

Angelhaken...
 2 fols. aus Weingard.
 2 Kistchen Eingeweide
 Catheter

8^o No. 2.

Böhmen
 Marins...
 C...
 L...
 Kaban...
 Derikamab

+
 [Rneppell, Eduard Wilhelm Peter Lincoln:
 Verzeichniss von Anneliden, Crustaceen, Zoophi-
 ten, Mollusken, Säugetieren, Vögeln, Amphibien
 und Fischen Nord-Afrikas. Bd 4.]



130
 11
 13
 2

025
 002
 051
 002
 000
 052
 052



Handwritten text on the left edge of the paper, possibly a list or index.

Fragment of handwritten text at the top of the page, partially obscured by the flap.

Main body of handwritten text, appearing as bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten text at the bottom of the page, including names like 'Lamin', 'Fungella', and 'Mushen'.

Vertical handwritten numbers on the right side of the bottom section: 91, 88, 81, 9.

2 Angelhaken
 2 folschen Weingart.
 2 Kistchen Eingeweide
 Catheter

8 No. 2.

Bahar
 Kabanine
 Derikamab
 Musirin

Surgethiere

Arabische
 in Kordofan
 in Darfon

Syatien
 Magasin
 Gelidat
 Masabem
 Kababien



130
 11
 13
 2

025
 002
 051
 002
 000
 050
 050

Iris	Pupilla Nahrung	Länder Nahmi	Vorkommen
------	-----------------	--------------	-----------

	Vogel, Ein Pratten p.p.	Abu Alfene	in Erdhöhlen + Anfangs februar bei Abu Karase
--	----------------------------	------------	--

hellbraun	groß. Wie vorstehende Speeres	Abu Wosie	in Erdhöhlen + Anfangs februar bei Abu Karase
-----------	----------------------------------	-----------	--

dunkel braun,	sehr groß. Pflanzensamen; Saberes		in Erdhöhlen in kleinen faulen
------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Der Penis ist die Luer nach gerichtet; er endet in einer cartilaginösen Membrane, die wie ein S getrieben ist. Das freistehende Ende dieser Knorpel Membrane bildet einen Haken.

hellbraun rund	Vogel p.p. Pratten	Sabata	Paarweise auf Baumen in diesen Gebirgen
-------------------	-----------------------	--------	--

N.	Genus & Species	Geschlecht	Brust Warzen	Lunge
----	-----------------	------------	-----------------	-------

5	Camelopardalis Giraffa	masc	4 an Inguine	lang, an
---	---------------------------	------	-----------------	----------

skel

Androuin de V. de V. Genetta
 Leber 7 Lappchen
 Milz lang, ^{sch} 3 kantig, verwasch
 roth
 Kleines Coecum
 Lunge links 3
 rechts 4

6	Gallina senegalensis		2 an d. Brust & 4 an Bauch	
---	----------------------	--	-------------------------------	--

skel

Der Magen wie bei den Menschen,
 die dünne Darm 2 mal so lang als die Krone
 dem folgt ein ungeschwammtes Coecum, $\frac{2}{3}$ so lang
 als die Krone; die dicke Darm 3 $\frac{1}{2}$ so lang als
 die Krone. Leber 3 Lappchen
 Die Leber hat einen Knochen, & die Egel
 ist mit rothweissen stehenden Nadeln
 bewaffnet.

Zus	Pupille	Nahrung	LanderNahme	VorKommen
-----	---------	---------	-------------	-----------

hell
 rothbraun klein
 sehr geringe Größe



heißt Teth
 in den Löchern von hohlen
 Bäumen Parweise
 lebt von Vogeln & Insekten

N ^o	Genus & Species	Geschlecht	Brust Warzen	Zunge	Pin
----------------	-----------------	------------	-----------------	-------	-----

7.	<i>Nictaris Taboldi</i> oben & unten 2 Schneide zähne		2 auf d. Brust.	fleischig rauh	
N: 52.	Tiefe Grube auf der Stirn; Fleischauswuchs auf der Nase			lange Ohren; lange Schwanz verbunden bis an die Spitze mit der Hinter- füße	
Skellet	11 R + 1 Skelet				

8	<i>Despet. llio leucogaster.</i> Keribfleischauswuchs auf der Nase; 2 Phalangen am Index; langer Schwanz, bis an die Spitze verbunden durch eine Membrane mit den Hinterfüßen; Oben 2 zusammen die obere Schneide zähne; unten 6 kleine Schneidezähne			fleischig mit etwas brauner Spitze; Kleine Ohren	
N: 53.	8 R + 1 Skelet				

9 *Canis flavus*
52 N^o

4.
Iris Pupille Nahrung Landnahme Vorkommen

Schwarz

^{Abstrich}
Schwarz in getrockneter Form; Index 1 Phalange
auf Tabolet Bäumen;
heißt Abu Prigok. —

hellbraun

heißt Abu Kosein

Hyena leucobriss.

Nach neuerer Untersuchung scheint mir dieses Thier ein eigenes Genus zu bilden, das zwischen Canis & Hyena eingeschaltet werden muss. Ich nenne es Kynos maculatus benennen.

Das Karstavianbräun; Haare glatt; Lungen rechts 5, links 4 flügel; Leber 9 Lappen
Darmkanal vom Pilorus bis zum After $2\frac{1}{2}$ mal so lang als der Körper (ohne den Schwanz gemessen); nicht sonderlich langer Genus; Magen wie bei den Meercaniden; Penis mit einem Knochen versehen; bes. ^{in jeder Seite des After eine} die sich nach außen öffnet
Genus ~~schneidet~~ Geruchsdrüsen am After. Um die Vulva ein d. Ker Muskelring; denn innerhalb derselben 2 blindsa. Keil zw beiden Seiten eines Clithorax, in der Vertiefung dieser Blindsäcke öffnen sich zwei kleine Ductus.

Das Thier heist Simit; lebt truppweise an den Brunnen, und jagt in Gesellschaft Gazellen, Schaf, p.p. Dieses ist das einzige Thier dessen Fleisch die Araber nicht essen.

Herpestes dispar.

Körper länglich fleischig, die Mitte des vorderen Drittels mit rückwärts stehenden Hornschalen versehen. Sämmtliche Ringe der Trachea unvollständig. Jeder Lungenflügel in 4 Theile getheilt. Leber 9 Lappen; mittellanger Cæcum. ^{Prethum & dicke Därme} 9: 6"
^{Dicke Därme & Duodenum} 4: 3"; Milch länglich 3 kantig

Tipus minor


Jeder Lungenflügel 3 Abtheilungen; Leber 6 Lappen
sehr dickes kurzes Coecum; Ductus spermaticus
macht im Bauche eine doppelte Windung in
Gestalt eines Amorphorns.

Felis leopardina? Tubata

Lunge links 3 rechts 2 flügel; Leber 5 Lappen
& ein Einschnitt. Iris braunlich gelb; Kein Coecum
& Driese öffnet sich nur beiden Seiten hinter der
After; heißt Tahat. Sehr häufig bei in der
Wüste südlich von Arabien, kommt selbst
bis Sues vor, und scheint ehemals in Egypt
gewesen zu sein, was in dem Catakomben von
Gurna abgebildet ist; Die Klauen sind abge-
stumpft, wie bei dem Hund, denn sie sind
nicht zurückziehbar wie bei dem andern Katzen
Arten.

Histiot cristatus?

Iris schwärzlich; Lunge fleischig etwas rauher
Magen wie nebensächlich; sehr dickes
großes Coecum bei welchem sich die Därme
schlingelhaft inseriren; Leber 6 Lappen;
Jeder Lungenflügel besteht aus 7 Haupt & 2 Neben
Abtheilungen, und jede derselben aus zahlreicheren kleineren
Unterabtheilungen. Am der Basis der Praethe, da
wo sich die Urethra inseriren 2 große in viele
Lappen getheilte Drüsen, ferner ein Appendix



bestehend aus einem länglichen Blinddarm, in
welchem sich 12 kleinere Blinddärme inseriren.
Heißt Nadjel bei den Arabern; wohnt in
Erdböhlen, frisst Gras und geht nur bei Nacht
aus. Gulo Pectoris? megalonix n. l.

Iris dunkelbraun; 4 Milchwarzen, 2 am
Bauch, 2 am Inguine; Lunge fast ohne
markliche Stacheln; Lunge auf jeder Seite 3flügl.,
Leber 6 Lappen. Milz länglich 3kantig; kein
Cöcum; keine Hinterdarm und After oder den
Geschlechts theile. Heißt Abukern; wohnt in
Erdböhlen, frisst Mäuse, Schildkröten, p. p.

Antelope Leucorix.

Iris kastanienbraun. 4 Milchwarzen am Inguine;
zwei Balle ohne Öffnung nach außen zu innerhalb
der Phalangen, welche mit Haaren besetzt sind.
Keine Vertiefung an den Wüthen; keine Threusische.
Ein gleiches bei A. addax.

Antelope Dama.

Iris kastanienbraun; Threusische & Vertiefung an den
Wüthen; keine Haarballe zwischen den Phalangen.
Leber Hauptmasse mit einem Einschnitt für die
Cistifelle; nach hinten zu ein kleines Nebelappen.
Lunge links 4, rechts 3 flügl; nur 2 Milchwarzen
am Inguine. Heißt Ad Ledra, oder Adia.

6
Belis caracal
Linceus melanolepis heißt bei den Arabern
Omreichat; er ist häufig bei Abu Kale, Weber, &c.
und tötet selbst Ziegen. Sein Fellgelb. —

Notizen über einige Thiere die südlich von Gomer
nach dem Bakhed Abbiad zu vorkommen.

a) Omjabe; eine Antilope von der Größe der A. Dama
man; Hörner wie das Weibchen der A. Dama;
Balz ganz roth, mit Ausnahme des unteren Theils
der Füsse, welche weiß sind; die Stirn ist schwarz.

b) Tedal. Antilope von der Größe eines Pferdes.
Hörner wie der Addax aber weit größer & dicker
Balz roth, Hinterfüße schwarzlich, Stirn schwarz
Schwanz wie A. leucoria.

c) El Hamra, Antilope ^{größer als} von der Größe der A. Dorcas
Hörner gleichfalls etwas größer & von derselben Form
wie die Dorcas. Balz ganz roth, nun längst jede
Flanke ein breiter schwarzer Streif.

d) Abu Delaf, eine Art Ameisenfischer, von der
Höhe eines großen Schafs, lange Ohren & lange
Schwanz; länglichen Kopf mit fleischiger
Schwanz ohne Zähne, Balz von der Farbe &
sparsam behaart wie die Bauchseite des Putorius
mexalonis; 3 Zehen an jedem Fuß; wohnt
in Erdhöhlen; frisst Ameisen.

e) Om Gissa, ist das formosianische Teufelchen.
an jedem Fuß 2 große & 2 kleine Zehen.

f) Anase das Einhorn. Balz weißlich; Größe
& Bau eines Pferdes, gespaltene Krone; auf der Stirn
ein langes gerades Häutiges Horn; kommt in den südlichen

sten Wisten vor: ich habe nur 3 Personen ge-
sprochen die dieses seltene Thier gesehen haben.

g.) Marafief. Hyänen Art graues Balck mit
schwarzen runden flecken.

h.) Nimmer bidah l. Gebel; ist mit den großen
Wahrscheinlichkeit flis ^{Leopardus} ~~subata~~; soll bei weitem
größer sein als flis ^{jubata} ~~Leopardus~~ ~~mit einem schwarzen~~
~~von~~ ~~ausgestrichelt~~ ~~linget~~ ~~in~~ ~~der~~ ~~Parten~~, und schwimmt
auf gelblichem Grund.

Siale ist ein Akarienbaum, die Stämmung mit weit
ausgestreckten linget der Erde herlaufenden Aesten;

er hat 2 erlei arten Stacheln, lange & kurze wie
Wiederhaken; seine Samenschoten sind gekrümmt,
er schmeckt einet schwarzes Harz aus. *Acacia Legat*

Sinner eine andere Akarienart, die viel sehr hoch
wird; der Busch erhebt sich konisch & ist oben
gleichsam horizontal abgestutzt; die Aeste sind
mit kleinen gepaarten Wiederhaken versehen.

Karare eine Strauch, der sich etwas ranket und
die felsigen Hügel liebt; er ist mit kleinen einfachen
Wiederhaken versehen. *Acacia albid.*

l' Baum eine Baumart ohne Blätter, dessen frische
lange Schoten bildet, die viele kleine Nüsse enthalten.
sie sind von angenehmem Geschmack. *Moringa Seylanica*

Ocher = *Asclepias procera*
Gelid = *Balanites aegyptiaca*.

Marschroute vom Nil bis an den
Brunnen C. Webis. —

21. 17. April. Abreise von Marsukotte, marschirt 3^h
10° S. W., Kieselstein Hügel mit wenigem Buschwerk.

21. 18. — Nebelwolken, denn etwas Regen nach Sonnen
Aufgang, warmer S. O. Wind; Mittags Windstill, wolky
marschirt 6^h in einer Richtung von 10° S. W.

21. 19. — Nachts Windstill, Gewitter im Süden; Marsch
8^h in Richtung von 10° S. W. bis wir uns bei dem Brun-
nen Abu Sale lagern; er ist umgeben von Sandstein
Hügel, welche ein großes Thal bilden, das voller Bäume
ist; man findet hier immensviele Wäpser, aber in
an Regen sparsamen Jahren in sehr geringer Quan-
tität; der Brunnen hat eine Tiefe von 12 Fuß zwischen
Lager von Kieselgerölle und Topferton.

Hier geblieben 7 1/2 20. Apr.

21. 21. Marschirt 9^h in einer Richtung von 10° S. O.
bis wir in das kleine Wadi des Brunnen C. Webis kamen

Hier fanden wir in einer Tiefe 10 Fuß an mehreren
Stellen zwischen einer laubelblauen Topferton
Schicht reichliches Wäpser; Auffallend war es uns
deshalb in anderer Brunnen gruben die wir 5 Schritte von
den unsrigen bis zu einer Tiefe von 18 Fuß in gleicher
Topferton Schicht einwühlten, wäpserlos waren!

Von hier liegt Simic nach W. S. W. in einer
Entfernung von circa 7^h —

Von Webis liegt Gummer direct nach S. O.
in einer Entfernung von 12^h. Der Brunnen von Wadi
Mallagh liegt in gleicher Richtung 8 weiter

Der Brunnen Kapsanacci liegt von Webi's (hier
Südlich) in einer Entfernung von 8^h; die Brunnen
von Elai in gleicher Richtung 9^h weiter.

Von Gummier östlich in einer Entfernung
von 4^h sollen sich die Trümmer von 2 großen An-
siedelungen vorfinden, deren Gebäude aus Leuten
bestehen, und mit Schiefeln versehen sind. 3 groß
ausgemauerte Brunnen finden sich vor; der
Ort heißt Wadi: Mozattem! —

Abu Gaschim ein Hügel der gleichfalls einige
Trümmer von Wohnungen vorfinden, doch sind dort
nicht von behauenen Steinen; er liegt von Webi's nach
P. P. W. in einer Entfernung von 5^h circa; ein
anderer Hügel — Abu Gelie — der N. N. Westlich
von Webi's in einer Entfernung von 4^h circa liegen soll
enthalt gleichfalls Trümmer von Wohnungen. —

1. Teil
Sogel

[Faint, illegible handwriting]

530

N ^o	Geschlecht & Species	Iris	Pupilla	Zunge
1.	<i>Colinus scensorius</i> ?	braunroth	—	Kurz, platt, mit ausgestrich. hornig Spitze
	♂ . 4.	trübe dunkel rosenroth;		alle 10 Zehen nach vorn ausgerichtet
		219		+ 1 Skelet

2	<i>Nectarinia scapularis</i> (im Winterkleid) / fauniana	Schwarzbraun	lang, schmal	zugespitzt, hornig schnell
			231	

3	<i>Pyrrhuloxia melas</i> (in Winterkleid)	Kastanienbraun	Kurz zugespitzt hornartig.	
			233	

4	<i>Tringilla superciliosa</i>	hellbraun		
	5.		244	

5	<i>Pogonias erythrocephala</i>	rothbraun	Kurz flach, hornig Spitze gespalten	
	13		202	+ 2 Skelet

6	<i>Buceros corpicillatus</i>	rothbraun	sehr Kurz lauzellen förmig hornig	
	4 St.	herv. Abu marzouk		+ 1 Skelet 230

7	<i>suberiza</i> <i>Fregilla flavigaster</i>	schwarzlich	mittelmäßig, hornig hornartig, scharfe Spitze	
	4 ♂ St		234	

Nahrung & Magen	Vorkommen	Bemerkung
-----------------	-----------	-----------

Keruberen (Gelid) im halbmembranösen Magen	Treppweise auf den Gelid Bäumen	+ in Tanna in Lubeid. Schnabelbasis blutroth; nackter Ring um die Augen Koschenilleroth;
--	---------------------------------	--

Kleine Insekten im membranösen Magen	Einseln auf dem Baum Büschel	+ Ende Tanna bei Obaid.
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------

Lämmerien im halbmembranösen Magen	Treppweise auf niedrigen Dornbüscheln	+ Ende Tanna bei Obaid.
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

Lämmerien	Treppweise auf dem Strauchwerk	+ Ende Tanna bei Obaid.
-----------	--------------------------------	-------------------------

Lämmerien im muskulösen Magen	Einseln auf Büscheln	im Oranggelb gefalt. ist sehr weich. Wachs + Ende Tanna Abu Karara
-------------------------------	----------------------	--

Lämmerien im muskulösen Magen	Einseln auf Büscheln	fleischfarbigen nackten Ring um die Augen + Ende Tanna Abu Karara
-------------------------------	----------------------	---

Lämmerien im muskulösen Magen	Treppweise auf andern feingillen	+ Ende Tanna Abu Karara
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------



N ^o	Geschlecht & Species	Iris	Beugung
8	<i>Lanius rubigaster</i> 1.	Strohgelb 207	Schaufelförmig hornig, eiserige Spitze
9	<i>Tringilla</i> ^{picta} <i>gularis</i> 4	Karmiroth 210	Kegelförmig, flei- schig mit horniger Spitze
10	<i>Tringilla caerulea</i> 6.	Karmiroth 209	wie vordaher
11	<i>Trochus plebejus</i> 4	Strohgelb 235	Schaufelförmig hornig, doppelt spitzig
- 12	<i>Colaptes auratus</i> 5	Schwärzbraun, mit einem eingelassenen Ring um die Augen Karmiroth 236	große harte fleischig
- 13	<i>Spizella monticola</i> 1.	Zitrongelb 237	große harte fleischig ausgehobelt Spitze
- 14	<i>Muscipora torquata</i> (Geschlechtsunterschied) 5 + 1 Weib	lebhaft Zitrongelb 238	Kurz flach lanzetten- förmig, hornig mit gespaltener Spitze
- 15	<i>Lanius excubitorides</i> 3	Kastanienbraun 206.	Lanzettenförmig flach hornig, rasig Spitze
- 16	<i>Tringilla cinereiceps</i> 4	hellbraun 245	Kegelförmig fleischig

Nahrung & Magen Vorkommen Bemerkung

Ameisen im menschlichen Magen ^{Truppweise} ~~Einzelne~~ im Gebrauche + Erde Lamm bei Harare

Lamproidea im menschlichen Magen mit anderen Insekten + Erde Lamm bei Harare

in halb muskulösen Magen-vegetabilien ^{Truppweise} ~~Einzelne~~ auf Büschen

Kabackbeeren, Getreide, Baumwollensamen ^{Truppweise auf} Büschen + Erde Lamm 1 Jahr heist Schilling

Käfer ^{Einzelne auf} Bäumen + Erde Lamm 1 Jahr

Kleine Insekten ^{Einzelne auf} Buschwerk + Erde Lamm 1 Jahr

Kleine Käfer ^{Einzelne auf} Büschen + Erde Lamm 1 Jahr

Lamproidea ^{Einzelne auf} Büschen + Erde Lamm 1 Jahr



97. Geachticht d. Species: Fais Pupilla Kunge

- 17 *Centropus superciliosus* lebhaft Karmosinroth 200 Laurettenförmig
1 hornig, wenig
gepunktet Spitze
- 18 *Silvia bicicaudata* Karmosinroth langschmal, = 221 schaufelförmig
3. = 221
- 19 *Picus ocellatus* Dunkelbraun langspitzig, hornig
1. Knochentrost - Schnellbord
232
- 20 *Silvia musciptera* Kastanienbraun flach, hornig
1. 248 rassenig
- 21 *Fringilla leucogaster* Dunkelbraun hornig, schaufel-
formig, ausgepunktet
Edolis Dong glou 246
- 22 *Quercus caerulea* Karmosinroth schaufelförmig, hornig
1 220 rassenig Spitze
- 23 *Silvia rubripilata* gelbbraun hornig, schaufelförmig
7 247 zugespitzt
- 24 *Columba cospicillata* rothbraun, nach Basis flüchtig
2 anfang zu einem spitzen
schmalen goldgelben Spitze
196
- 25 *Fringilla ptiliacus* rothbraun klein konisch
2 162 flüchtig
- 26 *Merula philochina* Kastanienbraun
2 193
- 27 *Cursorius isabellus* Dunkelbraun hornig, ausgehöhlt
25. 26. + 2 Keil. länglich rassenig
Spitze

Nahrung & Magen	Vorkommen	Bemerkung
-----------------	-----------	-----------

Candora in membra nefr Magen.	Truppenweise auf Buschwerk	+ Ende Januar Abri Mayas
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Vegetabilien?	Einzeln auf Buschwerk	+ Anfangs sehr
---------------	-----------------------	----------------

Kleine Gruppen pp.	Einzeln auf Bäumen	+ D ^o
--------------------	--------------------	------------------

Klein Insekten	Einzeln auf Gebüsch	+ Anfangs sehr
----------------	---------------------	----------------

Lämmerchen	Einzeln auf Gebüsch	+ D ^o
------------	---------------------	------------------

Skarabäen	Einzeln auf Gebüsch	+ D ^o
-----------	---------------------	------------------

Kleines Insekten	häufig auf Buschwerk	+ D ^o
------------------	----------------------	------------------

Lämmerchen	Paarweise auf Bäumen	+ D ^o perit Tabas
------------	----------------------	---------------------------------

Lämmerchen	Truppenweise auf Busch	+ D ^o
------------	------------------------	------------------

Lämmerchen im hoch muskulösen Magen & sehr lang Coecum	Truppenweise auf Gebüsch häufig auf der Erde	+ D ^o
--	---	------------------

Käfer Skarabäen im muskulösen Magen	Truppenweise auf der mit Halpa bewachsenen Ebene	+ D ^o hente Kjeu.
--	--	---------------------------------



N^o Geschlecht & Species Iris Pupilla Menge

- 28 Neues Geschlecht, wenn Dunkelbraun
 es nicht von Mellifera
 2 239 nicht sonderlich
 groß, fleisch, hornig
 mit ausgehebbler
 schwar zaseriger
 Spitze
 Chaabel lang, zugespitzt, dunkelbraun
 halb bedeckt durch
 Membran, an dem
 Schaabel. Die außen
 festsitzen der
 Barren, an dem
 Barren des
 verhalten
 mit 21 mittlern
- 29 ^{Sacura} Lampyrtonis ¹ ~~causa~~ strohgelb 205 laurblatförmig
 hornig, zaserig
- 30 ²⁰⁵ Perdix ¹ ~~stappertoni~~ Kartausenbraun Kurz hornig mit
 Genickth. Unterhind. Narkelring um die Augen & ffe
 hat Quere 4. 240
- + 31 ^{ventralis} Perdix ³ ~~fang~~ Dunkelbraun; Kurz zugespitzt
 Narkelring & ffe Liegetrost 241
- # 32 ¹ Xanellus capistratus Dunkelbraun; ffe lang, schmal
 & schmal schwarze fleischig, mit hornig
 Spitze 174
- 33 Charadrius palustris Orange gelb 198 langlich schmal
 fleischig, hornige
 Spitze
 9 St. + 1 Kelet Schaabelbapen &
 ffe rosenroth
- 34 ⁴ ~~flouey galbula~~ us. rötlich orange gelb 212
- 35 ⁵ ~~flouey galbula~~ schweis Kurz hornig
 fleischig 242
- = 36 ¹ flouey galbula rötlichbraun Kurz hornig
 mit horniger Spitze 213

Nahrung & Magen Vorkommen. Bemerkung

Insekten Larven in membranöse Magen.	auf wideren Gebirg in kleinen Truppen Gabelköpfe	+ Anfangs februar bei Ab. Karan
1 flügelte Wespe, die folgende Infusorien bei zur 5 welche die Längste ist	Schwamm länglich etwas zugespitzt in die flügellose weiße Binde.	Oberheit des Kopfes. Kopf Schwamm Nadelblau mit Metallglanz, Kahl, Hals & Bauch rauh schwarz
Ameisen im halb muskulösen Magen	Einseln auf Bäumen	+ Med. februar
Lämmerien im stark muskulösen Magen Vergelblich	Paarweise in der Hälfte der großen Ebenen	+ Med. februar
Lämmerien im stark muskulösen Magen Vegetabilien im stark muskulösen Magen	Truppenweise in Hälfte	+ Med. febr. bei Ab. Karan
halb muskulöse Mag		+ Med. febr. bei Ab. Karan
im stark muskulösen Mag Lämmerien		

N: Geschlecht & Species Iris Pupilla Leucis

37 *Puccia pictus* Kochenillwurz lang warmsfarig
taynographus 1. 218
 = 38. *Puccia olivaceus* 1. Orangebl. flach lanettenförmig
 1. 243 gespaltenen Spitze

Spindel gerade; stark zusammengedrückt mit hakenförm.
 Spitze, wenn stark angekerbt; Nadelchen unbedeckt,
 mit einer Membran versehen, die an einer kleinen
 runden Öffnung leidet

39 *Pittacus Farguatus*

40 *Panicula nigricanda*

41 *Coracias ^{abyssinica} cyanus* 1. 175 Kardenrot hornig flach und
 2. 175 eanng. Spitze

42 Neues Geschlecht
oxydactylus gigant.

Spindel lang, gekrümmt zusammengedrückt,
 geröhrt; oben mit einem hornartigen
 versehen; Nadelchen an der Basis derselben
 langförmig, mit feinem bedeckt, Nadelchen
 die äußeren Königblau; nadeln hart an der
 die äußeren & köhlhart Königblau &
 Karmosinrot ^{bei reifer} Iris schwarz.

6 + 2 Nekt. & bla Königblau bei
 der Jugend
 229



Nahrung & Magen Vorkommen (Beobachtung)

Larven, Puppen, Einseln auf Bäume + Maden fressen

Eiseln & Käfer im halb muskulösen Magen Einseln auf Bäume + Maden fressen ^{Madjen}

flügellose Käfer, deren Stufenweise bis zur 5. welche die längste ist; auf der Leber etwas verwaschen an der Basis und der Mitte

Kopf & Nacken aschgrau; Brust flügel & Schwanz grauweiß, die Federn der flügelartigen enden mit einem weißlichen fleck; Kehle, Bauch & färsen rotbraun gelb.

Scarabaeiden im halb muskulösen Magen Einseln auf Bäume + Maden fressen

Zunge sehr kurz, Carrettenförmig, fesselförmig flügel zugewandt; die 5 an Länge

Die 5 an Länge mit der Mittleren Leber verwaschen Nagel kurz; Schwanz mittelst lang

Alle Federn, schwarz mit Ausnahme der flügel Federn, welche alle schwarz sind in halb muskulösen Magen Käfer, Puppen, & Larven? hat von beiden



W. Entschl. & Species Paris Pupilla Linnæus
43 *Lanius* ~~*collurio*~~ *collurio*? Kartägenbräun. kornig, rötlich,
hörnig, rötlich

44 *Otiscus* ^{*arabicus*} ~~*arabicus*~~ gelblich; rötlich; kornig, rötlich.
2 N. n. 228. hater in geräth

2 *Pyrrochloa minuta*.

1 *Nedonca calurus*

2 *Turdus atropurpureus*

1 *Lanius bicolor*.

1 *Merops rubicus*. 217

1 *Motacilla lugubris*.

11 *Fringilla scabra*

1 *Chalchicomula*

1 *Saxicola aurita*.

1 *Saxicola olivacea*

1 *Saxicola nigricauda*

2 *Alauda*

1 *Pyrrochloa fusca* 249

1 *Silvia* 250 ? bullbraun.

Nahrung & Magen Vorkommen Bienen

Insekten Egel auf Haut + Med. f. ab

in halbmuskulösem Magen Scarabien Egel in der Truff. hart Merba

Florence

- N: 1. *Meropistes gineus Geoffroy*
2. *Gallus senegalensis*
3. *Merops coronatus*
4. *Nectarinia metallica*
5. *Colinus caucasiensis*
6. *Bucconas nasutus*
7. *Poconias erythrocephala*
8. *Lanius barbarus*
9. *Merops viridis*
10. *Cuculius isabellus*
11. *Lanius personatus f.*



6



Amphibien.

N ^o .	Geschlecht & Species	Iris	Pupilla	Zunge
------------------	----------------------	------	---------	-------

1.	<i>Monitor ocellatus</i> (m)	rotlich mit gelb braun gemischt.	groß.	schwarz in 2 lange Spitzen aus- laufend.
----	------------------------------	--	-------	---

2.	<i>Nopora reticulata</i> od. <i>Coluber nauama</i> <i>Popeia asictus</i>	strahlig	langlich gepalte ①	Korn flach nimmt lang zwei spitz
----	--	----------	--------------------------	--

Nahrung & Magen

Vorkommen

Bemerkung

Eidecken, Ratten,
Vogel pp

in Erdhöhlen, im
Sand

Anathomydas wie
die des Mouton
terrestris; hier gleich
falls Woran

Bäume
Korwofan

✓

Luz
Schwam
2 lange
Körner
Korwofan
Korwofan
Korwofan
Korwofan

21


44



44









Einhorn



8° Hs 2 Bol. 4
Fundort: B. 6

