


go R. 17i. 2965. = Soe 11
Bd. 213
[2. ex]



H. B. Mayer
Vignette Tafeln von Muffeln der m. K.
Halle fol. 67. 1808



Partel. Blatt 14 v. Michael.

Nom

Situation

Figure et description

Comparaison (Cubelung)

Structure

Attaches

Wagen



2
S. E. h. Sömmerring

Vom Baue

des

menshlichen Körpers.

Zweyter Theil.

Bänderlehre.

Zweyte umgearbeitete Ausgabe.

Mit Kaiserl. Königl. und Churfürstl. Sächs. allergnädigster Freyheit.

Frankfurt am Main,
bey Warrentrapp und Wenner.

1800.





3
G. F. S ö m m e r r i n g

Lehre von den Bändern

der

K n o c h e n.

Zweyte umgearbeitete Ausgabe.

Mit Kaiserl. Königl. und Churfürst. Sächs. allergnädigster Freyheit.

Frankfurt am Main,
bey Warrentrapp und Wenner.

1 8 0 0.





U
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
S. 7
S. 8

Uebersicht der Bänderlehre.

Schriften.

Bänder im Allgemeinen.

- U**nterscheidungszeichen der Bänder von andern Theilen.
- S. 2. Eigentliche Bänder.
- S. 3. Uneigentliche Bänder.
- S. 4. Befestigung der Bänder in Erwachsenen und Kindern.
- Bestandtheile der Bänder.
- S. 5. Kapselbänder, Seitenbänder.
- S. 6. Gelenkfaß.
- S. 7. Benennungsgrund der Bänder.
- S. 8. Nutzen der Bänder.



Beschreibung der einzelnen Bänder.

Bänder des Unterkieferß.

§. 9. Rechtes und linkes Band des Knorpels im Kiefergelenke.

§. 10. 2 Membran des Kiefergelenkes.

2 Seitenbänder des Unterkieferß.

Bänder der Hörknöchelchen.

§. 11. 6 Gelenkkapseln der Hörknöchelchen.

Bänder der Zungenbeine.

§. 12. 2 Gelenkbänder zwischen dem mittleren Zungenbeine und den Seitenzungenbeinen.

2 Bänder zwischen dem Mittlern und den Rudlichen Zungenbeinen.

2 Bänder zwischen den Seitenzungenbeinen und dem Schildknorpel.

Bänder zur Befestigung des Kopfs an die Wirbelsäule.

§. 13. 2 Gelenkkapseln zwischen dem Grundbeine und Atlas.

§. 14. 2 Vordere Ausfüllungsbänder zwischen dem Grundbeine und Atlas.

§. 15. 2 Hintere Ausfüllungsbänder zwischen dem Grundbeine und Atlas.

VII

- §. 16. Bandwesen zwischen dem Kopfe und den Halswirbeln.
 §. 17. 2 Seitenbänder zwischen dem Grundbeine und Zapfen
 des zweyten Halswirbels.
 §. 18. 2 Seitenmembranen zwischen dem Grundbeine und
 Zapfen des zweiten Halswirbels.
 §. 19. 1 Gerades Band zwischen dem Grundbeine und Zap-
 fen des zweiten Halswirbels.

Des Atlas.

- §. 20. 1 Querverband des Atlas.

Der Wirbel.

- §. 21. 1 Vordere Binde der Wirbelsäule.
 §. 22. 1 Hintere Binde der Wirbelsäule.
 §. 23. 23 Zwischenbänder der Wirbel.
 §. 24. 40 bis 46 Gelbliche Bänder zwischen den Bogen der
 Wirbel.
 §. 25. 22 bis 23 Bänder zwischen den Dornfortsätzen.
 §. 26. 20 bis 23 Bänder zwischen den Spitzen der Dorn-
 fortsätze.
 §. 27. 14 bis 15 Gerade Bänder zwischen den Querverfortsätzen.
 §. 28. 48 Gelenkbänder der schrägen Fortsätze.
 §. 29. 24. Bänder der Rippenknöpfchen.
 §. 30. 24 Querverbänder der Rippen.

- §. 31. 24 Innere Bänder der Ribbenhälfe.
 §. 32. 18 bis 20 Aeußere Bänder der Ribbenhälfe.
 §. 33. 18 bis 20 Venbänder der Ribben.
 §. 34. 12 Gelenkbänder der Ribbenknorpel.
 §. 35. 12 Zwischenbänder der Ribbenknorpel unter einander,

B ä n d e r d e r B r u s t b e i n e .

- §. 36. 1 Innere und 1 äußere Membran der Brustbeine.
 2 Bänder der Brustbeinspiße.

B ä n d e r d e s B e c k e n s .

- §. 37. 2 Lange hintere Beckenbänder.
 §. 38. 2 Kurze hintere Beckenbänder.
 §. 39. 2 Hintere Seitenbänder des Beckens.
 §. 40. 2 Große untere Beckenbänder.
 §. 41. 2 Kleine untere Beckenbänder.
 §. 42. 2 Obere vordere Beckenbänder.
 §. 43. 2 Untere vordere Beckenbänder.
 §. 44. 2 Vereinigungen der Hüftbeine mit dem Kreuzbein.
 §. 45. 1 Vereinigung der Hüftbeine unter einander.
 §. 46. 2 Membranen des großen Hüftbeinlochs.
 §. 47. 2 Zerstreute eigene Membranen des Kreuzbeins.
 §. 48. 2 Steißbeinbänder.

Bänder der obern Gliedmaßen.

Der Schlüsselbeine.

- S. 49. Band zwischen den Schlüsselbeinen.
- S. 50. Kapselband des Schlüsselbeins am Brustende.
- S. 51. Rautenförmiges Band zwischen dem Schlüsselbeine und der ersten Ripbe.
- S. 52. Band zwischen dem Schlüsselbeine und der Gräthenecke.

Der Schulterblätter.

- S. 53. Eigenes vorderes dreyeckiges Band des Schulterblatts.
- S. 54. Eigenes hinteres Band des Schulterblatts.
- S. 55. Kegelförmiges Band des Schulterblatts.
- S. 56. Viereckiges Band des Schulterblatts.

Des Oberarms.

- S. 57. Großes Kapselband des Oberarms.
- S. 58. Kapselband des Ellenbogengelenks.
- S. 59. Inneres Seitenband des Ellenbogengelenks.
- S. 60. Außeres Seitenband des Ellenbogengelenks.
- S. 61. Ringband der Speiche.
- S. 62. Sehnen Schnur der Vorderarmbeine.
- S. 63. Sehnenhaut zwischen den Vorderarmbeinen.
- S. 64. Knorpel am unteren Ende des Vorderarms.
- S. 65. Kapselhaut am Handende des Ellenbogens.

hülle.
 Rippenkiste.
 erpel.
 erpel unter einander.
 eine.
 der Brustbeine.
 e n s.
 ent.
 mit dem Kreuzbein.
 re einander.
 einloch.
 des Kreuzbein.



der
 zwischen
 dem



D e r H a n d.

§. 66. Gemeinschaftliche Binde des Rückens der Handwurzel.

§. 67. Gemeinschaftliche Binde der hohlen Handwurzel.

§. 68. Sehnenbrücke der Handwurzel.

§. 69. Kapselband des Gelenks der Hand mit dem Vorderarm.

§. 70. Band zwischen den beyden Reihen der Handwurzelbeine.

§. 71. Bänder zwischen den einzelnen Handwurzelbeinen der oberen Reihe.

§. 72. Bänder zwischen den einzelnen Handwurzelbeinen der unteren Reihe.

§. 73. Bänder zwischen den Handwurzelbeinen und Mittelhandbeinen.

§. 74. Bänder der Mittelhandbeine untereinander.

An den Handenden:

Rückenbänder,

Seitenbänder.

Innere Bänder.

An den Fingerenden.

7 10

Der Finger.

- S. 75. Hautbänder.
 Kapselhaut.
 Seitenbänder.
- S. 76. Querbänder der Finger.
- S. 77. Haltbänder der Sehnen der Fingerbeuger.
- S. 78. Schräge oder Kreuzbänder auf den ersten und
 mittlern Gliedern der Finger.
- S. 79. Haltband des Daumenbeugers.
- S. 80. Gefäßbändchen.
- S. 81. Sehnenstreifen an den Seitenrändern des Nagel-
 gliedes.



Handwurzelbeinen

...denk der Hand-
...den Handwurzel-
... mit dem Ver-
... der Handwurzel-
... Handwurzelbeinen.
... Handwurzelbeinen
... weinen und Mit-
... reinander.

Bänder der untern Gliedmaßen.

§. 82. Bänder des Pfannenauschnittes.

Aeußeres Band.

Inneres Band.

Des Schenkels.

§. 83. Kapselhaut des Schenkelgelenks.

§. 84. Rundes Band des Schenkelkopfs.

§. 85. Inneres Seitenband des Kniegelenks.

§. 86. Langes und kurzes äußeres Seitenband des Kniegelenks.

§. 87. Kapselmembran des Kniegelenks.

§. 88. Kreuzbänder des Kniegelenks.

§. 89. Bänder der Mondknorpel des Kniegelenks.

Des Unterschenkels.

§. 90. Oberes Band zwischen dem Schienbein und Wadenbein.

§. 91. Sehnenbinde am unteren Theil des Unterschenkels.

§. 92. Kreuzbinde des Fußgelenks.

§. 93. Sehnenhaut zwischen dem Schienbeine und Wadenbeine.

XIII

- S. 94. Höhere Bänder vornen und hinten zwischen dem un-
teren Ende des Schienbeins und Wadenbeins.
- S. 95. Niedrigere Bänder vornen und hinten zwischen dem
unteren Ende des Schienbeins und Wadenbeins.

Des Fußes.

- S. 96. Eigene Binden der Flecken einiger Muskeln, näm-
lich des langen, kurzen und dritten Wadenbein-
muskels, des eigenen langen Streckers u. s. f.
Sehnenhaut zur Anlage des Abziehers der groß-
sen Zehe.
- S. 97. Band zwischen dem Wadenbeine und Ferseubeine.
- S. 98. Vorderes und hinteres Band zwischen dem Wa-
denbeine und Sprungbeine.
- S. 99. Band des innern Knöchels.
- S. 100. Kapselband des Fußgelenks.
- S. 101. Bänder der Fußwurzelbeine untereinander.
- S. 102. Bänder zwischen den Fußwurzelbeinen und den
Mittelfußbeinen.
- S. 103. Bänder der Mittelfußbeine untereinander.

An den Fußenden.

Querbändchen.

Schräge Bändchen.

Handwritten notes:
An
zwischen
wird

Handwritten notes on the left edge:
Hiedmaßen.
ausgeschnitten.
s.
entf.
band des Knie-
elenks.
e l k.
enbein und Wa-
des Unterschenkel.
eine und Waden-



Fußsohlenbändchen.


An den Zehnenden.

Dünne Querebändchen.

- §. 104. Verbindung der Zehenglieder mit den Mittelfußbeinen und unter einander.

D e r Z e h e n .

- §. 105. Lange Bandstreifen der großen Zehenhautbänder.
Kapselhaut.
Seitenbänder.
- §. 107. Querebänder der Zehengelenke.
Haltbändchen.
- §. 108. Schräge oder Kreuzbänder der Sehnen der Zehengeuger.
- §. 109. Gefäßbändchen.
- §. 110. Sehnenstreifen an den Seitenrändern des Nagelgliedes.



3 10

Beste Werke
über die
Bänderlehre.

Isosias Weitbrecht Syndesmologia sive historia ligamentorum corporis humani — figuris ad obiecta recentia adumbratis. Petropoli 1742. 4to. ein fürtreffliches Werk. Die Kupfer in der deutschen Ausgabe Straßburg 1779. in 8. sind durch die Verkleinerung zu dunkel geworden. J. H. Loschge Knochen des menschlichen Körpers und ihre vorzüglichen Bänder. Erlangen 1791. und 1792. vierte Lieferung; übertrifft an Deutlichkeit und Richtigkeit der *Ab-* Abbildungen Weitbrecht.

Ab-
er
ung

mit den Mittelstüb-

sche.

sehen der Sehnen

dem des Nagele-

Bände

Unterschied

Ein Band

elastischen,

neben einan-

fern; oder

getrennte

Durch

scheidet

Haarigkeit

Farbe von

einem Ner-

von Echnen

einkommt,

nung oder

Doch sind

als andere

den Körper

Bänder der

Durch

einige Bän-

E. Bände

10

Bänder im Allgemeinen.

Stunde?
Unterscheidungszeichen der Bänder von
andern Theilen.

S. I.

Ein Band (Ligamentum) besteht aus beugsamen, elastischen, weissen, größtentheils parallelen, dicht neben einander liegenden, fest gewebten, soliden Fasern; oder kurz: aus Sehnenfasern, und hält sonst getrennte Theile zusammen.

Durch die Beugsamkeit und Schnellkraft unterscheidet sich ein Band von einem Knochen; durch die Faserigkeit von einem Knorpel; durch die Härte und Farbe von einem Muskel; durch die Festigkeit von einem Nerven; durch die Dichtigkeit von Gefäßen; von Sehnen aber, mit denen seine Masse völlig übereinkommt, meist nur durch die Lage und Bestimmung oder den Nutzen (s. Muskellehre S. 72. 74.). Doch sind einige Bänder fester, dichter, elastischer, als andere; vorzüglich unterscheiden sich die zwischen den Körpern der Wirbel liegenden, und die gelben Bänder der Wirbel.

Durchs Kochen wird eine Sehne weit früher, als einige Bänder, in eine Gallerte aufgelöst.

E. Bänderlehre.

II

*und Vol. 1. p. 59.
Vortel für 3 bei Ansehen bin der
früher als die Nerven, und werden
später löslicher als die Sehnen
in Gallerte.*

Durch chemische Zerlegung hat man nichts besonders, was sie von anderem Zellstoffe unterschiede, herausgebracht.

E i g e n t l i c h e B ä n d e r.

S. 2.

Im eigentlichen, strengern Verstande, begreift man unter dem Namen Band, nur diejenige sehnige Zurüstung, durch welche die überknorpelten Gelenkflächen der Knochen oder sonstige Knorpel an einander gehalten werden, oder sehnige Häute und Streifen oder Striemen, welche Knochen oder Knorpel, auch ausser den Gelenken, zusammenhalten; oder sehnige Binden, Scheiden, Ringe und Brücken, durch welche die Sehnen der Muskeln in ihrer Lage erhalten und eingeschränkt werden; oder Sehnenbündel, welche weiche Theile zusammenhalten, z. B. das Band der Augenlider. ¹

U n e i g e n t l i c h e B ä n d e r.

S. 3.

Uneigentlicher nennt man Bänder diejenigen Häute, mittelst welcher weichere Theile, z. B. die

¹) Weitbrecht will S. 7. diese Sehnenhaut nicht zu den Bändern gerechnet wissen, weil sie durch Verbindung mit den Augenlidern einen dicken Körper bilde, der den Namen und Nutzen eines Bandes verlöre, welches ich nicht so finde.

Ohren, die Lippen, die Zunge, der Kehlkopf, die Leber, die Milz, die Därme, die Geschlechtstheile u. s. f. an ihre Stellen befestiget sind, und welche ihres Orts beschrieben werden.

Die Sehnenscheiden oder sehnigen Binden, welche die Gliedmaßen, als meist zarte dünne Bänder, umkleiden, sind bey den Muskeln beschrieben.

Befestigung der Bänder.

S. 4.

Bey Erwachsenen hängen sie, wenigstens die stärksten und größtsten unter ihnen, so fest am Knochen, daß sie nur durch die äußerste Fäulniß sich rein von ihm trennen lassen. Bey Kindern hängen sie sehr fest mit der Knochenhaut oder Knorpelhaul zusammen, so daß sie gemeiniglich sich gleich mit selbiger bey einer mäßigen Fäulniß vom Knorpel oder Knochen ablösen lassen.

Bestandtheile der Bänder.

Uebrigens bestehen sie aus einem sehr dichten festen Zeugstoff, in welchen sie durch die Einwässerung aufgelöst werden. Sie haben, wie die Sehnen, nur sehr feine und wenige Blutgefäße, Saugadern und gar keine Nerven. Doch liegen an einigen Stellen ihre Fasern für den Durchgang der Blutgefäße auseinander. Inwendig sind sie meist mit der dichten,

doch durchsichtigen, äußerst glatten, schlüpfrigen, ringsum geschlossenen, folglich die Gelenkschmiere nicht durchlassenden Gelenkkapsel oder einer Schleimhaut überzogen, nach außen zu aber rauh, indem sie in den Zellstoff der Haut u. s. f. übergehen.

Kapselbänder und Seitenbänder.

§. 5.

Es giebt hauptsächlich zwey Arten von Bändern, Kapselbänder und Seitenbänder: denn die dritte Art von innern Bändern kommt nur im Hüftgelenke und Kniegelenke vor.

Alle beweglichen Gelenke haben Kapselbänder, die gewöhnlich durch Seitenbänder verstärkt werden. Einige Bänder bestehen aus dicht neben einander liegenden Faserbündeln, andere aus locker zusammenhängenden Bündeln; andere stellen Membranen vor; andere rund zusammengedrehte Seile oder Stricke; andere bestehen aus gekreuzten und verflochtenen Fasern.

Ein Kapselband besteht gewöhnlich aus einer zarten, dünnen, aber sehr dicht gewebten, elastischen, inwendig äußerst glatten, beständig feuchten, gleichsam eingesalbten Membran, welche, indem sie ringsum die an einander passenden überknorpelten Gelenkflächen der Knochenenden umschließt, eine völlig ge-

schlossene, den Gelenksaft im Leben und die Luft nach dem Tode nicht durchlassende, Höhle oder Kapsel bildet.

Ein solches Kapselband wird gewöhnlich, besonders an Stellen, wo es größer ist, durch offenbare Sehnenfasern, die jedoch nicht ringsum von gleicher Größe oder Menge sind, verstärkt, welche Sehnenfasern als eigene Bänder unter der Benennung von Seitenbändern u. s. f. vorkommen.

Diese Membran schließt, wegen ihrer ungemeynen Schnellkraft, bey allen Bewegungen der Gelenke ringsum genau und dicht an die Knochenenden, ohne sich zu runzeln, und zieht sich nach einer Ausdehnung wieder leicht zusammen, wie man bey dem Schnalzen der angezogenen Fingergelenke wahrnimmt.

Genauer angesehen scheint sie an einigen Stellen fast etwas Knorpelartiges zu haben, ohngeachtet man sie doch leicht von den überknorpelten Flächen der Gelenke, durch ihre Weichheit, ihr meistens zellstoffartiges Wesen, und die Menge der Gefäße, unterscheiden kann. — Man sieht zwar unzertrennlich mit diesen die Knochenenden bedeckenden Knorpelrinden zusammenhängen; allein sie scheint nicht über selbige fortgesetzt.

Eine schlaffe, aber feinere, Fortsetzung von ihr überzieht das Fett, welches sich in den meisten Gelen-

ken findet, und welches sich in Ansehung seiner Menge nach der Größe oder dem Umfange der Gelenkkapsel zu verhalten pflegt. — In dem ansehnlichsten aller Gelenke, nämlich dem Kniegelenke, ist daher auch dessen am meisten vorhanden. Man wollte in selbigem eigene Drüschchen (*Glandulas articulares*) zur Absonderung des Gelenksafts bemerkt haben. ²

Dieses Gelenkfett liegt meistens in eigenen Drüschchen des Knochens, so daß es zwar sanft gepreßt, aber nicht zerstört werden kann; und endigt sich in eigene

2) Am ausführlichsten beschreibt diese sogenannten Gelenkdrüsen *Clopton Havers*. Siehe seine *Observationes de ossibus*. Die beste lateinische Uebersetzung von Schreiber. Amsterdam 1731. Das Original erschien englisch 1691. — Ihm folgten bis auf *Monro* (*Description of the Bursae Mucosae Edinb. 1788. fol*) fast alle Bergliederer; z. B. *Pitschel*, welcher die Beschaffenheit in Ansehung der Größe dieser Fettklumpchen in den meisten Gelenken schildert, in seiner *Dissertatio de Axungia articularum*. Lips. 1740. wieder abgedruckt in *Haller's Selectus Dissertationum anatomicarum Vol. VI. pag. 407*. Deßgleichen *Haase de unguine articulari eiusque vitiiis*. Lips. 1774. und selbst *Haller* in seinen *Elementis Physiologiae*.

Sonderbar ist's, daß, da *Havers*'s vollkommen gleiche Drüschchen in den Gelenken, und zwischen der Sehenscheide und dem Fleische des Muskels annahm, seine sogenannten Gelenkdrüsen allgemeinen, seine Muskeldrüschchen gar keinen Beyfall fanden.

Eben so sonderbar, daß man diese Drüschchen nach ihm *Glandulas Haversii* nennt, da er doch S. 210. selbst anführt, daß sie *Comper* kannte.

Lieutaud

Franzen, welche, wenn sie gepreßt werden, etwas schleimig öligen Saft herzugeben scheinen.

Glückliche Einsprüzungen zeigen eine große Menge von Blutgefäßen in dieser Membran, die man aber, im gesunden Zustande, am Rande der Knorpelrinden aufhören, nicht bis über dieselben fortlaufen sieht. 3

Ohne Zweifel hat diese Membran auch Mündungen anfangender Saugadern, wiewohl sie dem Auge noch nicht dargelegt worden sind; denn der abgeschiedene Gelenksaft wird beständig wieder aufgenommen und weggeführt.

Nerven hat niemand in ihr entdeckt, daher sie auch, wie man bey Ablösungen der Glieder in Gelenken durch's Reizen wahrnimmt, völlig empfindungslos ist.

Weder die Gelenkkapseln, noch die übrigen Bänder, werden nach einer Zerstörung wieder erzeugt — doch heilen sie durch Narben.

G e l e n k s a f t.

§. 6.1

Der Gelenksaft (Gelenkschmiere, Unguen articulare, Axungia articularis, Synovia, Mucilago articularum u. s. f.), welcher theils aus den Arterien

3) Indessen habe ich doch an Knochen, die zum Theil vom Beintraß angegriffen waren, ganz deutliche Blutgefäße in die Knorpelrinde derselben sich erstrecken gesehen.

seiner Menge
nge der Gelenkkapsel
anfechtlichen unter
nte, ist daher auch
Man wollte in selbi
articulares) zur Ab
ft haben. 2
is in eigenen Glüh
sanft gepreßt, aber
ndigt sich in eigene
e sogenannten Gelenk
he seine Observations
de Ueberzeugung von
Das Original erschien
ik auf *Monro* (De
Edinb. 1798. fol) fast
melcher die Beschaf
heit Klumpen in
iner *Dissertatio de*
wieder abgedruckt in
anatomicarum Vol.
de unguine articu
id selbst Haller in
aver's vollkommen
, und zwischen der
s Muskeln ansetzen,
gemeinen, seine Mus
den.
diese Drüsen nach der
doch S. 210. selbst w



der Kapselmembran, theils aus dem Gelenkfett abge-
sondert wird, ist zwar im Ganzen eyweißartig, doch
etwas öligiger, zähe, klebrig, nicht immer nach dem
Tode klar und weiß, sondern selbst an Personen, die
nie an Gelenkkrankheiten (Sicht, Arthritis) litten,
gelblich, und von etwas salzigem Geschmack.

Er ähnelt also dem Blutwasser, ³ doch ist er et-
was dünner und öligiger; er gerinnt folglich auch nicht
so stark durch Zumischung von schwachen Säuren,
oder von starkem Weingeist, oder nach dem Abdäm-
pfen; denn wenn Blutwasser getrocknet ohngefähr ein
Eisstel Gallert zurückläßt, so läßt der Gelenksaft kaum
ein Drenzigstel zurück.

Er gerinnt selbst vom Weineßig, wenn er warm
damit vermischt wird. — Vermischt man ihn mit
adstringirenden Sachen, z. B. dem Decoct von Gall-
äpfeln, oder Granatäpfeln, oder der peruvianischen
Rinde, so entsteht eine Gallert, die getrocknet sehr
brüchig ist.

Scheidewasser, Salpetergeist, Vitriolgeist (nicht
Vitriolöl), Alaunauflösung, Bleiszuckerauflösung,
Sublimatauflösung, selbst rother und weißer Cana-
rienwein bringt ihn verschiedentlich zum Gerinnen.

Uebrigens hat man gefunden, daß Gelenksaft aus dem Gelenkfett besteht.
Ann. 14 p. 143. Die Gelenksäfte. 3) Margueron fand außer Wasser und einem eyweiß-
ähnlichen Stoff Küchen Salz, mineralisches Laugensalz, und
phosphorsaure Kalkerde. Annales de Chimie 1792.
Tom. 14.

Dr. Koffow's Untersuchungen
über den Gelenksaft sind in dem Journal de Pharmacie, 1792, p. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Den
Das
und Gall
im Wasser
Weinstei
Geronnen
Das
Schlüpfri
hingegen
Schleim,
Der
schlecht
frucht,
nicht n
sehen
gung ju
D
Ma
Ein
oder na
dreieckig
rautenfö
z. B. di
gerade,



Von Vermuthsals, wird er nur wenig dicker.

Das durch die Vermischung von Scheidewasser und Galläpfeldecocct entstandene Geronnene läßt sich im Wasser nicht auflösen, bis man Salmiakgeist oder Weinsteinöl zuschüttet; allein das bloß durch Säuren Geronnene läßt sich vom Wasser auflösen.

Das Schleimige in seiner Mischung hilft der Schlüpfrigkeit des Dels, das Delige oder Fettige hingegen hindert, daß er nicht so leicht, als anderer Schleim, verdicken kann.

Der Nutzen dieses Selenksafts ist sehr augenscheinlich; nämlich die überknorpelten Selenkflächen feucht, glatt und schlüpfrig zu erhalten; folglich also nicht nur den Schaden, der durch die Reibung entstehen könnte, zu hindern, sondern auch die Bewegung zu erleichtern.

Benennungsgrund der Bänder.

§. 7.

Man benennt ein Band nach den Vertern seiner Einfügungen, z. B. Zwischenband der Wirbel; — oder nach der Gestalt, z. B. lang, breit, rund, dreyeckig, viereckig, kegelförmig, pyramidenförmig, rautenförmig; oder nach dem äußeren Ansehen, z. B. dick, schlank, wulstig; oder nach der Lage, gerade, schräg, senkrecht, waagrecht, flach, tief, rech-

Selenkfaß abge-
weicht, doch
immer nach dem
Personen, die
(Arthritis) litten,
mach.

doch ist er et-
was auch nicht
den Säuren,
dem Abbäm-
hänge über ein
lenkfaß kaum

wenn er warm
man ihn mit
et von Gall-
wianischen
ordnet sehr

geißt (nicht
rauflösung,
süßer Cana-
erinnen.

em epweß-
genfaß; und
amie 1772.

in folio
1772-1773
in folio
1772-1773

tes, linkes, vorderes, hinteres, inneres, äußeres, oberes, unteres; — oder endlich nach der Größe, z. B. groß, kleiner oder klein.

Nutzen der Bänder.

§. 8.

Den allgemeinen Nutzen der Bänder zeigt ihr Namen an; nämlich, die Theile zusammenzuhalten, ohne die Beweglichkeit zu hemmen. Doch leisten sie an einigen Stellen ihren vorzüglichsten Dienst darinn, daß sie die Bewegungen, auch ohne sie zusammenhaltender Theile, einschränken, oder Muskeln, oder Sehnen umschließen, gleichsam an die Knochen binden, oder auch nur Lücken der Knochen zur Anlage von Muskelfasern ausfüllen, oder sonst die Form eines Theiles vollenden helfen.

Uaerger
Fadener
S
f

f
f
f
f
f
f

Besch
B
B
Ligam
Weitbr
ter on
De
Knorpel
nern u
dünn
flüg
lenge
die üb
Kiefer
men ei
pelsche
Blähe
Weit
B
Seite

Beschreibung der einzelnen Bänder.

Bänder des Unterkiefers.

Band des Knorpels im Kiefergelenk.

Ligamentum cartilaginis Maxillae intermediae.

Weitbrecht Tab. 8. fig. 32. Im Profildurchschnitt. Hunter on teeth plate 2. L.

§. 9.

Der im Gelenke zwischen den Kiefern befindliche Knorpel besteht aus zwey Stücken, einem vordern dünnern und einem hintern dickern, welche durch zwey dünne Häutchen vereinigt werden. Die obere Haut fligt sie ringsum an den Gelenkhügel und an die Gelenkgrube des Schläfebeins, die untere ringsum an die überknorpelte Fläche des Gelenkknopfs der Unterkiefers. Bisweilen bilden diese Knorpelstücke zusammen einen elliptischen Ring. Uebrigens ist diese Knorpelscheibe beweglich, und auf der obern und untern Fläche ausgehöhlt.

Membran des Kiefergelenks.

Membrana Maxillae articularis.

Weitbrecht Tab. 8. Fig. 32. h.

§. 10.

Besteht aus Fasern, die theils an der äussern Seite vom Gelenkhügel, theils hinten aus der Ge-

erz, äußere,
h der Größe,

Bänder zeigt
amenshalten,
sch leisten sie
ienst darin,
usammenhal-
wskeln, oder
Knochen bin-
en zur Anlage
ie Form eines



lenkgrube und dem Hörgange zum Unterkiefer gehen, und sich fest mit dem Knorpel verbinden, vorwärts aber sich nicht zeigen, sondern durch den äußern Flügelmuskel ersetzt werden.

Seitenband des Unterkiefers.

Ligamentum Maxillae laterale.

Weitbrecht Tab. 3. Fig. 32. i.

Steigt als ein dünnes, mehr langes als breites Band ebenfalls aus der Gelenkgrube, an die innere Seite des Unterkiefers, zur Rauhigkeit über dem Anfang seines Canals hinab; und weil der Gelenkknopf vorsteht, bleibt zwischen ihm und dem übrigen Kiefer ein Zwischenraum, in welchem Gefäße und Nerven liegen.

Dient, ausser zur Befestigung des Unterkiefers, noch als Trageband der Speicheldrüse am Ohr.

Bänder der Hörknöchelchen. ³

§. II.

Durch sehr zarte, fast nur häutige, wenigstens nicht augenscheinlich sehnige Gelenkkapselchen werden die überknorpelten glatten Gelenkflächen des Hammers und des Amboßes, so wie die überknorpelte Gelenkfläche des Knöpfchens des Amboßes, mit der über-

3) Scheinen von Weitbrecht übersehen worden zu seyn.

Ueber
Hörknöchelchen
Weitbrecht
Fig. 32. i.

3)
Hörknöchelchen
Weitbrecht
Fig. 32. i.

Knorpelsten Gelenkfläche des Steigbügels zusammengehalten;

Durch ein ähnliches zartes Gelenkkapselchen ist auch die Basis des Steigbügels im halbovalen Fenster befestigt.

Durch ein eigenes conisches Band haftet der Kopf des Hammers am Schläfebeine.

Durch ein oder zwey eigene Bänder haftet der kurze Schenkel des Amboßes am Schläfebein ⁴.

Bänder der Zungenbeine.

Ligamenta ossium linguae.

Weitbrecht Tab. 26. Fig. 8.

§. 12.

Das mittlere Zungenbein hält mit dem Seitenzungenbein oder Horn an jeder Seite durch eine förmliche, mit Sehnenfasern von aussen verstärkte Gelenkkapsel zusammen, mit den rundlichen Zungenbeinchen hingegen gewöhnlich durch schlaffere Bänderfasern.

Das Seitenzungenbein jeder Seite hält durch ein rundliches Band, in dem sich oft ein eiförmiges Knöchelchen findet, mit dem Horn des Schildknorpels zusammen ⁵.

4) Diese Bänder sind, meines Wissens, von mir zuerst entdeckt und abgebildet worden.

5) Weitbrecht Tab. 26. Fig. 81.

**Bänder, die den Kopf an die
Wirbelsäule befestigen.**

Gelenkbänder zwischen dem Grundbein und Atlas.

Ligamentum articulationum capitis cum Atlante.
Weitbrecht Tab. 7. Fig. 33. c. Ligamentum articulare
superius. Mauchart. 6

§. 13.

Sowohl das rechte, als das linke Gelenkband hält auf seiner Seite, als ein häutiger Ring, den Gelenkknopf des Grundbeins, und die ihn umfassende Gelenkfläche des Atlas zusammen; daher ist es vorn und hinten breiter, weil es eine größere Lücke ausfüllt, an der Seite schmaler; vorne am dünnsten, an der äußeren Seite, wo es auch ein wenig von der überknorpelsten Gelenkfläche des Atlas absteht, am stärksten.

Vorderes Ausfüllungsband zwischen dem Grundbein und Atlas.

Membrana annuli anterioris Atlantis

Weitbrecht Tab. 9. Fig. 33. oder ligamentum obturans
anticum Atlantis occipitale.

§. 14.

Das vordere Ausfüllungsband zwischen dem vordern Rande des großen Lochs des Grundbeins

6) Mauchart Diss. capitis articulatione cum prima et secunda colli vertebra. Tubingae 1747. in Haller's Select. Tom. VI. S. 337.

Wagner
Haller
Haller
Haller
Haller
Haller
Haller
Haller
Haller
Haller

und dem oberen Rande des vorderen Bogens des Atlas hat in der Mitte seine stärkste aus geraden Fasern bestehende Bündel, an den Seiten, wo es am schwächsten nur mit den vorigen vermischt ist, besteht es aus schrägen Fasern, zu denen vom Querfortsatz ein dünner breiter Bandstreifen (*Membrana annuli posterioris* oder *Lig. obturans atlantis posticum*)⁷ heraufkommt, der sich theils an den vorderen Bogen, theils an dieses Band verliert, und hauptsächlich zur Anlage des vordern größern geraden Kopfmuskels, des Seitenkopfmuskels und des vordern Zwischenquermuskels bestimmt ist.

Hinteres Ausfüllungsband.

Ligamentum vertebrae primae proprium.

Weitbrecht Tab. 9. Fig. 33. m.

§. 15.

Das hintere Ausfüllungsband zwischen dem hintern Rande des Loches des Grundbeins, und dem obern Rande des hintern Bogens des Atlas ist dünner und schlaffer, als das vorige, und hält das Grundbein und den Atlas zusammen.

⁷) Ist noch nicht abgebildet.

Bandwesen zwischen dem Kopf und den Halswirbeln.

Apparatus vertebrarum Colli ligamentosus

Weitbrecht Tab. 11. Fig. 38. e.

§. 16.

Starke, dicke und straffe Fasern, welche inwendig den Anfang des Kanals der Wirbelsäule im Halse zusammenhalten, kommen theils über dem Rande, theils vom Rande des großen Loches des Grundbeins, bedecken nicht nur den Zahn des zweyten Halswirbels, sondern füllen auch den Raum zu seinen Seiten aus^s, so daß alles eben und glatt wird; doch verlieren sie sich allmählig gegen die Mitte des dritten und vierten Halswirbels.

Dieses Bandwesen schränkt hauptsächlich das Vorwärtzneigen des Kopfs ein.

Bänder, die den Kopf mittelst des Grundbeines an den Zahn des zweyten Halswirbels befestigen.

Ligamenta Vertebrae Colli secundae lateralia.

Weitbrecht Tab. 9. Fig. 34. g. h. Doch ist die Figur nicht richtig. Alaria bey Mauchart.

§. 17.

Von jeder Seite des Zahns oder Zapfens des zweyten Halswirbels bis zu seiner Spitze erstreckt sich ein
anfangs

^s) Diesen Theil des Bandes nennt Mauchart Ligamentum vaginale dentis.

Wasser
gelöst
f
M

anfangs de
spitzt und
Rande des
unteren
wärts; f
trennten
zent.
Kuffen
Halswirbe
Kopfes un
ein; das
auf die
sichs a
Seiten
Membran
Weitbr
No
eine dün
hinanf
E. B.

anfangs breites, sehr starkes Band, welches sich zuspitzt und in die rechte und linke Grube am innern Rande des Gelenkknopfs des Grundbeines festsetzt; seine unteren Fasern sind länger, und steigen schräg aufwärts; seine oberen, bisweilen von den unteren getrennten Fasern sind kürzer und liegen fast horizontal.

Außer daß sie den Kopf an den Zahn des zweiten Halswirbels befestigen, schränken sie die Drehung des Kopfes um den Zahn auf der entgegengesetzten Seite ein; das rechte nämlich die Drehung des Gesichtes auf die linke Seite, das linke die Drehung des Gesichtes auf die rechte Seite.

Seitenmembran zwischen dem Grundbeine und Zahne des zweyten Halswirbels.

Membrana lateralis ligamentosa Vertebrae Colli secundae.

Weitbrecht Tab. 9. Fig. 34. c.

S. 18.

Noch geht auswärts von der Wurzel des Zahns eine dünne Membran an jeder Seite zum Grundbeine hinauf.

Gerades Band zwischen dem Grundbeine und
Zahne des zweyten Halswirbels.

Ligamentum dentis suspensorium oder
rectum medium ⁹.

§. 19.

Kommt vom vordern Rande des Rückenmarks
in Grundbein, und setzt sich an den Zahn des
zweyten Halswirbels, unmittelbar über seine vordere
Gelenkfläche, wo es auch mit den Seitenbändern zu-
sammenhängt.

Indem es zwischen dem vordern Ausfüllungsband
und dem obern Anhang des Querbandes liegt, ist es
mit beiden vermischt.

Bänder des Atlas.

Querband am Atlas.

Ligamentum transversale Atlantis.

Weitbrecht Tab. Fig. 9. 35-36. cruciforme bey Mauchart.

§. 20.

Geht vom rechten rauhen Höcker und Grübchen,
an der innern Seite des Seitentheils des Atlas, zum
linken rauhen Höcker quer und straff herüber, und
schließt dicht an den Hals des Zahns des zweyten
Halswirbels.

9) Hat Weitbrecht irrig geläugnet.

In der Mitte ist es dick, stark, fest, elastisch, und am breitesten; an beiden Enden schmaler. Es hat einen obern und untern Anhang.

Der obere Anhang (appendix superior Fig. 35. v. 36. g. c.) kommt vom obern Rande des Querbandes; ist dick, stark und fest; geht, ohne den Zahn des zweyten Halswirbels zu berühren, gerade aufwärts zum Grundbein, an das er sich inwendig eine Linie über dem Rande des Rückenmarklöchs festsetzt.

Der untere Anhang kommt vom untern Rande des Querbandes, besteht aus der Länge nach liegenden Fasern, bedeckt von hinten her den Zahn, und endigt sich am Körper des zweyten Halswirbels, wo er mit dem Bandwesen zwischen dem Kopfe und den Halswirbeln (apparatu ligamentoso §. 16.) vermischt wird. Dadurch bekommt dieß Querband im Ganzen die Gestalt eines Kreuzes.

Es dient nicht nur den Zahn des zweyten Halswirbels an den Atlas, sondern auch den Atlas und den zweyten Halswirbel an den Kopf zu befestigen; wie auch, den Atlas, der keinen ausgezeichneten Körper hat, mit dem zweyten Halswirbel so zu verbinden, daß er sich um den Zahn oder Zapfen, wie um eine Angel drehen kann, ohne ausweichen und das Rückenmark drücken zu können.

Bänder der Wirbel.

Vordere Binde der Wirbelsäule.

Ligamentum corporibus vertebrarum commune
anteriorius oder Fascia longitudinalis anterior.

Weitbrecht Tab. 10. aa.

§. 21.

Vorwärts sind die Körper der Wirbelsäule mit einer sehnigen Haut überspannt, welche vom Atlas straff und rundlich anfängt, drauffo breit wird, daß sie den größten Theil der Körper bedeckt. Sie ist nicht durchaus gleichdick, sondern an den Stellen dünner wo das Rückgrat eine starke Beugung hat, als am fünften Halswirbel, ferner am zwölften Rückenwirbel, oder ersten Lendenwirbel.

Auch laufen ihre Fasern nicht in ununterbrochenem Zusammenhange vom Anfange bis zum Ende fort, sondern fast auf jedem Wirbelkörper scheinen einige anzufangen, andere sich zuendigen, so, daß sie selten die Länge von drey Wirbeln halten.

Auf dem zweyten Lendenwirbel vertreten ihre Stelle die Sehnen der Zipfeln des Zwerchmuskels.

Sie hält die Mitte der Körper der Wirbel, nach deren Erhöhungen und Vertiefungen sie sich bequemt, und schickt nur unregelmäßige Fortsätze seitwärts.

Hintere Binde der Wirbelsäule.

Ligamentum corporibus vertebrae commune posterius

Fascia longitudinalis postica vertebrarum.

Weitbrecht Fig. 39. 40. 41.

S. 22.

Die hintere Seite der Wirbelkörper, die den Kanal für das Rückenmark bilden, ist mit einem ähnlichen Bande überzogen, welches zu oberst sowohl mit dem Sacke der festen Hirnhaut, wo sie durch das Loch des Rückenmarks geht, als auch mit dem Bandwesen zwischen dem Kopfe und den Halswirbeln (apparatu ligamentoso) sehr fest zusammenhängt. — Aber schon an dem Zahne des zweyten Halswirbels ist die Verbindung mit der festen Hirnhaut locker, mit dem Bandwesen zwischen dem Kopfe und den Halswirbeln fast unmerklich. Folglich berührt sie den ersten und zweyten Wirbel nicht unmittelbar; auf den folgenden Wirbeln hingegen liegt sie fester.

Im Halse ist sie etwas schmaler, als die Breite der Körper beträgt; im Absteigen aber wird sie noch schmaler, so, daß sie in den Lenden kaum ein paar Linien breit ist, nur auf den Zwischenknorpeln sich etwas ausbreitet, und zugleich fester anheftet.

Die vordere und hintere gemeinschaftliche Binde dienen zur Zusammenhaltung der Körper der Wirbel.

Wirbel.
Wirbelsäule.
arum commune
nalis anterior.

Wirbelsäule mit
elche vom Atlas
breit wird, daß
deckt. Sie ist nicht
den Stellen dünner
ung hat, als am
höchsten Rückenwir-
ununterbroche-
e bis zum Ende
ellkörper scheinen
digen, so, daß sie
halten.
rbel vertreten über
s Zwerchmuskeln.
er der Wirbel, nach
ngen sie sich beson-
verfäße seitwärts.



Die vordere scheint die Ueberbeugung der Wirbelsäule, die hintere die Vorwärtsbeugung der Wirbelsäule etwas einzuschränken.

Zwischenbänder der Wirbel, oder knorpeliges Bandwesen zwischen den Körpern der Wirbel

Ligamenta intervertebralia,

Weitbrecht Tab. 12, Fig. 42.

S. 23.

*Monro Ejus
of Edinburgh. Tom. 8. Pl. 18.*

Ausser dem Raume zwischen dem Atlas und dem zweyten Halswirbel werden die Räume zwischen allen übrigen Körpern der Wirbel des Halses, des Rückens und der Lenden, zwischen dem letzten Lendenwirbel und Kreuzbein, zwischen dem Kreuzbein und ersten Steisbein, so wie zwischen den Steisbeinen selbst, durch eine eigene bandartige Knorpelmasse ausgefüllt, welche die Körper der Wirbel selbst zugleich auf das festeste zusammenhält.

Die äussersten, offenbar bloß sehnigen, aus parallelen Fasern bestehenden Streifen steigen vom untern Rande des einen Wirbels zu dem oberen Rande des nächst unter ihm liegenden Wirbels schräg von der rechten gegen die linke Seite herab; die nächstfolgenden Fasern haben die entgegengesetzte Richtung. Die Fasern zweyer solcher Streifen scheinen sich hin und wieder durchkreuzend zu verflechten; die Fasern der dritten und folgenden Streifenlage ist der vorherge-

henden entgegengesetzt; doch so, daß ihre Richtung weit schräger, ja fast horizontal wird. Auf diese Art ist der größte Theil des Umfanges dieses Knorpelbandes beschaffen, der daher, queer durchschnitten, aus concentrischen ringsförmigen Fasern zu bestehen scheint. Die äussern Fasern liegen, vorzüglich hinten, dichter an einander, und sind fester miteinander verwebt, als die innern oder vordern. Zwischen ihnen befindet sich eine eigene, weiche, gallertartige Masse, welche sowohl bey dem queeren, als senkrechten Durchschnitt stark hervorquillt, oder durch die Schnellkraft der Sehnenfasern hervorgetrieben wird. Je mehr jene Sehnenstreifen gegen die Mitte zu abnehmen, und lockerer liegen, desto häufiger und härter wird diese Masse, bis sie endlich einen Kern bildet, der das übrige ausfüllt.

*ma queasi spongiola Vital.
fuit in disca intervertebralis*

Die dünnsten dieser Knorpelscheiben, die sich übrigens nach dem Umfang der Körper der Wirbel richten, liegen zwischen den oberen Rippenwirbeln; etwas dickere zwischen den Halswirbeln, die dicksten zwischen den Lendenwirbeln; so daß die Körper der Wirbel mit gradweise zunehmender Stärke auch zugleich immer weiter von einander entfernt werden. S. Knochenlehre. S. 380.

Diese schleimigen oder Knorpelartigen, sehr elastischen Bänder halten auß allerfesteste die Körper der

ung der Wirbel-
ng der Wirbel-
er knorpeliges
der Wirbel
ralia.
tlass und dem
zwischen allen
des Rückens
n Lendenwirbel
ein und ersten
wirbeln selbst,
ausgefüllt,
gleich auf das
en, aus paral-
gen vom untern
ren Rande des
schräg von der
die nächstfolgen-
e Richtung. Die
nen sich hin und
; die Fasern der
ist der vorherge-



Wirbel so zusammen, daß die Wirbelsäule, die in der Knochenlehre S. 384. 406. beschriebene Beweglichkeit erhält. Von dem bald Statt findenden, bald nicht Statt findenden Drucke auf sie hängt die Erscheinung ab, daß der Mensch nach langem Aufstehn kleiner, nach dem Liegen auf dem Rücken wieder höher wird. (Knochenlehre S. 404.)

Gelbliche Bänder zwischen den Bogen der Wirbel.

Ligamenta crurum Vertebrarum subflava,

Weitbrecht Tab. 12. Fig. 43. 44.

S. 24.

Die am Halse, vorzüglich aber an den Lenden, zwischen den Bogen der Wirbel, deren jeder aus einem rechten und linken Schenkel besteht, befindlichen Lücken (Knochenlehre S. 386.) werden durch ganz eigene starke und feste, sehr elastische, gelbliche Bänder ausgefüllt. Sie bestehen aus senkrechten Fasern, sind zu oberst am Halse sehr dünne und schmal, drauf dicker und breiter, zwischen den Lendenwirbeln am allerdickesten und breitesten, übrigens ziemlich glatt, und nur durch ein leichtes Zellgewebe bedeckt.

Ein jedes von ihnen fängt auf seiner Seite, sowohl oben als unten, von den Wurzeln der schrägen Fortsätze eines Wirbels an, und geht bis zu der Zusammenstoßung der Schenkel des Bogens in den Dorn-

fortsätze fort; stößt aber mit dem von der andern Seite nicht zusammen, sondern läßt eine kleine mit lockerem Zellstoff ausgefüllte Spalte übrig. Sie gestatten die Zurückbeugung des Rückgrats, schränken aber die Vorwärtsneigung und Seitwärtsneigung desselben durchs Zusammenhalten der Bogen ein.

Membran zwischen den Dornfortsätzen.

Membrana interspinalis,

Weitbrecht Tab. 12. Fig. 45.

§. 25.

Sie füllt den Raum zwischen den Dornfortsätzen je zweyer Wirbel aus, besteht aus unregelmäßigen Fasern, und ist, nach Verschiedenheit der Zwischenräume, (Knochenlehre S. 384.) breiter oder schmaler. — Sie hält die Dornfortsätze zusammen, schränkt die Vorwärtsneigung des Rückgrats ein, und dient hauptsächlich zur Anlage von Muskeln.

Band zwischen den Spitzen der Dornfortsätze.

Ligamentum quo apices Vertebrarum connectuntur.

Weitbrecht Tab. 11. Fig. 45. Tab. 12. Fig. 46.

§. 26.

Schräge Fasern erstrecken sich zu beiden Seiten der Spitzen der Dornfortsätze, und von einer Spitze zu der andern, so daß sie gleichsam ein zusammenhängendes Band ausmachen, welches von den mit ihm

...säule, die in der
...ne Beweglichkeit
...den, bald nicht
...die Erscheinung
...von kleiner, nach
...er wied. (Kno

den Bogen

subflava,

an den Lenden,
jeder aus einem
...ndlichen Lücken
...ganz eigene
...Händer aus-
...faser, sind zu
...drauf dicker
...eln am aller-
...ich glatt, und
...ft.

...mer Seite, so-
...in der schrägen
...bis zu der Zu-
...is in den Dorn-

vermischten Sehnen des Rückgratsstreckers verstärkt, oder wohl gar hauptsächlich gebildet wird.

Gerade Bänder zwischen den Quersfortsätzen.
Ligamenta processuum transversorum Vertebrarum.
Weitbrecht Tab. 13. Fig. 46.

§. 27.

In den Zwischenräumen der Quersfortsätze des fünften und sechsten bis zehnten und eilften Rückenwirbels liegen zarte Sehnenfasern, die wohl nur zur Anlage der Rippenheber von der einen Seite, und des vieltheiligen Rückgratsmuskels von der andern Seite dienen.

Gelenkbänder der schrägen Fortsätze.
Ligamenta processuum obliquorum Vertebrarum.
Weitbrecht Tab. 12. Fig. 45. g.

§. 28.

Die an einander passenden Gelenkflächen der schrägen Fortsätze werden ringsum durch starke Bänder, die aus kurzen Fasern bestehen, zusammengehalten, und im Rücken und in den Lenden an der innern Seite durch die gelblichen Bänder verstärkt. Das oberste Paar dieser Bänder, welches den Atlas mit dem zwenten Halswirbel verbindet, ist das dünneste und schlaffeste, und mit den benachbarten Bändern vermischt.

Der letzte Lendenwirbel wird mit dem Kreuzbein auf gleiche Art, wie die übrigen Wirbel des Rückgrats, untereinander verbunden, a) durch ein Band zwischen den Körpern der Wirbel, b) durch ein hinteres gemeinschaftliches Band, c) durch gelbliche Bänder, d) durch eine Membran zwischen den Dornfortsätzen, und e) durch ein Band, das die Spitzen der Dornfortsätze verbindet.

B ä n d e r d e r R i b b e n .

Band des Ribbenköpfcchens.

Ligamentum capituli costarum.

Weitbrecht Tab. 13. Fig. 47.

§. 29.

Von den Ribbenköpfcchen gehen kurze, unterbrochene, strahlenförmige Fasern zu den Rückenwirbeln, denen die Ribbenköpfcchen angepasst sind, herüber, und verschwinden allmählig auf den Bändern dieser Wirbel.

Q u e e r b a n d d e r R i b b e n .

Ligamentum transversarium externum Costarum.

Weitbrecht Tab. 13. Fig. 46. und 48. a.

§. 30.

Liegt zwischen den hintern Spitzen der Querfortsätze der Rückenwirbel und dem Gelenkhügelchen der Ribben. Jedes Band besteht aus starken Fasern, welche an der letzten Ribbe absteigen, an der ersten

der verfährt,
wird.
erfortsätze.
Vertebrarum.

erfortsätze des
ersten Rücken-
wohl nur zur
eite, und des
andern Seite

Fortsätze.
Vertebrarum.

flächen der
starke Bän-
sammengchal-
an der innern
erfährt. Das
Den Atlas mit
das dlanne
arten Bänder

fast horizontal liegen; an den obern Ribben hingegen aufsteigen.

Dieses Band ist an den obern Ribben kürzer, an den untern länger, weil nämlich die Gelenkflügeln immer desto weiter von den Querverfortsätzen abstehen, je tiefer die Ribben der Reihe nach liegen.

Innere Bänder des Ribbenhalses.

Ligamentum transversarium internum Costarum.
Weitbrecht Tab. 13. Fig. 47. 48. b.

S. 31.

Von dem Querverfortsätze eines über einer jeden Ribbe liegenden Wirbels, geht zu dem Hals der Ribbe ein ziemlich starkes rautenförmiges Band, etwas auswärts herunter, welches an den obern Zwischenräumen rundlicher, in den untern Zwischenräumen flacher, membranartiger wird.

Außere Bänder der Ribbenhälse.

Ligamentum cervicis costae externum.
Weitbrecht Tab. 13. Fig. 48. c. 1

S. 32.

Ein ähnliches Band liegt hinten, in entgegengesetzter Richtung vom vorhergehenden, zwischen den Querverfortsätzen der Rückenwirbel und den Ribben; bey der ersten Ribbe fehlt's, bey den beyden untersten verliert es sich zwischen die Muskeln.

Dieses und das vorhergehende Band gestatten der Ribbe ein Herein- und Herausrollen so daß beym Einwärtsrollen das hintere, beym Auswärtsrollen das vordere gespannt wird ¹.

Weybänder oder hinzukommende Bänder der Ribben.

Ligamenta accessoria Costarum.

Weitbrecht Tab. 13. Fig. 46. c.

§. 33.

Hin und wieder geht von den geraden Bändern, zwischen den Quersfortsätzen, ein und anderes Bündel zu den Ribben hinab; oder vom Quersfortsatze des ersten und zweyten Lendenwirbels steigt eine dünne sehnige Haut zu der letzten Ribbe hinauf.

Gelenkbänder der Ribbenknorpel.

Ligamenta Cartilagineum Costarum.

Weitbrecht Tab. 14. und 15.

§. 34.

Die Enden der Knorpel der sechs untern wahren Ribben werden mit den Gelenkenden des mittlern Brustbeines durch eine kurze Kapselmembran zusammengehalten. Ueber sie werfen sich von den Ribbenknorpeln kommende Sehnenstreifen, die sich strahlenförmig

¹⁾ Meckel Note zum §. 252. des Hallerschen Grundrisses der Physiologie.

weit über das mittlere Brustbein hin verbreiten, daher die mittlern dieser Fasern sich nicht nur kreuzen, sondern auch verschiedentlich bis zu dem zunächst darunter liegenden Ribbenknorpel der gegenüberliegenden Seite gelangen. Z. B. von dem rechten dritten Ribbenknorpel zu dem linken vierten. Hin und wieder sind ihnen auch bogensförmige Streifen eingemischt.

Bänder der Ribbenknorpel untereinander.

Ligamenta Costarum coruscantia.

Weitbrecht Tab. 14. e.

S. 35.

Von einem Ribbenknorpel steigen hin und wieder sehnige Streifen senkrecht, oder ein wenig schräg, zu dem andern herunter, mehrentheils an der Stelle, wo die Knorpel am meisten von einander abstehen, bisweilen auch wohl selbst zwischen die Knochentheile, und kreuzen die Fasern der Zwischenribbenmuskeln. In den beyden obersten Zwischenräumen fehlen sie; in dem fünften, sechsten und siebenten Zwischenraume sind sie schmaler und kürzer, aber stärker; in den folgenden Zwischenräumen dünner und schlaffer.

Sie hindern die Entfernung einer Ripbe von der andern; gestatten aber die Aufhebung und Näherung einer Ripbe an die andere. Außer diesen werden aber noch die zusammenstoßenden, gelenkartig zusammen-

passenden Fortsätze zwischen dem fünften, sechsten, siebenten und achten Rippenknorpel durch starke Sehnenfasern, die der Knorpelhaut eingemischt sind, straff zusammengehalten.

**Bänder der Brustbeine.
Membran der Brustbeine.**

Membrana ossium sterni.

Weitbrecht Tab. 14. 15.

§. 36.

Die drey Brustbeine halten mit einander durch einen Knorpel zusammen, als wenn sie zusammengeklüftet wären. Alle drey überzieht eine gemeinschaftliche dickere Beinhaut, die hin und wieder glänzende Sehnenfasern eingemischt zeigt, welche auf der auswendigen Seite mannichfaltige Richtungen haben, auf der inwendigen hingegen meistens senkrecht liegen.

Bänder zum untersten Brustbeine oder zu seiner knorpeligen Spitze.

Ligamenta Cartilaginis ensiformis.

Weitbrecht Tab. 14. Fig. 49.

§. 37.

Auf der äussern Seite gehen von den Knorpeln des siebenten Rippenpaares ein Paar Sehnenstreifen zum untersten Brustbeine schräg hinab. — Dienen zur Anlage des sehnigen Bauchstreifens, oder der sogenannten weissen Linie.

weiten, daser
kreuzen, son
nächst darun
überliegenden
dritten Rib
nd wieder sind
nisch.
einander.
antia,
in und wieder
nig schräg zu
der Stelle,
abstehen,
ochentheil,
enmuskeln.
fehlen sie;
ischenraume
ter; in den
schlaffer.
bbe von der
ad Abberng
werden aber
y zusammen



Bänder des Beckens.

Langes hinteres Beckenband.

Ligamentum posticum longum ossis Ilei.
Weitbrecht Tab. 16. Fig. 51. f.

§. 37.

Steigt von der hintern Ecke des Hüftbeinkammes, als ein dicker ansehnlicher Streifen, schräg zum Quersfortsatz des vierten falschen Wirbels des Kreuzbeins hinab. Hält das Hüftbein mit dem Kreuzbein zusammen.

Kurzes hinteres Beckenband.

Ligamentum posticum breve ossis Ilei.
Weitbrecht Tab. 16. g.

§. 38.

Unter dem vorigen sieht man ein kurzes Band, in entgegengesetzter Richtung, zwischen eben der Ecke des Hüftbeinkammes und dem dritten Quersfortsatz des Kreuzbeins liegen. Je tiefer es geht, desto kürzer sind seine Fasern; weil nämlich die Knochen einander näher kommen.

Hinteres Seitenband des Beckens.

Ligamentum laterale posticum ossis Ilei.
Weitbrecht Tab. 16. Fig. 57. h.

§. 39.

Zwischen der nämlichen Ecke des Hüftbeinkammes
und

und dem untern Rande des ersten Kreuzbeinwirbels geht ein flaches Band quer herüber, unter welchem die äussersten Enden der Sehnen des Rückgratsstreifers und Halbdornmuskels liegen. — Es scheint fast mehr zur Ueberspannung dieser Muskeln, als zur Zusammenhaltung der Knochen, zu dienen.

Großes unteres Beckenband oder Knorrenkreuzband.

Ligamentum tuberoso - sacrum oder sacro - ischiadicum maius.

Weitbrecht Tab. 16. k. Tab. 17. k. h. o.

§. 40.

Kommt mit seiner breiten Basis theils von der nämlichen hintern Ecke des Hüftbeinkamms, und von dem hintern langen Band des Hüftbeins, so, daß es von aussen her selbiges bedeckt; theils vom Höckerchen des dritten und vierten Querverfortsatzes, vom übrigen untern Seitenrande des Kreuzbeines und vom Seitenrande des ersten Steißbeines. Indem seine Fasern sich darauf zusammenbegeben, wird es schmaler, aber dicker; steigt darauf, indem es sich schnell wieder ausbreitet, schräg nach unten, aussen und vornen; und setzt sich an den Sitzbeinknoren fest; eine Portion aber von ihm, die nach innen liegt und die andern kreuzt, schlägt sich als eine sichelförmige frey

E. Bänderlehre.

€

abstehende Membran, an dem aufsteigenden Schenkel des Sitzbeines hinauf.

Seine Fasern sind an beyden Enden gebogen und strahlensförmig so ausgebreitet, daß die innern ohngefähr in der Mitte ihrer Länge die äußern kreuzen. — Es dient, ausser der Zusammenhaltung der Knochen, zwischen denen es liegt, noch zur Bildung des Beckens, zur Unterstützung der in dem Becken enthaltenen Theile zur Anlage der Muskelfasern des großen Gesäßmuskels von außen, und mit seinem Sichelfortsatz zur Anlage des innern Hüftbeinlochsmuskels von innen.

Kleines unteres Beckenband oder Stachelkreuzband.

Ligamentum spinoso - sacrum oder sacro - ischiadicum minus oder internum.

Weitbrecht Tab. 16. mm. 17. l. m.

§. 41.

Könnte auch als eine Portion des vorigen angesehen, und mit ihm zusammen Kreuz- und Sitzbeinband (Ligamentum spinoso et tuberoso sacrum) genennt werden. Es kommt, mit dem vorigen zusammenhängend, doch mit verschiedener Richtung seiner Fasern, innerhalb des Beckens, von dem Seitenrande des Kreuzbeins; ist anfangs am breitesten, darauf schmaler aber dicker, und setzt sich an die

scharfe Ecke des Sitzbeins. Es bildet daher, mit den beyden Ausschnitten des Sitzbeins zusammen, zwey ansehnliche Löcher, durch deren größeres und oberes der ischiadische Nerve nebst einigen Blutgefäßen, durch deren kleineres und unteres der innere Hüftbeinlochsmuskel nebst einigen Gefäßen und Nerven dringt.

Es hilft die Beckenmündung bilden, und dient dem Steißbeinmuskel zur Anlage.

Querschnitt des Beckens
Oberes vorderes Beckenband.

Ligamentum pelvis anticum superius.

Weitbrecht Tab. 10. Fig. 37. i.

S. 42.

Hält den Kamm des Hüftbeins mit dem Querfortsätze des letzten, oder auch des letzten und vorletzten Lendenwirbels zusammen. Im Ganzen ist es fast dreyeckig, und mit seiner längsten, gewölbten Seite nach oben gerichtet an den Rändern dicker, in der Mitte dünner. Gelangt es zu zweyen Wirbeln, so bleibt zwischen selbigen, zum Durchgange der Nerven und Gefäße, ein ansehnliches Loch übrig.

Es dient nicht nur zu der Verbindung dieser Knochen, sondern auch zur Anlage des viereckigen Lendenmuskels und des innern Darmbeinmuskels.

^{gewandt} ~~Unteres~~ ^{gerade} vorderes Beckenband.

Ligamentum pelvis anticum inferius.

Weitbrecht Tab. 10. Fig. 37. k. 1.

S. 43.

Liegt unter dem vorigen, als ein kürzeres, aber ründlicheres und stärkeres Band zwischen dem untersten Theil des Hüftbeinkammes, dem Quersfortsage des fünften Lendenwirbels und dem Kreuzbeine. Zwischen ihm und dem vorigen Bande ist eine Lücke für Gefäße und Nerven.

Da der letzte Lendenwirbel, und der obere Theil des Kreuzbeines so ungemein variiren, so kommen auch bey ihren Bändern manche Verschiedenheiten vor.

Vereinigungen der Hüftbeine mit dem Kreuzbein.

Symphysis Ossis sacri et Coxae.

Weitbrecht Tab. 17. Fig. 52. o.

S. 44.

Das Hüftbein hält mit dem Kreuzbein, theils durch einen beiden Knochen gemeinschaftlichen, bänderartigen, ohrförmigen Knorpel, theils durch starke, in Grübchen und an Höckern liegende Sehnenfasern, theils durch die vorne und unten über das ^{von Vereinigung} Gelenk gespannte Weinhaut zusammen. Bisweilen stehen an dieser Stelle die Hüftbeine vom Kreuzbein in Personen, die selbst in einer leichten Geburt sterben, um

auszug aus Senon.

28

In Pflanzbrühe, durch, durch im
 unvollständigen als vollständigen Zustand, verbindet
 sich immer, wobei Pflanze beim Entstehen gelassen
 man selbständige Bewegung, oder mit jungen
 Bewegung, welche eine ^{vollständige} unvollständige als ohne
 ungebundener Zustand ^{zufällig}. Das ist die
 Bildung und Bewegung Bewegung im vollständigen Zustand
 bei einem der günstigsten Fall. In gewissen
 jungen Bewegung befähigt, mit einem vollständig
 sind unvollständigen Zustand ist aber nicht so klein,
 das nur auf der Durchdringung der Pflanzengewebe
 Pflanzbrühe ^{ein} (als eine Pflanze, die in einem Bewegung
 nach unterschiedlichen Linien, je gleich nach der Kindes-
 Richtung nach einem Entwicklungsprozess bereit aufführt.
 für unvollständigen
~~Die die Pflanzbrühe~~ ^{ein} ~~unvollständig~~ ^{unvollständig} ~~gefunden~~
~~gefunden~~ ^{ist} ~~bleibt~~ ^{bleibt} ~~früher~~ ^{früher} ~~unvollständig~~ ^{unvollständig}.
 dieser Bewegung, oder diese Bewegung verbunden unter
 einem Umstande ihrer Entstehung, so dass sie unter
 einander oder durch unvollständige Pflanze die zu einer Lösung
 bei Lösung unvollständigen
 bewirkte Fortentwicklung dieser Pflanze führt von
 dieser jungen Bewegung ^{ein} ~~von~~ ^{von} ~~Fortentwicklung~~ ^{Fortentwicklung}
 gerührt im Zusammenhang mit dem Zustand ab.

in der Mem de
 tout ses Sciences
 VI. p 175. 177

inferior.
 oberer Teil
 so kommen
 denheiten vor.
 oxae.
 theils
 durch harte
 Sehnenfäden
 stehen an
 dem in Vorje
 stehen, um



les ligaments ~~ont~~ ont été appliqués alongés
et entre eux.

Sur le site de formation des Vessies
avec des Vessies nées, pendant l'existence
au Mâle en France en Languedoc.

halten eine Höhlung
flatten und ebenen

ntereinander oder
ung ².

a ossium pubis.
, am allergeuaesten
t Maaksel en de be-
vereeningen van het
yd de bevallinge mit
Verhandelingen van
ordam T. 3. 1777. S.

*Tenon in Mém de
l'Institut des Sciences
Tome VI. p 175. 177*

te der Hüftbeine die
als hinten, von
worpeln überzogen,
, oder Bandfasern
se Fasern sind oben
unten und außen
um (oder oben,
i sie dicker, mit ei-
umwickelt, welchem
uskeln einmischen.

m Entbindungskunst.
is Ligamentum arcua-

les ligamens cetera v
et cetera eminois
Jus si hi fuerint
viti et Pysungere
an Mäunnen fof

einen Zoff
mit roush
Wänden.
Viere
Bereinig
Symphy
Weitro
und vor
weegeli
Bekken
den sch
het Bora
251. Ta
D
überhar
einard
die dur
zusamme
und inn
zu werd
vorne,
nem B
sich auch
2) Jo
Peter
tam o

einen Zoll auseinander, und enthalten eine Höhlung mit rauhen, oder auch wohl glatten und ebenen Wänden.

Vordere

Vereinigung der Hüftbeine untereinander oder Schaambein^{füge}vereinigung ².

Symphysis oder comissura ossium pubis.

Weitbrecht, weit besser Hnnter, am allergeuauesten und vortrefflichsten Bonn over het Maaksel en de beweegeliike Loswording der Been-verëeningen van hes Bekken in vrouwen omtrent den tyd de bevallinge mit den schönsten Abbildungen. In den Verhandelingen van het Bataavsch Genootschap te Rotterdam T. 3. 1777. S. 251. Tab. 2. 3. 4.

Tenon in An. Mem de l'Institut des Sciences Tome VI. p 178. 177

S. 45.

Die Flächen der Schaamstücke der Hüftbeine die überhaupt vorne etwas mehr, als hinten, von einander stehen, sind mit Knorpeln überzogen, die durch queerliegende Sehnen, oder Bandfasern zusammengehalten werden. Diese Fasern sind oben und inwendig kürzer; nach unten und außen zu werden sie länger, rings um (oder oben, vorne, unten und hinten) werden sie dicker, mit einem Bande umgeben, gleichsam umwickelt, welchem sich auch die Sehnen der Bauchmuskeln einmischen.

2) Joseph von Mohrenheim Entbindungskunst. Petersb. 1791. will davon noch das Ligamentum arcuatum ossium pubis unterscheiden.



Nicht selten findet man in Weibern, die selbst in einer leichten Geburt sterben ³, mitten in dieser Vereinigung eine wahre Höhlung, bisweilen mit rauhen, bisweilen mit glatten, ebenen Wänden, die selbst in alten, fruchtbar gewesenen Weibern, hinterwärts eine Spur zurückläßt.

Beym weiblichen Geschlechte ist dieses Band breiter, weicher, aber weniger hoch; auch ist es nunmehr eine bewährte Thatsache, daß diese Vereinigung gegen die Zeit des Gebährens weicher und schlaffer wird ⁴.

*Diequart an sub parte humero
etiam naturalis, emoveantur in
noto die pelvis fra Aug. 1774
Karl Rouart
Bertin Trigo ossa in nominata in
graviter et postmortalibus
videntur Paris 1774.*

*Journal Portal anatomie Vol. 1. p 54.
p. 332, 374*

- 3) Doch fand ich einmal eine kleine Höhle mitten in diesem Bande bey einem Knabchen.
- 4) Des Voneinanderstehens der Schaambeine, welchen Fall ich selbst mehrere Male gesehen, gedenke ich hier, als einer offenbaren Mißbildung, nicht. S. Bonn Geneeskundig Kabinet Amst. Deel 3. deutsch Strassburg 1782. 8. und Walter über die Spaltung der Schaambeine Berlin 1782. 4. mit einem trefflichen Kupfer. Zu Wien findet sich ein Präparat dieser Art von mir von einem Knaben, so wie ich den nämlichen Fall von mehreren Mädchen gesehen habe. S. Baillie Anatomie des Frankhaften Baues und G. G. Herder Diss. de nativo prolapsu vesicae urinariae inversae in puella. Jenae 1786. 4. Ich selbst habe mehrere Male, nach sehr leichten Geburten bey übrigens gar nicht engen Becken, dieses Band erweicht gefunden, in Personen die wenig Stunden nach der Geburt starben, unter andern in einer Person, die kurz nach der ganz leichten Geburt von Zwillingen zufällig an Verblutung starb.



Membran des großen Hüftbeinlochs.
Membrana obturans foraminis thyreo-
dis ossium coxae.

Weitbrecht Tab. 17. und 18. Fig. 52. 53.

S. 46.

Sitzt an den scharfen Rändern dieses Loches.
Ihr inwendiges Blatt ist glatter, liegt höher, und
besteht aus Querfasern; ihr auswendiges Blatt aber
zeigt mehrere Schichten von verschieden gegen ein-
ander laufenden Fasern, geht unten, am absteigen-
gen Aste des Schaambeins fort, so wie auch Fasern
von ihr bis zum Gelenkband des Schenkels gelangen.

Ausser kleinern Löchern, womit sie durchbrochen
ist, bildet sie, indem ihre beiden Blätter schräg gegen
einander streichen, am obern oder der Gelenkpfanne
nächsten Winkel des Hüftbeinloches mit dem dort befind-
lichen schrägen Ausschnitt einen prismatischen schräg
laufenden Kanal zum Durchgange der Blutgefäße,
Saugadern und eines Nerven.

Sie dient zur Anlage des äussern und innern
Hüftbeinlochmuskels.

Zerstreute eigene hintere Bänder des
Kreuzbeines.

Ligamenta accessoria vaga postica ossis sacri.
Weitbrecht Tab. 16. Fig. 51.

S. 47.

Hin- und wieder zeigen sich in der Beinhaut des

Rückens des Kreuzbeines Sehnenfasern, dergleichen auch seinen acht Nervenlöchern vorgespannt liegen.

Bänder der Steißbeine.

Ligamentum ossium coccygis.

Weitbrecht Tab. 16. Fig. 57. p.

S. 48.

Vom Rücken des Kreuzbeins gehen 1) gerade, längere Sehnenfasern zu den Steißbeinen herunter, so wie auch 2) die Hörner des ersten Steißbeines durch kurze, aber starke, eigene Bänder mit den Knöpfchen des Kreuzbeines zusammenhängen. Diese kann man kurze hintere Bänder nennen.

Sie befestigen nicht nur die Steißbeine an das Kreuzbein und untereinander, sondern hindern auch die zu starke Krümmung desselben.

Ausser diesen Bändern hängen sowohl das erste Steißbein mit dem Kreuzbeine, als die Steißbeine untereinander selbst durch Knorpel zusammen, die den zwischen den Wirbeln des übrigen Rückgrats befindlichen Knorpelscheiben (S. 23.) völlig ähnlich sind. Bisweilen erstrecken sich inwendig ähnliche Bändchen vom Kreuzbein nicht nur zu dem ersten Steißbein, sondern auch über die folgenden Steißbeine, bisweilen auch wohl von einem Steißbeine zu dem andern, die man vordere Bänder nennen könnte.

Bänder der obern Gliedmaßen.

Bänder der Schlüsselbeine.

Band zwischen den Schlüsselbeinen.

Ligamentum interclaviculare.

Weitbrecht Fig. 1. 2. 3.

§. 49.

Meistens ist es einfach, bisweilen doppelt. Gemeiniglich zeigt es sich mehr an der innern, als äußern Seite. Bald liegt es ganz dicht auf dem oberen Brustbeine, bald höher über demselben; und ist mit der Sehne des Kopfnickers und dem Kapselbande der Schlüsselbeine vermischt.

Es hält nicht nur die Schlüsselbeine untereinander, sondern auch mit dem oberen Brustbeine zusammen.

Kapselband des Schlüsselbeins an seinem Brustende.

Connexio Claviculae cum Sterno et Costa prima.

Weitbrecht Fig. 1. 2. 3.

§. 50.

Geht von dem Brustende des Schlüsselbeins mit parallelen starken Fasern zur Weinhaut des obern Brustbeins herüber; ringsum, wo vornen das Schlüssel-

bein auf dem Knorpel der ersten Rippe ruht und wo die bloße dünne Kapselmembran erscheint.

Außwendig scheinen die Fasern von einem Knochen unennterbrochen zum andern zu gelangen, innen aber sieht man sie vom Schlüsselbein zum Zwischenknorpel, und von diesem Zwischenknorpel zum Brustbeine gehen.

Dieser Zwischenknorpel, durch den die Gelenkhöhle doppelt wird, ist fast häutig, in der Mitte, und gegen den Rippenknorpel zu dünner, am Umfange dicker, und gleichsam ein Ausfüllungsstück dieses Gelenks; daher durch eine dicke, zähe, der zwischen den Wirbeln liegenden ähnliche Substanz auf dem obern Brustbeine befestigt.

Hautenförmiges Band zwischen dem Schlüsselbein und dem Knorpel der ersten Rippe.

Ligamentum rhomboides Claviculae.

Weitbrecht Tab. 1. Fig. 1. 2.

§. 51.

Liegt schräg zwischen dem Brustbeinende des Schlüsselbeins, wo es an einer Rauigkeit, oder in einer unebenen Grube sitzt, und dem obern und vordern Theil des Knorpels der ersten Rippe.

Es befestigt nicht nur das Schlüsselbein, sondern hilft auch die erste Rippe befestigen; und dient zur Anlage des Schlüsselbeinmuskels.

Band des Schlüsselbeins zur Gräthenecke.

Connexio Claviculae cum acromio.

Weitbrecht Tab. 1. Fig. 4. Tab. 2. Fig. 5. 6.

§. 52.

Zwischen dem Schlüsselbein, und der Gräthenecke des Schulterblattes liegt ein Knorpel, der doch nicht ganz in die Gelenkhöhle herunter geht, sondern als eine feine Membran aufhört, außer welchem noch beide Knochen durch starke Sehnenfasern ringsum zusammengehalten werden.

Bänder der Schulterblätter.

Eigenes vorderes dreneckiges Band des Schulterblattes.

Ligamentum scapulare proprium anterius.

Weitbrecht Tab. 2. Fig. 6. 7. f.

§. 53.

Vereinigt brückenartig den innern Seitentheil der Spitze der Gräthenecke des Schulterblattes mit der äussern Seite des Hakens des Schulterblattes ist an der Gräthenecke spitzig, hernach ziemlich breit, aber dünne. — Widersteht dem Herausgehen des Oberarmbeins.

Eigenes hinteres Band des Schulterblatts.

Ligamentum scapulare proprium posterius.

Weitbrecht Tab. 2. Fig. 5. 7. ii.

S. 54.

Macht den kleinen Ausschnitt am Hakenfortsatze zu einem bald einfachen, bald doppelten Loche, und ist dünner ^s.

Die Ursache, warum statt seiner sich nicht ein Knochenblättchen zeigt, ist nicht ausgemacht; vielleicht würden sich die Gefäße, die unter dieser sehnigen Brücke liegen, bey der Senkung des Schulterblatts zu stark an dem Knochen reiben; so wie auch die Pfanne des Hüftbeins S. 82. durch Sehnenfasern vervollständigt und die Ausböhlung der Handwurzelbeine nicht durch Knochen, sondern durch eine sehnige Brücke zu einem Kanal gemacht wird.

Kegelförmiges Band des Schulterblatts.

Ligamentum scapulare commune conoides.

Weitbrecht Tab. 2. Fig. 5. k.

S. 55.

Kommt theils von dem vorigen Bande theils von dem hintern Theil der Wurzel des Schulterblatt-Hakens, und geht, dick und strahlenförmig, zum hintern Rande des Bogens am Schulterende des Schlüsselbeins.

s) Ich besitze es verknöchert.

Viereckiges Band des Schulterblatts.

Ligamentum scapulare commune trapezoides.

Weitbrecht Tab. 2. Fig. 6. g.

§. 56.

Ein eben so dickes, meist einen Zoll breites Band heftet den obern und mittlern Theil des Hakenfortsatzes mit dem untern Theil des Schlüsselbeins ohnfern seines Schulterendes, wo sich eine starke Rauigkeit findet, zusammen. Wegen des vorwärts niedrigeren Hakens sind auch die vordern Fasern länger, als die hintern; daher ist es ungleichseitig viereckig.

Da beyde Bänder, die man auch flüglich als Theile eines einzigen Bandes ansehen könnte, etwas locker sind; so kann sich das Schulterblatt bewegen, ohne das Schlüsselbein hinabzuziehen; doch hindern sie freylich die gar zu starke Senkung des Schulterblatts.

Bänder des Oberarms.

Großes Kapselband des Oberarms.

Ligamentum capsulare magnum.

Weitbrecht Tab. 2. auf allen Figuren.

§. 57.

Kommt, als eine dickliche, sehnige Haut, ringsum von dem ovalen Rande des Halses des Schulter-

*) Ich besitze es verknöchert.

blatts, vergrößert den Umfang seiner Gelenkfläche, überzieht, als ein dünner, länglich runder, sehr geräumiger Sack, den Kopf des Oberarms, und setzt sich, wieder zusammengezogen, ringsum unter dem Rande seiner überknorpelten Gelenkfläche an ihn fest.

Es hat eine ovale Oeffnung für die Sehne des zweybäuchigen Armmuskels, über welche im Eintreten ein Querbändchen gespannt ist.

An der hintern und äussern Seite, wo der Untergräthmuskel und kleine runde Armmuskel an ihm liegen, ist es am dünnsten und schlaffsten; an der innern und untern Seite, wo der Unterschulterblattsmuskel an ihm liegt, straffer und stärker. Die obere Fläche dieses Bandes wird durch eine von dem Hakenfortsatz kommende Membran verstärkt. — Alles dieses überzieht eine unregelmäßige membranöse Ausbreitung.

Für sich allein ist es zu der Befestigung der Oberarmbeine zu schwach, daher es von den um das Schulterblatt liegenden Muskeln, vom Obergräthmuskel, Untergräthmuskel, großen runden Armmuskel und Unterschulterblattsmuskel und deren Sehnen mächtig verstärkt wird.

Kapselband des Ellenbogengelenks.

Membrana capsularis Cubiti.

Weibrecht Tab. 3. Fig. 10. 1.

§. 58.

Umzieht das Gelenk von den Rändern der Gruben für die Fortsätze des Ellenbogens; und von den Knöcheln des Oberarmes an, bis zum Ellenbogenknorren (olecranon) und Vorsprung (corone) des Ellenbogens, und Ringband der Speiche. Es ist vorne und hinten schlaff, an den Seiten straffer, und besteht gleichsam aus mehreren aufeinander liegenden Blättern, und wird durch folgende, ihm eingemischte eigentliche Bänder verstärkt.

Inneres Seitenband des Ellenbogengelenks.

Ligamentum laterale internum Cubiti
oder brachio cubitale.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 10. m.

§. 59.

Dieses hält den innern Gelenkknöchel des Oberarmes, und den scharfen Rand des Vorsprungs des Ellenbogens zusammen, und ist bald schmaler, bald breiter, so, daß sich kurze Fasern zwischen diesem Knöchel und Ellenbogenknorren zeigen.

Äußeres Seitenband des Ellenbogengelenks.
Ligamentum laterale externum Cubiti
brachio radiale.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 11. m.

§. 60.

Dieses hält den äußern Gelenkknöchel und das Ringband der Speiche, gegen welches es strahlig sich verbreitet, zusammen.

Bänder des Vorderarms

Ringband der Speiche.

Ligamentum annulare sive orbiculare Radii.

Weitbrecht Fig. 11. 12. n. o. Tab. 3. und 4.

§. 61.

Umfaßt, als ein sehr starker, an der gegen die Speiche gewendeten Rauhigkeit des Ellenbogens befestigter, drey Viertel eines Kreises betragender, und fest anschließender, elastischer Ring, den Kopf der Speiche; ist aber doch von ihm durchaus getrennt, nur von dem untern Rande geht eine dünne Haut zu dem Halse der Speiche herunter. Es besteht aus kreisförmigen, parallel neben einander liegenden Fasern, die bisweilen gleichsam zwey Ringe ausmachen. Außer dem äußern Seitenbande wird es noch durch ein Paar mit der Kapselhaut des Ellenbogengelenks verwebte Sehnenbündel verstärkt, und in seiner Lage erhalten,

erhalten, davon einer v o r n e n (*ligamentum accessori-
um anticum*. Weitbrecht Fig. 10. p.) vom Vor-
sprung des Ellenbogens, der andere hinten (*lig-
amentum accessorium posticum*. Weitbrecht
Ebend. Fig. 11. p.) unter dem äussern Knöchel vom
Ellenbogenknorren kommt.

Sehnenschnur der Vorderarmbeine.

Chorda transversalis Cubiti.

Weitbrecht Tab. 3. Fig. 10. q.

§. 62.

Liegt schräg, als ein fast rundes Seil, zwischen
dem Ellenbogen und der Speiche, am Ellenbogen
an dem Höcker für den innern Armmuskel, an der
Speiche, unter dem Höcker der Speiche für den zwey-
bäuchigen Armmuskel. — Schränkt die Rückwärts-
wendung der Speiche ein.

Sehnhaut zwischen den Vorderarmbeinen

Membrana interossea Antibrachii.

Weitbrecht Tab. 3. Fig. 10. und 11.

§. 63.

Liegt zwischen der scharfen Leiste des Ellenbogens
und der scharfen Leiste der Speiche, füllt jedoch nicht
den ganzen Raum aus, sondern läßt über der Mitte
der Länge des Vorderarms eine ansehnliche Lücke für
den kurzen Rückwärtswender und Spalter übrig; be-
E. Bänderlehre. D

steht aus flachen Bündeln mit parallelen Fasern, deren Richtung der vorigen Sehnen schnur entgegengesetzt ist und die hin und wieder für den Durchgang der Gefäße durchbrochen sind. — Dient wohl nur den Muskeln zur Anlage.

Dreieckiger Knorpel am untern Ende des Vorderarms ⁷.

Cartilago intermedia triangularis extremitatum inferiorum Cubiti.

Weitbrecht Tab. 4. Fig. 12. 13. d.

§. 64.

Die Basis dieses starken Knorpels ist eine Fortsetzung des überknorpelten untern Endes der Speiche, und setzt sich mit der Spitze an die ihm gegenüberstehende Seite des Griffels des Ellenbogens fest, hängt ausserdem durch ein kleines Bändchen nach oben zu mit dem Ellenbogen zusammen.

Kapselhaut am Handende des Ellenbogens.

Membrana capsularis extremitatum inferiorum Cubiti.

Weitbrecht Tab. 4. Fig. 13. c.

§. 65.

Geht von der Speiche zu dem Ellenbogen, und umfaßt das überknorpelte Ende, ist ziemlich geräu-

2) S. Albinus de scoleto p. 396.

37
mig, und dünne; wird aber durch die Sehne des äußern Ellenbogenmuskels verstärkt.

Gemeinschaftliche Binde der Handwurzel an der Rückenseite.

Ligamentum commune Carpi dorsale.

Weitbrecht Tab. 4. Fig. 14. cc. desgleichen Barth Muskellehre.

S. 66.

Geht, als eine breite, dünne, aus parallelen Fasern bestehende Sehne, von der Speiche, wo sie am stärksten ist, schräg, etwas sich schmälend gegen das Ellenbogenende herunter, bedeckt nicht nur die Enden der Vorderarmbeine, sondern auch den größten Theil des Rückens der Handwurzel, und ist nach innen zu mit den Hervorragungen der Speiche und des Ellenbogens so verwachsen, daß sie sechs Scheiden für die hier liegenden Sehnen bildet; nämlich für die Sehne 1) des Abziehers des Daumens. 2) Des längern und kürzern äußern Speichenmuskels. 3) Des eigenen Daumenstreckers. 4) Des gemeinschaftlichen Fingerstreckers und des eignen Streckers des Zeigefingers. 5) Des Streckers des kleinen Fingers. 6) Des äußern Ellenbogenmuskels. Die Fortsetzung dieser sehnigen Ausbreitung über den ferneren Rücken der Hand ist zarter, und besteht aus Fasern,

die mit den Fasern der vorigen in entgegengesetzter Richtung oder von der Ellenbogen- seite schräg gegen die Speichenseite herunter laufen.

Gemeinschaftliche Binde der Handwurzel an der Hohlhandseite.

Ligamentum Carpi palmare.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 15.

§. 67.

Liegt etwas höher, als die vorige, an der innern Seite des untern Endes des Vorderarms, ist auch viel dünner, und bekommt Fasern von den Sehnen- scheiden der Abzieher des Daumens, des innern Speichenmuskels und innern Ellenbogenmuskels un- ter der Ausbreitung des langen Handsehnenspanners eingemischt. Die sehnige Ausbreitung des langen Handsehnenspanners kann man füglich für ein Band ansehen, darum aber wohl nicht die Querfasern der- selben für eigene Bänder.

Sehnenbrücke der Handwurzel.

Ligamentum Carpi proprium.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 16. Albin. Historia musculo- rum Icon. 1. und 2.

§. 68.

Dieses starke Band geht, als eine Brücke, vom runden Bein und vom Haken des Hakenbeins gegen

Das Kahnbein und große vieleckige Bein herüber, besteht aus dicken sehr festen Fasern, die mit den Handwurzelbeinen zusammen einen Canal für die Sehnen der Fingerbeuger bilden; und hat zum Durchlassen der Sehne des innern Speichenmuskels ein Loch. Uebrigens verliert es sich nach oben und nach unten zu und wird allmählig dünner. Auswärts ist es rauh, innwärts glatt und schlüpfrig, und mit einem Schleimsacke überzogen. Es dient nicht nur zur Einschränkung der Sehnen, sondern auch zur Anlage verschiedener Muskeln für den Daumen und kleinen Finger.

Kapselband des Gelenkes der Hand mit dem Vorderarme.

Membrana articuli cubiti et carpi capsularis.

Weitbrecht Fig. 12. 20. 21. 22.

§. 69.

Das Kapselband zwischen dem Vorderarm und den Handwurzelbeinen ist stark, aber doch schlaff; sitzt an einem Ende rings um die Gelenkfläche der Speiche, an dem dreyeckigen Knorpel, und dem Griffelfortsatze des Ellenbogens; an dem anderen Ende ringsum die obere Knorpelfläche des Kahnbeins, des Mondbeins, und des dreyeckigen Beins der Handwurzel.

Auf der Hohlhandfläche ist es glatt, aus Fasern

gebaut, die von dem runden Bein her auseinander fahren, und sich bis gegen die Mittelhandbeine erstrecken. Auf der Handrückenfläche hingegen erstreckt es sich nicht so weit.

Die Fasernbündel desselben liegen nach verschiedener Richtung übereinander; einige kommen theils vom dreyeckigen Beine, theils vom runden Beine, vom großen vieleckigen Beine, und vom Hakenbeine, theils von der Speiche und gehen zum Mondbeine und Kopfbeine der Handwurzel. (*Lacerti adscititii bey Weitbrecht.*)

Anderer streichen schräg gegen die vorigen, und kommen für die Hohlhandfläche von dem Griffelfortsatz der Speiche, für die Handrückenfläche, theils von der Speiche schräg zu dem dreyeckigen Beine, theils in entgegengesetzter Richtung von dem dreyeckigen Knorpel zu dem dreyeckigen Beine am Ellenbogen (*Lacerti proprii in vola et dorso manus.*)

Anderer sehr starke schräg von der Wurzel des Griffels der Speiche zum Mondbeine, und zu dem Bande zwischen ihm, und dem Kahnbeine (*Ligamentum accessorium obliquum.*)

Noch andere starke und gerade von der Hohlhandseite des dreyeckigen Knorpels zum Bande zwischen dem Mondbeine und dreyeckigen Beine (*Ligamentum accessorium rectum.*)

In der Höhlung selbst aber zeigen sich noch Gefäßbündchen, die von den Vereinigungen des Kahnbeins mit dem Mondbeine, und des Mondbeins mit dem dreyeckigen Beine, an die überknorpelte Gelenkfläche der Speiche gehen und die Werkzeuge zur Absonderung des Gelenksafts ausmachen.

Band zwischen den Reihen der Handwurzelbeine.

Connexio binorum ordinum ossium carpi.

Weitbrecht Fig. 21. 23. 24. 22. 26.

S. 70.

Die obere Reihe der Handwurzelbeine ist mit der untern Reihe ringsum durch eine Kapselhaut zu sammenheftet, die weit straffer ist, als die Verbindung der Handwurzel mit dem Vorderarm, und gestattet deshalb nur eine kleine Beugung der Handwurzel, da sich auch ihre Fasern nicht über die Reihen der Handwurzelbeine erstrecken.

Die Fasernbündel liegen nach sehr verschiedenen Richtungen, so, daß von einem Knochen die Fasern theils zu einem einzelnen, theils zu mehreren Knochen übergehen; so in der Hohlhandfläche von dem Kahnbeine zu dem großen vieleckigen Beine, kleinen vieleckigen Beine, und zum Kopfbeine der Handwurzel; so vom Mondbeine zu dem Kopfbeine und Hakenbeine; so von dem dreyeckigen Beine zu dem Kopfbeine, Haken-

beine und großen vieleckigen Beine; so auf eine ähnliche Art auf dem Rücken der Hand. Innerhalb der Gelenkhöhle finden sich auch hin und wieder Gefäßbändchen.

Bänder, welche die einzelnen Handwurzelbeine zusammenhalten.

Ligamenta inter utriusque ordinis carpi ossa singula.

Diese Bänder S. 71. und 72. sind sehr kurz, aber stark und straff, und überschreiten nicht die Ränder der aneinander liegenden überknorpelten Gelenkflächen.

Sie finden sich zwischen den Knochen der obern Reihe nur an ihrer Hohlhandseite, zwischen den Knochen der untern Reihe aber sowohl an der Hohlhand- als Handrückenseite; wo aber die wechselseitige Berührung des Kahnbeins, Mondbeins und dreieckigen Beins, desgleichen des großen vieleckigen Beins, des kleinen vieleckigen Beins, des Kopfbeins und Hakenbeins innerhalb des Gelenkes schaut, sind die aneinanderpassenden Ränder entblößt, und ausser ein und anderm weichen Faden ohne Bänder, oder ohne eine Fortsetzung der Ueberknorpelung.

Bänder zwischen den drei Handwurzelbeinen der
obern Reihe.

Ligamenta inter Carpi ossa tria ordinis primi.
Weitbrecht Fig. 20. 23 24.

S. 71.

So ist das Kahnbein mit dem Mondbeine, und
das Mondbein mit dem dreieckigen Bein, an der
gegen den Vorderarm gerichteten Seite zu einer ge-
meinschaftlichen Gelenkfläche verbunden.

Bänder des runden Beins.

Ligamenta ossis subrotundi.
Weitbrecht Fig. 16. 21. und 23.

So wird das runde Bein theils durch ein Kap-
selband, theils durch Fasern, die von ihm zur Seh-
nenbrücke der Handwurzel gehen; theils durch starke
Fasern, die zu dem Hakenbeine gehen; theils durch die
Fortsetzung der Sehne des innern Ellenbogenmuskels
an das Mittelhandbein geheftet.

Bänder zwischen den Handwurzelbeinen der
untern Reihe.

Ligamenta inter Carpi ossa ordinis secundi.
Weitbrecht Fig. 23. 25. 27.

S. 72.

So sieht man in der hohlen Hand das große
viereckige Bein und das kleine viereckige Bein rings

...; so auf eine ähnl.
... Innerhalb der
... und wieder Gefäß-
Handwurzelbein
... carpi ossa singula.
... sehr kurz, aber
... die Bänder der
... Gelenkflächen.
... Knochen der obern
... ite, zwischen den
... wehl an der Höhe
... der die wechselseitige
... beins und dem
... viereckigen Beins,
... Kopfbeins und
... schaut, sind die
... it, und außer ein
... änder, oder ohne
... 29.



um die Anpassung durch ein Kapselband, und an das Mittelhandbein durch einige Fasern befestigt; so auch das große vieleckige Bein mit dem Hakenbeine; das Kopfbein und das Hakenbein hingegen haben, ausser der Kapsel, noch eigene Bändchen, die bisweilen bis zum kleinen vieleckigen Beine und Hakenbeine gelangen. Die Fasern zwischen dem Kopfbeine und Hakenbeine sind dick und stark.

Auf dem Rücken der Hand vereinigen sich sowohl die Handwurzelbeine der untern Reihe, als die Mittelhandbeine untereinander, durch ein Kapselband, dessen Fasern queer liegen, und in eins fortgehen.

Querbänd innerhalb des Gelenkes zwischen dem Kopfbeine und Hakenbeine.

Ligamentum transversum ossis capitati et hamati.
Weitbrecht Fig. 27.

S. 73.

Ist sehr stark, rundlich, und so kurz, daß es beyde Knochen unbeweglich zusammenhält.

Bänder zwischen den Handwurzelbeinen und Mittelhandbeinen.

Band des Mittelhandbeins des Daumens.

Weitbrecht Fig. 16. 21. 22. 25. 26.

§. 74.

Das Mittelhandbein des Daumens hängt mit dem großen vieleckigen Beine durch eine ringsum liegende Kapselhaut zusammen, welche an sich sehr dünn ist, aber sowohl durch die Sehne der Abzieher, als durch vier hinzukommende Bänder verstärkt wird; nämlich durch eins an der Handrückenfläche, durch eines an der Hohlhandfläche, durch eines an der Ellenbogen- oder äußern Seite durch eines an der Speichen- oder innern Seite. Ligamentum dorsale, palmare, laterale externum et laterale interinum.

Band des Mittelhandbeins des Zeigefingers.

Weitbrecht Fig. 21. 23. 25. 28.

Das Mittelhandbein des Zeigefingers hat drey Bänder. 1) ein hohes Band (Sublime), welches in der hohlen Hand vom hohen Bande des Mittelhandbeins des mittlern Fingers bedeckt wird, und zwischen der Basis des Mittelhandbeins des Zeigefingers und dem Höckerchen des großen vieleckigen Beins liegt. 2) Ein tiefes Band (Profundum) zwischen seiner Basis, und dem kleinen vieleckigen

Beine, selten dem großen vieleckigen Beine, ist dünn und von den Bändern des Mittelhandbeins des Mittelfingers bedeckt. 3) Ein Seitenband, das stärkste, geht zu dem großen vieleckigen Beine, und besteht bald aus parallelen, bald aus strahligen Fasern.

Band des Mittelhandbeins des Mittelfingers.

Das Mittelhandbein des Mittelfingers verbindet sich 1) mit dem großen vieleckigen Beine in der hohlen Hand durch drey ansehnliche Bänder, zwey höhere Fig. 21. a. 8. und ein tieferes Fig. 23. 8. oder unter ihnen liegendes. 2) Mit dem Kopfbeine, auffer dem Kapselbande an der äußern Seite, noch durch ein starkes, bisweilen getheiltes, senkrechttes Band Fig. 27. f. 3) Mit dem Hakenbeine Fig. 23. t. in der Hohlhandfläche durch ein schräg liegendes Band.

Band des Mittelhandbeins des Ringfingers.

Das Mittelhandbein des Ringfingers verbindet sich durch eine bloße Kapselhaut mit dem Hakenbeine; doch streicht bisweilen ein Faserbündel von dem Bande zwischen dem großen vieleckigen Beine und kleinen vieleckigen Beine, oder wohl von dem runden Bein zu ihm hin (Fig. 23. l.)

Band des Mittelhandbeins des kleinen Fingers.

Das Mittelhandbein des kleinen Fingers verbindet sich durch ein einziges starkes Band mit dem Höcker des Hakenbeins (Fig. 16. Z. 21. E.)

Bänder, welche die Mittelhandbeine miteinander zusammenhalten.

Die Handenden der Mittelhandbeine halten durch drey Bänder zusammen. 1) Durch äußere oder Handrückenbänder (dorsalia). 2) Durch Seitenbänder (lateralia). 3) Durch innere oder Hohlhandbänder (palmaria).

1) Die Handrückenbänder (Fig. 29. a) unterscheiden sich deutlich von der Kapselhaut, und gehen quer von einem Mittelhandbeine zum andern hinüber. Zwischen dem kleinen Finger und Ringfinger sind sie am längsten und schlaffsten; zwischen dem Ringfinger und Mittelfinger straffer; zwischen dem Mittelfinger und Zeigefinger schwach oder fehlen gar, so wie sie auch zwischen dem Zeigefinger und Daumen fehlen.

2) Die Seitenbänder (Fig. 29. b.) liegen schräg zwischen den Mittelhandbeinen, und werden in Ansehung der vorigen, mit denen sie in Winkeln zusammenstoßen, in umgekehrter Ordnung schwächer. —

Das stärkste nämlich liegt zwischen dem Zeigefin-

ger und Mittelfinger, das schwächste zwischen dem Ringfinger und kleinen Finger. Ein ähnliches (Fig. 26. m.) verbindet auch den Daumen und Zeigefinger. Sie dienen, ausser, daß sie die Knochen zusammenhalten, auch noch zur Anlage von Muskelfasern.

3) Die inneren, oder in der Hohlhand liegenden Bänder, (Fig. 21. K. Fig. 23. und 28.) gehen, als parallele Fasern, queer von einem Mittelhandbein zum andern herüber, sind nicht bloß oberflächlich, sondern erstrecken sich tief zwischen die Mittelhandbeine, besonders zwischen das Mittelhandbein des Ringfingers und kleinen Fingers, wo sie auch schräge Fasern zeigen. Das zwischen dem Mittelfinger und Zeigefinger ist sehr dünne, oder fehlt oft gänzlich.

Die Fingerenden oder Köpfchen der vier Mittelhandbeine (ausserdem des Daumens) werden durch drey breite, aber dünne, queerliegende, schlaffe Bänder (Fig. 21.) zusammengehalten.

Bänder der Finger. Hautbänder.

S. 75.

Die Hautbänder (Ligamenta cutanea digitorum Fig. 19. g.) erstrecken sich von dem mittleren Fingergelenke in die Haut, damit selbige sich nicht zu sehr runzeln könne.

Das erste Glied der Finger ist durch eine glatte und schlafe Kapselhaut mit seinem Mittelhandbeine verbunden; wird aber 1) theils durch die Sehnen der Strecken, 2) theils durch die Scheiden der Sehnen der Beuger auf dem Gelenke, 3) theils durch folgende eigene Bänder verstärkt.

Seitenbänder.

Die Seitenbänder (*Ligamenta lateralia digitorum* Fig. 30. a.) heften jedes der drey Gelenke eines Fingers an den Seiten zusammen, indem sie von dem Höckerchen des einen Knochens zu dem Höckerchen des andern gehen; sind sehr stark und wulstig erhaben, aber nach der Stärke der Knochen, die sie zusammenhalten, an Stärke verhältnißmäßig verschieden.

Queerbänder der Fingergelenke.

Annuli ligamentosi iuncturarum digitorum.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 15. ii.

§. 76.

Auf der Hohlhandseite der drey Gelenke der Finger befinden sich bald einfache, bald doppelte, bald schmälere, bald breitere Bändchen, die, als halbe Ringe, die Sehnen der Beuger umschließen.

ste zwischen dem
ähnliches (Fig.
und Zeigefinger.
sien zusammen-
wülfelastern.

Hohlhand liegen-
28.) gehen, als
Mittelhandbein
s oberflächlich,
Mittelhand-
elhandbein des
ste auch Vorzüge,
stehender und Zwi-
stet gänzlich.

schen der vier
mens) werden
gende, schlafe.

g e r.

r.

cutanea digito-
n dem mittlern
abhängig sich nicht zu

Haltbänder der Sehnen der Fingerbeuger auf den
ersten und den mittleren Gliedern.

Ligamenta vaginalia phalangis primae et mediae
digitorum.

Weitbrecht Ebend. K. und Albin. Historia musculorum
Icon. I.

§. 77.

Liegen mitten auf den Gliedern, bestehen meist
aus kreisförmigen Fasern, und sind an dem oberen
und unteren Rande scharf, in ihrer Mitte am dick-
sten, übrigens sehr elastisch. Ihre Größe ist nach den
Fingern verschieden. Sie umschließen sehr fest die
Sehnen des gespaltenen Fingerbeugers und des Spal-
ters, sind aber inwendig von ihnen ganz getrennt,
und mit einem Schleimsacke bekleidet. Die auf den
mittleren Gliedern sind verhältnismäßig, wie die
mittleren Glieder selbst, kleiner, als die auf dem er-
sten Gliede.

Schräge oder Kreuzbänder auf den ersten und auf
den mittleren Gliedern der Finger.

Ligamenta obliqua seu cruciformia phalangis primae
et mediae digitorum.

Weitbrecht Ebend. I.

§. 78.

Zwischen dem unteren Rande der vorigen Halt-
bänder und den Gelenken der ersten oder oberen Glied-
der

der mit den mittleren Gliedern finden sich ein Paar schräge Fasern, welche, da sie in entgegengesetzter Richtung liegen, einander kreuzen. Doch sind sie oft auf dem Zeigefinger und Ringfinger undeutlich. Auf den mittleren Gliedern ist gewöhnlich nur ein schräger Streifen vorhanden.

Haltbändchen des Daumenbengers.

Ligamenta flexoris pollicis.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 15. n. o.

S. 79.

Ein Haltbändchen liegt zwischen den Sehnenknöcheln des Daumens, ein anderes Streifchen läuft von aussen nach innen schräg hinab.

Diese vier zuletzt beschriebenen Bänder sind innwendig, mittelst eines gemeinschaftlichen Schleimsackes, ausgekleidet, und in Zusammenhang gebracht.

Durch sie werden nicht nur die Sehnen in ihrer Lage erhalten, sondern selbst ihre Wirkung durch ein Festhalten gegen die Glieder beträchtlich verstärkt; und indem sich die Sehnen nach der Krümmung bequemen, die Beugung zugleich schicklicher, und der Raum größer gemacht, als wenn die Sehnen sich bey der Fingerbeugung gerade zögen.

S. Bänderlehre.

Ⓔ

Gefäßbändchen der Sehnen der Fingerbeuger.

Vincula tendinum musculi sublimis et profundi
accessoria, brevia et longa.

Weitbrecht Tab. 5. Fig. 17. 18. weit schöner in Barth's
Muskellehre. Tab. 13. Fig. 2.

§. 80.

Bevor die Sehne des gespaltenen Fingerbeugers
sich an das Nagelglied setzt, erhält sie, wie in der
Muskellehre §. 264. gezeigt wird, von der Weinhaut
des mittleren Gliedes eine kurze, einem Bändchen
ähnliche, straffe, bisweilen Fett enthaltende, drey-
eckige Verdoppelung, und ausser dieser ein oder ein
Paar längere und dünnere, schlaffere, ähnliche
Fädchen.

Ein gleiches, etwas größeres, strafferes, rauten-
förmiges Bändchen, und einige schlaffere, an Zahl,
Gestalt und Lage sehr variirende Bändchen gehen von
der Weinhaut des ersten Gliedes zu der Sehne des
Spalters.

Da sie zur Befestigung dieser Sehne nicht bequem
liegen, auch viel zu schwach sind, so dienen sie wohl
nur, um die Gefäße an die übrigen ringsum losen
und freyen Sehnen zu leiten³.

3) Cuius usus sint, determinare non audeo. Omnia au-
tem et singula utut tenuia sint, elegantibus tamen ar-
teriolis et venis facta iniectione superbire conspicuntur.
Weitbrecht. Ich habe sie mit Sorgfalt unter-

Sehnenstreifen an den Seitenrändern der Nagelglieder.

Ligamenta digitorum lateralia subtensa.

S. 81.

Füllen die Anschwefung zu beyden Seiten des Nagelgliedes aus, dienen nicht bloß zur Befestigung der Haut, sondern auch der Nägel.

Wie die Sehnen der Streckter der Finger zugleich als Bänder die Gelenke verstärken helfen, wird (Muskellehre S. 252.) gezeigt. — Ueber diesen Sehnen liegt auf dem Gelenke zwischen dem ersten und mittlern Gliede noch ein Querbändchen (*Retinaculum tendinum longorum lumbricalium et interosserum*. Weitzbrecht Tab. 6. Fig. 19. f.) welches, die langen Sehnen der Fingerstreckter straff und die Finger selbst runder zu erhält.

sucht und die Gefäße noch weiter bis auf die Sehnen verfolgt, und bin also sicher, daß sie diesen Nutzen leisten, daher ich ihnen auch obigen Namen gebe.

Bänder der untern Gliedmaßen.

Bänder des Pfannenauschnitts.

Ligamenta labri cartilaginei transversale internum
et externum.

Weitbrecht. Tab. 18. Fig 54 - 55. Das innere. Fig 55.
e. e. das äußere.

§. 82.

Der Rand der Pfanne des Hüftbeins wird von einer Masse umgeben oder fortgesetzt, die das Mittel zwischen einem Bande und einem Knorpel hält, welche oben und aussen am meisten vorragt, und wenn sie von oben nach unten an den Ausschnitt am Rande der Pfanne kommt, vollkommen bandartig wird, und theils den Ausschnitt so ausfüllt, daß sie auf die andere Seite in eins fortgeht; theils mit einem Streifen sich in das untere Horn festsetzt, doch bleibt unter dem Ausfüllungsbande eine Lücke, durch welche Gefäße dringen.

Außwendig ist dieses Ausfüllungsband der Pfanne mit zwey oder drey schrägen Streifen (Ligamentum labri cartilaginei transversale externum) bedeckt, welche von der Membran des großen Hüftbeinlochs kommen, und schräg zum gegenüberliegenden Horn des Pfannenauschnittes hinabsteigen, indem sie die Fasern des vorigen Bandes kreuzen. Die verwuthliche Ursache dieser Einrichtung; nämlich daß der Rand der Pfanne zum Theil aus Sehnenfasern besteht, ist oben §. 54. angegeben worden.

Kapselhaut des Schenkelkopfs.

Membrana capsularis femoris.

Weitbrecht Tab. 18. Fig. 56.

S. 83.

Diese zur Befestigung des größten Knochens allerstärkste und größte Gelenkkapsel des ganzen Körpers wird ringsum von verschiedenen ganz leicht mit ihr zusammengehefteten Muskeln bedeckt; vornen nämlich vom Darmbein- und Lendenmuskel; innen vom Schaambeinmuskel und äußern Hüftbeinlochsmuskel; hinten sowohl von dem äußern als innern Hüftbeinmuskel, vom viereckigen Schenkelmuskel, vom birnförmigen Muskel, und von den Zwillingsmuskeln; aussen vom kleinen Gefäßmuskel, der am allerfestesten auf ihr liegt.

Sie kommt ringsum sowohl vom Knochentheil, als vom knorpeligen Fortsatze des Randes der Pfanne, doch so, daß die Schärfe des knorpeligen Randes im Gelenke frey vorsteht. Auswendig geht sie höher um die Pfanne hinauf bis an die untere Ecke des Hüftbeinkammes; inwendig sitzt sie nur ringsum an der Schärfe des knorpeliegn Randes.

Sie umzieht darauf den ganzen Kopf und Hals des Schenkelbeins und setzt sich vornen an die rauhe Linie zwischen den Kollhügeln, fast bis an den großen Kollhügel selbst, fest; hinten aber geht sie lange nicht

Gliedmaßen.
anschnitte.
anversale internum
s. das innere. Fig. 55.

Hüftbeins wird von
steht, die das Mittel
Knorpel hält, welche
ragt, und wenn sie
schnitt am Rande der
bandartig wird, und
daß sie auf die andere
mit einem Streifen sich
bleibt unter dem Aus-
läge Gefäße bringen.
ngsband der Pfanne
eifen (Ligamentum
externum) bedeckt,
großen Hüftbeinloch
überhängenden Sperr
steigen, indem sie be
kreuzen. Die veran-
lung; nämlich bei der
aus Schenkelbein
eden.

so tief, als die Linie zwischen den Kothügeln liegt, herunter; vornen ist sie daher länger, am großen Kothügel kürzer.

Am dicksten ist diese Membran vorwärts; dünner innwärts, wo sie vom Darmbein- und Lendenmuskel bedeckt wird; am dünnsten hinten am Halse, wo der viereckige Lendenmuskel auf ihr liegt.

Hin und wieder wird sie durch Fortsätze der äußern Sehenscheide des Schenkels, die zwischen den äußern Hüftbeinlochsmuskel, den Schaambeinmuskel, den Darmbein- und Lendenmuskel, den geraden Schenkelmuskel und den kleinen Gefäßmuskel dringen, verstärkt, desgleichen durch den queer über sie laufenden Theil der Sehne des geraden Schenkelmuskels, welcher sich an die Pfanne setzt. Ihre innwendige glatte Haut bildet hin und wieder Verdoppelungen, und scheint, indem sie um den Kopf herum zurückgeschlagen ist, aus Kreisfasern zu bestehen. Ihre äußern Fasern sind ringsum weit länger, als die innern.

Rundes Band des Schenkelkopfs.

Ligamentum teres capitis femoris.

Weitbrecht Tab. 18. Fig. 56. Thomas Schwenneke
Haematologia accedit Obs. anat. de acetabuli Ligamento in-
terno caput femoris; firmante c. tab. Hag. Com. 1743. 8vo
bildet es aus einer zwey und zwanzig jährigen Frau ab.

S. 84.

Dieses den Kopf des Schenkelbeins mit der
Pfanne zusammenhaltende Band ist am Grunde der
Pfanne dreyeckig pyramidalisch.

Die Basis der

*Das Band ist rund und
Ductus membranaceus laxus
infundibuliformis, quoniam
ad pedem sui fissura in
V. Malacena. Sirodi &
Anatomia traumatica Veneta
1794. p. 115. s. Auctoris
Obs. et praxim ad orthopaediam
Ludovigi et Hieron. Palav. 1807.
p. 115.*

Handwritten note on a paper slip, partially obscured by a metal object. The text is in cursive and appears to be a continuation of the anatomical discussion, mentioning 'Band' and 'Pfeile'.

zwischen beiden Hörnern, und berührt nur in gewissen
Lagen des Schenkels die Pfanne.

Näher gegen den Schenkelkopf zu wird es runde-
licher.

Die schlüpfrige Haut, womit es überzogen ist,
bildet hin und wieder Verdopplungen, welche gegen
die Welle zu länger werden, und Gelenkfett zwischen
sich aufnehmen, auch innerhalb ein und andere Seh-
nenfasern zeigen. (Ligamenta massae adiposae Weit-
brecht Fig. 56. 1.)

so tief, als die Linie zwischen den Kollhügeln liegt, herunter; vornen ist sie daher länger, am großen Kollhügel kürzer.

Am dicksten ist diese Membran vorwärts; dünner innwärts, wo sie vom Darmbein- und Lendenmuskel bedeckt wird; am dünnsten hinten am Halse, wo der viereckige Lendenmuskel auf ihr liegt.

Hin und wieder wird sie durch Fortsätze der äußern Sehnenscheide des Schenkels, die zwischen den

und scheint, indem sie um den Kopf herum zurückgeschlagen ist, aus Kreisfasern zu bestehen. Ihre äußern Fasern sind ringsum weit länger, als die innern.

Rundes Band des Schenkelkopfs.

Ligamentum teres capitis femoris.

Weitbrecht Tab. 18. Fig. 56. Thomas Schwencke
Haematologia accedit Obs. anat. de acetabuli Ligamento in-
terno caput femoris firmante c. tab. Hag. Com. 1743-18vo
bildet es aus einer zwey und zwanzig jährigen Frau ab.

S. 84.

Dieses den Kopf des Schenkelbeins mit der
Pfanne zusammenhaltende Band ist am Grunde der
Pfanne dreyeckig pyramidalisch.

Die Basis der innern den Schenkelkopf berüh-
renden Seite ist am innern Bande des Pfannenaus-
schnittes befestiget.

Die Basis der obern die Pfanne berührenden
Seite kommt vom Ende des untern Randes des obern
Horns.

Die untere Seite kommt meist aus der Delle
zwischen beiden Hörnern, und berührt nur in gewissen
Lagen des Schenkels die Pfanne.

Näher gegen den Schenkelkopf zu wird es runde-
licher.

Die schlüpfrige Haut, womit es überzogen ist,
bildet hin und wieder Verdopplungen, welche gegen
die Delle zu länger werden, und Gelenkfett zwischen
sich aufnehmen, auch innerhalb ein und andere Seh-
nenfasern zeigen. (Ligamenta massae adiposae Weit-
brecht Fig. 56. 1.)

*Das Band ist runder als
Ductus membraceus laxus
infundibuliformis, quem Schwencke
et Weitbrecht für Ligamentum teres
de Malacarne. Linnæi &
Anatomia traumatica Venæ
1794 Tab. 1. f. Austaria
des et primum ad officologian
Ludovici et Hieron. Palav. 1801
8vo.*

den Kolligeln liegt
am großen Woll-

verordet; immer
und Lendenmuskeln
am Halse, wo die
liegt.

Fortsätze der Luf-
trichter, die zwischen den
Lungenmuskeln

Kopf herum zurückge-
hen. Ihre äußern
als die innern.

Es schränkt die Bewegung des Schenkels nach ^{unten} oben und aussen zu ein.

Inneres Seitenband des Knies.

Ligamentum laterale internum genu.

Weitbrecht Tab. 19. Fig. 58. k.

S. 85.

Liegt schräg zwischen dem innern Knöchel des Schenkelbeins und der innern Seite des Schienbeins; ist oben rundlicher und schmaler, unten dünner und breiter, und mit der Ausbreitung der Sehnen des längsten Schenkelmuskels, schlanken Schenkelmuskels und halbsehnigen Schenkelmuskels, und selbst des innern dicken Schenkelmuskels bedeckt. Nach hinten zu wird es durch einen starken Steifen, der sich an den innern mondformigen Knorpel festsetzt, verstärkt.

Langes und kurzes äusseres Seitenband des Kniegelenks.

Ligamentum laterale externum genu.

Weitbrecht das lange Tab. 19. Fig. 57. e. Das kurze Tab. 20. Fig. 59. g.

S. 86.

Das lange äussere Seitenband des Kniegelenks liegt, als ein rundlicher, starker Streifen, an der äussern Seite zwischen dem Knöchel des Schenkelbeins und dem Wadenbein. Es haftet am Schenkel

an einem gemeinschaftlichen Höckerchen mit der Sehne des Kniekehlmuskels. Unterwegs ist es mit dem sichelförmigen Zwischenknorpel und der Gelenkkapsel innigst verbunden; auch streichen Fasern von ihm zur Kniescheibe.

Das kurze äußere Seitenband des Kniegelenks liegt hinter dem langen äußeren Seitenbande des Kniegelenks, zwischen der tiefsten Gegend des Knöchels des Schenkelbeines und der Spitze des Wadenbeines gleichfalls mit dem Zwischenknorpel und der Gelenkkapsel verbunden; bisweilen ist es nicht am Schenkel, sondern bloß in der Kapselhaut über dem Knorpel befestigt.

Das innere Seitenband und die äußeren Seitenbänder halten das Schenkelbein mit den Unterschenkelbeinen zusammen.

Kapselmembran des Kniegelenks.

Membrana capsularis genu.

Weitbrecht Tab. 19. Fig. 57.

§. 87.

Die eigentliche Haut der Gelenkkapsel kommt vornen ziemlich hoch über der Gelenkfläche des Schenkelbeines, dann seitwärts von der Mitte der Knöchel des Schenkelbeines, hinten hingegen näher vom Rande der überknorpelten Gelenkfläche, und geht unter-

wegs an die Zwischenknorpel festgeheftet ringsum zum rauhen Rande des oberen Endes des Schienbeines herunter, indem sie noch die Kniescheibe mit einem Theile ihrer oberen und unteren Sehne in sich aufnimmt.

Diese äussere, hinten ziemlich schlaffe Membran wird verstärkt, theils durch eigene Sehnenfasern, die vom äusseren Knöchel des Schenkelbeines strahlenförmig zur Kniescheibe gehen, (Fig. 57. c. h.) theils durch die Sehnen des Wadenmuskels, des langsehnigen Muskelchens und Kniekehlmuskels, theils durch die beschriebenen drey Seitenbänder, theils durch die Schenkelbinde und die Ausbreitung der Sehnen des zweyhäuchigen Schenkelmuskels, des äusseren und inneren dicken Schenkelmuskels, und des geraden Schenkelmuskels, die sich über die Kniescheibe erstrecken, und sich selbst als ein Ueberzug löschälen lassen.

Ferner hinten durch einen vom äusseren Knöchel des Schenkelbeines zur Sehne des halbmembranösen Schenkelmuskels schräg absteigenden Sehnenstreifen, (Ligamentum posticum. Fig. 59. h.) der, wenn er fehlt, durch andere, mitunter gekreuzte Fasern ersetzt wird, und zur Anlage des Wadenmuskels und langsehnigen Muskelchens dient.

Uebrigens bildet die Haut dieser Gelenkkapsel inwendig verschiedene mehr oder weniger Gelenkfett

aufnehmende Verdoppelungen, vorzüglich eine an jeder Seite der Kniescheibe (Fig. 60. c. d.), die sich in der Mitte unter der Kniescheibe mit der andern in einem Fortsatze vereinigt,* und als ein Züngelchen (Frenulum Fig. 60. c.) an die Ausbuchtung zwischen den Gelenkknöcheln des Schenkelbeines verliert *.

Kreuzbänder des Kniegelenks.

Ligamenta cruciata in poplite.

Weitbrecht Tab. 21. Fig. 61-62.

§. 88.

Unten wird das Schenkelbein (so wie oben durch das runde Band mit der Pfanne) durch zwey sehr starke sich kreuzende Bänder mit dem Schienbein zusammengehalten.

Das vordere Kreuzband des Kniegelenks kommt aus der Grube zwischen den Knöcheln von der ganzen Wand des äussern Knöchels des Schenkelbeines, doch mehr nach hinten zu, und setzt sich an den Abhang des queeren Höckers aus der vorderen Grube des Schienbeines.

Das hintere Kreuzband des Kniegelenks kommt aus der Grube von der Wand des inneren Knöchels des Schenkelbeines, doch mehr nach vornen

- 8) Weitbrecht beschreibt sie unter den Namen: 1) ligamentum alare minus) 2) ligamentum alare maius, und 3) ligamentum mucosum oder appendix.

zu, und setzt sich in die hintere Grube des Schienbeins.

Bei der Beugung des Knies wird das hintere Band gespannt, das vordere aber erschlafft; bei der Streckung hingegen das vordere gespannt und das hintere erschlafft.

Bänder der mondformigen Knorpel des Kniegelenks.

Ligamenta cartilaginum lunatarum.

Weitbrecht Tab. 21. Fig. 63.

§. 89.

Außer der Befestigung an die Kapselmembran und an die Seitenbänder des Kniegelenks haften die Hörner der mondformigen Knorpelscheiben noch durch Bänder am Schienbeine Schenkelbeine und aneinander selbst.

Der äußere Mondknorpel gleicht einem unvollständigen Ringe, ist fast gleichbreit, an dem äußern Umfange am dicksten, nach innen zu immer dünner, durch sein vorderes Horn theils an das Grübchen, theils an den Abhang des äußern Höckers des Schienbeins; und durch sein hinteres Horn theils an das hintere Kreuzband des Kniegelenks, theils an den Abhang des äußern und des hintern Höckers befestigt.

Der innere Mondknorpel ist eigentlich mondformig, mit spitzigen Hörnern, und durch sein

vorderes Horn vorne am Rande des Schienbeins, durch sein hinteres Horn aber im hintern Grübchen befestiget.

Ausserdem hängen beyde Mondknorpel noch am vordern Rande des Schienbeins durch ein Querbändchen Ligamentum transversale Weitbrecht Fig 62. 63. x.) zusammen, von dem ein Fortsatz mit einer Verdoppelung der innern Haut sich vorne im Grübchen zwischen den Gelenkknöcheln des Schenkelbeins verliert.

Oberes Waden- und Schienbeinband.

Ligamentum capituli fibulae.

Weitbrecht Ta 2. b. Fig. 61. 62.

S. 90.

Der Kapselhaut, welche das obere Gelenk des Wadenbeins und Schienbeins umgiebt, sind einige parallele, schräg liegende Sehnenfasern eingemischt, die hinten ununterbrochen fortgehen, vornen aber sich bisweilen über die Sehne des zweybäuchigen Schenkelmuskels so werfen, daß selbige horizontal an das Schienbein gelangt.



Sehnenbrücke am untern Theile des
Unterschenkels.

V a g i n a T i b i a e.

Weitbrecht Tab. 24. Fig. 73. a.

§. 91.

Vorwärts am Unterschenkel geht von dem Schienbein gegen das Wadenbein ein dünnes Band schräg über die Sehnen der Fußstrecker und Zehenstrecker, dessen Fasern nach oben zu unmerklich sich verlieren, nach unten zu hingegen einen deutlichen Rand haben. Nach hinten zu verliert es sich von beyden Seiten gegen den Sehnenüberzug des Wadenmuskels.

Kreuzbinde des Rückens des Fußgelenks.

Ligamentum commune cruciatum.

Weitbrecht Ebd. b. c. d.

§. 92.

Vornen über dem Gelenke des Unterschenkels und der Fußwurzel liegt ein ähnliches, dünnes, aber aus zwey sich kreuzenden Faserstreifen bestehendes Band, von welchem nach innen zu Fortsätze zur Abscheidung der Sehnen sich erstrecken. Einer steigt vom innern Knöchel gegen das Fersebein, der andere vom äußern Knöchel gegen das Kahnbein herunter.

Sehnenhaut zwischen dem Schienbein
und Wadenbein.

Septum longitudinale interosseum.

§. 93.

Geht auf eine gleiche Art, wie die Membran zwischen den Vorderarmknochen vom schneidenden Rande des Schienbeins zur inneren Seite des Wadenbeins herüber; besteht auch hauptsächlich aus schrägen Fasern, die doch von andern gekreuzt werden; und ist auch hin und wieder zum Durchgange von Gefäßen und Nerven durchbrochen.

Dient ebenfalls vorzüglich zur Anlage von Muskelfasern.

Vorderes und hinteres höheres Band zwischen dem untern Ende des Schienbeins und Wadenbeins.

Ligamentum superius anticum et posticum.

Weitbrecht Anticum Tab. 22. Fig. 64. c. Posticum 65. a.

§. 94.

Von dem untern Ende des Schienbeins gehen vornen und hinten starke Faserstreifen gegen das untere Ende des Wadenbeins schräg herunter; die obern Fasern sind kürzer, die untern allmählig länger.

tern Spitze des
fels.
biae.

ht von dem Schien-
beins Band schräg
und Zehenstrecker,
stlich sich verlieren,
sehen Rand haben,
von beiden Seiten
Wadenmuskeln.

des Fußgelenks
cruciatum.

unteren Gelenks und
beins, aber aus
stehendes Band,
zur Absicherung
steigt vom innern
er andere vom höh-
herunter.

Vorderes und hinteres niedrigeres Band zwischen dem untern Ende des Schienbeins und Wadenbeins.

Ligamentum inferius anticum et posticum 9.

Weitbrecht Anticum Tab. 22. Fig. 64. 66. Posticum Fig. 65. c. 66. o.

§. 95.

Vornen und hinten geht unter den vorigen Bändern vom äußersten untern Rande des Schienbeins ein schmaler Streifen schräg zur Stelle unter den vordern und hintern Höcker am untern Ende des Wadenbeins, oder äußern Knöchels; macht, als eine Fortsetzung des Randes der Gelenkflächen des Schienbeins und Wadenbeins, daß selbige genauer an die Gelenkfläche des Sprungbeins schließen.

Diese vier Bänder §. 94. und 95. halten das Schienbein und Wadenbein so fest, dicht und straff zusammen, als wenn sie nur Ein Knochen wären.

Eigene Binden der Flechsen einiger Fußmuskeln.

§. 96.

Ueber die unter dem äußern Knöchel weglaufenden Sehnen des langen und kurzen Wadenbeinmuskels wirft sich ein Band, welches sie nicht nur ein-

9) Ließen sich auch wohl als Fortsetzungen der obern ansehen.
schränkt,

schränkt, sondern auch durch Fortsätze, die von ihm an die Knochen gehen, von einander absondert (*Retinaculum tendinum peroneorum. Fig. 73. e.*)

So pflegt sich auch auf dem Fußrücken ein dünnes Band über die Sehne zur kleinen Zehe vom gemeinschaftlichen Zehenstrecker und über die Sehne des dritten Wadenbeinmuskels zu werfen (*Fig. 73. n. m.*)

So fährt ein strahlenförmiges Band vom internen Knöchel über die Sehne des hintern Schienbeinmuskels herunter, das sich theils in die Haut, theils in die Sehne des Abziehers der großen Zehe, theils ans Fersehenbein verliert (*Ligamentum laciniatum Tab. 25. Fig. 74. e.*)

So werfen sich auf dem Gelenke des ersten Gliedes und den Mittelfußbeinen Sehnenfasern von den Seiten der Flechsen der Zehenstrecker bis zur Fußsohlenfläche herunter, welche das Ausweichen dieser Flechsen hindern. (*Retinacula lata Extensorum Weitbrecht Fig. 73. i. schöner Albini Tab. Musculorum 25. Fig. I.*)

Die Scheide des eigenen langen Streckers der großen Zehe wird sowohl auf dem Mittelfußbein, als auf dem ersten Gliede, durch Bandsfasern verstärkt. (*Ligamentum proprium tendinis Extensoris proprii longi Pollicis. Fig. 74. g.*)

S. Bänderlehre

§

So werden die eigenen Schleimsäcke der Flechsen des hintern Schienbeinmuskels, des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers, des eigenen langen Beugers der großen Zehe durch Bandfasern mächtig verstärkt; vorzüglich aber geht über die Flechse des letzten ein starkes Band vom Sprungbeine zum Fersenbein. (Vagina ligamentosa Flexoris proprii pollicis Fig. 69. a.)

So liegt zwischen dem hintern, und dem Seitenhöcker des Fersenbeins, und dem Kahnbeine eine Sehnenhaut, von der die Fleischfasern des Abzieherß der großen Zehe entspringen.

Die Sehnenhaut der Fußsohle ist bey den Muskeln beschrieben. S. 319.

Band zwischen dem Wadenbein und Fersenbein.

Ligamentum Fibulae medium perpendiculare.

Weitbrecht Tab. 22. Fig 64. e.

S. 97.

Vom Wadenbeine gleich über seiner Spitze, geht ein starkes, straffes Band zur äußern Seite des Fersenbeins herunter.

Ausser dem Zusammenhalten beyder Knochen schränkt es die Beugung des Fußgelenks ein.

Vorderes und hinteres Band zwischen dem Wadenbeine und Sprungbeine.

Ligamentum fibulae anterioris et posterioris.

Weitbrecht anterioris Tab. 22. Fig. 64. f. posterioris Fig. 65. d.

S. 98.

Das vordere Band geht (mitten zwischen dem untern Bande des Wadenbeins zum Schienbein und dem Bande zum Fersenbein) vom Rande des Wadenbeines zum Sprungbeine schräg hinab. Bisweilen besteht es aus zwey Hauptstreifen.

Ausser dem Zusammenhalten der Knochen schränkt es die Streckung des Fußgelenks ein.

Das hintere Band kommt aus einem Grübchen des Wadenbeins, geht fast quer zur hintern Seite des Sprungbeins herüber, schiebt bisweilen Fasern schräg bis zum innern Knöchel, und besteht aus locker neben einander liegenden Fasern ¹.

1) Die Fettklumpchen im Gelenke zwischen diesen beiden Knochen bildet Pitschel de Axungia articularum in Hallers Selectus dissertationum anatomicarum Vol. I. p. 437. ab.

Band des innern oder des Schienbeinknöchels.
Ligamentum Deltoides.

Weitbrecht Tab. 22. Fig. 67. g.

§. 99.

Kommt von der ganzen Spitze des innern Knöchels des Schienbeins, und setzt sich mit strahlenförmig ausgebreiteten Fasern theils an das Grübchen an der innern Fläche des Sprungbeins, theils an den Vorsprung (Sustentaculum), und die überknorpelte Kollenfläche des Fersenbeins, theils an die Wölbung des Kahnbeins.

Seine hintersten Faserstreifen sind die kürzesten, aber dicksten; seine vordersten die längsten, aber dünnsten; im Ganzen ist es dreyeckig, und für die Sehnen des hintern Schienbeinmuskels und des langen Zehenstreckers ausgefurcht. — Außer dem Zusammenhalten der Knochen werden bey der Streckung des Fußgelenks seine vordern Fasern gespannt, die hintern erschlafft; bey der Beugung verhält es sich umgekehrt.

Kapselband des Fußgelenks.

Membrana iuncturae capsularis.

Weitbrecht Tab. 22. Fig. 64. 65.

§. 100.

Ist dünne, schlaff, und, außer dem beym hintern Bande zwischen dem Wadenbeine, und Sprungbeine

erwähnten unbeständigen Streifen, durch keine Bandfasern verstärkt, falls man nicht die vier zuletzt beschriebenen dafür ansehen will.

Bänder der Fußwurzelbeine untereinander ².

Ligamenta ossium Tarsi.

§. 101.

Das Sprungbein und Fersenbein halten zusammen 1) durch eine Kapselhaut (Fig. 65. g.), die vornen und hinten dünne, locker, schlaff, und mit einem Züngelchen versehen ist, an der äußern Seite fast verschwindet (wegen des Bandes vom Knöchel zu dem Sprungbeine), an der innern Seite hingegen zum Durchgang der Sehnen der langen Zehenbeuger, ohne deutliche Fasern aber, fest und straff ist.

2) Durch fünf, bis sechs Bandstreifen, welche die an der äußern Seite zwischen beiden Knochen befindliche Ausschweifung anfüllen, in mannigfaltigen Richtungen liegen, auch theils rundlich, theils breit sind.

3) Kann hieher noch ein Theil der starken Scheide

2) Die wahre Lage dieser und der folgenden Bänder am Fuße wird man sich fast deutlicher, als nach Weitbrechts Abbildungen, vorstellen können, wenn man nur einen gut skeletirten Fuß oder Albins unvergleichliche 32. und 33. Tafel bey dieser Beschreibung zur Hand nimmt.

der Sehne des langen Beugers der großen Zehe gerechnet werden.

Zwischen beiden Knochen findet daher einige Beweglichkeit Statt.

Das Sprungbein und Kahnbein halten mittelst der dünnen, und vorzüglich oben schlaffen Kapselhaut, die durch zwey Bänder verstärkt wird, zusammen; nämlich durch 1) ein oberes breites Band, (Fig. 64. k.) welches von der obern rauhen Fläche des Halses des Kahnbeins zur obern oder Fußrückensfläche des Kahnbeins, oft bis zum mittlern Keilbein, geht; 2) Durch ein unteres Band (Fig. 67. i.), welches gleichsam eine Fortsetzung des vorigen ist, aus kürzern, und schwächern Fasern besteht, und von dem übrigen Theile der obern rauhen Fläche des Halses zu dem innern Theil der Fußrückensfläche des Kahnbeins geht.

Das Fersenbein und Kahnbein halten zusammen: 1) Oben oder auf dem Fußrücken durch ein Paar schräge Bänder, ein höheres und tieferes; (Fig. 64. l.) 2) An der innern Seite durch eine starke Haut, die bald beweglich wird, und eine Rolle (Trochlea cartilaginea Fig. 67. h.) zum Durchgang der Sehne des hintern Schienbeinmuskels bilden hilft; 3) unten oder in der Fußsohle durch ein Paar schräg liegende Streifen, einen flachen dün-

nen Fig. 68. b.) und einen rundlichen dicken (Fig. 68. c.).

Das Fersenbein und Würfelbein halten, ausser der Kapselhaut, sehr fest zusammen: 1) Oben durch zwey flacher liegende und einen tiefer liegenden Streifen, (Fig. 64. m.) die sich zum Theil kreuzen; 2) An der äusseren Seite durch ein kurzfasriges Band; 3) unten theils durch ein langes und starkes Band (Fig. 68. 69. d.) von ansehnlichem Umfange, dessen Fasern oft weiter, als das Würfelbein, sich erstrecken, theils durch ein an diesem nach innen zu liegendes, schwächeres, kürzeres, schräges Band, (Fig. 68. e.) theils durch ein unter diesen liegendes rautenförmiges Band.

Das Kahnbein und Würfelbein halten, ohne durch Gelenkflächen aneinander zu passen, durch drey Bänder zusammen: 1) Oben durch ein flaches Band; (Fig. 64. p.) 2) durch eine den Raum zwischen selbigem ausfüllende Bandmasse; 3) unten durch ein schlaffes, rundliches, ringsum frey liegendes Band. (Fig. 69. g.)

Das Kahnbein und die drey Keilbeine halten zusammen: 1) Oben durch ein Band, welches im Uebergang zu den drey Keilbeinen sich in drey Portionen spaltet; (Fig. 67. x.) 2) Das große Keilbein an der innern Seite durch eine Fortsetzung des

vorigen Bandes (Fig. 67. l.) 3). Unten gehen vor vier sehr starken vom Kahnbein kommenden Streifen zwey (Fig. 69 l. m.) weit von einander abstehende zum großen Keilbein; der dritte (Fig. 69. n.) zum kleinsten Keilbein; der vierte, lange mit der Sehne des hintern Schienbeinmuskels innigst verwebte, an das kleinere Keilbein. (Fig. 69. k.)

Das Würfelbein und das kleinere Keilbein halten zusammen: 1) Oben durch ein flaches, kurzfaseriges Band (Fig. 64. t.) 2) Unten durch vier Bandstreifen, einen geraden von hinten nach vornen laufenden, (Fig. 68. g.) und drey queer liegende. (Fig. 68. h. i. k.) Die drey ersten erstrecken sich in die Zwischenräume und füllen sie aus.

Die drey Keilbeine halten unter sich, außer der Kapselhaut zusammen: 1) Oben, oder auf dem Fußrücken, durch kurze flache Bandstreifen, die vom ersten zum zweyten, und vom zweyten zum dritten gehen; 2) unten, in der Fußsohle, hält das größte Keilbein und das kleinste Keilbein durch ein kurzfaseriges, aber starkes, den Zwischenraum ausfüllendes Band zusammen; (Fig. 70. d.) vom kleinsten Keilbein aber gehen zum kleineren Keilbeine nur in der Tiefe kurze, aber starke Bandfasern.

Bänder zwischen den Fußwurzelbeinen und den Mittelfußbeinen.

Ligamenta inter ossa Tarsi et Metatarsi.

S. 102.

Das Mittelfußbein der großen Zehe hält mit dem großen Keilbeine durch eine Kapselhaut zusammen, die durch ein Paar Bänder verstärkt wird; nämlich: 1) auf dem Fußrücken durch ein flaches Band, (Fig. 67. n.) welches am Keilbeine etwas schmaler, am Mittelfußbeine etwas breiter ist; 2) In der Fußsohle durch ein ebenfalls vom Keilbeine gegen das Mittelfußbein strahlenförmig sich ausbreitendes Band. (Fig. 68. p.)

Das Mittelfußbein der zweyten Zehe hält, ausser dem Kapselgelenke im Fußrücken, zusammen: 1) durch einen schrägen Streifen (Fig. 64. k.) mit dem großen Keilbeine; 2) durch einen geraden Streifen (Fig. 64. y.) mit dem kleinsten Keilbeine; 3) durch einen schrägen starken Streifen (Fig. 64. z.) mit dem kleineren Keilbeine; 4) In der Fußsohle durch ein zum Theil auch dem folgenden Mittelfußbeine gebdriged Band mit dem großen Keilbeine, von dem sich ein Theil tiefer zwischen beyde Knochen erstreckt. (Fig. 64. g.) 5) durch ein gerades längliches Band (Fig. 71. b.) mit dem kleinsten Keilbeine.

3) Unten gehen von
n kommenden Streifen
n einander absteigende
(Fig. 69. n.) zum
lange mit der Sehne
innigst verwebt, an
k.)
as kleinere Keilbe
den durch ein flaches
2) Unten durch
den von hinten nach
und dem vorder liegende.
erien erstrecken sich in
für aus.
alten unter sich, außer
oben, oder auf dem
und streifen, die vord
gehört zum dritten
hle, hält das größte
in durch ein kurzfo
raum ausfüllend
vom kleinsten Keilbe
eine nur in der Zeit



Das Mittelfußbein der dritten Zehe hält im Fußrücken zusammen: 1) mit dem kleinen Keilbeine durch einen geraden Streifen; (Fig. 64. a.) 2) mit dem Würfelbein durch einen schrägen längern Streifen; (Fig. 64. b.) 3) in der Fußsohle mit dem Würfelbeine durch ein ihm mit dem zweyten Mittelfußbeine gemeinschaftliches schräges Band; (Fig. 69. r.) 4) ferner tief an der innern Seite durch ein längliches Band mit dem kleinern Keilbeine; (Fig. 71. c.) 5) durch ein anderes mit dem kleinsten Keilbeine, (Fig. 71. e.) und an der inneren Seite ebenfalls durch zwey Bänder, nämlich 6) durch ein krummes mit dem Würfelbeine (Fig. 70. h.) und 7) durch ein gerades mit dem kleinsten Keilbein.

Das vierte Mittelfußbein hält im Fußrücken zusammen: 1) Durch ein flaches Band mit dem Würfelbeine; (Fig. 64. v.) in der Fußsohle an der innern Seite durch ein sehr starkes Band mit dem kleinen Keilbeine (Fig. 69. s.)

Das fünfte Mittelfußbein hält mit dem Würfelbeine durch keine besondere Bandfasern, sondern nur durch eine dicke schaffe Kapselhaut zusammen, die in der Fußsohle für die Sehne des langen Wadenbeinmuskels eine Rinne bildet. Uebrigens geht ein langes Querbänd vom kleinsten Keilbein zu ihm herüber, (Fig. u.) welches die Sehnenportionen des

hintern Schienbeinmuskels, die sich an das zweyte und dritte Mittelfußbein setzen, durchbohrt.

Bänder, die die Mittelfußbeine untereinander zusammenhalten.

Ligamenta inter ossa Metatarsi.

S. 103.

Die Fußenden der vier Mittelfußbeine, ausser dem der großen Zehe, werden im Fußrücken zusammengehalten: 1) Durch drey dünne Querbändchen, von denen das erste zwischen dem zweyten und dritten, das zweyte zwischen dem dritten und vierten, das dritte zwischen dem vierten und fünften Mittelfußbeine liegt (Fig. 64. E.) 2) Durch schmälere, schlaffe, schräge Bändchen. (Fig. 64. E.) Das erste liegt zwischen dem zweyten und dritten Mittelfußbeine, so daß es sich, schräg vorwärts gerichtet, an die Schienbeinseite des dritten Mittelfußbeins setzt. Das zweyte und dritte (Ebd. K.) hingegen liegen, in entgegengesetzter Richtung, zwischen dem dritten und vierten, und dem vierten und fünften Mittelfußbein.

In der Fußsohle werden ihre Fußenden zusammengehalten: 1) Durch drey, etwas schräg liegende Bändchen die, weil sie die Zwischenräume ausfüllen, stärker sind. Das erste (Fig. 68. x.) zwischen dem

der dritten Zehe
1) mit dem kleinen
Strahlen; (Fig. 64. e.)
in schrägen längern
der Fußsohle mit dem
dem zweyten Mittelfuß-
bein; (Fig. 69. r.)
e durch ein längliches
Bändchen; (Fig. 71. c.) 3)
in den Keilbeine, (Fig.
die ebenfalls durch zwey
eintrümmet mit dem
nd 7) durch ein grades
bein hält im Fuß-
in dieses Band mit
der Fußsohle an der
fes Band mit dem
ein hält mit dem
Bändchen, sondern
apfelhaut zusammen
de des langen Bänder-
Uebrigens geht in
einigen Keilbein zu ihm
Sehnenportionen des

zweyten und dritten Mittelfußbeine, ist das kürzeste, weil diese Knochen dicht aneinander liegen. Das zweyte, (Ebend. y.) zwischen dem dritten und vierten Mittelfußbeine, ist länger. Das dritte, (Ebend. z.) zwischen dem vierten und fünften Mittelfußbeine, ist stark, aber schlaff und oft doppelt. 2) Durch ein und anderes gemeinschaftliches Band, welches vom zweyten Mittelfußbeine schräg oder fast queer zum fünften Mittelfußbeine hinüber geht, (Fig. 69. x.) und unterwegß mit dem dritten und vierten Mittelfußbeine zusammenhängt.

Die Zehennenden oder Köpfschen der fünf Mittelfußbeine halten durch dünne Querbändchen zusammen, die weit kürzer, als die gleichen an den Händen sind. Das erste, zwischen dem Sehnenknöchelchen der großen Zehe und dem Mittelfußbein der zweyten Zehe, ist etwas breiter, als die zwischen den übrigen vier Mittelfußbeinen.

Verbindung der Zehenglieder mit den Mittelfußbeinen und unter einander.

Connexio Phalangum digitorum pedis cum metatarsi ossibus et inter se.

§. 104.

Sowohl die Verbindung der ersten Reihe der Zehenglieder mit den Mittelfußbeinen, als dieser ersten Glieder mit den mittlern Gliedern und der mitt-

tern Glieder mit den Nagelgliedern (oder an der großen Zehe des ersten Gliedes mit dem Mittelfußbeine und des ersten Gliedes mit dem Nagelgliede) geschieht theils durch eine Kapselhaut, die oben und seitwärts dünne, in der Fußsohle sehr dick, und als Rollenfläche für die Sehnen der Zehenbeuger abgeglättet ist. In der Kapselhaut, die das erste Glied der großen Zehe mit dem Mittelfußbeine zusammenhält, sind zwey ansehnliche Sehnenknöchelchen enthalten, so wie auch die Kapselhaut, die dies erste Glied der großen Zehe mit dem Nagelgliede verbindet, mitten in der Fußsohlenfläche ein Knöchelchen enthält.

Lange Bandstreifen der großen Zehe.

Productio ligamentosa longitudinalis Hallucis.

Weitbrecht Tab. 22. Fig. 72. e. e.

§. 105.

Auf der Fußsohlenfläche der großen Zehe erstrecken sich, zwischen der Sehne ihres langen Beugers und den Knochen, von den Sehnenknöchelchen des ersten Gliedes bis zum Nagelgliede, ein Paar feste schräge Streifen, die einigermassen die Stelle eines Bandes zu vertreten scheinen.

Hautbänder, Kapselhaut und Seitenbänder.

§. 106.

Verhalten sich wie die an den Fingern, nur daß sie kleiner sind und näher beysammen liegen.

Querbänder der Zehengelenke.

Annuli iuncturarum ligamentosi.

Weitbrecht Fig. 75. f.

§. 107.

Gehen queer an der Basis eines jeden Gliedes über die Sehnen, ausser am ersten Gelenke der großen Zehe, wo dieses Haltbändchen schräg liegt, und sind, nach der Größe der Glieder, an Dicke, Breite und Länge verschieden. Am ersten Gelenke der großen Zehe werfen sie sich über die Sehnen des Abzieher's und kurzen Beugers, an den übrigen über die Sehnen der Mittelfußmuskeln.

Haltbändchen und schräge oder Kreuzbänder der Sehnen der Zehenbeuger.

Ligamenta vaginalia.

§. 108.

Statt deren bemerkt man auf dem ersten Gliede der großen Zehe einen schräg von hinten und aussen

nach innen und vorne über die Sehne seines langen Beugers laufenden Streifen, (Weitbrecht 75. g.) der bisweilen doppelt und gekreuzt ist. (Albin Tab. Musc. x. Fig. 18. d. d.) Auf dem Nagelgliede der großen Zehe werfen sich Fasern in entgegengesetzter Richtung über diese Sehne.

Auf der Mitte des ersten Gliedes und mittlern Gliedes der übrigen vier Zehen sieht man, wie an den Fingern, halbe, sehr elastische, etwas schlaffere Ringe die Sehnen der Zehenbeuger einschränken. (Weitbrecht Tab. 25. Fig. 75. i. weit schöner Albin Tab. Musc. x. 18. t. u.)

Kreuzbänder zeigen sich nur auf dem ersten Gliede der zweyten und dritten Zehe; ja oft ist selbst von ihnen nur ein schräg laufender Streifen vorhanden (Weitbrecht Fig. 75. i. l.)

Lange und kurze Gefäßbändchen der Sehnen der Zehenbeuger.


§. 109.

Verhalten sich, bis auf die Größe, wie an den Fingern; indem der lange Beuger den gespaltenen Fingerbeuger, der kurze Beuger den Spalter vorstellt.

Sehnenstreifen an den Seitenrändern des Nasen-
gelglieds der Zehen.

S. 110.

Verhalten sich, wie an den Fingern; sind aber
gewöhnlich nur an der großen Zehe recht deutlich zu
zeigen.



G. E. h. Sömmerring

Vom Baue

des

menschlichen Körpers.

Dritter Theil.

Muskellehre.

Zweyte umgearbeitete Ausgabe.

Mit Kaiserl. Königl. und Churfürstl. Sächs. allergnädigster Freyheit.

Frankfurt am Main,
bey Warrentrapp und Wenner.

1800.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



S. Th. S ö m m e r r i n g

M u s k e l l e h r e

oder von den

Muskeln, Sehnen und Schleimsäcken.

Zweyte umgearbeitete Ausgabe.

Mit Kaiserl. Königl. und Churfürstl. Sächs. allergnädigster Freyheit.

Frankfurt am Main,
bey Varrentrapp und Wenner.

1 8 0 0.



Uebersicht der Muskellehre.

Beste Werke über die Muskellehre.

- §. 1. Allgemeine Eigenschaften der Muskeln.
- §. 2. Fadige Beschaffenheit der Muskelfasern.
- §. 3. Die Größe einer Muskelfaser ist unbestimmbar.
- §. 3. Die Muskelfasern sind halbdurchsichtig, trocken stärker als die Sehnenfasern aus.
- §. 5. haben wenig Schnellkraft.
- §. 6. Röthe der Muskelfasern.
- §. 7. Einwässerung der Muskelfasern.
- §. 8. Arterien und Venen der Muskeln.
- §. 9. Saugadern der Muskeln.
- §. 10. Nerven der Muskeln.
- §. 11. Eigenthümliche Fasern der Muskeln.
- §. 12. Ansehen der Muskeln auf dem Querdurchschnitte.
- §. 13. Betrachtung der Muskeln durch das Vergrößerungsglas.
- §. 14. Die feinen Fasern sehen wie die gröbern aus.



- §. 15. Unter den homogenen Theilen des Körpers machen sie die größte Masse aus.
- §. 16. Chemische Zerlegung der Muskelfasern.
- §. 17. Der Charakter der lebendigen Muskelfasern ist Reizbarkeit, Krampf, Zuckung.
- §. 18. Unterschiede der Reizbarkeit von der Schnellkraft.
- §. 19. Natürliche Reize der Muskelfasern; widernatürliche Reize.
- §. 20. Der Grad der Reizbarkeit ist in verschiedenen Muskeln verschieden. Stufenfolge der reizbaren Theile.
- §. 21. Grad der Reizbarkeit ist größer bey jüngern oder schwächern Personen.
wird durch Spannung vermehrt.
Kleine Thiere sind reizbarer als große.
- §. 22. Grad der Reizbarkeit zeigt eine angebohrne Verschiedenheit, sympathische Reizbarkeit.
Reizbarkeit als Grund der Temperamente.
Krampffische.
- §. 23. Verstärkung des Reizes verstärkt die Reizbarkeit.
- §. 24. Reizung des Nerven eines Muskels verursacht die Zusammenziehung entweder eines Theiles, oder des ganzen Muskels, oder mehrerer Muskeln, welche auch auf die Reizung des Hirns und Rückenmarks erfolgt.
Reizung eines Nerven durch verschiedene (angebrachte Metalle.

VII

Der Reiz theilt sich auch wohl von einer Faser der andern mit.

Antagonisten haben oft einerley Nervenstamm.

Bisweilen wirken nicht die Muskeln, zu denen die Nerven gehören, sondern entfernte.

§. 25. Unterbindung oder Druck eines Muskelnervens macht Lähmung, welche durch die Lösung oder Wegnahme des Bandes oder des Drucks wieder verschwindet.

§. 26. Durchschneidung oder Verderbung des Muskelnervens macht auch Lähmung; so auch eine Durchschneidung des Rückenmarks;

Das Herz kann durch Nerven nicht gereizt werden; doch verliert sich bisweilen mit der Heilung des durchschnittenen Nerven die Lähmung.

§. 27. Unterbindung der Arterien eines Muskels macht nur langsame Lähmung.

§. 28. Selbst ausgeschchnittene und zerschnittene Muskeln zeigen Reizbarkeit.

bleiben auch wohl bisweilen krampfhaft nach dem Tode gefräuselt.

§. 29. Auch in sehr verdünnter Luft zeigt sich Reizbarkeit.

§. 30. Beym Drücken, Binden, Zerschneiden der Nerven eines Muskels geht auch seine Empfindung verloren.

Das Herz hat die geringste Empfindung.

§. 31. Erscheinungen bey der Zusammenziehung eines Muskels, Verkürzung, Verdickung, Härte, Runzelung.

Reizet man
wären in Reiz
Schnellkraft.
übernatürliche
ideneu Mus-
schen Theil.
jungen oder
Reizbar-
heit.
ursache die Se-
oder des gar-
welche auch in
erfolgt.
ne langharte

- §. 32. Im Volumen ändern sich zusammengezogene Muskeln nicht merklich.
- §. 33. Die ersten Zusammenziehungen scheinen heftiger, die folgenden schwächer.
- §. 34. Die Muskeln am Kopfe, Rumpfe und an den Gliedmaßen zittern bey der Reizung; die der Därme u. s. w. ziehen sich zusammen.
- §. 35. Willkührliche Muskeln, unwillkührliche, gemischte.
- §. 36. Oft werden durch Krankheitsursachen willkührliche Muskeln unwillkührlich bewegt; aber nicht umgekehrt.
- §. 37. Willkührliche Muskeln lassen sich gradweise zusammenziehen.
- §. 38. Eine Zusammenziehung kann in einer Terze Zeit geschehen.
- §. 39. Auch wirken bisweilen Muskeln nur theilweise.
- §. 40. Zwischen willkührlichen und unwillkührlichen Muskeln ist kein Unterschied in Ansehung der Lage der Fasern;
- §. 41. aber wohl in Ansehung der Nervenmenge— Willkührliche Muskeln haben stärkere Nerven, als unwillkührliche.
- §. 42. Unwillkührliche Muskeln bewegen sich leichter, länger, und unaufhörlich.
- §. 43. Mohnsaft hemmt oder tilgt die Reizbarkeit nach dem Grade der Reizbarkeit. Reizbare Muskeln werden weniger, als andere, durch ihn geschwächt. Daher daß Herz am wenigsten.
- §. 44. Ist Reizbarkeit und Nervenkraft einerley?

- S. 45. Wie die Nerven die Reizbarkeit bewirken, ist unbekannt.
- S. 46. Im oder am Nerven bemerkt man während der Muskelwirkung keine Aenderung.
- S. 47. Auch sieht man keine Aenderung der Farbe.
- S. 48. Das Hirn ist zur Spannkraft nicht nothwendig.
- S. 49. Reizbarkeit liegt mehr in der Gallert als Erde.
- S. 50. Läßt die Spannkraft nach, so erschlafft der Muskel.
- S. 51. Werden die Muskeln durch den Gebrauch fester?
- S. 52. Giebt's an beiden Enden unbeweglich feste Muskelfasern?
- S. 53. Muskelfasern werden nicht wieder erzeugt.
- S. 54. Wahrscheinlich haben auch andere Theile Reizbarkeit.
- S. 55. Haben auch die Pflanzen Reizbarkeit?
- S. 56. Zu große Kälte schadet der Reizbarkeit, wie zu große Wärme.
- S. 57. Mäßiges Fett erleichtert die Muskelbewegung.
- S. 58. Todte Muskelfasern reißen leichter, als lebendige.
- S. 59. Schwindende Muskelfasern werden schwächer.
- S. 60. Die Kraft einer einzelnen Faser läßt sich nicht leicht bestimmen;
- S. 61. Abgänge von dieser Kraft wegen der Form des Körpers.



...ngesagene Muskeln
 ...nen heftiger, die
 ...nd an den Blut-
 ...er Dörme u. s. w.
 ...e, gemischte.
 ...en willkürliche
 ...nicht umgeschert.
 ...adweise zusam-
 ...er Länge Zeit ge-
 ...e theilweise.
 ...herischen Muskeln
 ...der Fasern;
 ...-Willkür-
 ...als unwill-
 ...hper, länger,
 ...arkeit nach dem
 ...keln merke
 ...ht. Daher löst
 ...?



§. 62. Auch die Verbindung der Muskelfasern untereinander ist verschieden, bald blättrig, nebartig, gefiedert, strahlenförmig u. s. f.

An den Gelenken sind statt der Muskelfasern Sehnen.

§. 63. Gegenwirkende Muskeln.

Die Einrichtung, welche die Stelle eines gegenwirkenden Muskels vertritt, ist sehr verschieden.

§. 64. Ein größerer Muskel wirkt stärker, als ein kleinerer.

§. 65. Die Muskeln sind die Werkzeuge aller lebendigen Bewegung.

Abtheilung der Muskelfasern.

§. 66. Ist sehr willkürlich.

§. 67. Regeln, die man befolgen sollte.

Benennung der Muskeln.

§. 68. Nach der Wirkung, nach beiden Befestigungsörtern, oder dem unbeweglichen allein, u. s. f.

§. 69. Anfang, Ende, und Bauch eines Muskels.

Symmetrie der Muskeln.

§. 70. Die meisten sind doppelt.

§. 71. Bloß männliche und bloß weibliche Muskeln.

XI

Von den Sehnen.

- §. 72. Die meisten Muskelfasern haften an Sehnen.
 §. 73. Allgemeine Eigenschaften der Sehnen.
 §. 74. Sehnenfasern und Bänderfasern haben einerley Beschaffenheit, folglich sind die Sehnen Bänder der Muskeln.
 §. 75. Beknicktes Ansehen der Sehnen.
 §. 76. Sehnen sind nach den Knochen die härtesten Theile;
 §. 77. haben nach den Knorpeln die meiste Schnellkraft.
 §. 78. schwellen durch Einwässerung an, und werden faserig.
 §. 79. Farbe der Sehnen.
 §. 80. Blutgefäße der Sehnen.
 §. 81. Saugadern der Sehnen.
 §. 82. Nerven der Sehnen.

Zusammenhang der Sehnen mit den Muskeln.

- §. 83. Muskeln sehen wie auf die Sehnen geleimt aus;
 §. 84. oder wie zwischen sie gegossen.
 §. 85. Muskelfasern trennen sich durchs Kochen von Sehnen.
 §. 86. Sehnen der Kinder.
 §. 87. Sehnenfasern entstehen nicht aus Muskelfasern.
 §. 88. Sehnen werden nicht wieder erzeugt.
 §. 89. Chemische Zerlegung der Sehnen.

Zusammenhang der Sehnen mit andern Theilen außer
mit Muskelfasern.

§. 90. Sehen sich an Knorpel, Knochenhaut oder Häute.

Form der Sehnen.

§. 91. Sehnen sind dicker oder dünner.

§. 92. Gespaltene, eingeschränkte Sehnen u. s. f.

§. 93. Sehnen hängen durch Zellstoff, mit den benachbarten
Theilen zusammen.

§. 94. Die Knochenstelle, über die sich eine Sehne schlägt,
ist überknorpelt.

§. 95. Einige Sehnen sind mit Schleimsäcken umgeben.

Allgemeine Bemerkungen über die Schleimsäcke.

§. 96. Stellen, wo sich Schleimsäcke finden.

§. 97. Häute, aus denen sie bestehen.

§. 98. Saft dieser Schleimsäcke.

§. 99. Vergleichung der Schleimsäcke mit den Gelenkkapseln.

§. 100. Weniger Uebereinkunft zeigen sie mit der Haut an-
derer geschlossenen Säcke.

Beschreibung der einzelnen Muskeln.

S c h e d e l m u s k e l

§. 101. Stirn- und Hinterhauptsmuskel.

Muskeln des Hörwerkzeuges.

§. 102. Aufwärtszieher des Ohres.

§. 103. Vorwärtszieher des Ohres.

§. 104. Rückwärtszieher des Ohres.

§. 105. Größerer Muskel der Ohrleiste.

§. 106. Kleinerer Muskel der Ohrleiste.

§. 107. Muskel der Ohrecke.

§. 108. Muskel der Ohrgegenecke.

§. 109. Quermuskel des Ohres.

§. 110. Größerer Erschlaffer des Paukenfells.

§. 111. Kleinerer Erschlaffer des Paukenfells.

§. 112. Paukenfellspanner.

§. 113. Muskel des Steigbügels.

Muskeln des Sehwerkzeuges.

§. 114. Augenliedschließer.

§. 115. Augenbraunrunzler.

§. 116. Aufzieher des oberen Augenlides.

§. 117. Gerade Muskeln des Augapfels im Allgemeinen.

§. 118. Aufwärtszieher des Augapfels.

andern Theilen auf

haut oder Platte.

nen.

n u. f.

mit den benachbarten

eine Sehne schließt

wischen umgeben.

die Schließmuskeln

den Gelenkknorpeln

e mit der Haut

- §. 119. Außwärtzieher des Augapfels.
 §. 120. Niedermärtzieher des Augapfels.
 §. 121. Inwärtzieher des Augapfels.
 §. 122. Oberer schiefer Augenmuskel.
 §. 123. Unterer schiefer Augenmuskel.

Muskeln des Antlitzes.

- §. 124. Zusammenzieher des Nasenlochs.
 §. 125. Oberlipp- und Nasenflügelaufzieher.
 §. 126. Aufzieher der Oberlippe.
 §. 127. Kleiner Wangenmuskel.
 §. 128. Großer Wangenmuskel.
 §. 129. Aufzieher des Mundwinkels.
 §. 130. Niedrigerzieher des Mundwinkels.
 §. 131. Niedrigerzieher der Unterlippe.
 §. 132. Backenmuskel.
 §. 133. Niedrigerzieher der Nasenspitze.
 §. 134. Mundschließer.
 §. 135. Niedrigerzieher des Nasenflügels.
 §. 136. Ungewöhnlicher Muskel des Oberkiefers.
 §. 137. Aufzieher des Kinns.

Muskeln des Unterkiefers.

- §. 138. Zweybäuchiger Kiefermuskel.
 §. 139. Kiefermuskel.

- S. 140. Schläfemuskel.
- S. 141. Innerer Flügelmuskel.
- S. 142. Aeußerer Flügelmuskel.

Muskeln des Halses.

- S. 143. Breiter Halsmuskel.
- S. 144. Kopfnicker.

Muskeln der Zunge und des Schildknorpels.

- S. 145. Rückwärtszieher der Zungenbeine.
- S. 146. Niederzieher der Zungenbeine.
- S. 147. Niederzieher des Kehlkopfs.
- S. 148. Schildzungenbeinmuskel.
Schilddrüsenmuskel.
- S. 149. Griffel- und Zungenbeinmuskel.
- S. 150. Griffelzungenmuskel.
- S. 151. Kieferzungenbeinmuskel.
- S. 152. Kinnzungenbeinmuskel.
- S. 153. Zungenbeinzungenmuskel.
- S. 154. Kinnzungenmuskel.
- S. 155. Zungenmuskel.

Muskeln des Gaumens und Schlundkopfes.

- S. 156. Griffelschlundkopfmuskel.
- S. 157. Schlundkopfschnürrer.

ntliche
bb.
zieher.
k.
ell.
berliefer.
erliefer.



- §. 158. Trompetenschlundkopfmuskel.
 §. 159. Gaumenschlundkopfmuskel.
 §. 160. Verenger der Rachenmündung.
 §. 161. Heber des Gaumens.
 §. 162. Umgeschlagener Gaumenmuskel.
 §. 163. Muskel des Zäpfchens.

Muskeln des Kehlkopfs.

- §. 164. Ringschildknorpelmuskel.
 §. 165. Hinterer Ringschneppknorpelmuskel.
 §. 166. Innerer Ringschneppknorpelmuskel.
 §. 167. Schräger Muskel der Schneppknorpel.
 §. 168. Quermuskel der Schneppknorpel.
 §. 169. Größerer und kleinerer Schildschneppknorpelmuskel.
 §. 170. Größerer und kleinerer Schildkehldeckelmuskel.

Muskeln der Bauchdecken des Unterleibes.

- §. 171. Äußerer schräger Bauchmuskel.
 §. 172. Innerer schräger Bauchmuskel.
 §. 173. Pyramidenbauchmuskel.
 §. 174. Gerader Bauchmuskel.
 §. 175. Querer Bauchmuskel.

Scheidemuskel.

- §. 176. Zwerchmuskel.

Mus.

XVII

Muskeln des Thorax.

- §. 177. Innerer Brustmuskel.
- §. 178. Viereckiger Lendenmuskel.
- §. 179. Hinterer oberer Sägenmuskel.
- §. 180. Hinterer unterer Sägenmuskel.
- §. 181. Ribbenhalter.
- §. 182. Kürzerer Heber der Ribben.
- §. 183. Längerer Heber der Ribben.
- §. 184. Außere Zwischenribbenmuskeln.
- §. 185. Innere Zwischenribbenmuskeln.

Muskeln des Kopfs und Rückgraths.

- §. 186. Bauschähnlicher Kopfmuskel.
- §. 187. Bauschähnlicher Halsmuskel.
- §. 188. Zweybäuchiger Nackenmuskel.
- §. 189. Durchflochtener Muskel.
- §. 190. Nackenwarzenmuskel.
- §. 191. Quermuskel des Nackens.
- §. 192. Absteigender Nackenmuskel.
- §. 193. Rückgratsstrecker.
- §. 194. Dornmuskel des Nackens. *Nackel*
- §. 195. Halbdornmuskel des Rückens. *Nackel*
- §. 196. Dornmuskel des Rückens. *Nackel*
- §. 197. Vieltheiliger Rückgratsmuskel.

S. Muskellehre.

§

- §. 198. Zwischendornmuskeln des Nackens.
 §. 199. Zwischendornmuskeln des Rückens.
 §. 200. Zwischendornmuskeln der Lenden.
 §. 201. Hinterer größerer gerader Kopfmuskel.
 §. 202. Hinterer kleinerer gerader Kopfmuskel.
 §. 203. Unterer schräger Kopfmuskel.
 §. 204. Oberer schräger Kopfmuskel.
 §. 205. Gerader Seitenkopfmuskel.
 §. 206. Vorderer größerer gerader Kopfmuskel.
 §. 207. Vorderer kleinerer gerader Kopfmuskel.
 §. 208. Langer Halsmuskel.
 §. 209. Vordere Zwischenqueermuskeln des Halses.
 §. 210. Hintere Zwischenqueermuskeln des Halses.
 §. 211. Zwischenqueermuskeln des Rückens.
 §. 212. Zwischenqueermuskeln der Lenden.

Eigene Muskeln der männlichen Geschlechtstheile.

- §. 213. Muskel des Saamenstrangs.
 §. 214. Steifer der Ruthe.
 §. 215. Harnröhrenmuskel.

Muskeln des Darms und Afters.

- §. 216. Hinterer Dammmuskel.
 §. 217. Vorderer Dammmuskel.
 §. 218. Drucker der Vorsteherdrüse.

- §. 219. Muskel der Harnblase.
 §. 220. Aeußerer Schließer des Afters.
 §. 221. Innerer Schließer des Afters.
 §. 222. Aufheber des Afters.
 §. 223. Steißbeinmuskel.
 §. 224. Krümmer der Steißbeine.

Eigene Muskeln der weiblichen Geschlechtstheile.

- §. 225. Steifer des Rißers.
 §. 226. Scheidenbeenger.
 §. 227. Niederzieher der weiblichen Harnröhre.

Muskeln der oberen Gliedmaße.

Muskeln der Schulter.

- §. 228. Großer Brustmuskel.
 §. 229. Kleiner Brustmuskel.
 §. 230. Schlüsselbeinmuskel.
 §. 231. Großer Sägenmuskel.
 §. 232. Kappenmuskel.
 §. 233. Breiter Rückenmuskel.
 §. 234. Größerer Rautenmuskel.
 §. 235. Kleinerer Rautenmuskel.
 §. 236. Heber des Schulterblattwinkels.
 §. 237. Dreyeckiger Armmuskel.

- §. 238. Obergräthmuskel.
 §. 239. Untergräthmuskel.
 §. 240. Kleinerer runder Armmuskel.
 §. 241. Größerer runder Armmuskel.
 §. 242. Unterschulterblattmuskel.

Muskeln des Oberarms.

- §. 243. Zweybäuchiger Armmuskel.
 §. 244. Hakenarmmuskel.
 §. 245. Innerer Armmuskel.
 §. 246. Strecker des Ellenbogengelenkes.
 §. 247. Ellenbogenknorrenmuskel.

Muskeln des Vorderarms.

- §. 248. Langer Rückwärtswender.
 §. 249. Längerer und kürzerer Speichenmuskel.
 §. 250. Äußere Vorderarmbinde.
 §. 251. Äußerer Ellenbogenmuskel.
 §. 252. Gemeinschaftlicher Fingerstrecker.
 §. 253. Eigener Strecker des kleinen Fingers.
 §. 254. Langer Abzieher des Daumens.
 §. 255. Kleinerer Strecker des Daumens.
 §. 256. Größerer Strecker des Daumens.
 §. 257. Strecker des Zeigefingers.

§. 258. Seltener kurzer Streckter des Zeige- oder Mittelfingers.

§. 259. Innere Vorderarmbinde.

§. 260. Innerer Ellenbogenmuskel.

§. 261. Handschuenspanner.

Ungewöhnlicher Beuger des Handgelenkes.

§. 262. Innerer Speichenmuskel.

§. 263. Rundlicher Vorwärtswender.

§. 264. Gespaltener Fingerbeuger.

§. 265. Spalter.

§. 266. Spulmuskeln der Hand.

§. 267. Langer Beuger des Daumens.

§. 268. Kurzer Rückwärtswender.

Muskeln der Hand.

§. 270. Außerer und innerer kurzer Abzieher des Daumens.

§. 271. Gegensteller des Daumens.

§. 272. Kurzer Daumenbeuger.

§. 273. Anzieher des Daumens.

§. 274. Hohlhandmuskel.

§. 275. Abzieher des kleinen Fingers.

§. 276. Kurzer Beuger des kleinen Fingers.

§. 277. Anzieher des Mittelhandknochens des kleinen Fingers.

- §. 278. Innere Mittelhandmuskeln.
 §. 279. Aeußere Mittelhandmuskeln.

Muskeln der unteren Gliedmaße.

Muskeln des Schenkels.

- §. 280. Schenkelbinde.
 §. 281. Spanner der Schenkelbinde.
 §. 282. Großer Gefäßmuskel.
 §. 283. Mittlerer Gefäßmuskel.
 §. 284. Kleiner Gefäßmuskel.
 §. 285. Birnförmiger Muskel.
 §. 286. Zwillingsmuskel.
 §. 287. Innerer Hüftbeinlochmuskel.
 §. 288. Viereckiger Schenkelmuskel.
 §. 289. Zweybäuchiger Schenkelmuskel.
 §. 290. Halbsehniger Schenkelmuskel.
 §. 291. Halbmembranöser Schenkelmuskel.
 §. 292. Kleiner runder Lendenmuskel.
 §. 293. Großer runder Lendenmuskel.
 §. 294. Darmbeinmuskel.
 §. 295. Längster Schenkelmuskel.
 §. 296. Schlanker Schenkelmuskel.
 §. 297. Gerader Schenkelmuskel.
 §. 298. Aeußerer und innerer dicker Schenkelmuskel.

XXIII

- S. 299. Schenkelbeinmuskel.
- S. 300. Seltener Kniegelenkmuskel.
- S. 301. Schaambeinmuskel.
- S. 302. Dreybüchiger Schenkelmuskel.
- S. 303. Aeußerer Hüftbeinlochmuskel.

Muskeln des Unterschenkels.

- S. 304. Wadenmuskel.
- S. 305. Langsehniges Muskelchen.
- S. 306. Kniekehlmuskel.
- S. 307. Langer Zehenbeuger.
- S. 308. Spulmuskeln der Fußsohle.
- S. 309. Langer Beuger der großen Zehe.
- S. 310. Hinterer Schienbeinmuskel.
- S. 311. Unterschenkelbinde.
- S. 312. Langer Wadenbeinmuskel.
- S. 313. Kurzer Wadenbeinmuskel.
- S. 314. Vorderer Schienbeinmuskel.
- S. 315. Langer Strecker der Zehen.
- S. 316. Dritter Wadenbeinmuskel.

Muskeln des Fußes.

- S. 317. Strecker der großen Zehe.
- S. 318. Kurzer Zehenstrecker.
- S. 319. Sehnenhaut der Fußsohle.

- §. 320. Kurzer Zehenbeuger.
 §. 321. Abzieher der großen Zehe.
 §. 322. Kurzer Beuger der großen Zehe.
 §. 323. Abzieher der großen Zehe.
 §. 324. Quermuskel der Sohle.
 §. 325. Abzieher der kleinen Zehe.
 §. 326. Kurzer Beuger der kleinen Zehe.
 §. 327. Innere Mittelfußmuskeln.
 §. 328. Äußere oder doppelbäuchige Mittelfußmuskeln.

Schilderung der Wirkung der Muskeln bey
 Fortbewegung des Körpers.

- §. 329. Daß Stehen.
 §. 330. Daß Gehen.
 §. 331. Daß Laufen.
 §. 332. Daß Springen.
-

B e s t e W e r k e

ü b e r d i e

M u s k e l l e h r e .

B. S. Albinus Historia musculorum Hominis. Lugd. Bat.
1734. in 4. Die trefflichste und vollständigste Beschreibung unter allen, die auch die Synonymen und Beschreibungen der meisten vor ihm erschienenen Schriftsteller anführt. Die von Hartenkeil besorgte Ausgabe, Frankfurt und Leipzig 1784. in Quart hat das Bequeme, daß sie Albinus eigene, dreyzehn Jahre nachher erst erschienene Abbildungen anführt.

Desselben Tabulae Sceleti et musculorum corporis humani.

Lugd. Batav. 1747. in groß Folio. Ein Werk von unfäglichem Fleiße, daß an Genauigkeit, äußerster Richtigkeit und Schönheit der Darstellungen, über einen Vergleich mit irgend einem andern in diesem Fache erhoben ist. Auch ist ein Vorzug des Originals, daß es von selbigem keine schlechten Abdrücke giebt. Wo indessen einige Neuere von einzelnen Muskeln dennoch bessere Darstellungen geliefert haben, ist bey Beschreibung derselben angegeben. Barth, Fischer, Innes, Lavater, Loder, Mayer, Tarin, Wunsch, u. m. a.

besorgten verkleinerte Copien von diesen Tafeln.

*J. G. Walker. Myologischer
Grundriß. Berlin 1777*

Ed. Sandifort Descriptio Musculorum hominis. Lugd.

Batav. 1781. in 4. sehr brauchbar.

*Charles Dumas
Système méthodique
de nomenclature et
classification des
muscles du corps hum.
avec des tableaux
descriptifs. Paris 1785. 4to*

A. E. Gautier d'Agoti Essay d'Anatomie en (20) tableaux imprimés, qui représentent au naturel tous les muscles etc. Paris 1746. im größten Folio. Diese Tafeln zeigen wenigstens an einigen gut vorgestellten Muskeln, was man liefern könnte, wenn man mit dieser Kunst U-

bin's Treue und Genauigkeit verbände. Farbe und Manier ist gut, allein die Zeichnung ist flüchtig.

Wyer Guiliel. Muys Musculorum artificiosa fabrica.

Lugd. Bat. 1751. ein fürtreffliches, sehr genaues Werk, mit sorgfältigen und netten Abbildungen. Macht alle seine Vorgänger, was die feinere Untersuchung der Muskelfasern angeht, entbehrlich, weil ^{es} ihre Beobachtungen aufs fleißigste mit ihren eigenen Worten zusammen^{enthält. Der Verfasser} getragen hat. Er arbeitete über achtzehn Jahre daran, welches auch der innere Werth hinlänglich beweist.

Georg Proschaska. De carne musculari. Wien 1778.

Ein treffliches Werkchen.

Alb. von Haller Operamina. Lausanne 1762 bis 1768. *Dorpat. 1803.*

drey Bände in groß Quart, enthalten das Vorzüglichste über die Reizbarkeit. Die übrigen Schriften hierüber sind zwischen den Sphen 17 und 55 gelegentlich angeführt.

Aloysii Galvani de viribus electricitatis in motu musculari Bononiae 1791 in 4. Ist das über diesen Gegenstand Epoche machende Werk.

*H. F. Henflamm von der
Muskeln des Rindes
Dorpat. 1803.
von Henflamm
ausg. unter Aufsicht
Erlangen. 1822*

C. H. Pfaff über thierische Electricität und Reizbarkeit,
Leipzig 1795 in Octav.

Fried. Alex. von Humboldt. Versuche über die ge-
reizte Muskel- und Nervenfaser. Berlin 1797. in Octav.

L. W. Ritter. Beyträge zur nähern Kenntnifs des Gal-
vanismus, erster und zweyter Theil. Jena 1800.
Durchaus sowohl wegen Originalität, als Gründlichkeit,
Deutlichkeit und trefflicher Darstellung musterhaft.

*Anthony Carlisle on muscular Motion. Croonian Lecture
1804.
See Willouby Phil Mag. Vol 23. 1806.*

Bänder

Allgemeine Eigenschaften der Muskeln.

§. I.

Muskelfibern oder Fleischfasern bestehen aus Fäden oder Fäserchen, welche länglich (S. 2.), feucht, weich, wenig elastisch, halbdurchsichtig (S. 4.), gelblichbräunlich (S. 6.), durch Zellstoff zusammengeheftet (S. 7.), mit Arterien, Venen (S. 8.), Lymphadern (S. 9.) und meist auch Nerven (S. 10.) versehen, im ruhigen Zustande schlaff sind, und im Leben die Eigenschaft haben, daß sie entweder unmittelbar durch eigene Reize, oder mittelst der Nerven und Hirnmasse gerührt, eine eigene Bewegung äußern (S. 17.). Diese Bewegung äußert sich unter gewissen Umständen bey Menschen noch länger als eine Stunde nach dem Tode, bey kaltblütigen Thieren noch länger als einen Tag nach dem Tode.

Die meisten dieser Eigenschaften haben wenigstens alle in die Augen fallende Muskelfasern; daher es nicht unwahrscheinlich ist, daß auch die Muskelfasern im menschlichen Körper, die sich zwar vermuthen lassen, aber ihrer Feinheit wegen dem Auge entgehen, S. Muskellehre. H

... und ...
... über ...
... in ...
... des ...
... 1797 ...
...
...
...
...

eben so beschaffen sind ¹⁾. Noch mehr erhellet dieß durch einen Blick auf kleinere Thiere, wo wir in manchem, bis auf die Größe völlig gleichscheinenden Theile, bloß der Kleinheit wegen keine Muskelfasern mehr entdecken, die wir doch in eben dem Theile bey etwas größern Thieren deutlich wahrnehmen. Selbst bey menschlichen Embryonen kann man nicht überall Muskelfasern zeigen, wo sie doch unläugbar vorhanden sind, und mit dem zunehmenden Alter sehr sichtbar werden. Auch bey schwachen, blassen Menschen kann man einige zarte Muskel kaum mit Mühe, oder auch wohl gar nicht zeigen, deren Daseyn darum doch nicht geläugnet werden kann.

S. 2.

Die fadige Beschaffenheit der Muskeln zeigt sich am deutlichsten, wenn man sie kocht, bratet, oder in starken Weingeist legt. Hiedurch werden sie nämlich härter, undurchsichtiger, freylich auch im ganzen Umfange kleiner, und an Farbe geändert, und lassen ihre Bündel Fasern und Fäden leichter durch bloßes Hineinanderziehen ohne Schneiden trennen.

Diese Fäden scheinen alsdann länglich, so viel

1) Aliquando fibrae musculares potius ex motu aliquo cognoscuntur, quam oculis. Haller Elem. Phys. T. 4. p. 409. desgleichen P. 516. Vis insita residet in musculis inconspicuis sphincterum minimorum, qui vasa lactea et vasa resorbentia cutanea ambiunt.

— 3 —

man durchs Vergrößerungsglas erkennt, flach oder meist cylindrisch, und in den kleinern Bündeln meist parallel nebeneinander liegend.

§. 3.

Die Größe eines einzelnen Muskelfadens läßt sich daher auch nicht nach einem Maasstabe bestimmen.

§. 4.

Die Muskelfasern sind, ihrer vielen Feuchtigkeit wegen, halbdurchsichtig, weich, beugsam und leicht von den harten undurchsichtigen Fasern der Sehnen zu unterscheiden. Geht diese Feuchtigkeit aber, durchs Austrocknen, verloren, so schrumpfen die Muskeln stärker als die Sehnen ein, und verlieren auch mehr von ihrem Gewichte.

§. 5.

Die Schnelkraft der Muskelfasern ist wegen ihrer Weichheit, nach dem Tode, gering.

§. 6.

Die Nöthe der Muskelfasern variirt 1) nach dem Alter, 2) nach der Menge, 3) nach der Uebung, 4) nach dem Geschlechte, 5) nach der Gesundheit, und 6) nach der Flüssigkeit, in der sie sich bey ihrer Entblößung nach dem Tode befinden.

1) Je jünger der Mensch, desto blässer sind seine Muskelfasern. In Embryonen sind sie kaum gelblich.

*2) wenig 4) spärlich. Man ver-
gibt sich Hallpflanz mit
ausflüssig*

mehr erhelet dies
wo wir in man-
gleichmässigen
die Muskelfasern
dem Theil bey
ernehmen. Selbst
man nicht überall
augbar vorhanden
Alter sehr sichts-
lassen Menschen
um mit Mische-
den Dajon darum
Muskeln steigt sich
t, bratt, oder
werden sie näm-
auch im ganzen
et, und lassen
er durch blasse
rennen.
länglich, so viel
is ex mea digne
11er The. Phys.
is inau mebe in
ministrum, qui
tea miline.



Im hohen Alter sind sie gewöhnlich blässer # als im besten Alter.

2) Je weniger Fäden eine Faser oder ein Bündel enthält, desto gelber oder blässer ist es an Farbe; je mehrere, desto röther oder dunkeler. Man vergleiche z. B. einen zarten Gesichtsmuskel mit einem Brustmuskel, oder die feinen Fleischfasern der Därme mit den dicken Fasern der Harnblase. Daher entdeckt nicht mehr das Auge, sondern nur der Verstand die feinsten Muskelfasern, von denen die gröbern noch sichtbar seyn würden, wenn sie eine dunkle Farbe hätten.

3) Fleißig gebrauchte Muskeln erscheinen bey übrigens gleicher Größe gewöhnlich dunkler, als solche, die wenig oder gar nicht gebraucht wurden.

4) Vielleicht ist die seltener Anstrengung der Muskeln mit eine Hauptursache, warum man oft bey dem weiblichen Geschlechte in Städten die Muskeln blässer, als bey dem männlichen findet.

~~2) So auch bey Thieren. Man vergleiche nur Kafffleisch mit Rindfleisch.~~

3) Vielleicht ist dies die Hauptursache, daß an unserm zahmen Hühnergeschlechte die Brustmuskeln soviel weicher, als alle übrigen sind, welches hingegen bey Tauben, Rebhühnern, Schnepfen, die ihre Brust- oder Flügelmuskel häufig bewegen, nicht der Fall ist.

Vielleicht ist dies auch die Ursache des dunklern Fleisches des Wildpreß?

note
2) Portal ~~versteht~~ in allen Lücken
in einer gelbigen Färbung
enthalten. *goffe*

*die bläuliche Färbung von Feingewebe
in den Muskeln ist eine Folge
von einer unvollständigen
Oxydation (Sauerstoff) und nicht
Portal Anat. Vol. 2. p. 407. in dem
man findet die Muskeln sind
Thromben der Oxydation
nach einer unvollständigen
Oxydation von Sauerstoff.
Vergl. Dayr.*

5) Je länger ein Mensch krank lag, desto blasser pflegen seine Muskeln zu erscheinen.

Das Fleisch mit Sauerstoff überladener Thiere ist zäher, härter, weniger saftig, rother oder dunkler, als das Fleisch von Thieren, denen es am Sauerstoff fehlte.

6) Muskeln, die in gemeiner frischer Luft entblüht werden, erhalten nach einigen Stunden eine lebhaftere Röthe, die in sogenannter dephlogistisirter Luft noch zunimmt; in entzündbarer und phlogistischer Luft hingegen abnimmt.

Ueberhaupt aber scheint die Röthe der Muskelfasern mit der Beschaffenheit des Blutes in Verhältniß zu stehen. Je dunkler, dicker das Blut, desto röther, kirschbrauner die Muskeln; je heller, wässriger das Blut, desto blasser, gelblicher die Muskeln. Daher bey Wassersüchtigen die Muskeln wie nach dem Einwässern aussehen.

In schwachen, blassen, besonders weiblichen Körpern, sind oft die Fasern dünner Muskeln so blaß, daß man sie kaum mit aller Mühe entdecken kann.

Durchs Auswaschen, Einwässern, Kochen im Wasser, oder Aufbewahren im Weingeiste geht diese Röthe allmählig verlohren.

4) Kälbern zapft man Blut ab, um ihr Fleisch weiß zu machen.

*Körper
je länger sie an Wasser
stehen, desto mehr sie beschä-
den. vgl. vgl. vgl.
Litt. vgl. vgl.
Portul Vol. 2
p 406.*

infusilligum?

*mit gelblichgelber
gelblich*

*Man findet die Muskeln in
Brennspiritus im Wasser,
weil sie in Spiritus, in Wasser
gelblich eingewässert.*

*Portul Vol. 2
p 407.*

blasse & als im
oder ein Bündel
es an Farbe; je
Man vergleiche
it einem Bruch
der Därme mit
er entdeckt nicht
stand die feine-
bern noch sicht-
le Farbe hätten.
in erscheinen bey
ich dunkler, als
braucht werden?
infusion der
rum man oft
die Muskeln
te nur kochend
; das an einem
stein wird ent-
gen der Zer-
Bruch- oder Flüss-
ik.
des dichten Fle-



Werden sie mit Kochsalze, oder noch besser in Salpeter gebeizt oder eingepöckelt, so wird ihre Röthe dunkler ⁵.

Je röther, dunkler die Muskelfaser, desto weniger geht durchs Austrocknen von ihr verloren.

Doch scheint das Herz nie so rothe, so weiche, so locker liegende, so durchsichtige Fasern, als ein anderer Muskel zu haben; seine Fasern sind bräunlicher, härter, dichter, undurchsichtiger.

Die Muskelfasern der Gliedmassen, des Kopfes und des Rumpfs kommen mit den Muskelfasern des Darmcanals, der Harnblase so ziemlich überein: allein was man Muskelfasern der Arterien, was man Mus-

5) Das Fleisch der Mägen von körnerfressenden Vögeln hat wegen seiner eigenen fächerigen Verwebung mit Sehnenfasern ein blauliches Ansehen, ist auch härter, dichter und von anderm Geschmacke, als das übrige Fleisch. Gut abgebildet von M u y s Tab. 2. fig. 10.

Auch ist es bekannt, daß das Fleisch des Herzens und der Zunge eines Thieres nicht nur ein anderes Ansehen hat, sondern auch gekocht oder gebraten merklich anders, als sein übriges Fleisch schmeckt. Worin liegt der Unterschied der Farbe des Fleisches des Lachses vom Fleische des Karpfen, oder Hechtes?

Worin liegt im Lachse der Unterschied des dunkelen Fleisches von dem hellen?

Daß Röthe kein wesentlicher Charakter der Muskelfaser ist, lehrt unter andern das blasse, oder auch weiße, ganz durchsichtige und dennoch rege Fleisch der kleinen Fische.

kelfasern des Uterus nennt, ist auffallend anders beschaffen. Offenbar sind die Fasern der Arterien, und des Uterus nicht nur blässer, sondern von weit härterer, gleichsam spröderer Textur als alle übrigen Muskelfasern.

S. 7.

Die Fäden der Muskelfasern bestehen, wie die Einwässerung zeigt, außer einer eigenen Substanz, größtentheils aus Zellstoffe, welcher sie vielleicht, das Herz ausgenommen, durch kurze Fasern zuerst aneinander, dann zu dickern Fasern, und ferner zu größern wirklichen Bündeln oder platten Streifen zusammenheftet.

Solche Streifen, Striemen oder Bündel sind entweder nach einerley oder nach verschiedener Richtung, entweder, wie bey dem Herzen, unmittelbar miteinander verbunden, oder durch etwas länger fadigen Zellstoff, theils verschiedenen Häuten eingewebt, theils zu dicken Säcken verflochten, theils mit einer Scheide von einer sehnigen Haut zu einer Masse von bestimmter Form und Größe, die man eigentlich einen Muskel nennt, umzogen, und durch Zellstoff, Fett oder andere zwischenliegende Theile von ähnlichen Fleischmassen oder Muskeln abgesondert; theils sind die Bündel bey größern Muskeln in einer solchen Scheide durch dicken Zellstoff, der mit der Scheide selbst

zusammenhängt, auch wohl Fett aufnimmt, gleichsam in kleinere Portionen, oder kleinere Muskeln geschieden. Die eigentlichen Muskeln sind entweder unmittelbar, oder meistens mittelst sehniger Fasern, auf welchen sie wie aufgeleimt liegen, oder in welche sie fast unmerklich übergehen, an Knorpel- oder Knochenhaut, oder an Bänder, oder an Membranen, oder an Gelenkkapseln festgeheftet.

An manchen Stellen im Körper verbindet grober an anderen feiner, hier straffer, dort lockerer Zellstoff, theils die Muskeln verschiedentlich miteinander, theils mit den benachbarten Theilen, z. B. mit der äußeren Haut und den Knochen.

§. 8.

Die Muskelfasern besitzen inbgesammt größere oder mehrere Blutgefäße, als irgend ein Knochen oder eine Sehne, aber kleinere oder weniger, als die meisten Eingeweide, z. B. als eine Lunge oder Niere. Sie scheinen deshalb nach gut gerathener künstlichen Anfüllung mit einer gefärbten Masse, unter dem Vergrößerungsglase fast größtentheils aus Blutgefäßen zusammengesetzt.

Die Größe oder Menge der Arterien^x der Muskeln scheint überall ihrer Größe angemessen. Ein größerer Muskel enthält entweder größere oder mehrere Arterien, als ein kleinerer.

*) Proctopka. de carne musculari. Viennae. 1778.
Tab. VI. fig. 5.

78 / 23

Gewöhnlich begeben sich in einen Muskel der über einen Scrupel wiegt, mehrere Arterienstämmchen unter sehr verschiedenen Winkeln, theilen sich, ehe sie zwischen sie selbst hineintreten, in Nestchen, und folgen bald drauf mit ihren häufig untereinander zusammen mündenden Zweigen und Reifern, der Richtung der Muskelfasern.

Die Venen der Muskeln haben eine ähnliche Beschaffenheit, wie man vorzüglich bey Gehenkten an den Muskelfasern über dem Strange sieht. Auch in den Muskeln, so wie in den meisten übrigen Theilen des Körpers, übertreffen die Venen die gleichnamigen mit ihnen zusammengehefteten Arterien an Menge und Dicke. Ueberall zeigen sie häufige Klappen, ausgenommen im Herzen. Nicht nur mit ihren feinsten Würzelchen, sondern selbst mit ihren Stämmchen bilden sie noch Neße.

Häufig dringen von den Arterien der Muskeln Neste in die Haut, so wie auch Venen der Haut sich nicht bloß in die Venenstämme zwischen den Muskeln, sondern in die kleineren Venen der Muskeln selbst begeben.

Diese Blutgefäße dienen den Muskeln, so wie allen anderen Theilen, zur Ausbildung und Ernährung.

Handwritten notes:
in der
in der
in der
in der
in der
in der
in der
in der

Fragment of text from the adjacent page:
nimmt, gleichsam
Muskeln geschie
nd entweder un
vorer Poren, auf
oder in welche sie
l- oder Knochen
embranen, oder
verbündet grober
oderer Zellstoff
einander, theils
mit der äußeren
gesammt größer
und ein Knochen
enigere, als
ne Länge oder
ut geratener
den Wasse, un
stentheils aus
Arterien be
ße angehen
er größer der
lari. Varnet. 77



Die Beschreibung der Blutgefäße der einzelnen Muskeln findet sich in der Gefäßlehre ⁶.

§. 9.

*Im Körper des Menschen
in den Muskeln sind die
Klappen fest, die
durchgängig fallen
Monro in Fijher
Museum Anatomy
7. 86.*

Saugadern findet man zwar vorzüglich im Herzen, im Gesichte, in der Zunge, im Zwerchmuskel, und einigen andern Theilen, zwischen den Fasern der Muskeln, so wie überall zwischen den ganzen Muskeln. Auf was für Art aber diese Saugadern aus der Substanz der Muskeln selbst Würzelchen ziehen, ist noch nicht deutlich gezeigt. Wahrscheinlich entspringen sie aus dem Zellstoff zwischen den Muskelfasern.

Die Beschreibung der Saugadern, die von einzelnen Muskeln kommen, findet sich in der Gefäßlehre ⁷.

§. 10.

Der Nerve einer Muskelfaser scheint bis auf das Herz und die Muskeln des ^{in organ} Augapfels in Absicht seiner Größe, meistens der Größe der Muskelfaser angemessen zu seyn. Ein großer Muskel hat einen großen, ein kleiner einen kleinen Nerven ⁸. Kleine

⁶) Angiologia Francofurti 1800. oder Gefäßlehre Frankfurt 1792.
⁷) Angiologia Francofurti 1800. oder Gefäßlehre Frankfurt 1792.
⁸) Der Löwe hat kleine Nerven bey großen Muskeln. Wolf in den Novis Commentariis Petropolitariis Tomo XV.

Muskeln haben oft nur einen, große Muskeln gewöhnlich mehr, als einen Nervenstamm.

Die Muskeln des Augapfels haben bey weitem die allergrößten Nerven. Haben diese Muskeln des Augapfels etwa deswegen verhältnißmäßig so ganz ungeheuer große Nerven, weil sie als so kleine Muskeln am häufigsten vom Willen gebraucht werden, oder wirken sie etwa willkürlich kräftiger als andere, z. B. selbst zur Veränderung des Augapfels ?

Soviel ist gewiß, daß sie sich bey Sterbenden noch sehr rege zeigen, wenn schon Tage, ja Wochenlang vorher die meisten andern Muskeln des Körpers ihren Dienst versagen.

Für die Muskelfasern des Herzens, das ist, für das eigentliche Herz, hat man noch keine Nerven entdeckt²; da man sie doch in einem wenigstens drey-

9) Auf der dritten Tafel meiner Iconum oculi humani habe ich mit der größten Sorgfalt das wahre Verhältniß der Größe der Nerven zu diesen Muskeln darzustellen gesucht.

1) Als ich in der ersten Ausgabe dieses Werkes 1791 diesen Satz mit aller Vorsichtigkeit äußerte, schien niemand darauf zu achten: als ihn aber das Jahr darauf Ioan. Jac. Bernh. Behrends in seiner trefflichen Dissertatio, qua demonstratur cor nervis carere Moguntiae 1792. ausführlich darstellte, und theoretisch und praktisch bewies, machte er das größte Aufsehen, und fand mit unter einigen Widerspruch, der sich doch bald bey denjenigen legte, die ihn mit dem Messer in der Natur selbst nachprüften.

*Man fällt es ein
jedem die Muskeln
des Augapfels
so die Augenmuskeln
die Muskeln des
Augapfels
die Muskeln des
Augapfels*

*einmal
ein
einmal
einmal
einmal
einmal
einmal
einmal*



hundertmal kleineren Augenmuskels ganz leicht findet; denn die Nervenfädchen, die man, mit größter Mühe, endlich bis ins Herz, wirklich verfolgen kann ², verhalten sich nicht wie irgend andere Muskelnerven, sondern wie alle wahre Gefäßnerven ³.

Diese Nervenfädchen sind nämlich nicht nur sämtlich 1) sehr fein, sondern auch 2) weich, 3) gelblich und platt, 4) den Häuten der Arterien fast durchaus sehr dicht eingewebt; 5) und von dem sympathischen Paar abstammend. Daß aber das sympathische Nervenpaar ein bloßer Gefäßnerve ist, beweist ausführlich die Nervenlehre S. 266.

Gewissermassen war dieser Satz schon längst bekannt, nur nicht genau genug bestimmt. Vor mehr als zwey hundert Jahren schrieb schon Vesalius: Cor caro peculiaris nervis haudquaquam indigens.

- 2) Merkwürdig ist es, daß Andersech und Neubauer die eigene äußerst mühsame Werke über diese Nerven schrieben, dennoch, kaum ein Paar Fädchen bis wirklich auf dem Herzen, abbildeten. Allein wie konnten sie es anders, da sie der Wahrheit treu blieben? Auch bey Scarpa, der die allergenauesten Abbildungen liefert, sind die Nervenfädchen ~~nur~~ ~~sparsam~~ für eine so große Fleischmasse als das Herz ausmacht, *Siehe in der Vorrede p. 10*
- 3) Haller sagt Elementor, physiologiae Tom. I. pag. 489. oder de Corporis humani Fabrica Lib. IV. §. XIV. Molles sunt cordis nervi, ut possis pro magis medullosis habere, und setzt in der Note noch ausdrücklich hinzu: Res vera est, molles sunt ii nervi omnes, qui per magnas arterias adveniunt.

*offenbar ist die Nervenmasse
die man in den Abbildungen
sicht in der Vorrede p. 10*

21 23

Diese ausgemachte anatomische Wahrheit, harmonirt auß vollkommenste mit allen physiologischen und pathologischen Erscheinungen, da man nur jemals am lebenden Herzen bemerkte ⁴.

Die Winkel, welche die Nervenstämme mit den Muskeln bilden, sind sehr verschieden, bald spizig, bald stumpf. Der Nervenstamm begiebt sich zum Muskel bald in der Mitte, bald näher an einem seiner Enden. Seine feinsten sichtbaren Zweige oder Fäden aber nehmen endlich, so wie die Blutgefäße, die Richtung der Muskelfasern, wie man am bequemsten und deutlichsten an den Muskeln der Augen, nach gut gerathener Anfüllung der Blutgefäße und geringer Einwässerung, durch ein Vergrößerungsglas sehen kann; ob sie aber mit dem Feinerwerden zugleich auch weicher werden, ist nicht leicht zu entscheiden.

Die Nerven der Muskeln lassen sich auch durch Einwässerung zeigen, weil die Muskelmasse eher als der Nerve wegfällt, und daher die gröbere Zerästelung des Nerven übrig bleibt.

Gewöhnlich treten die Nerven, durch lockern Zell-

4) Gründlich hat dieses alles Behrend's in seiner angeführten Dissertation, die sich in Ludwig's Selectus scriptorum neurologicorum Tomo tertio wieder abgedruckt befindet, dargethan. — Hiermit kann man auch meine Nervenlehre S. 275. der zweyten Ausgabe, und die Gefäßlehre vergleichen.

*Lehrbuch der
Anatomie, 2te Aufl.
W. S. Edwards de
l'influence des
organes physiques
sur la vie. Paris 1824.*

Handwritten notes on the right margin, including 'Wiederholung' and 'S. 275'.

Fragmentary text from the left page, including 'ganz leicht findet', 'mit weicher Weich', 'gen kann?', 'ver-', 'Wachsthum', 'nicht nur', 'weich, 3) gel-', 'erien fast durch', 'dem sympathi-', 'das sympathi-', 'beweist', 'schon längst bekannt', 'Wer mehr als nur', 'is: Cur caro pe-', 'nd Neubauer', 'die Nerven', 'en bis wirklich', 'konnten sie es', 'en? Auch bey', 'lungen keine', 'für eine so', 'auf eine', 'Tom. I. p. 4', 'Lib. IV. §. III.', 'no magis mal-', 'ech castellan', 'tri. ans, p. 4'

stoff mit den Blutgefäßen, besonders mit den Arterien, zusammengeheftet, in die Muskeln.

Außer den Sinnorganen, wohin auch die Haut gehört, und den Zeugungstheilen, haben die Muskeln die reichlichsten Nerven.

Die Beschreibung der Nerven, die einzelnen Muskeln zugehören, findet sich in der Nervenlehre ⁵.

§. 11.

Den Zellstoff, die Arterien, die Venen, die Saugadern und die Nerven, haben die Muskeln mit andern Theilen des menschlichen Körpers gemein, die Fasern aber, welche nach Absonderung dieser fünf Dinge übrig bleiben, machen ihr eigentliches Wesen aus.

§. 12.

Im Querdurchschnitte sehen die größern Bündel vom Fleischfasern eckig aus, und sind mit einer häutigen Scheide umzogen, die desto feiner ist, je kleiner die Bündel selbst erscheinen ⁶.

§. 13.

In den meisten Muskeln scheinen die feinsten, durchs Vergrößerungsglas erkennbaren Fäden, neben-

5) Neurologia. Francofurti 1798. Nervenlehre deutsch in der 2ten umgearbeiteten Ausgabe. Frankfurt 1800.

6) Mit äußerster Genauigkeit bildet Querdurchschnitte der Muskeln ab Muys Tab. 3. fig. 4. 5. aus einem Ochsen Prochaska Tab. I. aus einem Menschen.

einander zu liegen, so, daß ein Schnitt der Länge nach weit weniger Fasern verlegt, als ein Schnitt der Queere nach. Am Herzen, Schlunde, Magen und an der Harnblase scheinen diese Fäden ästig ⁶, und zu kleinen Scheibchen verwebt ⁷.

Ob ein einzelnes Fädchen eines langen Muskels, z. B. am langen Schenkelmuskel, seine ganze Länge hält, ist wohl schwer auszumachen ⁸.

Bisweilen erscheinen Muskelfäden, wegen der sie verbindenden Queerfasern knotig ⁹; bisweilen auch gegen eines ihrer Enden, oder in der Mitte, vielleicht wegen Verschiebung oder zu starker Anziehung, dünner.

Sie sind so fein, daß, falls sie hohl wären, sie doch nicht den sechs und vierzigsten Theil eines Blutkügelchens durchlassen könnten ¹, oder sie übertreffen das feinste Menschenhaar vierzigmal an Feinheit.

Unter zweyhundert acht und siebenzigmaliger Vergrößerung, im Durchmesser, scheinen sie in der Mitte

- 6) Aus *Leeuwenhoek* abgebildet bey *Muyß* und *Prochaska*. Tab. 6. fig. 2. 3.
- 7) Vortreflich abgebildet bey *Muyß* Tab. 1. fig. 8. So auch am Magen körnerfressender Vögel.
- 8) *Prochaska* meynt gegen *Haller*n, daß es die ganze Länge halte. S. 29.
- 9) *Muyß* Tab. 1. fig. 16. c. D. Auch *Henr. Baker*n *The Microscope made easy*. Lond. 1743. scheinen sie gegliedert. *J. J. Evered Home*. *Vol. 2* 1816. *Annals of Philosophy*, Vol. 3. 1825.
- 1) *Muyß* pag. 48. handelt umständlich davon.

Handwritten notes in the right margin:
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten
Handwritten



hell, am Rande dunkel; Asbestfäden hingegen umgekehrt in der Mitte dunkel und am Rande helle ².

Je jünger der Mensch ist, desto feiner sind seine Muskelfäden ³.

Sind die Fäden eines großen vollkommen ausgewachsenen Menschen größer oder sind sie häufiger, als die Fäden eines vollkommen ausgewachsenen kleinen Menschen ⁴? Wahrscheinlich sind sie in großen Leuten größer, nicht bloß häufiger.

§. 14.

Ob die letzten oder einfachen Muskelfäden (da sie doch wohl nicht ins Unendliche theilbar seyn können), hohl oder dicht ⁵, cylindrisch oder flach

2) Merrem, in den Schriften der naturforschenden Gesellschaft. Berlin 1783. 4. Band Seite 409. Er schließt daraus, daß sie hohl wären. Allein nach Mezger soll das ein optischer Betrug seyn. S. ebend. Band 5. S. 378.

3) Leeuwenhoeck bey Mays p. 163. Prochaska p. 38.

4) Auch bey den an Größe verschiedensten Säugthieren, Vögeln und Insekten scheinen die Muskelfäden einerley Dicke zu haben. Mays p. 48. 170. 219. Natürlich müssen die Muskelfäden der Infusionsthierchen feiner seyn. Indessen scheint es mir sehr merkwürdig, daß der Augapfel eines Elephanten der nicht größer als der Augapfel eines Ochsen ist, dennoch ohne allen Vergleich dickere Muskeln besitzt.

5) Nach Prochaska pag. 47 sind sie nicht hohl. Nach Stuart Thres Lectures on muscular motion. Lond

flach sind, ist nicht ausgemacht, da unsere Vergrößerungsgläser vielleicht nicht hinreichen, dies zu entscheiden. Mit Gewisheit bemerkt man nicht, als daß die feinem Fasern wie die gröbern aussehen.

S. 15.

Unter völlig gleichartig gebauten und gleichartig wirkenden Theilen des gesunden menschlichen Körpers, machen sie die größte oder meiste Masse aus, und nur ihre Lage und Form im Ganzen unterscheidet sie von einander.

*über
nicht künstlich fett...*

Chemische Zerlegung der Muskelfasern.

S. 16.

Muskelfasern von Thieren liefern ohngefähr die gleichen Bestandtheile, wie ihr Blut, nämlich Wasser, etwas flüchtiges Laugensalz, dickes Del und eine Kohle, die etwas Kochsalz enthält.

*Muskelfleisch oder miedlung
des Gallens aufhält ein
Säurestoff und Kohlenstoff,
wogegen der Knochenzahn
ungefähr, je nach der Art
verschiedenartig ist
aussehen soll.
Grundstoff parallel mit
Zeit. 1808. N. 200. S. 373*

*Carlyle Ph. 1739. 4. Tab. 2. fig. 3. sind sie aus Bläschen zusammen
1805. a. folio gesetzt. Nach Hook und Schwammerdam sind sie
cylindrisch form eine Reihe von Kugeln, nach Comper sind sie zellig,
of a pulpy nach Borellus rautenartig, nach Ring und Laurus
substantie, irregularis an Fortsetzungen der Arterien.
granulata
covered by
section of the
reticular
membrane*
6) Prochaska hält sie für flach. S. 27. Fontana sur
le Venin de la Vipere, für cylindrisch.
7) Haller. Elem. Phys. Tom. 4. p. 432.
S. Muskellehre. B

Hutchett.

Ein ganz mageres Stück Kuhfleisch auf eine Stange gesteckt, und mitten in einem Flusse befestiget, verwandelt sich in sechs Monaten in eine Wallrath ähnliche Substanz. Nach anderthalb Jahren ist alles Fleisch in einen solchen Stoff verändert, der jedoch einen gelblichen Schein und widerlichen Geruch hat.

Gießt man auf ganz mageres Hammelfleisch Salpetersäure, so entwickelt sich Stickgas, und verwandelt nach Wegwaschung der Säure in drey Tagen das Fleisch ebenfalls in eine solche wallrathähnliche Substanz *.

Muskeln unter dem pneumatischen Apparate distillirt, geben, ein leicht faulendes Wasser, kohlen-saures Ammoniak und brenzliches Del.

Zu den Muskelfasern gehören als Elemente: Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Bittererde, Kalkerde, Phosphor ?.

*) George Smith Gibbes in den Philosophical Transactions für 1794. und 1795., in Grens Journal der Physik. Erster Band S. 156.

*) Alex. von Humboldt Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. Erster Band S. 176. und 398.

Vier Unzen Rindfleisch,		Kalbfleisch
im Wasserbad destillirt, gaben	$\frac{3}{3}$ 3 gr.	$\frac{3}{3}$ 3 gr.
an Feuchtigkeit	2 6 36	2 6 54
an trockenem Reste	1 1 36	1 1 18
Summe	<u>4 — —</u>	<u>4 — —</u>

Vier Unzen gaben		
an wässrigem Extracte (A)	— 1 56	— 2 30
an Feuchtigkeit	2 6 36	2 6 54
an rückgeblieb. Phlegma	— 1 16	— — 70
an trockenem Reste (B)	— 6 36	— 5 62
Summe	<u>4 — —</u>	<u>4 — —</u>

(A) gab ferner analysirt	$\frac{3}{3}$ 3 gr.	$\frac{3}{3}$ 3 gr.
an flüchtigem Salze	— 1 2	} — 1 12
an Oele und Geiste	— — 38	
an Kohlenrückstand	— — 6	
verlohren giengen	— — 10	— — 18
Summe	<u>— 1 56</u>	<u>— 2 30</u>

(B) gab ferner analysirt		
an flüchtigem Salze	— 2 —	— 1 66
an flüchtigem Geiste	— — 36	— 1 37
an Kohlenrückstand	— 1 60	— 2 18
verlohren giengen	— 2 12	— — 13
Summe	<u>— 6 36.</u>	<u>— 5 62.¹</u>

*) Fourcroy in Crell's neuem chemischen Archive. Band III. Seite 117.



Die chemische Untersuchung menschlicher Muskelfasern fehlt noch. Durch bloßes Trocknen verlieren sie über die Hälfte ihres Gewichtes.

Lebendige Muskelfasern.

§. 17.

Der ausschließliche Hauptcharakter der lebendigen Muskelfasern ist, durch einen Reiz, der auf sie selbst oder auf ihren Nerven wirkt, entweder sich zusammen zu ziehen, und dadurch sich zu verkürzen, breiter, dicker, härter und runzlich zu werden, oder auch zu erzittern.

Nur die eigentlichen Muskeln (§. 307.) erzittern; die übrigen Muskelfasern hingegen, die Säcken oder Canälen, z. B. der Urinblase, der Gallenblase, dem Darmcanale eingewebt sind, ziehen sich auf einen Reiz sichtlich zusammen.

Diese in einer sichtlichen Bewegung bestehende Eigenschaft nennt man die Reizbarkeit, Beweglichkeit, Erregbarkeit, Lebhaftigkeit oder Agilität, Muskelkraft, vielleicht am schicklichsten Spannkraft, Irritabilitas, Contractilitas, Tonus, Vis vitalis, insita, innata, musculosa, oder propria, Attraction of life ², Excitability ³.

2) Fordyce Phil. Tr. 1788. p. 35.

3) Gaubius Pathologia §. 126. Vis ab omni alia cor-

Muskelvermögen

Eine starke anhaltende Zusammensziehung nennt man einen Krampf; eine schnell wiederholte heftige Zusammensziehung oder Erzitterung, eine Zuckung.

Aus dieser Reizbarkeit allein, schließt man daher auf Muskelfasern in solchen Theilen, in welchen sie der Feinheit halber dem Auge entgehen (§. 1.).

§. 18.

Die Reizbarkeit ⁴ unterscheidet sich durch ihre augenscheinliche, schnelle, und abwechselnde, durch Mohnsaft zu hemmende, und nach dem Tode aufgehörnde Wirkung von der allem Zeustoffe gemeinen Zusammensziehbarkeit und Schnellkraft, welche langsam und ^{un}unterbrochen wirkt, durch Opium nicht gemindert, und durch den bloßen Tod eines Thieres nicht vernichtet wird.

porum vi motrice huc usque detecta distinguenda ut principium sui generis viventibus inditum, quod prius sibi in agendo leges sequatur.

Nach Girtanner und Beddoes ist Reizbarkeit und Lebenskraft einerley. S. Götting. gel. Anzeige 1794. St. 169.

4) Zimmermanns treffliche Dissert. de Irritabilitate. Goettingae 1751. Desgleichen Oeder Diss. de Irritabilitate. Hafniae 1752. und Haller in seinen Operibus minoribus. Joan. Ludw. Gautier Diss. de Irritabilitate Halae 1739. 8.



Die gewöhnlichen natürlichen Reize, die im gefunden Zustande Zusammenziehung der Muskelfasern bewirken, sind nach verschiedenen Muskeln verschieden; z. B. für die Muskeln, die durch den Willen bewegt werden, Etwas mittelst der Nerven vom Hirne kommendes, fürs Herz das Blut, für die Därme die Speisen und Luft, für die Harnblase der Harn, für die Gallenblase, falls sie Muskelfasern hat, die Galle.

Ob auf gleiche Art für den Uterus das Kind, für die Saamenbläschen der Saamen, für die Blindung im Auge das Licht, was auf die Markhaut fällt, als Reiz dient, ist nicht ausgemacht, da diese Theile wenigstens keine gewöhnlichen Muskelfasern zeigen.

Vermuthlich ist die Verschiedenheit der innern Bekleidung dieser muskulösen Organe die Ursache dieser Verschiedenheit, so wie wir sehen, daß der Magen drey bis vier Gran spanischer Fliegen, aber nicht Brechweinstein, die Urinblase sogar scharf oder faul gewordenen Urin, aber kein frisches Blut oder Eiter verträgt.

Ungewöhnliche, widernatürliche Reize hingegen der Muskelfasern sind: ein Besprennen mit kaltem Wasser, oder sonstige Beraubung der Wärme, ein Stechen, Kneipen, Zupfen, Schneiden, Brennen,

5) Vergleiche S. 56.

Betupfen mit Säuren oder andern Schärfen, oder Mittheilen des elektrischen Funkens, welcher sich als der allerkräftigste Reiz zeigt 6, bewirken ein heftigeres Zusammenziehen in einigen, und schnelle Erzitterungen oder Zuckungen in andern Muskelfasern.

*J.W. Ritter, Beweis des
eines beständigen Galvanismus
den Lebensprinceps im
Thierreich begleitet
Weimar 1798*

Es scheint ein allgemeines Gesetz, daß alles was in organisirten Körper den Sauerstoff vermehrt, zu gleicher Zeit auch die Reizbarkeit vermehrt 7.

6) Etwas deswegen, weil er am besten den Muskel überall durchdringt? Haller Elem. Phys. Tab. 4. pag. 460. doch darf er nicht zu heftig seyn, sonst stirbt er alle Reizbarkeit, im Gegentheil lehren die neuesten Versuche, daß ein gefinder Grad von Elektricität sich kräftiger zeigt.

Daher Elektricität als das wirksamste Mittel zur Erweckung scheinbar todtgebohrner Kinder angewendet wird. Siehe die schönen Versuche von F. S. Boer in seinen Abhandlungen und Versuchen Geburtshülftlichen Inhalts. 2ter Theil Wien 1792.

Von der Elektricität scheinen mir auch alle Galvanischen Versuche abzuhängen. Wenigstens kenne ich noch keinen hieher gehörigen Versuch der nicht dem Gesetze des aufgehobenen Gleichgewichts der Elektricität conform wäre.

Hildebrandt nimmt verschiedene Arten der Reizbarkeit an, in seiner Geschichte der Unreinigkeiten

7) L'Irritabilité des corps organisés est toujours en raison directe de la quantité d'oxygene qu'ils contiennent

*gibt manne in dem die Pflanze
genau wie Kopf: in dem
viel mehr ist, was die irrita-
bilität vermehrt, das Oxygene
im Körper vermehrt.
Marius Joseph Pflanzstoff über die
Natur der Linsen. St. Petersburg 1809. im
Lese 9.*



§. 20.

Der Grad der Reizbarkeit ist also in verschiedenen Muskeln verschieden. Einige werden durch schwächere, andere erst durch stärkere Reize in Bewegung gebracht.

Unter allen Theilen hat das Herz die beweglichsten, reizbarsten oder regesten Muskelfasern, nächst diesem die Därme, dann der Magen, dann die Urinblase, dann der Zwerchmuskel, die Zwischenrippenmuskeln, der innere Brustmuskel, zuletzt die willkürlichen Muskeln.

§. 21.

Derselbe Reiz in vollkommen gleichem Grade, und auf gleiche Art angebracht, wirkt also auf verschiedene Muskeln verschieden.

Ja, derselbe Reiz, in demselben Grade angebracht, wirkt in einem und demselben Menschen zu verschiedenen Zeiten verschieden auf seine Muskeln.

Je jünger der Mensch, desto reizbarer sind seine Muskeln *.

ment. Tout ce qui augmente la quantité d'oxygene, augmente en même tems l'irritabilité Girtanner in Roziers Journal de Physique. Tome 37. 1790. p. 147.

*) Die physische Ursache davon habe ich in meiner Nervenlehre Frankfurt 1800. §. 91. und im zweiten Kapitel mehr

Je mehr ein Mensch auf irgend eine Art, z. B. durch Blutverlust oder Abführungen geschwächt wird, desto reizbarer werden seine Muskeln. Wegen des schwächern Körperbaues ist daher das weibliche Geschlecht auch meist reizbarer, als die Männer; Entzündung vermehrt, vielleicht auf entgegengesetzte Art durch Spannung, nicht durch Schwächung, die Reizbarkeit ⁹.

Mäßige Spannung verstärkt die Reizbarkeit, z. B. wenn das Herz vom Blute ausgedehnt wird; wenn der Darmcanal aufgeblasen oder die Harnblase angefüllt wird ¹. Zu große Spannung oder Ausdehnung schwächt, tilgt und zerstört freylich die Reizbarkeit.

Kleine Thiere scheinen reizbarer, als große.

Kaltblütige Thiere sind mitunter sehr reizbar ².

§. 22.

Auch scheint eine angebohrne Verschiedenheit im Grade der Reizbarkeit Statt zu finden, so daß z. B.

ner Tabula Baseos Encephali Francofurti 1800 angegeben.

9) Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 453.

1) Siehe J. Pugh p. 34.

2) Frigida animantia, maxime irritabilia, calore latente adfatim abundant. Principium irritabilitatis in animalibus frigidis a calore latente, in animalibus calidis, a calore libero efficaciter adflatur et fovetur. J. X. Poli in seinem wunderschönen Werke: Testaceae utriusque Siciliae p. 66.

unter völlig gleich großen und gleich erzeugenen Menschen dennoch einige von Natur reizbarer sind, als andere.

Daß die sympathisch erregte Reizbarkeit sehr verschieden seyn müsse, lehrt die so sehr verschiedene Zerstückelung der Nerven.

Auch sucht man hierin die Ursache der Verschiedenheit der Temperamente; z. B. zum cholertischen Temperamente glaubt man, gehöre eine sehr reizbare und starke Muskelfaser; zum melancholischen eine reizbare, aber schwache; zum sanguinischen eine mäßig reizbare, aber starke, zum phlegmatischen eine mäßig reizbare, aber schwache.

Vollte man nicht sagen S. 107
Einige Thiere haben das auszeichnende, daß sie durch die Bewegung eigener Muskeln einen dem elektrischen gleichen Schlag hervorbringen. Solcher Thiere sind bis jetzt fünf bekannt, nämlich: 1) der Zitterrochen (Raja Torpedo. Bloch Tab. 122 Phil. Tr. Vol. 63. Tab. 19 et Vol. 65). *Humboldt in Jour Linn. sur la Torpille*
2) Der Zitteraal (Gymnotus electricus) giebt sogar Funken. Bloch Tab. 156. *Hunter Ph. Zo. Vol. 65*
3) Der Trichiurus indicus, Parague de la Condamine in den Memoires de l'Acad. des Sc. à Paris 1745 pag. 466.) *Chimica XXII. 223*
4) Der Zitterwels (Silurus electricus. Broussonet Mem. de l'Acad. des Sc. à Paris 1782. Tab. XX. *et Journal de Physique 1785 Août.* *Geoffroy a. u. O.*
Rudolphi Transactio. der Berliner akademie 1824

Geoffroy in Anales du Muséum T. 1. p. 391. 407
Jean de Gilbert Annot. à Physic. Jafrogung 1802.
Alex v Humboldt. Berichtsungen aus der Zoologie. Tokio 1816. T. 19. und Zoologie. Paris 1805.

Geoffroy in Annot. du Muséum T. 1. p. 391. 407
Geoffroy a. u. O.
Rudolphi Transactio. der Berliner akademie 1824
Geoffroy in Annot. du Muséum T. 1. p. 391. 407
Geoffroy a. u. O.
Rudolphi Transactio. der Berliner akademie 1824



Handwritten notes at the top of the page, including the number 88 and 91.

5) Der Stachelbauch (Tetrodon. Paterson in Phil. Trans. for 1785. c. fig. tab. 13. p. 382.)

Fische zeigen unter allen Thieren die meiste Muskelkraft, weil sie sich in einer tausendmal dichteren Flüssigkeit als die Luft bewegen. In ihren Muskeln sind die Fasern nicht lang, aber zahllose Schichten derselben sind übereinander gehäuft.

S. 23.

Unter gehörigen Umständen erfolgt auf die Verstärkung des nämlichen Reizes in der nämlichen Muskelfaser ein lebhaftes Zittern, oder eine länger anhaltende Zusammenziehung.

S. 24.

Mechanisches Betupfen, Berühren, Kneipen, Stechen, oder Reizen des Nerven, der einem Muskel gehört, erregt in diesem Muskel Zusammenziehung oder Zuckung.

Gehört ein so gereizter Nerve nur einem Theile eines Muskels, oder überhaupt nur Einem Muskel, so äußert auch bloß dieser Theil des Muskels oder dieser eine Muskel seine Reizbarkeit; gehört er hingegen mehreren Muskeln, so gerathen auch alle Muskeln, zu denen er gehört, in Zusammenziehung oder Zuckung.

Trifft der Reiz eine gewisse Stelle des Hirnes oder des Rückenmarkes, so gerathen alle Muskelfa-

3) Croone Lecture on muscular motion p. 54.



fern in Bewegung, deren Nerven mit der gereizten Stelle im Hirne, oder unter der gereizten Stelle mit dem Rückenmarke in Verbindung stehen.

Ein Reiz theilt sich auch andern Muskelfasern mit, auf die er nicht unmittelbar wirkt; z. B. auf die Berührung sehr weniger Muskelfasern des Darmcanales zieht er sich zuweilen der ganzen Länge nach zusammen. Theilt sich hier etwa der Reiz durch die Zellfädchen * mit, die die Muskelfasern aneinander heften, da sich die Muskelfäden dieser Stelle nicht zusammenziehen können, ohne die benachbarten zugleich mit anzuziehen? So schreitet bisweilen im Herzen die Bewegung von einer Stelle zur andern fort.

Gegenwirkende Muskeln (Antagonisten) erhalten Nerven von dem nämlichen Stamme, und wirken auch bey einem Reize auf diesen Nervenstamm zugleich, miteinander.

Bisweilen wirken jedoch nicht die Muskeln, zu denen die gereizten Nerven gehen, sondern entfernte; z. B. auf ein Brennen der äußeren Seite des Vorderarms erfolgte Zusammenziehung nicht in den Streckern, sondern in den Beugern.

Die mittelst ihrer Nerven am meisten verbunden

4) Monro Betrachtung über das Nervensystem Cap. 28.

3 Jane

scheinenden Muskeln haben aber darum nicht die meiste Sympathie.

Muskeln, die ihren Nervenfäden von dem Theile des Nerven erhalten, der zwischen der gereizten Stelle, und der Stelle, wo sich Sympathie zeigt, liegt, gerathen nicht in Bewegung ⁵.

Von dieser Kraft der Nerven, die Muskeln zu spannen, (Spannkraft) oder zur Zusammenziehung zu bringen, handelt die Nervenlehre S. 343.

§. 25.

Unterbindet oder drückt man hinlänglich einen Nerven, so werden die Muskeln, zu denen er gehört, gelähmt, das heißt kein Reiz diesseits dem Bande, oder zwischen dem Hirne und Bande vermag die Muskeln, die jenseits des Bandes von diesem Nerven Zweige haben, in Bewegung zu bringen, welches hingegen ein Reiz jenseits des Bandes eine Zeitlang vermag, der alle Muskeln in Bewegung setzt, die von diesem Nerven Zweige erhalten.

Löst man das Band, oder hebt man den Druck, so erfolgt auch (falls der Nerve nicht zu sehr gelitten hat) wieder auf einen Reiz diesseits der gebunden gewesenem Stelle Bewegung in den Muskeln, die jenseits dieser Stelle von ihm Zweige erhalten, und die Lähmung ist gehoben.

5) Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 471.

in
zu jenseits
/ of
in

ja als
in einem
Kausette



der gereizten
Stelle mit

des Darmes
länge nach
durch die
einander
de nicht
uten ge-
stellen im
ge wahren

sich) er-
und
kommen

in, zu
hernte;
Dorber-
trecken,

erhalten
Exp. 2.

Gleiche Lähmung sieht man auf einen Druck, den das Hirn oder Rückenmark leidet, folgen; oft auf der entgegengesetzten Seite ⁶.

§. 26.

Durchschneidet, oder verdirbt man, auf eine andere Art, eine Stelle eines Nerven, so bewirkt kein Reiz auf den Nerven zwischen dem Hirne und Schnitte oder Verderbung mehr eine Zusammenziehung in den Muskeln, für die er jenseit dieser verdorbenen Stelle Zweige abgibt, sondern alle diese Muskeln sind gelähmt, und ein Reiz auf den Nerven vermag nur jenseit dem Schnitte noch eine Zeitlang eine Zusammenziehung dieser Muskeln zu bewirken.

Wird das Rückenmark gereizt, so werden alle Muskeln verzuckt, die unter der Stelle von ihm Nerven erhalten, außer diejenigen, deren Nerven man vorher durchschnitten hatte.

Nur das Herz allein, macht eine Ausnahme, indem man durch keine Reizung, selbst der Nerven, die seinen Blutgefäßen gehören, es zur Zusammenziehung bringt ⁷. Selbst die sonst so wirksame Galvanische Art die Muskeln mittelst der Nerven zu reizen,

⁶) Haller El. Ph. Tom. 4. pag. 331.

⁷) Haller's Elem. Phys. Tom. 4. p. 526. *Vis irritans in nervos cordis exserta nihil in cordis motu mutat.* und p. 527. *In cor nervis nihil est potestatis. It de C. H. F. Tom. 2. pag. 384. Ebd. S. 483.*

vermag nichts, so lange man nicht unmittelbar das
Fleisch des Herzens in die Kette bringt.

Die Lähmung eines Muskels, welche auf Durch-
schneidung oder Ausschneidung eines Stückes des Ner-
vens erfolgt, verschwindet bisweilen nach der Wieder-
zusammenwachsung oder Heilung *.

§. 27.

Unterbindet man hingegen die Arterien
eines Muskels, so wird er dadurch erst nach eini-
ger Zeit nur in so ferne gelähmt, als sie seiner Ernäh-
rung schaden.

§. 28.

Von dem lebendigen Körper ganz getrennte
Muskeln oder auch Stücke von Muskeln, zeigen noch
eine Zeitlang, beym Reizen ihrer Substanz oder ihrer
Nerven dieses Zusammenziehen und Zittern, doch
einige länger, als andere. Gewöhnlicher erfolgt dies nach
dem Grade ihrer Reizfähigkeit, oder in der Ordnung, in
welcher sie sich durch schwächere Reize in Bewegung ver-
setzen lassen (S. 320). Das aus lebendigen Menschen *

*) S. Arnemanns lehrreiche Versuche an Thieren. Ich
sah selbst die auf Durchschneidung von Nerven bey chirur-
gischen Operationen am Menschen erfolgte Lähmung ver-
schwinden.

9) „Meminimus ipsi vidisse hominis cor, qui eviscera-
tus erat (supplicii genere apud nos versus prodito-
res recepto) quod in ignem de more injectum, sal-

90 91

3 Jane

zu
zu jufert
/

zu die
zu minen
L aufhalten

den Druck, den
ist auf der
eine andere
kein Reiz
Schritte oder
ng in den
nen Stelle
sind ge-
mag nur
zu Zofum
werden alle
m ihm Ner-
ven man
nahme,
Nerven,
Tammen-
ame Gal-
zu reijet
Via imini
mora aut
ocia. In la



Der Gang eines getödteten Thieres, dergleichen ^{noch} folgt bey Lenz
L. Mascagni Prodromus della grande anatomia. Firenze 1809.
p. 77 ~~105~~.

— 32 —

oder lebendigen Thieren geschnittene Herz zeigt da-
her seine Reizbarkeit am längsten, anhaltendsten; aus
lebendigen Thieren geschnittene, ja selbst erkaltete
Därme ziehen sich noch ferner zusammen; schwächer
hin-

der Gang eines getödteten
Thiers nach 4 Stunden
41 Minuten ist noch
ganz fest.

K. H. Nyffen in Gillett ad articul. 15. Nro. 32.

Analen. 1803. B. 2.

Nro 13 Band. 2^{te} N^o.

*) Albinus, Vassalli - Candi
Giulio, Lepri, Quersfeld - J. Gillett
Analen 13 Band 2^{te} N^o.

„tabat in altum primo ad sesquipedem, et deinde gra-
„datim ad minus, durante spatio septem aut octo mi-
„nutarum.“ Baco de Verulamio Hist. vitae et mortis

So auch andere dem Willen gehorchende Muskeln.
Meyer (Anatomie Band 3. S. 42.) führt einen Fall an, wo
ein Mensch, dem im Gehen der Kopf weggehauen ward,
noch nach der Trennung des Kopfes den Schritt voll-
führte. In einem andern Falle, den Albinus sah,
blieb der Mensch noch ein Weilchen stehen. Auch im ab-
gehauenen Menschenkopfe bewegen sich noch manchmal die
Gesichtsmuskeln. ^{*)} Ebend. S. 23^{er} Herr von Leveling
reizte, auf mein Anrathen, einem geköpften Menschen
das Rückenmark mit einer Nadel, wodurch der ganze
Leichnam in Zuckungen gerieth; in einem Briefe an mich
vom Novemb. 1789. und in seiner Umarbeitung von
Haller's Grundriß der Physiologie. Erlangen 1785.
Mehreres hierüber habe ich in der zweyten Ausgabe mei-
ner Nervenlehre S. 332. angeführt.

Man reizte den Anfang des Rückenmarks im abge-
hauenen Kopfe eines Menschen, und sah sich die Gesichts-
muskeln verzucken. Haller Tom. 4 p. 354. v. Leve-
ling stellte ebenfalls diesen Versuch verschiedenemale
mit vielem Effecte an, wie ich am eben angeführten
Orte schildere. Eigens handelt über diesen Gegenstand
C. Fr. Clossius über die Enthauptung. Tübingen 1791.

Weickard selbst sah an einem abgehauenen Menschen-
kopfe sich die Lippen bewegen. Phil. Arzt. Erster Band.
1790. S. 221.

31

*Die Zungelafalt erzeugt alle der Fing ihre Reizbarkeit in Musfeln in
Herrn Blumenhof in Reimar. London. Med & Chirj. General 1825 June*

— 33 —

Hingegen auffern der Magen und die Harnblase nach der Ausschneidung ihre Reizbarkeit ¹.

Ausgeschnittene Därme, oder Stücke anderer Muskeln, bewegen sich bisweilen fast noch heftiger, als im Leibe hängende.

Auch bekommen sterbende Thiere heftige Zuckungen, besonders wenn sie zuvor starke Ausleerungen erlitten.

Ein Muskel, der seine Reizbarkeit schon verloren zu haben scheint, verräth sie noch, wenn er zerstückelt wird.

An Fischen, die lebendig in Stücke zerschnitten und ins Wasser geworfen werden, sehen die Muskelfasern geschlängelt aus, so auch bey andern Säugethieren und selbst bey Menschen, die im Krampfe sterben ².

1) An Thieren lassen sich diese Versuche leicht wiederholen. So wird man an frisch von lebendigen Thieren getrennten Köpfen, noch eine Zeitlang, diese Muskelkraft beym Reizen sehr rege finden; bey kaltblütigen Thieren sogar noch nach mehreren Tagen, z. B. ein abgeschnittener Vipernkopf bis noch am zwölften Tage. *Rodii degli animal. viv. p. 9.* S. Clossius über die Ent-
hauptung.

2) Muys p. 51. Tab. 1. fig. 17. L. I. Dies sieht man z. B. an den angeschossenen Muskeln von frischem, nicht vorher halb todt gehehrem, Wildpret; wenn nämlich der Muskel krampfhaft zusammengezogen bleibt, wie ich solche Beispiele in Weingeiste aufhebe.

So fand ich sie auch an einem lebendig Geräderten, S. Muskellehre. E

*Ja, die Natur derer Stoffen
faulit Zerscheren zum feinen juftiert
immer Bewegung sich auf
Hilf findet stellen köng, im
Kellernigen Thieren. *)*

*H. G. Vetter von Jüngen etc.
17. Feb. 1806.*

Zerknirscht man einem Fische (z. B. einem Lachs) den Kopf gleich nachdem er gefangen ist, so bleiben seine Muskeln länger (12 Stunden) reizbar, als wenn man ihn für sich sterben läßt (nur $\frac{1}{2}$ Stunde lang) *.

§. 29.

Auch in einem Raume, worin die Luft sehr verdünnt ist, bewegen sich ganz vom Körper abgetrennte Muskelfasern fort †.

§. 30.

Daß durch ein Drücken, Binden oder Zerschneiden eines Muskelnervens zugleich die Empfindung des Muskels aufhört, wird unter den allgemeinen Eigenschaften der Nerven des ganzen Körpers erörtert (s. Nervenlehre S. 337.). Empfindlichkeit ist daher nicht mit Reizbarkeit zu verwechseln. Denn die Bewegung eines Muskels fühlen wir im gesunden Zustande nicht.

Da das Herz die kleinsten Nerven unter allen Muskeln in Ansehung seiner Größe hat (S. 10.), so ist auch seine Empfindung stumpfer, als die Empfindung aller anderen Muskeln ‡.

wo z. B. den zweybäuchigen Armmuskel das scharfe Rad wie ein Messer zerschnitten hatte.

*) Blane Croonian Lecture for 1788.

‡) Boyle.

‡) Harvey's, Lorry's, Carrere's, Haen's,

A Portal anat. Vol. 2. p. 402.

*auf ganz bestimmten die
Empfindlichkeit ohne die
Organe durch die Nerven
verlassen. *)*

*Die Lungen sind nicht
Lebendigkeit ohne die
Empfindlichkeit, ja selbst
mit unvollständiger*

*de cadaveribus
La Fontaine's (Courtivron
wenn die Empfindlichkeit in
den Nerven gleichsam, die
in der dazwischen kommt
A Portal anat. Vol. 2. p. 402.*

Indem nun unmittelbar oder durch ihre Nerven gereizte Muskelfasern sich zusammen ziehen, werden sie kürzer, dafür aber dicker und härter, zugleich gespannt, ungleich und runzelich.

Diese Verkürzung, bey der sich die Enden einer Muskelfaser ihrer Mitte nähern, ihre Grundtheilchen sich zusammendrängen, oder ihre Elemente sich dichter an einander begeben^s, ist sehr verschieden; die Muskelfasern der Gliedmaßen und des Rumpfes scheinen sich verhältnismäßig weniger zu verkürzen, als die des Zwerchmuskels, der Därme, der Urinblase, des Schließers des Mundes, des Schließers des Afters, und des Schließers der Augenlider. Einige dieser Muskelfasern verkürzen sich oft mehr, als um die Hälfte ihrer Länge.

Daß aber auch die Muskeln der Gliedmaßen weit über den gewöhnlichen Grad sich verkürzen können, sobald nur die Einrichtung sich ändert, die sie zurück hielt, sehen wir vorzüglich nach queergebrochener Knie-

Louise's, Fontana's Versuche führt Haller de Corp. hum. Fabr. Tom. 2. Seite 439. an. Auch verdient Eloussius drüber nachgelesen zu werden.

§) //Der angebrachte Reiz gäbe den Theilchen eine stärker anziehende Kraft, und bey der lebendigen Anziehungskraft sände kein entgegengesetztes Zurückstoßen Statt;“ sagt Fordyce Phil. Trans. Vol. 78.

scheibe, wo die Strecker des Kniegelenks mit dem oberen Stücke der Kniescheibe bis über die Mitte des Schenkels sich hinaufziehen, wovon sie vor diesem Bruche, durch ihre Befestigung am Schienbeine mittelst der Kniescheibe, zurückgehalten wurden. Ein gleiches beobachtet man nach anderen Beinbrüchen.

Daß die Muskelfasern während ihrer Wirkung verkürzt, dicker und härter werden, wird man leicht durchs Gesicht und Gefühl am Kiefermuskel, an verschiedenen Armmuskeln und am Wadenmuskel überzeugt.

Was sie daher an Länge verlieren, gewinnen sie an Dicke.

*V. Erman über Muskelcontraction.
Sitz Gilbert's Ann. der Physik. 1812. 171.*

S. 32.

Im ganzen Umfange aber scheinen sie während der Wirkung weder merklich zuzunehmen, noch abzunehmen.

*Blanc's Lectures on Muscular
motion. an einemaal. 1799.*

S. 33.

*Handb. der Naturgeschichte der Menschen
Freiherrn Bischoff's Physio- und
Anthropologie München 1812.
S. 338. ^{muskel}
Vollständ. u. v. d. Muskel
anatom. u. physiol. Beschreibg.
26*

Die ersten Zusammenziehungen oder Zitterungen eines Muskels auf einen Reiz scheinen heftiger, lebhafter oder kräftiger, als die folgenden, die allmählig abnehmen, bis sie ganz aufhören.

S. 34.

An einigen Theilen zeigen die Muskelfasern auch bey dem heftigsten Reize bloß eine Zusammenziehung, z. B. am Darmcanale, an der Urinblase; an andern

Theilen hingegen, z. B. an den Gliedmaßen, am Rumpfe, am Kopfe, am Herzen gerathen sie bey stärkern Reizen in Zuckung, so daß sie augenscheinlich während ihrer Wirkung abwechselnd sich kräufeln, und bey dem Nachlassen der Zuckung sich strecken, oder mit Schnelligkeit ein- oder etlichemal hin- und herfahren, oder mit Einem Worte zittern. Eine Erscheinung, die schlechterdings bey keinem andern thierischen Theile, außer der lebendigen Muskelfaser bemerkt wird.

§. 35.

Ferner giebt es eine Verschiedenheit unter den Muskelfasern darin: 1) Daß wir einige nach Willkühr in Zusammenziehung bringen oder bewegen können, oder daß einige dem Hirne gehorchen, Willkührliche Muskeln (*Musculi voluntarii*). Freylich bewegen die Menschen meist ihre Muskeln, ohne daß sie es wissen: sie wollen just nicht den Muskel bewegen, sondern nur, was die Folge davon ist; z. B. Gehen, Stehen, u. s. f. Nur des Willens, den Fuß zu bewegen, aber weder der Muskeln, die dieß Bewegung verrichten, noch der Nerven, durch welche der Wille auf die Muskeln wirkt, sind wir uns bewußt. 2) Daß wir andere hingegen durchaus nicht bewegen können, oder daß andere dem Hirne nicht gehorchen, Unwillkührliche Muskeln (*Musculi automatici oder vitales, involuntarii, spontanei*); z. B. daß Herz, der Darmcanal.

3) Daß noch andere gemischte, theils willkürlich, theils unwillkürlich bewegt werden; z. B. der Zwerchmuskel und die Muskeln, die zum Athmen gehören, die im Schlafe sich unwillkürlich fortbewegen, im Wachen dem Willen ohne Anstand gehorchen; hieher gehören zum Theile die Muskelfasern der Geschlechts-theile.

Dieser Unterschied ist vorzüglich in einigen Krankheiten auffallend; z. B. beym Schlagflusse, wo das Hirn leidet, sind alle willkürlichen Muskeln gelähmt, während daß die unwillkürlichen, zum Leben notwendigen, ununterbrochen fortwirken.

§. 36.

In andern Krankheiten werden, ganz gegen unsern Willen, sonst dem Willen oder Hirne leicht gehorchende Muskeln durch Reize, die entweder den Muskel selbst, oder seine Nerven, oder das Hirn treffen, heftig bewegt; z. B. wir sind nicht im Stande, an unserm eigenen Körper, wenn ein Splitter oder sonst ein fremder Körper einen willkürlichen Muskel unmittelbar, oder durch seinen Nerven, oder durchs Hirn reizt, oder wenn ein entblößter willkürlicher Muskel selbst, oder sein entblößter Nerve gereizt wird, die Zusammenziehung oder Zuckung dieses Muskels zu hindern.

Aber nicht umgekehrt; denn durch keinen Um-

stand erhalten wir das Vermögen, die Bewegung des Herzens oder des Darmcanales, oder irgend einer unwillkürlich wirkenden Muskelfaser, durch den Willen unmittelbar zu beschleunigen oder aufzuhalten.

Der Grund hiervon ist im ^{10^{ten} u. 11^{ten}} ~~verigen~~ Paragraphen angegeben. *zu finden.*

S. 37.

Die dem Willen gehorchenden Muskelfasern können wir nach Gefallen schnell oder langsam wirken lassen, gradweise zusammensziehen, auch mitten in ihrer Wirkung aufhalten, und folglich entweder den Grad der Zusammensziehung ganz aufheben, oder sie in diesem Grade erhalten, oder die Zusammensziehung vollenden.

S. 38.

Die Geschwindigkeit dieser Bewegung ist so groß, daß eine vollkommene Zusammensziehung in weniger als einer Terze^{zeit} erfolgt.

S. 39.

Auch können wir größere Muskeln nur theilweise wirken lassen, so wie bey Krankheiten auch nur zuweilen Portionen von Muskeln in Zuckung gerathen (Man vergleiche S. 24.).

Dies sieht man ganz deutlich bey Versuchen an lebendigen Thieren, und oft eben so augenscheinlich bey Zuckungen des Schließers der Augenlieder, und

Dauer der Muskelthätigkeit

*gewöhnlich 10-15 Sec. je h.
Muskeln aufspringen aus
ihrem Zust. von Contractionem
bis sie in ihrem Zust. von
Relaxation sind. In 1/2 Sec.
20 bis 30 Erschütterungen in
einer Taktzeit.*

*Hyde Williston. in An. Phil. Transact.
for 1810.*

*geb. von
1812
181.*

andern Gesichtsmuskeln an Personen, die eine zarte Haut haben.

Geschieht dies etwa nur bey solchen Muskeln, die mehrere Stämmchen von Nerven, nicht bloß einen einzigen besitzen?

§. 40.

Man glaubt, die willkührlichen Muskeln hätten längliche, die unwillkührlichen runde Fasern: allein die Schließer des Auges, des Mundes, des Afters, hauptsächlich aber die Muskelfasern der Harnblase streiten dagegen, als welche insgesammt rund, und doch der Willkühr unterworfen sind.

§. 41.

Der Grund der Verschiedenheit in Rücksicht der willkührlichen und unwillkührlichen Beweglichkeit der Muskeln (§. 35) liegt offenbar in der verschiedenen Art der Verbindung dieser Muskeln mit dem Nervensysteme. Die unwillkührlichen Muskeln nämlich, stehen in keinem directen Zusammenhange mit dem Hirne mittelst der Nerven, können daher auch nicht durch den Willen, der im Hirne anfängt, und durch die Nerven sich den Muskeln mittheilt, regiert werden.

Denn der sympathische Nerve, dessen Fäden an die Blutgefäße des Herzens und des Darmcanals

6) F. Platner. Briefe eines Arztes an seine Freunde. Leipz. 1770. Brief 23. S. 326.

gehen, besteht für sich, und kommt nicht vom Hirne.
(Nervenlehre 266. 209.)

§. 42.

Am Herzen und Darmcanale sieht man, daß die unwillkürlichen Muskelfasern 1) leichter, 2) länger als die willkürlichen, und 3) unaufhörlich, ohne alle Ermüdung ihre Reizbarkeit äußern, oder sie werden durch schwächere Reize in Bewegung gebracht, und äußern diese Bewegung bey einem mechanischen Reize selbst noch eine Zeitlang nach dem Tode, ja nach der Trennung vom Körper; wenn andere Muskeln durch keinen mechanischen Reiz mehr rege gemacht werden können.

Wenn andere Muskeln ohne Ermüdung, und selbst ohne Schmerzen kaum stundenlang wirken können, so zeigt das Herz sich unaufhörlich, vom ersten Augenblicke des Lebens an, bis zum letzten ununterbrochen, Tag und Nacht hindurch unermüdet wirksam.

§. 43.

Mohnsaft auf einen Muskel unmittelbar, oder auf seinen Nerven, oder auf's Hirn gebracht, mindert anfangs seine zusammenziehende, lebendige Kraft oder Reizbarkeit, bis er sie endlich, wenn er in hinlänglicher Menge angewendet wird, gänzlich tilgt 7.

7) S. Nervenlehre S. 108.

So lange folglich die Wirkung des Mohnsaftes anhält, wird der Muskel durch einen Reiz zur Zusammenziehung gebracht.

Ist der Muskel zusammengezogen, wenn man Mohnsaft giebt, so wird er dadurch erschlafft.

Eben dies geschieht, wenn innerlich genommener Mohnsaft auf das Hirn, auf die Nerven, oder auf die Muskeln wirkt.

Diejenigen Muskeln, welche mehrere Reizbarkeit oder Lebenskraft besitzen, widerstehen auch mehr dieser die Reizbarkeit tilgenden Kraft des Mohnsaftes, am meisten das Herz.

Da das Herz fast keine Nerven hat, und der Mohnsaft durch die Nerven wirkt, so ist es begreiflich, warum das Herz weniger, als alle übrigen Muskeln, durch Mohnsaft leidet. Hätte es so viel Nerven, als ein anderer an Masse ihm gleicher Muskel, so würde es auch, wenn seine Nerven in gleichem Grade vom Mohnsaft angegriffen worden, eben so sehr als ein anderer leiden müssen.

So scheint auch eine zu starke Spannung, die Nux vomica, das Viperngift, der starke electrische Funken, der Schwefeldampf die Kälte und Hitze, der Reizbarkeit zu schaden. Kirschlorbeerwasser raubt den Muskeln fast augenblicklich alle Reizbarkeit, so auch die Cerbera ahovai.

§. 44.

Ist Reizbarkeit und Nervenkraft der Muskelfasern also einerley? oder sind die in verschiedenen Sinnorganen (außer dem allgemeinen Vermögen zu empfinden und zu schmerzen), zu so mannigfaltigen Berrichtungen modificirte Nerven in den Muskelfasern zur Spannung oder zur Hervorbringung der zusammenziehenden Bewegung oder Reizbarkeit modificirt? Denn 1) es ist einerley, um die Reizbarkeit rege zu machen, ob man den Reiz auf den Muskel selbst, oder an seinen Nerven bringt. (S. 17. S. 24.) Man berührt im ersten Falle gleichsam nur den Nerven näher, im andern entfernter. 2) Es ist einerley, ob man, um die Reizbarkeit zu hemmen, Mohnsaft an den Muskel selbst, oder an seinen Nerven bringt. 3) Wird die Reizbarkeit eines Muskels durch Mohnsaft in dem Verhältnisse der Menge seiner Nerven geschwächt. Das Herz hat unter den Muskeln äußerst wenig oder keine Nerven, folglich wird es auch, wenn diese Nervenkraft geschwächt wird, am wenigsten geschwächt. 4) Reizbarkeit und Empfindlichkeit werden durch dieselben Ursachen erhöht und geschwächt. Je jünger der Mensch, desto empfindlicher ist er, aber auch zugleich desto reizbarer. 5) Drückt, unterbindet, durchschneidet und zerstört man den Nerven, der zu einem Muskel gehört, so wird dieser Muskel nicht

schlafes an
zur Zusam
wera man
laßt.
ernommenet
, oder auf
Reizbar
auch mehr
schlafes,
und der
begreiflich
Muskeln,
von, als
wurde
de vom
als ein
ung, die
electrische
Spitze der
raude der
o nicht

96

100

nur sogleich gelähmt, sondern schwindet allmählig, außer in dem Falle, wo diese Nervenverderbung wieder vergeht. 6) Steht meist die Größe des Nerven mit der Größe seines Muskels im Verhältnisse, wenn man das Herz die Augen = Zungen = und Ohrmuskeln ausnimmt. *.

Allein eben diese Kleinheit der Nerven des Herzens macht den wichtigsten Einwurf gegen diesen Schluß, da man, falls die Reizbarkeit von den Nerven abhinge, erwarten sollte, daß dieser allerreizbarste Theil auch die meisten Nerven haben müßte *.

S. 45.

Wie es aber geschieht, daß die Nerven diese besondere Aeußerung der Reizbarkeit in den Muskelfasern bewirken, ist unbekannt.

S. 46.

Im oder am Nerven selbst, der zu einem Muskel gehört, hat man, während daß er gereizt wird, und im Muskel die Zusammenziehung bewirkt, auch nicht die allermindeste Veränderung entdecken können *, und

*Die Nerven eines gewissen Thiers
während der Reizung sind
fest und elastisch
Stellen sich nicht
von ihm wirklich an
man kann sie in die
gebräuchliche Art bringen.*

*Haller in Gellert
Anat. Sect. 13 P. 2.*

8) Haller d. C.H.F. T. 2. p. 398.

8) S. die Note zum 26. S.

9) Arne mann S. 299. sagt: „In der Ruhe seyn die Nerven weich, beynah wech und schlaff, wie im Leichnam; aber so bald sie wirkten, näherten sich ihre Theile mehr aneinander, würden fester, verb, beynah solide, gerade so, wie die Muskeln. Je heftiger die Convulsionen waren, desto solider schienen die Nerven zu seyn ?



doch muß nothwendig eine Bewegung oder Veränderung in oder um selbigen vorgehen, oder der ganzen Länge nach, vom Orte der Berührung an bis in den Muskel, fortgepflanzt werden.

§. 47.

Auch hat man in entblößten Muskeln des Menschen, während ihrer Ruhe und während ihrer Wirkung, keine Veränderungen wahrgenommen.

§. 48.

Das Hirn scheint nicht just zur Energie der Nerven in den Muskeln oder zur Spannkraft nothwendig zu seyn, indem man Kinder ohne Hirn gebahren werden sieht, die dennoch ihre Muskeln bewegen, z. B. athmen, saugen, schreyen ¹.

§. 49.

Die Reizbarkeit scheint mehr in den gallertartigen, als in den erdigen Bestandtheilen der Muskelfasern zu liegen. Denn 1) hat Gallert Schnellkraft, zittert leichter; Erde aber ist ruhig. 2) Die Muskeln sind

Nach ihm S. 301. haben die Nerven eine lebendige Kraft, auf einen mechanischen Reiz sich zusammen zu ziehen?

G. Prochaska. de carne musculari S. 84. will bemerkt haben, daß ein gespannter Nerve, ohnfehlbarer seine Wirkung als ein schlaffer äußere. Bey den sogenannten Galvanischen Versuchen schien es mir einerley, ob der Nerve gespannt oder ganz schlaff war.

1) Siehe meine Beschreibung und Abbildung einiger Mißgeburten. Mainz 1791. Fol. S. 88.

in Gilbert's Journal Anna X. 499

in Wolff

Gabr Franc Circaud. melle, je que les fibres sont les fibres de Galvani, je ne zitterent point seules

Ann. de Phys. t. 55. p. 402 in 469. 5

Année Gilbert Annalen 13 Band. 2 P.

Durch die Vermittelung

et allmählig
Verderbung
des Ner-
schlänke,
und die
des Her-
sen Schluß,
Nerven ab-
reizbarste
von die be-
in Muskeln
Muskel
ich, und
auch nicht
en?, und
he legen de
wie im Loh-
ihre Zeit
genah bilden
die Condu-
von ja 100?



bey Embryonen und Kindern nur noch bloße Gallert, und doch in diesem Zustande reizbarer, als wenn sie etwas erdiger geworden sind. 3) Polypen, die bloß aus Gallert bestehen, sind selbst fürs Licht empfindlich; erdigere Theile, z. B. die Knochen, zeigen nichts ähnliches ².

Einigen scheint Phlogiston die Quelle der Muskelbewegung ³, Andern scheint der Sauerstoff der Grundstoff der Reizbarkeit zu seyn ⁴.

§. 50.

Hört die Wirkung eines Muskels auf, so wird er wieder schmaler, dünner, weicher, entronzelt, und bekommt das Ansehen, das ein Muskel gewöhnlich nach dem Tode hat.

§. 51.

Die Muskeln werden durch fleisigen, nur nicht übertriebenen, Gebrauch röther, fester, stärker, dicker,

- 2) Nach Hildebrandt scheint die Reizbarkeit von den Erwortheiten, die dem Leime der Muskelfasern beygemischt sind, abzuhängen §. 1041.
- 3) Priestley S. 276.
- 4) Girtanner und Beddoes. Gegen diesen Satz machen Gren, und besonders noch Herdmann on the Causes of animal Life. London 1795. verschiedene sehr wichtige Erinnerungen.

bey Embryonen und Kindern nur noch bloße Gallert, und doch in diesem Zustande reizbarer, als wenn sie etwas erdiger geworden sind. 3) Polypen, die bloß aus Gallert bestehen, sind selbst fürs Licht empfindlich; erdigere Theile, z. B. die Knochen, zeigen nichts ähnliches ².

Einigen scheint Phlogiston die Quelle der Muskelbewegung ³, Andern scheint der Sauerstoff der Grundstoff der Reizbarkeit zu seyn ⁴.

§. 50.

Hört die Wirkung eines Muskels auf, so wird er wieder schmaler, dünner, weicher, entronzelt, und bekommt das Ansehen, das ein Muskel gewöhnlich nach dem Tode hat.

§. 51.

Die Muskeln werden durch fleisigen, nur nicht übertriebenen, Gebrauch röther, fester, stärker, dicker,

2) Nach Hildebrandt scheint die Reizbarkeit von den Muskelfasern die dem Keime der Muskelfasern beyge-

92

contractione. In der vorigen Vorlesung bin gewis schon alles Oxygen aufgeführt
(abstract and unite with it.) ^{zwei} ~~Hydrogen~~ + ~~Oxygen~~ ^{Hydrogen}
von Oxygen.
Kreatur primari 3d.
+) Oxygenate Faunen in Oxygen der Weltball, Pflanzen und Thiere, im den 4. Verfall.
In Oxygen hat sie auffälliger, als die Luftigkeit und die ist die Hypothese.
allein Hand für ist die Hand ^(von 3) hat die Wirkung der
Länge mit Oxygen.
Nur geboren selbst gefallene in der 4. Verfall. ^{Hydrogen} ^{Oxygen}
et die Kreise ^{Hydrogen} ^{Oxygen}
von für Oxygen ^{Hydrogen} ^{Oxygen}



und in den Stand gesetzt, leichter, schneller, richtiger, und genauer zu wirken ⁵.

§. 52.

Trifft man wohl jemals im ganz gesunden Zustande des Körpers Muskelfasern an, die mit beiden Enden an unbeweglichen Theilen so haften, daß sie sich nicht zusammenziehen können? ⁶

Von kränklicher Steifigkeit, Verrenkung oder vom Bruche eines Knochens, wodurch die Muskeln

5) Cheyne. De Infirmorum sanitate tuenda. pag 124. und J. Pugh p. 37.

6) Was Albinus von dem Theile des Steißbeinmuskels p. 50. sagt, der zwischen dem Kreuzbein- und Sitzstücke des Hüftbeines liegt, und bey Erwachsenen unzusammenziehbar scheint, ist kein Einwurf, weil er selbst vermuthet, daß der Theil des Kreuzbeines vorher beweglich war; ferner kann unsere Art zu sitzen schaden. Der *M. anomalus*, den er S. 169 beschreibt, konnte vielleicht auf die Gefäße und Nerven, die auf und unter ihm lagen, wirken; so wie der vorderste Theil des *M. mylohyoideus*, der ebenfalls zwischen dem unbeweglichen Unterkiefer liegt, wenn er wirkt, als ein Hebeband die Zunge in die Höhe bringt.“ Sind beide Endtheile eines Muskels an unbewegliche Theile angewachsen, so wirkt der Muskel auf die nachgiebigen weichen,“ sagt Barth. S. VIII. Wolf glaubt, daß bey *M. triangularis sterni*, bey einem Theil der *M. intercostalium*, bey *M. plantaris* und *palmaris* die Natur nicht ihre Absicht erreicht habe, so wie die Harnblasenschnur des Menschen ein unnützes Analogon von der Harnblasenschnur der Thiere sepe. Acta acad. Petropolit. 1779. P. 2. p. 215.

die Möglichkeit einer Zusammenziehung verlieren, ist hier die Rede nicht.

§. 53.

Auch bemerkt man nicht, daß verlohren gegangene, sichtlich in die Augen fallende Muskelfasern im menschlichen Körper wieder erzeugt werden, oder daß außer der Ausbildung der primitiven Muskelfasern irgend eine neu erzeugt werde, sondern die Lücken werden durch einen anfangs sehr gefäßreichen, darauf harten, unempfindlichen Zellstoff ausgefüllt. 7 Anders verhält es sich freylich bey kaltblütigen Thieren, wo ganze Gliedmassen und Sinnorgane mit allen Muskeln wieder wachsen.

§. 54.

Kommt diese Reizbarkeit auch andern Theilen ^s des menschlichen Körpers außer den sichtbaren Muskelfasern zu?

Uterdings bemerkt man Erscheinungen an der menschlichen Haut, an den Blutgefäßen und Saugadern, welche einer Muskelkraft vollkommen gleich sehen.

Wenn

7) A. J. G. Murray de Redintegratione Partium. Goett. 1787. Tab. I. Deßgleichen O. Huhn de Regeneratione partium. Goett. 1787.

8) S. hierüber so wie über diese Lehre überhaupt. C. L. Hoffmann's gründliche Abh. von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile. Zweyte verbesserte Ausgabe. Mainz 1792.

Wenn wir zum Beyspiel, bey dem Anhören oder Lesen einer Nachricht, erschrecken, uns ein Schauer überfällt, unsere Haut dadurch erbleicht, zusammengezogen und trockener wird, so kann dies schwerlich anders, als durch eine Zurückwirkung des Hirnes auf die Haut und Blutgefäße begriffen werden; denn die Empfindungen durch die Ohren oder Augen machten das Hirn rege, und dies wirkte durch die Nerven auf die Haut zurück, dies ist gewiß. Allein wirkte hier das Hirn durch die Nerven auf die Muskelfasern, die in der Haut oder in den Hautgefäßen liegen, welche Muskelfasern aber nicht nur durchs Messer und durch die bloßen Augen, sondern selbst durchs Vergrößerungsglas ihrer Feinheit wegen unentdeckbar sind? Oder sind die Nerven selbst, in der Haut oder in den Hautgefäßen so eingerichtet, daß sie auch ohne eigentliche Muskelfasern diese Wirkung auf der Haut hervor bringen?

Das Erröthen der Schamhaften, das Erblassen der Furchtsamen, das Glühen der Zornigen, das Erkalten der Traurigen läßt sich auf gleiche Art noch am wahrscheinlichsten erklären.

Die Gallenblase, der Uterus, die Blendung im Auge, die männliche Ruthe, die Gefäße einiger Drüsen zeigen zwar dem Zergliederer keine deutliche Muskelfasern; allein ihre Wirkungen verrathen doch etwas muskelähnliches.

S. Muskellehre.

D

g verlieren, ih
 schen gegn-
 Muskelfasern im
 werden, der
 von Muskeln
 ern die Blöden
 icken, darauf
 füllt. 7 An-
 gen Thieren,
 me mit allen
 dem Theilen
 scharen Mus-
 igh an der
 und Sauge-
 gleich sehen.
 Dem
 Partium. Grot-
 e Regeneratio
 überhaupt. S. L.
 der Enstia-
 ile. Jany ver-



Kommt diese Reizbarkeit auch einigen Pflanzen zu? Die schnell auf eine Berührung folgenden Bewegungen an den Blättern und Stengeln der *Mimosa pudica* ¹, an den Blättern der *Dionaea muscipula* ², *Oxalis sensitiva* ³, *Smithia sensitiva* ³, an den Blattstielen der *Averrhoa carambola* ⁴, an den Blattfäden der *Drosera rotundifolia* und *longifolia* ⁵, am stigma der *Martynia annua* an den ^{7. fig. p.} Zeugungstheilen der *Nigella sativa* ⁶, *Onoclea sensibilis*, an den Staubfäden der *Berberis vulgaris* und des *Heliotropium*, halten einige Physiologen für etwas Analoges. Allein die Erscheinungen beym Schläfe der Pflanzen, z. B. an den Blättern der *Amorpha fruticosa*, und der *Mimosa virgata*, an der Blume der *Mirabilis Jalappa*, ferner das Nicken oder die Drehun-

Rob. Hook.

- 9) Du Hamel Physique des Arbres. Tom. 2. p. 158.
- 1) Ellis Beschreibung der *Dionaea muscipula*. Erlang 1780.
- 2) Garsin Hist. de l'Ac. des sc. de Paris 1780.
- 3) Aiton, Hortus Kewensis. Vol. VIII. p. 496. Tab. 13.
- 4) ^{Rob.} Bruce. Phil. Tr. Vol. 75. ^{for the year 1785} Usteri Magazin 1 Stück p. 96.
- 5) Roth in Usteri Magaz. 2 Stück. p. 27.
- 6) Medicus Abhandlung von der Neigung der Pflanzen sich zu begatten, in den Hist. et Comment. Academiae Theodoro-Palatinae T. 3. S. 116.

gen des Hedysarum gyrans ⁷, scheinen doch andere Ursachen zu haben ⁸.

§. 56.

Bey starkem Verluste der Wärme, oder einer Erkältung ⁹, werden mit dem ganzen Körper auch die Muskeln steif, und zur Bewegung weniger geschickt, bis sie endlich bey noch größerm Verluste gänzlich erstarren.

Hingegen schwächt ein gar zu großer Grad von Wärme die Muskeln auf der andern Seite, indem er sie erschlaft; und der Auflösung in ihre Elemente oder der Fäulniß näher bringt.

§. 57.

Erleichtert mäßiges Fett, das theils zwischen den Muskelfasern liegt, die Bewegung der Muskelfasern, indem es als Zwischenlage oder durch eine

7) Ein Paar sehr schöne Abhandlungen darüber s. in Vogt's Magazin für Physik, Band 6. St. 3. wo gezeigt ist, welchen Einfluß die Electricität auf die Hedysarum hat.

8) ein Paar sehr sinnreiche Abhandlungen über die Reizbarkeit von Girtannern in Rozier Obs. sur l'Hist. nat. et les arts. 1790. Julius und Augustus, vorzüglich Alex. v. Humboldt Flora Fribergensis Berolinæ 1793. in den Aphorismis.

9) Smith in den Phil. Transact. Vol. 78. Art. 12. Conlon praes. Brugmanns diss. de mutata humorum indole a vi vitali L. B. 1789. p. 6. vertheidigt ausführlich die Reizbarkeit bey Pflanzen.

2) S. oben §. 19.

*J. Carradori in An-
Memorie di Matematica
e di Fisica vol. 12. per l'Italiana.
Tome XII. 1805. Modena.*

Vetter

Art von Einöslung das Reiben mindert, oder, indem es den Muskel vom Knochen entfernt, so daß er unter einem weniger spitzen Winkel zu dem Knochen gelangt? Eine Einöslung kann man nicht wohl annehmen; letzteres aber ist nicht unwahrscheinlich.

§. 58.

Zwischen den lebendigen und todten Muskelfasern und Sehnenfasern zeigt sich der Unterschied: 1. daß eine todte Muskelfaser sehr leicht von einem Gewichte zerrissen wird, welches sie mit der größten Leichtigkeit während des Lebens bewegte; 2. daß eine lebendige Muskelfaser nicht so leicht, als eine lebendige Sehnenfaser reißt, hingegen eine todte Muskelfaser viel leichter, als eine todte Sehnenfaser reißt.

Wahrscheinlich widersteht eine lebendige Muskelfaser einer sie trennen wollenden Gewalt durch Annäherung ihrer Grundtheilchen bey der Zusammenziehung (§. 31.) da hingegen die sich nicht zusammenziehende sehnige Faser bloß der Muskelfaser folgt, und so lange ausgedehnt wird, bis sie nachgiebt und reißt. Ja oft brechen eher Knochen, als daß Muskelfasern²

1) Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 503. (Liber XI. sect. 2. §. 39.)

2) Adolph Diss. de commodis ex scapularum mobilitate in homine oriundis. Halae 1759. §. 103. pag. 50.

reissen. Indessen sollen Muskeln doch zuweilen in Krämpfen zerrissen seyn ?.

Auch scheint eine durch die Einwässerung weiß gewordene Muskelfaser nicht schwächer, oder leichter zerreißbar.

§. 59.

Wenn Muskeln in Krankheiten schwinden, werden sie zugleich auch schwächer.

§. 60.

Die Kraft, die eine Muskelfaser von bestimmter Größe, Länge und Dicke bey ihrer Bewegung zu äußern vermag, ist noch nicht genug bestimmt, auch deshalb schwer zu berechnen, weil kaum ein Muskel allein wirkt, und dieser sich nicht vom Körper absondern läßt.

Daß sie aber sehr groß ist, sehen wir bey dem Hüpfen und Springen, wo die Muskeln des Fußes als lebendige Federn die ganze Last des Körpers, eine mehr als hundert Pfund schwere Masse, in die Höhe schnellen, und wieder auffangen; oder hängt man sich mit den gekrümmten vier Fingern, als mit einem Haken auf, so tragen die beiden Fingerbeuger, der gespaltene und der Spalter, die Last des ganzen Körpers, weil

Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 484. Camper de fractura Patellae. 1789.

3) Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 556.

oder, indem
daß er un-
Rochen ge-
wohl anneh-
lich.
den Mus-
Unterschied:
von einem
der größten
2. daß eine
eine lebendige
Muskelfaser
rißt.
Muskel-
nach Annah-
ammenzie-
ammenzie-
folgt, und
t und reißt.
Muskelfasern?
(Liber XI.
arum mobili-
103. pag. 50.



sie allein diese Krümmung verrichten. Sa man sah einen Fall, wo einer an einem Finger über 600 Fuß in die Höhe gezogen ward ⁴.

§. 61.

Alein viele Muskel liegen, wenn man die Knochen als zu bewegende Hebel ansieht, um der äußern Form des Körpers willen nach den Gesetzen der Mechanik nicht zum vortheilhaftesten, sondern z. B. nahe am Ruhepunkte des Hebels, oder unter einem spitzigen Winkel befestigt; von ihrer Kraft geht daher so viel verlohren, als der Sinus totus den Sinus des Winkels zwischen dem Muskel und dem Knochen, an Größe übertrifft. Sie sind deshalb dicker, als sie zur Verrichtung einer gleichen Kraft, bey mehrerer Entfernung vom Ruhepunkte oder weniger spitzem Winkel zu seyn nöthig hätten.

Auch geht etwas an Kraft verlohren, wenn sich Muskelfasern nicht gerade, sondern schief an ihre Sehnen legen.

Ferner muß ein Muskel noch einmal so viel Kraft anwenden, weil er, als ein Seil, das Gewicht gegen den festen Punkt anzieht.

Auch geht manchem Muskel so viel von seiner Kraft ab, als er wegen der Gegenwirkung anderer Muskeln gleichsam vergeblich anwendet.

⁴) Haller Elem. Phys. Tom. 4. pag. 488.

Und doch überwinden sie nicht nur das Gleichgewicht, sondern erzeugen noch einen Ueberschuß von Geschwindigkeit.

Um den spitzigen Winkel der Einfügung zu vergrößern, haben die Knochen an den Gelenken, von denen Muskelfasern kommen, kleine Vorsprünge; oder eigene Knöchelchen in den Sehnen machen, daß die Sehnen sich unter einem größern Winkel, als außerdem der Fall seyn würde, an den Knochen festheften.

Auch kommt einem oder dem andern Muskel, der im ersten Augenblicke seiner Wirkung am meisten zu überwinden hatte, bald darauf die in ihm selbst dadurch geschene Veränderung zu statten, die nach und nach seine Fasern in einen immer weniger spizen Winkel zum Knochen, der bewegt wird, bringt. Auch hilft das Gewicht des Theils selbst, wenn es in Schwung gekommen ist, nun ferner nach.

Diese und andere Umstände müssen bey Beurtheilung der Größe der Kraft eines Muskels in Anschlag gebracht werden.

S. 62.

Um bey der äußeren Gestalt des Menschen diese mannigfaltigen Bewegungen zu bewirken, hat die Natur den Bau der Muskeln in Ansehung der Form, Lage und Verbindung sehr verschieden eingerichtet.

Einige Muskeln sind aus meist geraden, an-

an die Kno-
der äußern
en der Me-
ndern z. B.
nter einem
geht daher
Sinus des
nochen, an
als sie zur
hrerer Ent-
nem Winkel
wenn sich
an ihre
viel Kraft
icht gegen
von seiner
ng anderer



andere aus gebogenen Fasern zusammengesetzt. Einige legen sich schicht- oder blätterweise übereinander; andere kreuzen sich mit ihren Fasern; andere stoßen in sehr spitzen Winkeln zusammen, und laufen auch wohl vereinigt weiter fort; andere entfernen sich, um andere Muskel- oder Sehnenfasern durchzulassen; einige bilden an den Enden Streifen, andere Zipfel; andere bilden, indem sie sich unter einander verflechten, löchrige Netze, andere dicke Säcke. Einige sind durchaus fleischig, andere in der Mitte sehnig; einige sind mehr auf der äußern, andere mehr auf der innern Seite sehnig. Einige setzen sich gerade, andere schief, andere gar queer an die Sehne. Einige setzen sich wie die Fahne am Riele einer Feder an eine, oder an beide Seiten der Sehne. Einige sind strahlenförmig, andere spindelförmig. Einige haben am obern, andere am untern Ende die stärksten oder längsten Sehnen.

An den Stellen, wo gleichsam nicht Raum genug für sie scheint, gehen sie in weit weniger Raum einnehmende Sehnenfasern über, die bey ihrer Dünneheit dennoch hinlängliche Festigkeit besitzen. Viele Muskeln werden in der Gegend, wo sie über Gelenke, besonders die äußere Seite des Gelenkbugs fortgehen, sehnig, vielleicht auch mit deswegen, weil das Fleisch

Die an solchen Stellen unvermeidliche Reibung nicht vertragen konnte. Bey einigen Muskeln ist das Fleisch, bey andern die Sehne länger oder breiter; doch ist überhaupt das Fleisch dicker. Um verschiedne Muskeln liegt eine Sehnenhaut, die seine Kraft verstärkt, weil sie bey der Wirkung dem Fleische widersteht, und es gegen den Knochen drückt. Bisweilen erstreckt sich diese Sehnenhaut bis über die Sehne.

S. 63.

Verschiedene Muskeln stellen, in Rücksicht aufeinander, Gegenwirker, oder Antagonisten, vor. Auch dieser Muskeln Größe wird durch verschiedene Umstände modificirt. So sind z. B. die Strecker der Hand und Finger weit schwächer, als die Beuger, wegen nachdrücklicherer, durch die Beugung als durch die Ausdehnung zu verrichtender Wirkung, und wegen der Einrichtung der Gelenke, welche die gestreckte Hand zur ruhigen Lage macht: Hingegen am Fuße, wo die Streckung wegen des Gehens u. s. f. nachdrücklicher, als die Beugung ist, sind die Beuger weit schwächer, als die Strecker, und vermöge der Einrichtung des Fußgelenks, erfolgt z. B. heym Stehen, die Beugung des Fußes schon durch die Last des Körpers.

Daher auch noch im Leichname auf Zerschneidung eines starken Streckers die Beugung, und auf die Zer-

schneidung eines starken Beugers die Streckung gleichsam von selbst erfolgt.

An andern Theilen vertritt eine andere Einrichtung die Stelle von Antagonisten, z. B. am Herzen und an den Arterien das Blut, an der Harnblase der Urin; im Darmcanal die Speisen, oder das Getränk, oder die Luft; am Thorax die Schnellkraft der Rippen; am Kopfe und an den Hoden die Schwere.

Ruhige Muskelfasern werden durch diese Einrichtung ausgedehnt und gespannt, doch wegen der Beschaffenheit des Gelenks, oder wegen der Festigkeit des Sacks, oder wegen der Stärke des Canals, dem sie eingewebet sind, nur bis auf einen gewissen Grad.

S. 64.

Die Größe der Kraft der Muskeln ist durchaus der Größe ihrer Masse angemessen. Ein unter übrigen gleichen Umständen größerer Muskel äußert daher auch mehrere Stärke als ein kleinerer ⁵.

5) Indessen finde ich, wie ich oben bemerkte, die Muskeln des Augapfels von einem Elephanten ganz ungeheuer voluminös.

Nuzen der Muskeln im Allgemeinen.

S. 65.

Indem auf solche Art die Muskelfasern sich zusammenziehen, sind sie die Werkzeuge aller lebendigen Bewegungen, und aller Stellungen des Körpers. Sie schnellen durch Herz und Arterien das Blut fort, bringen es durch Venen zurück, und befördern diesen Rückfluß, ja die Mischung der Theilchen des Bluts selbst durch ihren Druck auf die Venen, die allenthalben zwischen ihnen und häufig durch sie hinführen. Auf eben die Art befördern sie auch den Fortgang des Eingesaugten. Sie dienen beym Saugen, Trinken, Beißen, Kauen, Fortschaffen der Speisen durch den Darmcanal, und sowohl dem Zurückhalten als endlichen Austreiben ihrer unnützen und schädlichen Reste. Sie helfen durch Erweiterung und Verengerung der Brusthöhle zum Athmen, unterstützen alle übrigen Absonderungen im Kopfe, in der Brust und im Unterleibe, leeren angefüllte Säcke und Behälter aus, schließen Mündungen, verrichten allein durch das Beugen und Strecken der Glieder das Stehen, Gehen, Laufen, Springen, Tanzen, Schwimmen, Sitzen, Niederlegen, Fassen, Heben, Tragen, Stoßen, Werfen, Ziehen, Reißen u. s. w. Sie allein bringen durch Veränderung der Luftröhre, des Mundes und der

Brust Töne, Stimme und Sprache hervor. Endlich befördern sie die Fortpflanzung des Menschen, indem die meisten, wo nicht alle eigentliche Muskeln, bey dem Beyschlafe dienen, und die Geburt unterstützen.

Abtheilung der Muskelfasern.

§. 66.

Bis jetzt ist die Abtheilung der Muskeln nach zu willkürlichen und gar nicht festen Grundsätzen bestimmt worden.

Wittig sollte man bloß diejenigen Fleischmassen unter dem Namen eines für sich bestehenden Muskels begreifen, die sowohl für sich als mit ihren Sehnen ringsum von allen andern abgegrenzt liegen; z. B. der viereckige Vorwärtswender der Hand, oder die sieben Muskeln in der Augenhöhle, oder Muskelfasern, die zwar an einem Ende getrennt liegen, mit dem andern aber in eine gemeinschaftliche Sehne zusammenkommen; z. B. der Brustmuskel, der breite Rückenmuskel, der zweybäuchige Armmuskel, welche daher zusammengesetzte Muskeln heißen, oder die ein zusammenhängendes unzertrennliches Fleisch, aber gespaltene Sehnen haben; z. B. die Strecker der Finger.

Alein man trennt an verschiedenen Stellen Mus-
 kelfasern, die nicht nur in eine gemeinschaftliche Sehne
 zusammenkommen (den vierbändigen Kniestrecker in
 den Rectus femoris, Cruralis femoris, und einen
 Vastus externus, Vastus internus, den Wadenmuskel
 in den Gemellus und Soleus); sondern auch die selbst
 als Muskelfasern unzertrennlich zusammenhängen, den
 Sternomastoideus vom Cleidomastoideus, den Lon-
 gissimus dorsi vom Sacrolumbalis, welches beydes
 nach dem Grundsatz, den man z. B. bey der Be-
 stimmung des Biceps annahm, nicht seyn sollte.

Auf gleich willkührliche Art theilt man die sehr
 mit einander verwebten Muskelfasern im Gesichte zu
 einzelnen Muskeln ab ⁶.

Benennung der Muskeln 7.

S. 67.

Die Namen der einzelnen Muskeln werden von
 sehr verschiedenen Eigenschaften hergenommen; z. B.
 von ihrer Wirkung, Strecker (Extensor); von den
 Befestigungsörtern ihrer beyden Enden,
 Hakenarmmuskel (Coracobrachialis); oder von dem
 unbeweglichen Befestigungsorte allein, ^{oder Turgor (Heros)}
^{Flu-}

- 6) Ich habe, so viel ich konnte, dies zu verbessern gesucht.
- 7) Die Synonymen der Muskeln findet man am vollstän-
 digsten bey Albinus.

*Da in der ersten Auflage, nach Ansehen der, die von der Willkür abhängigen
 Befestigung bald Media bald Turgor vorkommt, so die Muskeln an denen
 in der ersten Auflage Madam auf der, so bald sich auch keine Befestigung mit Turgor
 vorkommt in der ersten Auflage. Gilt es für die Turgor der Turgor
 in der ersten Auflage — In der ersten Auflage dieser Auflage ist die
 in der ersten Auflage der Madam auf der Seite 1805 2. Aufl., die die
 in der ersten Auflage einer neuen Auflage der Auflage von der Auflage
 bey der Auflage der Auflage*

gelmuskel (Pterygoideus); oder allein von dem beweglichen, Handsehnenspanner (Palmaris); von irgend einer auszeichnenden Eigenschaft, Zwerchmuskel (Diaphragma); vom Verlauffe, umgeschlagener (Circumflexus); von der Richtung der Fasern, schräger (Obliquus); von der Form, deltastörmiger (Deltoides); von der Zahl der Bäuche, zweybäuchiger (Biceps); von dem Bezuge auf andere, äußerer (Externus); von dem Verhältniß ihrer Durchmesser, platt, länglich, (planus oblongus); von der Rücksicht auf die Sehne, halbschniger Semitendinosus); endlich von der Größe, dicker (Vastus). *großer, kleiner (major, minor)*

ganzes, gerades
vierfüßig (quadratus)
halbförmig, röhrenförmig
einseitig, doppel
superior, inferior

Offenbar ist der erste oder zweyte Benennungsgrund der beste, der letzte der schlechteste. Allein es ist sehr schwer, einen jeden Muskel nach der Wirkung oder den Befestigungörtern zu benennen, ohne daß der Name zu lang würde.



Beschreibung der Muskeln.

S. 68.

Gemeiniglich fängt man die Beschreibung eines Muskels mit demjenigen von seinen Enden an, das an einem unbeweglichen, oder doch weniger beweglichen Theile haftet, welches man auch wohl den Anfang, den Ursprung oder den Kopf nennt; und schließt mit dem Ende, das am beweglichen Theile haftet, welches man die Einfügung, Ansetzung, Insertion, oder das Ende nennt.

Bey verschiedenen Muskeln ist dies völlig willkürlich, indem beyde Enden des Muskels an Theilen haften, die in gleichem Grade beweglich sind. Daher man auch findet, daß ein Physiologe dasjenige Ende für den Ursprung angiebt, was ein anderer die Einfügung des Muskels nennt.

Da viele Muskelfasern spulsförmig oder an beyden Enden zusammengezogen aussehen, so nennt man gemeiniglich den mittlern oder dickern Theil den Bauch, oder den Körper des Muskels.

Die Wirkung eines einzelnen Muskels wird so beschrieben, daß man sich die Knochen oder die Theile, an denen er liegt, in der Ruhe und nachgebend vorstellt, soviel es nämlich die Gelenke, Bänder oder sonstige Einrichtungen gestatten *.

8) Um die Bestimmung der Wirkung der Muskeln hat sich,

m be
von
verch
unge
der
del
uche
f an
niff
on-
als
ße,
unge
n es
ng
af



Symmetrie der Muskeln.

§. 70.

Die meisten Muskeln sind doppelt, oder paarig und symmetrisch gebaut. Daher auch die Beschreibung eines rechten Muskels für die Beschreibung des gleichnamigen linken gilt.

Einfach ist gewöhnlich der Muskel des Zäpfchens, der Queermuskel der Schnepffknorpel, der Schließer des Mundes und der innere und äußere Schließer des Afteres; einigermaßen auch der Zwerchmuskel. Diese wenigen einfachen oder unpaarigen Muskeln liegen gerade in der Mitte des Körpers, und können also in eine rechte und linke Hälfte getheilt werden, obgleich die Natur keine Abscheidungsmerkmale machte. Bloss männliche, und bloss weibliche Muskeln.*

§. 71.

Dem männlichen Körper sind eigen: die Hodenmuskeln und Harnschneller, die Zusammendrücker der Vorsteherdrüse und Ruthenaufrichter, welche letztern sich doch mit den Aufrichtern des Ritzlers vergleichen lassen.

Dem weiblichen Körper sind eigen: die Schnürer der Scheide und Aufrichter des Ritzlers.

außer dem großen Albinus, vorzüglich Winslow in seiner Exposition anatomique verdient gemacht.

*) Ich vermuthe daß es in den Muskeln bestimmte Geschlechtsunterschiede giebt. Die Data die ich bis jetzt herausgebracht habe, scheinen mir noch nicht zahlreich genug, um etwas darüber mit Sicherheit bestimmen zu können.

Sehnen oder Glehfen, oder Bänder der Muskeln.

S. 72.

Bei weitem die meisten Muskelfasern des menschlichen Körpers hängen ganz unzertrennlich mit sehnigen Fasern zusammen, und werden daher auch nicht in der Beschreibung der einzelnen Muskeln übergangen.

S. 73.

Allgemeine Eigenschaften der sehnigen Fasern, besonders in Rücksicht der muskulösen, sind: daß sie weniger feucht, dichter, zäher, fester oder härter, elastischer, undurchsichtig, hellweiß oder silberglänzend, und überhaupt feiner scheinen, sehr viel feinere und kleinere Blutgefäße besitzen, und wegen des Mangels an Nerven weder Empfindung, noch Reizbarkeit zeigen.

S. 74.

Die Fasern der Sehnen haben mit den Fasern der Knochenbänder, oder Gelenkbänder so vollkommene Uebereinkunft, daß sie sich von selbigen bloß durch ihre Verbindung mit den Muskelfasern, und durch ihre Form unterscheiden lassen. Wo Sehnen und Gelenkbänder mit einander verwebt sind, kann man sie gar nicht von einander unterscheiden. Auch sind

S. Muskellehre.

Ⓔ

im Grunde die Sehnen wahre Bänder der Muskeln. An einigen Stellen erscheinen die Sehnenfasern, wo sie über einen Knochen laufen, härter, als an andern Stellen, oder gleichsam knotig. So z. B. am hinteren Schienbeinmuskel.

§. 75.

Näher betrachtet haben ganz frische sehnige Fasern ein eigen gestaltetes, geknicktes, oder einigermaßen dem Spiralbaue der Nerven ähnliches Ansehen.

§. 76.

Nach dem Gefühl zu urtheilen scheinen sie die härtesten Theile nach den Knochen.

§. 77.

Alle Sehnen der Muskeln zeigen nach den Knorpeln die meiste Schnellkraft. Daher sie an verschiedenen Stellen von der Natur durch sehr feste Ringe, wie durch Klammern, in ihrer Lage erhalten werden.

§. 78.

Durch mäßige Einwässerung schwellen sie an, und lassen sich in Bädern auseinander ziehen⁹; diese Bäder liegen meist parallel oder bündelweise, durch Zellstoff fester und dichter, als die Muskelfasern, mit einander verbunden. Mehrentheils sind die Hauptfäden der Sehnen nicht verwebt oder verflochten, son-

*Die Fasern von altem
Menschen sind sehr
gering, von jungen Frauen
mehr, von Kindern am
stärksten.
Hauptfäden...*

⁹) Albin, annot. acad. lib. 4. tab. 5 fig. 2.

— 67 —

der neben einander liegend. Fortgesetzte Einwässerung aber löst endlich die ganze Sehne in Zellstoff auf.

Nicht sowohl zwischen den einzelnen Fäden, als um die ganze Sehne liegt Fett.

Auch sind die Sehnen meist mit einer Art von dünnen Scheide überzogen.

§. 79.

Die Farbe der gesunden Sehnen ist silberglänzend weiß, bläulich, oder grünlich schillernd; gleichsam atlasartig.

§. 80.

In Rücksicht der Muskelfasern haben sie ohne allen Vergleich feinere und weniger Blutgefäße, die ihnen von den benachbarten Theilen zukommen, und ein Netz mit viel größern Maschen bilden, das sie überall durchzieht.

Kinder zeigen verhältnißmäßig reichlichere Blutgefäße auf ihren unvollkommenen Sehnen.

§. 81.

Saugadern sind an vielen Stellen auf den Sehnen deutlich.

§. 82.

Allein Nerven hat niemand, selbst für die allergrößten Sehnen, mit Ueberzeugung dargelegt.

Auch durch Versuche an lebendigen Menschen kann man nicht auf Nerven schließen, weil ein Stechen

Schneiden, Betupfen mit Schärfen, oder Brennen der reinen Sehne, im gesunden Zustande, schlechterdings keine Empfindung oder Zusammenziehung bewirkt, sondern sie folgen den Muskelfasern bey der Bewegung wie leblose Seile.

Zusammenhang der Sehnen mit den Muskeln.

§. 83.

An verschiedenen Stellen, besonders bey sehr fleischigen und starken gesunden, plötzlich gestorbenen Personen, sehen die Muskelfasern von außen her wie aufgeleimt auß, und verlieren sich nicht allmählig in die Sehnen, sondern gehen hügelig, wie ein breiter Leimtropfen in die Sehne über, so daß man die Gränzen zwischen Muskel- und Sehnensubstanz auf den ersten Blick ganz deutlich wahr nimmt. Dieses hügeliche Ansehen nimmt man in Personen, die lange krank lagen, wenigstens nie deutlich wahr.

§. 84.

An andern Stellen sieht die Muskelsubstanz gleichsam wie zwischen einen Pinsel von sehnigen Fasern gegossen auß; oder die sehnigen Fasern verlieren sich so unmerklich wegen ihrer Verfeinerung zwischen den Muskelfasern, daß man gar nicht gewahr wird, wo sie anfangen, oder wo sie sich endigen; sie setzen daher die Form des Muskels ununterbrochen fort: In beyden

Falten aber zeigen sie sich, sobald man sie gewahr wird, als ein von Fleisch- oder Muskelfasern ganz verschiedenes Wesen. Doch sind sie allemal dünner, meist auch schmaler, als diese Fleischfasern.

An andern Stellen haften unter spitzen Winkeln die Muskelfasern an den Sehnen und bilden die sogenannten gefiederten Muskeln (§. 352.).

§. 85.

Sehnen trennen sich an einigen Stellen durchs bloße Kochen ganz von Fleischfäden, so wie sich die Oberhaut vom Leder der Haut trennt ¹.

§. 86.

Die Sehnen junger Kinder sind von den Sehnen der Erwachsenen, wie die Muskeln verschieden, doch allemal vorhanden, ja an einigen Stellen selbst verhältnißmäßig größer, als in Erwachsenen.

§. 87.

Es ist daher ungegründet, daß einige sehnige Fasern aus verhärteten fester gewordenen Muskelfasern entstehen ²; denn wenn sich auch Muskelfasern verhärteten, so erhalten sie ein ganz anderes, als sehniges

1) Mery. bey du Hamel in der Hist. de l'Acad. roy. de Paris Lib. 4. sect. 7. Cap. 7.
2) Adolph Murray de Fascia lata Ups. 1774. erörtert dies schön. S. die Noten zum 397. S. meiner Uebersetzung von Hallers kleinen Physiologie.

Brennen
schlechter-
ziehung
a bey der

Muskeln.

bey sehr
orbene
her wie
nählig in
in breiter
die Grän-
auf den
es hüge-
e lange

ns gleich-
en Fasern
sieren sich
ischen den
wird, wo
en daher
a bey den

Unsehen; ferner ist dies an denjenigen Muskeln völig unmöglich, wo die Fleischfasern eine ganz verschiedene Richtung von den Sehnenfasern haben. Auch werden eingewässerte Muskelfasern bleich, aber nie glänzend; auch nähert sich bey der Einwässerung die Sehnenfaser weit mehr, als die Muskelfaser dem Zellstoffe.

Das Fleisch löst sich bey der Einwässerung sehr ein, zelleförmig, während die Sehnenfasern sich nicht auflösen, sondern nur aneinander haften.

§. 88.

Verlohren gegangene Sehnen werden nicht wieder ersetzt; ihre Wunden heilen mit Narben.

*Wundheilung in Sehnen
Sitzung für Vergleichung
Kunst. Leipzig 1800. 4te. Band 27.
Pass.*

Chemische Zerlegung der Sehnen.

§. 89.

Die chemische Zerlegung der Sehnen fehlt noch vom Menschen. Von Thieren zeigt eine Sehne fast dieselben Bestandtheile, als das Fleisch, doch hält die Kohle kein Salz.

Zusammenhang der Sehnen mit anderen Theilen außer den Muskeln.

§. 90.

Bey jungen Kindern verlieren sich die Sehnen an die Knorpel- oder Knochenhaut; bey Erwachsenen hingegen sind ihre Fasern so fest mit den Knochen selbst, besonders an verschiedenen Höckern derselben verwachsen, daß sie zugleich mit ihren Gefäßen die Weinhaut

vorstellen, und sich daher auch nicht mehr rein von diesen Stellen absondern lassen.

Außer dem verlieren sie sich bald an Membranen, z. B. am Augapfel; bald an Häute, bald an Gelenkkapseln, bald an Bänder.

Form der Sehnen.

§. 91.

Ist die Gestalt der sehnigen Fasern, die mit den Muskelfasern unzertrennlich zusammenhängen, lang, schmal, und rundlich, so heißen sie rundliche Sehnen oder Flechsen; sind sie mehr flach, dünn und breit so heißen sie Aponeurosen, oder sehnige Häute oder sehnige Ausbreitungen, oder Flechsenhäute; liegen sie um den Muskel, heißen sie Muskelscheiden oder Binden.

§. 92.

Einige Sehnen sind von anderen gleichsam gespaltenen Sehnen umfaßt. Einige bleiben einfach andere sind ästig, und begeben sich durch Mittelstücke mit anderen zusammen. Einige laufen gerade aus, andere schlagen sich um eine Rolle. Einige liegen ziemlich frey, so, daß sie sich leicht unter der Haut verschieben lassen, andere liegen sehr genau in harten Scheiden und festen Riugen, oder eigenen Haltbändchen eingeschlossen, oder eingeschränkt. Einige liegen wie eine

Fasern vörlig
schiene
werden
länzend;
Fasern
ffe.

icht wie

en.

fehlt noch
sehne fast
Doch hält

deren

Sehnen
wachstüm
nen selbst,
verwach
Seinhaut

Nacht zickzackartig zwischen dem Fleische, andere nehmen Knöchelchen in sich auf.

§. 93.

An den mehrsten Stellen haften die Sehnen sowohl unter einander, als mit den benachbarten Theilen durch sehr lockeren Zellstoff zusammen.

§. 94.

Wo Sehnen dicht über den Knochen laufen, ist dieser mit einer Knorpelscheibe überzogen.

§. 95.

An andern Stellen, wo die Sehnen unmittelbar über Knochen laufen, liegen sie ringsum mit einem Schleimsacke umgeben, und sind hier meist ganz abgefondert und glatt; an Stellen, wo diese Schleimsäcke groß oder lang sind, begiebt sich aus ihrer Mitte ein Gefäßbändchen an die Sehne, um ihr Blut zu- und abzuführen.

Da bey der Beschreibung der einzelnen Muskeln diese Schleimsäcke vorkommen, so wird die Kenntniß ihrer allgemeinen Eigenschaften vorausgeschickt.

Allgemeine Bemerkungen über die Schleimsäcke ³.

§. 96.

Schleimsäcke, Schleimbeutel, Schleimbläschen oder Schleimscheiden (Bursae mucosae, Vesicae unguinosae, Mucosae tendinum capsulae)

*Inflam. d. B. d. Sehnen
Flüssigkeit im Gelenke*

3) Jancke de Capsis tendinum articularibus. Lips. 1753. 4. — Haase Diss. de unguine articulari. Lips. 1774. 4. Desselben Progr. de adminiculis motus muscularis. Lips. 1785. 4. — Fourcroy Memoire des Tendons dans lequel on s'occupe specialement de leurs capsules muqueuses in der Hist. de l'Acad. roy. des sciences Paris für 1785. sechs Abhandlungen bis 1787. — Das trefflichste Werk über diese Schleimsäcke ist Monro Description of all the Bursae mucosae of the human Body etc. Edinb. 1788 in Fol. wo alle von ihm beschriebene in natürlicher Größe abgebildet sind, so daß man mit einem Blick ihre Lage, Gestalt und Größe wahrnimmt, welches durch eine bloße Beschreibung nicht zu erreichen ist. Doch muß man hinzufügen, daß sie sich nicht bloß an den Gliedmaßen finden, da der Circum flexus Palatii, obliquus superior Oculi selbst die Sehnen des Biventer Maxillae, des Sternohyoideus, des Stylohyoideus, und bisweilen auch die Brustportion des Zwerchmuskels mit solchen Schleimsäcken versehen sind. Auch zwischen dem Saamenstrang und dem Schaambeine findet sich ein Schleimbeutel, den mein Schüler H. Schenzer, entdeckte. Fr. Ern. Gerlach Praes. A. F. Nürnberger de Bursis tendinum mucosis in capite et collo reperiundis. Viteb. 1793. 4. c. tabb. Enthält außer dem auf dem Titel Angegebenen die Hauptsachen von

*1813
zwischen dem
obliquus superior
Oculi und dem
Biventer Maxillae
Sternohyoideus
Stylohyoideus
Zwerchmuskels
Schenker*

*zwischen dem Kopf
und Hals
Muskel
A 30 May 1812*

Derer neh
sowohl
Theilen
fen, ist
mittelbar
einem
abge
Schleimsäcke
Mitte ein
zu und
auskeln
antriff
ft.



lae, Capsulae synoviales), bestehen aus einer eigenen Haut, die eine ringsum geschlossene, meist für sich bestehende Höhle, eine Tasche oder einen Sack bildet.

Sie liegen entweder bloß zwischen der Haut und einer Sehne, z. B. ein ansehnlicher zwischen der Haut und der Sehne, welche den Ellenbogenknorren bedecken oder der innern Seite der Sehne und dem Knochen, blasenartige Schleimsäcke (Bursae mucosae vesiculares), oder sowohl zwischen der inneren Seite der Sehne und dem Knochen, als der äußeren Seite und den äußeren Theilen, überziehen die Sehne an dieser Stelle der ganzen Länge nach, und sind freyer oder lockerer, scheidenartige Schleimsäcke (Bursae mucosae vaginales). In jungen Leuten sind sie weiter oder größer, auch zahlreicher, weil einige sich mit den Jahren zu schließen scheinen.

Einige liegen zwischen den Sehnen und den äußeren Theilen, andere zwischen benachbarten Sehnen, oder

den Schleimsäcken und die vollständige Litteratur. Die Beschreibungen sind sehr genau, und die Abbildungen sehr schön. Ch. M. Koch Diss. anat. physiol. de Bursis tendinum mucosis. Lips. 1789. in 4. so wie die zweite de Morbis Bursarum tendinum mucosarum. Ebd. 1790. ist wegen der gesammelten Litteratur mancher eigenen Bemerkung und Berichtigung der Nomenclatur schätzbar. Monro's Werk hat H. Rosenmüller lateinisch übersetzt und mit eigenen Kupfern, Anmerkungen und Litteratur sehr bereichert.

zwischen den Sehnen und Gelenkbändern; oder in den Sehnen selbst 5.

Wenige finden sich an Stellen, wo ein Knochenfortsatz auf einem Gelenkbande, oder einem andern Knochen spielt. Eine kleine nämlich zwischen der Spitze des Hakens am Schulterblatte und der Gelenkkapsel der Achsel 6; desgleichen eine ansehnliche hinter dem Kniescheibenbande 7.

Liegen zwey oder auch mehrere Sehnen nahe bey einander, die nachher voneinander gehen; so findet sich ein gemeinschaftlicher Sack, der sich in Aeste theilet.

Einige stehen bisweilen, doch nicht allezeit, mit einer Gelenkhöhle oder mit andern Schleimbeuteln in Verbindung; andere scheinen nur durch vielen Gebrauch und starke Reibung, doch ohne weitere Kranklichkeit, mit der Gelenkhöhle in Verbindung zu kommen. Einige sind sehr beständig, andere unbeständig. Einige bisweilen einfach, bisweilen inwendig getheilt oder förmlich doppelt.

§. 97.

Die Haut, woraus ein Schleimsack besteht, ist

- 5) Eine solche sah Fourcroy in der Sehne des großen runden Muskels.
- 6) Monro Tab. I. L.
- 7) Monro Tab. 3. c. Tab. IV. K. M.

auf ihrer innern Seite eben, glatt, und äußerst schlüpfrig, übrigens dünne, durchsichtig, doch sehr dicht, und im Stande, Luft zu halten.

Werden sie aufgeblasen, so schwellen sie an, und zeigen sich eysförmig auch wohl in etwas zellig.

Mit den benachbarten Theilen ist diese Haut durch Zellstoff verbunden. Gewöhnlich liegt zwischen ihr und der Knochensubstanz entweder ein dünnes Knorpelscheibchen, oder eine dichte Membran.

Einige sind so fest mit den Theilen verbunden, daß sie sich schwer absondern lassen, und gleichsam aus einer fast sehnigen Haut bestehen.

Die Haut der scheidenartigen Schleimsäcke hingegen ist meist weicher als der blasenartigen; auch dünnerhäutig, und gleichsam schleimig.

Wo die Haut an der Sehne oder am Knochen angeheftet ist, lassen sie sich fast gar nicht absondern, oft so wenig, daß sie fast aus der Beinhaut oder Sehne selbst gebildet scheinen. Am übrigen Umfange lassen sie sich leichter löstrennen.

Die blasenartigen Schleimsäcke sind kleiner, rundlich oder eysförmig, und lassen sich leicht ausschälen. Gemeiniglich hängen sie mit den Theilen, auf denen die Sehnen liegen, fester als mit den Sehnen selbst zusammen.

Liegen mehrere Schleimsäcke dicht aneinander, so werden sie von einem allgemeinen Schleimsacke umgeben, so daß man bisweilen mehrere (bis vier Lagen) nach einander abschälen kann.

Auf der Außenseite des Schleimsacks liegt Fett, ausgenommen, wo er eine Sehne, oder einen Knorpel, oder einen Knochen, die einem Drucke oder dem Reiben sehr ausgesetzt sind, schützt.

Innerhalb der Höhlen der Scheidenschleimsäcke finden sich dünne, doch mitunter härtsliche, elastische, fast sehnige, Fortsetzungen, welche zur Leitung der Gefäße dienen (S. 396).

Selbst ohne künstliche Anfüllung, noch mehr aber nach einer künstlichen Anfüllung, entdeckt man in dieser Haut zahlreiche Blutgefäße.

Bisweilen zeigen sich in einigen Schleimsäcken weiche schleimige Körper, die mit einer feinen Haut überzogen sind, z. B. am Brustmuskel, an der Sehne des zweybäuchigen Armmuskels.

In verschiedenen, besonders den größern Schleimsäcken, findet sich ein größeres oder kleineres Fettklümpchen, welches von der Haut des Schleimsacks überzogen ist, die an dieser Stelle von vielen Blutgefäßen roth, und an den Enden fransig erscheint ⁹.

8) Monro Tab. VIII. sowohl in natürlicher, als auch durch Gläser vermehrter Größe.

Prüfung...

Wieder...

Doch findet man in Abgekehrten bisweilen selbst die Schleimsäcke, die sonst das meiste Fett hatten, ganz fettlos.

Uebrigens erkennt man in ihnen nichts drüsenartiges.

§. 98.

Drückt man diese Fransen, die man auch in den Gelenkhöhlen am Fette antrifft; so bemerkt man eine aus ihnen kommende schlüpfrige Feuchtigkeit, die folglich Ausführungswerkzeuge in selbigen verräth.

Diese Feuchtigkeit scheint, so wie die Gelenkschmiere, ohne Drüse abgesondert zu werden.

Sie entspringt durch die aushauchenden Arterien, durch die Gänge in den Fransen, und das Del, das durch nicht ganz deutliche Mündungen aus den Säckchen schwitzet.

Diese Mündungen müssen sehr fein seyn, weil das Del der Gelenkschmiere mit dem Schleime so genau vermischt ist, daß man es selbst durchs Vergrößerungsglas nicht in der Form von Kügelchen wahrnimmt.

Bisweilen erscheint dieser Saft im lebendigen Menschen, bey der Oeffnung der sogenannten Oberbeine (welche nichts anders als Anfüllungen dieser Schleimsäcke sind), als eine dünne, durchsichtige, goldgelbe Gallerte. Sie wird wahrscheinlich durch Saug-

adern wieder eingesogen und weggeführt, weil sie sonst stocken und faulen würde.

In kleinern Schleimsäcken scheint der Schleim dünner, weißer, flüssiger, weniger schmierig, als in größern.

Frisch (vom Ochsen) untersucht, wird diese eiyweissartige Feuchtigkeit von schwacher Vitriolsäure trübe; aber nicht coagulirt; allein starker Weingeist macht sie gerinnen. Mit Wasser vermischt sie sich leicht, macht es aber weißlich. In Kochhitze wird sie undurchsichtig und zähe, doch ist des Geronnenen wenig. Den Weilschensaft färbt sie bisweilen grün. Sie trocknet zu einer zähen, leichten Kruste aus, die wie ein Scheibchen Horn brennt.

Dhngesähr eben so verhält sie sich auch im Menschen, wo sie noch näher untersucht werden sollte.

Wahrscheinlich wird ihre Absonderung durch die Bewegung der Sehnen befördert.

Der Nutzen dieser Schleimbeutel und des in ihnen enthaltenen Schleimes ist klar. Sie mindern nämlich, indem sie die Sehnen schlüpfrig, feucht und weich erhalten, die Reibung, und erleichtern also die Bewegung; scheinen auch an einigen Stellen ihren Saft selbst in die Gelenkhöhlen zu ergießen. Schwerlich helfen sie die Sehnen in ihrer Lage erhalten.

en selbst
hatten,
drüsen
in den
an eine
ie folge
chmie
arterien,
el, daß
Säul
weil
so ge
röße
wahr
digen
Obers
dieser
gold
Saug



Die ganze Beschaffenheit dieser Schleimsäcke kommt mit der Beschaffenheit der Gelenkkapseln so sehr überein, daß sie an einigen Stellen beständig miteinander in Gemeinschaft stehen, und von einander bloß durch den Ort unterschieden werden können. Insbesondere gleichen sie sich in folgenden Stücken:

- 1) Die Haut, woraus beide, sowohl eine Gelenkkapsel, als ein Schleimsack gebildet sind, ist inwendig dünn, glatt und schlüpfrig.
- 2) Beide werden mit den äußeren Sehnen und Bändern durch den allgemeinen Zellstoff verbunden.
- 3) Zwischen beiden und den Knochen liegen Knorpelüberzüge, oder die Knochenstelle, die sie überziehen, ist mit Knorpel bedeckt.
- 4) Bey beiden verbindet sich an den Seiten, die nicht stark gedrückt oder gerieben werden, die Fettsubstanz mit dem Zellgewebe der übrigen Theile.
- 5) Innerhalb ihrer Höhlen finden sich gleiche fransenartig auslaufende Fettklumpchen, die bisweilen sogar beiden gemeinschaftlich sind. — Im Kniegelenke z. B. geht der obere Theil dieses Fettklumpchens ins Kniegelenk, und der untere Theil in den Schleimsack hinter dem Kniescheibenbande.
- 6) Die Organe, die die schlüpfrige Feuchtigkeit absondern, zeigen in beiden gleiche Beschaffenheit.
- 7) Auch

7) Auch zeigt diese schlüpfrige Feuchtigkeit in beiden einerley Dicke, Farbe und übrige Beschaffenheit, und verhält sich, chemisch untersucht, auf die nämliche Art.

8) In alten Leuten findet man oft mittelst eines, wahrscheinlich durchgeriebenen Lochs, Schleimsackhöhle und Gelenkhöhle in Verbindung, ohne Schmerz oder Steifigkeit zu verursachen, welches wohl nicht seyn könnte, wenn sie wesentlich voneinander verschieden wären.

9) Beide zeigen im gesunden Zustande wenig Empfindlichkeit, aber sehr große im kränklichen; z. B. bey der Entzündung.

10) Auch bemerkt man an beiden gleiche Krankheiten aus gleichen Ursachen. So bilden sich z. B. in beiden knorpelige Körperchen, welche anfangs mittelst der Gefäßbändchen, durch welche sie erzeugt und erhalten werden, befestigt sind, nach Zerstörung aber derselben, rings um frey werden.

S. 100.

Mit andern Häuten aber, die geschlossene Höhlen bilden; z. B. dem Brust- oder Bauchfell, dem Herzbeutel und der Scheidenhaut des Hodens zeigen sie weniger Uebereinkunft.

Stirn- und Hinterhauptsmuskel.

Epicranius.

Albinus Tab. XI. fig. 6. 7. I. D. Santorini Tabulae septendecim editae. a Mich. Girardi. Parmae 1775. Tab. I. A. B.

§. 101.

Der Hinterhauptsmuskel kommt mit sehnigen Fasern queer vom Hinterhauptsbeine über den Rückwärtsziehen des Ohrs und dem Kopfnicker, wird bald fleischig, und verliert sich mit einem bogen- oder flammförmigen Umfange in eine flache dünne Sehne, die sich nach vornen zu über die Weinhaut des Schedels legt, bisweilen sich kreuzende Fasern zeigt, und in den flachen Stirnmuskel übergeht.

Die Fasern dieses Stirnmuskels sind an der Ohrseite schwach, kurz und schief, werden dann verschiedentlich länger, stärker und gerader, bis sie allmählig gegen die Nase hin etwas kürzer werden, auch mit denen von der anderen Seite zusammenstoßen.

Sein oberer Umfang ist bogen- oder auch wellenförmig.

Seine Fasern werden theils gegen die Nase hin dünner und sehnig, oder auch wohl in ein Paar Bündel gesammelt, laufen über die Nase, und vermischen sich mit den Zusammendrückern der Nase; theils

9) Man könnte diese Fasern fast als einen besondern Muskel und Gegenwirker des Stirn- und Hinterhauptsmuskels ansehen. Bell p. 193.

*Descending slip of the
occipito-frontalis.
Charles Bell. Essays - on
Expression Ed. 2. Lond
1824 p. 36.*

werden sie mit dem Aufheber der Oberlippe und des Nasenflügels, dem Augenbraunrunzler und Augenschiedschließer vermischt, theils setzen sie sich ans Stirnbein fest.

Abweichungen.

Bisweilen soll sich der Stirnmuskel über den ganzen Schedel hin erstreckt haben ¹. Bisweilen hängen die Hinterhauptsmuskeln mit dem Rückwärtszieher des Ohr zusammen. Bisweilen sind die Hinterhauptsmuskeln sehr klein, ja bisweilen sollen sie gefehlt haben ².

Wirkung.

Da beide Muskeln überall sehr fest an die Haut geheftet sind, so ziehen die Stirnmuskeln die Haut der Stirne, der Augenbraunen, und selbst der Nase nach oben und außen, runzeln die Stirne, und unterstützen den Aufheber der Oberlippe und des Nasenflügels. — Die Hinterhauptsmuskeln ziehen die Kopfschwarte nach hinten, entrunzeln die Stirne, und bewirken den Ausdruck der Heiterkeit. — Sind diese Muskeln sehr stark, so sieht man deutlich bey ihrer Bewegung das Haupthaar sich mit bewegen oder sträu-

1) Mayer, Band 3. p. 159.

2) Haller. Elementa physiologiae Tomo 5. p. 34. Lib. XVI. r.

ben. — Der Stirnmuskel wirkt bey dem Aufschauen und Erschrecken, verräth Nachdenken und Sorgen.

Aufwärtszieher des Ohrs.

Attollens auriculam.

Albinus Tab. XI. fig. 6. 7. Santorini am angezeigtem Ort. Tab. 1. c. *Seebezeichnung. Tab. 1.*

§. 102.

Liegt mit seinen zarten, anfangs zerstreuten, Fasern, strahlenförmig, über dem Schläfemuskel, auf der Sehne des Stirn- und Hinterhauptmuskels, wird darauf in einen etwas dickern Muskel zusammengezogen; und setzt sich am Ohrknorpel an die Erhabenheit zwischen den Schenkeln der Gegenleiste.

Unter den Muskeln des Ohrs hat er den größten Umfang.

Wirkung.

Zieht das Ohr in die Höhe, besonders wenn der Stirnmuskel zugleich mitwirkt, und spannt die Stelle, an die er sich setzt.

Vorwärtszieher des Ohrs.

Anterior Auriculae.

Albinus Tab. XI. fig. 3. 7. *Seebezeichnung.*

§. 103.

Liegt ebenfalls strahlenförmig auf der Sehne des Stirn- und Hinterhauptmuskels in der Gegend des ^{Stirns} ~~Stirns~~beins, steigt schief abwärts;

und setzt sich am Ohrknorpel an die Erhabenheit auf dem Rücken der Leiste, welche die Muschel abtheilt.

Ist unter den Ohremuskeln der schwächste.

A b w e i c h u n g.

Man sah ihn doppelt. ³

W i r k u n g.

Zieht das Ohr nach vornen und aufwärts, und spannt jene Erhabenheit.

Rückwärtszieher des Ohrs.

Retrahentes Auriculam.

Albinus Tab. XI. fig. 3. *Retrahens*.

§. 104.

Gewöhnlich kommen zwey bis drey, selten vier kleine flache spulförmige Muskelfasern sehnig über dem Kopfnicker vom Zügenfortsatz,

und setzen sich mit ihren rundlichen Sehnen an die hintere obere Erhabenheit der Muschel des Ohrknorpels.

Sie sind die rundlichsten, und in Rücksicht der Kleinheit fleischigsten des Ohrs.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen ist der mittlere der stärkste; doch variiert der unterste am meisten; bald fehlt er; bald ist

³) A. F. Walther in Haller's select. diss. anat. Vol. VI. p. 614.

er so stark und lang, daß er zwischen dem Kappen-
muskel und durchflochtenen Muskel entspringt; bald
geht er hinten zur Muschel; bald schlägt er sich zum
Theil an den Kopfnicker.

Wirkung.

Ziehen das Ohr rückwärts.

Größerer Muskel der Ohrleiste.

Major Helicis.

Albin Eben. fig. 4. a. b.

S. 105.

Liegt an dem Theile der Leiste des Ohrknorpels,
der von der Ecke aufsteigt, ist schmal, und am unter-
ren Ende sehnig.

Wirkung.

Zieht diesen Theil der Ohrleiste herunter und
spannt ihn.

Kleinerer Muskel der Ohrleiste.

Minor Helicis.

Albinus Eben. c.

S. 106.

Liegt tiefer, als der vorige, am Ohrknorpel, an
der Leiste, da wo sie eben aus der Muschel mit einem
kleinen Ausschnitte aufsteigt, ist auch kleiner und an
beiden Enden sehnig.

Wirkung.

Zieht den Ausschnitt der Ohrleiste an dieser Stelle zusammen.

Muskel der Ohrecke.

Tragicus.

Albinus Tab. XI. fig. 4. f. Santorini Tab. posth. I. V.
S. 107.

Steigt von der Ohrecke, mehr lang als breit, und in der Mitte am dicksten zur Muschel hinauf.

Abweichungen.

Zuweilen geht ein Theil von ihm bis zur Ohrleiste, zuweilen vermischt er sich sogar mit dem größeren Muskel der Ohrleiste.

Wirkungen.

Scheint die Muschel des Ohrs an dieser Stelle flacher zu machen, und den obern Rand der Ohrecke nach vornen und außen zu drehen. Gelangt er bis zur Leiste, so zieht er sie herunter.

Muskel der Ohrgegenecke.

Antitragicus.

Albinus Ebd. h. k.

S. 108.

Liegt an beiden Enden sehnig zwischen der Ohrgegenecke und Gegenleiste.

Rappen,
gt; bald
sich zum

ste.

knorpel,
am unte-

ter und

ste.

knorpel, an
mit einem
er und an

Wirkung.

Zieht die Gegenecke gegen die Gegenleiste herunter, krümmt und spannt den Rand der Muschel.

Quer-muskel des Ohrs.

Transversus Auriculae.

Albinus Eben. fig. 5.

S. 109.

Lauft hinten am Knorpel mit kurzen, nicht zusammenhängenden, an beiden Enden sehnigen Fasern quer von der Muschel zur Gegenleiste und elliptischen oder kahnförmigen Grube.

Die obern und untern Fasern sind schwächer, die mittlern stärker. Die Fasern an der Grube sind länger, die an der Muschel kürzer.

Verschiedentlich findet man statt seiner bloß sehnige Fasern.

Gewöhnlich ist er kein zusammenhängender Muskel, sondern besteht in einer bogenförmigen Reihe von Muskelchen.

Wirkung.

Zieht die Furche zwischen der kahnförmigen Grube, der Muschel und der Gegenleiste zusammen.

Größerer Erschlaffer des Paukenfells.

Externus Mallei, Laxator major Tympani.

Albin. vortreflich Tab. XI. fig. 28. b. c. d. fig. 32.

S. 110.

Kommt vom Dornfortsaze des Keilbeins mit einem länglichen Bauche, und lauft mit seiner langen Sehne durch die Spalte zwischen der Gelenkhöhle und dem Hörgange, und sezt sich an den langen Fortsaz des Hammers.

Wirkung.

Zieht den Hammer vorwärts gegen den Hörgang, und erschlafft dadurch das Paukenfell.

Kleinerer Erschlaffer des Paukenfells.

Laxator tympani minor.

Albin Tab. XI. fig. 28. a. und fig. 30. *Spemmering.*

S. 111.

Kommt vom obern und hintern Rande des Hörgangs, an welchem das Paukenfell siht, wird allmählig schmaler, und

sezt sich in- und vorwärts absteigend an den Griff des Hammers, ohnfers seines kurzen Fortsazes; Ist der kleinste Muskel des Hammers.

Abweichung.

Folgt mit seiner Sehne im Paukenfell parallel

te herun-
chel.
s.
nicht zu
Fasern
ptischen
cher, die
sind län
sch
Mus-
Reihe
rmigen
mmen.



dem Griffe des Hammers, bis er sich ohnfern seiner Spitze an ihn festsetzt.

Wirkung.

Indem er den Griff des Hammers vorwärts hinaufzieht, erschläßt er das Paukenfell.

Paukenfellspanner.

Tensor Tympani.

Albin Tab. XI. fig. 28. e. n. fig. 29. a. b. c. d. fig. 32. und 33.

§. 112.

Kommt sehnig von dem obern Theile des Knorpels der Ohrtrompete dicht am Grundbeine, oder auch vom Grundbeine selbst, liegt in einem halb knöchernen, halb bandartigen Canal der Pyramide, ist spindelförmig, und

setzt sich mit seiner aus diesem Canal tretenden Sehne, die nun, wie über eine Rolle geleitet, eine andere Richtung nimmt, an die gegen die Paukenhöhle gerichtete Fläche des Hammers unter dessen spitzern Fortsätze.

Abweichung.

Man sah ihn doppelt ¹.

Wirkung.

Zieht mittelst des Hammers das Paukenfell in

¹) Böhmer obs. rar. Praefat. P. VII.

die Paukenhöhle, und spannt es dadurch so sehr, daß es von außen her sich vertieft. — Wahrscheinlich drückt er zugleich mittelst des Ambosses den Steigbügel von vornen her in den Vorhof des Labyrinth.

Muskel des Steigbügels.

Stapedius.

Albin. Tab. XI. fig. 28. 29. 34.

S. 113.

Liegt mit seinem spindelförmigen und gebogenen Fleische ganz in einem Knochenfutteral der Paukenhöhle, und zeigt bloß seine runde Sehne, die aus dem Knochen hervortritt, und

sich an den hintern Theil des ^{zier} Köpfchens des Steigbügels festsetzt.

Wirkung.

Zieht die Basis des Steigbügels rückwärts in den Vorhof hinein, vorwärts aber aus selbigem heraus; unterstützt also den Spanner des Paukenfells nur von der andern Seite her, um folglich desto gerader den Steigbügel ins ovale Fenster zu drücken.

rn seiner
tts hin
r.
fig. 32.
Knor-
der auch
knöcher-
ist spin-
enden
eine
cken-
dessen
in



Augenliedschließer.

Orbicularis Palpebrarum.

Albin. Tab. XI. fig. 1. — Santorini opus posth. Tab. I. D. D. E. E. meine Icones Oculi humani. Tab. II. fig. 1.

S. 114.

Kommt fehnig vom Stirnbeine, vom Stirnfortsaze des Oberkiefers, und vom Augenliederbände im innern Augenwinkel, vermischt sich mit dem Stirnmuskel, Augenbraunrunzler und Aufzieher des Nasenflügels, wirft sich, mit flachen gebogenen Fasern, rings um die Augenlieder, bis in die Gegend der Augenbraune, der Schläse und der Wange, kehrt wieder an den größern Augenwinkel zurück, um sich fehnig von unten her an das Band am Nasenfortsaze des Oberkiefers fest zu heften. Wie sich feine Fasern von der Spalte der Augenlieder allmählig entfernen, so sind sie durch Fett von einander getrennt und immer dünner. Die Fasern im innern Augenwinkel, die vom Knochen kommen, sind stärker und dichter aneinander liegend; die vom Bande schwächer, aber in eine breitere Fläche ausgedehnt. Zärter sind auch die Fasern, die auf den Augenliedern selbst, unter einer magern Haut, und um den Schliß der Augenlieder etwas gehäuft liegen². Die äußersten Fasern sind gebogener,

Auch Bell
Musculus ciliaris
l. c. p. 37. oder
Abbild. ist in gering. Misp. h. c.

²) Albinus M. ciliaris Tab. XI. fig. 2. scheint doch nur eine Portion von ihm, und kein eigener Muskel.

die innersten am geradesten. Um den äußern Augenwinkel findet man nicht nur sich kreuzende, sondern auch vom Rande der Augenhöhle weiterfortgesetzte Fasern.

Bisweilen gelangt eine kleine Portion von ihm mit dem Aufzieher der Oberlippe, eine andere mit dem kleinen Wangenmuskel zusammenstoßend bis zur Oberlippe ³, eine dritte auch wohl zum Mundwinkel ⁴.

Wirkung.

Bewegt anfangs die Augenlieder gegeneinander, und schließt sie, runzelt und zieht sie sonach gegen den größern Augenwinkel; preßt endlich den Augapfel, und treibt ihn in die Knochenhöhle, woben zugleich die Haut der Stirne herunter, der Wange aber herausgezogen wird. — Wirkt auch mittelbar auf die Absonderung der Thränen, und hilft sie gegen den innern Winkel bringen. — Wirkt mit beym Weinen. — Die innern Fasern wirken beym Schlafen — die äußern beym Zusammenziehen der Augenlieder, und helfen zum Scharfersehen durch Ausschließung überflüssiger Lichtstrahlen, ohne die Spalte zu verschließen. Findet sich die angeführte Portion, so zieht sie den Augenliedschließer herunter.

3) Albin. Tab. XI. fig. 10. Santorini obs. anat. Tab. 1. o.

4) Haller elem Physiol. Tom. V. Lib. XVI. §. 26.

A u g e n b r a u n r u n z l e r.

Corrugator Supercilii.

Albin. Tab. XI. fig. 1. Santorini op. posth. Tab. I. c.
e. meine Icones oculi humani Tab. VII fig. 4. Tab. VIII.
fig. 1. u. 2.

S. 115.

Kommt mit einer, zwey oder drey anfangs sehnigen Portionen unten fast von der Mitte des Stirnbeins, so daß sie von beiden Seiten bisweilen beynah zusammenstoßen, geht stärker werdend schief nach außen, über den Rand der Augenhöhle, wird wieder schwächer, vermischt sich mit dem Augenliedschließer und Stirnmuskel,

und setzt sich in den Wulst der Augenbraune.

W i r k u n g.

Zieht theils die Augenbraunen schräg gegen die Nase und gegen die Augenbraune der andern Seite herunter, runzelt sie, macht sie mehr vortreten, ihre Haare aufrichten, und das Auge beschatten; theils spannt er das Ende der Augenbraune, so daß es sich über das obere Augenlied legt; — unterstützt den Augenliedschließer; — verräth Unwillen und Zorn.

123 124
Es ist zu bemerken das die Augen-Muskeln
sich fallen lassen müssen
Hauptwerke
mit Naturf.
S. 77.

Hebamuskel Bone

— 95 —

Aufzieher des obern Augenlides.

Levator Palpebrae superioris.

Meine Icones oculi humani. Tab. III. fig. 2. und Tab. VIII.
Fig. 1. und 2.

S. 116.

Kommt von der festen Hirnhaut am oberen Rande des Sehnervenlochs mit einer schmalen dünnen Sehne, hängt anfangs mit dem obern geraden Augenmuskel zusammen; sein flachrundliches Fleisch wird allmählig dünner, aber breiter; besteht gegen die Nase hin aus meist geraden, gegen die Schläfe hin aber aus gebogenen Fasern, und verliert sich in eine noch breiter werdende dünne Sehnenhaut, mit der er sich über den Knorpel des obern Augenlids herabwäszt, um sich

in den Rand des obern Augenlids zu setzen.

Wirkung.

Zieht das Augenlid in die Höhe, und in die Augenhöhle zurück, und öffnet dadurch die Augenlidspalte.

Wirkt bey der Liebe und Bewunderung.

Gerade Muskeln des Augapfels.

Recti oculi.

Meine Icones oculi humani Tab. II. fig. 2. 3. 4. Tab. IV.
fig. 3. Tab. VIII. 1. und 2.

S. 117.

Vier Muskeln, die am Augapfel haften, haben

into the integuments
and conjunctiva
Dr. Crampton.
Anatomical
Sy. of the Eye 1816
p. 13.

folgendes mit einander gemein: 1) daß sie hinten vom Zellstoffe und Bande, die ums Sehnervenloch liegen, sehnig entspringen, und zwar so, daß der innere und untere, und zum Theil der äußere gerade Muskel von dem gemeinschaftlichen, palmartigen, zwischen diesen Muskeln sich theilenden Bande, welches eine Furche in der obern Augenhöhlenspalte ausfüllt, vorwärts laufen; 2) daß ihr Fleisch anfangs gerade ausläuft, und gegen die Mitte breiter wird; 3) daß sie gebogen weit über die Mitte des Augapfels nach vornen laufen; 4) wieder an Dicke und Breite abnehmen; und 5) sich mit ihren breiten, aber dünnen und kurzen Sehnen in die weiße Haut des Augapfels, in gleicher Entfernung von der Hornhaut verlieren.

Indem sie der Reihe nach mit einander durch Zellstoff locker zusammenhängen, umgeben sie fast den Sehnerven wie ein kegelförmiger Saß.

Ihre Sehnen machen schwache Spuren auf der weißen Haut, die daher hinter oder unter ihnen dünner erscheint.

A b w e i c h u n g e n.

Bißweilen fehlt einer der geraden Muskeln des Augapfels bey Schielenden ^s.

Sie

^s) Wrißberg in den Göttingischen gelehrten Anz. von 1781. Seite 683.

Sie unterscheiden sich aber von einander durch Lage, Größe und andere Eigenschaften auf folgende Art.
Aufwärtszieher des Augapfels.
Attollens.

Meine Icones oculi humani Tab. III. fig. 2. Tab. IV. fig. 3. Tab. VIII. fig. 1. und 2.
 S. 118.

Kommt wegen der schiefen Lage des Sehnervens Lochs mit dem äußern geraden Muskel mehr vorwärts, als der innere und der untere gerade Muskel, theils vom Rande des Grundbeins, theils von der Scheide des Sehnervens, und ist anfangs mit dem Aufzieher des Augensieder und dem innern geraden Muskel vereinigt.

Unter den vier geraden ist er der dünne.

In Ansehung des Ausdrucks der Leidenschaften durchs Auge, verräth er Stolz, Hochmuth und Bewunderung, höchste Andacht, Entzückung beym Beten.

Auswärtszieher des Augapfels.
Abductor.

Meine Icones oculi humani Tab. III. fig. 2. 3. 4. Tab. IV. fig. 4.
 S. 119.

Kommt mit einem größeren, unteren und hinteren Stücke von obiger gemeinschaftlichen Sehne, und mit einem kleineren, oberen und vorderen Stücke vom Rande der oberen Augenhöhlspalte. Beyde Stücke, zwischen welchen, wie in einer Spalte, das dritte und sechste S. Muskellehre.



hinten vom
 hoch liegen,
 innere und
 de Muskel
 , zwischen
 welches eine
 fließt, vor-
 gerade aus-
 3) daß sie
 nach vornen
 nehmen;
 n und kur-
 apfels, in
 rlieren.
 nder durch
 sie fast den
 auf der
 nen dün-
 skeln des
 die
 an, 100



Nervenpaar, nebst dem Nasenaste des fünften Paares liegen, werden bald vereinigt, um den längsten und gebogensten Muskel unter den vier geraden zu bilden.

Diese Länge und Beugung war erforderlich, um ihn, wegendes nicht in der Mitte des Augapfels eingepflanzten Sehnervens, zu gleicher Entfernung von der Hornhaut mit den übrigen geraden Muskeln zu bringen.

Auch hat er das Auszeichnende, daß er ein eigenes Nervenpaar des Hirnes erhält.

Verräth auf seiner Seite des Gesichtes gleichsam durchs Wegwenden des Auges vom Gegenstande, Unwissen und Zorn.

Niederwärtszieher des Augapfels.

D e p r e s s o r.

Meine Icones oculi humani Tab. III. fig. 3. 4. Tab. IV. fig. 3. Tab. VIII. fig. 1. 2.

§. 120.

Kommt tiefer vom Rande des Sehnervenlochs, und ist meist ein wenig länger, als der obere.

Wirkt beim Ausdrucke der Demuth und Niedergeschlagenheit.

Inwärtszieher des Augapfels.

A d d u c t o r.

Meine Icones Oculi humani Tab. III. fig. 2. 3. 4. Tab. IV. fig. 3.

§. 121.

Kommt vom Rande des Sehnervenlochs, und ist

Der kürzeste, dickste und geradeste unter den vier geraden, weil sich der Sehnerv mehr nach innen zu an dem Augapfel einpflanzt. Hängt zu oberst in etwas mit dem oberen zusammen.

Verräth auf seiner Seite des Gesichts Freude oder Liebe.

Wirkung der vier geraden Augenmuskeln.

Der obere dreht den Augapfel nach oben oder gegen die Stirne; der äußere nach außen gegen die Schläfe; der untere nach unten gegen die Wange; der innere nach innen gegen die Nase. Wirken sie alle zusammen, so ziehen sie den Augapfel in die Knochenhöhle zurück, und weil sie über die Mitte des Augapfels mit ihrem Fleische hinlaufen, verändern sie vielleicht durch ein sanftes Pressen in etwas seine Form.

Oberer Schiefer Augenmuskel,

Obliquus superior oculi.

Meine Icones Oculi humani. Tab. III. fig. 2. 3.

§. 122.

Kommt an der innern Seite der Augenhöhle von der Hirnhaut in einiger Entfernung vom Sehnervenloche mit einer zarten Sehne, deren Fasern, je tiefer sie entspringen, destomehr vom Sehnervenloche entfernt liegen, bildet ein fast spindelförmiges Fleisch, welches in eine runde Sehne übergeht, die durch eine am

Stirnbeine mittelst Bänder befestigte, geschlossene knorpeliche Rolle läuft, sich dann umbeugt, rückwärts und auswärts ihre Richtung nimmt,

um sich an den obern Theil des Augapfels, gleich hinter seiner Mitte, mit auseinanderfahrenden und sich verdünnenden Fasern festzusetzen.

Von der Rolle an bis fast zum Augapfel, ist diese Sehne mit einem scheidenartigen Schleimsacke umgeben ⁶.

Er ist a) der dünnste, b) aber durch seine Sehne der längste Augenmuskel, geht c) durch eine Rolle, um d) in einer andern Richtung, als seine Fleischfasern liegen, den Augapfel zu bewegen, und e) bekommt ein ganz eigenes Nervenpaar.

Abweichung.

Nur selten sieht man einen andern sehr dünnen Muskel neben dem beschriebenen liegen, und sich an die Scheide seiner Sehne verlieren ⁷.

Wirkung.

Zieht den Augapfel vorwärts gegen den großen Augenwinkel; richtet das Lichtloch nach unten gegen

⁶ Gerlach Diss. Tab. III. 10.

⁷ Molinelli anat. Pathol. c. 4. septimus oculi musculus. Kulmus descr. anat. foetus monstrosi acc' obs. viri aqua suffocati. Gedani 1624. — Albin. Hist. musc. p. 176. Lib. 3. Cap. 23.

— 101 —

die Wange; bringt besonders mit Unterstützung des unteren schiefen Muskels den Augapfel gegen die Nase; — drückt durchs Auge Erhabenheit auß; — scheint beym Zorne heftig zu wirken.

U n t e r e r s c h i e f e r A u g e n m u s k e l ,
Obliquus inferior.

Meine Icones Oculi humani Tab. III. fig. 4. und Tab. VIII.

§. 123.

Kommt gemeiniglich schwachsehnig, bisweilen am innern Rande starksehnig, vom Oberkiefer ohnfern des Thränenbeins; sein anfangs schwaches Fleisch wird allmählig stärker und breiter, dann wieder dünner, schlägt sich unter dem Niederzieher des Augapfels, drauf zwischen dem Auswärtzieher des Augapfels und dem Augapfel selbst, um den Augapfel nach außen und rückwärts, steigt an ihm über die Mitte hinauf, und verliert sich mit seiner Sehne, unter dem Auswärtzieher des Augapfels in die weiße Haut des Augapfels, gegen über der mehr vom Sehnerven entfernten Sehne des oberen schiefen Muskels.

A b w e i c h u n g .

Kommt bisweilen bis von dem Thränenfacke *.

W i r k u n g .

Ist dem oberen schiefen Muskel entgegengesetzt,

§) Haller Elem Physiolog. Lib. XVI. p. 334. §. 22.

richtet also das Lichtloch aufwärts gegen die Schläfe; — zieht aber wie der obere schiefe den Augapfel (nur von unten her) gegen die Nase. — Bey der Bewegung des Kopfes gegen die Schultern heften die beyden schiefen Muskeln die Augen auf den Gegenstand, so daß, wenn der Kopf z. B. rechts gewendet ist, der obere schiefe Muskel das rechte Auge, hingegen der untere schiefe das linke Auge fest hält ?

Zusammenzieher des Nasenlochs.
Compressor Naris.

Albinus Tab. XI. Fig. 7. d. e. f. n. Santorini Tab. posth. I. P.

§. 124.

Kommt von der Wurzel des Nasenflügels, ist anfangs mit dem Oberlipp- und Nasenflügelauflzieher, und oft ganz unzertrennlich mit dem Niederzieher des Nasenflügels verwebt, breitet allmählig seine dünnen Fasern auseinander, die zum Rücken der Nase zwischen den Nasenknochen und Nasenflügeln zum Theil gekrümmt hinauf laufen,

und sich theils in eine dünne Sehnenhaut verlieren, theils auf dem Rücken der Nase mit denen von der andern Seite, theils mit den Fasern des Stirnmuskels vermischen.

9) Hunter on animal Oeconomy p. 212.

Wirkung.

Drückt den beweglichen Theil der Nase gegen die Scheidewand der Nase, wenn zu gleicher Zeit der Niederzieher des Nasenflügels wirkt, und beengt den Eingang der Nasenhöhle. Wirken sie auf beyden Seiten zugleich mit den Aufziehern der Nasenflügel, so ziehen sie die Nasenflügel vorwärts in die Höhe, und erweitern die Nasenlöcher.

Oberlipp; und Nasenflügelanzieher.

Levator Labii superioris alaeque Nasi.

Albinus Tab. XI. Fig. 10. a. b. c. d. — Santorini Tab. posth. o.

S. 125.

Steigt anfangs sehnig, auch wohl mit dem Stirnmuskel vermischt, vom Nasenfortsatze des Oberkiefers hinab,

um sich mit einer kurzen mit dem Zusammenzieher des Nasenlochs vermischten Portion an den Nasenflügel, mit der andern längern, mit dem Nasenmuskel der Oberlippe, dem Mundschließer, Aufzieher der Oberlippe, und Niederzieher des Nasenflügels vermischten und verdünnten Portion in die Oberlippe zu verlieren.

Wirkung.

Zieht die Oberlippe und den Nasenflügel aufwärts, wirkt beym spottenden Lächeln, und verräth

Schläfe; —
Kapsel (nur
Bewegung
die beyden
Anstand, so
det ist, der
ingegen der

n Lochs.

rini Tab.

flügel, ist
elaufzieher,
zieher des
e dinnen
Nase zwi-
um Theil

nhaut ver-
mit denen
Fasern des



Merger und Verachtung; verrichtet das sogenannte Nasenrumpfen.

Aufzieher der Oberlippe.

Levator Labii superioris.

Albinus Tab. XI. Fig. 10. e. e. f. — Santorini Tab. posth. N.

§. 126.

Kommt einfach, zweyfach oder dreyfach vom Oberkiefer über der Mündung des Canals unter der Augenhöhle; zieht ein wenig seine Fasern zusammen, verbindet sich mit dem Niederzieher des Nasenflügels; und setzt sich an der oberen Lippe, zwischen die Nase und den Winkel des Mundes, indem er sich dem Schließer des Mundes einmischt.

Wirkung.

Zieht die obere Lippe schief gegen das Auge hinauf, und treibt daher die Wange zwischen dem Auge und der Oberlippe in die Höhe.

Kleiner Wangenmuskel.

Zygomaticus minor.

Albin. Tab. XI. Fig. 10. i. k. Santorini Tab. posth. I. I.

§. 127.

Kommt vom vorderen Theile des Wangenbeines, steigt schräge zur Oberlippe hinab;

und vermischt sich in der oberen Lippe mit dem Aufzieher der Oberlippe und dem Mundschließer.

Abweichungen.

Fehlt bisweilen gänzlich;
bisweilen geht eine kleine Portion von ihm zum
Augenliedschließer gegen den großen Augenwinkel;
bisweilen ist die Portion gegen die Lippe zu ge-
spalten oder doppelt ¹.

Wirkung.

Zieht die Oberlippe schief aufwärts.

Großer Wangenmuskel.

Zygomatikus major.

Albinus Tab. XI, Fig. 10. 11. 12. 13. Santorini Tab.
posth. I. H.

S. 128.

Kommt sehnig vom Anfange des Bogens des
Wangenbeins, liegt mehr nach außen, aber weniger
schräg, als der kleinere,

steigt zum Mundwinkel, und tief unter selbigen
hinab, so daß zulezt seine zärtesten und längsten Fäden
sich mit dem Niederzieher der Unterlippe verweben,
und unter der Unterlippe bis an die andere Seite sich
erstrecken. Er verliert sich ferner theils in den Nie-
derzieher des Mundwinkels selbst, theils hinter ihm
und dem Aufzieher des Mundwinkels in den Backenmus-
kel, um sich mit ihm dem Mundschließer einzumischen.

¹) Santorini in der ang. Tafel.

Wirkung.

Zieht die Wange und den Mundwinkel schief gegen die Schläfe hinauf, daher die Wange unter dem Auge anschwillt, und gegen den Schlaf gezogen wird. — Wirken sie auf beyden Seiten, so ziehen sie die Deffnung des Mundes in die Länge und Höhe; z. B. beyms Lachen.

Aufzieher des Mundwinkels.

Levator anguli oris.

Albinus Tab. XI. Fig. 11. 12. Santorini Tab. posth. I. L.

S. 129.

Kommt dünn, aber breit, aus der Vertiefung des Oberkiefers unter der Mündung des Canals unter der Augenhöhle, wird dicker und schmaler, und setzt sich an den Mundwinkel, indem er theils in den Niederzieher des Mundwinkels, theils in den Mundschließer an der Unterlippe übergeht.

Wirkung.

Zieht den Mundwinkel gegen das Auge hinauf, und macht dadurch die Wange anschwellen; z. B. beyms Lächeln.

Niederzieher des Mundwinkels.

Depressor anguli oris.

Albinus Tab. XI. Fig. 10. 11. 12. 13. Santorini Tab.
posth. I. M.

§. 130.

Steigt seitwärts am Kinne vom Unterkiefer anfangs breit, dann schmaler, mit den innern Fasern vorzüglich gebogen, zum Mundwinkel hinauf,

wo er sich theils aufwärts in den großen Wangenmuskel, theils in der Mitte in den Aufzieher des Mundwinkels, theils inwärts in den Mundschließer an der Oberlippe begiebt.

Nach außen zu hängt er stark mit der Haut, nach innen zu mit dem Niederzieher der Unterlippe zusammen, und hat meist einen dreyeckigen Umfang.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen stößt er unten am Kinne mit dem von der andern Seite zu einem halben Monde zusammen.

W i r k u n g.

Zieht den Winkel des Mundes herab. — Bezeichnet Einfalt und Traurigkeit. ²

²) Haller Elementor: Physiol. Lib. 12. §. 23.

Niederzieher der Unterlippe.

Depressor Labii inferioris.

Albinus Tab. XI. Fig. 9. 10. 16. — Santorini Tab. posth. I. zwischen M. und S.

§. 131.

Steigt zur Seite des Kinns als ein zarter, breiter, mit dem Mundschließer und Niederzieher des Mundwinkels vermischter Muskel schräg von außen an der Kinnlade nach innen zur Unterlippe längs ihres ganzen Randes, zum Theil unter dem Niederzieher des Mundwinkels liegend so hinauf, daß die Fasern des rechten sich mit den Fasern des linken kreuzen und verweben, am Kinn aber einen dreieckigen Raum zwischen sich übrig lassen.

A b w e i c h u n g.

Oft ist sein äußerer Theil eine Portion des breiten Halsmuskels.

W i r k u n g.

Zieht die Unterlippe und das Kinn schief hinab.

B a c k e n m u s k e l.

Buccinator.

Albinus Tab. XI. Fig. 13. 14. Santorini Tab. posth. l. y. y.

§. 132.

Kommt vom Oberkiefer hinter dem letzten Backenzahne gleich über dem Zahnfleische, hängt mit dem

oberen Schnürer des Schlundkopfs zusammen, kommt ferner von der Spitze des Hakens des Flügelfortsatzes (oder auch vom Raume zwischen diesem Haken und dem äußern Blatte des Flügelfortsatzes), und endlich von der Erhabenheit der Unterkinnlade zwischen dem letzten Backenzahne und ihrem spizen Fortsatze;

geht mit gebogenen Fasern, auf die Haut der Mundhöhle fest geheftet, quer über die Wange, theils zum innern Theile des Mundschließers, theils gegen die Oberlippe, theils mit gekreuzten Fasern gegen den Mundwinkel, theils gegen die Unterlippe.

Wirkung.

Zieht den ganzen Mund rückwärts und runzelt die Backe. Ist die Backe durch Luft oder sonst einen Körper ausgedehnt, so preßt er selbigen und treibt ihn vor- oder hinterwärts, wirkt also beym Pfeifen, Blasen, Rauen, Schlingen, Saugen, und scheint den Gang der Speicheldrüse, die zwischen seinen Fasern liegt, auszumelden.

Niederzieher der Nasenspitze.

Nasalis Labii superioris.

Albinus Tab. XI. Fig. 10. 11. 12. 13.

§. 133.

Könnte ganz füglich für eine Portion des Mundschließers gelten.

Kommt mit einem sehnigen Anfange unten vor der Nasenspitze und der Nasenscheidewand, und steigt verstärkt, um sich mit dem Mundschließer zu vermischen, schief nach außen herunter.

Wirkung.

Unterstützt den Mundschließer in der Zusammenziehung der Mundwinkel, und zieht die Scheidewand und Spitze der Nase herunter.

Mundschließer.

Orbicularis oris.

Albinus Tab. XI. Fig. 10. bis 14. — Santorini Tab. posth. I. q. q.

§. 134.

Ist in den meisten Fällen gleichsam nur eine Fortsetzung der Backen- und Wangenmuskeln, und der Nieder- und Aufzieher des Mundwinkels.

Doch sieht man bisweilen ihm eigenthümliche ununterbrochene Fasern rings um den Mund, oder nur um die Lippen her liegen.

Bisweilen kommen zu diesen noch vier Portionen von jeder Kinnlade, auf jeder Seite eine, ohngefähr aus der Gegend des Eckzahns, die sich um den Mund herum erstrecken.

Außer obigen Muskeln sind ihm noch an der Oberlippe die Niederzieher der Nasenspitze, die Aufzieher

— III —

der Oberlippe und der Nasenflügel, die Wangenmuskeln, und an der Unterlippe die Niederzieher der Unterlippe eingemischt.

Wirkung.

Zieht den Mund zusammen, runzelt die Lippen, und treibt sie vorwärts. Nachdem aber die ihm beigemischten Muskelfasern verschiedentlich mitwirken, werden die Lippen sehr mannichfaltig bewegt.

Niederzieher des Nasenflügels.

Depressor alae Nasi.

Albin. Tab. XI. Fig. 8. — Santorini Tab. posth. I. m.

S. 135.

Kommt sehnig von der Oberkinnlade nahe über den Schneidezähnen, auch wohl über dem Eckzahne, steigt mit seinem Fleische sich ein wenig ausbreitend aufwärts,

um sich an den Nasenflügel zu setzen, wo sein oberer Theil mit dem Zusammenzieher des Nasenlochs, dem Aufzieher des Nasenflügels, und den beyden Aufwärtziehern der Oberlippe sich vermischt.

Wirkung.

Zieht den Nasenflügel und den mit ihm zusammenhängenden Theil der Oberlippe herunter, verengt das Nasenloch, und spannt endlich mit dem Mundschließer die Oberlippe über die Zähne einwärts.

unten von
em Mund
herunter.
Zusammen-
scheidewand
rini Tab.
nur eine
eln, und
liche un-
ber nur
ortionen
hngesähr
en Mund
Der Dors-
Anzieher



Ungewöhnlicher Muskel des Oberkiefers.
Anomalous maxillae superioris.
Santorini obs. anat. Tab. I f. 3

S. 136.

Verschiedentlich sah man einen geraden spulförmigen, unter den beyden Aufhebern der Oberlippe gelegenen Muskel, der wegen der Befestigung seiner beyden Enden am unbeweglichen Oberkiefer keinen Nutzen zu haben, oder nicht wirken zu können schien, außer daß er vielleicht auf die Gefäße und Nerven druckte. Er kam aus dem oberen Theile des Grübchens des Eckzahns vom Oberkiefer, und setzte sich gleich unter dem Ursprunge des Aufziehers der Oberlippe wieder an den Oberkiefer.

Bisweilen ist er anfangs breit, und mit dem Niederzieher des Nasenflügels zusammenhängend, wird dann schmaler, und verliert sich mit seiner Sehne an den Oberkiefer in die Mitte des Randes in der Nasenmündung.

Aufzieher des Kinns.

Levator Menti.

Albinus Tab. XI. Fig. 15.

S. 137.

Kommt gleich unter dem Rande der vorragenden Zelle des Eckzahns von der untern Kinnlade, geht

3) Albinus Hist. Musc. Libr. 3. Cap. 18.

immer mehr auseinander fahrend und gebogen, quastenförmig zur Mitte des Kinns herunter, vermischt sich mit dem von der andern Seite, so, daß sie zusammen einen halben Mond bilden.

Wirkung.

Zieht das Kinn, und dadurch zugleich die Unterlippe in die Höhe, legt und spannt sie ferner über die Zähne einwärts. Verräth Verachtung und Indignation ⁴.

Zweybäuchiger Kiefermuskel.

Biventer Maxillae.

Albinus Tab. XII. Fig. 18. 19. — John Hunter on human teeth Tab. 2. in natürlicher Größe; doch ist die mittlere Sehne zu eckig vorgestellt.

§. 138.

Sein hinterer längerer Bauch kommt sehnig vom Ausschnitte hinter dem Zitzenfortsatze des Schlafbeins, wird absteigend breiter und dicker, allmählig aber wieder dünner, bis er endlich auf der äußern Seite des Bauchs früher, als auf der innern, in eine runde starke Sehne übergeht, die gewöhnlich mitten durch das Fleisch des Griffelzungenbeinmuskels ⁵ dringt, sich aufwärts beugt, durch eine (von den zusammenkommenden Sehnen der von den Zungenbei-

⁴ Haller Lib. 18.

⁵ Courcelles Tab. 7.

nen zum Brustbeine, Schulterblatte, Griffel und Unterkiefer gehenden Muskeln erzeugte) Sehnenhaut ans mittlere Zungenbein geheftet wird, oder auch eine Sehnenhaut von sich zum mittleren Zungenbein abschickt, hier an der innern Seite der mittleren Sehne einen fast drey Linien langen, ovalen, blasenartigen Schleimbeutel ⁶ zeigt, und ins Fleisch des vorderen Bauchs, früher oben als unten übergeht.

Dieser vordere Bauch ist anfangs schmal, wird aber durch eine von den Zungenbeinen hinzukommende Portion dicker, bis er zuletzt sich wieder etwas schmälern in eine eigene Grube hinten an die Mitte des Unterkiefers festsetzt.

Der ganze Muskel bildet durch seine bogenförmige Richtung einen halben Mond, der seine Hörner aufwärts kehrt.

Abweichungen.

Bisweilen liegt er vor, bisweilen hinter dem Griffelzungenbeinmuskel. — Bisweilen vermischt sich sein vorderer Bauch mit dem Kieferzungenbeinmuskel. — Bisweilen legen sich an seine Sehne einige Fasern vom Kieferzungenbeinmuskel. — Mehrentheils wird sein vorderer Bauch von innen her durch eine starke, vom Zungenbeine kommende Portion ver-

⁶) Gerlach in der ang. Diss. Tab. I. 7.

stärkt, die bisweilen so getheilt ist, daß der vordere Bauch auf beyden Seiten doppelt scheint. — Bisweilen sieht man ganz deutlich die Fasern dieser hinzukommenden Portion von der rechten Seite, mit den gleichen Fasern von der linken Seite, sich kreuzen und verflechten. — Bisweilen geht zwischen dem vordern Bauche des rechten und linken zweybäuchigen Kiefermuskels, ein ungepaarter Muskel vom Zungenbeine zum Unterkiefer 7.

Wirkung 8.

Zieht offenbar, wenn seine beyden Bäuche sich verkürzen und er im Ganzen dadurch gerader wird, die untere Kinnlade von der oberen ab, und öffnet den Mund; das Anschwellen des hinteren Bauchs fühlt man beym Deffnen des Mundes durch den hinter den Rippenfortsatz gelegten Finger. — Da sein vorderer Bauch wegen der Befestigung an die Zungenbeine als eine Fortsetzung des Brustzungenbeinmuskels angesehen werden kann, so unterstützt er diesen bey Abziehung des unteren Kiefers vom oberen. — Sind die

7) Haller Lib IX. Sect. 2. §. 6. Sah ich auch.

8) Ueber seine Wirkung ausführlich Albin. annot. acad. Libr. VII. cap. 1. Bey Ausschälung einer Geschwulst in der Gegend dieses Muskels sah ein Wundarzt, daß durch ihn die Zungenbeine herausgezogen wurden. Monro Med. Ess. and Obs. Vol. I.

Zungenbeine niederwärts gesunken, so hilft er sie besonders mit seinem vordern Bauche in die Höhe heben. — Sein vorderer Bauch scheint, wenn er allein wirkt, die Zungenbeine, und die mit selbigen zusammenhängenden Theilen vorwärts, sein hinterer Bauch aber hinterwärts zu ziehen. — Nach dem Gefühle zu urtheilen, scheint er auch beym Schlingen zu wirken. — Seine mittlere Sehne wird bey Niedersenkung der Zungenbeine mit herabgezogen. — Sollte er auch bey hinlänglich befestigtem Unterkiefer den Kopf nach hinten bewegen und eine kleine Drehung des Unterkiefers bewirken können? Hält man ein Messer in der Richtung der oberen Zähne stät, so sieht man, daß bey Deffnung des Mundes der Kopf hinterwärts weicht. Auch bey saugenden Kindern sieht man den Kopf bey Deffnung des Mundes hinterwärts weichen.

Kiefermuskel oder unterer Käumuskel.

Masseter oder Mandibularis.

Albinus Tab. XII. Fig. 20. 21. 22.

§. 139.

Kommt sehr stark sehnig vom Oberkiefer, dann vom unteren Rande des ganzen Wangen- oder Jochbogens, darauf fleischiger sowohl von der inneren

9) Hunter Seite 27.

Fläche des Wangenbogens, als der mit dem Wangenbogen verbundenen Sehnenhaut des Schläfemuskels; wird dann noch fleischiger, bleibt aber doch mit starken Sehnenfasern sowohl verwebt, als vorzüglich von außen her bedeckt. — Seine mehr nach außen liegenden Fasern steigen schief rückwärts zum Unterkiefer hinab, seine inneren hingegen laufen gerader herunter, ziehen sich mehr zusammen, erreichen auch den Unterkiefer früher. — Bisweilen sind diese beyden Portionen halb, bisweilen durchaus getheilt. — Seine hinterste, zunächst am Ohr gelegene Portion, ist ebenfalls kürzer, und aus Fasern zusammengesetzt, die sich in einem spitzen Winkel vereinigen.

Setzt sich schief rückwärts, nur wenig zusammengezogen, an den ganzen Seitentheil des Unterkiefers vom spitzen Fortsaze an, bis zum Winkel mit starken Sehnen fest.

Wirkung.

Zieht den Unterkiefer gerade gegen den oberen hinauf; wirkt folglich beym Beißen, Käuen, Zahnknirschen. Ist hingegen der Mund offen, und die Unterkiefer fest, so zieht er den Kopf vorwärts herunter 1.

1) Dieser Muskel, nebst den drey folgenden, ~~sind weit~~ ~~hinter, als sie in~~ gleicher Wirkung ~~nöthig hätten~~, falls sie weniger rückwärts, oder nicht so nahe am Gelenke des Unterkiefers, lägen.

Handwritten note:
 Franz Pflüger's Handb.
 Lefschmüller, Tab. II. 1. ed. 2.
 unter dem Mastoideus
 v. d. H. v. Meunier Vol. 1.
 p. 398 un.

Handwritten note:
 brauchte ~~er~~ an Verächtung
 Fweniger stark zu seyn

ist er sie be-
 che heben. -
 allein wirkt,
 umhängen
 ch aber hin-
 le zu urthei-
 wirken. -
 senkung der
 lte er auch
 Kopf nach
 ng des Un-
 t man ein
 stät, so sich
 Kopf hinter
 ndern sich
 des hinter

muskul.
 is.

kiefer, dann
 = oder Joch-
 der manen



Schläfermuskel oder oberer Käu muskel.
Temporalis.

Albinus Tab. XII. Fig. 12. 13. 14.

S. 140.

Kommt anfangs sehr dünne, von der bogenförmigen Linie, die sich vom Wangenbeine über das Stirn- und Seitenbein erstreckt, ferner theils sehnig, theils fleischig vom Wangenbeine, Grundbeine, Seitenbeine und Schläfebeine, und endlich von der ihn selbst überziehenden, am oberen Rande des Wangenbogens haftenden Sehnhaut; wird darauf schmaler aber dicker, geht innerhalb, noch ehe er die Mitte seiner Länge erreicht, in eine Sehne über, von welcher nach außen zu noch eine Strecke lang Fleischfasern entspringen

setzt sich an den spizen Fortsatz des Unterkieferes, indem er ihn ringsum überzieht, und tief an ihm, besonders hinten heruntergeht.

Wirkung.

Zieht den Unterkiefer gegen den Schedel rückwärts hinauf. Sein mittlerer, in etwas auch sein hinterer Theil schiebt den Gelenkknopf des Unterkieferes in die Grube hinter dem Gelenkhügel des Schläfebeins. — Sein hinterer und unterer Theil ist vorzüglich bey offenem Munde gewunden, um den Unterkiefer desto gerader hinaufziehen zu können. — Wird

hingegen bey offenem Munde der Unterkiefer befestigt, so zieht umgekehrt der Schläfemuskel den Kopf gegen den Unterkiefer.

Innerer Flügelmuskel oder hinterer unterer Käu muskel.

Pterygoideus internus.

Albinus Tab. XII. Fig. 15. a. 17.

S. 141.

Kommt anfangs sehnig aus der Grube des untern Flügelfortsatzes des Grundbeins und Gaumenbeins, wird fleischig, ist mehr breit als dick, zieht sich bald zusammen, und setzt sich stark sehnig an die hintere Fläche des Winkels des Unterkiefers.

Wirkung.

Einer allein zieht den Unterkiefer schief gegen die andere Seite hinauf. — Wirken beyde, so ziehen sie den Unterkiefer gerade herauf. — Ist der Unterkiefer hinlänglich fest, so ziehen sie gegenseitig den Kopf herunter.

Äußerer Flügelmuskel oder hinterer oberer Käu muskel.

Pterygoideus externus.

Albin. Tab. XII. Fig. 15. g. Fig. 16.

S. 142.

Kommt sehnig fast von der ganzen äußeren Fläche

des äußern Blatts des untern Flügelfortsatzes des Grundbeins, und auch wohl von der äußern Seite des zwischen diesem Flügelfortsatze eingepaßten Gaumenbeins, und vom Oberkiefer; ist kleiner als der vorige, mehr breit als dick, und endigt sich auch mit einer schmälern Sehne; er geht rückwärts und ein wenig aufwärts gegen den Unterkiefer herüber, und

setzt sich größtentheils an den Hals des Gelenkknopfs des Unterkiefers in eine eigene Grube, theils an die Gelenkkapsel, theils an die zwischen den Gelenkflächen liegende Knorpelscheibe.

Wirkung.

Zieht den Unterkiefer nebst der Knorpelscheibe aus der Grube hinter dem Gelenke vorwärts unter den Gelenkhügel, und schief auf die andere Seite herüber; ferner zieht er die Gelenkkapsel an, damit sie sich nicht runzeln könne; zugleich zieht er auch den Unterkiefer gegen den Oberkiefer in die Höhe. — Ist hingegen der Unterkiefer bey offenem Munde befestigt, so bewegt er umgekehrt den Kopf gegen den Unterkiefer auf seine Seite.

Breiter Halsmuskel.

Latissimus Colli.

Albinus Tab. XI. Fig. 16.

S. 143.

Besteht aus dünnen, langen, in der Fetthaut liegenden Fleischfasern.

Kommt mit anfangs zerstreuten, abwechselnd längern und kürzern Fasern bisweilen bis aus der Gegend der vierten Rippe ², von der Brust- und Schultergegend, allmählig ein wenig sich schmälern, aber dicker werdend am Halse schief ins Gesicht herauf, wo er sich mit dem Niederzieher der Unterlippe und des Mundwinkels vermischt, auch hin und wieder, mehr nach außen zu, sich über die Kinnlade wirft.

Verschiedene, besonders seine oberen Fasern sind durch Fett fast ganz von den übrigen abgefordert; seine stärksten und längsten Fasern sind die innern und untern, seine schwächsten und kürzesten die äußern und obern; verschiedene der letztern pflegen daher auch nicht bis an den Unterkiefer zu reichen. Bisweilen findet man Portionen von ihm gebogen bis zum

2) Mayer Band 3. Seite 213. Nach ihm ist er bey Weibern stärker, als bey Männern.

Mundwinkel ³, ja bis zum Augenschiedschließer gelangen, oder sie zeigen sich am größern Wangenmuskel, oder sie kommen von der Sehne des Kiefermuskels; bisweilen reichen sie bis zum Ohr hinauf, und setzen sich fest an selbiges fest, oder schlagen sich unter dem Ohre bogenförmig über den Kappenmuskel.

Nach Ch. Bell. System of Dissections. Vol. II. fol. 1803. Wirkung.

*einige von jüngstfüßig durch die
Venen am Hals.*

Zieht den Mundwinkel, die Unterlippe, die Wange, und die Haut des Halses unter dem Kiefer seitwärts schief herunter. — Wirkt mit beym Lächeln. — Zugleich zieht er die Haut am Schlüsselbeine in die Höhe. — Hilft auch, wie man bey Leuten, wo er sehr stark ist, deutlich sehen kann, den Unterkiefer herunterziehen, um den Mund zu öffnen. — Auch scheint er die Speicheldrüsen an der Unterkinnlade, die er bedeckt, sanft zu drücken. — Gehen Fasern von ihm zum Ohr hinauf, so ziehen sie selbiges niederwärts. — Wenn der Kiefer in die Höhe gezogen wird, unterstützt er vielleicht die unter ihm liegenden Muskeln durch Spannung der Haut.

3) Der Lachmuskel (risorius) bey Santorini Tab. posth. I. w.

K o p f n i c k e r.

Sterno et Cleido mastoideus.

Albinus Tab. XVI. Fig. 25. 26.

§. 144.

Kommt mit einem sehnigen, bogenförmigen Rande von der ganzen Seitenfläche des Zitzenfortsatzes des Schläfebeins und vom Hinterhauptbeine; wird dann fleischig und stärker; theilt sich, indem er schief am Halse, bald mehr bald minder tief, heruntersteigt, allmählig in zwey Portionen. Eine geht, sich sehr schmälend, in eine flach rundliche Sehne über, und setzt sich vornen und oben an das obere Brustbein fest. Die andere, die zum Theil unter der vorigen liegt, wird im Absteigen breiter, und setzt sich weniger schief an die obere Fläche. Des Schlüsselbeins zunächst am obern Brustbeine.

Bisweilen ist hinten von ihm eine Strecke lang ein Stück deutlich abgefondert. Bisweilen geht er bis zur Spitze des untern Brustbeins ⁴, ja gar bis über den geraden Bauchmuskel hinab ⁵.

*Einmalen liegt
eine Portion 4 d. partes
claviculæ perpendic
quæ sterni flexis
multo vor der parte flexis
S. H. H. 47
Sic. Hall. Lit. Febr. 1809
R. 153.*

W i r k u n g.

Zieht den Kopf gegen seine Seite vorwärts schief herunter, krümmt dadurch den Hals. — Steht der

4) P. C. Fabricius Idea anatomiae practicae. Wezlar 1741. S. 17.

5) Bourienne in Roux Journ. de Medecine Vol. 39. 1773.

Hals und das Gesicht gerade, so wendet er das Gesicht gegen die andere Seite. — Ist der Kopf und Hals rückwärts gebogen, so zieht er ihn durch die Bewegung des Kopfes noch mehr, nur schief, gegen seine Seite herunter. — Wirken beide, so neigen sie den Kopf gerade vorwärts auf die Brust hinab, oder ist der Kopf rückwärts gebogen, so ziehen sie ihn wieder gerade. — Helfen mittelst des Schlüsselbeins und der Brustbeine das erste Ribbenpaar beynt stärksten Einathmen aufheben und befestigen.

Rückwärtszieher der Zungenbeine.

Omohyoideus.

Albinus Tab. XI. Fig. 35. unter dem Namen Coracohyoideus.

S. 145.

Kommt mit sehnigen Fasern vom Schulterblatte ohnfern des Ausschnittes an der Wurzel des Hakenfortsatzes, oder auch wohl vom Bande, welches diesen Ausschnitt ausfüllt, steigt als ein dünner Fleischstreifen gebogen über den Thorax schief nach vornen und innen gegen den Hals hinauf; wird durch eine eigene, gegen das Schlüsselbein gespannte sehnige Haut in seiner Lage erhalten; wird schmaler, aber dicker, und geht, indem er zwischen den Kopfnicker und die Blutgefäße am Halse, nebst dem Ribbenhalter tritt, gänzlich in eine dünne schmale Sehne über, wird aber

Drauf wieder fleischig, und fährt in gerader Richtung als ein zweyter kürzerer Fleischstreifen am Halse hinauf, und setzt sich zuletzt schmaler und sehnig an die untere Ecke des mittleren Zungenbeins.

Er ist der längste und schmälste Muskel am Halse.

Bey unreifen Kindern hat er das Ansehen eines fast durchaus gleich breiten, durch keine Sehne getheilten Fleischstreifen.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen geht ein gemeinschaftlich mit ihm vom Schulterblatte anfangs sehnig kommender Theil quer über die Gefäße und Nerven am Halse, der sich zuletzt wieder sehnig an den Knorpel der ersten Rippe festsetzt. — Bisweilen geht er zum Theil mit dem Griffelzungenbeinmuskel in eins fort. — Bisweilen ist das Ende am Schulterblatte schmaler — bisweilen breiter, auch bald mehr, bald weniger vom Hakenfortsaze entfernt. — Bisweilen kommt er vom Schlüsselbeine. — Bisweilen fehlt er ganz, wo alsdann der Niederzieher der Zungenbeine breiter ist. — Auch die mittlere Sehne ist sehr verschieden, bald länger, bald kürzer, bald schmaler, bald breiter, bald gänzlich fehlend ⁶.

⁶) Diese Sehne fehlte in einem menschlichen Körper auf beiden Seiten nach Behrends mir mitgetheilter Beobachtung

Wirkung.

Zieht die Zungenbeine schief gegen seine Seite rückwärts herunter. — Wirken beide zugleich, so ziehen sie die Zungenbeine, und mit selbigem die Zunge und den Unterkiefer gerade und rückwärts herunter. — Der abweichende Theil konnte wohl bloß die Gefäße und Nerven ein wenig pressen.

Niederzieher der Zungenbeine.

Sternohyoideus.

Albinus Tab. XI. Fig. 39.

§. 146.

Kommt sehnig von der hinteren Fläche des oberen Brustbeins, vom Knorpel der ersten Rippe, vom Gelenke des Schlüsselbeins, und vom Schlüsselbeine selbst, steigt erst schief, dann gerade in die Höhe, ist anfangs am breitesten, nachher schmaler, aber dicker, ist meist nicht weit von seinem Anfange mit einer sehnigen Linie durchzogen, wird mit dem von der andern Seite leicht zusammengeheftet, bedeckt mit ihm von vornen her den Kehlkopf, und setzt sich sehnig unterhalb am mittleren Zungenbeine an die Stelle, die ihm der Rückwärtszieher der Zungenbeine übrig läßt, bis in die Mitte.

Zwischen ihm und der Membran die den vordern Ausschnitt am Kehlkopfe ausfüllt, liegt ein Schleimsack.

Abweichungen.

Bisweilen reicht ein Theil von ihm bis zum Knorpel des Schlüsselbeingelenkes hinauf, und endigt sich an selbigem sehnig.

Bisweilen ist er doppelt, so, daß sich der ungewöhnliche mehr ans Seitenzungenbein festsetzt.

Wirkung.

Zieht die Zungenbeine und die mit selbigen verbundenen Theile, die Zunge, den Kehlkopf, den Unterkiefer, und endlich selbst das Haupt gerade herunter; treibt den Kehlkopf mit dem Schlundkopfe rückwärts, und erweitert die Stimmriße. — Wirkt folglich beim Schlingen, Singen, Sprechen. Wirkt einer allein, so zieht er diese Theile ein wenig auf seine Seite.

Niederzieher des Kehlkopfes.

Sternothyreoideus.

Albinus Tab. XI. Fig. 44.

S. 147.

Kommt sehnig, tiefer, mehr nach innen liegend, und gleich anfangs breiter, als der Niederzieher der Zungenbeine von der hinteren Seite des oberen Brustbeins, und mit einem kleinen Theile auch vom Knorpel der ersten Rippe; ist meist gleich über dem Brustbeine mit einer sehnigen Quерlinie durchzogen; steigt

ein wenig schmaler, und daher mehr von dem der andern Seite entfernt über die Schilddrüse gerade hinauf; und befestigt sich sehnig an den unteren, und in etwas an den Seitentheil des Randes des Schildknorpels; reicht bisweilen bis zu dem Seitenzungenbeine herauf.

Abweichungen.

Bisweilen mischt er sich unterwegs dem unteren Schnürrer des Schlundkopfs ein.

Bisweilen vereinigt er sich rückwärts mit dem Schildzungenbeinmuskel.

Bisweilen ist er unten gespalten und oben erst vereinigt, doch so, daß man durchaus zwey Portionen unterscheiden kann.

Bisweilen kreuzen sich zu unterst seine Fasern, ja man sah den rechten mit dem linken durch Quersfasern zusammenhängen ⁷.

Bisweilen kommt er auch von der zweyten Rippe und vom Schlüsselbeine.

Wirkung.

Zieht den Schildknorpel, und dadurch den Kehlkopf, die Zungenbeine u. s. f. herunter, schief, wenn einer allein wirkt, gerade, wenn beide zugleich wirken.

⁷) M. Girardi de re anat. oratio. Parmae 1781. S. 36. not. i).

Fen. — Wirkt mit dem vorigen beym Schlingen,
Singen und Sprechen, preßt die Schlunddrüse.

Schildzungenbeinmuskeln.

Hyothyreoides.

Albin. Tab X. Fig. 45.

S. 148.

Füllt den Seitenraum der Schildknorpelstäche
aus, den der Niederzieher des Kehlkopfes übrig läßt,
so daß sich zwischen ihnen eine hervorragende Leiste
am Schildknorpel zeigt — und setzt sich in etwas an
das mittlere, meist aber ans Seitenzungenbein von
untenher fest.

Abweichungen.

Mischt sich mannigmal dem Schnürrer des
Schlundkopfes ein. — Bisweilen setzt er sich an den
Ringknorpel fest. — Bisweilen findet sich noch ein
oberer, kleinerer, ungepaarter Muskel,
zwischen dem oberen Rande des Schildknorpels, und
dem unteren Rande des mittleren Zungenbeins. —
Bisweilen findet sich ein Muskel zwischen dem oberen
Rande des Schildknorpels und dem Bande, welches
das Seitenzungenbein mit dem Horn des Schildknor-
pels vereinigt, der sich mit dem Niederzieher des Kehl-
kopfes verbindet.

S. Muskellehre.

3

Wirkung.

Wirken beyde, so ziehen sie den Schildknorpel und die Zungenbeine wechselseitig gegeneinander, verengen dadurch die Stimmrinne und bringen den Stimmringendeckel herunter. — Könnte einer allein wirken, so zöge er die Zungenbeine und den Schildknorpel schief gegeneinander.

Schildrüsenu Muskel ².

Thyreoidæus.

Bisweilen sieht man auf der linken Seite einen Muskel ohngefähr von der halben Breite des gewöhnlichen Schildzungenbeinmuskels sehnig vom unteren Rande des mittleren Zungenbeins kommen, fleischig über den Schildknorpel absteigen und sich theils an den Schildknorpel festsetzen, theils ganz offenbar über die Schildrüse hin verbreiten.

Bisweilen kommt er vom Seitenzungenbeine. — Selten ist er auf der rechten Seite, noch seltner auf beyden Seiten vorhanden.

Wirkung.

Zieht den mittleren Theil der Schildrüse gegen das mittlere Zungenbein.

2) Ich habe mich durch eigens angestellte wiederholte Untersuchung von der Beschaffenheit dieses Muskels, wie ich sie hier schildere, zu überzeugen gesucht.

Griffelzungenbeinmuskel.

Stylohyoideus.

Albinus Tab. XI. Fig. 37. — Santorini Tab. posth. VI. H.

S. 149.

Kommt sehnig vom Griffelfortsatz, wo sich ein Schleimsack findet ²⁾, oder von seinem knorpeligen, oft ein Knöchelchen enthaltenden Fortsatz, bildet einen länglichen spindelförmigen Bauch, der schräg absteigt, bald mehr bald weniger gespalten ist, den zweybäuchigen Kiefermuskel selbst oder seine Sehne durch einen sehnigen mit einem Schleimsack versehenen Schliz durchläßt, sich wieder vereinigt, — und sich mit seiner dünnen Sehne entweder ans mittlere, oder ans Seitenzungenbein befestigt.

Abweichung.

Bisweilen fehlt er auf einer Seite; bisweilen ist im Gegentheile noch ein anderer sehr ähnlicher kleinerer vorhanden; — bisweilen setzt sich dieser andere an den Winkel des Unterkiefers ¹⁾ oder ans rundliche Zungenbein.

Wirkung.

Zieht die Zungenbeine und dadurch die Zunge und den Kehlkopf schief zur Seite und rückwärts hinauf,

2) Dieser Schleimsack ist noch nicht abgebildet.

1) Mayer, Band 3. pag. 547.

144
*Malecarne soll für
Stylohyoideus genommen werden*

oder, wenn beyde wirken, gerade in die Höhe. — Ist die Zunge vorwärts gezogen, so zieht er sie rückwärts. — Unterstützt auch den zweybäuchigen Kiefermuskel im Heraufziehen des Unterkieferß.

Griffelzungenmuskel.

Styloglossus.

Albinus Tab. XI. Fig. 40. 43. — Santorini Tab. posth. VI. F.

§. 150.

Kommt sehnig, tiefer, und mehr nach vornen als der Griffelzungenbeinmuskel von der Spitze des Griffels, meist auch vom Bande, das zwischen dem Griffel und dem Unterkiefer liegt; ist anfangs schmal, dann breiter, bis er sich wieder dünner und gebogen unten seitwärts in die Zunge begiebt, in welcher er sich, in zwey, drey oder vier Lagen ausbreitend, bis gegen ihre Spitze hin verliert. Gewöhnlich vermischt er sich mit dem äußersten Theile des Zungenbeinzungenmuskels, und mit dem Kieferzungenmuskel.

Abweichungen.

Bekommt bisweilen Fleischfasern vom Unterkiefer. Bisweilen giebt er Fasern zum Kehlkopf. Fehlt bisweilen ².

²) Boehmer. Obs. rarior. Praefat.

Wirkung.

Zieht die Zunge schief zur Seite, und rückwärts in die Höhe. — Wirken beide zugleich, so machen sie die Zunge breiter.

Kieferzungenbeinmuskel, oder Quersmuskel des Kiefers.

Mylohyoideus.

Albinus Tab. XI. Fig. 38.

§. 151.

Kommt kurzsehnig von der Erhabenheit an der innern Fläche des Unterkiefers, die sich vom letzten Backenzahne schief vorwärts erstreckt, geht queer gegen den gleichnamigen der andern Seite herüber, vereinigt sich mit ihm, nicht nur durch eine meist unterhalb etwas breitere sehnige Linie, sondern selbst durch Fleischfasern zu einem gemeinschaftlichen Muskel, der den Raum zwischen der Kinnlade und dem mittleren Zungenbeine ausfüllt. Die vordersten Fasern sind die kürzesten, die hintersten die längsten. — Mit seinen hinteren am Ende sehnigen Fasern sitzt er am vorderen und unteren Theile des mittleren Zungenbeins fest.

Abweichungen.

Ein Theil von ihm setzt sich auch wohl an die

mittlere Sehne des zweybäuchigen Kiefermuskels; — oder er vermischt sich mit dem Niederzieher der Zungenbeine ³.

Wirkung.

Schwerlich wirkt einer allein. Sie ziehen daher nicht nur die Zungenbeine und die mit ihnen verbundenen Theile aufwärts, sondern heben auch die vor selbigen liegenden Theile in die Höhe; — drücken die Zunge an den Gaumen; — vielleicht hilft auch sein am mittlern Zungenbeine befestigter Theil, wenn die Zungenbeine schon niedergezogen sind, noch in etwas den unteren Kiefer vom oberen abziehen; — scheint auch durch ein Pressen auf die zwischen ihm und der Zunge liegenden Speicheldrüsen zu wirken.

Kinnzungenbeinmuskeln, Geniohyoideus.

Albin. Tab. XI, Fig. 36.

S. 152.

Kommt mit kurzen, aber starken Sehnenfasern vom unteren Höckerchen der innern Fläche des Kinnstücks des Unterkiefers, wird allmählig stärker und breiter, liegt mit seiner inneren Seite am gleichnamigen; — und setzt sich meist fleischig an den oberen

³) Haller T. 7. p. 298.

und vorderen Theil des mittleren Zungenbeines, bisweilen bis ans Seitenzungenbein fest.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen setzt sich ein Theil von ihm abgesondert in etwas ans mittlere, meist aber ans Seitenzungenbein. — Bisweilen ist er ungepaart; — bisweilen hingegen auf beiden Seiten doppelt ⁴.

W i r k u n g.

Zieht die Zungenbeine gegen den Unterkiefer vorwärts in die Höhe, bis die Zunge zum Munde austritt; — zieht folglich auch den Kehlkopf in die Höhe. — Sind aber die Zungenbeine niedergezogen und befestigt, so hilft er den Unterkiefer herunterziehen, weil er in dieser Rücksicht gleichsam als eine Fortsetzung des Niederziehers der Zungenbeine angesehen werden kann.

Zungenbeinzungenmuskel.

Hyoglossus.

Albin. unter dem Namen des Basioglossus, Chondroglossus und Ceratoglossus. Tab. XI.

S. 153.

Kommt ganz fleischig mit einem Theile (Ceratoglossus Albin.) vom äußeren Rande des Seitenzungenbeines, wird allmählig im Aufsteigen schmaler,

⁴) Mayer, Band 3. S. 547.

und verbreitet sich in den hinteren, unteren und Seitentheil der Zunge, wo er sich mit dem Griffelzungenmuskel vermischt. — Der zweyte stärkere Theil (Basioglossus Alb in.) kommt vom mittleren Zungenbeine, legt sich an den vorigen Theil, breitet sich allmählig aus, und begiebt sich in den vorderen Theil der Zunge. — Der dritte Theil (Chondroglossus⁵⁾) kommt zwischen den beiden vorigen Theilen vom runden Zungenbeinchen, auch wohl vom benachbarten mittleren Zungenbeine, und mischt sich unten der Seite der Zungenwurzel am Anfange des eigentlichen Zungenmuskels und des Kinnzungenmuskels bey.

Abweichung.

Bisweilen lassen sich vier Portionen unterscheiden.

Wirkung.

Zieht den vorderen und Seitentheil der Zunge nebst dem Griffelzungenmuskel nach unten und innen, und macht die Zunge eben, wenn sie gekrümmt oder löffelartig hohl war. — Einer allein zieht die Zunge schief auf seine Seite. — Hebt die Zungenbeine in die Höhe, im Falle die Zunge durch den Kinnzungenmuskel und Kinnzungenbeinmuskel befestigt ist.

5) Gut abgebildet bey Courcelles, Tab. 8. D.

R i n n z u n g e n m u s k e l.

Genioglossus. }

Albin. Tab. X. Fig. 3. k. l. m. n. Courcelles
Tab. 2.

§. 154.

Kommt mit einer kurzen starken Sehne über dem Ringungenbeinmuskel, vom innern Höcker des Unterkieferß, geht wie eine sehr dicke plattgedrückte Quaste sich ausbreitend rückwärts in den unteren Theil der Zunge. — Seine vordersten Fasern sind die kürzesten, die hintersten die längsten. An der Wurzel der Zunge geht von ihm unterhalb eine schmale Portion ab, die sich am Ende sehnig an die Zungenbeine festsetzt. Ferner schießt er rückwärts und aufwärts Fäden in die Haut des Schlundkopfes, die sich größtentheils mit der mittlern Portion des Zungenbeinringungenmuskels, theils mit dem oberen Schlundkopfschnüerer, theils mit dem Griffelzungenmuskel vermischen; endlich wo beide sich an eben der Wurzel der Zunge vereinigen, steigen von ihnen oder von der Zunge selbst Fäden gegen das mittlere Bändchen des Kehlsdeckels aufwärts, um sich auf dem Rücken des Kehlsdeckels zu verlieren.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen begeben sich von dem Bande zwischen

dem Griffel und dem Seitenzungenbeine Muskelfäden zu ihm; — bisweilen scheinen sie dreyfach ⁶.

Wirkung.

Zieht die Zunge vorwärts in die Höhe, und mit ihr auch den Schlundkopf, den er von den Seiten beengt. — Hilft die Zunge zum Munde herausstrecken. — Zieht die Seitentheile der Zunge auseinander, und macht sie dadurch breiter; — krümmen sich hingegen seine Fibern um, so ziehen sie die Zunge rückwärts — sind die Zungenbeine heruntergezogen und befestigt, — so unterstützt er die Abziehung des Unterkiefers vom oberen, und hilft den Mund öffnen. — Seine Fasern, die gegen den Kehlsdeckel laufen, richten selbigen nach vornen auf.

Zungenmuskel.

Lingualis.

Albin. Tab. XI. Fig. 41. 43. Courcelles Tab. 8.

*per Penada sulla struttura delle parti
più interne della lingua.*

§. 155.

Tab. 3. in An.

*Memorie di Anatomia
et fisica della società*

italiana. Tomo 8.

parte 1. Modena. 1799

4to. mit einem Kupfer.

Besteht aus Muskelfäden, die unterhalb der Zunge längs ihrer Seite liegen, sich von ihrer Wurzel bis zur Spitze hin erstrecken, und mit den vorigen Muskeln der Zunge, die vom Zungenbeine, Griffel und Rinne kamen, verflechten.

6) Mayer, Band 3. p. 547.

Wirkung.

Verkürzt die Zunge der Länge nach, krümmt sie ferner nach unten zu, so daß ihre Spitze das Zungenbändchen und den Grund der Mundhöhle berührt.

Griffelschlundkopfmuskel.

Stylopharyngeus.

Albin. Tab. XII. fig. 27. 28. 30. Santorini Tab. posth. VI. E.

S. 156.

Kommt sehnig und dünne von der inneren und unteren Seite des bey jungen Leuten beweglichen Stückes des Griffelfortsatzes, wird dicker und unter den Schlundmuskeln allein rundlich, — bis er allgemach nach innen und vorne absteigt, mit dem Gaumenschlundkopfmuskel sich verbindet, dem oberen Schlundkopfschnürrer sich beylügt, und in den Schlundkopf und in das Innere des Kehlkopfes sich verbreitet.

Abweichungen.

Man sah ihn doppelt auf einer Seite 7; ja bisweilen dreysach. Der obere gieng bis in den Bogen des Zäpfchens, der mittlere zum Kehlsdeckel, der untere an den Schildknorpel 8. Bisweilen streicht er bis in die Gegend der Stimmritze 9.

7) Boehmer Obs. Praef. p. 17. Instit. Osteol. p. 117.

8) Haase Myotomiae specimen de musculis Pharyngis Lips. 1784. p. 13.

9) Girardi orat. de re anat. not. i.

Wirkung.

Zieht den Schlundkopf und Kehlkopf rückwärts und auswärts in die Höhe; — oder gerade, wenn sie beide wirken; — verkürzt dadurch den Schlundkopf so, daß sich das Kehldeckelchen über die Stimmritze legt, und zieht ihn, wenn er von beiden Seiten wirkt, nach den Seiten auseinander.

Schlundkopfschnüerer.

Constrictores Pharyngis.

Courcelles Tab. 6. Albin. Tab. XII. Fig. 13. 14. 15. 16. Santorini Tab. posth. Fig. 1. am getreuesten und schönsten in natürlicher Größe.

S. 157.

Die Muskelfasern, welche den trichterförmigen Sacl des Schlundkopfs von außen und hinten umgeben, werden füglich, da sie als drey dünne Blätter etwas über einander geschoben liegen, in den oberen, mittleren und unteren Schnüerer getheilt. — Sie schlagen sich von der rechten und linken Seite nach hinten herum, und stoßen in der Mitte in eine weiß zellige, aber nicht sehnige Scheidungslinie zusammen. — Da man am bequemsten von außen her diese Muskelfasern untersucht, so geht in der Beschreibung der untere Schnüerer voraus, weil er von hinten her den folgenden bedeckt.

*Monro jun Kopfweill
P. all. v. in. M. H. H.
Vol. 2. p. 68*

Unterer Schlundkopfschnüerer. — Kommt in Portionen getheilt, seitwärts, vom Ring- und Schildknorpel, ist anfangs schmal, breitet sich dann im Herumschlagen aus; und bekommt Fasern vom Niederzieher des Schildknorpels, und zuweilen auch vom Ring- und Schildknorpelmuskel zugemischt. Wie seine Fasern allmählig höher liegen, werden sie aus querliegenden, sehr dünnen, allmählig dicker, schräger, länger, und stoßen unter spitzen Winkeln mit denen von der anderen Seite zusammen. Sie bilden eine Spitze, die bis über die Mitte des Schlundkopfs hinaufreicht, und vermischen sich mit dem mittleren Schlundkopfschnüerer an den Stellen, wo sie auf ihm liegen. — Ist der stärkste und längste.

Mittlerer Schlundkopfschnüerer. —

Kommt auf gleiche Art, anfangs schmal, dann sich strahlenförmig ausbreitend, vom rundlichen Zungenbeine und von der Spitze des Seitenzungenbeins, so, daß seine Fasern ebenfalls unten kürzer sind, einigermaßen quer liegen, nach oben zu allmählig sich verlängern, aufsteigen, und in spitzen Winkeln mit denen von der andern Seite zusammenstoßen. Diese dadurch entstehende lange Spitze endigt sich dünnsehnig am Hinterhauptsbeine unten vor dem großen Rückenmarksloche.

frwärts
wenn
Schlund-
Stimm-
Seiten

r.

14. 15.
ßen und

rmigen
umge-
kätter
eren,
Sie
hin-
weise
nen.-
Mus-
ng der
en her

A b w e i c h u n g.

Bisweilen kommt er bloß vom runden Zungenbeinchen; — bisweilen hingegen mit zweyen bald vereinigten Portionen, einer breitem vom Seitenzungenbeine, und einer schmälern vom 'rundlichen Zungenbeinchen — bisweilen auch mit einer dritten Portion vom Bande zwischen den Zungenbeinen und dem Schildknorpel ¹.

Oberer Schlundkopfschnürer. — Bekommt seine Fasern theils vom Kinnzungenmuskel, theils von der Seite der Wurzel der Zunge, wo der Griffelzungenmuskel zuerst den Zungenbeinzungenmuskel berührt; theils vom Unterkiefer ohnfern des letzten Backenzahns; theils vom Oberkiefer mittelst des Backenmuskels; theils vom Haken des Flügelfortsatzes seiner ganzen Länge nach, theils vom inneren Blatte des Flügelfortsatzes; bisweilen auch vom benachbarten Gaumenbeine und vom Heber des Gaumens ²; theils von der Sehne des umgeschlagenen Gaumenmuskels; theils von der Pyramide; theils vom Griffel des Schläfebeins; theils vom Griffelschlundmuskel. — Ist der schwächste von den drey Schlundkopfschnürern, und umfaßt den oberen Theil

1) Haase Pag. 23.

2) Haller Elem. Physiol. Tom. 6. pag. 63. nennt ihn salpingopalatinus.

des Schlundes. Seine oberen Fasern bilden mit der Wölbung nach unten gekehrte Bogen; die untern liegen quere; die untersten sind nach vorne gebogen. Bisweilen zeigt sich auch eine von der Basis des Schen- dels kommende Portion (der sogenannte Cephalo- pharyngeus ³⁾), die anfangs sehnig und schmal, dann fleischig, stärker und breiter wird, sich unter dem oberen Schlundkopfschnürer so mit dem Griffelschlund- muskel verbindet, daß man sie für eine Portion des- selben halten sollte. Bald ist sie nur auf einer, bald auf beiden Seiten vorhanden. — Bisweilen wirft sich ein Theil der Portion, die von der Zunge kommt, über die Speicheldrüse am Unterkiefer ⁴⁾.

Wirkung.

Diese Schnürer ziehen den durch Speisen oder Getränke ausgedehnten Schlundkopf zusammen; — der Theil des oberen Schlundkopfschnürers, der vom umgeschlagenen Gaumenmuskel kommt, zieht den weichen Gaumen herab; — der Theil vom Unterkie- fer drückt die Mandel aus; — der mittlere Schlund- kopfschnürer zieht außer den Zungenbeinen und dem Kehlkopfe den Schlund in die Höhe, verkürzt und

3) Albin. annotat. acad. Libr. 4. c. 4. p. 26. Tab. V.
desgleichen Sandifort. Exercit. acad. Cap. 6. p. 81.
4) Santorini Tab. posth. VI. h. desgleichen Girardi
Oratio de re anat. not. 1).

verengt ihn; — die oberen Fasern des unteren Schlundkopfschnülers ziehen den Kehlkopf aufwärts.

Trompetenschlundkopfmuskel.

Salpingopharyngeus ⁵.

Albinus Tab. XI. fig. 27. 28. — Santorini Tab. posth. VI. fig. 2. f. f.

§. 158.

Könnte als ein Theil des folgenden Gaumenschlundkopfmuskels angesehen werden.

Kommt sehnig unten und vornen vom äußersten Rande des knorpeligen Theils der Ohrtrompete; wird fleischig, etwas dicker, steigt eine Strecke lang, für sich abgesondert, als der kleinste Muskel des Schlundkopfs hinab, und verliert sich ausbreitend in den folgenden.

Wirkung.

Zieht den Schlundkopf etwas vorwärts hinauf, und verkürzt ihn; — scheint umgekehrt auch die Mündung der Ohrtrompete herunter zu ziehen und zu erweitern.

⁵) Haller Tab. 6. pag. 44. scheint ihn für keinen ächten Muskel zu halten

G a u m e n

Gaumenschlundkopfmuskel.

Palatopharyngeus.

Albinus Tab. XII. Fig. 11. 27. 28. 29. 30. — Santorini
Tab. posth. VI. Fig. 2. G. von hinten. Tab. VII. KK.
sehr schön von vornen.

§. 159.

Kommt anfangs dünn, aber breit, von der Mitte
der hinten aus der Nase kommenden Gaumenhaut,
nimmt den ganzen zwischen dem hinteren Rande des
Zungenbeins bis zum Zäpfchen enthaltenen Raum ein,
so daß hier der rechte und linke sich vereinigen. —
Er besteht aus zwey Lagen, die den Heber des wei-
chen Gaumens so zwischen sich aufnehmen, daß eine
über ihm, die andere unter ihm liegt ⁶. — Jeder
schlägt sich, nachdem ihm noch Fasern vom unge-
schlagenen Gaumenmuskel beygemischt sind, seitwärts
im weichen Gaumen herunter, so daß er sich theils
in den Bogen hinter der Mandel senkt, theils hinten
im Schlundkopfe mit seinen Fasern in einen Winkel
wieder zusammen stößt, bekommt den Trompeten-
schlundkopfmuskel und Griffelschlundkopfmuskel bey-
gemischt, fährt mit ihnen gemeinschaftlich sich aus-
breitend und verdünnernd herunter, und heftet sich
theils an den Schildknorpel, theils verliert er sich in

⁶) Man vergleiche auf Albinus 10ter Tafel die 13te Figur
mit der 14ten."

S. Muskellehre.

die hinten zwischen dem Schildknorpel befindliche Haut, wo er sich mit dem mittleren und unteren Schlundkopfschnüer verwebt.

Wirkung.

Beide ziehen den weichen Gaumen, besonders seine Seitentheile, und am meisten den untersten Theil desselben abwärts zusammen, krümmen ihn nach unten und vornen, und verschließen mit Hülfe der Zunge und der oberen Schlundkopfschnüer klappenartig der Speise und dem Getränke den Weg in die Nase. — Zu gleicher Zeit wird der Schlundkopf nebst dem Kehlkopfe in die Höhe gezogen, und der Schlundkopf verkürzt und erschlaft. — Leeren die Mandeln aus, und schmerzen daher beym Schlingen, wenn sie geschwollen sind 7.

Verenger der Rachenmündung.

Constrictor Isthmi Faucium.

Albin Tab. XII. Fig. 11. — Santorini Tab. posth. VII. o. o.* sehr schön in natürlicher Größe.

§. 160.

Kommt von der Wurzel der Zunge schmal, dünn und bogenförmig, gleich unter der Haut vor der Mandel in den weichen Gaumen hinauf, wo er sich ausbreitet mit dem Gaumenschlundkopfmuskel verbindet,

7) Haller pag. 76.

in der Mitte mit dem von der andern Seite zusammenkommt, und sich bis ins Zäpfchen hin erstreckt.

Wirkung.

Zieht den weichen Gaumen und die Zunge aneinander, und verengt dadurch die Mündung des Rachens. — Hilft mit dem Gaumenschlundkopfmuskel die Mandel ausleeren.

^{Levator}heber des Gaumens.

Levator Palati mollis.

Albinus Tab. XII. Fig. 9. — Santorini Tab. posth. VII. L. L. vortreflich unter dem Namen Salpingostaphylinus, doch etwas verschieden.

S. 161.

Kommt sehnig vom äußersten Ende der Pyramide, wo sie die aus der Paukenhöhle kommende Trompete bildet, wird fleischig, flach, rundlich, dann allmählig im Fortgange breiter und dünner; — steigt zum weichen Gaumen vorwärts und innwärts herunter, nimmt den ganzen Raum desselben, vom hintern Rande des Gaumenbeins bis zum Zäpfchen ein, vereinigt sich mit dem von der andern Seite unter einem Winkel, vermischt sich mit dem Gaumenschlundkopfmuskel, und haftet in der auß der Nase kommenden Sehnenhaut. — Er ist der stärkste Muskel des Gaumens.

Wirkung.

Indem er den weichen Gaumen rückwärts so in die Höhe hebt, daß sein hinterer Theil in der Mitte am höchsten steigt, und die Seitentheile flach werden, der vordere aber locker herabhängt, schließt er den Gang, der aus dem Munde in die Nase führt, z. B. wenn man bey offenem Munde athmet. — Zu gleicher Zeit werden durch ihn die von der Zunge und dem Rachen zum Gaumen aufsteigenden Bögen fast gerade gespannt, und bilden an der Wurzel des Zäpfchens einen Winkel.

Umgeschlagener Gaumenmuskel oder Gaumenspanner.

Circumflexus Palati. Tensor palati.

Albinus Tab. XII. Fig. 9. 10. — Santorini Tab. posth. VII. 1.

S. 162.

Bildet gleichsam den vierten Muskelbogen im Gaumen.

Kommt sehnig größtentheils von der Pyramide auswärts am vorigen, desgleichen etwas sehnig, doch meist fleischig vom benachbarten Grundbeine aus einer eigenen Furche am ovalen Loche; theils sehnig vom Knorpel der Ohrtrompete. Beyde Stücke vereinigen sich bald zu einem allmählig stärker werdenden, aber

wieder abnehmenden Muskel, der in eine breite Sehne übergeht, die sich um den Haken des Flügelfortsatzes beugt, so daß zwischen ihm und dem Haken ein Schleimsack liegt *, noch stärker und breiter wird, sich im oberen Theile des weichen Gaumens mit der aus der Nase kommenden Sehnenhaut verwebt, und bis zur Naht zwischen beyden Gaumenbeinen erstreckt. — An seiner Sehne sind Fasern des oberen Schlundkopfschnürers und des Gaumenschlundkopfmuskels befestigt.

A b w e i c h u n g.

Man sah einen kleinen Theil der Sehne sich nicht um den Haken schlagen, sondern an die Wurzel desselben festsetzen ?. — Ein kleinerer Theil der Sehne gieng rundlich, ohne sich um den Haken zu legen, wieder in Fleisch über, und mischte sich dem Backenmuskel ein.

W i r k u n g.

Spannt den weichen Gaumen, und zieht ihn vorwärts herunter, drückt die Ohrtrumpete von außen nach innen zusammen, erweitert sie aber im Anzieshen ¹. — Widersteht den Theilen des obern Schlund-

^{§ 96. p. 73.}

- 8) Gerlach in der ang. Diss. Tab. 2. X.
- 9) Albinus in der Explicat. Tab. XII. Fig. 10. verglichen mit der Hist. Musc. pag. 247.
- 4) Haller Tom. 7. pag. 50.

kopfschnürers und Gaumenschlundkopfmuskels, die sich an seine Sehne legen.

Muskel des Zäpfchens.

Musculus Uvulae.

Albin. Tab. XII. Fig. 8. — Santorini Tab. posth. VI. Fig. 2. F.

§. 163.

Zeigt sich ohnfern der Naht der Gaumenbeine an die aus der Nase kommende Sehnenhaut, und an die Sehne des umgeschlagenen Gaumenmuskels befestigt, bildet drauf ein flaches spulförmiges, doch nach unten zu spitziges Fleisch, das mitten durch den weichen Gaumen, auch wohl mit dem Gaumenschlundkopfmuskel, oder dem Heber des Gaumens vermischt, gerade ins Zäpfchen absteigt.

Abweichung.

Ist gewöhnlich ein ungepaarter Muskel, doch bisweilen doppelt²⁾, oder aus zwey leicht zu unterscheidenden Bündeln zusammengesetzt.

Wirkung.

Zieht das Zäpfchen herauf, verkürzt und krümmt es vorwärts.

2) S. Santorini am angef. Orte. Auch ich sah ihn mehrmalen doppelt.

Ring- und Schildknorpelmuskel.

Cricothyreoideus (Dilatator glottidis anterior).

Albinus Tab. XI. Fig. 46. 47. 48.

§. 164.

Kommt vorwärts und seitwärts vom Ringknorpel, besteht gewöhnlich aus einer doppelten, entweder nur leicht, oder meist durchaus, besonders oberhalb getheilten Portion. Die vordere Portion ist kleiner, kürzer, gerader aufsteigend; die hintere, größer, länger und schiefer aufsteigend. Beide Portionen sind anfangs schmal, und setzen sich mehr dick als breit an den Schildknorpel über dessen untern Rand fest. Doch bleibt die vordere Portion breiter, da sich die hintere mehr zusammenzieht.

Abweichungen.

Bisweilen ist er vollkommen doppel. — Bisweilen giebt er deutlich Fasern an den Schlundkopf. Bisweilen giebt der rechte auf seiner Seite Fasern an den obern Theil der Schilddrüse.

Wirkung.

Zieht den Schildknorpel und Ringknorpel gegeneinander, und erschläfft die Stimmröhre. — Doch zieht die vordere Portion den Schildknorpel gerader gegen den Ringknorpel vorwärts herunter, und den Ringknorpel gerader gegen den Schildknorpel herauf;

die hintere hingegen zieht den Schildknorpel schräger vorwärts herunter, und den Ringknorpel schräger hinterwärts herauf, und spannt dadurch im Gegentheile die Stimmritze, wenn nämlich zu gleicher Zeit der Schildknorpel durch andere Muskeln vorwärts tritt. Drückt die Haut des Kahlkopfs, wo er auf ihr liegt, nach hinten.

Hinterer Ring- und Schnepfknorpelmuskel.

Crico arytaenoideus posticus (Dilatator glottidis posterior).

Albinus Tab. XII. Fig. 2. 4.

S. 165.

Füllt die hintere Ausbuchtung des Ringknorpels aus, steigt, sich allmählig zusammenziehend, schief nach außen; — und setzt sich auswärts und hinterwärts an ein eigenes Knöpfchen der Basis des Schnepfknorpels.

Wirkung.

Zieht den Schnepfknorpel auswärts und rückwärts in die Höhe, und neigt ihn endlich zur Seite. — Wirken beide zugleich, so entfernen sie die Schnepfknorpel voneinander, und erweitern die Stimmritze, deren hinterer Theil dadurch rundlich wird.

Seiten
Innerer Ring- und Schnepfknorpelmuskel.

Crico arytaenoideus Lateralis.

Albin. Tab. XII. Fig. 5.

§. 166.

Kommt von der Seite des Ringknorpels, und dem vordern Bande zwischen dem Ring- und Schildknorpel, auch wohl vom Schildknorpel selbst³; steigt schief aufwärts, wird allmählig schmaler und sehnig; setzt sich ebenfalls zur Seite dicht vor dem hintern Ring- und Schnepfknorpelmuskel an den Schnepfknorpel; ist kleiner als der hintere Ringschnepfknorpelmuskel.

Wirkung.

Wirken beide, so ziehen sie die Schnepfknorpel vorwärts, und drehen sie so, daß sie sich durch ihre vordern Spitzen fast bis zur Berührung gegeneinander wenden, hinten aber voneinander entfernen. — Daher wird durch sie die Stimmriße vornen verengert, und endlich geschlossen, doch so, daß sie hinten etwas offen bleibt⁴.

3) Caldani desgl. Girardi Orat. de re anat. not. i.)

4) Nach Haller hingegen de Corp. hum. Fabr. Tomo 7. p. 250. wirkt er nicht sehr verschieden vom Thyreoarytaenoideus, und erweitert sowohl die Spalte zwischen beiden Schnepfknorpeln, als die Stimmriße.

Schräger
Schräger
Gegen-
ber Zeit
vornwärts
auf ihr
muskel.
lotti-
gknorpel
, schief
und hin-
wärts des
rück-
seite. —
Schnepf-
knorpel



Schräger Muskel der Schnepffknorpel.
Arytaenoideus obliquus ⁵.

Albin. Tab. XII. Fig. 2. 3.

§. 167.

Kommt vom hintern und äußern Theile der Basis des Schnepffknorpels, steigt schräg, den andern kreuzend, gegen die Spitze des entgegengesetzten Schnepffknorpels hinauf, wird ein wenig breiter, schlägt sich sowohl um den Schnepffknorpel selbst, als um das auf ihm sitzende Knöpfchen, und geht mit dem von unten her an ihn stoßenden Schild- und Schnepffknorpelmuskel bis zum Kehldedeel. — Ist der dünnste Muskel des Kehlkopfs, und nicht füglich vom folgenden abgesondert darzustellen.

Abweichungen.

Bisweilen kommt er vom Knöpfchen des Ringknorpels, auf dem er sitzt; — bisweilen sondern sich einige seiner höhern Fasern ab, gehen über den andern Schnepffknorpel bis zum Kehldedeel, und verdienen den Namen des Schnepffkehldedeelmuskels (*Aryepiglottidei*); — bisweilen hingegen gehen sie nicht weiter, als die Fasern des Quermuskels der Schnepf-

5) Die *Arytaenoidei obliqui* mit dem *Arytaenoideus transversus* zusammen genommen, heißen auch füglich der *Constrictor minor glottidis*; hingegen die folgenden *Thyreoaerytaenoidei* der *Constrictor major*.

knorpel; — bisweilen fehlt einer, bisweilen fehlen beide, wo sie alsdann durch einige Fasern des Quermuskels der Schnepfknorpel ersetzt werden.

Wirkung.

Ziehen die Schildknorpel wechselseitig aneinander, und das Kehlsdeckelchen hinterwärts, beengen folglich die Stimmrinne.

Quermuskel der Schnepfknorpel.

Arytaenoidens Transversus.

Albinus Tab. XII. Fig. 1.

S. 168.

Geht als ein fleischiges, an den Enden dünnes und sehniges, in der Mitte dickeres Querband von einem Schnepfknorpel zum andern herüber, ist breiter und stärker, als der schräge Schnepfknorpelmuskel, von dem er sich nicht wohl trennen läßt.

Abweichung.

Ist bisweilen getheilt oder förmlich doppelt; — bisweilen ersetzen Fasern von ihm den schrägen Schnepfknorpelmuskel, die nicht selten bis zum Kehlsdeckelchen reichen; — bisweilen ist er mit dem Schild- und Schnepfknorpelmuskel vermischt.

Wirkung.

Zieht die Schnepfknorpel aneinander.

knorpel,
der Ba-
andern
gefehten
breiter,
st, als
mit dem
Schnepf-
dünnsfe
folgen-
3 Ringe-
ern sich
en an-
er die-
Arye-
e nicht
Schnepf-
oidens
füßlich
folgen



Größerer und Kleinerer Schild- und Schnepf-
knorpelmuskel.

Thyreoarytaenoides.

Albinus Tab. XII. Der größere fig. 3. 4. Der kleinere
fig. 6. 7.

S. 169.

Der Größere kommt unter dem Kehldeckel, zum Theile auch wohl vom Kehldeckel selbst, theils mitten vom Schildknorpel, theils vom Bande, welches vorne den Schildknorpel mit dem Ringknorpel verknüpft, wird im schräg Auswärtssteigen schmaler, und — setzt sich an den vordern Theil des Schnepfknorpels, zwischen die Enden des Arytaenoides transversus und Cricoarytaenoides lateralis, indem er sich gewöhnlich dem Arytaenoides obliquus einmischt.

Der Kleinere (der doch bisweilen fehlt) kommt vom Schildknorpel ohnfern seines herzförmigen Ausschnitts, wird schräg aufsteigend schmaler, — und setzt sich theils an den Schnepfknorpel gleich über dem Cricoarytaenoides lateralis, theils von außen an die Tasche im Kehlkopf fest.

Wirkung.

Erweitern * die Stimmritze, indem sie die Schnepfknorpel vorwärts neigen; — der größere

6) So scheint Hallern und Camperr. — Nach Albin hingegen verengern sie die Stimmritze.

zieht durch einen Theil das Kehlsdeckelchen herunter; — der kleinere drückt durch einen Theil die Tasche zusammen, und scheint sie auszuleeren 7.

Größerer und kleinerer Schildkehldeckelmuskel.
Thyreoepiglotticus 8.

Albin. Tab. XII. fig. 3.

§. 170.

Der größere kommt anfangs am breitesten inwendig vom Schildknorpel nach außen zu am obern Theil des Ursprungs des größern, Thyreoarytaenoides, — und setzt sich an den Seitenrand des Kehlsdeckels, wo er sich mit dem schrägen, Arytaenoides, vereinigt. — Bisweilen erhält er noch eine Portion vom Ringknorpel, und dringt auch wohl mit einem Fleischbündel durch den kleinern, Thyreoarytaenoides 9.

- 7) Santorini obs. anat. Tab. 3. Fig. 2. M. bildet einen runden Muskel ab, der mit beiden Enden an der innern Seite des Schildknorpels festsaß.
- 8) Einige wollen noch bisweilen einen Retractor oder Elevator Epiglottidis in dem Bändchen das von der Zunge zum Stimmrißendeckel geht, und einen Hyoepiglotticus gesehen haben. Haller d. C. H. F. Tom. 7. p. 255. Der Fasern vom Styophlaryngeus zum Stimmrißendeckel ist §. 156. gedacht worden.
- 9) Albinus Tab. XII. Fig. 7.

Schnepf
kleinere
hDeckel,
theils
de, wes
gknorpel
schmäler,
Schnepf
us trans
dem er
mischf.
kommt
Aus-
und
dem
in die
e die
fere
g W.



Der kleinere ² kommt höher als der größere inwendig mitten vom Schildknorpel, — und setzt sich an die Seitenwand des Kehlsdeckels über seine Wurzel.

Wirkung.

Beide ziehen den Kehlsdeckel nieder.

Äußerer schräger Bauchmuskel.

Obliquus externus Abdominis.

Albinus Tab. XIII. fig. 1. et 2. doch sind die Sehnenfasern nicht deutlich genug von den muskulösen unterschieden.

S. 171.

Kommt von den acht untersten Rippen ohnfern ihrer Knorpel mit acht anfangs sehnigen Spitzen; bisweilen mit der neunten von der vierten Ripbe, oder auch, besonders wenn acht wahre Ripben sind, nur mit sieben, nämlich mit der ersten von der sechsten Ripbe. Die beiden obersten Spitzen vom untern Rande, die folgenden auch von der äußern Seite, und die beiden letzten auch vom Knorpel ihrer Ripben; die letzte bisweilen bloß von der Sehne des innern schrägen Muskels, oder, wenn die letzte Ripbe fehlt, von einem etwas längern Queerfortsaze des ersten Lendenwirbels.

Die meisten dieser Anfänge hängen mit den Zwischenribbenmuskeln zusammen, die obersten noch mit

1) Albinus Fig. 3. i. k. l.

dem großen Sägenmuskel, die untern mit dem breiten Rückenmuskel, die letzte mit dem Querverbauchmuskel. Einige von ihnen erscheinen gespalten. Sie werden nach unten zu stärker, auch bis zur fünften breiter, stoßen zusammen, und steigen mit ihren Fasern desto schräger und länger vorwärts herunter, je tiefer sie liegen, bis die untersten fast senkrecht absteigen.

Gegen den vordern Theil des Unterleibes geht er in eine ansehnliche, breite und dünne Sehne über, deren Hauptfasern, die vorzüglich oberhalb stark sind, in der Richtung der Muskelfasern, andere dünnere aber in fast entgegengesetzten Richtungen liegen.

Der obere Rand dieser Sehne läuft quer, wird mit dem größern Brustmuskel vereinigt, und verliert sich an den vordern Theil des Knorpels der sechsten und siebenten Rippe und an den benachbarten Theil der Spitze des untern Brustbeins; ferner begiebt sie sich auf der Mitte des Unterleibes der ganzen Länge nach mit der Sehne des gleichen Muskels der andern Seite und der Sehne der innern schrägen und der queeren Bauchmuskeln, zu einem dicken weißen Sehnenstricken oder der sogenannten weißen Linie, die über dem Nabel länger und breiter als unter ihm ist, zusammen, bis an die Vereinigung der Schaambeine, wo sie zwey Zipfel oder Säulen bildet.

er größer
setzt sich
Wurzel.
kel.
is.
Sehnen
verhieden
n abnehmen
gen; bis
be, oder
nd, nur
sechsten
untern
e, und
iben;
innern
e fehlt;
erfien
n Zwi
g mit



Der innere, obere und längere Zipfel mischt sich den Bändern der Schaambeine und der männlichen Ruthe ein, und nachdem er den gleichen Zipfel von der andern Seite gekreuzt hat, bis ans Schaambein der entgegengesetzten Seite herunter.

Der äußere untere und kürzere Zipfel legt sich im Fortgange unter den längern, und setzt sich oben zur Seite der Schaambeinvereinigung an den Höcker, und zum Theil an die nach außen von selbigem sich erstreckende Linie, auch in etwas nach innen zu an die Bänder der Schaambeinvereinigung.

Diese beyden gegen einander gefehrten, an den Bändern stärkern Zipfel lassen eine schrägliegende, von außen nach vornen und unten gerichtete, längliche, dreyeckige, elliptische oder eysförmige Lücke oder Spalte ² (den unschicklich sogenannten Bauchring) zwischen sich übrig, welche oberhalb rundlich spizig ist, und durch zarte Sehnenfasern, die schräg vom äußern Zipfel gegen den innern gehen, zusammen gehalten wird, und um die sich auch von hintenher bogenförmige Sehnenfasern schlagen. Bey Männern ist sie größer, weiter, schlaffer und höher, doch kaum einen
Zoll

2) Die vortrefflichste Zeichnung dieser Lücke, sowohl aus dem männlichen als weiblichen Geschlechte, findet sich auf Camper's 9ten und 13ten Platte von Brüchen.

*Atl. Corpor.
Hefelb. 1.*

Zoll lang, und zum Durchlassen des Saamenstranges nebst dem Hodenmuskel bestimmt; bey Weibern ist sie kleiner, enger, tiefer, und mehr außwärts liegend, und nimmt das runde Band des Uterus auf, welche Theile übrigen unter und hinter dem obern Zipfel, und über und vor dem untern Zipfel liegen. Bisweilen ist diese Spalte doppelt, so daß durch die kleinere einige Nerven dringen.

Der Rand, der den oberen Zipfel bildet, ist mit der Wölbung nach innen und oben, mit der Ausschweifung nach außen und unten gebogen. Der Rand des untern Zipfels hingegen ist gerader.

Ihr unterer stumpfer Winkel ist nach innen und vornen; ihr oberer spitzer Winkel ist nach außen und hinten gerichtet.

Ferner setzt sich diese Sehne von hinten an die äußere Lippe des oberen Theils des Hüftbeinkamms anfangs fleischig, dann sehnig.

Von diesem Kamme nämlich erstreckt sich eine sehnige Ausbreitung mit einem starken Rande gegen die Schaambeine, die sich nach unten und innen herumschlagend der Schenkelbinde einmischet, und anfangs gerade, dann mondformig mit nach oben gekehrter Höhlung erscheint, am andern Ende wieder gerade fortgeht, und unter sich die Gefäße und Nerven

E. Muskelsehre.

‡

Zipfel
und der
gleichen
bis ans
ter.
zipfel legt
setzt sich
an den
in selb-
ch innen
an den
de, von
e, drei-
alle =
schen
und
spfern
alten
enför-
ist sie
einen
Zoll
al aus
d auf



des Schenkels liegen hat; dieß ist das sogenannte Leistenband.²

*Lig. Suspens., Fallopiæ, Ovarial,
Roth.*

*Cooper. on hernia fol. 1804
Tab.*

*2. Himmelsatz sehr geeignet ist dieß
Bänder inwendig doppelt für ein
einmal durch die Öffnung
des Leistenbandes zu verlaufen
und so die Hernie zu bilden.
Art. Leistenband ist ein weiches
gerades Längen, flaches,
aus dem Tympanum sehr breites
und weiches.*

*Alg. Moore on Ovarial Hernia
Edinb 1803. 8te. nach dem Briten
Görschen - Doppel Moore
Anatomie Vol 2. 1813.
pag 76*

Uebrigens ist diese Sehne an den Einfügungen stärker, sonst oberhalb und unterhalb des Nabels schwächer und mit schiefen Löchern, besonders unter dem Nabel ohnfern der weißen Linie, für Gefäße und Nerven durchbohrt, ferner so dünne, daß vornen das Fleisch des geraden Bauchmuskels und unten das Fleisch des Pyramidenbauchmuskels und des innern schrägen Bauchmuskels durchschimmert.

Wirkung.

Zieht den Bauch zusammen, und die Ripben herunter und rückwärts, drückt und preßt die Eingeweide des Unterleibes, befördert dadurch alle Absonderungen, und unterstützt nachdrücklich die Ausleerungen des Magens bey dem Brechen, der Urinblase bey dem Harnen, des Mastdarms bey dem Stuhlgange, des Uterus bey dem Gebären; — schiebt dadurch den Zwerchmuskel aufwärts, verengt den Thorax, und hilft die Luft aus der Lunge treiben, wirkt folglich bey allen stärkern Ausathmungen, z. B. bey dem Blasen, Lachen, Ausspucken, Husten, Niesen; — und da keine beträchtliche Veränderung im Unterleibe und in der Brust vorgehen kann, ohne den Lauf des Bluts im Kopfe zu verändern, so wirkt er auch in sofern auf den Kopf; — zieht die Lende seiner Seite, wenn sie auf die andere

Seite herüber gebogen war, wieder gerade; — ist sie gerade, so zieht er sie ferner vorwärts herunter. — Hilft den Thorax auf der Wirbelsäule auf die entgegengesetzte Seite drehen; neigt ihn auf seine Seite herunter. — Hilft auch bey dem Liegen auf dem Rücken, wenn beyde zugleich wirken, das Becken sammt den untern Gliedmaßen in die Höhe richten; — wirkt auch bey dem Beyschlafen; — und bey dem Fortrutschen auf dem Hintern. — Hilft vielleicht auch die Schenkelbinde spannen. — So befestigt er auch das Brustbein, damit sich gegen selbiges der Kopfnicker besser zusammenziehen könne.

Der weiße sehnige Striemen aber dient als eine Fortsetzung des Brustknorpels zur festen und starken Anheftung und Vereinigung der Sehnen der schrägen und queeren Bauchmuskeln, ohne doch die Beugbarkeit im mindesten zu hindern.

Innerer schräger Bauchmuskel.

Obliquus internus Abdominis.

Albinus Tab. XIII. Fig. 3. 4. 5.

§. 172.

Kommt als eine breite, dünne, mit dem hinteren untern Sägenförmigen Muskel gemeinschaftliche, anfangs doppelte, darauf einfache Sehne von den Dornfortsätzen der drey untern oder auch alle fünf Len-

Denwirbel und des Kreuzbeins; ferner vom Hüftbein-
Kamme mitten zwischen seinen Rändern, und wo die-
ser vorwärts aufhört, gewissermaßen von der Sehne
des äußeren schrägen Bauchmuskels, — wird darauf
fleischig, steigt strahlensförmig mit seinen hintern und
mittlern Fasern aufwärts, mit den folgenden quer, mit
den unteren, den dünnsten, aber allmählig abwärts; —
geht vorwärts auf dem Unterleibe in eine sehnige
Ausbreitung mit einem mondförmigen Rande
über, die sich unten an die rauhe Linie, und an den
Höcker der Schaambeine ohnfern ihrer Vereinigung
gleich über der Sehne des äußern schrägen Bauchmus-
kels festsetzt; dann eine Strecke lang aufwärts mit
der Sehne des äußeren schrägen und queeren Bauch-
muskels verbunden einfach bleibt, vornen den geraden
Bauchmuskel bedeckt, von der untern Spitze aber des
Sehnenstriemens (der weißen Linie) an nach oben zu,
nachdem sie nur eine kleine Strecke lang einfach geblie-
ben, sich in zwey dünne Blätter theilt, deren vordere
stärkere sich mit der Aponeurose des äußern
schrägen Bauchmuskels verbindet, deren hintere
weit schwächere aber sich mit der Sehnenhaut des
queeren Bauchmuskels vereinigt; beide Blätter ge-
hen, indem sie den geraden Bauchmuskel zwischen
sich aufnehmen, bis zum Sehnenstriemen fort, und
stoßen von beiden Seiten zusammen. — Ferner setzt

er sich sehnig an die knorpelige Spitze des untern Brustbeins, drauf mit dem hinteren kreuzfaserigen Blatte, an den Knorpel der siebenten, achten, neunten und zehnten Rippe, und hängt in den Zwischenräumen der Rippen mit den Zwischenribbenmuskeln zusammen. — Im männlichen Geschlechte schickt er, nach unten zu, gleich über dem sehnigen Rand des äußern schrägen Bauchmuskels um den Saamenstrang, der schief durch sein Fleisch dringt, einige Fasern (s. unten Hodenmuskel). — Im weiblichen Geschlechte dringen durch ihn die runden Bänder des Uterus, denen einige Fibern von ihm beyzutreten scheinen ³.

Abweichungen.

Bisweilen findet sich unter der zehnten Rippe ein queer durch ihn laufender sehniger Streifen ⁴. — Bisweilen stößt zu ihm eine Portion vom Queerbauch-

3) Meckel in seiner Note g. zum 847. S. meiner Uebersetzung von Hallers Physiologie. Nach Meckel (sieh Otto Friedr. Rosenberger Diss. de Viribus partum efficientibus, generatim et de Utero speciatim. Halae 1791. mit einer herrlichen Abbildung) — laufen die Muskelfasern der runden Bänder des Uterus an den Bauchring, und verbreiten sich theils fleischig an den untern Fasern des Queerbauchmuskels, theils sehnig an den äußern schrägen Bauchmuskel, theils dringen sie durch den Bauchring in den Schaamhügel.

4) Sah ich in einem Manne nur auf der linken Seite.

muskel, und setzt sich mit ihm vereinigt anß Schaam-
bein. — Bisweilen liegt die Spalte für den Saamen-
strang über ihm, so daß er nichts zu ihr beyträgt. —
Bisweilen zeigt sich zwischen den beiden äußern schrä-
gen Bauchmuskeln, oder zwischen dem innern schrä-
gen und dem queeren Bauchmuskel ein mittlerer, der
von der über die Schenkelgefäße gespannten Sehne
des äußern schrägen Bauchmuskels kommt, und sich
in die Sehne des queeren Bauchmuskels verliert,
oder auch mit dem Brustmuskel zusammenhängt. —
Bisweilen liegt eine Portion zwischen dem Hüftbeine
und den Saamengefäßen, die weder dem innern
schrägen Bauchmuskel, noch dem Querbauchmuskel
anzugehören scheint, doch der Richtung der Fasern
des queeren folgt, und bisweilen den Hodenmuskel
bildet.

Wirkung.

Wirkt ohngefähr wie der äußere schräge Bauch-
muskel. — Zieht den unteren Rand des Thorax nach
unten gegen den Rückgrat. — Entfernt die Spigen
der unteren Ribben von einander und von den obern
Ribben. — Schnürt den Unterleib gegen den
Rückgrat zusammen. — Dreht die Lenden auf die
dem äußern schrägen Bauchmuskel entgegengesetzte

5) Gunz de Herniis. Lips. 1744. p. 18.

Weise nach außen. — Sieht dem geraden Bauchmuskel gleichsam einen Widerhalt. Da seine Fasern sich mit den Fasern des äußern schrägen Bauchmuskels kreuzen, so wirken sie zusammen in der Diagonalinie, wie die Zwischenrippenmuskeln.

P y r a m i d e n b a u c h m u s k e l.

Pyramidalis.

Albin. Tab. XIII. Fig. 7.

S. 173.

Kommt sehnig von der Vereinigung der Schaambeine, und vom Schaambeine selbst, ist anfangs dünn fleischig, aber am breitesten, steigt sich schmälend gegen den Sehnenstriemen heraus, ist mit der gemeinschaftlichen ihn bedeckenden Sehne des innern schrägen und des queeren Bauchmuskels zusammengeheftet, theilt dem geraden Bauchmuskel sehnige Fasern mit, bis er sich in eine feine Spitze endigt. — Bey jungen Kindern ist dieser Muskel verhältnismäßig sehr viel größer, als bey Erwachsenen 6.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen sah man drey 7, ja vier 8 Pyramidenbauchmuskeln, nämlich zwey auf jeder Seite. —

6) Ein Siebentheil vom geraden Bauchmuskel in einem Manne.
7) Ruysch Thes. anat. 4. N. 83.
8) Sabatier Anatomie T. 1. p. 526.

Schaam-
Saamen-
trägt. —
ern schrä-
ern schrä-
tlerer, der
en Sehne
, und sich
verliert,
hängt. —
Hüftbeine
a innern
uchmuskel
er Fasern
enmuskel

Bauch-
rax noch
Epiphen
Den ob-
gen den
auf die
ngeliegt



*was all dem den eigentlichen
Bosheit zu sagen giltigt. V. 22
Hauptkammer Beiträge. T. 16
ist für die Wahl auf der
ersten und die auf der
zweiten Seite.
1804. V. 19.*

Bisweilen ist er auf einer Seite kleiner, als auf der andern. — Bisweilen fehlt er auf einer Seite, oder auf beiden Seiten; alsdann pflegen die geraden an dieser Stelle breiter und stärker zu seyn; oder man hat auch bemerkt, daß alsdann die innern schrägen Bauchmuskeln nicht von der obern Ecke des Hüftbeinkamms, sondern tiefer vom Bande, welches von der unteren Ecke des Hüftbeins zum Schaambeine geht, kommen, so daß sie die Harnblase pressen können.

Wirkung.

Scheinen die geraden Bauchmuskeln zu unterstützen, indem sie das untere Stück ihrer Sehne spannen. — Sollten sie den schwangern Uterus unterstützen? — Vermuthlich helfen sie bey Kindern die angefüllte und über die Schaambeine ragende Harnblase ausleeren.

G e r a d e r B a u c h m u s k e l.

Rectus Abdominis.

Albin. Tab. XIII. Fig. 6.

S. 174.

Kommt mit zwey Sehnen vom Vereinigungsbande der Schaambeine, selten vom Schaambeine selbst; die innere tiefer liegende, schwächere Sehne von der Mitte dieser Vereinigung oder auch vom

9) Hunter Eph. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 34.



Schaambeine der entgegengesetzten Seite, so daß sie sich hier kreuzen; die äußere breitere weit stärkere Sehne vom obern Theile dieser Vereinigung; beide stoßen bald zusammen, und gehen in ein Fleisch über, das im Aufsteigen allmählig breiter und dicker wird, das Auszeichnende hat, daß es durch zwey, drey, oder drey und eine halbe, oder vier zickzackförmige Quersehnen in vier oder fünf Portionen geschieden wird, bis es sich im Ausbreiten verdünnt, gewöhnlich — mit drey Spizen an die Knorpel der siebenten, sechsten und fünften Rippe festsetzt. — Die erste, breiteste, und dickste Spitze setzt sich an den untern und äußern Theil des Knorpels der siebenten Rippe ohne fern seines Endes. — Die zweite und dritte Spitze ist sehniger, und setzt sich auch weiter vom Ende an die Rippenknorpel, so daß die dritte Spitze bisweilen selbst an den Knorpeltheil der fünften Rippe gelangt, wo sie bisweilen mit dem großen Brustmuskel zusammenstößt. — Am untern und obern Ende liegen beide gerade Bauchmuskeln dicht neben einander, und auf dem Bauchfell, in der Mitte aber von einander entfernt. — Wie sie von den Sehnen des innern und des äußern schrägen und des queeren Bauchmuskels eingeschlossen werden, ist oben erwähnt worden.

Die Quersehnen sind mehrentheils wellenförmig oder zackig; zwei, bisweilen drei liegen über dem

Wirden
vom 2. 15.

Nabel schief nach außen, zuweilen auch nach innen zu abhängig; die dritte liegt quere, gerade in der Höhe des Nabels; die vierte unter dem Nabel ist gewöhnlich nur halb, und von außen nach innen absteigend. — Bisweilen laufen auch die drey obern nicht durch die ganze Breite des Muskels. — Ihre Dicke oder Stärke ist sehr verschieden. Meist zeigen sie sich nur auf der äußeren Oberfläche, und hängen alsdann auch nur mit der beiden schrägen Bauchmuskeln (dem innern und äußern) gemeinschaftlichen Sehne zusammen; dringen sie hingegen durch die ganze Dicke des Fleisches, so hängen sie auch mit der gemeinschaftlichen Sehne des innern schrägen und des queeren Bauchmuskels zusammen, und die dadurch abgesonderten Portionen können als so viele eigene Muskeln angesehen werden. — Uebrigens ist der untere Rand der Fleischportionen dicker, als der obere.

Abweichungen.

Sind acht wahre Rippen vorhanden, so setzt sich auch wohl eine vierte Spitze an die achte Rippe; — oder sind acht wahre Rippen, und nur drey Spitzen, so setzen sie sich an den Knorpel der sechsten, siebenten und achten Rippe. — Bisweilen setzt sich eine Portion an die vierte Rippe ¹. — Bisweilen nur zwey

¹) Kaauw. Nov. Comment. Petropolit. T. 2. p. 559

in v. als
Bauh.
I. fent
ist in
auf
L. d. h.
I. f. l. l.
I. f. f. l. l.
1800.

Spitzen von der sechsten und siebenten Ripbe. —
 Fehlt der Pyramidenbauchmuskel, so ist sein unterer
 Theil stärker (s. oben). — Bisweilen zeigt sich (wie
 bey Hunden) eine Fortsetzung des geraden Bauch-
 muskels aufwärts über die Brust ², die sehnig und
 dünne vom vordern Theile des Knorpels der siebenten,
 und sechsten, oder der fünften, oder auch nur der
 vierten Ripbe, und über ihnen von der Sehne des
 äußern schrägen Bauchmuskels kommt, drauf fleischig
 und dicker, dann wieder schmaler, dünner und sehnig
 wird, und sich theils vornen oben ans obere Brustbein
³ festsetzt, theils sich mit dem größern Brustmuskel
 vereinigt, oder gar bis zur Sehne des Kopfnickers
 aufsteigt ⁴. — Auch sah man an einem Mohren einen
 ähnlichen Muskel zwischen der dritten und sechsten
 Ripbe liegen ⁵. — Ja man sah ihn bis zur ersten
 Ripbe, oder bis zum Schlüsselbeine gelangen ⁶.

*genauer Abbildung des ger.
 Pector. p. 156.*

*Wirden
 am 2. 15.*

*zwischen der fünften Ripbe in dem kugelförmigen Laster strom abis auf den ersten Fort-
 stärken.*

Albinus.

- 2) Eine rothe Abbildung hievon findet sich bey Vesa-
 lius de Corp. Hum. Fabrica. Lib. 2. Tab. 5. diese
 Varietät sah auch Behrend s. ¹
- 3) Haller Icon. anat. Fasc. 6. Tab. I. N.
- 4) Wilde Comment. Petrop. Tom. 12. Tab. 8. Fig. 5.
- 5) Sandifort in seiner Exercit. acad. p. 83. führt meh-
 rere Fälle aus verschiedenen Schriftstellern und nach
 Bonn's Beobachtung an. Siehe meine Abhandl. vom
 Neger.
- 6) Weitbrecht Commentar. Petropolit. Tom. 4.

*Behrend, auf der Brust soll
 auch oben in den
 Rippen die Brustmuskeln
 die gehen bis zur
 1. Rippe an der
 Schlüsselbeine, in
 in der Rippen der 1. Rippe
 Rippen bis zum 1. Hals-
 Rippen*

7) Henslow mit einer Abbildung in s. Beiträgen 22. 9. 92.

*innen zu
 der Höhe
 gewöhn-
 steigend. —
 durch die
 der Stärke
 ur auf der
 auch nur
 m innern
 ammen;
 des Flei-
 hastlichen
 en Bauch-
 sonderter
 feln ange-
 ere Hand
 fest sich
 bbe; —
 Spitzen,
 sieben-
 eine Pos-
 ur 1707
 p. 157*

Wirkung.

Wirken beide, so ziehen sie mittelst der drey untersten achten Ribbenpaare den Thorax vorwärts herunter. — Pressen den aufgetriebenen Unterleib nach innen. — Helfen umgekehrt bey dem Liegen auf dem Rücken das Becken mit den untern Gliedmaßen in die Höhe richten. — Die Querschnen scheinen zur Verstärkung seiner Kraft beyzutragen, indem sie die Fasern abkürzen, die vielleicht bey dieser Länge in der lockern Bauchdecke zu schwach seyn würden. — Auch gewinnt seine Wirkung, wenn die schrägen, die queeren und Pyramidenbauchmuskeln die Sehnnenscheide, womit sie ihn umgeben, spannen, und nach innen gegen das Bauchfell gleichsam andrücken.

Qu e r r e r B a u c h m u s k e l.

Transversus Abdominis.

Albinus Tab. XIV. Fig. 1. 2. 3.

S. 175.

Kommt sehnig und dünne, auch wohl in Portionen gespalten, von der innern Seite der sieben untern Ribben, meist von ihren Knorpeln, und nur wenig von ihren Knochen; ferner mit einer breiten Sehne von den äußersten Enden der Quersfortsätze des letzten Rückenwirbels und der vier obern Lendenwirbel, vom innern Rande des Hüftbeinkamms, und vom benach-

was ab.
Stück
3. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.



barten Theile der Sehne des äußern schrägen Bauchmuskels. Zu dieser hinter dem viereckigen Lendenmuskel liegenden Sehne tritt noch eine vorwärts den viereckigen Lendenmuskel überziehende zarte Sehne.

Gemeiniglich hängt er in den drey untersten Zwischenräumen der Ribben mit dem Zwerchmuskel zusammen, oft auch durch die Portionen, die von der siebenten, achten oder neunten Ribbe kommen, so daß ihre Spitzen oder Zacken wechselseitig in einander greiffen.

Auch ist er anfangs mit der gemeinschaftlichen Sehne des hintern untern Sägenmuskels, und dem innern schrägen Bauchmuskel verwachsen, so daß seine von den Querverfortsätzen kommende Sehne und diese Sehne als zwey Blätter den innern Bauch des Rückgratsstreckers zwischen sich aufnehmen.

Drauf wird er fleischig, und schlägt sich um den Unterleib, so daß seine meisten Fasern queer laufen, wenige der obern, die kurz und dem Sehnenstriemen sehr nahe sind, aufsteigen, die untern aber als die dünnsten desto mehr absteigen, je tiefer sie liegen. Eben diese untern Fasern vermischen sich mit den Fasern des innern schrägen Bauchmuskels.

Sodann geht er vornen der ganzen Länge des Unterleibes nach, vom Brustbeinknorpel an, bis zu den Schaambeinen, mit einem mondförmigen Ran-

*W. J. J. ...
... 2. 15.*

r drey un-
wärts her-
erleib nach
auf dem
ffen in die
zur Ver-
ie die Fa-
e in der
- Auch
die quee-
mscheide,
ch innen

e l.

Portio-
untern
wenig
Sehne
legten
nom
enach



de, unten und in der Mitte früher, als der innere Bauchmuskel, in eine sehnige Ausbreitung über, die den übrigen Theil des Unterleibes bis zur Bildung des Sehnenstriemen einschließt. Unterwegs vereinigt sich diese Sehnausbreitung ohnfern ihres Ursprungs mit der sehnigen Ausbreitung des innern schrägen Bauchmuskels, und spaltet sich in der Mitte zwischen dem Nabel und den Schaambeinen der Queere nach bis zum Sehnenstriemen, so daß sie mit dem untern Stücke von vornen her den geraden und den Pyramidenbauchmuskel bedeckt, indem sie sich mit dem hier bloß einfachen Stücke der Sehne des innern schrägen Bauchmuskels vereinigt, und dessen hintere Fläche bildet; mit dem oberen Stücke aber auf dem Bauchfell in das hintere Blatt der hier doppelten Sehne des innern schrägen Bauchmuskels hinter dem geraden Bauchmuskel sich verliert.

Oberhalb setzt sie sich mit dem innern Brustmuskel vereinigt an den untern Theil des Randes des Brustbeinknorpels; dann vereinigt sie sich vor diesem Knorpel mit der Sehne des Muskels von der anderen Seite; zuletzt, nachdem sie weiter nach unten feiner geworden ist, vermischt sie sich mit dem untersten Rande des äußern schrägen Bauchmuskels, der Sehne des innern schrägen Bauchmuskels, die ans Schaambein geht, und der Schenkelbinde.

1000 ab
Bauh.
1/2 fent
1/2 fent
1/2 fent
1/2 fent
1/2 fent
1/2 fent
1800

Unter dem Rande dieses Muskels tritt bey männlichen Geschlechte der Saamenstrang; bey weiblichen das runde Band des Uterus vor.

Abweichungen.

Bisweilen finden sich sehnige Quersfasern, die mitten durch sein Fleisch laufen. — Bisweilen findet sich noch ein kleinerer quere Bauchmuskel, der den andern kreuzt, und sich an die zwölfte Rippe setzt.

Wirkung.

Schnürt den Unterleib quer zusammen, und wirkt fast wie die schrägen Bauchmuskeln. — Näheret die rechten Rippen den linken, und verengt die Brusthöhle an dieser Stelle.

Zwerchmuskel, Zwerchfell.

Diaphragma, Septum Transversum.

Albinus Tab. XIV. 5. 6. 7. 4. doch sind die Sehnenfasern ein wenig zu stark vorgestellt.

Haller Nova Icon. Septi transversi. Goettingae 1741. Dasselbe Kupfer in dem ersten Fascikel der Iconum. Ein Nachstich, der aber dem Original nicht beykommt, in den operibus min. Tom. I. p. 263. ist so nachlässig copirt, daß die Buchstaben nicht einmal richtig stehen. Stellt die untere Fläche aus einem weiblichen Körper in meist natürlicher Größe vor.

Santorini Tab. posth. x. Fig. I. eine niedliche, kleine Abbildung der unteren Fläche außer dem Zusammenhange mit den Knochen.

§. 176.

Kommt auf der rechten Seite mit der stärksten

Wirkung
mm. 2. 15.

Portion des Ersten längsten und dicksten Zipfels (Caput, Appendix, Crus) mit einer breiten, mit dem langen Bande der Wirbelkörper verwebten, dünnen, bisweilen die der andern Seite kreuzenden Sehne vom vordern, untern und Seitentheil des Körpers des dritten Lendenwirbels, die bald schmaler, aber dicker und auswendig fleischig wird. Zu ihr stößt von hinten her eine andere ebenfalls anfangs sehnige kleinere Portion vom oberen Rande des dritten, oder vom unteren Rande des zweiten Lendenwirbels, und vom langen Wirbelbände; desgleichen eine dritte Portion vom unteren Rande des ersten Lendenwirbels, auch wohl noch eine vierte Portion vom mittleren und vorderen Theile eben dieses Lendenwirbels.

(Bisweilen kommt dieser erste Zipfel rechts bloß vom langen Wirbelbände unter dem zweiten, und vom zweiten Lendenwirbel selbst, oder auch vom dritten und vierten Lendenwirbel.)

Auf der linken Seite pflegt dieser erste Zipfel um einen Wirbel höher vom Rückgrate zu entspringen, und deshalb kürzer zu seyn, auch später in Fleisch überzugehen; übrigens auf eine ähnliche Art, theils vom langen Wirbelbände unter dem zweiten Lendenwirbel, theils vom zweiten Lendenwirbel selbst zu kommen, und eine kleinere Portion, theils von den Knorpelbändern zwischen dem zweiten und ersten

Len-

100 ab.
100 h.
100 f.
100 g.
100 i.
100 k.
100 l.
100 m.
100 n.
100 o.

Lendenwirbel, theils vom unteren und vorderen Theile
des ersten Lendenwirbels zu erhalten.

(Bisweilen kommt dieser linke erste Zipfel bloß
vom dritten, oder bloß vom ersten oder vierten Len-
denwirbel.)

Der zweite kleinere Zipfel kommt auf beiden
Seiten mit einer spitzern Sehne, auch mehr seitwärts,
als der erste, vom Körper des vierten, dritten,
zweiten, oder ersten Lendenwirbels, entweder von
den Körpern oder Bändern, die sie bedecken, und
wird drauf fleischig und dicker.

(Bisweilen kommt er auf einer Seite um einen
Wirbel höher vom Rückgrate, als auf der andern.
Bisweilen fehlt er auf einer Seite.)

Der dritte noch schwächere Zipfel kommt
gleichfalls auf beiden Seiten, von der Seite der Körper
des zweiten, oder des ersten Lendenwirbels, oder vom
Knorpelbande zwischen dem ersten Lenden- und letz-
ten Rückenwirbel, oder vom letzten Rückenwir-
bel selbst.

(Bisweilen kommt er mit drey Portionen a) vom
oberen Rande des zweiten, b) vom unteren, und c)
vom oberen Rande des ersten Lendenwirbels; biswei-
len auf der rechten Seite um einen Wirbel höher,
als auf der linken; bisweilen läßt er sich vom zwei-
ten Zipfel fast nicht trennen, und liegt mit seinem

S. Muskellehre.

M

164
yb. Anker in einem Muskel
Hemphann. 2. 15.

Sehnenbogen über dem runden Lendenmuskel; bisweilen fehlt er ganz.

Der vierte allerschwächste Zipfel kommt vom anderen Theile des Quersfortsatzes des zweiten Lendenwirbels, zu dem bisweilen eine Portion vom Quersfortsatz des ersten Lendenwirbels stößt.

(Bisweilen kommt dieser vierte Zipfel vom letzten Rückenwirbel; bisweilen nur von der sehnigen Bedeckung des runden Lendenmuskels.

Außer diesen acht Zipfeln (vier rechten und vier linken), kommt bisweilen noch auf jeder Seite einer vom letzten Lendenwirbel hinzu, der anfangs sehnig ist, dann fleischig und breiter wird, und sich zum zweiten Zipfel schlägt; bisweilen tritt noch eine Portion von der Oberfläche des viereckigen Lendenmuskels hinzu ⁷, die unter den andern liegt, und sie kreuzt.

Alle diese Zipfel, deren die sechs ersten inwendig länger, als auswendig, sehnig bleiben, verdicken sich im Aufwärtsteigen; die innersten mittelsten allerdicksten beiden ersten Zipfel aber bleiben länger, als die übrigen, von einander getrennt, um die Pforte für die Aorta und den hinteren Hauptstamm der

⁷) Roederer Progr. de Arcubus tendineis musculorum originibus. Goett. 1760. g. k. m.

Saugadern ⁹, bisweilen auch für die unpaarige Vene und den linken Eingeweidenerven, zu bilden.

Selten sah man die Aorta durch die Sehne gehen ⁹. — Indem nun zu ihnen die zwey oder drey übrigen Zipfel stoßen, welche kleinere Räume zum Durchgange von Gefäßen und Nerven ¹ zwischen sich übrig lassen, breitet sich das Fleisch im Aufsteigen in die Brusthöhle wölbend vorwärts und seitwärts aus, bis es in sehnige Fasern übergeht.

Zuvor aber bilden die Fleischfasern der mittlern oder ersten Zipfel über der Pforte der Aorta, links

9) Sehr schön Santorini am ang. Orte, fig. 4. Desgleichen Mascagni.

9) Morgagni bey Haller de C. H. F. Tom. 6. pag. 136.

1) Zwischen dem ersten und zweiten Zipfel, oder zwischen den Portionen des ersten Zipfels geht links der linke einfache oder doppelte Eingeweidenerve durch. Walter Tabulae nervorum Thoracis et Abdominis Tab. 3. n. 222. bis 226. und 231. bis 235; Rechts zwischen dem ersten und zweiten Zipfel der Eingeweidenerve und die ungepaarte Vene. Bey Walter der doppelte rechte Eingeweidenerve zwischen dem zweiten und dritten Zipfel Tab. I. Nr. 191. und 217. desgleichen Tab. 2.

Zwischen dem zweiten und dritten, oder dem ersten und dritten, wenn der zweite fehlt, links der sympathische Nerve und die unpaarige Vene.

Zwischen dem dritten und vierten, oder dem vierten und den Fasern von der zwölften Rippe der hintere Nierennerve nebst dem Stamme des sympathischen. Walter rechts. Tab. I. nr. 239. links Tab. 3. nr. 237.

nahe am Rückgrate, zum Durchlassen des Schlundes einen länglichen Schlitze, der mit dem stumpfern Winkel aufwärts, mit dem spitzern niederwärts gekehrt ist, an dessen Rändern sich die Fleischfasern häufen, an den Winkeln oder Spitzen aber so verflechten, daß am untern Winkel der linke Zipfel vor den andern zu liegen kommt, aber auch noch jenseits des Schlitzes kreuzen sich noch ferner selbst die Sehnenfasern beider Zipfel.

(Bisweilen zeigt auch der obere Winkel einige sehnige Fasern. Bisweilen scheint der rechte Zipfel ein Bündel Fleischfasern selbst an den Schlund zu schicken ²⁾).

Sehr selten begeben sich auch Fleischfasern unter die Aorta, so daß der Zwerchmuskel alsdann auch auf die Aorte wirken kann ³⁾.

Bisweilen kreuzen sich die Zipfel am oberen, nicht am unteren Winkel des Schlitzes, und der rechte Zipfel liegt vor dem linken ⁴⁾.

An die Fleischfasern der Zipfel legen sich ferner der Reihe nach Fleischfasern, die vom inneren

²⁾ Haller de C. H. Fabrica Tom. 6. S. 136.

³⁾ Morgagni de sedibus et causis morbor. Epist. 18. Art. 2. Ich sah in einem Manne ein Fleischbündel queer über der Aorta, und über der entspringenden Arteria coeliaca liegen.

⁴⁾ Behrend's.

Theile der fünf oder sechs untersten Ribbenpaare, als anfangs sehnige; breite, abgesonderte, bisweilen gar gespaltene Spitzen kommen, die zwischen die Spitzen oder Zacken des queeren Bauchmuskels eingreifen, auch wohl zum Theil, oder an der neunten, zehnten und eilften Ribbe gänzlich mit ihnen vereinigt sind, oder auch an der achten und zehnten Ribbe mit dem äußern schrägen Bauchmuskel zusammenhängen; nämlich am Ende des Knochens und Anfange des Knorpels, oder nur allein vom Knorpel der achten, neunten, zehnten, eilften, auch wohl der zwölften Ribbe; ferner mit der breitesten Spitze vom Anfange bis zur Mitte der Länge des Knorpels der siebenten Ribbe, bisweilen auch von dem mit diesem Knorpel zusammenstoßenden Knorpel der sechsten Ribbe.

Die letzte, kleinste, vorderste und mittelste Fleischportion steigt, sich nach dem Thorax krümmend, vom Rande, und von der inneren oder hinteren Fläche der Spitze des untersten Brustbeines hinauf, und ist bisweilen durch eine Lücke für die rechte und linke Seite abgesondert; bisweilen fehlt sie auf einer oder auf beiden Seiten.

Alle diese Fleischfasern, die vom Rückgrate, vom runden und viereckigen Lendenmuskel, von den Ribben und dem untersten Brustbeine kommen, sind

anfangs dünne, werden drauf im strahlenförmigen Zusammenfahren allmählig dicker, und zur Bildung eines Gewölbes gebogen, bis sie allmählig wieder dünner, außer einer mondformigen Portion sich zu einer gemeinschaftlichen Sehne verflechten.

Die mittlern Fleischfasern, nämlich der Zipfel, steigen im Ganzen etwas gerader, ihre Seitenfasern aber desto gebogener aufwärts, je weiter sie von den mittleren nach außen zu entfernt liegen.

Der hinterste Theil aber bleibt vom Anfange bis zum Ende fleischig, und am dünnesten, und setzt sich mondformig aufwärts gerichteter Wölbung unter den viereckigen Lendenmuskel an die letzte Ripbe 4, und stellt gleichsam den untersten Rand des Zwerchmuskels vor.

Die Fasern der von den Ripben kommenden Fleischportionen steigen als Bogen in Ansehung der Fasern der Zipfel im Ganzen hinten meist gerade, zur Seite schräge, vornen aber wieder etwas gerader aufwärts.

Die Fasern der vom untersten Brustbeine kommenden Fleischportionen sind die kürzesten, und steigen mit ihren Bogen ziemlich gerade aufwärts.

4) Albinus Fig. 6. D. F. G. H.

Sehne des Zwerchmuskels.

Die dünne Sehne des Zwerchmuskels, die eigentlich die Scheidewand zwischen der Brusthöhle und Bauchhöhle abgiebt, hat auf beiden Seiten einen beynahe eysförmigen Umfang, vorwärts eine stumpfe Spitze, und hinterwärts einen fast mondförmigen Ausschnitt. Man theilt sie deshalb in ein Mittelstück und zwey Seitenstücke, nämlich ein rechtes und ein linkes Seitenstück, und vergleicht sie mit einem Kleeblatte, dessen kleineres mittleres Blatt mit den Seitenblättern zusammensiebt. — Meist ist der Umfang des rechten Blatts, bisweilen hingegen der Umfang des linken Blatts größer.

Im Ganzen ist diese Sehne von unten her auf die Art concav, daß sie zu beiden Seiten zwey große längliche Ausbühlungen, rechts eine größere und höhere, links eine etwas kleinere darstellt, in der Mitte flacher, und nur nach unten zu ein wenig gewölbt ist, von der rechten Seite aber zur linken abhängig wird. — Sie gehört mit zu den höchsten Theilen des Zwerchmuskels, weil aber die Spitze des Herzens niedriger, als seine Basis ist, so steigt sie links ohngefähr nur bis zur Höhe der fünften, rechts bis zur vierten Rippe hinauf.

Die Hauptfasern ^s der Sehne halten als Fort-

s) Dies ist vorzüglich bey alten Männern sichtbar.

sezungen der fleischigen die nämliche Richtung. Daher gehen die mittlern gerade auß, die Seitenfasern hingegen beugen sich desto stärker, jemehr sie rückwärts liegen. — Indem sie aber in so verschiedener Richtung rings um von den Wänden in der Brusthöhle zusammenkommen, kreuzen, verflechten und verweben sie sich häufig, theils unter einander, theils mit andern sehnigen Fasern, die sich sowohl auf ihrer oberen als unteren Fläche finden. So erstreckt sich auf der unteren Fläche rechts eine sehnige Ausbreitung vom hinteren Theile des Fleisches zum vorderen, die die Hauptfasern kreuzt, und vorwärts in die Fleischfasern sich verliert 6. — So auch bisweilen links eine ähnliche schwächere sehnige Ausbreitung.

Ferner zeigen sich auch auf der oberen oder Brustoberfläche dieser Sehne Fasern, die eine eigene Richtung halten, und sich mit den Hauptfasern durchflechten.

So sieht man auf beiden Seiten eine sehnige Ausbreitung, deren elliptische Fasern sich einander begegnen, und, mit andern von der unteren Fläche kommenden verflochten, das Loch für die Stammvene übrig lassen. — So finden sich noch andere zerstreute einzelne Sehnenfasern nach mannigfaltigen Richtungen.

6) Albinus Fig. 6. v. o. §. 6. 7.

für die Zwerchmuskellobe⁹; oder auch für zwei Lebervenen¹. — Bisweilen finden sich im mittlern oder vordern Theile der Sehne querverlaufende Muskelfasern².

Uebrigens ist die obere oder gewölbte Fläche des Zwerchmuskels größtentheils mit dem Brustfell, und dem Herzbeutel, seine untere oder hohle Fläche mit dem Bauchfell bis auf die Stelle, wo ihn die nackte Leber an der Stammvene berührt, überzogen.

An einigen Stellen hängen jedoch Brust- und Bauchfell zusammen, z. B. um das große Loch für die Stammvene: ferner ist vorwärts ein ansehnlicher Raum ohne Fleisch, wo Brust- und Bauchfell zusammenhängen, und durch welchen Zweige der Brustarterie (Mammaria) zur Leber kommen, und Saugadern von der Leber hinaufgehen.

Auch zwischen der eilften und zwölften Rippe bleibt eine Stelle des Brustfells von Fleischfasern entblößt.

Die ganze rechte Hälfte des Zwerchmuskels ist größer, steigt auch höher in die Brusthöhle hinauf,

9) Haller de C. H. F. Tom. 6. p. 137.

1) Morgagni Epist. anat. Leidae 1728. Epist. I. N. 26. p. 28.

2) In einer Handschrift von Huber, der dies in einem dreymonatlichen Knäbchen fand.

als die linke; doch bey'm Kinde wegen der größern Leber mehr, als beim Erwachsenen.

Diese Wölbung ist elliptisch, und ihr Querdurchmesser (das ist, von einer rechten zu einer linken Ripbe) größer, als irgend einer von vornen nach hinten; ferner vornen ausgeschnitten, und hinten mit Zipfeln absteigend.

Der größte Theil der Ausschweifung schaut vorwärts, weil sie oben früher, als unten, aufhört, und der Winkel, mit dem sich diese Ellipse gegen den Rückgrat legt, spitzer ist, als jener, mit dem sie sich ans unterste Brustbein legt, wie am deutlichsten Profildurchschnitt des Zwerchmuskels zeigt³.

W i r k u n g.

Außer daß der Zwerchmuskel die Höhle der Brust und des Bauchs von einander scheidet, verkleinert er, wenn er wirkt, die Bauchhöhle, preßt alle Eingeweide des Unterleibes, treibt sie nach unten, vorne und zum Theile nach außen, am meisten drückt er die Leber, den Magen und die Milz unterwärts.

Er zieht seine Sehne herab, macht sie flacher, und erweitert dadurch vorzüglich auf den Seiten die

3) Sehr richtig ist diese Wölbungslinie von Camper in seinen Betrachtungen über einige Gegenstände der Geburtshülfe. Leipzig 1777. Tab. I. Fig. VI. gezeichnet.

Handwritten notes:
L. 172
L. 171
L. 170
L. 169
L. 168
L. 167
L. 166
L. 165
L. 164
L. 163
L. 162
L. 161
L. 160
L. 159
L. 158
L. 157
L. 156
L. 155
L. 154
L. 153
L. 152
L. 151
L. 150
L. 149
L. 148
L. 147
L. 146
L. 145
L. 144
L. 143
L. 142
L. 141
L. 140
L. 139
L. 138
L. 137
L. 136
L. 135
L. 134
L. 133
L. 132
L. 131
L. 130
L. 129
L. 128
L. 127
L. 126
L. 125
L. 124
L. 123
L. 122
L. 121
L. 120
L. 119
L. 118
L. 117
L. 116
L. 115
L. 114
L. 113
L. 112
L. 111
L. 110
L. 109
L. 108
L. 107
L. 106
L. 105
L. 104
L. 103
L. 102
L. 101
L. 100
L. 99
L. 98
L. 97
L. 96
L. 95
L. 94
L. 93
L. 92
L. 91
L. 90
L. 89
L. 88
L. 87
L. 86
L. 85
L. 84
L. 83
L. 82
L. 81
L. 80
L. 79
L. 78
L. 77
L. 76
L. 75
L. 74
L. 73
L. 72
L. 71
L. 70
L. 69
L. 68
L. 67
L. 66
L. 65
L. 64
L. 63
L. 62
L. 61
L. 60
L. 59
L. 58
L. 57
L. 56
L. 55
L. 54
L. 53
L. 52
L. 51
L. 50
L. 49
L. 48
L. 47
L. 46
L. 45
L. 44
L. 43
L. 42
L. 41
L. 40
L. 39
L. 38
L. 37
L. 36
L. 35
L. 34
L. 33
L. 32
L. 31
L. 30
L. 29
L. 28
L. 27
L. 26
L. 25
L. 24
L. 23
L. 22
L. 21
L. 20
L. 19
L. 18
L. 17
L. 16
L. 15
L. 14
L. 13
L. 12
L. 11
L. 10
L. 9
L. 8
L. 7
L. 6
L. 5
L. 4
L. 3
L. 2
L. 1

Handwritten note:
y 6 der Mayen 8
L. 172 Fol. 33.



Brusthöhle zum Einathmen; bei mäßiger Wirkung tritt der mittlere Theil der Sehne weniger als der übrige herunter, weil er niedriger liegt, und an den Herzbeutel und an die Brustscheidewand (Mediastinum) befestigt ist; bei heftigerer Wirkung aber wird freylich auch das Herz mit nach unten gezogen.

Er bringt hiebei die Rippen und den Knorpel des untersten Brustbeins (falls er beweglich ist) nach innen gegeneinander, und gegen den Rückgrat.

Beim allerstärksten Einathmen aber, wenn die Rippen auß kräftigste zusammengezogen sind, wird der Zwerchmuskel aufwärts getrieben, so wie er umgekehrt beim allerheftigsten Ausathmen zuletzt nach unten getrieben wird, wenn er nämlich den noch unverletzten Bauchmuskeln nicht länger widerstehen kann⁴.

Die Aorta kann er nicht viel verändern, weil er sie nur oberhalb mit seinem Fleische umfaßt, nach unten zu hingegen seine Sehnen, zwischen denen sie durchgeht, fest auf den Rückgrat auseinanderge-spannt sind.

Auch die Stammvene kann er wohl kaum verändern, außer daß er in sofern auf sie Einfluß hat, als

4) Haller de C. H. F. Tom. 6. Seite 141. Bey Thieren sieht man es sogar bey den allerheftigsten Zusammenziehungen sich nach unten wölben.

er sie durch sein Herabsinken verkürzt und erweitert; beim Einathmen sieht man daher in Thieren diese Vene nach unten gezogen werden und sich ausleeren, beim Ausathmen hingegen anschwellen.

Den Schlund aber schnürt er gleich über dem Magen zusammen, und hindert, daß beim Einathmen nichts aus dem Magen hinauf kann.

Selten wirken wohl bloß seine einzelnen Portionen, weil er überhaupt nach dem Herzen der reizbarste Muskel ist.

I n n e r e r B r u s t m u s k e l .

Sternocostalis.

Albinus Tab. XIV. Fig. I. unter dem Namen Triangularis Sterni.

S. 177.

Besteht oft aus vier Portionen, die sehnig, dünne, zuweilen vom innern Theile des letzten Endes des Knochens, immer aber vom innern Theile des Anfangs des Knochens der zweiten, dritten, vierten und fünften Rippe kommen, die anfangs ziemlich breit sind, bald fleischig und dicker werden, und desto schief absteigen, je tiefer sie liegen, so daß endlich die unterste quer zu liegen kommt; sie stoßen bald früher, bald später zusammen, werden wieder dünner und breit sehnig,

170 172

Handwritten notes on the right margin, including the word "Sternocostalis" and other illegible text.

178
135.

und setzen sich theils an die Spitzen des Knorpels der dritten, vierten, fünften und sechsten Rippe, theils an den Rand des Mittleren und unteren Brustbeins bis zur äußersten knorpeligen Spitze herunter.

Je tiefer diese Portionen liegen, destoweniger sind sie am Ende sehnig, so daß die unterste fast bis zum Ende fleischig bleibt. — Altemal hängt er unten mit dem queeren Bauchmuskel durch seine Sehne, bisweilen auch durchs Fleisch, zusammen.

Abweichungen.

Dieser Muskel zeigt viele Veränderungen.

Bisweilen setzen sich seine Portionen gar nicht an die Rippenknorpel, sondern bloß an die Brustbeine.

Bisweilen besteht er aus fünf Portionen.

Bisweilen sind seine Endsehnen gespalten.

Sehr oft macht die oberste einen ganz eigenen Muskel zwischen der zweiten und dritten Rippe aus, der gar nicht mit den übrigen zusammenstößt ⁵.

Bisweilen hingegen fährt dieser oberste Muskel über die dritte Rippe zur vierten Rippe herunter ⁶.

Bisweilen stellt er gar drey bis vier ganz abgefonderte Muskeln vor.

Oft ist er auf einer Seite ganz anders, als auf der andern beschaffen.

⁵) Albinus Tab. X. Fig. 24.

⁶) Camper Verhandeling over Kankerwordig Tab. 13.

Der Querverfortsätze der drey oder vier untersten Lendenwirbel kommen, erst spät ins Fleisch übergehen, dann allmählig im schief Absteigen dicker werden, bis sie sich denselben im Vorwärtslaufen einmischen.

Abweichungen.

Bisweilen setzt er sich auch an den eilften Rückenwirbel, theils mit einer breiten Sehne an den untern Rand des Körpers, theils mit einer schmälern an den Querverfortsatz desselben, theils an die eilfte Rippe ohnfern ihres Köpfchens an den Rand über den Zwischenrippengefäßen.

Wirkung.

Zieht die letzte, und auch bisweilen die vorletzte Rippe herunter. — Beugt die Lende zur Seite. — Hilft die Hüfte gegen den Rückgrat in die Höhe heben.

*Fallen er ganz auf sich
da er sich für beweglicher
halten will.*

Hinterer oberer sägenförmiger oder Sägenmuskel.

Serratus posticus superior.

Albinus Tab. XVII. Fig. 16.

S. 179.

Kommt zusammenhängend mit dem rautenförmigen Muskel, Kappenmuskel und Bauschmuskel des Kopfes mit einer breiten, dünnen, und langen Sehne vom Bande, in der Gegend des Dornfortsatzes des fünften, sechsten, allemal aber des siebenten Halswir-

wirbels, auch wohl des ersten, zweyten und dritten Rückenwirbels, bleibt so lange sehnig, als er den Bauschmuskel des Kopfes und den Rückgratsstrecker bedeckt, wird im schief Abwärtssteigen breiter, und allmählig fleischig, drauf ein wenig dicker, zuletzt aber wieder dünner, spaltet sich meist in vier sehnige Spitzen, die sich hinten am obern Rande der kleinern Krümmung der zweyten, dritten oder vierten Ripbe, oder nur mit drey Spitzen an die zweyte, dritte und vierte, oder an die dritte, vierte und fünfte Ripbe, oder bisweilen an die sechs ersten Ripben festsetzen. Die unterste Spitze geht am weitesten nach außen vor.

Wirkung.

Zieht diese drey oder vier Ripben in die Höhe. — Scheint die unter ihm befindlichen Muskeln als ein Band zusammen zu halten, und gegen den Rückgrat zu drücken; denn von ihm erstreckt sich bis zum untern Sägenmuskel eine sehnige Ausbreitung.

Hinterer unterer sägenförmiger oder Sägenmuskel.

Serratus posticus inferior.

Albinus Tab. XVII. Fig. 17.

S. 180.

Kommt mit einer zarten, anfangs mit dem Rück-

7) Idenflamm sah den linken in einem Buchligen fehlen.

E. Muskellehre.

R

*Wird selten durch die Brust
seiner sehnigen Haut an die
Rückgratswirbel befestigt einem
Länglichen Muskel anhängen
den bei einer Lungenentzündung
ist aber der Gallenblase
mit springt in Folge mit einem
Kopf der Leber papulae
gemeinlich abtrifft.*

Hall Zeit 1808
Pl. 133.

ersten Lende
hergehen,
den, bis
en.

Rücken-
n unten
an den
e Ripbe
n Zwi-

vorlegte
Seite. —
haben.

oder

entfer-
fel des
Ehne
des
hals-
vit.

gratstrecker vereinigten Sehne vom Dornfortsatz des letzten Rückenwirbels, oder von den Dornfortsätzen der zwey oder drey untersten Rückenwirbel, und der meisten oder aller Lendenwirbel, geht fast queer über den Rücken fort, bleibt, so lange er den Rückgratstrecker bedeckt, sehnig, vereinigt sich mit der Sehne des Querebauchmuskels, die vorwärts den Rückgratstrecker bedeckt, so daß diese beiden Sehnenblätter den Rückgratstrecker einschließen, wird drauf dünne, fleischig, und im schief Aufwärtssteigen (bisweilen auch im Niedersteigen) ein wenig stärker, bis er sich mit vier Spizen oder Zacken an den untern Rand der vier untersten Ribben festsetzt. Diese Spizen liegen dachpfannenartig übereinander; die oberste von ihnen für die neunte Ribbe ist die stärkste, längste und breiteste, die unterste für die zwölfte Ribbe die schwächste, kürzeste und schmalste. — Ueber dieses scheint er auch der Sehnenhaut, die über ihm, den Rückgratstrecker und die Zwischenribbenmuskeln überzieht, mit anzugehören.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen endigt er sich nur mit drey Spizen, indem die oberste oder unterste fehlt.

W i r k u n g.

Zieht die Ribben gegen den Rückgrat. — Scheint die unter ihm liegenden Muskeln als ein

*Die oberste ist die oberste oder
4^{te} Spizze gegen die unterste,
welche sich an die 12^{te} Ribbe
setzt. Behnert.*

— 195 —

Band zusammen zu halten, und dadurch, daß er ihnen widersteht, ihre Wirkung zu befördern.

R i b b e n h a l t e r.

Scaleni oder Triangulares.

Albinus Tab. XVI.

§. 181.

Alle Ribbenhalter kommen darin überein: a) daß sie zwischen dem Halse und den obersten Ribben liegen; b) daß sie sehnig und schmaler von den Ribben kommen; c) dicker und stärker werden, bis sie wieder schmaler d) sich in schlanke Zipfel theilen, die auseinanderfahrend, verdünnt und sehnig an den Quersfortsätzen der Halswirbel haften, und deren jede desto schmaler erscheint, je höher sie liegt; e) daß sie gegen die Ribben hin dicker und einfach sind; folglich auch f) einerley Wirkung äußern. — Gemeiniglich sind drey vorhanden, der vordere, der mittlere und hintere; bisweilen vier, nämlich noch ein Seitenribbenhalter; bisweilen fünf, nämlich noch ein kleinerer; bisweilen sechs bis sieben. Mehrentheils werden sie nur durch die Halsnerven von einander abge sondert.

Der vordere Ribbenhalter (Albinus Tab. XVI. fig. II. — Camper Dem. anat. path. Tab. I. L. L. M. M.) — kommt vom obersten Rande

R 2

der ersten Rippe, ohnfern ihres Knorpels — und setzt sich mit drey bisweilen gespaltenen Enden, deren unterstes das breiteste ist, an den vordern und untern Theil des Queerfortsatzes des fünften, vierten und dritten, oder des sechsten, fünften und vierten, oder nur des sechsten und fünften Halswirbels; — wird vom kleinsten Ribbenhalter bloß durch die Schlüsselbeinarterie getrennt, — beugt den Hals mehr vorwärts als die übrigen.

*W. für ein Pleurawinkel?
Anatomische Beiträge
3. 1. 2. S. 373*

Der kleinste Ribbenhalter (bey Albin nicht abgebildet) — kommt gleich hinter dem vorigen von der ersten Rippe, und setzt sich mit einem Zipfel an den siebenten Halswirbel ohnfern des Queerfortsatzes, mit dem andern Zipfel an den Queerfortsatz des sechsten Halswirbels. — Bisweilen ist er nur zur Hälfte da; meist fehlt er ganz.

Der Seitenribbenhalter (Lateralis) — (bey Albinus nicht abgebildet) — kommt von der zweenen Rippe, über dem großen Sägenmuskel, und setzt sich mit vier Zipfeln an die Queerfortsätze des sechsten, fünften, vierten und dritten Halswirbels; — bisweilen hängt er mit dem mittleren Ribbenhalter zusammen; — bisweilen hängt er nur mit einem Zipfel am fünften oder vierten Halswirbel; — bisweilen fehlt er ganz.

Der mittlere Ribbenhalter — (Albin. Tab. XVI. fig. 4. 5. — Camper Tab. I. fig. 1. T. T. U. U.) — kommt sehnig von der Mitte der Länge der ersten oder zweyten Ripbe, ist der stärkste unter allen, und setzt sich mit drey, vier bis sieben Zipfeln an die Queerfortsätze, oder ohnfern derselben an die Körper aller, oder nur der fünf oder vier ersten Halswirbel. — Sein oberster sehniger Zipfel hängt mit dem Heber des Schulterblatts und Bauschmuskel des Halses zusammen, ist auch wohl, wo er vom Muskel abtritt, schmal, dann dicker, und zuletzt wieder schmaler. — Bisweilen fehlt der Zipfel für den zweyten Halswirbel; — bisweilen hingegen tritt zum obersten Zipfel eine vom sechsten Halswirbel kommende Portion, oder es stoßen auch wohl zwey Portionen von den Queerfortsätzen der untersten Halswirbel an seinen hintern Theil; — neigt den Kopf mehr als die übrigen zur Seite.

Der hinterer Ribbenhalter — (Albinus Tab. XVI. Fig. 12.) — kommt hinten von der zweyten, seltener von der ersten Ripbe, ohnfern ihrer Befestigung an den Queerfortsatz des Rückenwirbels, — und setzt sich mit drey Zipfeln an den Queerfortsatz des sechsten, fünften und vierten, oder des sechsten und siebenten, oder sechsten und fünften, oder des fünften und vierten, oder des vierten und dritten,

oder allein des sechsten Halswirbels fest. — Bisweilen ist er klein, an beiden Enden schmal, in der Mitte dicker, mit dem äußern Zwischenribbenmuskel vermischt, und an den Querverfortsatz des untersten Halswirbels befestigt. — Bisweilen fehlt er,

Wirkung.

Neigen den Hals seitwärts, oder ziehen umgekehrt die erste und zweyte Ripbe aufwärts und halten sie fest, so daß die übrigen Ribben gegen diese Ribben als feste Theile hinaufgezogen werden.

Kürzere Heber der Ribben.

Levatores breviores Costarum.

Albinus Tab. XVII. Fig. 14. desgleichen auf der Tab. vasis chyloferi.

§. 182.

Kommen für jede Ribbe vom Querverfortsatze des nächst über ihm liegenden Wirbels, auch wohl von dem Bande, welches die Ribben an den Querverfortsatz befestigt; folglich der erste vom Querverfortsatze des letzten Halswirbels, der zweyte vom Querverfortsatze des ersten Rückenwirbels u. s. f. — Der erste oder oberste ist der schwächste, der letzte oder unterste gemeiniglich der stärkste.

Anfangs sind sie sehnig und dünner, dann etwas stärker und breiter, bis sie wieder dünner sich hinten an den obern Rand der Ribben, von dem Höcker

ihres Halses an, in ein eigenes Grübchen, und an eine raue Linie festsetzen. — Von ihren Fasern steigen diejenigen am schrägsten herunter, die am weitesten vom Rückgrate entfernt liegen.

Abweichungen.

Bisweilen ist der oberste mit dem Zipfel des mittleren Ribbenhalteres, am siebenten Halswirbel vereinigt. — Bisweilen überschreitet eine Portion von ein und andern die nächste Ribbe, um sich, wie ein längerer Ribbenheber an die nächstfolgende festzusetzen.

Wirkung.

Ziehen die Ribben in die Höhe.

Längere Heber der Ribben.

Levatores longiores Costarum.

Albinus Tab. XVII, Fig. 16.

S. 183.

Die zwey, drey oder vier untersten Ribben besitzen noch außer obigen ^{Kürzeren} längere Heber.

Diese kommen von der Spitze der Querverfortsätze der Ribbenwirbel, sind anfangs sehnig, dünn und schmal, darauf breiter und dicker, schreiten über eine Ribbe, und setzen sich wieder dünner, schmaler und sehnig an die nächstfolgende Ribbe, nach außen neben die vorigen Muskeln; also der erste vom Querverfortsatze des siebenten Rücken-

wirbels setzt sich an die neunte Ripbe, der zweyte vom achten Rückenwirbel an die zehnte Ripbe u. s. f.

Abweichungen.

Oft vereinigen sie sich im Verlauf mit den äußern Zwischenribbenmuskeln und den kürzern Ribbenhebern, so daß sie bisweilen zusammen einen langen gezähnten Muskel oder eine Portion derselben vorstellen. — Bisweilen stößt zu ihnen noch eine Portion von der zunächst über ihr liegenden Ripbe, durch die bisweilen auch die längern Heber unter einander verbunden werden. — Bisweilen begiebt sich eine nicht an die Ripbe, sondern an den innern Theil des Rückgratsstreckerß. — Bisweilen fehlt die erste und zweyte Portion,

Wirkung.

Ziehen die Ribben in die Höhe; — die beyden untern noch überdieß die zwey letzten Ribben auswärts.

Äußere Zwischenribben: oder Intercostalmuskeln.

Albinus im Zusammenhange Tab. 3. einzeln Tab. XVII. Fig. 9. 10. desgleichen auf seiner Tabula Vasis chyliiferi. Sehr niedlich und richtig bey Ho adly three Lectures on the Organs of Respiration. Lond. 1740. 4.

S. 184.

Die Eilf äußeren Zwischenribbenmuskeln kommen von der äußern Lippe des untern Randes der eilf obern Ribben, von ihrer Verbindung mit dem Querfortsätze

des Wirbels, bis fast zu ihrem Knorpel ^s, dann von hier an, bis zu den Brustbeinen, liegen bloß gleiche Richtung haltende Sehnenfasern. Sie steigen als dünne, mit Sehnenfasern untermischte Muskeln, schräg von hinten nach vorne, an und etwas unter dem obern Rande der unter ihnen liegenden Ribben, hinab, so daß sie mit der vorwärts laufenden obern Ribbe einen spitzen, mit der untern einen stumpfen Winkel bilden. Ihre hintern Fasern liegen schräger, als die vordern. Den Muskel unter der ersten Ribbe, oder im Zwischenraume der ersten und zweyten Ribbe, nennt man den ersten Zwischenribbenmuskel u. s. f.

U b w e i c h u n g.

Bisweilen geht der erste äußere Zwischenribbenmuskel bis zum Ende des Knochenheißs der zweyten Ribbe, ja bis zum Brustbeine, so daß der innere Zwischenribbenmuskel nirgends bloß liegt.

W i r k u n g.

Ziehen die Ribben gegeneinander, folglich die zweyte Ribbe gegen die erste, die dritte gegen die zweyte u. s. f. hinaus, erweitern den Thorax, und befördern ebendadurch die Einathmung.

s) Die Ursache scheint, weil der Pectoralis major et minor hier ihre Stelle vertritt, oder ihren Platz einnimmt.

Innere Zwischenribben : oder Intercostalmuskeln.

Albinus Tab. XVII. Fig. 11. 12. 13. stellt nur den neunten und zehnten vor. Alle zusammen weit schöner auf der Tabula vasis chyliferi in natürlicher Größe. Auch Hoadly am ang. Orte.

§. 185.

Kommen größtentheils mit den äußeren überein. Doch unterscheiden sie sich dadurch, a) daß sie sich in entgegengesetzter, und b) weniger schrägen Richtung von vornen nach hinten an den innern Rand der Ribben festsetzen, so daß jede Faser am Anfange mit dem untern Ende dem Rückgrate näher, mit dem obern Ende von ihm etwas entfernter liegt; c) daß sie die Länge der Ribben von ihrem Knorpel an (in den obern Zwischenräumen bis fast von den Brustbeinen) bis über ihre kleinere Krümmung hin einnehmen, folglich laufen sie weiter vorwärts als die äußeren, aber nicht so weit rückwärts; den übrigen Raum nehmen gleiche Richtung haltende Sehnenfasern ein; d) daß ein und anderer von ihnen, vorzüglich in der Nähe des Rückgrats, mit einer anfangs länger sehnigen Portion über eine Ribbe schreitet, um sich erst an die nächst darunter liegende zu setzen; e) daß sie durchaus schwächer, f) auch sehniger sind; g) auch aus kürzern Fasern bestehen. — In den Zwischenräumen der Ribben findet sich also vornen und hinten nur an einer kleinen

Stelle eine einfache Muskelfasernlage, hingegen ist die ganze übrige Länge derselben mit einer doppelten Lage ausgefüllt.

Abweichungen.

Bisweilen lassen sie hinten keinen Raum übrig, sondern gelangen bis zum Rückgrate. — Bisweilen kommt der erste vom obersten Brustbeine, und hat strahlige Fasern. — Bisweilen hat der zweyte und dritte Fasern vom mittleren Brustbeine. — Bisweilen fließt der achte und neunte mit dem innern schrägen Bauchmuskel zusammen. — Bisweilen hat der achte eine Portion, die völlig wie ein äußerer Zwischenribbenmuskel mit ihren Fasern von hinten nach vornen zu absteigt. — Sind dreizehn Rippen vorhanden, so giebt's zwölf Zwischenribbenmuskeln. — Bisweilen fehlt der erste, oder das vordere Stück des zehnten, oder dieser zehnte oder der eilfte ist so dünne und sehnig, daß er fast gänzlich zu fehlen scheint. — Hängen die Rippenknorpel durch ein Mittelstück zusammen, so machen die Muskelfasern dieses Zwischenraumes einen eigenen abgesonderten Muskel aus, dessen Fasern fast senkrecht liegen. — Ziehen diese Fasern etwa die Rippen herunter?

9) Albin. Tab. Sceleti. rechts Z. Q. O. links e. VV. O. F.

Wirkung.

Ziehen die Rippen gerade wie die äußern Zwischenrippenmuskeln gegeneinander.

Bauschähnlicher Kopfmuskel.

Splenius Capitis.

Albinus Tab. XVI. Fig. 27.

§. 186.

Ist gewöhnlich vom Bauschhalbmuskel getrennt, doch bisweilen mit ihm, besonders anfangs, vereinigt.

Kommt anfangs sehnig und gespalten vom Bande am Dornfortsaze des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebenten Halswirbels, und des ersten und zweyten Rückenwirbels, bisweilen auch vom dritten Halswirbel, bisweilen auch vom dritten Rückenwirbel, hängt mit dem auf ihm liegenden hintern obern Sägenmuskel und Kappenmuskel zusammen (seine drey oder vier untersten Anfänge sind schmaler, als die übrigen); wird bald fleischig, und steigt gleich breit bleibend, aber verdickt schief hinauf, bis er mehr am obern als am untern Rande verdünnt und sehnig sich an den hintern Theil des Zihenfortsazes und ans Hinterhauptstück des Grundbeins festsetzt.

Wirkung.

Zieht den Kopf schief rückwärts auf seine Seite herunter, und krümmt den Hals. — Ist der Rücken hingegen steif, so dreht er den Kopf so, daß er das Hinterhaupt auf die ihm entgegengesetzte Seite richtet. — Ist der Kopf hingegen so gedreht, daß das Gesicht auf die ihm entgegengesetzte Seite schaut, so dreht er ihn zurück.

Wuschähnlicher Halsmuskel.

Splenius Colli.

Albinus Tab. XVI. Fig. 1.

§. 187.

Liegt nach außen zu unter dem vorigen. — Kommt sehnig portionenweis von den Dornfortsätzen des dritten und vierten (bisweilen des ersten, zweyten und dritten; bisweilen des zweyten, dritten, vierten, fünften und sechsten) Rückenwirbels.

Die obern Portionen werden früher als die unteren, besonders von innenher, fleischig, immer stärker, stoßen zusammen, und bilden einen schmalen Muskel, der nach einem geringen Dickerwerden wieder abnimmt, und sich mit zwey oder drey getheilten langen spitzigen Enden, an die Quersfortsätze des ersten und zweyten oder dritten Halswirbels festsetzt. Am ersten Halswirbel hängt seine bisweilen gespalt-

fenß zusammen. Sie werden drauf im Aufsteigen dicker, und vereinigen sich in einen Bauch, der noch eine schmale Sehne vom innern Rückgratsstrecker zu erhalten pflegt, allmählig abnimmt, und gegen den Nacken in eine dicke Sehne übergeht, die sich schmälert, dann aber sich wieder ausbreitet und in einen andern Fleischbauch übergeht, welcher im Fortgange dicker wird, bis er wieder verdünnt, und zum Theile sehnig sich unter dem Kappenmuskel anß Hinterhaupt festsetzt.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen hängen seine Bäuche durch Fleisch zusammen, so daß er, wo die Sehnen zu seyn pflegen, äußerlich fleischig erscheint. — Gewöhnlich zeigt der obere Bauch in der Mitte seiner Länge an der äußern Seite eine sehnige Stelle. — Bisweilen gesellen sich zu ihm eine, zwey, oder auch wohl drey dünne Fleischportionen von den Dornfortsätzen des ersten Rücken- oder des letzten Halswirbels, oder des ersten, zweyten und dritten Rückenwirbels.

W i r k u n g.

Zieht den Kopf nach hinten; — krümmt den Hals schief auf seine Seite; — richtet den vorwärts gesunkenen Kopf in die Höhe.

Graber

Durchflochtener Muskel.
Complexus.

Albinus ebendasselbst.

S. 189.

Kommt mit sieben Portionen von dem hinteren und oberen Theile der Querfortsätze des dritten, zweyten und ersten Rücken- und des letzten Halswirbels (auch wohl nur von den zwey ersten Rückenwirbeln, doch im Gegentheile auch von den fünf ersten), und von den schrägen Fortsätzen des sechsten, fünften und vierten Halswirbels, nämlich mit der fünften Portion, theils vom schrägen aufsteigenden Fortsatze des sechsten Halswirbels, theils vom schrägen absteigenden Fortsatze des fünften, theils von der Gelenkkapsel, die den aufsteigenden schrägen Fortsatz des einen Wirbels mit dem absteigenden des folgenden Wirbels verbindet. Auf gleiche Art entsteht die sechste und siebente Portion.

Anfangs sind sie sehnig und fleischig, dünne, schmal, jemehr nach oben liegend, desto kürzer, getheilte, fleischiger und schräger absteigend.

Sie nehmen an Sehnen- und Fleischfasern langsam zu, begeben sich zusammen, und bilden einen mehr breiten als dicken Muskel, der sich schmalernd und sehnig nach außen neben den zweybäuchigen Nackenmuskel an den Hinterhauptstheil des Grundbeines festsetzt.

U b.

Abweichung.

Bisweilen kommt auch eine Portion vom schrägen Fortsatze des letzten Halswirbels, und eines Rückenwirbels.

Wirkung.

Bewegt den Kopf und den Hals, wie der zweyhäuchige Nackenmuskel, doch schiefer zur Seite.

kleiner durchflochtener Muskel.

Nackenwarzenmuskel.

Trachelomastoideus.

Albinus Tab. XVI. Fig. 21. und 22.

S. 190.

Kommt mit sieben sehnigen Portionen von den nämlichen Quererfortsätzen, wie der durchflochtene, mit dem er auch zusammenhängt. Einige sind schmaler, andere breiter; einige sind dicker, andere dünner; alle aber gehen aufwärts, sind desto dicker und später fleischig, je höher sie liegen, und stoßen zu einem kurzen, dünnen, breiten, bisweilen durch Sehnenfasern unterbrochenen Muskel zusammen, der seitwärts um den Halsbauschmuskel sich schlägt, allmählig breiter und dicker, dann aber wieder dünner wird, und sich endlich sehnig an den hintern Rand des Zihenfortsatzes hinter dem Kopfbauschmuskel, bisweilen in eine eigene Knochenfurche festsetzt.

E. Muskellehre

D

Abweichungen.

Oft fehlen eine, zwey oder drey von den unteren, oder von den mittleren Portionen. — Oft fängt er mit dem Quermuskel des Halses, bisweilen auch mit dem durchflochtenen Muskel zusammen. — Bisweilen ist sein oberes Ende stärker und gespalten. — Bisweilen kommt eine Portion selbst vom Queerfortsatz des achten Rückenwirbels. — Bisweilen bekommt er eine und andere sehnige Portion vom innern Rückgratsstrecker. — Bisweilen giebt sich eine Portion vom Quermuskel des Halses mit einer Portion vom innern Rückgratsstrecker zusammen, und geht an seine unterste Portion.

Wirkung.

Neigt den Kopf schief rückwärts auf seine Seite, und krümmt dadurch den Hals.

Quermuskel des Nackens.

Transversalis Cervicis.

Albinus Tab. XVI. Fig. 16. 17. 18.

§. 191.

Kommt sehnig, meist mit sechs Portionen vom hintern und obern Theile des Queerfortsatzes der sechs obersten Rückenwirbel. — Die untere Portion ist die längste, schmälste; die oberste die kürzeste, dickste. Die obern Portionen erscheinen bündelartig.

Im Fortgange sind sie fleischig und stärker, bis sie sich zu einem Muskel übereinander legen, der allmählig dicker, dann wieder dünner wird, und in fünf breite, früh sich zeigende Sehnen übergeht, die auseinander fahren, an Stärke zunehmen, bis zum Ende Fleischfasern behalten, und sich an den hintern und untern Theil des hintern Horns der Queerfortsätze des sechsten, fünften, vierten, dritten und zweiten Halswirbels, mit dem Halsbauschmuskel zusammenhängend, festsetzen; die oberste dieser Sehnen ist die stärkste, die unterste die dünneste.

A b w e i c h u n g e n .

Bisweilen kommt noch eine Portion vom Queerfortsatz des letzten Halswirbels, und vom siebenten Rückenwirbel hinzu, oder sie kommen von den fünf obern Rücken- und dem untersten Halswirbel, oder vom dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenten und achten, auch wohl vom neunten und zehnten, ja vom elften Rückenwirbel. — Bisweilen hingegen fehlt eine der mittlern Portionen. — Bisweilen zeigen sich die Endsehnen sehr spät, bisweilen sind ihrer nur vier, indem sich statt der untersten Sehne eine Fleischportion an den sechsten Halswirbel setzt. — Oft verbindet sich der innere Rückgratsrecker mit seiner vierten und fünften Sehne, oder auch wohl mit seinem Fleische.²⁾ — Bisweilen fehlt die fünfte Sehne. —

D 2

*Hausmann
1760 die Teile von folgenden
Küpfel und von gleichem Art
sich nach Sumpf d. Fahrung
beide Küpfel kommen.*

Bisweilen hingegen ist eine sechste vorhanden, die an den Atlas gelangt. — Bisweilen stellt sie den sechsten hintern Halszwischenqueermuskel vor, oder sie vereinigt sich zum Theile mit dem innern Rückgratsstrecker, um an den Nackenwarzenmuskel zu gehen. — Bisweilen ist er oberhalb, bisweilen unterhalb vom folgenden absteigenden Nackenmuskel unzertrennsich.

Wirkung.

Krümmt den Hals schief gegen den Rücken.

Absteigender Nackenmuskel.

Cervicalis descendens.

Albinus Tab. XV. Fig. 3. 4.

S. 192.

Hängt gewöhnlich mit dem äußern Rückgratsstrecker (*Sacrolumbalis*) unzertrennsich zusammen, und sollte daher auch nicht abge sondert von ihm beschrieben werden, oder man sollte wenigstens die Portionen zu ihm rechnen, die Albinus als Zuwächse des *Sacrolumbalis* beschreibt und abbildet 2.

Kommt mit langen dünnen Sehnen hinten von drey, vier oder fünf Ribben, von der Rauigkeit ihres kleinen Bogens, der sich mit dem Queerfortsatze der Wirbel verbindet, nämlich von der sechsten, fünften und vierten; oder von der fünften, vierten und

2) Diemerbroek that dieß. *S. Anatome C. H. c. 6. p. 5.*

Handwritten note:
Handlungen übergingt sich
von beyläufig im Rücken
mit dem Sacrolumbalis
zusammenhängt, und erst
nach der Zusammenziehung
im Leben (während der Volumen
also zusammenzieht wird?)
für ein eigenes Muskel
gleichsam bildet.

*Tagebuch von Jorpat
S. 22.*

dritten; oder von der vierten, dritten und zweyten;
 oder von der fünften, vierten, dritten, zweyten und
 ersten; oder von der sechsten, fünften, vierten, drit-
 ten und zweyten Ripbe (oder von neun Ribben). —
 Die unterste Portion ist die längste und dickste, die
 oberste die kürzeste und dünneſte. — Sie hängen ver-
 ſchiedentlich, oft ganz unzertrennlich, mit dem äußern
 Theile des Rückgratsſtreckerß (Sacrolumbalis) zusa-
 men, beſonders die unterſte Sehne, bißweilen bloß
 an der fünften Ripbe; werden allmählig breiter, in-
 wendig früh fleiſchig, ſtoßen zu einem Bauche zusa-
 men, der mit dem Queermuſkel des Nackens auf-
 ſteigt, nachdem er dicker geworden, wieder abnimmt,
 biß er ſich mit vier ſehnigen Portionen, deren unterſte
 die kürzeste und dünneſte, die oberſte die längste und
 dickste iſt, an den innern Theil des hintern Hornß
 des Querfortſaßeß deß ſechſten, fünften, vierten und
 dritten; oder nur deß fünften und vierten; oder deß ſie-
 benten, ſechſten, fünften und vierten; oder deß ſie-
 benten, ſechſten, fünften, vierten, dritten und zwey-
 ten Halswirbelß feſtſetzen. — Die Portion am vier-
 ten Halswirbel vereinigt ſich mit dem Heber deß
 Schulterblattwinkels, andere Portionen vereinigen
 ſich mit dem Queermuſkel deß Nackens und den bei-
 den Rückgratsſtreckern.

die an
 ſechs-
 der ſie
 grats-
 n. —
 b vom
 anlich.
 n.
 l.
 Rückgrats-
 n, und
 beſchrie-
 Portio-
 nße deß
 ten von
 gkeit ih-
 fortſaße
 n, fünf-
 ten und
 675

Wirkung.

Beugt den Hals ungefähr wie der Quermuskel des Nackens; hilft die Rippen in die Höhe heben.

Rückgratsⁿstrecker.

Longissimus Dorsi und Sacrolumbalis oder Lumbo-costalis.

Wäre der Name Opisthomenar nicht besser?

Albinus Tab. XV. Fig. 3. 4. 5. 6.

S. 193.

Der innere und äußere Rückgratsstrecker sind anfangs vereinigt, und liegen auch nach der Trennung dicht neben einander.

Sie kommen a) vom Kreuzbeine, theils mit einer scharfen Spitze zur Seite der untern Mündung seines Canals fürs Rückenmark, theils äußerlich stark sehnig, innerlich dünn fleischig von seinen drey Dornfortsätzen; b) sehnig von den Dornfortsätzen aller fünf, oder nur der vier oder drey untersten Lendenwirbel; c) von dem Bande zwischen dem Kreuzbeine und Hüftbeine; d) größtentheils sehnig und nur mit dem vordersten Stücke fleischig vom hintern, innern und obern Theile des Hüftbeins. — Die Sehnen von den Dornfortsätzen des Kreuzbeins und der Lendenwirbel sind abgesondert, lang, breit, stark, und werden durch Sehnen und Fleischfasern verbunden. — Ge-

gen den Rückgrat hin ist dieser gemeinschaftliche Muskel sehnig und dünne, gegen die Seite des Körpers dicker und fleischiger, weil das Fleisch von seinen Sehnenfasern selbst entspringt,

und bildet zehn, nach oben zu dünner, und endlich sehnig werdende Portionen, von denen sich je zwey an die Queerfortsätze, auch in etwas an die obern schrägen Fortsätze der fünf Lendenwirbel festsetzen.

Drauf spaltet er sich in der Gegend der letzten Ripbe in den stärkern innern Theil oder den innern Rückgratsstrecker (Longissimus Dorsi), und in den dünnern äußern Theil oder den äußern Rückgratsstrecker (Sacrolumbalis).

Der innere Rückgratsstrecker setzt sich mit zwölf Zipfeln, deren unterster der kürzeste, der oberste der längste ist, und von denen einige, besonders der obere, bisweilen ein- bis zweymal gespalten sind, an die Ecke der Queerfortsätze der Rückenwirbel fest. b) Mit andern dünnern Zipfeln, deren unterster ebenfalls der kürzeste und fleischigste, der oberste der längste und sehnigste ist, an elf Ripben außer der ersten (oder nur an acht, wenn die drey obersten und untersten fehlen; oder nur an sieben, wenn die oberste, und die vier untersten fehlen; oder nur an fünf oder vier Ripben), und zwar ohnfern jener Queerfortsätze, so daß sie meist mit den kurzen Hebern der Ripben

muskel
en.
Lum.
er?
r sind
ennung
mit einer
g seines
f sehnig,
ornfort-
r fünf,
wirbel;
e und
mit dem
rn und
von den
wirbel
recken
Ge.



zusammenhängen. c) Mit einer dünnen rundlichen an den Hals, ja zuweilen bis an den Kopf ³ hinaufsteigenden Sehne an den Nackenwarzenmuskel, oder an den Quermuskel des Nackens, oder an den Halsbauschmuskel, oder an den zweybäuchigen Nackenmuskel, oder an den absteigenden Nackenmuskel.

Bisweilen ist diese Sehne dreyfach, und mit dem Halsbauschmuskel, dem zweybäuchigen Nackenmuskel, und absteigenden Nackenmuskel verbunden; oder mit einem Ende zum Nackenwarzenmuskel, mit den beiden andern zum Quermuskel des Halses geschlagen; — bisweilen ist sie nur einfach, und mit dem Quermuskel des Nackens vereinigt, oder an den Querfortsatz des sechsten Halswirbels befestigt.

Bisweilen erhält der innere Rückgratsstrecker einige, in Ansehung der Zahl, des Ortes und der Größe, unbeständige Zuwüchse; entweder nur einen starken Zuwuchß vom Querfortsatze des ersten, oder des zweyten, oder des dritten Lendenwirbels, oder zwey bis drey Zuwüchse vom Querfortsatze des neunten und zehnten, oder des neunten und achten, oder des elften, zehnten und neunten, oder des neunten, achten und sechsten; oder fünf Zuwüchse von den Querfortsätzen des zehnten, neunten, achten, siebenten und sechsten Rückenwirbels.

3) Morgagni Adv. anat. II. p. 38.

Der äußere Rückgratsstrecker setzt sich mit zwölf sehnigen, dünner werdenden, je höher liegenden, desto längern (die zwey obersten ausgenommen), dafür aber dünnern Zipfeln, an die Rauigkeit des Kleinern Bogens der Ribben, und mit dem dreyzehnten an den Quersfortsatz des untersten Halswirbels (letzterer Zipfel fehlt bisweilen); die zwey oder drey untersten Zipfel gehören mehr dem gemeinschaftlichen Bauche, als diesem äußern Rückgratsstrecker; bisweilen setzt sich auch der letzte Zipfel noch neben die erste Ribbe an den Quersfortsatz des letzten Rückenwirbels.

Außerdem erhält er anfangs sehnige, dünne, im Fortgange zunehmende Zuwüchse vom obern Rande der fünf, sechs, zehn, ja eilf untersten Ribben (wie der innere Rückgratsstrecker von den Wirbeln), die nach innen zu mit jenen Zipfeln sich vereinigen, je höher sie liegen, desto stärker werden, und von denen gewöhnlich die zwey obersten, oder die oberste allein sich durchs Fleisch mit den zwey untern Anfängen des absteigenden Nackenmuskels, auf mannigfaltige Weise vereinigen.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen findet sich eine durchaus abgesonderte Portion, die dünnsehnig von der vierten Ribbe kommt, fleischig wird, und sich wieder sehnig an den Quers-

fortsatz des sechsten Halswirbels festsetzt. — Bisweilen scheidt der äußere Rückgratsstrecker eine Portion zur Sehnenhaut, die zwischen dem hintern obern und untern sägenförmigen Muskel liegt; — bisweilen zum Halsbauschmuskel. — Bisweilen erhält er eine vom inneren Rückgratsstrecker.

Wirkung.

Beide, der äußere und innere Rückgratsstrecker krümmen den Rücken nach hinten, und etwas auf ihre Seite. — Beyde ziehen den vorwärts gebogenen Rücken gerade, und halten ihn strack. — Die Ripben werden durch die Portionen, die an ihnen sitzen, herunter gezogen, freylich wenig vom Innern, weil er so nahe am Ruhepunkt liegt, und für dies Geschäft allein zu schwach ist. Doch werden sie mit durch ihn festgehalten, daß sie nicht herauf können. — Da die Zuwüchse des äußern, wie gesagt, doch mehr dem absteigenden Nackenmuskel gehören, so ziehen sie mit ihm die Ribben aufwärts.

Dornmuskel des Nackens.

Spinalis Cervicis.

Albin. Tab. XVI. fig. 15. bey andern Semispinalis Cervicis.

S. 194.

Kommt sehnig vom hintern und obern Theile der Quersfortsätze der fünf oder sechs obersten oder aller

sieben Halswirbel, wird fleischig, allmählig dicker und breiter (je höher eine Portion liegt, desto stärker ist sie), nimmt aber bald wieder ab, und setzt sich mit vier sehnigen Enden an die äußersten Spitzen der Dornfortsätze des fünften, vierten, dritten und zweiten Halswirbels.

von Animum
Halswirbel, fünften
von dem Querfortsatz,
sitzen der fünf oberen
Wirbelsäule. Die
unteren sind spindelförmig
in fünf Portionen,
wobei die an den
ersten bis 2. 3. 4. 5.
die fünften Halswirbel
sitzen. Behrend's.

Abweichungen.

Ist bisweilen mit dem vieltheiligen Rückgratsmuskel vermischt. — Bisweilen tritt noch eine oder andere Portion vom Dornfortsatz eines Halswirbels zu ihm.

Wirkung.

Beugt den Hals nach seiner Seite schief rückwärts, und streckt ihn, wenn er vorwärts gebogen war.

Halbdornmuskel des Rückens.

Semispinalis Dorsi.

Albinus Tab. XV. Fig. 8.

§. 195.

Ist gleichsam eine Fortsetzung des Dornmuskels am Halse nach unten zu, und oft unzertrennlich mit ihm verbunden.

Kommt mit vier, fünf, sechs, bis sieben anfangs sehnigen Portionen vom hintern und obersten Theile der äußersten Enden der Querfortsätze des zehnten, neunten, achten und siebenten; oder des elften, zeh-

Kommt
mit fünf lang sehnigen
Theilen von dem
Querfortsatz des
10. 9. 8. 7. bis 3ten
Wirbelsäule. Die
sieben bis zum 10ten
sitzen an den Querfortsätzen
obersten Wirbelsäule
des Halses.
Behrend's

Biswei-
Portion
n und
weilen
er eine

stärker
uf ihre
genen
ibben
y, her-
weil er
beschäft
rch ihn
Da die
r Dem
ie mit

erriat.
te der
aller



ten, neunten, achten und siebenten; auch wohl des sechsten Rückenwirbels. — Diese Portionen, von denen die untern kürzer und dicker, die obern länger und schmaler sind, stoßen zu einem dicker werdenden Bauche zusammen, der bald wieder dünner wird; — und sich mit fünf, sechs, sieben, oder acht flachsehnigen Portionen (die aber dicker als die Anfänge sind) an den untern und Seitentheil der Dornfortsätze der drey, vier, oder fünf obersten Rückenwirbel und des letzten oder des letzten und des vorletzten Halswirbels festsetzt. — Gewöhnlich vermischt er sich mit dem Dornmuskel des Rückens und dem vieltheiligen Rückgratsmuskel.

Wirkung.

Zieht den Rückgrat zwischen seinen Enden zusammen, — oder streckt ihn, wenn er vorwärts gebogen war.

Dornmuskel des Rückens.

Spinalis Dorsi.

Albin. Tab. XV. Fig. 6.

S. 196.

Ist gewöhnlich mit dem innern Rückgratsstrecker verbunden, und stellt gleichsam seine von den Dornfortsätzen kommende Portion vor.

Kommt mit vier Sehnen, deren unterste die

186 183

längste und stärkste, die oberste die kürzeste und schwächste ist, von den Dornfortsätzen der zwey obersten Lendenwirbel und zwey untersten Rückenwirbel. — Bisweilen kommt eine Portion vom zehnten Rückenwirbel hinzu, bisweilen fehlt hingegen die oberste Portion. — Die von den Lendenwirbeln kommenden Portionen gehören oft mehr dem innern Rückgratsstrecker, als ihm. — Alle Portionen werden fleischig, und bilden einen dünnen, schmalen, im Fortgange nur wenig breiter werdenden, nach außen schwach gewölbten, nach innen zu concaven Muskel, — der sich mit drey, vier, fünf, sechs, sieben oder acht, je höher liegenden, desto längern und stärkern, oft auch gespaltenen Sehnen an die Dornfortsätze der obern Rückenwirbel, vom achten bis ersten, oder vom neunten bis zum zweyten, oder vom sechsten bis zum dritten, oder vom siebenten, sechsten und fünften, oder sechsten, fünften und vierten festsetzt (bisweilen fehlt eine der mittlern Portionen). — Seine obern Portionen hängen gewöhnlich an den Spitzen und auch am Fleische mit dem Halbdornmuskel des Rückens zusammen.

Wirkung.

Hilft den Rücken hinterwärts und etwas zur Seite beugen. — Hilft den vorwärts gebogenen Rückgrat wieder aufrichten.

Vieltheiliger Rückgratsmuskel.

Multifidus Spinae.

Albin. Tab. XV. Fig. 1. und 2.

§. 197.

Füllt längs dem Rückgrate die Rinne zwischen den Queerfortsätzen und Dornfortsätzen aus, und besteht aus einer Reihe kleiner zusammenhängender Muskeln.

Kommt gewöhnlich mit sieben und zwanzig Portionen a) von den vier Höckerchen des Kreuzbeins, die die schrägen Fortsätze vorstellen; ferner b) vom Bande, welches das Kreuzbein mit dem Hüftbeine zusammenhält, und c) vom Hüftbeine selbst; d) von den schrägen Fortsätzen aller Lendenwirbel; e) von den Queerfortsätzen aller Rückenwirbel (an den drey untern mehr von ihren Enden, an den übrigen mehr vom obern Theile), und endlich f) von den schrägen Fortsätzen der vier untersten Halswirbel.

Diese anfangs sehnigen Portionen werden im Schiefaufsteigen breiter und dicker, stoßen, indem sie auseinander fahren, zusammen,

und sehen sich, indem sie immer sehniger werden, an den ganzen untern Rand der Dornfortsätze des Kreuzbeins, aller Lendenwirbel, aller Rückenwirbel und der sechs untern Halswirbel, so daß eine Portion zu drey, vier bis fünf über ihr liegenden Wirbeln ihre

Fasern schießt, folglich ein Wirbel von drey, vier bis fünf verschiedenen Anfängen Fasern besitzet.

Die längern Fasern liegen mehr nach außen, und steigen schräger aufwärts, die kürzern mehr nach innen, und steigen gerader aufwärts. — Ueberhaupt ist er wie der Rückgrat unten stärker, oben schwächer.

A b w e i c h u n g e n .

Bisweilen fehlt die Portion vom letzten Halswirbel. — Bisweilen findet man abgesonderte Muskeln am Halse, die vom schrägen Fortsatze eines Wirbels zum Dornfortsatze des nächsten Wirbels aufsteigen; und an den Lenden, die vom schrägen Fortsatze zum Höcker, der zwischen dem Querfortsatze und dem schrägen Fortsatze liegt, aufsteigen.

W i r k u n g .

Beugt den Rückgrat nach hinten; richtet ihn auf, wenn er vorwärts geneigt war, und scheint ihn ein wenig zu drehen ⁴.

4) Die Wirkung der beschriebenen Muskeln des Rückgrats kann man vorzüglich bey jungen Aequilibristen und Voltigirern beobachten, wo man deutlich fühlt, wie ein Wirbel nach dem andern bewegt wird.

Zwischendornmuskeln des Nackens.

Interspinales Cervicis.

Albin. Tab. XVI. Fig. 2. und 3.

S. 198.

Liegen zwischen den Hörnern der Dornfortsätze je zweyer Halswirbel, außer dem Atlas, folglich sind ihrer fünf auf jeder Seite. Sie sind rundlich, gleichsam von den Seiten her zusammengedrückt, und an beyden Enden etwas schmaler, als in der Mitte.

Abweichungen.

Bisweilen findet man auf der rechten oder der linken Seite, bisweilen auf beyden noch andere Muskeln zwischen den Dornfortsätzen der Halswirbel, die ein auch wohl zwey Dornfortsätze überspringen, und deshalb länger, als die gewöhnlichen Zwischendornmuskeln werden.

*4om
ist "process" spinosus
von diesem Hals
wegen der forata post.
spinae.
wie andere von breiter
sehr die 2te Gelenkfläche
für den Vorwärtz der Brust
Hallig 300 Lat. Nat. 1805 N. 155.*

Wirkung.

Ziehen die Dornfortsätze an einander, und krümmen dadurch den Hals nach hinten; oder richten ihn wieder auf, wenn er vorwärts geneigt war.

Zwischendornmuskel des Rückens,

Interspinales Dorsi.

Albin. Tab VIII. ff. ΔΔ.

S. 199.

Bisweilen finden sich einige ähnliche Muskeln
zwi-

zwischen den Dornfortsätzen, besonders der untern Rückenwirbel. Oft fehlen sie aber.

Wirkung.

Wirken auf den Rücken, wie die ähnlichen am Halse auf den Hals.

Zwischendornmuskeln der Lenden.

Interspinales Lumborum.

Albinus Tab. XV. Fig. II.

§. 200.

Sechs ähnliche, beständigere, an beiden Enden sehnige Muskeln finden sich zwischen den Dornfortsätzen der Lendenwirbel. Der erste nämlich zwischen dem Dornfortsatze des Kreuzbeins und des fünften Lendenwirbels: der sechste zwischen dem ersten Lendenwirbel und letzten Rückenwirbel.

Wirkung.

Wirken auf die Lenden, wie die ähnlichen am Halse auf den Hals.

Hinterer größerer gerader Kopfmuskel.

Rectus Capitis posticus major.

Albinus Tab. XVII. Fig. 2. — Courcelles Tab. V. N.

§. 201.

Kommt stark sehnig vom oberen Theile des Dornfortsatzes des zweyten Halswirbels. Sein anfangs
S. Muskellehre. P

spitziges Fleisch wird dicker und strahlenförmig, bis zum Ende immer breiter, geht schief aufwärts den Atlas vorbei, und — setzt sich verdünnt und sehnig an den untern Theil des Hinterhauptbeins zwischen seinen Zigenrand und das Loch fürs Rückenmark, mitten zwischen den obern schrägen, und hintern kleinern geraden Kopsmuskel.

Abweichung.

Bisweilen ist er doppelt, indem nach außen ein kleinerer, aber längerer an ihm liegt.

Wirkung.

Zieht den Kopf und den ersten Halswirbel schief rückwärts gegen den zweyten Halswirbel. — Hilft dem untern schrägen Kopsmuskel den Kopf und den ersten Halswirbel auf dem zweyten Halswirbel drehen.

Hinterer kleinerer gerader Kopsmuskel.

Rectus Capitis posticus minor.

Albinus Tab. XVII. Fig. 1. — Courcelles Tab. v. o.

§. 202.

Kommt auf gleiche Art vom ersten Halswirbel (wie der hintere größere gerade Kopsmuskel vom zweyten); nämlich sehnig von dessen hinterer Spitze, ist strahlenförmig fleischig, — und setzt sich wieder sehnig ans Hinterhauptbein, gleich über dem Loche fürs Rückenmark.

Wirkung.

Zieht den Kopf und den ersten Halswirbel wechselseitig schief an einander, und hilft dadurch den Kopf rückwärts neigen.

Unterer schräger Kopfmuskel.

Obliquus Capitis inferior.

Albinus Tab. XVII. Fig. 4. — Asch de primo Pars Nervorum Cervicalium Fig. V. schön in natürlicher Größe.

S. 203.

Kommt sehnig vom obern Theile des zweyten Halswirbels, und geht ein wenig dicker werdend, dann wieder abnehmend, und zuletzt sehnig, schräg gegen den Quersfortsatz des ersten Halswirbels hinauf, — an dessen hinteres Ende er sich festsetzt.

Wirkung.

Dreht mittelst des ersten Halswirbels den Kopf gegen seine Seite, und indem er den ersten Halswirbel gegen den zweyten zieht, hilft er auch etwas den Kopf hinterwärts neigen.

Oberer schräger Kopfmuskel.

Obliquus Capitis superior.

Albin. Tab. XVII. fig. 3. — Asch. am ang. Orte. fig. V. L.

S. 204.

Nimmt sehnig am hintern Theile des Quersforts

faßes des ersten Halswirbels das obere, vom untern schrägen Kopfmuskel übrig gelassene Stück ein, wird breiter und stärker, und geht in entgegengesetzter Richtung vom untern schrägen Kopfmuskel schräg hinauf, um sich verdünnt, schmaler und sehnig — ans Hinterhauptbein zwischen den Zihenrand und den hintern größern geraden Kopfmuskel festzusetzen.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen setzt er sich an den Warzenfortsatz selbst.

W i r k u n g.

Zieht den Kopf schief gegen den ersten Halswirbel herunter. — Hilft dem untern schrägen Kopfmuskel den Kopf auf seine Seite drehen.

G e r a d e r S e i t e n k o p f m u s k e l.

Rectus Capitis Lateralis.

Albin. Tab. XVII. fig. 5.

§. 205.

Kommt vom vordern Theile des Quersfortsatzes des ersten Halswirbels, wird etwas stärker, und geht in eine Sehne über, die sich an die Raubigkeit des Hinterhauptbeins hinter dem Halsvenenloche am vordern Ende des Zihenfortsatzes festsetzt.

A b w e i c h u n g.

Ist bisweilen doppelt, indem ein kleinerer vom Körper des ersten Halswirbels selbst kommt.

Wirkung.

Neigt den Kopf zur Seite, und etwas schief vorwärts.

Vorderer größerer gerader Kopfmuskel.

Rectus Capitis anterior major.

Albin. Tab. XVI. fig. 19. 20. nennt ihn Rectus Cap. internus major.

S. 206.

Kommt 1) fleischig von der am sechsten Halswirbel befestigten Sehne des langen Halsmuskels; 2) sehnig vom äußersten Höckerchen des sechsten, fünften, vierten, auch wohl des dritten Halswirbels. Diese fünf Portionen stoßen im schief Absteigen in einen sich verdickenden, äußerlich sehr sehnigen Bauch zusammen, der sich an den Felsenrand des Hinterhauptbeins festsetzt.

Abweichungen.

Bisweilen ist die Sehne vom sechsten Halswirbel doppelt. — Bisweilen findet man Zipfel vom ihm an einigen der obersten Halswirbel haften. — Bisweilen kommt statt deren ein besonderer Muskel mit zwey Portionen vom sechsten und fünften Halswirbel, der sich an den mondformigen Rand des Querfortsatzes des dritten Halswirbels festsetzt. — Bisweilen kommt mit dem vordern größern geraden Kopfmuskel ein ansehnlicher Muskel von der am Querfortsatz des

vom untern
ein, wird
rechter Rich-
vorg hinaus,
ans Hinter-
den hintern

ort sah selbst.

Halswirbel
Kopfmuskel

uskel.

erfortsatzes
und gefe
higkeit des
che am vor

inner vom

fünften Halswirbels sitzenden Sehne des vordern Ribbenhalters, der gespalten sein kürzeres schwächeres Ende an den Queerfortsatz des dritten Halswirbels, sein längeres Ende an den Queerfortsatz des ersten Halswirbels mit dem mittlern Ribbenhalter heftet,

Wirkung.

Beide neigen den Kopf gerade vorwärts. — Einer allein neigt ihn etwas zur Seite; dreht ihn gegen seine Seite. — Ist der Kopf rückwärts gebogen, so richten sie ihn wieder auf.

Vorderer kleinerer gerader Kopfmuskel.

Rectus Capitis anterior minor.

Albin. Tab. XVII. Fig. 6. nennt ihn *Rectus Capitis internus minor.*

§. 207.

Kommt sehnig vom vordern Theile des Körpers und der Wurzel des Queerfortsatzes des ersten Halswirbels, wird im schräg Aufsteigen etwas breiter und dicker, bis er mit einem schmalen, dünnen, sehnigen Ende sich an den durch eine knorpelige Masse mit der Pyramide verbundenen Rand des Hinterhauptbeins festsetzt.

Wirkung.

Neigt den Kopf vorwärts und etwas zur Seite.

Langer Halsmuskel.

Longus Colli.

Albinus Tab. XVI. Fig. 6. 7.

§. 208.

Besteht gleichsam aus zwey Muskeln. — Kommt mit sieben sehnigen Portionen von den Körpern der drey obersten Rückenwirbel, und den Querfortsätzen des sechsten, fünften, vierten und dritten Halswirbels, die allmählig breiter und dicker werden.

Sein unterer Theil steigt drauf aufwärts, und setzt sich mit einem, zwey, drey bis vier langen, schmalen, zuletzt sehnigen, auch wohl gespaltenen Enden an den vordern Höcker des Querfortsatzes des sechsten, oder des sechsten und fünften, oder des sechsten, fünften und vierten, oder des siebenten, sechsten, fünften und vierten Halswirbels.

Sein oberer weit stärkerer Theil steigt gerader aufwärts, nimmt die von den Querfortsätzen kommenden Portionen zu sich, und setzt sich mit schmaler werdenden, zuletzt sehnigen, je höher liegenden, desto stärkern Enden an die Körper aller, oder nur der fünf, vier, oder drey obersten Halswirbel; bisweilen geht er bis ans Hinterhauptsbein, wo er mit dem von der andern Seite zusammenstößt.

Abweichungen.

Bisweilen kommt eine Portion von der ersten

oder zweyten Ripbe, oder vom Körper des sechsten oder siebenten Halswirbels hinzu. — Bisweilen fehlt hingegen die unterste Portion vom sechsten Halswirbel.

Wirkung.

Krümmt den Hals vorwärts etwas zur Seite, und macht ihn gerade, wenn er rückwärts gebogen war.

Vordere Zwischenqueermuskeln des Halses.

Intertransversarii Colli anteriores.

Albin. Tab. XVI. Fig. 3. und 10. nur nennt er umgekehrt den untersten den ersten, und den obersten den sechsten.

S. 209.

Sie liegen mehr vorwärts als die folgenden zwischen den Querfortsätzen je zweyer Halswirbel; ihrer sind daher sechs. Der erste zwischen dem ersten und zweyten Wirbel ist der oberste, der sechste zwischen dem sechsten und siebenten Halswirbel der unterste. An beiden Enden sind sie dünne und fehnig, in der Mitte etwas dicker und rundlich, doch durchaus mehr breit als lang. Sie steigen schief inwärts in die Höhe.

Der erste oder oberste unterscheidet sich dadurch von den übrigen, daß er mit einer schmalen Sehne anfängt, breiter werdend aufsteigt, auch wohl doppelt ist.

— 233 —

Bisweilen vereinigen sich zwey benachbarte zu einem gemeinschaftlichen Bauche, indem ihre Fasern einen zwischenliegenden Querfortsatz überschreiten.

Wirkung.

Ziehen die Querfortsätze aneinander, und krümmen dadurch den Hals seitwärts, oder machen ihn wieder gerade, wenn er auf die entgegengesetzte Seite gebogen war. — Der erste scheint überdies den ersten Halswirbel, wenn er auf die entgegengesetzte Seite gedreht war, zurückdrehen zu helfen.

Hintere Zwischenqueermuskeln des Halses.

Intertransversarii Colli posteriores.

Albin. Tab. XVI. Fig. 9. den ersten unter dem Namen des Sextus Fig. 16 und 18.

§. 210.

Ihrer sind sechs. Der erste kommt dünne, theils vom Querfortsatze des zweyten Halswirbels, theils von den Sehnen des Halsbauschmuskels, und Quermuskel des Nackens (bisweilen bloß von diesen Sehnen, bisweilen von der Sehne des Quermuskels des Nackens allein), wird stärker, dann wieder dünner und sehnig, in der Mitte stärker und rundlich, und steigt durchaus mehr breit als lang in die Höhe.

Wirkung.

Wirken wie die vordern. — Auch der erste

4. Tab. 1815.
16.
105

hintere Zwischenqueermuskel wirkt wie der erste vorder.

Zwischenqueermuskeln des Rückens.

Intertransversarii Dorsi.

Albinus Tab. XV. Fig. 9.

S. 211.

Sechs, sieben, acht, oder neun ähnliche, nur weit dünnere, doch etwas längere Muskelchen finden sich zwischen den Quersfortsätzen je zweyer Rückenwirbel, vom dritten an bis zum letzten.

Zwischen dem ersten und zweyten, dem zwenten und dritten Rückenwirbel scheinen sie gänzlich zu fehlen. In den folgenden Zwischenräumen werden sie allmählig sichtbarer, doch finden sich bisweilen in den obern Zwischenräumen bloß sehnige Fasern. Zwischen den Quersfortsätzen der untern Rückenwirbel aber werden sie stärker und deutlicher.

Bisweilen vereinigt sich der unterste mit dem zunächst über ihm liegenden zu einem gemeinschaftlichen Muskel, so wie bisweilen der unter ihm liegende erste Zwischenqueermuskel der Lenden mit ihm zusammenstößt.

Wirkung.

Helfen die Rückenwirbel aneinander bringen.

— 235 —

Zwischenqueermuskeln der Lenden.**Intertransversarii Lumborum.**

Albinus Tab. XV. Fig. 10.

S. 212.

Fünf ähnliche, aber weit stärkere, Muskeln finden sich an den Querfortsätzen der Lendenwirbel. — Der erste zwischen dem Querfortsatze des ersten Lenden- und des letzten Rückenwirbels. — Der zweyte zwischen dem Querfortsatze des zweyten und ersten Lendenwirbels, u. s. w. — Sie sind kurz, breit, stark, etwas sehnig, und nach der verschiedenen Stärke der Querfortsätze an Größe verschieden.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen überschreitet der erste mit einer Portion den Querfortsatz des zwölften Rückenwirbels, und setzt sich an den Querfortsatz des eilften Rückenwirbels.

W i r k u n g.

Helfen die Querfortsätze seitwärts aneinander ziehen; — sind sie hingegen auf die andere Seite geneigt, so helfen sie sie wieder aufrichten.

h. Tab. 1813.

56.

405.

Hoden Muskel des Saamenstrangs.
Cremaster.

Albinus Tab. XIII. Fig. 4.

Camper von Brüchen Tab. IX. in natürlicher Größe.

S. 213.

Tritt vom untern Theile des zusammenhängenden innern schrägen und des queeren Bauchmuskels, doch vorzüglich vom innern schrägen Bauchmuskel zum äußeren Theile des Saamenstrangs, fährt drauf mit seinen Fasern auseinander, umfaßt sich windend den Saamenstrang, und wird nach unten zu allmählig dünner. — Bisweilen schlägt sich auch zu ihm eine kurze, aber breite Portion vom äußern schrägen Bauchmuskel, ohnferne des Schaamstücks des Hüftbeins.

Beym Embryo scheint er durch den Bauchring als ein Bündel in den Unterleib zu gehen. Beym weiblichen Geschlechte findet man einen ähnlichen, doch schwächern, Muskel ⁵.

Wirkung.

Zieht die Hoden in die Höhe, wie man bey starkem Husten ⁶, vorzüglich bey Kindern, die am Krampfhusten leiden, sieht. — Scheint die Absonderung und Heraufschaffung des Saamens zu unterstützen ⁷. —

5) S. oben innerer schräger Bauchmuskel.

6) Hunter on animal Oeconomy. p. 6.

7) Ist deshalb bey Thieren, die keine Saamenbläschen

Hoden Muskel des Saamenstrangs.
Cremaster.

Albinus Tab. XIII. Fig. 4.

Camper von Brüchen Tab. IX. in natürlicher Größe.

S. 213.

Tritt vom untern Theile des zusammenhängenden innern schrägen und des queeren Bauchmuskels, doch vorzüglich vom innern schrägen Bauchmuskel zum äußeren Theile des Saamenstrangs, fährt drauf mit seinen Fasern auseinander, umfaßt sich windend den Saamenstrang, und wird nach unten zu allmählig dünner. — Bisweilen schlägt sich auch zu ihm eine kurze, aber breite Muskel, ohnferne

Beym Embryo als ein Bündel in weiblichen Geschlechten doch schwächer,

Zieht die Hoden in die Höhe, wie man bey heftigem Husten⁵, vorzüglich bey Kindern, die am Krampfhusten leiden, sieht. — Scheint die Absonderung und Herauffschaffung des Saamens zu unterstützen⁷. —

5) S. oben innerer schräger Bauchmuskel.

6) Hunter on animal Oeconomy. p. 6.

7) Ist deshalb bey Thieren, die keine Saamenbläschen

Melkt bey wiederholter Begattung den Saamen aus den Hoden. — Scheint mit dem hohen Alter zu schwinden. Man vermuthete, daß er beyhm Embryo den Hoden im Hodensack befördere?†

R u t h e n s t e i f e r.

Erector Penis oder Ischiocavernosus.

Albinus Tab. XII. Fig. 39. 40. — Camper Dem. anat. path. Lib. 2. Tab. 2. Fig. 1. N. O. P. desgl. Fig. 5. am schönsten in natürlicher Größe auf Santorini's Tab. posth. 16. H. H.

S. 214.

Kommt anfangs dünnsehnig vom innern Theile des aufsteigenden Astes des Sitzbeins, bisweilen mit noch einer Portion vom Knorren des Sitzbeins, schlägt sich fleischig und etwas an Dicke zunehmend um den Anfang des schwammigen Körpers der Ruthe, an welchem er sich verdünnt, und sehnig im Innwärts und Aufwärtsgehen verliert.

W i r k u n g.

Zieht den Anfang des schwammigen Körpers der Ruthe abwärts, rückwärts, und etwas seitwärts, verkürzt und preßt ihn dadurch, und vermehrt folglich, wenn er schon mit Blut gefüllt ist, das Anschwellen, und Steifwerden desselben.

haben, nicht nur verhältnismäßig stärker, sondern gar doppelt; z. B. bey Hunden.

H. S. 214 1813.

186.

1805.

Harnröhrenmuskel.

Accelerator Urethrae.

Albinus Tab. XII. Fig. 37. — Camper am ang. Orte
L. M. Q. R. in natürlicher Größe. — Santorini Tab.
posth. XVI. E. c. d.

§. 215.

Kommt vom bandartigen Wesen, das den Anfang der Harnröhre an den schwammigen Körper befestigt, und von der innern Seite des schwammigen Körpers der Ruthe; ist anfangs breit, sehnig, aber sehr dünne, drauf fleischig und etwas dicker. — Seine Fasern stoßen mit denen von der andern Seite gerade in der Mitte der Harnröhre zu einer sehnigen Linie in vorwärts offene Winkel zusammen, so daß seine hintern Fibern queerer liegen, fast gerade ohne Winkel zusammenstoßen und kürzer sind, die folgenden eine desto schiefere Richtung nach hinten haben, länger sind, und desto spitzere Winkel bilden, je mehr sie nach vornen liegen. Er umgiebt den Wulst der Harnröhre wie eine Muskelscheide, die hinterwärts mit dem äußeren Schließer des Afters, und dem Quermuskel des Damms verwebt ist. — Beym weiblichen Geschlechte vertritt seine Stelle der Scheidenbeenger.

Abweihung.

Bisweilen umgiebt die vorderste Portion von ihm einen Theil des schwammigen Körpers der Ruthe *.

g) Camper am ang. Orte. Fig. V.

Wirkung.

Drückt den Wulst der Harnröhre zusammen, und spannt ihn beym Steifwerden der Ruthe. — Schneidet durch Pressen des Wulstes der Harnröhre den Harn und Saamen fort, besonders wenn durch Zusammenziehung des äußern Asterschließers sein hinterer Theil befestigt wird; auch scheint er wegen der schiefen Richtung seiner Fasern den Wulst der Harnröhre zugleich vorwärts zu treiben, besonders wenn obige Abweichung Statt findet.

Hinterer Damm muskel.

Transversus Perinaei.

Albinus Tab. XII. fig. 27. e. d. 28. — Camper am ang. Orte Tab. 2. fig. I. SS. in natürlicher Größe. — Santorini Tab. posth. aus einem Manne. Tab. XVI. LL. aus einem Mädchen, Tab. XVII. LL. vortreflich.

S. 216.

Kommt vom aufsteigenden Aste des Sitzbeins mit dem Ruthensteifer (oder in Weibern mit dem Steifer des Kitzlers); doch queerer liegend, ist anfangs sehnig, dünne und spizig, wird drauf fleischig, allmählig dicker und breiter, bis er sich wieder verdünnt, im Damme vor dem Aster zwischen dem äußern Schließer des Asters und dem Harnröhrenmuskel verliert, indem er sich größtentheils mit dem von der andern Seite vereinigt, und theils dem äußern

Tab. 1915.
196.
1705

Schließer, theils dem Aufheber des Afters einmischet.
(Im weiblichen Geschlechte vermischet er sich außer dem
Schließer des Afters mit dem Scheidenbeenger.)

A b w e i c h u n g e n.

Variirt ungemein; bisweilen sieht er doppelt aus;
bisweilen ist er auf einer Seite stärker, als auf der
andern ?.

W i r k u n g.

Wirken beyde, so ziehen sie den Damm und Afters
rückwärts, drücken in etwas das Ende des Mastdarms
zusammen, und befördern dadurch den Stuhlgang.

V o r d e r e r D a m m m u s k e l.

Transversus Perinaei alter.

Albinus Tab. XII. fig. 37. f. i. 39. — Camper an ang.
Orte fig. 5. A. F. D. Santorini Obs. anat. aus einem
Manne Tab. 3. fig. 5. H. H. aus einem Weibe Tab. 2. F.
Ebenderselbe in den Tab. posth. XVI. i. i. aus einem
Manne; desgleichen den weiblichen. Barth letzte Tafel.

S. 217.

Kommt mehr vorwärts oder höher, als der vo-
rige zur Hälfte der Höhe des Ruthensteifers vom in-
nern Theile des Schaambeins, geht nach innen zum
Damme, vereinigt sich theils mit dem von der an-
dern Seite, theils mit dem vorhergehenden, und ver-
liert

9) So bey Camper am angef. Orte.

*Vollung des Afters
by Weibern & Männern
H.*

Musculus partii membranaceae

James Willson. Description of two muscles vertebrae. 197
surrounding the membranaceous part of the vertebra.

Med. & Physicall
Observations of a Soc.
in London. Vol. 1. 1709.
p. 175. pag. 180. t. in Tab.

and nearly at the same
distance below the
attachment of the
tendon(?) of the bladder.

F. aufhören

Die Torsion dieses
einigenmaßen in
der Richtung der
Levatoris ani.

Nach der innern im hinteren Theil
des Os sacrum einmündung ein altes
gell über dem folgenden Bogen des Falles
kommt mit einem unklaren Torsion
ein flacher, unregelmäßig sich ausbreitender
Muskeln, welcher aufwärts hinwärts geht
aufwärts parallel abwärts zum
folgenden Theil des Os sacrum zu verlaufen
in unterhalb mit der von den anderen
Theile der innern einmündung des
zu bilden, welche sich mit dem hinteren
Theil des Os sacrum verlaufen, dann abwärts
des Abwärts des Os sacrum einmündung
findet.

Wirkung

zieht den folgenden Theil des Os sacrum
nach unten gegen die Torsion des Os sacrum
eigenen Bogens des Os sacrum einmündung
verlaufen, welche die Richtung einwärts
des Os sacrum des Os sacrum zu
findet.

2. Lat. Tab. 1115.
4. p. 26.
Levator

Dieser Muskel springt unangenehm
heraus an der Beweglichkeit des Halses oder
Schulders einzuhalten.

Je sehr ein solcher Muskel sich in Bewegung zu
bringen für sollte in der Gegenwart liegen sollte
an dieser Stelle nicht gedrückt werden.

Einfluss gedankt seiner
nicht.

Liegen
geringfügig hinter sich ist es das werden
Vorder der Leisten mit einigen kleinen Gelenken

Man sollte hier einen Komplex des Muskels
nicht einzig für eine Bewegung (Strikate)

Je weiliger Körper findet
sich isolierte Muskeln geringer
an Leisten mit ein
Schinken vagina.

Pollung
by Mail
HK

Das (Merkel.) Halliff. seit Feby $\frac{115}{1814}$ Fund of Herrn Miß/hal
off.

to last Feb 1815.
4. p. 26.
Lector

Roll ...
By M.
146



In
an
gind
mach
Seite

nicht
auch

H
die
cae
fber
tor
mit

hebe
bein
Ech
ovale
1)
E.

liert sich an den Wulst der Harnröhre; bisweilen auch an den schwammigen Körper der Kuthe, so daß er gleichsam nur eine Portion des Kuthesteifers ausmacht ¹. Im weiblichen Körper endiget er sich an den Seitentheil der Scheide.

Abweichung.

Fehlt zuweilen.

Wirkung.

Drückt den vordern Theil des Mastdarms, und zieht ihn mittelst der Harnröhre rückwärts. — Hilft auch die Harnröhre auseinander ziehen.

Muskel der Vorsteherdrüse.

Compressor Prostatae.

Albinus selbst wirft in der Erklärung Tab. XII. Fig. 41. die Frage auf, ob nicht sein Harnblasenmuskel (m Vesicae) der ehemals von ihm genannte Compressor sey Er scheint nur das vorderste Stück desselben zu seyn. — Santorini Obs. anat. Tab. 3. Fig. 2. V. desgleichen aber weit schöner Tab. posth. XV. Fig. 3. F.

§. 218.

Kommt sehnig, schmal und dünn, über dem Aufheber des Afterns von der innern Seite des Schaambeins, mitten zwischen dem untersten Theile der Schaambeinvereinigung und dem obern Theile des ovalen Lochs — geht als ein dünnes, schmales Fleisch

1) S. Camper, am ang. Ort.

S. Muskellehre.

Q

*Outline of the last Nov 1815.
Kaufmann Vol. 4. p. 26.
muss Portion des Levator
ani*



gekrümmt rückwärts, umfaßt die Vorsteherdrüse, und verliert sich unterhalb zwischen ihr und dem Mastdarme, so daß er sich bisweilen mit dem von der andern Seite vereinigt.

A b w e i c h u n g.

Sieht oft wie eine Portion des Aufhebers des Afters aus.

W i r k u n g.

Preßt den untern Theil der Vorsteherdrüse, und zieht die Harnröhre vorwärts.

M u s k e l d e r H a r n b l a s e.

M. Vesicae.

Albinus Tab. XII. Fig. 41.

§. 219.

Ist selten. Kommt, wie der vorige, von dem Schaamstücke des Hüftbeins, nur schlägt er sich auf seiner Seite höher über der Vorsteherdrüse zur Harnblase, und verliert sich zwischen ihren Muskelfasern.

W i r k u n g.

Zieht die Harnblase herunter.

Neußerer Schließer des Afters.

Sphincter Ani externus.

Albinus Tab. XII. Fig. 35. 36. doch wohl vorwärts ein wenig zu lang. Camper Dem. anat. path. Lib. 2. Tab. 2. Fig. 1. B. C. D. E. sehr schön. — Santorini Tab. posth. aus einem Manne Tab. XVI. O. O. R. aus einem Mädchen Tab. XVII. M. M. am allernatürlichsten.

.S. 220.

Im männlichen Körper liegt in der Haut unter dem After ein dünner breiter Muskel, dessen Fasern sich von beyden Seiten elliptisch krümmen, nach vorn und hinten aber in einen spitzen Winkel vereinigen. Sein hinterer Winkel ist an die Steißbeine unmittelbar, oder mittelst eines Bändchens, befestigt. Sein vorderer Winkel geht gegen den Damm in einen bald kürzern, bald längern Zipfel über, wird mit den Quermuskeln des Damms und dem Harnröhrenmuskel verwebt, und verliert sich im Damm.

Im weiblichen Körper hat seine vordere Hälfte einen rundlichen Umfang, und nimmt daher mit ihrer Breite den ganzen Damm ein, in welchem sie sich bisweilen mit einem spitzen Zipfel verliert, und gewöhnlich mit den Scheidenbeengern verwebt. — Bisweilen kreuzen sich vorwärts seine Fasern ².

2) S. Santorini's Abbildung.

Abweichung.

Zieht bisweilen Fasern zum innern Schließer des Afters, und vermischt sich mit dem Aufheber des Afters.

Wirkung.

In beyden Geschlechtern zieht er die Haut um den After, und den After selbst zusammen, wodurch dessen Mündung geschlossen wird; — zieht den Damm rückwärts; — bey dem männlichen Geschlechte befestigt er überdies durchs Rückwärtsziehen des Dammes die Harnröhrenmuskeln, drückt sie, und preßt den Theil der Harnröhre, der im Damm liegt, unterstützt also die Wegschnehlung des Harns und des Saamens

Innerer Schließer des Afters.

Sphincter Ani internus³.

Albinus Tab. XII. Fig. 31. 32 — Camper am ang. Orte. — Santorini Tab. posth. aus einem Manne Tab. XVI. m. aus einem Mädchen Tab. XVII. o. o.

§. 221.

Besteht in einem ziemlich dicken und starken Ringe von Fleischfasern, die um die Mündung des Afters innerhalb des äußern Schließers des Afters liegen.

Abweichung.

Bisweilen laufen über die äußere Fläche seines

³) Nach Bell ist er nur die gegen den After zu verstärkte Muskelhaut des Mastdarms.

Fleisches, und des Fleisches des äußern Schließers
des Asters strahlenförmige Quersfasern ⁴, die aus dem
Aster, wie aus einem Mittelpunkte, sich verbreiten.

Wirkung.

Zieht den Aster zusammen, und schließt seine
Mündung.

Aufheber des Asters.

Levator Ani.

Albinus Tab. XII. von vornen Fig. 32. von hinten Fig. 31.
von der Seite Fig. 33. 34. Camper am ang. Orte Tab.
2. Fig. 2. sehr schön in natürlicher Größe. Noch schöner in
fast natürlicher Größe von oben Haller Icon. Fasc. 4.
Tab. Art. Pelvis I. P. Santorini Tab. posth. aus einem
Manne Tab. 16. S. S. aus einem Mädchen Tab. XVII. P.
P. den weiblichen Aufheber des Asters. Barth letzte
Tafel.

§. 222.

Kommt bis auf ein Loch zum Durchgange von Ge-
fäßen und Nerven, mit ununterbrochenen dünnen
Fasern, im Becken, fleischig vom untern Theile der
Schaambeinvereinigung, sehr dünn sehnig, längs dem
obern Rande des innern Hüftbeinlochmuskels, vom
Schaam- und Sitzbeine, bis zur scharfen Ecke des Sitz-
beines, von der er meist wieder fleischig abgeht. Seine
Fleischfasern fahren rückwärts, nach unten den Mast-
darm umgebend, strahlenförmig zusammen, so daß die

⁴) Camper am ang. Orte.

obersten fast gerade abwärts, die folgenden so lange schief absteigen, bis die untersten fast queer liegen; und setzt sich theils sehnig, einfach oder doppelt an den vordern Theil des letzten oder vorletzten Steißbeinchens, größtentheils aber mit dem Aufheber der andern Seite vereinigt in den After fest, so daß seine Fasern nach oben zu offene Winkel bilden, und nur wenige gerade in einander übergehen. Zu diesem tritt eine dünne Portion, die anfangs sehnig, dann fleischig, theils von dem Winkel kommt, in welchem die schwammigen Körper mit der Harnröhre zusammenstoßen, theils von der innern Fläche des benachbarten Schaambeins, und ebenfalls zur Seite des Wulstes der Harnröhre rückwärts geht, und sich theils dem Aufheber, theils dem äußern Schließer des Afters beymischt.

Beide Aufheber (der rechte und linke), umgeben also, wie eine gemeinschaftliche Binde, den After, die Samenbläschen, die Harnblase, und den Anfang der Harnröhre. — Einige ihrer untern Fasern steigen, mit dem Schließer des Afters vereinigt, in die Höhe. Ihre vordersten Fasern sind die schwächsten, und kreuzen sich.

Im weiblichen Geschlechte aber krümmt sich der untere Theil des Aufhebers des Afters um den After aufwärts, und begegnet, indem er sich zwischen dem After und Steißbeinchens ausbreitet, dem von

der andern Seite, geht mit fast queerliegenden Fasern zur Seite der Steißbeine; die übrigen Fasern steigen, wie sie folgen, gerader auf, amgeradesten diejenigen, die sich an die Steißbeinchen festsetzen. — Indem er mit seinem untern Theile an der Scheide zum After absteigt, ist er sehr dicht an sie geheftet. — Bisweilen ist er kleiner, als der männliche Aufheber, weil ihm die untere vom Schaambeine kommende Portion fehlt, die als ein eigener abgesonderter, auch wohl doppelter Muskel sich zuletzt ihm beymischt.

Wirkung.

Zieht das Ende des Mastdarms vorwärts, und mäßig aufwärts, preßt es zusammen, und leert den Unrath aus. — Hält ferner beym Stuhlgange den Mastdarm und die Steißbeine zurück, und zieht beide nach ausgepreßtem Kothe, wenn sie ausgetreten waren, wieder in die Höhe. — Befördert auch die Ausleerung des Harns und Saamens, und da sein unterer Theil unterwegs auch die Vorsteherdrüse umgiebt, so preßt er auch diese und die Harnröhre. — Im weiblichen Geschlechte scheint er auch die Scheide zusammen zu ziehen.

Steisbeinmuskul.

Coccygeus.

Albinus Tab. XVII Fig. 7. 8. — Camper am ang. Orte
Lib. 2. Tab. I. Fig. 1. Ω p. — Haller am ang. Orte Q.
— Santorini Tab. posth. XVI. X.

S. 223.

Kommt mit einer schmalen Sehne von der innern Seite der spizen Ecke des Hüftbeins, und dem großen untern Beckenbände, wird darauf fleischig, allmählig strahlenförmig, breiter und auch etwas dicker, bis er sich wieder dünner und sehnig an die innere Seite des untersten Stückes des Kreuzbeins und an den Seitenrand der Steisbeine bis aufs vorlezte festsetzt.

Abweichung.

Bisweilen kommt er bloß vom Kreuzbeine, so daß er die Steisbeine nicht bewegen kann. — Bisweilen ist er doppelt, auch wohl dreyfach — Bisweilen hängt er mit dem Aufheber des Afters unzertrennlich zusammen.

Wirkung.

Beugt die Steisbeine nach vornen, und bringt sie, wenn sie hinterwärts getrieben waren, in ihre Lage. — Drückt und preßt den angefüllten Mastdarm, indem er ihn gleichsam unterstützt. — Scheint auch das große untere Beckenband zu spannen.

Krümm er der Steis beine.

Curvator Coccygis.

Ist nicht abgebildet.

§. 224.

Kommt theils vom innern, untern und Seiten-
theile des untersten Stückß des Kreuzbeins, theils vom
innern und Seitentheile des ersten Steißbeins, steigt
klein, länglich, schmal, dünne und meist sehnig ab-
wärts, und setzt sich mit dreyen Enden an den Sei-
tentheil des zweyten, dritten, und vorzüglich des vier-
ten Steißbeins, so daß hier der rechte mit dem lin-
ken zusammenhängt.

A b w e i c h u n g.

Oft ist er größtentheils sehnig; bisweilen fehlt
er ganz.

W i r k u n g.

Krümmt das Steißbein vorwärts.

S t e i f e r d e s R i s t l e r s.

Erector Clitoridis.

Santorini Tab. posth. XVII. H. H.

§. 225.

Kommt sehnig vom untern Aste des Schaambeins,
und legt sich auf eine ähnliche Art, wie der Aufrichter
der männlichen Ruthe, um den schwammigen Körper
des Ristlers; nur ist er kleiner.

von Geyßl.

Wirkung.

Scheint durch eine Zusammendrückung das Steißen des Kitzlers zu befördern.

Scheidenbeenger.

Constrictor Cunni.

Santorini Obs. anat. Tab. 2. Fig. 1. G. desgleichen Tab. posth. XVII. J. J. Barth letzte Tafel.

S. 226.

Kommt sehr dünne, und etwas sehnig, seitwärts vom hintern Theile der Scheide von ihrem schwammigen Wesen, bekommt eine Portion vom benachbarten äußern Schließer des Afters, auch wohl vom Höcker des Sitzbeins hinter dem Aufrichter des Kitzlers, wird darauf fleischig und dicker, und steigt zur Seite des Eingangs der Scheide über der Nymphe bis zum Kitzler hinauf, an den er sich, nachdem er wieder dünner und sehnig geworden ist, festsetzt.

Abweichung.

Bisweilen vereinigt er sich hinter dem Kitzler mit dem von der andern Seite zu einem Bogen.

Wirkung.

Zieht die Scheide zusammen. — Schwillt sie beim Begattungstriebe an, so spannt er sie, und macht, daß sie in der Begattung das männliche Glied um-

fast. — Ist er stärker, als gewöhnlich, so kann er vielleicht selbst die Schaamlefzen bewegen.

Niederzieher der weiblichen Harnröhre,
Depressor Urethrae muliebris.

Santorini Obs. anat. Tab. 2. Fig. 1. F. desgleichen Tab. posth. XVII. g. M. Transversus bey Haller Elem. Physiol. Tom. 7. pag. 84.

§. 227.

Geht als ein Querstreifen unter der Harnröhre von einer Seite zur andern herüber, und ist folglich ein ungepaarter Muskel.

Wirkung.

Drückt er etwa die Harnröhre gegen die Schaambeine?

Großer Brustmuskel.

Pectoralis major.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 4. 5. Camper demonstrat. anat. patholog. Lib. 1. Tab. 2. B. B.

§. 228.

Kommt mit halbkreisförmigem Umfange a) vom vordern nach dem Thorax gebogenen Stücke des Schlüsselbeins, welche Portion oft lange von der übrigen getheilt zu seyn pflegt. b) Von der vordern Seite der Brustbeine bis zum Knorpel der fünften Rippe herunter, so daß sich von beiden Seiten die sechs

von Geißl.

nigen Fasern kreuzen, oder auch wohl die Fleischfasern vereinigen. Auch diese Portion ist bisweilen getheilt. c) Vom Knorpel der fünften, sechsten und siebenten Rippe, ja sogar bisweilen der achten und neunten. d) Vom Knorpel der vier obern Rippen, auch wohl in etwas vom Knochen der fünften Rippe, so daß er mit dem geraden Bauchmuskel bisweilen zusammenstößt. e) Endlich hängt er mit der Sehne des äußern schrägen Bauchmuskels zusammen, und erhält von ihr bisweilen eine oder zwey abgesonderte Portionen.

Das vom Schlüsselbeine kommende Stück ist anfangs dick, die übrigen aber sind anfangs dünne und sehnig, und nachher erst fleischig und dicker, bis sie sich sämmtlich strahlenförmig zusammen begeben, und wieder an Dicke abnehmen.

Sein oberer, mehr als die Hälfte betragender Theil, steigt als eine kurze breite Sehne zur Befestigung an die Oberarmröhre schief herunter. Sein übriger Theil dreht sich um den obern Theil hinterwärts in die Höhe, geht früher in eine Sehne über, welche länger, als die vorige, oft auch in mehrere Stücke getheilt ist, mit ihr aber, indem sie sich kreuzt, nicht nur verknüpft, sondern zuletzt völlig vereinigt wird.

Mit dieser nach oben und unten zu breiter wer-

Musculus mucosa. Pflaum fol
inter ipse
Monro outline
of the anat. of the
H. B. Vol. 1. p. 394.

Denden Sehne befestigt er sich an den Oberarm an die raue Leiste, die vom größern Höcker absteigt, und vereinigt sich hier nicht nur mit dem breiten Rückensmuskel, dem größern runden Armmuskel, und selbst dem dreieckigen Muskel, sondern geht auch nach unten zu in die Armbinde über.

A b w e i c h u n g e n .

Bißweilen kommt eine abgesonderte Portion von der achten Rippe, die mitten im Hinaufgehen zur Achsel sehnig, dann wieder fleischig wird, und zuletzt sich wieder sehnig mit der übrigen Sehne vereinigt. — Bißweilen findet sich zwischen den vom Schlüsselbeine und von den Brustbeinen kommenden Hauptportionen noch eine mittlere diese kreuzende Portion. — Bißweilen findet man einen runden Muskel von ihm zum innern Armmuskel gelangen. — Bißweilen sieht man ein viereckiges Muskelchen auf ihm liegen, welches seine Fibern in rechten Winkeln kreuzt. — Bißweilen kommt ein Muskel sehnig vom Knorpel der dritten Rippe, und setzt sich sehnig an die sechste Rippe ohnfern ihres Knorpels fest ⁵. — Bißweilen kommt eine Portion vom Knorpel der fünften Rippe, die sich ans Brustbein verliert ⁶, folglich als ein Rib-

Formilun. Jellé de
non. Pflaum
Arms. und. Portion
Seiler. 84. anat
Tab. 1. Tab. 1608.

5) Bonn bey Sandifort. Exercit. acad. cap. 6. p. 88.
6) Haller Icon. Fasc. 6. Tab. Art. Pectoris N. Der- gleiche hiemit den 174. S.

von Geißl.

leischig
weilen
n und
n und
ribben,
Rippe,
weilen
Sehne
und
erte
an-
und
Bie
und
er
in
er,
ere
st
gt
s



benheber wirkt. Bisweilen geht von ihm eine fast cylindrische Portion gegen die Achsel, denn unter der Haut mit einer flachen langen Sehne und setzt sich an dem innern Knöchel des Oberarmbeins. Bisweilen geht eine Sehnenportion am Oberarmbeine aufwärts, deren Fasern die Faser der andern Sehne durchkreuzen und als Brücke die Furche des Oberarmbeines bedecken, in welcher die Sehne des zweybäuchigen liegt, vermischt sich mit der Sehne des Obergräthmuskels und verstärkt die Gelenkkapsel.

Wirkung.

Zieht, wenn er ganz wirkt, den ruhig hängenden Arm vorwärts nach innen; — bringt den aufgehobenen Arm herunter, den auswärts geschlagenen Arm vorwärts zurück; — ist der Arm nach außen gedreht, so dreht er ihn nach innen; — wirkt er hingegen theilweise, so hebt sein oberer niedersteigender Theil den Oberarm in die Höhe; — sein mittlerer querliegender bringt den Arm gerade vorwärts gegen die Brust; — sein unterer aufsteigender Theil zieht nicht bloß den Arm, sondern auch das Schulterblatt und das Schlüsselbein nach unten. — Ist die Schulter befestigt, so zieht er umgekehrt das Brustbein und

7) Caldani Institut anat. Myologia S. 365.

Die Rippen aufwärts ³⁾. — Auch kann er nebst andern den Thorax drehen oder wenden; — scheint auch die sehnige Scheide des Arms und des äußern schrägen Bauchmuskels spannen zu können.

Kleiner Brustmuskel.

Pectoralis minor.

Albin. Tab. XVII. Fig. 22. unter dem Namen Serratus anterior. — Camper am ang. Orte, Tab. I. in natürlicher Größe.

S. 229.

Kommt zum Theile sehnig, zum Theile dünnfleischig vom äußern Theile der dritten, vierten, und vom obern Theile der fünften Rippe; oder der zweyten, dritten, vierten und fünften Rippe ohnfern ihrer Knorpel mit drey Zähnen, deren unterster der stärkste ist; die beiden obern Zähne kommen auch wohl in etwas mit sehnigen Fasern von den Knorpeln jener Rippen. Er zieht sich dann aufsteigend zu einem dickern Muskel zusammen, wird am Ende wieder dünner, bis er mit einer schmalen aber starken, auf seiner äußern Fläche früher und am untern Rande am frühesten sich zeigenden Sehne ober- und innerhalb an die Spitze des Hafens des Schulterblatts festsetzt,

3) Wie Haller an sich selbst bey einem Rheumatismus erfuhr de Corp. Hum. Fabr. Tom. 7. pag. 96.

47-48

wo er bisweilen mit dem Hakenarmmuskel und dem zweyhäuchigen Armmuskel zusammenhängt.

Abweigung.

Bisweilen legt sich eine fleischige Portion von ihm an die Sehne des Hakenarmmuskels. *Handbuch der Anatomie p. 15.*

Wirkung.

Zieht durch den Haken das Schulterblatt vorwärts gegen die Brust herunter; — ist aber die Schulter fest, so zieht er umgekehrt die Rippen, an denen er liegt, seitwärts desto leichter in die Höhe, da er sich an ihre Mitte als den beweglichsten Theil festsetzt.

Schlüsselbeinmuskel.

Subclavius.

Albin, Tab. XVII. Fig. 20. — Camper am ang. Orte Fig. 1. in natürlicher Größe.

S. 230.

Kommt vom Knöpfchen der ersten Rippe, oder auch vom Anfange ihres Knorpels mit einer flach runden Sehne, die sich ausbreitet, und in ein längliches, schräg aufsteigendes, dicker werdendes Fleisch übergeht, welches sich an den untern Theil des Schlüsselbeins, nicht weit von seinem Brustende bis zu seiner Verbindung mit dem Haken des Schulterblatts, und bisweilen an das Schulterblatt selbst festsetzt.

Abwei

Abweichung.

Bisweilen kommt eine Portion vom Hakenfort-
satz hinzu. — Bisweilen ist er förmlich doppelt⁹, so
daß der hinzukommende zwischen der untern Fläche
des Schlüsselbeines und dem obern Brustbeine liegt. —
Bisweilen ist statt seiner ein bloßes Band vorhanden¹.
Bisweilen findet sich zwischen seiner Sehne und dem
Knorpel der ersten Rippe ein Schleimsack².

Wirkung.

Zieht das Schlüsselbein, und durch den mit dem
Schlüsselbeine vereinigten Haken des Schulterblatts
die ganze Schulter näher gegen die Brust herunter; —
ist hingegen die Schulter fest oder gar in die Höhe
gehoben, so zieht er ein wenig die erste Rippe und die
ihr folgenden Brustbeine seitwärts und aufwärts.

Großer Sägenmuskel.

Serratus magnus.

Albinus Tab. XVII. Fig. 21.

S. 231.

Kommt von den acht obern Ripben mit neun
Spitzen (weil nämlich zwey Spitzen an der zweyten
liegen), die seinem übrigen runden Umfange ein

9) Boehmer Obs. rar. Praef. Haller de C. H. F. Tom.

VI. p. 76. Rosenmüller Beiträge für Englandenkunst Bd. 1. N. 3. Tab. 2 in naturaligen Größen.

1) Haller am ang. Orte pag. 77.

2) Koch Diss. de Buris mucosis S. 34.

E. Muskellehre.

winkliches oder gezacktes Ansehen geben. — Die erste kleinste rundliche Spitze hängt oft mit dem mittleren Ribbenhalter zusammen, und kommt vom äußern und untern Theile der ersten Ribbe. — Die zweyte gleichfalls rundliche Spitze, und die dritte schon scharfe Spitze kommt von der zweyten Ribbe, und so die folgenden theils von den Ribben, theils von der Sehnenhaut der äußern Zwischenribbenmuskeln. — Die dre y obersten Portionen sind die dicksten, und stoßen bald zusammen, die übrigen bleiben länger, fast bis zum Ende unterschieden. — Bis auf die sechste nehmen sie stark an Länge zu, dann allmählig nicht nur an Länge, sondern auch an Breite wieder ab, doch so, daß sich die siebente Portion am meisten vorwärts zeigt. — Er geht im Ganzen sich ein wenig schmälend um die Ribben nach hinten, so daß die dritte und vierte Portion ein Dreyeck bilden, die fünf untern hingegen strahlensförmig zusammen laufen; — und setzt sich verdünnt und sehnig an den innern Rand der ganzen Basis des Schulterblatts, vorzüglich an dessen obern und untern Winkel fest.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen kommt eine zehnte Portion von der neunten Ribbe hinzu, die weit schwächer und kürzer als die neunte ist, — bisweilen auf ähnliche Art eine eilfte von der zehnten Ribbe; — bisweilen hingegen

fehlt die oberste Portion; — bisweilen ist die erste und zweyte Portion so sehr von den übrigen abge- sondert, daß man sie für einen eigenen Muskel halten könnte.

Wirkung.

Wirkt er ganz, so zieht er das Schulterblatt vorwärts. — Seine beiden obersten Portionen ziehen das Schulterblatt herunter; sein mittlerer Theil schiebt es queer nach vornen, und hebt es in die Höhe; sein unterer senkt es niederwärts. — Ist hingegen das Schulterblatt fest, und wirkt er ganz, so zieht er die Rippen auswärts und rückwärts. — Wirkt er theilweise, so ziehen seine sieben oberen Portionen die Rippen herunter, seine neunte und zehnte ziehen, doch meist nur bey aufgezo- genem Schulterblatte, ihre Ripben in die Höhe. — Hilft er auch den Thorax seitwärts drehen?

K a p p e n m u s k e l

Cucullaris.

Albinus Tab. XVII. Fig. 18. 19.

§. 232.

Kommt gleichsam, als eine Fortsetzung des Kopfnickers a) von der obern rauhen Linie mitten vom Hinterhauptsbeine; b) hinten von dem ihnen beyden gemeinschaftlichen Zellstoffe; c) vom Bande, welches

R 2

Die erste
in mittleren
vom äußern
die zweyte
schon scharfe
so die fol-
n der Seh-
In. — Die
und stoßen
fast bis
chste nehe-
nicht nur
b, doch so,
n vorwärts
enig schmä-
die dritte
auf untern
— und
Rand der
an dessen

on von der
und kürze
che Met eine
en hingegen



die spizen Fortsätze der Halswirbel zusammenhängt; d) von den spizen Fortsätzen selbst, des letzten Halswirbels, und der acht, neun, zehn, elf oder zwölf folgenden Rückenwirbel. In den Räumen zwischen den Dornfortsätzen hängt der rechte mit dem linken zusammen, so daß man beide von den Dornfortsätzen selbst loslösen kann, ohne daß sie von einander getrennt werden. — Dieser ganze Anfang ist sehnig, am stärksten am Hinterhaupte, am breitesten in der Gegend des zweyten und dritten oder des untersten Rückenwirbels; — wird darauf fleischig, allmählig schmaler, aber etwas dicker, doch zuletzt wieder dünner. Von seinen Fasern senken sich die obern schief, etwas gewunden hinab; die mittlern gehen queer, die untern steigen aufwärts. — Er setzt sich sehnig an den vom Kopfnicker übriggelassenen hintern Theil des Schlüsselbeins; ferner an den größten Theil des obern Randes der Gräthe des Schulterblatts; der ans Schlüsselbein gelangende Theil ist der dickste, der übrige ist, je tiefer er liegt, desto dünner.

Abweichung.

Zuweilen liegt auf einer Seite die unterste Portion von den übrigen Portionen eine Strecke lang getrennt, um ein Paar Wirbel tiefer, als auf der andern, so daß ein dreyeckiger leerer Raum zwischen seinen Fasern übrig bleibt.

Wirkung.

Wenn er ganz wirkt, zieht er das Schlüsselbein und Schulterblatt rückwärts. — Sein oberer Theil hebt das Schlüsselbein und Schulterblatt rückwärts in die Höhe; sein mittlerer Theil zieht sie gerade rückwärts; sein unterer senkt sie rückwärts nach unten; — neigt den Kopf und den Hals rückwärts gegen die Schulter, und hilft den Kopf gegen seine Seite drehen.

Breiter Rückenmuskel.

Latissimus Dorsi.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 1. 2. 3.

S. 233.

Kommt sehnig a) von den Dornfortsätzen der vier, fünf, sechs, sieben oder acht untersten Rückenwirbel, aller Lendenwirbel und denen des Kreuzbeins, b) von den schrägen Fortsätzen des Kreuzbeins, c) vom Rande des großen Gefäßmuskels, mit dem er zusammenhängt, d) vom äußern Rande des Hüftbeinkammes, e) und endlich fleischig vom äußern Theile der vier untersten Rippen, so daß die Portion von der zwölften Rippe die breiteste, die von der neunten die schmalste ist. — Diese Sehne ist zart, dünne, oben schmal, unten aber sehr breit, und mit der Sehne des hintern untern Sägenmuskels, und dem innern schrägen Bauchmuskel verwebt. — Von diesem an-

sehnlichen Umfange wird er aufsteigend allmählig schmaler, aber dicker, so daß seine obersten Fasern quer liegen, die untersten hingegen am schrägsten, die von den Rippen fast gerade aufsteigen — schlägt sich um den untern Winkel des Schulterblatts, von dem zuweilen noch eine Portion kommt, steigt stark aufwärts, und geht schleunig in eine dünne längliche, aber doch starke Sehne über, welche sich gewöhnlich eine Strecke lang ans Fleisch und an die Sehne des größern runden Armmuskels legt, am Ende aber wieder von ihr trennt, und indem sie breiter und mit der Sehne des großen Brustmuskels vereinigt wird, sich an die vom kleinen Höcker absteigende rauhe Leiste des Oberarms festsetzt. — Von dieser Sehne geht eine Fortsetzung ab, die den Arm überzieht. — Zwischen ihr und der Sehne des größern runden Armmuskels liegt ein ansehnlicher Schleimsack, und gleich darunter ein kleinerer zwischen ihr und der Oberarmröhre ³.

A b w e i c h u n g.

Bisweisen fehlt die Portion von der zwölften Rippe; — bisweisen geht eine fast viereckige kurze dünne Fleischportion von ihm in die Höhe, bedeckt mit ihrer Sehne den kurzen Bauch des zweybäuchigen Armmuskel, an den sie sich, so wie an den Haken des Schulterblatts, festsetzt.

3) Monro Tab. I. Q. und S.

Wirkung.

Zieht den Oberarm hinterwärts herunter; bringt ihn nach einer Aufhebung wieder herab; zieht den ganzen Arm sammt dem Schulterblatte und Schließelbeine rückwärts herunter, dreht ihn, wenn sein hinterer Theil gegen den Rücken gewendet war, zurück; — drückt den untern Winkel des Schulterblatts gegen den Thorax. — Ist der Arm aufgehoben, so zieht er die Ripben, von denen er kommt, in die Höhe; — und ist der Arm fest genug, so wendet er auch wohl den Rumpf gegen ihn; — hilft auch die Hüfte in die Höhe heben; — verstärkt durch seine Spannung die Wirkung der übrigen Rückenmuskeln.

Größerer Rautenmuskel

Rhomboideus major.

Albin. Tab. XVIII. Fig. 24.

§. 234.

Kommt mit einer breiten Sehne von der Seite der Spitze der Dornfortsätze der vier ersten Rückenwirbel, auch wohl dem Dornfortsatze des letzten Halswirbels, wird darauf fleischig, in der Mitte stärker, steigt schräg abwärts, wird wieder, aber kurz, sehnig; — und setzt sich an die Basis des Schulterblatts, unter der Gräthe, bisweilen bis zum untern Winkel fest, so daß sich der obere Theil ein wenig krümmt.

Abweichungen.

Bisweilen hängt er mit dem über ihm liegenden breiten Rückenmuskel zusammen; — bisweilen ist er gegen das Schulterblatt hin in Portionen getheilt; geht in eine starke rundlichte Sehne über, die an der äußeren Lefze und der hinteren Fläche des untern Winkels des Schulterblatts haftet.

Wirkung.

Zieht das Schulterblatt rückwärts in die Höhe, und dreht es folglich so, daß, wenn dessen unterer Winkel in die Höhe geht, sein Hals sich ein wenig vorwärts neigt.

Kleinerer Rautenmuskel,
Rhomboides minor.

Albinus Tab. XVII. Fig. 23.

S. 235.

Kommt ebenfalls, gleich sehnig, über dem vorigen von der Seite der Spitze des Dornfortsatzes des sechsten und siebenten Halswirbels, zum Theile auch von dem ~~Rückenbände~~ ^{von Folger = Fortsatz} in der Gegend des fünften Halswirbels, wo er mit dem Kappenmuskel und dem hintern obern Sägenmuskel zusammenhängt. Sein Fleisch wird im Fortgange etwas dicker, geht weniger schräg als der größere Rautenmuskel, und bisweilen am Ende merklich schmaler als am Anfange, zum Schulterblatte

Handwritten note in German:
Haut des Rückenmuskels dem unteren
Theile des Halses vom sechsten
Wirbel gebunden zu verlaufen
in die Basis scapulae folgt Folger
Behrend.

Behrend.

herunter, an dessen Bass er sich von der Bräthe an nach unten zu mit einer kurzen Sehne festsetzt.

Abweichungen.

Bisweilen hängen beyde Rautenmuskeln, der größere und der kleinere, unzertrennlich zusammen; — bisweilen ist der kleinere fast durchaus fleischig; — bisweilen bedeckt und kreuzt der kleinere gegen das Schulterblatt hin den größern; — bisweilen setzt sich der größere oder auch der kleinere, höher oder tiefer als gewöhnlich ans Schulterblatt.

Wirkung.

Außer der gleichen Wirkung mit dem vorigen scheint er noch den Hals nach seiner Seite rückwärts neigen zu helfen, — Kann er auch den Rückgrat nach befestigtem Arme zur Seite neigen helfen?

Heber des Schulterblattwinkels.

Levator Anguli Scapulae.

Albinus Tab. XVI. Fig. 13. 14.

§. 236.

Kommt fast fleischig vom hintern Theile des obern Winkels des Schulterblatts, wird darauf etwas breiter und dicker, steigt, wo der Kappenmuskel auf ihm liegt, gekrümmt, dann aber gerader in die Höhe, wird schmaler, und spaltet sich in drey, vier oder fünf dünner werdende, anfangs nur innerhalb, zuletzt ganz seh-

nige Portionen, — mit denen er sich an den vordern und untern Theil der Queerfortsätze der drey, vier oder fünf obern Halswirbel festsetzt. Die erste Portion, die an den Queerfortsatz des Atlas gelangt, ist die längste und dickste, und pflegt hier mit dem Halsbauschmuskel und dem mittlern Ribbenhalter zusammen zu hängen; Die zweyte schwächere hängt mit dem Halsbauschmuskel zusammen; die dritte ist noch schwächer, die vierte die allerschwächste und kürzeste, hängt mit der Sehne des absteigenden Nackenmuskels zusammen.

Abweichung.

Bisweilen sind seine Portionen so getheilt, daß sie sowohl am Halse als am Schulterblatte ein wenig von einander entfernt liegen.

Wirkung.

Zieht den Nacken etwas rückwärts auf seine Seite herunter; hilft das Schulterblatt in die Höhe heben, indem er es nach vornen zieht: allein da er es am hintern und obern Theile hebt, so wendet er es so, daß sein Hals sich herabsenkt.

Gen. 3.
Portion
Müßel
in N. B.
Rehrand

212 215

Dreheckeriger Armmuskel.

Deltoides.

Albinus Tab. XVIII. Fig. II. 12.

S. 237.

Kommt sehnig vom vordern Theile des untern Randes des Schlüsselbeines, den der Brustmuskel übrig läßt, und faßt von dem untern Rande der Gräthe des Schulterblatts, ist folglich mit seinem Umfange dem Kappenmuskel entgegengesetzt, wird fleischig, dick, bald aber sehr viel schmaler, — und setzt sich meist sehnig, doch auch etwas fleischig, an und zwischen die länglichen Höcker auf der Mitte der Oberarmöhre. — Eigentlich besteht er aus sieben in zwey Ordnungen liegenden Portionen. — Die vier Portionen der ersten Ordnung sind anfangs breit, meist fleischig, aber zuletzt dünne, breit und sehnig an die länglichen Höcker des Oberarms befestigt. Die erste Portion macht den vordern Rand, und kommt vom Schlüsselbeine, die zweyte macht den hintern Rand; die dritte kommt von der Gräthenecke; die vierte vom hintern Rande der Gräthe. — Die drey übrigen Portionen liegen zwischen diesen, sind federartig, umgekehrt anfangs schmal und sehnig, und am Ende fleischig, hängen aber mit denen von der ersten Ordnung so zusammen, daß sie mit ihren Sehnen ihnen zur Anlage ihres Fleisches

vordern
), vier
e Por-
ngt, ist
n Hals-
zusam-
it dem
schwä-
hängt
zu-
Das
wenig
Seite
eben,
hin-
das



dienen, nach unten zu aber sich mit ihrem Fleische wechselseitig an die Sehnen jener Portionen legen. — Unter ihm liegt an der Gräthenecke des Schulterblatts ein Schleimsack ⁴.

*Genus glen
Portio
Mittell
in N. B.
Rehrand*

*Etiquilla dicitur in libro
von der anatomie Sternalis
claviculae*

*Leiter Off anat. pag. 1.
Vergl. 1808. Videl.*

A b w e i c h u n g.

Bisweilen kommt eine Portion vom vordern Rande des Schulterblatts zwischen dem Untergräthmuskel und dem größern runden Armmuskel hinzu.

W i r k u n g.

Hebt den Oberarm auswärts gerade in die Höhe; schief vorwärts, wenn sein vorderer Theil vorzüglich wirkt; schief rückwärts, wenn sein hinterer Theil vorzüglich wirkt; da aber der hintere Theil breiter ist, und schräger hinabsteigt, hebt er auch den Arm stärker. — Ist der hängende Arm auswärts und rückwärts gezogen, so bringt ihn sein vorderer Theil zurück; ist er vorwärts gezogen, so thut sein hinterer Theil. — Ist der Arm befestigt, so zieht er das Schulterblatt so herüber, daß sein Hals sich neigt, und es sich hinten erhebt.

O b e r g r ä t h m u s k e l.

Supraspinatus.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 17. 18.

§. 238.

Füllt die Grube über der Gräthe des Schulter-

4) Monro Tab. I. K.

blatts aus, vom hintern Rande an bis zum Ausschnitte an der Wurzel seines Hafens, ist anfangs dünne, dann dick, bis er gegen seine kurze, flache, aber dicke, mit dem Gelenkkapsel verwachsene Sehne ⁵ hin wieder abnimmt, — und sich an die Spitze des größern Höckers an den Kopf des Oberarms festsetzt, wo er sich bisweilen mit der Sehne des Untergräthmuskels vereinigt.

Wirkung.

Zieht den Oberarm vorwärts und schief auswärts in die Höhe; — zieht das Schulterblatt gegen die Oberarmröhre, und entfernt es vom Thorax; — hindert durch seine Befestigung an der Gelenkkapsel das Runzeln derselben bey der Bewegung des Armes.

U n t e r g r ä t h m u s k e l.

Infraspinatus.

Albinus Tab. XVII. Fig. 6.

S. 239.

Nimmt die ganze Fläche des Schulterblatts unter ihrer Gräthe ein, bis auf das durch eine erhabene Linie abgeforderte Stück, an dem die beyden runden Muskeln liegen; kommt sowohl vom Rücken des Schulterblatts als von der untern Fläche der Gräthe, ist größer,

5) Auch die Sehnen der drey folgenden Muskeln hängen aufs festeste mit der Gelenkkapsel zusammen.

aber anfangs dünner, und zuletzt viel schmaler, als der Obergräthmuskel; doch ist seine Sehne ansehnlicher, kurz, aber breit, und am nämlichen Höcker, nur mehr nach hinten, befestigt. — Zwischen seiner Sehne und dem Schulterblatt liegt ein Schleimsack ⁶.

Wirkung.

Er ist, der vorzüglich den Arm nach außen und rückwärts rollt.

Kleiner runder Armmuskel.

Teres minor.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 13. 14.

S. 240.

Nimmt am Schulterblatte den vordern vom Untergräthmuskel und größern runden Armmuskel übriggelassenen Theil des untern Randes bis zum Halse desselben ein, ist anfangs spitzig, dünne, dann fleischig, doch von unten her eine Strecke lang sehnig, hängt mit dem Untergräthmuskel zusammen, wird im Aufsteigen dicker, und zuletzt wieder dünner und breiter; — setzt sich unterhalb, auch wohl oberhalb fleischig, in der Mitte aber sehnig an den großen Höcker unter der Sehne des Untergräthmuskels fest.

Abweichung.

Läßt sich bisweilen vom Untergräthmuskel oberhalb gar nicht trennen.

⁶) Eine Entdeckung des Herrn von Hagen.

Handwritten note:
Herrn von
Hagen
Mittel
in d. B.
Reisehand

Wirkung.

Wirkt wie der Untergräthmuskel; — unterstützt den größern runden Armmuskel im wechselseitigen Anziehen der Oberarmröhre gegen das Schulterblatt, und des Schulterblattes gegen die Oberarmröhre.

Größerer runder Armmuskel.

Teres major.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 13. 14.

S. 241.

Nimmt auf dem Rücken des Schulterblatts das Stück vom untern Winkel ein, welches der Untergräthmuskel und kleine runde Armmuskel übrig läßt, ist anfangs dünne, fast fleischig, läßt sich nicht ganz rein vom Unterschulterblattsmuskel Untergräthmuskel und kleinern runden Armmuskel trennen, wird dann stärker, lang, flachrundlich, bis er im Aufsteigen gegen die Oberarmröhre allmählig in eine dünne, aber breite Sehne, besonders von unten her, übergeht, sich in zwey Portionen theilt, deren vordere stärkere mit dem großen Brustmuskel und breiten Rückenmuskel zusammenstößt (s. oben), und sich unter dem Unterschulterblattmuskel an die längliche vom kleinen Höcker kommende Erhabenheit des Oberarms festsetzt; deren hintere kleinere, aber dickere, sich fleischig an die hintere Seite eben der Erhabenheit festsetzt. — Zwischen

äßer, als
anfehn
höcker,
en seiner
im fact
hen und
e l.
n Un-
muskel
is zum
dann
sehnig,
wird
e und
erhalb
großen
als fest.
el ober



der vordern Sehne und der Oberarmröhre liegt ein Schleimsack ⁷ (Bursa teretis majoris exterior). Auch findet sich mitten in der Substanz dieses Muskels, wo sich die Fasern der Sehne in zwey Portionen theilen, ein Schleimsack (B. teretis majoris interior); bisweilen statt desselben verschiedene Grübchen.

Wirkung.

Zieht die Oberarmröhre auswärts, und bringt das Schulterblatt und die Oberarmröhre wechseltig aneinander. — Wendet den auswärts gedrehten Oberarm wieder zurück.

Unterschulterblattsmuskel.

Supscapularis.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 15.

S. 242.

Füllt die ganze Aushöhlung der inneren Fläche des Schulterblattes bis zu ihrem Halse aus; kommt bis auf den Raum, an dem die Sehne des großen Sägenmuskels sitzt, vom hintern Rande; ist anfangs unten sehnig, flach, dünne und breit, wird dicker, aber nach der Form des Schulterblattes schmaler.

Eigentlich besteht er aus mehreren Portionen, die sich in drey Ordnungen bringen lassen. — Zur ersten Ordnung

7) Menro Tab. 1. Q.

*Genus 3. von
Portion
Mittels
in N. B.
Behand*

Ordnung gehören fünf Portionen, die von den Rau-
higkeiten der hohlen Fläche des Schulterblatts ohn-
fern seiner Basis kommen, anfangs sehnig und sehr
schmal, dann ein wenig breiter, zuletzt aber wieder
schmäler sind. — Zur zweyten gehören gleichfalls
fünf Portionen, deren vier zwischen, eine aber über
der obern von den vorigen liegt. Sie sind anfangs
breit und dünne, zuletzt aber schmal und dicker, gehen,
jede für sich, in eine ansehnliche Sehne über, und lie-
gen zum Theile unter den vorbeschriebenen Portionen,
mit denen sie zusammen hängen. — Zur dritten
Ordnung⁸ gehören die dünnen Portionen, die in den
Zwischenräumen der vorhergehenden, und unter denen
von der ersten Ordnung liegen. — Alle diese Portio-
nen vereinigen sich endlich zu einem gemeinschaftlichen
Ende, welches sich an die ganze Ausdehnung des klei-
nern Höckers der Oberarmröhre, theils mit einer brei-
ten, starken Sehne, theils mit einem flachen unter-
halb auf die Sehne folgenden Fleische festsetzt. —
Zwischen dieser Sehne und der Gelenkkapsel liegt ein
größerer und ein kleinerer Schleimsack⁹, der oft mit
der Gelenkhöhle Gemeinschaft hat.

Wirkung.

Zieht die Oberarmröhre und das Schulterblatt

8) Ist nirgends abgebildet.

9) Monro Tab. I. D. und N.

E. Muskellehre.

wechselseitig aneinander; rollt den Oberarm innwärts, und zieht ihn, wenn er aufgehoben war, herunter.

Zweybäuchiger Armmuskel.

Biceps Brachii.

Albinus Tab. XIX. Fig. 3. 4. — Camper Dem. anat. Path. Libr. I. Tab. 1. et 2. vortreflich in natürlicher Größe.
S. 243.

Der vordere oder längere Bauch kommt vom Schulterblatt dicht über seiner Gelenkfläche mit einer flachen, schmalen, starken und langen Sehne, als eine Fortsetzung des um die Gelenkfläche liegenden Bandes ¹. Hier liegt bisweilen ein sehniger Ring gerade um den Theil der Sehne, der vom Schulterblatt abgeht; oder die Sehne bildet auch wohl ein mondformiges Stück, das auf der Gelenkfläche liegt, gerade, wie im Kniegelenk ein Mondknorpel auf dem Schienbeine. Diese anfangs breitere, dann sich schmälende Sehne geht durch die Gelenkkapsel über die Oberarmröhre, um vorwärts in der Furche zwischen ihren beiden Höckern hinabzufließen. In dieser Furche wird sie meist etwas härter, und durch ein eigenes Band eingeschränkt, so daß sich ein Schleimsack zwischen ihr und der Oberarmröhre findet ²; indem sie aus selbigem tritt, wird sie allmählig dicker, breiter und fleischig.

1) Weitbrecht Tab. 2. Fig. 8.

2) Monro Tab. I. T.

Der hintere oder kürzere Bauch kommt mit einer anfangs breiten, aber dünnen, und vom Hakenarmmuskel unzertrennlichen Sehne von der Spitze des Hafens am Schulterblatte, wird noch breiter und dicker, und fleischig.

Beide Bäuche sind länglich, spulfförmig, und auswendig mehr als inwendig sehnig; der hintere wird früher oder höher fleischig, aber auch früher sehnig, indem sich der vordere zum Theile unter ihn begiebt. Ueber der Mitte der Länge des Oberarms legen sie sich an einander, vereinigen sich in Schmälerwerden zu einem gemeinschaftlichen Bauche, welcher in der Gegend des Ellenbogengelenks an der äußern Seite etwas früher in eine starke lange Sehne übergeht, welche größtentheils dem vordern Bauche, wie ihre gegen den innern Armmuskel gefehrte Sehne zeigt, gehört, anfangs ein wenig schmaler ist, und so lange einerley Breite behält, bis sie sich endlich ausgebreitet und verdickt, an die hintere Seite des Knorrens der Speiche unter dem Halse derselben festsetzt, wo sich zwischen ihr und dem Knorren ein Schleimsack³ findet, um ihre Reibung in der Vorwärtswendung (Pronation) zu hindern.

Von eben dieser Sehne und dem untern Theile

3) Monro Tab. I. X.

des Fleisches geht noch über dem Ellenbogengelenk eine dünne breite Sehnenhaut ab, die sich auf dem runden Vorwärtswender verdünnet, und in die Sehnenbinde des Vorderarms verliert.

Abweichung.

Bisweilen hängen die Bäuche gar nicht durchs Fleisch, sondern erst durch die Sehne zusammen. — Bisweilen kommt eine kleine Portion von der Oberarmröhre zum längern Bauche; oder eine Portion vom innern Armmuskel, die sich an ihn ohnfertn seiner untern gemeinschaftlichen Sehne festsetzt. In einem weiblichen Körper gieng eine Portion vom längern Bauche ab, und verlorh sich an die Gelenkapsel.

Wirkung.

Beugt das Ellenbogengelenk; bringt die Speiche aus der Pronation in die Supination; zieht den ausgestreckten Arm seitwärts und vorwärts. — Ist aber der Arm auswärts gedreht, so dreht ihn der vordere Bauch inwärts. — Hilft den Arm in die Höhe heben. — Bringt das Schulterblatt und die Oberarmröhre wechselseitig gegeneinander.

*Der Muskel ist ein langer, dichter,
fleischiger, faseriger, fleischiger
mit feinen Nerven besetzt,
den ich in Muskel und Sehne
auf und einem von der Sehne vom
oben zu werden sieht, die
den Muskel ansetzt.*

*Hall. an L. L. Leipzig 1800
p. 153.*

*Seelen Progn. Anat. Top. 1.
Tab. 1808. Taf. 1. u. 2. u. 3.
Nerven und Nerven.*

H a f e n a r m m u s k e l.

Coracobrachialis.

Albinus Tab. XVIII. Fig. 7. 8. scheint doch fast im Verhältniſſe zum zweybäuchigen zu dicke.

Ist oberhalb vom vorhergehenden zweybäuchigen ungetrennlich.

§. 244.

Kommt vorne sehnig ⁴, hinten fleischig, von der Spitze des Hafens am Schulterblatte mit einem dünnen Anfange, ferner von der Sehne des kurzen Bauchs des zweybäuchigen Armmuskels; wenn er von dieser abtritt, wird er schmaler, und geht vor der Mitte seiner Länge in eine Sehne über, an welche sich bis zuletzt von vorne her Fleischfasern federartig anlegen; — und setzt sich sowohl sehnig als fleischig rückwärts schief absteigend an die innere Seite der Oberarmröhre, ohngefähr in der Mitte ihrer Länge fest, so daß seine Sehne mit dem innern Armmuskel sich vereinigt.

A b w e i c h u n g.

Oft sieht man ihn über der Mitte seiner Länge gespalten, und einen Nerven durchlassen, doch nicht immer ⁵; — bisweilen ist er gar doppelt, und nur durch eine gemeinschaftliche Sehne vereinigt.

4) Wo zwischen ihm und der Gelenkkapsel oft ein Schleimsack liegt. *Monro Tab. I. O.*

5) *Hildebrandt in Blumenbachs Medizin. Bibl. 3 Band. 1. Stück*, und in seiner Nervenlehre.

Wirkung.

Zieht das Schulterblatt und die Oberarmröhre wechselseitig gegen einander; entfernt den untern Winkel des Schulterblatts vom Thorax; — hilft den Oberarm aufheben; — zieht die Oberarmröhre gerade als der zweybäuchige gegen die Seite des Körpers; und wenn sie nach außen gedreht ist, dreht er sie innwärts.

Innere Arm muskel.

Brachialis internus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 1. 2.

S. 245.

Umfaßt mit zwey etwas sehnigen Spitzen den untern Theil der Höcker der Oberarmröhre, an denen sich der dreyeckige Armmuskel endigt, mit dem er hier oft zusammenhängt; kommt darauf immer mehr an Dicke zunehmend, doch mehr breit als dick, mit seinem Fleische von der ganzen übrigen innern Seite der Oberarmröhre bis fast zu den Gelenkknöcheln; indem er sich übers Ellenbogengelenk hinabsenkt, wird er allmählig schmaler, und äußerlich, besonders wo ihm der lange Rückwärtsrunder gleichsam eine Furche eindrückt, sehnig, bis er — sich größtentheils an die innere Seite des Kopfes des Ellenbogens festsetzt. — Diese Sehne schießt ebenfalls, wie die vom zwey-

bäuchigen Muskel vor ihrer Einfügung eine dünne Fortsetzung über den langen Rücklingswender zur Sehnenbinde des Vorderarms.

Abweichung.

Sein hinterer Theil ist bisweilen lange vom übrigen Muskel unterschieden; — bisweilen trennt sich eine ansehnliche Portion vom hintern Theile, die unter dem zweybäuchigen absteigt, und sich endlich mit ihm ohnfern seiner Sehne vereinigt. Bisweilen trennt sich eine Portion, die sehnig wird und sich auf dem langen Rückwärtswender verbreitet. — Bisweilen liegt neben dem innern Armmuskel nach außen ein kleinerer Armmuskel, der von der andern Fläche der Oberarmröhre kommt, übers Gelenk geht, und sich an den Ellenbogen festsetzt *.

Wirkung.

Beugt das Ellenbogengelenk, so daß er bald die Oberarmröhre gegen den Ellenbogen, bald umgekehrt den Ellenbogen gegen die Oberarmröhre neigt.

*) Hildebrandt. Ebd.

Dreynbüchiger Armmuskel oder Strecker
des Ellenbogengelenks.

Triceps Brachii.

Albinus Tab. XIX. Fig. 5. 6. 7.

S. 246.

Sein erster langer Bauch kommt vom Schulterblatte gleich unter dessen Halse; seine anfangs flache, glatte, starke Sehne wird allmählig breiter und dicker, bis sie wieder im Fleische, welches hoch anfängt, abnimmt; sein Fleisch ist äußerlich lange sehnig, und liegt zwischen den beyden andern Bäuchen etwas nach hinten.

Sein zweyter, äußerer kürzerer Bauch kommt von der Oberarmröhre von ihrem Halse an, bald höher bald tiefer, längs ihrer äußern Fläche, dicht an den dreyeckigen Armmuskel schließend, ferner längs dem innern Armmuskel herunter, wo er in der Mitte der Länge des Oberarms zum Durchlassen des Speichennerven und einiger Gefäße eine Lücke übrig läßt; ist anfangs dünne, breit, und äußerlich, besonders oberhalb, sehnig, wird stärker, und liegt etwas vorwärts. Dieser Bauch zeigt die meisten Abweichungen; denn bisweilen entspringt er unterbrochen, so daß er mit ein und anderer Sehnenportion vom Knochen kommt, an den Zwischenstellen aber den Knochen gar nicht berührt.

Strecken

om Schul-
ngs flach,
und dicker,
ngt, ab-
g, und
as nach

Bauch
alse an,
fläche,
ferner
r in der
en des
übrig
beson-
e etwas
reichun-
hen, so
om Kno-
Knochen

Sein dritter, innerer kürzester Bauch (Brachialis externus) kommt anfangs sehnig, hinterwärts neben der Sehne des größern runden Muskels, ebenfalls von der äußern Seite und vom vordern und hintern Rande der Oberarmröhre bis zu ihren Knöcheln herunter, ja selbst vom ganzen innern Knöchel; liegt mit dem hintern Rande, der Länge, nach dem innern Armmuskel entgegengesetzt, und ist gleichfalls im Anfange schwach, im Fortgange stärker.

Die Fleischfasern dieser Bäuche stoßen unter spitzigen Winkeln zusammen, doch liegen die Fasern des äußern Bauches gerader, und bilden eine starke Sehne, indem der äußere Bauch schon hoch oben sich mit einer breiten Sehne zeigt, an die sich die Fasern des längen Bauches legen, welcher zu unterst ebenfalls äußerlich sehnig wird.

Inwendig aber ist's umgekehrt, wo der lange Bauch eine Sehne bildet, an die sich die Fasern der kürzern Bäuche legen; der äußere Bauch schmiegt seine Fasern theils ans Fleisch, theils an die Sehnen der beyden andern Bäuche, und wird äußerlich unterhalb ebenfalls immer sehniger, bis auf eine kleine Portion, die sich fleischig an den Ellenbogenknorren fügt, auch wohl bisweilen mit einer Portion von der gemeinschaftlichen Sehne abweicht, um sich hinter ihr abge-



sondert mit einer kurzen dünnen Sehne an den Ellenbogen festzusetzen.

Die gemeinschaftliche Sehne aber wird allmählig schmaler, und setzt sich breit und dick, vorzüglich an den äußern Theil des Scheitels des Knorrens; mit einer Spitze aber geht sie am vordern Theile desselben bis an die scharfe Leiste des Ellenbogens herunter, außer welcher sie noch Fasern vorwärts und rückwärts zur Sehnenbinde des Vorderarms abgiebt. — Zwischen ihr und dem Knorren liegt ein Schleimsack ⁷, der bisweilen noch einen kleinen an jeder Seite neben sich hat ⁸.

Wirkung.

Streckt das Ellenbogengelenk durch Anziehen des Ellenbogens; — ist hingegen der Ellenbogen fest, so bewegt er die Oberarmröhre. — Sein langer Bauch zieht überdies den Arm gegen den Körper und Rücken und das Schulterblatt gegen die Oberarmröhre. — Spannt die Sehnenbinde des Vorderarms.

7) Monro Tab. 2. P.

8) Koch S. 37.

Ellenbogenknorrenmuskel.

Anconeus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 8.

§. 247.

Ist bisweilen eine durchaus unzertrennsche Fortsetzung des dreyhäuchigen Armmuskels, und kein eigener Muskel. — Ist er getrennt, so kommt er mit einer schmalen, starken, nach außen längern Sehne, vom äußern und untern Theile des äußern Knöchels der Oberarmröhre, gleich hinter der gemeinschaftlichen Sehne des dreyhäuchigen Armmuskels, wird fleischig, breiter und dicker, so daß seine obern Fasern kurz sind, und queer liegen, seine untern Fasern länger sind, und schräger absteigen, und zuletzt in eine Spitze sich endigen, mit der sie sich an den äußern Rand des vordern Theils des Ellenbogens festsetzen. Zwischen diesem Muskel und dem Kopfe des Radius, liegt ein Schleimsack.

Wirkung.

Hilft das Ellenbogengelenk strecken.

*Bezeichnet sich bei Kindern durch seine Größe
an der Querschnitten aus
Haller'schen Vorlesungen 1822. P. 64.*

an den Ellen
und allmählig
völlig an
vorn; mit
ile desselben
herunter,
rückwärts
— Zwischen
sack 7,
neben
ehen des
fest, so
r Bauch
Näcken
rt. —



Langer Speichendreher oder Rückwärtswender.

Supinator longus oder besser Brachioradialis 9.

Albinus Tab. XIX. Fig. 16. — Camper Dem. anat. path. Libr. I. Tab. 1. und 2.

§. 248.

Kommt innerhalb sehnig vom untern Theile des vordern Randes der Oberarmröhre; sein spulförmiges Fleisch geht ohngefähr in der Mitte der Länge des Vorderarms in eine flache Sehne über, die sich zuletzt verdünnt an den vordern Theil des untern Endes der Speiche über der Ausbuchtung für die Sehnen des langen Abziehers und kurzen Streckers des Daumens, unter denen sie fortgeht, festsetzt.

Wirkung.

Beugt das Ellenbogengelenk; — dreht die Speiche um den Ellenbogen, und bringt dadurch den Vorderarm sowohl aus der Pronation in die Supination, als vorzüglich aus der Supination in die Pronation.

*Al hat in diesen Vogel.
Halt. all. d. f. d.
1878 N. 153.*

Längerer und kürzerer Handstreckler an der Speiche.

Radialis externus longior et brevior.

Albinus Tab. XIX. Fig. 13. 14. der längere. — Fig. 11. 12. der kürzere.

§. 249.

Beide kommen vom untern Theile der Oberarm-

9) Albinus sagt selbst von ihm Cap. 152. Manum saepe ne convertere quidem in supinum posse visus.

röhre; der längere höher, und anfangs besonders auf der untern Fläche sehnig; der kürzere gleich unter dem längern vom vordern Knöchel selbst, mit einer für ihn, den gemeinschaftlichen Strecken der Finger, den eigenen Strecken des kleinen Fingers, und den äußern Ellenbogenmuskel gemeinschaftlichen Sehne, zwischen welcher und der Speiche ein Schleimsack liegt ¹. — Beyde sind anfangs dünne, nehmen an Fleische zu, werden spulsförmig (doch ist der längere länglicher, der kürzere dicklicher), gehen gegen den Rücken des Vorderarms in flache Sehnen über (der längere früher auf der Seite, die auf dem kürzern liegt, schon über der Mitte der Länge des Ellenbogens; der kürzere, dessen Sehne auch stärker ist, später, mehr nach außen zu), die etwas stärker werden, darauf sich schmälern, um durch eine Rinne am untern Ende der Speiche mit einem obern und untern Schleimsacke umgeben ² durchzugehen; treten auf der Handwurzel von einander, breiten sich verdünnet aus, und endigen sich so, daß sich die Sehne des längern mit einem kleinern unter ihr liegenden Schleimsack an die Wurzel des Mittelhandknochens vom Zeigefinger, die Sehne des kürzern in etwas an denselben Mittelhandknochen des Zeigefingers, hauptsächlich aber an den

1) Monro Tab. I. Z.

2) Monro Tab. 2. RR. und SS.

von seinem ganzen äußern Theile kommt eine starke Sehne, zu der sich eine schwächere vom Ellenbogenknorren gesellt, die anfangs mit der Sehne des kürzern Rückwärtswenders vereinigt absteigt, sich an die Gelenkkapsel der Speiche legt, bald aber auswärts in einen starken sehnigen Ueberzug für die Muskeln am Ellenbogen, vom äußern Speichenmuskel an bis zur scharfen Leiste des Ellenbogens hin, sich verliert. — Nach innen zu geht diese Sehnenbinde in ansehnliche Fortsätze über, die wie Fächer zwischen den Muskeln liegen. Eins davon liegt zwischen dem äußern kürzern Speichenmuskel und dem gemeinschaftlichen Fingere strecker; dieses spaltet sich nach unten zu, um den Strecker des kleinen Fingers zwischen sich aufzunehmen; ein anderes zwischen dem gemeinschaftlichen Fingere strecker und dem äußern Ellenbogenmuskel; ein anderes zwischen eben dem äußern Ellenbogenmuskel und Knorrenmuskel. — An dieser Sehnenbinde und ihren Fasern, die nach unten zu breiter werden, bis sie sich im Dünnerwerden verlieren, liegen Fleischfasern von den genannten Muskeln.



mit einem
 eile auch das
 n sich an dem
 ers als des
 ine schlank
 ab, welche
 unter die
 Durchaus
 chen des
 r längere
 ts, und
 te aus-
 e Hand
 er Län-
 niger
 arms,
 egre und

Äußerer Handstrecker am Ellenbogen

Ulnaris externus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 15. — Camper Dem. anat. path. Tab. I. Fig. 3. Z. F. A.

§. 251.

Kommt von der äußern Vorderarmbinde über dem Strecker der Finger, und vom Ellenbogen unter dessen Knorren; sein Fleisch ist anfangs schmal, dünne, darauf breiter, und dicker, zuletzt wieder allmählig dünner, verwandelt sich äußerlich früher, unter der Mitte der Länge des Ellenbogens, in eine Sehne, die anfangs breiter, dann schmaler, sich in die mit Sehnenfasern geschlossene Rinne am untern Ende des Ellenbogens legt, flacher wird, durchs äußere Armband dringt, und sich an den äußern Theil des Höckers an der Wurzel des Mittelhandknochens vom kleinen Finger festsetzt.

Abweichung.

Schickt bisweilen eine dünne Sehne zum kleinen Finger, die sich der Sehne seines Streckers beyfügt.

Wirkung.

Beugt die Hand auswärts und rückwärts und hilft sie sowohl vorwärts als rückwärts wenden.

Ge

Gemeinschaftlicher Fingerstrecker.

Extensor communis Digitorum Manus.

Albinus Tab. XX. Fig. 1. Hist. Musc. Hom. Icon. 4.
vortrefflich wegen der Sehnenendigung dieses Muskels. —
Camper Dem. anat. path. Tab. I. Fig. 3. T. U. V.

S. 252.

Kommt fleischig von der äußern Vorderarmbinde gleich unter dem Knöchel der Oberarmröhre, nimmt im Fortgange allmählig zu, und theilt sich auf dem Rücken des Vorderarms bald in drey Portionen, die allmählig schlanker werden, und bald höher, bald tiefer, gemeiniglich die mittelfte am frühesten, in flach rundliche Sehnen übergehen. — Diese Sehnen, von denen die schwächste dem Zeigefinger, die stärkere dem Mittelfinger, die stärkste dem Ringfinger zu gehören pflegt, laufen in einer Rinne am untern Ende der Speiche, und in einem eigenen sehnigen Canal an der Handwurzel eingeschlossen, haben einen Schleimsack ⁴ um sich liegen, fahren darauf auseinander, werden auf dem Rücken der Hand breiter und flacher, spalten sich (die für den Zeigefinger ausgenommen), vereinigen sich wieder, hängen auch durch Mittelportionen mannigfaltig untereinander zusammen, werden schmaler aber stärker, bis sie an die Finger gelangen, wo sie sich ausbreiten, verdünnen, zur Gelenkkapsel Fasern abschicken, den ganzen Rücken

⁴) Monro Tab. 2. X.

S. Muskellehre.

des ersten Gliedes der Finger überziehen, sich mit den sehnigen Ausbreitungen der spulsförmigen Muskeln und Mittelhandmuskeln (Interossei) vereinigen, mit ihnen bis zum Nagelgliede laufen, — und sich vorzüglich an die Wurzel des mittlern Gliedes festsetzen. — Am Zeigefinger nämlich stößt an der Speichenseite der Spulmuskel allein, am mittlern und vorletzten Finger der mit dem Mittelhandmuskel verbundene Spulmuskel; an der Ellenbogenseite hingegen stoßen zu allen drey Sehnen dieses Muskels die Mittelhandmuskeln.

A b w e i c h u n g e n .

Bisweilen ist er gleich anfangs in vier Portionen getheilt; — bisweilen bildet er später noch eine vierte Sehne für den kleinen Finger, die sich mit dessen Strecker vereinigt; — bisweilen spaltet sich diese vierte Sehne, und geht mit zweyen Theilen zum kleinen, mit dem dritten zum vorletzten Finger.

W i r k u n g .

Streckt das mittlere und Nagelglied des Zeige-, Mittel- und vorletzten Fingers; — unterstützt die Spulmuskeln und Mittelhandmuskeln in der Streckung des ersten Gliedes, und bey'm Auswärtziehen. — Wirkt er stark, so entfernt er die Finger voneinander — Neigt auch die Handwurzel nach außen.

*Sil. muller. fol. de
vocali. finger. n. n.
figura. bylonfen
Hall. Lit. Febr. 1808 N. 153.
Il muscolo estensore dell' anulare
correa solitaria dal dito fino alla
base parte superiore dell' ulna,
Quadr. Prof. di Bologna
auf in Cabanis
zu Wien.
aus Amoretti della
Ladomanzia. Milano. 1808 S. 163.*

Eigener Streckter des kleinen Fingers.

Extensor proprius Digiti minimi.

Albinus Tab. XX. Fig. 1. *Extensor proprius auricularis.* — Camper Dem. anat. path. Tab. I. Fig. 3. W. X. Y.

S. 253.

Hat mit dem gemeinschaftlichen Fingerstreckter für die drey übrigen Finger einen gleichen Anfang und Fortgang, nur ist er dünner, geht auch unter dem Bande an der Hand in einem eigenen Canal mit einem Schleimsacke⁵ umgeben, mit seiner Sehne durch, welche sich spaltet, flacher wird, wieder sich vereinigt, und am kleinen Finger sich auf gleiche Art wie die Sehne des gemeinschaftlichen Streckters der drey andern Finger endigt.

Wirkung.

Streckt den kleinen Finger, und zieht ihn von den andern ab. — Hilft auch die Hand beugen, und etwas rückwärts neigen.

Langer Abzieher des Daumens⁶.

Abductor longus Pollicis Manus.

Albinus Tab. XX. Fig. 18. 19. — Camper Tab. I. Fig. 3. G. H.

S. 254.

Kommt a) sehnig von der scharfen Leiste des

⁵) Monro Tab. 2. Y.

⁶) Bell p. 174. nennt ihn *Extensor primus Pollicis*, und

Ellenbogens über der Mitte ihrer Länge unter dem kurzen Rückwärtsrunder; ferner b) fleischig von der Membran zwischen den Vorderarmknochen; c) ebenfalls fleischig von der Speiche unter dem kurzen Rückwärtsrunder; die von den Knochen kommenden Fasern stoßen im Absteigen unter spitzen Winkeln zusammen, und bilden einen anfangs breiten, dünnen, dann stärker werdenden, zuletzt wieder abnehmenden Bauch, und schlagen sich um die Speiche bis zur Wurzel des Mittelhandknochens vom Daumen.

Bleibt er einfach, so wird er bis zum Ende schmaler, und geht in eine flache, anfangs breitere, dann schmälere Sehne über, die in einem vom untern Ende der Speiche und Bändern gebildeten Canal mit einem Schleimsacke ⁷ umgeben absteigt, — und sich in das Höckerchen des obern und innern Theils des Mittelhandknochens vom Daumen festsetzt, außer einer kleinen Portion, die zum Anfange des kurzen Abziehers des Daumens geht. — Spaltet er sich aber bald anfangs, so geht der untere stärkere Muskel mit seiner Sehne zum Mittelhandbeine des Daumens, außer einer Portion, die er zuweilen an den obern Muskel abgiebt; der obere Muskel aber

Die zwey folgenden secundus und tertius, weil der dünnere ohne Abziehung nicht gestreckt werden kann.

7) Monro Tab. 2. Q.

geht bisweilen an das nämliche Mittelhandbein des Daumens; bisweilen geht er an die innere Seite des größern vieleckigen Beins, außer der kleinen zum kurzen Abzieher des Daumens gelangenden Portion; bisweilen geht er gespalten mit der stärkern Sehne an das größere vieleckige Bein und an den kurzen Abzieher des Daumens, mit der schwächern zum Mittelhandknochen des Daumens.

Bisweilen geht die Sehne, wenn sie durch den mit einem Schleimsacke umgebenen Canal gedrungen ist, in einen zweyten fleischigen Bauch über, der wohl die Hälfte des kurzen Abziehers beträgt und sich ans erste Daumengelenke, gerade wie der äußere kurze Abzieher festsetzt. Dieser zweyte Bauch stellt folglich den äußern kurzen Abzieher vor.

Wirkung.

Streckt den in die Hohlhand gezogenen Mittelhandknochen des Daumens. — Zieht den Daumen von den Fingern ab, darauf gerade vorwärts und zuletzt auswärts; — unterstützt den kleinen Abzieher mit der Portion, die er an ihn abgiebt; — beugt die Handwurzel vorwärts und etwas inwärts.

Kleinerer Streckter des Daumens.

Extensor minor Pollicis manus.

Albinus Tab. XX, Fig. 23. — Camper Tab. I. Fig. 3.
I. K. L.

§. 255.

Kommt fehnig, gleich unter dem langen Streckter des Daumens, von der scharfen Leiste des Ellenbogens, und der Membran zwischen den Vorderarmknochen, bisweilen nicht vom Ellenbogen, sondern von dieser Membran und der Speiche; ist anfangs dünne, dann spulförmig, geht in eine Sehne über, an die sich die Muskelfasern federartig anlegen, ist übrigens dünne, flach und lang, läuft entweder durch den nämlichen Canal oder mit dem langen Abzieher durch einen abgesonderten Canal an der Speiche zum Rücken des Daumens, wird im Ausbreiten dünner, und mit der Sehne des größern Streckters gegen das Ende des Mittelhandknochens vom Daumen vereinigt; überzieht das erste Glied vom Daumen, und setzt sich an die queere Erhabenheit am obern Ende des Nagelgliedes des Daumens fest.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen ist er sehr dünne, und gleichsam nur ein Theil des langen Abziehers; — bisweilen geht er nicht bis ans Nagelglied, sondern hört am ersten an der Sehne des größern Streckters des Daumens auf.

Wirkung.

Streckt beyde Glieder des Daumens und beugt sie nach außen; oder nur eins, im Fall er nicht ans Nagelglied gelangt; — beugt den Mittelhandknochen des Daumens nach vornen und außen, und dadurch auch die Hand auswärts.

Größerer Strecker des D^aumens.

Extensor major Pollicis Manus.

Albinus Hist. Musc. Icon. 4. und Tab. XX, Fig. 22.

Camper Tab. I. Fig. 3.

S. 256.

Kommt halbsehnig oder ganz fleischig, anfangs am breitesten, höher als der kleinere Strecker vom Ellenbogen hinter dem langen Abzieher, ferner unter dem kleinern Strecker von der Membran zwischen den Vorderarmknochen, wird allgemach stärker, drauf schmaler, und geht federartig in eine starke fast runde Sehne über, schreitet schief durch die mittlere Rinne an der Speiche in einem eigenen sehnigen Canal, und von zwey Schleimsäcken ⁸ umgeben, über den Rücken der Handwurzel, wird immer flacher, geht bisweilen in Fasern auseinander, vereinigt sich mit dem kleinern Strecker, oder bleibt auch von ihm getrennt, und setzt sich ans Gelenk und an die Wurzel des Nagelgliedes

8) Monro Tab. 2. U. und V.

des Daumens, nachdem er allein oder mit dem kleinern Strecker eine Sehnenhaut von der einen Seite vom langen Abzieher des Daumens ⁹ erhalten, von der andern Seite zum Gelenke des Mittelhandknochens mit dem ersten Gliede des Daumens ums Sehnenbeinchen abgegeben, und eine andere vom kurzen Deu-ger ¹ erhalten hat.

Wirkung.

Streckt beyde Glieder des Daumens, und beugt sie vorwärts, das Nagelglied auch nach außen. — Die Handwurzel und den Mittelhandknochen des Daumens beugt er wie der kleinere Strecker, aber weniger vorwärts, hingegen mehr auswärts.

Strecker des Zeigefingers.

Indicator.

Albinus Tab. XX. Fig. 12. Hist. musc. Icon. 4. — Camper Tab. I. Fig. 3. M. N. O.

S. 257.

Kommt, wie der größere Strecker des Daumens, vom äußern Theile der scharfen Leiste des Ellenbogens, hat auch einen ähnlichen Verlauf, nur daß er kleiner ist und hinter ihm liegt. Er geht durch eine gemeinschaftliche Rinne der Speiche, und einen mit dem

9) Albin. Hist. Musc. Icon. I. K. I.

1) Albin. Hist. musc. Icon. 4. m.

227 231

Streckter der übrigen Finger gemeinschaftlichen Sehnen canal, legt sich an dessen Sehne, die dem Zeigefinger gehört, und setzt sich mit ihr vereinigt an zweyte Glied des Zeigefingers.

Abweichungen.

Bisweilen geht seine Sehne gespalten theils zum Zeigefinger, theils zum Mittelfinger. — Bisweilen ist das Fleisch schon hoch gespalten, doch so, daß sich dessen dünne Sehnen ohnfern des Zeigefingers wieder vereinigen.

Wirkung.

Wirkt wie der dem Zeigefinger gehörige Theil am gemeinschaftlichen Streckter der Finger, nur zieht er ihn etwas mehr rückwärts gegen den Mittelfinger.

Seltener kurzer Streckter des Zeige- oder des Mittelfingers.

Extensor brevis digiti indicis vel medii.

Am Mittelfinger Albin. annotat. academ. Libr. 4. cap. 6. S. 28. Tab. 5. Fig. 3.

§. 258.

Nur selten findet sich ein kurzer Streckter für den Zeige- oder Mittelfinger ² auf dem Rücken der Hand,

2) Petzsch in Haller's Samml. anat. Diss. Vol. 6. p. 771. Ed Sandifort Exercit. acad. p. 93. Ebd. de Extensore proprio digiti medii manūs. in dem Obs. anat. path. Lib. 4. Cap. 4. pag. 39.

der dem auf dem Rücken des Fußes, für die Zehen alle-
mahl vorhandenen, ähnlich ist. — Man sah ihn spul-
förmig am untern Ende der Speiche von der Rinne
kommen, in der die Sehne des gemeinschaftlichen
Streckers der Finger liegt, und sich zur Seite jener
Sehne ans erste Glied des Mittel- oder Zeigefingers
setzen.

I n n e r e W o r d e r a r m b i n d e .

E. Barth Muskellehre Tab. XII. recht schön.

S. 259.

Vom innern oder hintern Knöchel der Oberarm-
röhre kommt, wie vom äußern Knöchel, eine die
Muskeln überziehende Sehnenbinde, die nach innen
zu Fächer bildet, und mit der andern vom Knorren
und der scharfen Leiste des Ellenbogens kommenden
sich vereinigt. — Eins von ihren Fächern legt sich
an den runden Vorwärtswender und den innern
Speichenmuskel; ein zweytes zwischen diesen Spei-
chenmuskel und den Handsehnenspanner; ein drit-
tes zwischen den Handsehnenspanner und den gespal-
tenen Muskel; ein viertes zwischen den gespalte-
nen und innern Speichenmuskel. Ein anderes
dünnes zwischen die drey Anfänge des innern Ellen-
bogenmuskels; ein anderes zwischen den Spalter
und den gespaltenen Muskel, — so daß fünf der ge-

nannten Muskeln (außer dem innern Speichenmuskel) mit ihren Fleischfäden von dieser Sehne selbst, theils von ihrer Ausbreitung, theils von ihren Fäsern kommen.

Innerer Ellenbogenmuskel oder Handbeuger am Ellenbogen.

Ulnaris internus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 10. II. — Camper Tab. I. Fig. 2. L. M. Tab. 2. Fig. 1. NN.

§. 260.

Kommt mit drey schmalen Enden, mit dem ersten Ende vom Kopfe der Sehnenbinde des Vorderarms; mit dem zweyten, kleinen, fast fleischigen, noch in etwas von jener Sehnenbinde und dem innern Knöchel der Oberarmröhre selbst; mit dem dritten fleischigen vom hintern Rande des Ellenbogenknorpels ohnferrn der Sehne des dreybäuchigen. Diese Anfänge werden dicker, und vereinigen sich bald zu einem Bauche, der allmählig zunimmt, dann aber wieder abnimmt, bis er auf der innern Fläche früher, als auf der äußern, in eine Sehne übergeht, zu der noch fast bis zuletzt von der äußern Seite des Ellenbogens Fleischfasern stoßen, so wie auch die Sehne selbst immer stärker wird (bisweilen kommt er bloß von der Sehnenbinde); durchaus aber ist er mehr breit als dick, und lauft längs dem ganzen Ellenbogen zur

Hand hinab. Seine Sehne fügt sich so an den runden Handwurzelknochen, daß sie mittelst desselben auch an den Mittelhandknochen des kleinen Fingers gelangt, und überdies starke sehnige Bündel zu den Bändern der Hand schiebt. Zwischen dieser Sehne und dem runden Knochen liegt ein Schleimsack ³; desgleichen zwischen ihr und den Bändern der Handwurzel ⁴.

Wirkung.

Beugt die Handwurzel. Auch hebt er anfangs die Handwurzel nach innen und schief rückwärts, bis er sie in die Pronation bringt.

Handsehnenspanner.

Palmaris longus.

Albinus Tab. XX. Fig. 26. — Camper Tab. I. Fig. 2.
S. 261.

Kommt ebenfalls von jener Sehnenbinde, geht in einen kleinen dicker werdenden Bauch über, der bald wieder langsam abnimmt, sich an eine lange, dünne, flache, schmale Sehne heftet, die schräg gegen die Mitte der Handfläche hinabsteigt, mit dem innern Bande der Hand, von dem sie einen Theil erhält, vermischt wird, sich in der Handfläche ausbrei-

3) Monro Tab. 1. O.

4) Monro Tab. 2. Z.

tet, und sich mit der hier vorhandenen sehnigen Ausbreitung gleichsam in vier breite Hauptbündel für die vier Finger außer dem Daumen vertheilt, die durch feinere Queerfasern⁵ unter einander zusammenhängen, gegen die Finger hin aber sich ausbreiten, feiner werden, zuletzt gleichsam zweyhörnig die Sehne des gespaltenen Muskels und Spalters umfassen, und sich an die Querbänder zwischen den Wurzeln der Finger und mit einem kleinen Theile an die Knochen der Mittelhand verlieren, und zum Anfange des kurzen Abziehers des Daumens etwas beytragen.

A b w e i c h u n g e n.

Bisweilen fehlt er gänzlich an einem oder an beyden Armen; doch ist die Sehnenhaut in der Handfläche da, zum Beweise, daß er sich mit seiner Sehne in diese Sehnenhaut verliert und sie nicht erzeugt. — Bisweilen ist hingegen das Fleisch sehr viel länger, als gewöhnlich, und reicht bis zur Handwurzel herab. — Entspringt oben mit einer sehr dünnen Sehne, die unter der Hälfte des Vorderarms fleischig wird, und gleichsam den umgekehrten Muskel vorstellt. Das Fleisch befestigt sich an die Sehnenhaut der Handfläche⁶. Bisweilen kommt von innern Knöchel der

5) Weitbrecht S. 47. macht eigene Bänder aus ihnen, die er Ligamentula palmaria transversa nennt.

6) Behrend's.

Oberarmröhre eine Sehne, die am Vorderarme fleischig wird, und sich mit ihrer Sehne an den Ellenbogen, oder an die innere Fläche der Handwurzel erstreckt. — Bisweilen ist er oben und unten lange sehnig, in der Mitte aber fleischig.

Wirkung.

Spannt die sehnige Ausbreitung in der Handfläche, und hilft die Hand beugen. Seine Sehne vertritt zugleich in der Hand die Stelle eines Bandes oder einer Binde für die Sehnen und Gefäße.

Ungewöhnlicher Beuger des Handgelenks.

Bisweilen kommt ein ungewöhnlicher Beuger des Handgelenks sehnig von der innern Fläche des innern Handwurzelbandes, läuft dann fleischig neben den Sehnen des gespaltenen Muskels, und setzt sich neben dem kleinen Höcker an den Ellenbogen. Außer daß er die Hand beugt, spannt er das eigene Band der Handwurzel.

I n n e r e r S p e i c h e n m u s k e l.

Radialis internus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 9.

§. 262.

Kommt, vor dem Handsehnenspanner liegend, gleichfalls vom Anfange jener Sehnenbinde, und zuweilen mit einer, oder auch wohl mit mehreren seh-

nigen Portionen von der Speiche mit dem gespalte-
 nen Muskel; steigt am Ellenbogen schräg mit seinem
 länglich spulförmigen, doch mehr breiten als dicken
 Bauche hinab, geht im Abnehmen, besonders auf der
 Außenseite, vor der Mitte des Vorderarms in eine
 Sehne über, welche anfangs breit, aber dünne ist, dar-
 auf schmaler und dicker, endlich rundlich wird, durch
 einen eigenen Sehnencanal am Kahnbeine und am
 größern vieleckigen Beine (wo sie dicht, hart und
 rundlich wird) tritt, und sich in etwas ans größere
 vieleckige Bein, vorzüglich aber an den obern Theil
 des Mittelhandknochens des Zeigefingers ausbreitend
 und verdünnend festsetzt.

Wirkung.

Beugt die Handwurzel. — Ist bey rückwärts
 gewendeter Hand die Speiche unbeweglich, so hebt er
 sie anfangs ein wenig vorwärts nach innen, und dar-
 auf gerade nach innen, endlich rückwärts in die Höhe.
 — Ist die Speiche beweglich, so unterstützt er die
 Vorwärtsdrehung des Vorderarms.

Rundlicher Vorwärtswender.

Pronator Teres.

Albinus Tab. XIX, Fig. 19. 20. — Camper Tab. 1. Fig.
 2. DE. Tab. 2. Fig. 1. F. Fig. 2. I.

§. 263.

Kommt vom innern und obern Theile des hin-

tern Knöchels der Oberarmröhre von der gemeinschaftlichen Sehnenbinde, ferner mit dem innern Speichenmuskel von einem ihrer Fächer, und von der Sehnenhaut, die den gespaltenen Muskel von außen bedeckt.

Er ist kürzer und schräger liegend, als der innere Speichenmuskel, übrigens im Anfange am breitesten, drauf etwas dicker, dann schmaler, überhaupt aber mehr breit als dick, geht äußerlich, in der Mitte seiner Länge, in eine Sehne über, an welche sich fast bis zuletzt Fleischfasern legen, — und die sich ausbreitend an die Rauigkeit auf der Mitte des Bogens der Speiche festsetzt.

Abweichungen.

Bisweilen wird er durch eine vom Ellenbogen gleich unter dem innern Armmuskel kommende Portion verstärkt, die anfangs sehnig, dünne und breit, dann fleischig und dicker werdend sich an seine innere Seite legt. — Bisweilen bildet er zwey Sehnen, nämlich noch eine höher liegende. — Bisweilen liegt unter ihm noch ein kleiner Vorwärtswender ⁶. Bisweilen zeigt die Sehne, die vom Oberarmbein kommt, wo sie anfängt fleischig zu werden, ein Sehnenknöchelchen.

Wir

⁶) Hildebrandt am ang. Orte.

Wirkung.

Dreht die Speiche, und mit ihr die Hand um den Ellenbogen in die Pronation. — Ist die Speiche nun so gedreht, oder wird sie vom Drehen zurückgehalten, so unterstützt er die Beugung des Ellenbogengelenks, besonders wenn es schon etwas gebogen ist.

Gespaltener Fingerbeuger.

Sublimis.

Albinus Tab. XX. Fig. 4. 5. Hist. Musc. Icon. I. 2. 3. wegen der Sehne.

S. 264.

Kommt 1) gleichfalls vorzüglich vom Anfange jener Sehnenbinde; 2) vom Bande zwischen dem untern Theile des hintern Knöchels, und dem hintern Theile des obern Endes des Ellenbogens unter dem mondformigen Ausschnitte; 3) vom obern und hintern Theile der Rauigkeit des Ellenbogens, an die sich der innere Armmuskel setzt. Dieser Theil des Muskels wird darauf breiter und dünner, nimmt bisweilen noch eine schmale sehnige Portion von jener Rauigkeit zu sich, wird darauf dicker, und vereinigt sich 4) rückwärts mit der halbsehnigen, breiten und dünnen, von der Speiche unter dem kurzen Rückwärts- wender und runden Vorwärts- wender kommenden zweyten Hauptportion. — Er theilt sich dann auf

E. Muskellehre

U

der Mitte der Länge des Vorderarms in vier Portionen, die sich schmälernd in dicke rundliche Sehnen übergehen. — Von diesen Portionen zeigt sich zuvorderst die zweite, dann die dritte, dann die erste, zu hinterst die vierte. — Die zweite und dritte Portion zeigen sich höher sehnig, als die fast bis ans Armband fleischige erste und vierte.

Diese vier Portionen gelangen gemeinschaftlich durch einen aus den Handwurzelknochen und Bändern gebildeten Canal, wo sie nicht nur unter sich, sondern auch mit der Sehne des Spalters, mit dem langen Beuger des Daumens, und dem Canale selbst durch eine schlüpfrige gefäßreiche Haut, wie durch eine Scheide, umzogen werden, in die Handfläche; treten auseinander, begeben sich zu den vier Fingern, nach deren Größe ihre Dicke eingerichtet ist, werden härter, und durch eigene starke halbknorpelige Bogen auf der Mitte des ersten und zweiten Gliedes, an den übrigen Theilen aber, so wie auf den Gelenken, durch weichere Häute mit der Sehne des Spalters in ihrer Lage erhalten, für die durchgehende Sehne des Spalters gespalten und setzen sich mit zwei zugespitzten, unter der Sehne des Spalters wieder zusammenkommenden, Enden an das mittlere Glied aller Finger fest.

Diese Spaltung, von der sich schon frühe eine Spur zeigt, geschieht so, daß anfangs die Sehne des

gespaltenen Muskels sich um die Sehne des Spalters zu beyden Seiten legt, sie umfaßt, und dann in zwey Zipfel gespalten sich unter sie herumschlägt, auch wohl durch ein sehniges Bändchen mit ihr zusammen hängt, daß sie während dem Durchtreten derselben unten durch kreuzende Fasern wieder sich vereinigt, und zuletzt wieder gespalten, mit zwey auseinander fahrenden und spitzigen Zipfeln sich endigt.

Die Sehnen, sowohl des Gespaltenen als des Spalters, liegen auf dem ersten und zweyten Gliede der Finger ringsum frey und abgesondert, außer daß sich an sie vom Knochen des ersten Gliedes ein dünnes Gefäßbändchen 7, entweder ein doppeltes, für jeden Zipfel nämlich eines, oder ein einfaches, aber sich bald für beyde Zipfel spaltendes, oder ein einfach bleibendes, oder ein dreyfaches begiebt. Ferner geht ein kurzes, aber starkes, auch wohl ringsum freyes Gefäßbändchen, vom vordern Theile des ersten Gliedes an den mittlern Theil zwischen den drey Zipfeln, kurz bevor sie übers Gelenke zum zweyten Gliede gelangen.

Abweichung.

Bisweilen schiebt der gespaltene Muskel eine und andere Portion mit einer dünnen Sehne zur Sehne des Spalters.

7) Weithrecht Tab. V. Fig. 17. 18. Noch schöner bey Barth Muskellehre Tab. 13. fig. 2.

vier Portio-
liche Sehnen
at sich zuwor-
Die erste, zu
ritte Portion
ans Armband
einschäftlich
nd Bändern
h, sonderg
in langen
lbf durch
durch eine
liche; treten
ngern, nach
erden häu-
Bogen auf
, an den
en, durch
in ihrer
des Spal-
gespizten
nmenten
Finger
spüle ein
Sehne des



Wirkung.

Beugt das erste und zweyte Glied der vier Finger, und zieht die Finger aneinander. — Wird die Hand nicht befestigt, so bringt er sie endlich in die Pronation.

Spalter oder spaltender Fingerbeuger.

Profundus.

Albinus Tab. XX. Fig. 2. 3. Albin, Hist. Musc. Icon. 1. 32. und Icon. 2.

S. 265.

Kommt a) von der ganzen Fläche des Ellenbogens, unter dem Knorren, und unter der Anfügung des innern Armmuskels; b) von der Membran zwischen den Knochen des Vorderarms; c) in etwas von den Fächern jener Sehnenbinde; ist anfangs dünn und schmal, wird allmählig breiter und dicker, darauf aber wieder dünner und schmaler, geht früh in eine flache, äußerlich aus vielen kleineren, inwendig aber nur aus vier Haupttheilen bestehende Sehne über. Diese vier Hauptsehnen werden, nach unten zu, immer deutlicher abgesondert, gehen, der Größe der Finger, denen sie gehören, angemessen, durch die Ausbuchtung der Handwurzel, wo sich zwischen ihnen, dem untern Ende der Speiche, nebst der Gelenkkapsel der Handwurzel ein Schleimsack * findet; sind hier rund.

8) Monro Tab. I. m.

lich, durch eine sichtliche Linie gleichsam in zwey Hälften getheilt; hängen unter sich, mit dem Canale der Handwurzel und den Sehnen des gespaltenen Muskels und des langen Daumenbeugers zusammen; dienen den Spulmuskeln zur Anlage; treten von einander, und laufen flachwerdend auf der innern Seite der Finger, mit einer halbknorpeligen Scheide umschlossen, dringen etwas geschmälert durch die Sehnen des gespaltenen Muskels, um sich wieder ausbreitend an die Rauigkeit der Wurzel des Nagelgliedes festzusetzen. — Innerhalb der Scheide, worin sie nebst der Sehne des Spalters frey und abgesondert liegen, erhalten sie nicht nur von der Vereinigungsstelle der Zipfel des gespaltenen Muskels ein oder zwey Gefäßbänder ⁹, sondern auch ein kurzes Bändchen ¹ vom vordern Theile des zweyten Gliedes.

A b w e i c h u n g e n .

Bisweilen sind die vier Hauptportionen sehr früh abgetheilt. — Bisweilen gehen Sehnen von der für einen Finger allein bestimmt scheinenden Portion zur Sehne einer andern Portion herüber. Eine sehr kleine, rundliche, fleischige Portion entspringt an der Hälfte der Länge der Speiche, neben dem Flexor

9) Weitbrecht Fig. 18. l. a.
 1) Weitbrecht Fig. 17. und 18. kk. — Bey Barth Tab. 13. Fig. 2. noch deutlicher.

der vier Fin.
 Wird die
 endlich in die
 ger beuger.
 Musc. Icon.
 5 Ellenbo-
 führung des
 an zwischen
 als von den
 3 dünn und
 er, darauf
 lich in eine
 endig aber
 hne über.
 zu, immer
 der Finger,
 die Ausfüh-
 hnen, dem
 affapfel der
 hier runde



Rechnungs.
pollicis, wird sehr dünnsehnig, und geht zu der Sehne des Zeigefingers.

Wirkung.

Beugt das Nagelglied der vier Finger, zieht sie aneinander, beugt dadurch endlich selbst die Hand, und bringt sie in die Pronation.

Wunderfüßler Spulmuskeln der Hand.

Lumbricales.

Albin. Ebenb. — Camper Tab. I. Fig. 2. Tab. 2.

S. 266.

Sind von der Sehne des Spalters unzertrennlich.

Kommen mit ihrem Fleische von der in die hohle Hand tretenden Sehne des Spalters. Der erste für den Zeigefinger bloß von der Speichenseite der Sehne des Spalters für den Zeigefinger; die drey übrigen zwischen je zwey Sehnen des Spalters (folglich der zweyte für den Mittelfinger, sowohl von der Sehne des Spalters für den Zeigefinger, als von der Sehne für den Mittelfinger, u. s. w.), oder auch bloß von der Speichenseite der Sehnen des Spalters für ihren Finger. — Sie sind anfangs schmal, dünne, darauf dicker, nach der Stärke der Finger an Dicke verschieden, zuletzt wieder schmaler, und begleiten jene Sehnen übers zwente Glied, an welches sie ein eigenes Bändchen² befestigt, bis zum vorder-

sten Theile der Finger, — und setzen sich mit ihren dünnen, sich ausbreitenden Sehnen, so an die Finger, daß die Sehnen für den kleinen, vorletzten und Mittelfinger mit der breiten Sehne der innern Mittelhandmuskeln sich vereinigen, der für den Zeigefinger hingegen mit der Sehne der Streckter des Zeigefingers. Zwischen den Sehnen dieser und der Mittelhandmuskeln finden sich bisweilen Schleimsäckchen 3.

Abweichungen.

Bisweilen geht von der Sehne des Spalters vor Erzeugung des Spulmuskels eine dünne sehnige Portion ab, die sich im Verlaufe zu den Spulmuskeln schlägt. — Bisweilen spaltet sich der dritte dieser Muskeln, und geht mit einer Portion an die Ellenbogenseite des Mittelfingers, mit der andern an die Speichenseite des vorletzten Fingers; der vierte Spulmuskel an die Ellenbogenseite des dritten Fingers, so daß der Mittel- und vorlezte Finger an jeder Seite einen solchen Muskel haben. — Bisweilen hat der Mittelfinger zwey, der vorlezte keinen Spulmuskel 4. — Bisweilen fehlt der vierte.

Wirkung.

Beugen das leicht bewegliche erste Glied schief

2) Weitbrecht Fig. 17. f.

3) Jancke pag. 14.

4) Camper's Abbildung.

geht zu der
ger, zieht sie
die Hand,
Hand,
ab. 2.
ertrennlich,
in die hohle
Der erste
henseite der
die drei
alters (folgt
wohl von
r, als von
oder auch
Spalters
schmal
der Finger
mäler, und
anwächst
im vorder-

vorwärts; — helfen im Gegentheile auch das mittelste und vorderste Glied strecken, wenn nämlich die Sehnen des Spalterß hinreichend fest gehalten werden. — Wirken einige Mittelhandmuskeln mit ihnen zusammen, so ziehen sie die Finger zur Seite,

Langer Beuger des Daumens.

Flexor longus Pollicis manus.

Albinus Tab. XX. Fig. 21.

§. 267.

Kommt gleichsam als Spalter (Profundus) des Daumens von der Speiche, und der Membran zwischen den Vorderarmknochen, fast bis zum viereckigen Vorwärtswender herunter, bisweilen auch noch mit einer anfangs sehnigen Portion vom Ellenbogen gleich unterm innern Armmuskel; ist anfangs spitzig, dünne, bisweilen gespalten, dann dicker und breiter, bis er wieder abnimmt, und in eine Sehne übergeht, — die sich äußerlich früh gegen den Ellenbogen hinliegend zeigt, wenn sie vom Fleische abtritt, allmählig schmaler und rundlich wird, an der Speiche zwischen sich und der Gelenkkapsel der Handwurzel einen Schleimsack^s liegen hat, mit dem Spalter durch die Ausbuchtung der Handwurzel tritt, wo sich noch ein Schleimsack um sie findet, über den Mittelhandknochen des

5) Monro Tab. I. 1.

Daumens, und zwischen den Sehnenbeinchen durch-
läuft, mittelst knorpelig sehniger Bogen am ersten
Glieder eingeschränkt wird, sich allmählig schmaler
aber runder zeigt, ebenfalls wie die Sehne des Spal-
ters durch eine Linie gleichsam in zwey Hälften ge-
schieden ist — und sich nach einer Anheftung an die
Gelenkkapsel ans vordere Glied des Daumens festsetzt,
von welchem sie kurz zuvor ein Schleimbändchen er-
hielt 6.

Abweichungen.

Man sah ihn doppelt. — Bisweilen geht ein
ansehnlicher Theil von ihm, der sich in eine Sehne ver-
wandelt; zur Sehne des Spalters, die dem Zeigefinger
gehört. Bisweilen kommt eine Portion vom innern
Knöchel der Oberarmröhre sehnig, wird unter dem El-
lenbogengelenke bald fleischig und rundlich, bleibt vom
übrigen Bauche getrennt, bis sie wieder in eine Sehne
verwandelt auf der Mitte der Länge der Speiche sich
zur Sehne des langen Beugers gesellt 7.

Wirkung.

Beugt das Nagelglied des Daumens, und bey
Fortwirken wegen der Einschränkung seiner Sehne
auf dem ersten Gliede auch dieses, — und selbst den
Mittelhandknochen; — beugt ferner das Handgelenk,

6) Monro Tab. I. f.

7) S. Albinus Abbildung.

krümmt also ansehnlich den Daumen in die hohle Hand und bringt seine Spitze bis an den kleinen Finger.

Kurzer Rückwärtsender.

Supinator brevis.

Albinus Tab. XIX. Fig. 17. 18.

§. 268.

Kommt sehnig, theils vom äußern Knöchel der Oberarmröhre, gleich unter dem Anfange jener gemeinschaftlichen Sehnenbinde, theils von der Gelenkkapsel der Speiche mit der Oberarmröhre, hauptsächlich aber meist fleischig auswärts von der Rauhigkeit am Ellenbogen unter der Gelenkfläche für die Speiche, steigt mit seinen Fleischfasern äußerlich ziemlich sehnig, abwärts gerade gegen die Speiche herunter, wird allmählig dicker, schlägt sich dann schief um selbige vorzüglich oberhalb, und befestigt sich über, um und unter die Stelle, an der der zweybäuchige Armmuskel sitzt, bis zur Mitte der Länge der Speiche herunter, verdünnt sich allmählig, und ist auf seiner innern Fläche etwas sehnig.

Besteht allemal von oben bis über seine Mitte herunter, aus zwey aufeinander liegenden deutlich abgefonderten Lagen, einer längern äußern und kürzern innern, die man am leichtesten entdeckt,

wenn man den durch ihn gehenden Ast des Nervi radialis verfolgt ⁸.

Abweichung.

Bisweilen ist der obere Theil vom übrigen Muskel stark abgesondert; — bisweilen ist er an einem Arme doppelt ⁹.

Wirkung.

Dreht die um den Ellenbogen gewendete Speiche zurück in die Supination. — Vermuthlich unterstützt er auch, wenn das Armgelenk vorher schon ein wenig gebogen ist, die fernere Beugung desselben.

Viereckiger Vorwärtswender.

Pronator quadratus.

Albinus Tab. XIX. Fig. 21. 22.

§. 269.

Kommt, fast bis unten zu sehnig, vom eckigen Rücken am untern und innern Theile des Ellenbogens, geht mit seinem dicker werdenden Fleische zum untern Theile der Speiche herüber, auf deren innern Fläche er sich verdünnt festsetzt.

Abweichungen.

Bisweilen steigen seine innern Fasern weit schiefser als die äußern vom Ellenbogen zur Speiche herun-

⁸) Eine Bemerkung von H. Schenzer.

⁹) Bonn bey Sandifort Exercit. pag. 94.

ter. — Bisweilen steigen die äußern obern herauf, die untern herunter, und die mittlern laufen queer; — bisweilen liegen umgekehrt die untern queer, und die obern absteigend; — bisweilen sind die obern kürzer, die untern länger; — bisweilen hingegen von gleicher Breite.

Wirkung.

Dreht die Speiche um den Ellenbogen, und dadurch die Hand in die Pronation,

Kurze Abzieher des Daumens, äußerer und innerer.

Abductores breves Pollicis Manus exterior et interior.

Albinus Tab. XX. Fig. 16. Hist. Musc. Icon. I. F. der Innere K. die Sehne vortreflich in natürlicher Größe.

§. 270.

Der äußere kommt sehnig vom Bande der Handwurzel, auch wohl vom größern vieleckigen Beine, von der sehnigen Ausbreitung des Handsehnenspanners, und der Sehne des langen Abziehers — geht gerade zum Daumen, indem er allmählig breiter, dann wieder schmaler wird, bis er früher, wo er auf dem Gegensteller liegt, in eine Sehne übergeht, die sich größtentheils an die vordere Wurzel des ersten Daumengelenks festsetzt, kleinerntheils in die Sehnen-

Musculi proprii utriusque

Digiti nominati pro musculis

inter osseis magis exclusis

et in plures ventres

Musculi habentur

Musculi de Smithsoniano

1826. fol. ad finem

S. 18.

haut der Strecker, die den Rücken des Daumens überzieht, verliert.

Der andere innere Abzieher des Daumens¹ kommt mehr nach innen der Handwurzel, und mehr von der Mitte des innern Bandes der Handwurzel, und setzt sich mehr nach innen an die Wurzel des ersten Gliedes des Daumens fest.

Abweichung.

Der äußere ist bisweilen nichts anders als der untere oder vordere Bauch des langen Abziehers (f. S. 254.).

Wirkung.

Der äußere zieht den Daumen von den Fingern nach innen und hinten ab, und beugt in eben der Richtung sein erstes Glied. — Ist aber der Daumen schon abgezogen, oder der Mittelhandknochen des Daumens auf der Handwurzel fest, so hilft er mit seinem äußern Theile beyde Glieder des Daumens strecken. — Der innere zieht den Daumen mehr als der äußere nach innen ab, und beugt sein erstes Glied.

1) Albinus Hist. Musc. Icon. 1. K. unter dem Namen cauda prior flexoris brevis. Auf der XX. Tafel Fig. 17. hingegen nennt er ihn Abductor brevis alter. In der Expl. der 2ten Tafel sagt er selbst: u. v. w. pars flexoris brevis pollicis manus, quae pro abductore brevi altero haberi potest.

Gegensteller des Daumens.

Opponens Pollicis. Flexor ossis metacarpi pollicis

Albinus Tab. XX. Fig. 15. Hist. Musc. Icon. 1. G. und Icon. 2. F. vortreflich.

§. 271.

Kommt unter dem innern kurzen Abzieher des Daumens von denselben Theilen, nämlich dem Handwurzelbände, und dem größern vieleckigen Beine, ist zwar am Anfange breiter als der innere kurze Abzieher, läuft aber nicht so weit vor, sondern setzt sich sehnig an den ganzen äußern Rand des Mittelhandknochens des Daumens.

Wirkung.

Beugt den Daumen so, daß er ihn nach innen und rückwärts abzieht, zugleich dreht, und seinen innern Theil der Handfläche entgegensteut.

Kurzer Beuger des Daumens.

Flexor brevis Pollicis manus.

Albinus Tab. XX. Fig. 20. auf dem Icon 1. bloß L. nicht K.

§. 272.

Kommt sehnig mit etwas getrennten Portionen vom Hakenbeine, vom Kopfbeine, vom kleinern vieleckigen, und in etwas dem größern vieleckigen Beine, oder von den Sehnen, mit denen diese Knochen überzogen sind, ferner von den an diese Knochen stoßenden Mittelhandknochen, nämlich des vorletzten, des

Mittel- und des Zeigefingers, auch wohl des Daumens. — Er ist anfangs breit, und äußerlich sehr sehnig, wird dann dicker, bis er sich wieder zusammenzieht, und in zwey Sehnen spaltet, die die Sehnenbeinchen aufnehmen, und sich an die Wurzel des ersten Gliedes festsetzen. Die Sehne, die dem Zeigefinger näher ist, vermischt sich mit der Gelenkkapsel, den ausgebreiteten Sehnen der Strecker des Daumens², und der Sehne des Anziehers des Daumens.

Wirkung.

Beugt den Daumen in die Hohlhand.

Anzieher des Daumens.

Adductor Pollicis Manus.

Albinus Tab. XX. Fig. 24. Hist. Musc. Icon. 1. M.

S. 273.

Kommt anfangs am breitesten, auch wohl gespalten, von der innern Fläche des Mittelhandknochens des Mittelfingers, bisweilen von der ganzen Länge, die zwischen beyden Enden liegt, wird darauf dicker, zuletzt aber wieder zu einer sehnigen Spitze geschnäbert, die sich an die dem Zeigefinger zugekehrte Stelle der Wurzel des ersten Daumengliedes festsetzt, und mit der Sehne des kurzen Beugers des Daumens vermischt.

2) Albin. Hist. Musc. Icon. 4. M. N.

Wirkung.

Beugt das erste Glied gegen die Mitte der Hand herunter, und zieht den Daumen in die Mitte der Hohlhand.

Hohlhandmuskeln.

Palmaris brevis.

Albinus Tab. XX. Fig. 26.

S. 274.

Besteht aus vier, fünf, bis sechs queer liegenden Fleischbündeln, die in der Hohlhand, theils von der Ausbreitung der Handsehnen, theils vom Handwurzelbände kommen, wenig untereinander zusammen hängen, zum Theile durch Fett abgefordert werden, und gegen den Mittelhandknochen des kleinen Fingers sich in der Hohlhandsehne verlieren.

Wirkung.

Zieht diesen Theil der Hohlhand zusammen.

Abzieher des kleinen Fingers.

Abductor digiti minimi.

Albinus Tab. XX. Fig. II. Hist. Musc. Icon. I. C. Icon. 4. Ω .

S. 275.

Kommt sehnig, theils vom runden Handwurzelbeine, theils vom Bände der Handwurzel. Sein anfangs dünnes, gerade auslaufendes, Fleisch wird breiter

breiter und dicker, darauf wieder schmaler und dünner, bis er sich in eine Sehne verwandelt, die theils an den äußern Theil der Wurzel des ersten Gliedes des kleinen Fingers gelangt, theils mit der Sehne des kurzen Beugers vereinigt, sich der sehnigen Ausbreitung des eigenen Streckers des Daumens einmischt.

Abweichung.

Bisweilen kommt eine anfangs sehnige, dann zwey Zoll lange Fleischportion von der Ausbreitung der Handsehne. — Fehlt aber der Handsehnenspanner, so kommt diese Portion von der Vorderarmbinde.

Wirkung.

Zieht durchs erste Glied den kleinen Finger von den übrigen Fingern ab, und beugt ihn in die Hohlhand; — hilft auch das letzte und mittelste Glied des kleinen Fingers strecken, und beugt darauf den Mittelhandknochen des kleinen Fingers nach innen.

Kurzer Beuger des kleinen Fingers.

Flexor proprius digiti minimi.

Albinus Tab. XX. Fig. 10. Hist. Musc. Icon. 1. D.

S. 276.

Kommt sehnig vom Handwurzelbände, und vom Haken des Hakenbeins; ist anfangs dünne und schmaler, darauf breiter und dicker, bis er sich sehr geschmälert durch seine Sehne mit dem Anzieher des

S. Muskellehre. K



kleinen Fingers vereinigt, und den Sehnen der Streck-
ker, die den kleinen Finger überziehen, beylieft.

A b w e i c h u n g.

Bißweilen iſt er ſehr ſchmal; bißweilen fehlt er
ganz.

W i r k u n g.

Streckt anfangs das mittelfte und Nagelglied des
kleinen Fingers, beugt darauf das Gelenk des erſten
Gliedes mit dem Mittelhandknochen, und endlich den
Mittelhandknochen des kleinen Fingers ſelbſt gegen
den Daumen, ſo daß er den kleinen Finger etwas dreht.

**Auzieher des Mittelhandknochens des
kleinen Fingers.**

Adductor ossis Metacarpi digiti minimi.

Albinus Tab. XX. Fig. 25. Hist. Musc. Icon. I. EE.
Icon. 2. D.

S. 277.

Liegt unter dem kurzen Beuger und Abzieher des
kleinen Fingers, iſt kürzer als beyde, und dem Ge-
genſteller des Daumens ähnlich, kommt ſehnig vom
Handwurzelbande und vom Hakenbeine, iſt anfangs
dünne und ſchmal, dann dicker und breiter, und ſetzt
ſich an den Mittelhandknochen des kleinen Fingers
längs der ganzen Außenseite, die zwischen seinen bey-
den Enden liegt; anfangs iſt er mehr äußerlich, zu-
lezt mehr innerlich ſehnig.

Wirkung.

Zieht den Mittelhandknochen des kleinen Fingers in die Hohlhand gegen den Daumen, so daß auch der Mittelhandknochen des vorletzten Fingers folgen muß, und macht daher die innere Fläche der Hand hohl, den Rücken aber gewölbt.

Innere Mittelhandmuskeln.

Interossei interni oder priores.

Albinus Tab. XX. Fig. 6. und 7. die innern oder vordern Fig. 8. 9. die äußern oder zweybäuchigen. In der Hist. Musc. sind sie sehr viel schöner in natürlicher Größe vorgestellt; nur sollten die Fasern gefiedert oder verflochten, nicht länglich und gerade vorgestellt seyn.

§. 278.

Der innern oder vordern Mittelhandmuskeln sind drey ³. — Der erste gehört dem Zeigefinger; der zweyte dem vorletzten; der dritte dem kleinen Finger ⁴. Der Mittelfinger hat keinen innern Mittelhandmuskel.

Sie haben folgendes miteinander gemein: — Der erste innere Mittelhandmuskel kommt

3) Albinus hat vier innere und drey äußere Interosseos, weil er nämlich einen Theil des ersten äußern Interosseos als einen eigenen Muskel unter der Benennung: Abductor indicis manus beschreibt. Ich bin Waltern gefolgt.

4) Albinus Hist. Musc. Icon. 3. H. L. N.

*Man sieht an der ersten Figur
einen Muskel der vom vierten
adligten Seiden ausgeht dieses
als ein spitzwinkliges, unter
dem spitzwinkligem ausgeht
in die Handfläche des
kleinen Fingers befißt*

*Yustham Beiträge
S. 1. P. 15.*

Streb

geht er

ed des

erften

den

ger

ht.

es

EE.

des

er

m

ß

ht

ß

von der Ellenbogenſeite; der zweyte und dritte von der Speichenſeite der Mittelhandknochen ihrer Finger gleich unter ihrem obern Ende, bis gegen die Mitte herab. Sie ſind anfangs äußerlich ſehnig, dünne und ſchmal, dann breiter und dicker, bis ſie wieder ſchlanker werden, ohnfern der Finger in Sehnen übergehen, der dritte früher auf der Seite des Handrückens, der erſte und zweyte früher an der Hohlhandſeite.

Die Sehne des erſten innern Mittelhandmuskels iſt dünne, ſach, giebt queere und ſchiefe Faſern ⁵ an die Gelenkkapsel des Mittelhandknochens mit dem erſten Gliede des Zeigefingers, läuft zur Seite des Handrückens auf dem erſten Gliede, miſcht ſich der Sehne des gemeinſchaftlichen Streckers der Finger ein, verläßt ſie aber kurz vor ihrem Ende wieder, geht allmählig gegen den Rücken des zweyten Gliedes, bis ſie mitten auf dem Rücken deſſelben mit der ähnlichen Sehne des ſpulförmigen Muskels von der andern Seite in einen ſpizen Winkel vereinigt, ſich an die Wurzel des Nagelgliedes feſtſetzt ⁶.

Auf gleiche Art verhalten ſich die Sehnen des zweyten und dritten innern Mittelhandmuskels, nur

⁵) Vincula Extensorum digitorum bey Weitbrecht S. 63. durch welche nämlich die Sehnen der Streckers in ihrer Lage erhalten werden.

⁶) Vortreflich abgebildet bey Albin Icon. 4.

mit dem Unterschiede, daß sie 1) vor der Speichen-
seite liegen, 2) noch die Sehne des Spulmuskels zu-
gemischt bekommen, und 3) daß die Sehne des zwey-
ten innern Mittelhandmuskels am Nagelgliede, mit
dem äußern Mittelhandmuskel; die Sehne des dritten
innern Mittelhandmuskels aber mit der Sehne des
Abziehers und kurzen Beugers des kleinen Fingers
in einem spizen Winkel am Nagelgliede zusammen-
kommen.

Äußere oder doppelbäuchige Mittel- handsmuskel.

Interossei externi oder bicipites.

Albinus Tab. XX. Fig. 8. 9. Hist. Musc. auf allen vier
Tafeln in natürlicher Größe.

S. 279.

Zhrer sind vier. — Der erste gehört der Spei-
chenseite des Zeigefingers; der zweyte und dritte
dem Mittelfinger; der vierte der Ellenbogenseite
des vorletzten Fingers. — In folgendem kommen
sie miteinander überein: Sie sind doppelbäuchig; —
der innere stärkere Bauch kommt (wie bey einem
innern Mittelhandmuskel) von seinem eigenen Mit-
telhandknochen etwas über der Hälfte seiner Länge;
— der Äußere, dünnere, flachere Bauch, durch
den sich die äußern Mittelhandmuskeln von den in-

nern unterscheiden, kommt vom gegenüber liegenden Mittelhandknochen, fast von der ganzen zwischen seinen Enden enthaltenen Länge, außer bey dem ersten des Zeigefingers, der auch mit einer sehnigen Portion vom größern vieleckigen Beine kommt; die drey übrigen pflegen noch eine unter sich liegende Portion zu haben, die sich mit einer dickern oder schmälern Sehne an die Rauhigkeit über der Wurzel des ersten Gliedes festsetzt 7. — Die Fasern dieser Bäuche sind anfangs sehnig, stoßen in spitzen Winkeln zusammen, zeigen sich äußerlich sehnig, und bilden eine gemeinschaftliche Sehne, die sich auf die nämliche Art, wie die Sehne der innern Mittelhandmuskeln, verläuft, doch mit dem Unterschiede, daß die Sehne vom ersten sich theils kurz an die Wurzel des ersten Gliedes fügt, theils sich der Gelenkkapsel einmischt, mit der Sehne des Spulmuskels und der Strecker verbindet, und über den Rücken des ersten Gliedes verbreitet. Die Sehne des zweyten äußern Mittelhandmuskels, zu dem sich der zweyte Spulmuskel schlägt, läuft am Mittelfinger mit der Sehne des dritten äußern Mittelhandmuskels zusammen, und am vorletzten Finger die Sehne des vierten äußern Mittelhandmuskels mit der Sehne des zweyten innern Mittelhandmuskels.

7) Diese Portion ist noch unabgebildet.

Wirkung.

Alle sieben Mittelhandmuskeln beugen das erste Fingerglied; — der zweyte und dritte Innere, und der erste und zweyte Aeußere gegen den Daumen, die übrigen äußeren gegen den kleinen Finger. — Im vollkommensten Zustande drehen sie die Finger auf die Seite des Mittelhandknochens, welche derjenigen, an der sie liegen, entgegengesetzt ist. — Alle helfen auch das mittlere und Nagelglied strecken. — Der erste äußere entfernt wechselseitig den Zeigefinger von den übrigen, und zieht den Mittelhandknochen des Daumens an den Zeigefinger.

Schenkelbinde^s.

§. 280.

Die Sehnenbinde des Schenkels senkt sich vom Hüftbeinkamme abwärts über die Gefäßmuskeln, ferner vom Kreuzbeine und den Steißbeinen über den Anfang des großen Gefäßmuskels, vom Sitzbeine und Schaambeine über den Ursprung des halbsehnigen Schenkelmuskels, des Schenkelanzieher's, des schlanken Schenkelmuskels und Schaambeinmuskels, so daß zu ihr noch Fasern vom sehnigen Rande des äußern schrägen Bauchmuskels, und von der Sehne des

§) Murray Diss. de Fascia lata. Upsal 1777. Sehr gründlich.

kleinen runden Lendenmuskels treten. Sie besteht sowohl aus geraden, als schiefen Quersfasern, und bedeckt die Backen des Hintern und den Schenkel. Auf dem großen Gefäßmuskel ist sie sehr dünne, auf dem mittlern um desto stärker, je mehr sie sich vom großen entfernt. An der äußern Seite des Schenkels ist sie am stärksten.

*von dem Lenden zum Hüft
Lenden zum Hüft in dem
ist ein der aufsteigen
unter dem pyramiden
Füllknippen Längen
von dem Hüft zum Hüft
vom Hüft zum Hüft
Vana fuphera*

Ihr stärkster Theil verbindet sich mit der Sehne des äußern dicken Schenkelmuskels, und setzt sich an die äußere Seite des obren Endes des Schienbeins. Mit einem dünnern Theile umgiebt sie das Kniegelenk, und lauft zum Unterschenkel hinab.

*V. Bruner Edinburgh Med & Surgical
Journal 2^o Vol. Pag 1 et 2.*

Von ihren Fortsätzen geht ein ansehnlicher zwischen den großen und mittlern Gefäßmuskel; andere dünnere Fortsätze umgeben den Schenkel locker, wie ein Ueberzug; ein anderer ansehnlicher legt sich zwischen den hintern Theil des äußern dicken Schenkelmuskels, und den kleinen Bauch des zweybäuchigen Schenkelmuskels, an dessen vordern Theil sich eine dünne, vom untersten Theile des großen Gefäßmuskels, und der rauhen äußern Leiste des Schenkels kommende Portion legt, die schief mit ihren Fasern absteigt.

Spanner der Schenkelbinde.

Fascialis, oder Tensor Vaginae Femoris, oder
Fasciae latae.

Albinus Tab. XXIII. Fig. 8.

§. 281.

Kommt sehnig von der äußern Seite der vordern Spitze des Hüftbeinkammes, wird drauf fleischig, und indem er seitwärts und rückwärts von der Hüfte zum Schenkel absteigt, allmählig breiter und dicker, bis er wieder nach und nach abnimmt, und sich im dicksten Theile der Schenkelbinde, hoch über der Mitte des Schenkels endigt, so daß sein Fleisch zwischen zwey Blättern der Schenkelbinde oder sehnigen Scheide enthalten ist.

Wirkung.

Spannt diese Schenkelbinde über den Schenkelmuskeln an, hilft den Schenkel auswärts in die Höhe heben, und innwärts drehen. — Zieht mit die Hüfte zur Seite vorwärts herunter, und dreht sie auswärts.

Großer Gesäßmuskel.

Gluteus magnus.

Albinus Tab. XXI. Fig. 1.

§. 282.

Kommt a) vom äußeren Rande des hintern Theils des Hüftbeinkammes; b) Vom Bande zwischen dem

Hüftbeine und Kreuzbeine, wo er mit den Rückgrats-
streckern zusammenhängt; c) Vom äußern Rande des
Kreuzbeines und seinem Höcker an der Mündung des
Canales für das Rückenmark, und dem Gelenke zwischen
seinen schrägen Fortsätzen, und den schrägen Fort-
sätzen des Schenkelbeins; d) Von der Seite der Steiß-
beine; e) Von den beyden untern Beckenbändern (dem
Ligamento Sacro iliaco, und Sacro Ischiadico), end-
lich f) von der Schenkelbinde, mit der er überzogen ist.

Anfangs ist er meist sehnig, dann fleischig und
allmählig dicker. Der Umfang seines Ursprungs ist
rund; sein oberer und unterer Rand aber ist flacher
rundlich. Er steigt schief seitwärts nach außen her-
unter, so daß sein Fleisch außerhalb durch sehnige
Fächer in locker zusammenhängende Bündel abgetheilt,
innerhalb hingegen dichter aussieht, bis er zu unterst
sowohl durch Fleisch- als Sehnenfasern mit dem
äußeren dicken Muskel sich vermischt, wo anfangs ein
Schleimsack zwischen beiden Muskeln liegt, und,
nachdem er schmaler geworden, in eine ziemlich breite
und dicke Sehne übergeht,

die sich mit ihrem untern hintern, als dem stärk-
sten Theile der Schenkelbinde einmischt, in einige
Portionen spaltet, einige Fasern nach außen in die
Schenkelbinde abschickt, und endlich an den obern

g) Monro Tab. 3. V.

von d.
Cysten
27
in der
Fülle
von
Vand
O. Brunn
Journ

Theil des größern Kollhügels, den sie überzieht, und an den obern Theil der von diesem Kollhügel sich erstreckenden rauhen Leiste festsetzt.

Er ist der dickste Muskel des ganzen Körpers. — Zwischen der Sehne und dem Kollhügel liegt ein großer ¹ Schleimsack; zwischen ihr und dem Schenkelbeine liegen zwey ² Schleimsäcke.

Wirkung.

Hebt den Schenkel auswärts und rückwärts in die Höhe; — dreht ihn auch auswärts und rückwärts herum; — zieht den vorwärts gebogenen Schenkel zurück, und entfernt ihn vom andern. — Sein unterer Theil zieht die Steißbeine seitwärts und vorwärts.

Mittlerer Gefäßmuskel.

Gluteus medius.

Albinus Tab XXI. Fig. 2. und 3.

§. 283.

Ist viel kleiner, als der vorige, auch aus dichter aneinander liegenden Fasern zusammengesetzt. Kommt mit einem rundlichen Umfange a) vom untern Theile des Randes des Hüftbeinkammes, den der große Gefäßmuskel übrig läßt; b) von einem beträchtlichen Theile der äußern Fläche des Hüftbeins unter diesem

1) Monro Tab. 3. V. U.

2) Monro Tab. 3. V. W.

Blende; c) von der sehnigen Haut, die ihn von außen bedeckt. — Er wird allmählig dicker, aber schmaler, bis er sich mit seiner Sehne schief von hinten an den großen Knochelhügel, von seiner Spitze an bis zu seiner Wurzel herunter festsetzt. — Sein vorderer Theil ist anfangs dünner, dann stärker, kürzer, quersliegender, als der andere, und überdies mit dem kleinen Gesäßmuskel bis zum Ende verbunden, daher er sich auch mit ihm durch eine vereinigte Sehne an den großen Knochelhügel festsetzt. — Auf der innern Fläche der Sehne laufen nach Art eines Bandes sehnige Querfasern, die ihre Länge halten. — Zwischen dem Ende seiner Sehne und dem Birnmuskel liegt ein Schleimsack ³.

Wirkung.

Hebt den Schenkel seitwärts in die Höhe; entfernt ihn also vom andern. — Dreht er hingegen den aufgehobenen Schenkel, so wendet er dessen obern Theil gegen den andern Schenkel. — Ist das Becken vorwärts nach innen auf dem feststehenden Schenkel geneigt, so hilft ers wieder aufrichten, und nach außen neigen. — Mit seinem vordern Theile dreht er den Schenkel vorwärts, mit dem hintern rückwärts; das Becken hingegen auf die umgekehrte Art. — Spannt auch die Schenkelbinde.

3) Monro Tab. 3. K. Tab. 5. I.

von d.
Cysten
ist
in der
Fülle
von
Vand
O. Brun
Joue

Kleiner Gefäßmuskel.

Gluteus minor.

Albinus Tab. XXI. Fig. 4. 5.

S. 284.

Kommt mit einem runden Umfange von der ganzen vom mittlern Gefäßmuskel übrig gelassenen äußern Fläche, und vom obern Theile des hintern Randes des Hüftbeins; ist anfangs am breitesten, aber dünnsten, wird etwas dicker, zieht sich strahlensförmig zusammen, so daß von seinen Fasern die vordern mäßig rückwärts, die mittlern fast gerade, die hintern stark rückwärts absteigen; und geht in seiner Mitte schon früh auswendig in eine Sehne über, — die sich an den vordern Theil des großen Kollhügels von der Spitze an bis zur Wurzel herunter festsetzt. — Vor seinem Ende heftet er sich an die Gelenkkapsel; zwischen seinem Ende aber und dem großen Kollhügel befindet sich ein Schleimsack ⁴.

Wirkung.

Bewegt den Schenkel und die Hüfte fast ganz wie der mittlere Gefäßmuskel; nur dreht er z. B. den Schenkel noch etwas mehr vorwärts.

4) Monro Tab. 3. 5.

Birnförmiger Muskel.

Pyriiformis.

Albinus Tab. XXI. Fig. 6. 7.

S. 285.

Kommt vom untern und hintern Rande des Hüftbeins; ferner mit zwey oder drey sehnigen Spitzen, deren oberste die schwächste ist, vom vordern Theile des Kreuzbeins, zwischen dem ersten, zweyten, dritten, und vierten Loche. Anfangs ist er dünne, aber am breitesten, dann wird er im Raume zwischen dem Kreuz- und Sitzbeine, und hinten über dem Sitzbeine nur wenig absteigend dicker und rundlich, bis er wieder schmaler in eine längliche, mehr breite als dicke Sehne übergeht, die sich mit der Sehne des innern Hüftbeinlochmuskels und der Zwillingsmuskeln vereinigt, und an den innern Theil der Spitze des größern Rothhügels in der Mitte festsetzt.

Abweichung.

Oft fehlt die oberste vom Kreuzbeine kommende Portion. — Bisweilen ist noch ein kleinerer über ihm, von ähnlicher Gestalt und Lage, vorhanden.⁴ Oder er ist von einem Theile des ischiadischen Nerven durchbohrt⁵. Bisweilen ist er mit dem benachbarten mittleren Gefäßmuskel fast unzertrennlich verbunden.

5) G. Hildebrand S. 1245.

von
Costa
ist
nicht
Felle
von
Vand
O. Braun
Joue

4/ Seiler Tafel 1.



Wirkung.

Dreht den Schenkel auswärts und rückwärts; die Hüfte aber auf die entgegengesetzte Weise. — Hilft in etwas den Schenkel rückwärts in die Höhe heben, und die Hüfte auf die entgegengesetzte Art schief herabneigen. — Zieht den nach vornengebogenen Schenkel vom andern ab.

Zwillingsmuskeln.

Gemini.

Albinus Tab. XXI. Fig. II.

S. 286.

Kommen sehnig entweder mit einem einfachen oder getheilten Anfang ohnfern dem mondformigen Ausschnitte unter der untern spitzen Ecke des Sitzbeins, auf dem der innere Hüftbeinlochmuskel sich umbeugt. — Bisweilen kommt der untere Zwillingmuskel, anfangs abgesondert, vom untersten Rande des Ausschnittes vom Sitzbeine gleich über dem kleinen untern Beckenbände. — Sie sind anfangs schmal und dünne, werden darauf etwas dicker, hängen im Fortgange durch Sehnenfasern zusammen, und bilden eine Art Scheide um den innern Hüftbeinlochmuskel; indessen nehmen sie wieder ab, und werden sehnig, vereinigen sich mit der Sehne des innern Hüftbeinlochmuskels, und setzen sich ans Schenkel-

bein in die Grube hinter dem großen Knochelhügel. — Zwischen den Zwillingenmuskeln, der Sehne des innern Hüftbeinlochmuskels, und der Gelenkkapsel des Schenkels findet sich ein länglicher Schleimsack ⁵.

A b w e i c h u n g.

Gemeinlich ist der obere kürzer, als der untere. — Bisweilen sind es fast durchaus getrennte Muskeln. — Man sah auch wohl den untern doppelt.

W i r k u n g.

Unterstützen den innern Hüftbeinlochmuskel, und können gleichsam als seine außerhalb des Beckens liegenden kürzeren Portionen angesehen werden.

Innere Hüftbeinlochmuskel.

Obturator internus.

Albinus Tab. XXI. Fig. 16. — Camper Dem. anat. path. Libr. 2. Tab. I. Fig. I. w. x 6.

§. 287.

Kommt fehnig innerhalb des Beckens vom Schaambeine, in sofern es mehr als den halben Umfang des ovalen Lochs bildet, und fleischig von der in diesem Loch ausgespannten Membran; geht in ein dünnes Fleisch über, welches anfangs am breitesten ist, dann etwas dicker, aber bald allmählig wieder schmaler wird, nach außen und rückwärts tritt, sich

6) Monro Tab. 5. N.

von d.
Ligam.
ist a.
in d.
Felle
von
von
Vans
O. Braun
Jour

ums Sitzbein in einem eigenen Ausschnitte zwischen dessen spitzem Ede und Knorren schlägt, aus dem Becken tritt, indem es allmählig, doch weit früher auf der innern Fläche in eine flache Sehne übergeht, legt es sich zwischen die Zwillingsmuskeln,

und setzt sich mit einer, ihm und den beyden Zwillingsmuskeln gemeinschaftlichen, an die Gelenkkapsel der Pfanne festgehefteten, Sehne zu oberst in die Grube hinter dem Rothhügel des Schenkels.

Die Fasern seiner Sehne ragen verschiedentlich etwas hervor, und lassen auch auf obigem Ausschnitte am Sitzbeine drey oder vier Eindrücke von sich sehen.

Wirkung.

Rollt oder dreht über das Sitzbein, wie über eine Rolle geleitet, etwas gerader als der birnförmige Muskel den Schenkel nach außen und hinten; — hilft auch den vorwärts gebogenen Schenkel vom andern abzuziehen.

Viereckiger Schenkelmuskel.

Quadratus Femoris.

Albinus Tab, XXI. Fig. 8. 9.

S. 288.

Kommt sehnig vom äußern Rande des Höckers am Sitzbeine, wird von innen bald fleischig und stär-

S. Muskellehre.

¶

fer, darauf wieder dünner, und von außen früher
sehnig, geht quer zum Schenkel herüber,

und setzt sich an die Mitte der rauhen Leiste des
Schenkels, die hinten vom großen Rothügel nach un-
ten zum kleinen lauft.

Im Ganzen ist er mehr lang als breit, auch am
Anfange oder am Sitzbeinende schmaler als am Schen-
kelende. Zwischen ihm und dem mit dem halbmem-
branösen Schenkelmuskel vereinigten langen Kopfe
des zweybäuchigen liegt ein Schleimsack ⁷, so wie zwi-
schen ihm und dem kleinen Rothügel ⁸.

Abweichung.

Fehlt bisweilen.

Wirkung.

Hilft dem innern Hüftbeinslochmuskel und den
Zwillingemuskeln den Schenkel oder umgekehrt die
Hüfte drehen. — Zieht den seitwärts aufgehobenen
Schenkel herunter, und an den andern an. — Ist
die Hüfte auf die Seite geneigt, so hilft er sie auf-
richten, und endlich auf die entgegengesetzte Seite
neigen.

7) Monro Tab. 5. Q.

8) Jancke pag. 15.

Zweybäuchiger Schenkelmuskel.

Biceps Femoris.

Albinus Tab. XXI. Fig. 10. 11. 12.

S. 289.

Gehört auf ähnliche Art mit dem halbsehnigen zusammen, wie der zweybäuchige am Arm mit dem Hafenarmmuskel.

Sein längerer Bauch kommt mit dem halbsehnigen Muskel durch eine gemeinschaftliche kurze, dicke, etwas breite und starke Sehne von der Mitte des Sitzknorrens, geht in einen langen, dicken, runden, mehr breiten als dicken Bauch über, der hinten am Schenkel ein wenig schief von innen nach außen absteigt, bis zu seiner Mitte immer dicker wird, den halbsehnigen Muskel gleichsam in einer schwachen Furche an sich liegen hat, dann wieder abnimmt, bis er in eine Sehne übergeht, die sich an seinem äußern Rande schon früh zeigte, und an die sich das Fleisch des kürzern Bauches legt.

Dieser kürzere Bauch kommt dünne, aber breit sehnig vom untern Theile der hintern rauhen Leiste des Schenkelbeines, etwas über der Mitte seiner Länge, und von der sehnigen Scheidewand, die ihn vom äußern dicken Muskel trennt; hängt oben mit dem kurzen Bauche des dreybäuchigen Schenkelmuskels zusammen, wird darauf dicker, bald aber auch wieder schmäl-

ler, legt seine Fleischfasern und zuletzt auch seine Sehnenfasern an die Sehne des längern Bauches, unter dem er größtentheils liegt, in dessen Richtung er auch schief nach außen absteigt.

Diese gemeinschaftliche breite, kurze und dicke Sehne beider Bäuche senkt sich über dem äußern Gelenkknopf des Schenkelbeines herunter, beugt sich ein wenig nach vornen herum, und heftet sich an den äußern Theil des obern Endes des Wadenbeines, bis auf eine kleinere Portion, die sich über den Kopf des Wadenbeines an die äußere Seite des Schienbeines festsetzt.

Von dieser Sehne, zwischen welcher und dem äußern Seitenbände des Kniegelenks ein Schleimsack liegt⁹, gehen hinterwärts und vorwärts Fasern ab, die sich mit der Sehnenbinde des Oberschenkels verweben, auch zur Sehnenbinde des Unterschenkels etwas beytragen.

Abweichung.

Bisweilen ist er nicht zweybäuchig, sondern förmlich dreybäuchig.

Wirkung.

Beugt das Kniegelenk. — Ist bey gebogenem Knie der Unterschenkel inwärts gedreht, so dreht er ihn auswärts, und entfernt also einen Schenkel vom

⁹ Monro Tab. 5. I. hat bisweilen mit der Gelenkkapsel Gemeinschaft.

ändern. — Spannt auch die Sehnenbinde des Unterschenkels, und verstärkt dadurch die Wirkung der Wadenmuskeln. — Zieht den Hüftknochen und den Schenkel hinterwärts, und zwar sein längerer Bauch den Hüftknochen unmittelbar nach hinten und innen, der kürzere unmittelbar den Schenkel, wenn nämlich der Unterschenkel feststeht. Ist der Hüftknochen nach vornen gebogen, so zieht er ihn nach hinten.

Halbsehniger Schenkelmuskel.

Semitendinosus.

Albinus Tab. XXII. Fig. 11. und 12.

S. 290.

Kommt durch eine gemeinschaftliche Sehne, vor der ein Schleimsack ¹ liegt, mit dem zweybäuchigen nur mehr nach innen, und unten vom Höcker des Sitzbeines; bisweilen ist er ein paarmahl mit Sehnenfasern queer so durchzogen, daß er alsdann aus drey Portionen besteht. — Bisweilen auch von der Sehne des zweybäuchigen, bleibt an der gegen den zweybäuchigen und gegen den halbmembranösen Muskel gerichteten Seite länger sehnig, wird darauf fleischig, allmählig breiter und dicker, bis er wieder, vor der Mitte seiner Länge, allmählig abnimmt, und auf der gegen das Schenkelbein gerichteten Seite früher in eine flache, lan-

1) Monro Tab. 5. S.

ge Sehne übergeht, die hinten längs dem Schenkelbeine, und endlich hinter dem innern Knöchel zum Schienbeine absteigt, vorwärts sich herumschlägt, und an der innern Seite der Sehne des schlanken Muskels sich ein wenig ausbreitend festsetzt.

Das vorwärts Ausweichen dieser Sehne hindern die hinterwärts von ihr über die Kniekehle zur Sehnenbinde des Unterschenkels sich erstreckende Fasern.

Wirkung.

Wirkt wie der zweybäuchige. — Ist das Kniegelenk gebogen, so dreht er den Unterschenkel auf die ihm entgegengesetzte Seite, oder nach außen.

Halbmembranöser Schenkelmuskel,

Semimembranosus.

Albinus Tab. XXII. Fig. 9. 10.

§. 291.

Kommt gleichfalls vom Höcker des Sitzbeines, dicht am Anfang des zweybäuchigen und halbsehni- gen Schenkelmuskels, als eine anfangs rundliche, dann lange, breite und dünne bandartige Sehne, die schief abwärts, zuerst von der gegen den andern Schenkel gerichteten Seite in Fleisch übergeht, welches nach unten zu immer dicker wird, dann wieder abnimmt, ebenfalls von der gegen den andern Schenkel gerichteten Seite in eine ähnliche bandartige Sehne schief ab-

wärts übergeht, die kürzer und dicker, als die obere ist, und sich an die hintere und innere Seite des obern Endes des Schienbeines festsetzt, wo zwischen ihr und dem Schienbeine ein Schleimsack liegt ², der mit dem Kniegelenke Gemeinschaft hat.

Er begleitet den halbsehnigen Schenkelmuskel, den er in einer schwachen Furche aufnimmt, von der innern Seite am Schenkel herunter bis hinter den innern Knöchel, an dem er aber gerader absteigt, und dann sich etwas vorwärts krümmt.

Hinter dem innern Gelenkknopf des Schenkelbeines schießt seine untere Sehne über die Kniekehle starke sehnige Fasern ab, die gegen den äußern Gelenkknopf laufen, allmählig breiter werden, und sich theils an das Schenkelbein, theils an die Gelenkkapsel des Knies verlieren; andere ansehnliche Fasern steigen von dieser Sehne, indem sie sich zu krümmen anfängt, sowohl hinterwärts gegen das Wadenbein, als vorwärts hinab, breiten sich aus, und laufen übers Schienbein an der innern Seite ziemlich schief herunter.

Wirkung.

Wirkt wie der halbsehnige. — Spannt die Gelenkkapsel und Schenkelbinde.

2) Monro Tab. 5. h.

knöchelbeine,
Schienbeine
in der in-
sich ein
hindern
zur Sch-
Fasern.
Knie-
auf die
kel.
beines,
sehnige,
liche,
die
Schen-
nach
mmt,
ichte-
ab-



Kleiner runder Lendenmuskel.

Psoas minor.

Albin. Tab. XV. Fig. 14.

§. 292.

Kommt schmal und dünnsehnig seitwärts vom untern Rande des Körpers, auch wohl vom Queerfortsätze des letzten Rückenwirbels, vom Knorpelbände zwischen dem letzten Rücken- und ersten Lendenwirbel, bisweilen auch von dessen unterm Rande und dem ersten und zweyten Lendenwirbel; bisweilen kommt er bloß mit zwey Portionen von der Seite des Körpers des ersten Lendenwirbels; wird bald fleischig (nur wo er auf dem großen runden Lendenmuskel liegt, bleibt er länger sehnig), breiter und dicker, bald aber wieder dünner, und geht äußerlich früher in eine dünne Sehne über, die sich allmählig im Absteigen ausbreitet, und sich theils nach innen, ohnfern des Darmbeines an die rauhe Linie des Schaambeines, theils nach außen als eine dünne, den großen runden Lendenmuskel und innern Darmbeinmuskel überziehende Haut in die Schenkelbinde verliert.

Abweichung.

Fehlt sehr oft ³. — Selten sieht man einen dritten runden Lendenmuskel ⁴.

und Winslow
in Bell. p. 341.

³) Soll öfter in Männern ^(und Frauen hingegen öfter in) Weibern fehlen. Bell. p. 341.

⁴) Winslow Tab. 2. pag. 146. in der Pariser Ausg. v. 1763.

Wirkung.

Wirkt wie der große runde Lendenmuskel; und spannt die Schenkelbinde.

Großer runder Lendenmuskel.

Psoas major.

Albin. Tab. XXI. Fig. 12. 13. 15.

§. 293.

Fängt mit zehn abgefonderten Portionen an, deren fünf von der Seite der fünf Lendenwirbel, und den sie vereinigenden Zwischenknorpeln, fünf vom vordern und untern Theile der Querfortsätze der fünf Lendenwirbel kommen. Die oberste Portion pflegt vom letzten Rückenwirbel, vom Zwischenknorpel und ersten Lendenwirbel, auch wohl vom Köpfchen der zwölften Rippe zu kommen. So die zweyte Portion vom untern Theile des ersten, vom obern Theile des zweyten Lendenwirbels, und von dem zwischen ihnen liegenden Knorpelbande; so die dritte vom zweyten und dritten Lendenwirbel, und vom Zwischenknorpel; so die vierte vom dritten und vierten; so die fünfte vom vierten und fünften Lendenwirbel und von den Zwischenknorpeln.

Diese dünne und schmale Portionen werden im Zusammenstoßen und Verflechten ein allmählig dicker und breiterer Muskel, der im Absteigen sich dem

Hüftbeine nähert, rundlich, dann wieder schmaler und dünner wird, bis er von der äußern Seite am frühesten in eine Sehne übergeht, an welche sich das Fleisch des Darmbeinmuskels bis zum Ende anlegt, und nachdem es mit ihr über den Rand des Schaambeins abgestiegen ist, und sich an die Gelenkkapsel der Pfanne festgeheftet hat, sich auch mit ihr an den kleinen Kauhügel festsetzt.

Abweichungen.

Oft erhält er noch Zuwüchse von den Quersfortsätzen des ersten, zweyten, auch wohl des dritten Wirbels des Kreuzbeins. — Bisweilen legt sich an ihr von der Seite des Beckens her eine ganz abgeforderte kleine Portion, die fast bis zum Kauhügel herunter fleischig bleibt, endlich aber doch sehnig wird, und sich zur gemeinschaftlichen Sehne dieses großen runden Lenden- und des Darmbeinmuskels schlägt, so daß sie daher manchmal wie doppelt ausfieht.

Wirkung.

Hebt den Schenkel in die Höhe, und dreht seinen äußern Theil hinterwärts. — Steht der Schenkel fest, so hilft er die Hüfte nach innen drehen. — Beugt die Lenden vorwärts auf seine Seite; oder, wenn die Lenden nach hinten gebogen sind, macht er sie gerade.

— 347 —

D a r m b e i n m u s k e l.

Iliacus internus.

Albin. Tab. XXI. Fig. 14. 15.

S. 294.

Sollte vom vorigen runden Lendenmuskel nicht getrennt werden ⁵, weil er eigentlich nur dessen untere und äußere Portion vorstellt.

Kommt meist fleischig, von der ganzen innern Fläche des Darmbeins, vom innern Rande seines Kamms an bis zur Spitze desselben herunter, bisweilen auch mit einer kleinen Portion vom Kreuzbeine und von der Gelenkkapsel der Pfanne. Anfangs ist er dünne, darauf dicker, bis er wieder im Absteigen über den Rand des Beckens in einer Ausbuchtung des Schaamstücks des Hüftbeines unter der Sehne des äußern schrägen Bauchmuskels abnimmt, rundlich, dünner und schmaler wird, sich an den runden Lendenmuskel legt, und mit ihm eine gemeinschaftliche, an den kleinen Kothügel befestigte Sehne bildet, zwischen welcher, der Ausbuchtung des Darmbeins und der Gelenkkapsel ⁶, so wie zwischen dieser Sehne

5) Haller nennt beide Muskeln zusammen Iliacops oas.

6) Monro Tab. 3. K.

und der Spitze des Knochens ein bisweilen doppelter Schleimsack ⁷ liegt.

Abweichungen.

Bisweilen kommt eine breite und dünne Portion gleich unter dem untern Höcker des Hüftbeinkammes, die an der äußeren Seite des Darmbeinmuskels absteigt, allmählig stärker, zuletzt aber wieder schwächer wird, bis sie sich an die rauhe Leiste des Schenkelbeins unter dem kleinen Knochensack festsetzt. — Selten ist er vom großen runden Lendenmuskel ganz getrennt ⁸.

Wirkung.

Hebt den Schenkel aufwärts; — dreht die Hüfte noch mehr als der runde Lendenmuskel nach innen.

vermehrt sich nach unten gegen den Hüftbeinwinkel.

Längster Schenkelmuskel.

Sartorius.

Albin. Tab. XXIII. Fig. 4.

§. 295.

Kommt von dem obern Höcker des Hüftbeinkammes dicht am Spanner der Schenkelbinde mit einer spizen Sehne, die bald breiter wird, und in Fleisch übergeht, welches, nachdem es stärker geworden ist, nun fast von gleicher Breite schief am Schenkel nach

⁷) Koch S. 43.

⁸) Lieutaud.

innen, dann gerader nach unten, und etwas rückwärts zur innern Seite des Knies absteigt, wo es wieder, nach dem es allmählig schon eine Strecke zuvor schmaler geworden, in eine Sehne übergeht, welche flach und dünne sich vorwärts beugt, und an der innern Seite des Schienbeins unter dem Höcker des Kniescheibenbandes breiter werdend festsetzt. — Wo seine Sehne am innern Gelenkknöchel absteigt, schiebt sie hinterwärts über das Kniegelenk starke und breite sehnige Fasern ab, die sich in die Sehnenbinde des Unterschenkels verbreiten, und sie zurückhalten, daß sie nicht nach vorne ausweichen kann.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen zeigt er unterwärts eine kleine abge sonderte Portion.

W i r k u n g.

Hebt den Schenkel in die Höhe, und dreht, wenn er fortfährt zu wirken, ihn nach außen. — Beugt das Knie. — Zieht das Hüftbein schief nach vornen herunter, und dreht es nach innen. — Ist das Knie gebogen, so wendet er das Schienbein, und schlägt es über das andere.

wollen doppelt
 eine Portion
 Beinlamm-
 muskels ab-
 r schwächer
 Schenkels
 - Scha-
 l ganz
 e Höhe
 innen.
 -
 am-
 inner
 eifsch
 n ist,
 nach



Schlanker Schenkelmuskel.
Gracilis.

Albin. Tab. XXIII. Fig. 5.

S. 296.

Kommt als eine bandartige dünne Sehne von der Schaambeinvereinigung, und unter ihr vom Schaambeine, geht bald, doch von innen früher, in ein dünnes Fleisch über, welches oben am breitesten ist, dann etwas dicker wird, an der innern Seite des Schenkels als ein dünner, schmaler, fast bandartiger Muskel absteigt, allmählig wieder schmaler und fast rundlich wird, zuerst hinten und dann gänzlich in eine schlanke Sehne übergeht, die am innern Gelenkknöchel des Schenkels absteigt, sich nach vornen zu umbeugt, mit der Sehne des halbsehnigen Muskels vereinigt, sich unter die Sehne des längsten Schenkelmuskels vornen an den obern Theil des Schienbeins im Ausbreiten festsetzt, und Fasern zur Sehnenbinde des Unterschenkels abschickt. — Zwischen seiner Sehne, der Sehne des längsten Schenkelmuskels und des halbsehnigen, und dem Schienbeine liegt ein Schleimsack ?

Wirkung.

Hilft das Knie beugen, und durchs Becken den

9) Monro. Tab. 3. k.

Rumpf nach innen gegen den Schenkel niederziehen. — Bringt durchs Schienbein einen Schenkel an den andern. — Ist das Knie gebogen, so wendet er den Unterschenkel so, daß er vor den andern zu liegen kommt.

Gerader Schenkelmuskel.

Rectus Femoris.

Albin. Tab. XXIII. Fig. 2. 3. Rectus Cruris.

§. 297.

Sollte bittig mit den drey folgenden Muskeln, nämlich mit dem Schenkelbeinmuskel, mit dem äußern dicken Schenkelmuskel, und mit dem innern dicken Schenkelmuskel zusammen, für einen Muskel gerechnet, und der vierbäuchige Kniestrecker genennt werden.

Kommt mit einer starken rundlichen Sehne von der Wurzel des unteren Höckers des Hüftbeinkamms, wird im Fortgange etwas breiter, und erhält vom obern und hintern Rande der Pfanne und ihrer Gelenkkapsel eine andere etwas breitere, dünnere, bald aber schmälere und dicker werdende bogenförmige Sehne, wird inwendig bald fleischig, und bis zur Mitte seiner Länge immer dicker, dann aber langsam wieder dünner, doch durchaus mehr breit, als dick; steigt gerade vor dem Schenkel hinab, bis er in eine kurze Sehne

an oberer Pfanne
unterer Pfanne
Schenkel

an oberer Pfanne
unterer Pfanne
Schenkel

Knochen in
Knochen
des Kniegelenks
Tab. 13. 381. 8.
373.

Knochen
unterer Pfanne

übergeht, die sich mäſig ausbreitet, und an den oberem Theil der Kniescheibe feſtſetzt. — Seine vordern Faſern liegen zu beyden Seiten der Sehne federartig gegeneinander, ſo daß ſie nach unten zu offene Winkel bilden. Seine innere Fläche iſt ſehr ſehnig. Seine Sehne, die gewöhnlich mit den dicken Schenkelmuskeln vereinigt iſt, bildet eine Sehnenhaut¹, die die Kniescheibe und das Kniescheibenband ſo überzieht, daß bißweilen eine Höhlung zwiſchen ihr und der Kniescheibe übrig bleibt.

Wirkung.

Zieht mittelſt der Kniescheibe das Schienbein an, und ſtreckt das Kniegelenk, wenn es gebogen war. — Iſt der Unterschenkel feſt, und das Knie gebogen, ſo richtet er den Schenkel auf dem Schienbeine in die Höhe. — Zieht das Hüftbein vorwärts herunter.

Äußerer und innerer dicker Schenkelmuskel.

Vastus.

Albijn. Tab. XXIII. Fig. 6. 7.

S. 298.

Der äußere kommt vom vordern und äußern Theile der Wurzel des größern Rothhügels; ferner
hin

1) P. Camper Diss. de Fractura Patallae. Hagae Com. 1789. Fig. I. x. 7.

hinten längs der ganzen äußern rauhen Leiste, die von diesem Rothhügel bis zum äußern Gelenkknopf absteigt, wo er zu oberst mit dem großen Gefäßmuskel zusammenhängt, ferner zum Theile von der sehnigen Scheidewand, die zwischen ihm und dem kurzen Bauche des zweyhäuchigen liegt, ferner fast von der ganzen äußeren Hälfte der Fläche des Schenkels, steigt mit seinen Fasern schief vorwärts herunter, ist in der Mitte seiner Länge am dicksten, am hintern Theile seiner Außenseite vom Anfang an, bis zum Ende sehnig, — und setzt sich mit einer breiten, dicken und kurzen Sehne, die innerhalb schon vor der Mitte seiner Länge anfängt, an den obern und äußern Rand der Kniescheibe. — Allein diese Sehne schickt nicht nur vorwärts eine Fortsetzung bis zum obern Ende des Schienbeins zwischen das Wadenbein und Kniescheibenband herab, sondern erstreckt sich auch hinterwärts als eine dünne Haut in die sehnige Schenkelbinde. — Mit dem Schenkelbeinmuskel ist er nicht nur am Ende durch seine Sehne, sondern auch durch seinen innern Rand vereinigt, welcher sich auf den Schenkelbeinmuskel legt.

Der innere kommt von der inneren Hälfte der Fläche des Schenkels, nur vorwärts tiefer als der äußere, und von der hintern rauhen vom kleinern Rothhügel absteigenden Leiste. Steigt, wie der äußere, nur mit seinen Fasern von innen nach außen her-

S. Muskellehre.

oben
Fa-
artig
Bin-
eine
mus-
ie die
iebt,
nie-
nt,
—
so
die
.
en
er
n



ab, ist am hintern Theile seiner Außenseite auf gleiche Art langsehnig, mit dem Schenkelbeinmuskel vermischt, doch im Ganzen kürzer und schmaler, unten aber dicker, bis er sich endlich nochmals schmälert, und mit einer breiten, weniger starken, doch bis zum Knie herunter Fleisch aufnehmenden, inwendig später anfangenden, Sehne ebenfalls vorzüglich an den innern Rand der Kniescheibe festsetzt, mit dem hintern Theile der Sehne des geraden Schenkelmuskels vereinigt, und auch bis zum obern Ende des Schienbeins und zu der starken Fortsetzung dieser Sehne, welche die Kniescheibe an das Schienbein befestigt, absteigt, auch hinterwärts sich den Sehnenbinden des Ober- und Unterschenkels einmischt.

Abweichung.

Bisweilen kommt sowohl der äußere als innere dicke Muskel bloß von der rauhen Leiste ³.

Wirkung.

Strecken das gebogene Kniegelenk, indem sie entweder das Schienbein gegen den Schenkel anziehen, oder den Schenkel auf dem Schienbeine in die Höhe richten. — Ist das Knie gebogen, so wendet es der äußere mit dem Spanner der Schenkelbinde einigermaßen nach außen.

3) Schenker.

Schenkelbeinmuskel

Cruralis.

Albinus Tab. XXIII. Fig. 7.

§. 299.

Kommt mitten zwischen den beiden dicken Schenkelmuskeln vom vordern Theil der Fläche des Schenkelbeins, ist zwar mit beiden dicken Schenkelmuskeln oberhalb, doch meist mit dem innern der ganzen Länge nach unzertrennlich verbunden, anfangs schmal und dünne, dann etwas breiter und dicker, bis er wieder abnimmt, und von außen schon sehr hoch in eine Sehne übergeht, mit der er sich hinter der gemeinschaftlichen Sehne des geraden und der dicken Schenkelmuskeln an die Kniescheibe festsetzt, nachdem sie sich völlig untereinander vereinigt haben; hinterwärts läßt sich jedoch diese kurze, breite, nicht sehr dicke Sehne von der gemeinschaftlichen unterscheiden. — Zwischen ihr, dem Schenkelbeine, der Gelenkkapsel und der Kniescheibe, liegt ein Schleimsack, der bisweilen mit der Gelenkhöhle Verbindung hat ². Von dem untern Rande der Kniescheibe erstreckt sich eine starke Fortsetzung dieser Sehne bis zum rauhen Höcker des Schienbeins, die man gemeiniglich das Kniescheibenband zu nennen pflegt.

2) Monro Tab. 3. Z. desgl. Tab. 4. G.



Wirkung.

Streckt das Knie.

Seltener Kniegelenkmuskel.

Articularis Genu³ oder Subcruralis.

Albinus annot. acad. Libr. 4. Cap. 5. p. 27. Tab. V.

§. 300.

Bisweilen findet sich ein kleinerer, bisweilen größerer Muskel, der vorwärts vom unteren Theile des Schenkels kommt, und sich mit zwey auseinander gehenden, am Ende sehnigen Zipfeln zu beiden Sei-

Sehnen in Kniegelenk verläuft und sich in die Gelenkkapsel festsetzt.

g. Hoffmann Lehrb. 13. 371. p. 372.

Hand. Anat. Helveticae

p. 64

Wirkung.

Scheint das Kniegelenk bey der Streckung desselben zu spannen.

Schambeinmuskel.

Pectineus.

Albinus Tab. XXII. Fig. 5. 6.

§. 301.

Könnte als die erste Portion des drehbäuchigen Schenkelmuskels angesehen und mit ihm vierbäuchiger Schenkelmuskel genannt werden.

3) Huber in den actis helveticis Vol. 3. p. 250. wieder abgedruckt in Sandiforts Thesaurus Diss. Vol. II. p. 250.

Kommt dünnsehnig von der obern scharfen Leiste am Horizontalaste des Schaambeins, geht darauf mit seinen Fleischfasern nach unten, außen, und etwas nach hinten, wird darauf viel dicker, zulezt aber viel dünner, doch nur wenig schmaler, — und setzt sich mit seiner dünnen, kurzen, gewöhnlich mit dem kleinsten Bauche des dreybäuchigen vereinigten, Sehne an die rauhe, vom kleinen Rothhügel absteigende Leiste des Schenkels fest. — Zwischen seiner Sehne und dem Schenkel findet sich ein Schleimsack ⁴.

A b w e i c h u n g.

Ist bisweilen gespalten oder doppelt.

W i r k u n g.

Hebt den Schenkel vorwärts in die Höhe, beugt das Pfannengelenk, und dreht die Außenseite des Schenkels auswärts. — Zieht den Schenkel gegen den andern. — Neigt das Becken, und dadurch auch den Rumpf vorwärts herunter.

Dreybäuchiger Schenkelmuskel.

Triceps femoris. Triceps adductor femoris.

S. 302.

Der lange oder mittlere Bauch (Abductor longus Albin, Tab. XXII. Fig. 1. 2.) kommt mit einer schmalen Sehne größtentheils von der Schaam-

⁴) Monro Tab. 3. M.

beinvereinigung, und vom obern Höcker an derselben, geht inwendig bald in Fleisch über, welches allmählig breiter und dicker wird, zur Mitte der Länge des Schenkels wie der Schaambeinmuskel absteigt, bis es wieder unter seiner Mitte sehr abnimmt, und in eine dünne, vornen und hinten früh anfangende Sehne sich verwandelt, — die sich an die rauhe Leiste des Schenkels festsetzt. Bisweilen schiebt er unterhalb eine dünne sehnige Portion abwärts, die entweder mit dem großen Bauche zum innern Gelenkknopfe gelangt, oder die sich mit dem innern dicken Muskel vereinigt.

Der kurze oder kleine Bauch (*Adductor brevis* Albin. Tab. XXII. Fig. 3. 4.) kommt gleich unter dem vorigen von dem Schaambeine, und mit einer kleinen Portion auch von der Schaambeinvereinigung. Seine Gestalt, seine Enden, seine Mitte und seine Wirkung sind, wie die des langen Bauches, mit dem er auch gewöhnlich, so wie mit dem Schaambeinmuskel und innern dicken Muskel am Schenkelende zusammenhängt, beschaffen; nur läuft er queerer, und setzt sich auch höher, indem er wohl dünner, aber nicht schmaler wird, an die rauhe Leiste, gleich unter dem kleinen Knochelhügel fest. — Bisweilen ist er der Länge nach in zwey Stücke gespalten.

Der große oder stärkste Bauch (*Adductor mag-*

mus Albin Tab. XXII. Fig. 16. 17.) kommt zunächst unter dem kurzen Bauche vom äußern Theile des Randes des Schaambeins, von der Schaambeinverbindung an bis zum Höcker des Sitzbeins, und vom äußern Rande des Sitzbeins selbst. Dst ist der kleine vom Schaambeine kommende Theil vom größern, vom Sitzbeinhöcker kommenden, vorne durchaus abgetrennt. Er wird allmählig breiter und dicker, und geht mit seinen obern Fasern fast queer, mit den untern immer schief, und zuletzt fast gerade absteigend gegen das Schenkelbein, an welches er sich, nachdem er dünner geworden, mit zwey sehnigen Enden festsetzt; — mit dem obern Ende längs seiner ganzen hintern rauhen Leiste herunter, wo er mit dem kurzen Bauche des zweyhäuchigen Schenkelmuskels zusammenhängt; — mit dem untern kleinern, rundlichen Ende an die Mitte des obern Theils der innern Seite des innern Gelenkknopfs, erhält eine Portion vom mittlern Bauche, und hängt mit dem innern dicken Muskel zusammen.

W i r k u n g.

Zieht einen Schenkel an den andern; — hebt ihn in die Höhe, und wendet seine vordere Seite auswärts; — neigt durchs Becken den Kumpf vorwärts.

selben,
 allmäh-
 e des
 bis
 in
 Sehne
 e des
 halb
 der
 we
 kel
 ore-
 unter
 einer
 ung.
 seine
 mit
 am-
 kel-
 uee-
 ner,
 leich
 ist
 g-



Äußerer Hüftbeinlochmuskel.

Obturator externus.

Albinus Tab. XXII. Fig. 7. 8.

§. 303.

Kommt sehnig mit einem breiten Umfange vom vordern Theile des Schaam- und Sitzbeins, welchen der Schaambein- und dreybüchige Muskel übrig lassen, und von der vordern Hälfte des innern Randes des eysförmigen Lochs, hat anfangs ein dünnes Fleisch, welches allmählig dicker wird, strahlenförmig zusammenläuft, und hinten früher in eine flache, schmale, lange Sehne übergeht, welche mit der Gelenkkapsel zusammengeheftet und aufsteigend sich hinten an die innere Seite der Wurzel des großen Kollhügels festsetzt. — Zwischen ihm und dem Hüftbeine liegt ein Schleimsack 5.

Wirkung.

Zieht den Schenkel gegen das Becken, und dadurch gegen den andern Schenkel, und rotzt ihn nach außen. — Reigt durchs Becken den Kumpf nach innen.

5) Monr. Tab. 5. M.

259 263

W a d e n m u s k e l,

Gemellus und Soleus.

S. 304.

Zwey Bäuche oder Portionen (Albin's Gemellus Tab. XXIV. Fig. 10.) kommen sehnig gleich hinten über den Gelenkknöpfen vom Schenkelbeine; der äußere etwas tiefer, als der innere, von der scharfen Leiste gleich über der Ausbuchtung für den Kniekehlmuskel. Der innere besteht gewöhnlich aus einer obern, breitem, dünnern, und einer untern, schmälern, dickern Sehne. Beide werden auswendig viel früher, als inwendig, fleischig, hängen fest an der Gelenkkapsel, und steigen mit ihren Fleischfasern schief gegeneinander gerichtet am Unterschenkel hinab, doch bleiben sie an ihrer äußern Seite lange, bisweilen bis zum Ende, sehnig, nehmen bis über die Mitte ihrer Länge an Breite und Dicke zu, worauf sie zuletzt wieder schnell abnehmen, voneinander weichen, und sich mit einem elliptischen Umfange endigen. Gewöhnlich ist der innere Bauch stärker, steigt auch tiefer als der äußere.

Bisweilen vermischen sich diese beiden Bäuche miteinander, meist aber sind sie so lange getheilt, bis sie sowohl untereinander, als mit dem Fleische des dritten Bauches in eine gemeinschaftliche Sehne zusammenstoßen.

vom
elchen
übrig
Nan-
nes
ig
de,
Be-
hin-
Roll-
beine

rch
auf
en.



Diese Sehne zeigt sich inwendig in diesen Bäuchen schon frühe, ist anfangs am breitesten und dünnsten: jemehr sie aber absteigt, desto schmaler und unzertrennlicher mit der Sehne des mittleren dritten Bauches verwebt.

Dieser dritte stärkste oder mittlere Bauch (Albin's Soleus Tab. XXIV. Fig. 8. 9.) kommt sowohl vom hintern Theile des obern Endes, als größtentheils von der hintern rauhen Leiste des Wadenbeins, ferner von der hintern Hervorragung des Schienbeins, die von seinem obern Ende schief abwärts läuft, und wo diese aufhört, vom hintern Rande der innern scharfen Leiste des Schienbeines. — Diese Anfänge sind spitzig, dünne und sehnig, bilden aber bald einen breitem und dickern Bauch, der schon vor der Mitte seiner Länge wieder abnimmt, in einer schiefen Richtung zur Sehne der beiden erstern Bäuche stößt, und mit ihnen eine gemeinschaftliche, kurze, dicke, rundliche, von hinten und vorne flache, im Fortgange sich schmälernde, zuletzt aber wieder sich ausbreitende Sehne (Tendo Achillis) bildet, — die sich an den hintern und untern Theil des Fersenbeines festsetzt.

Hinterwärts und inwendig nämlich ist dieser Bauch schon gleich anfangs sehnig; außerdem aber findet sich im Fleische ein ansehnlicher sehniger Theil, der wie das Fleisch beschaffen ist; anfangs nämlich

schmal, dann in der Mitte dicker, dann zuletzt wieder schmaler. Diese Sehne scheidet also das Fleisch, welches mit seinen Fasern von beiden Seiten schief gegen sie convergirt, gleichsam in zwey Hälften, so daß sich selbst nach außen und hinten eine Furche zeigt. Auf der äußern Seite hört das Fleisch früher auf, sich an sie zu legen, ist daher auch nicht so dick, als auf der innern. Auch ist das Fleisch vorwärts auswendig vom Anfange an sehnig, und bleibt von beiden Seiten eine Strecke lang, so daß sich von der Mitte der Länge des Muskels an ein dünnes Fleisch zur mittlern scheidenden Sehne herabläßt.

Zwischen dem innern Bauche, dem halbmembranösen Muskel und der Gelenkkapsel, liegt ein Schleimsack ⁶, und innerhalb diesem ein kleinerer ⁷ der mit der Gelenkhöhle in Verbindung steht.

Ferner liegt zwischen dem Ende der Sehne und dem obern Theile des Fersenbeines ein Schleimsack ⁸, weil nämlich bey der Beugung der Fußwurzel sich hier die Sehne am Knochen reibt.

A b w e i c h u n g.

Bisweilen kommt vom äußern Rande seiner Sehne eine anfangs sehnige, dann fleischige Portion, die sich

6) Monro Tab. 5. f.
 7) Monro Tab. 5. g.
 8) Monro Tab. 5. t.



endlich als eine dünne Haut auf der Mitte der Wade in die Sehnenbinde des Unterschenkels verliert, und sie spannt? — Nicht selten findet sich in der Sehne seines äußern Bauches ein Knöchelchen 1.

Wirkung.

Streckt den Fuß so, daß die Ferse in die Höhe geht, die Sohle hinterwärts schaut, und der Unterschenkel schief von vornen nach hinten sich neigt. — Widerstehen ihm die Schienbeinstrecker, so stemmt er den Fuß fest. — Durch die beyden obern Portionen beugt er auch das Kniegelenk.

Langsehniges Muskelchen.

Plantaris.

Albinus Tab. XXIV. Fig. II.

S. 305.

Kommt sehnig über dem äußern Gelenkknopfe vom Schenkelbeine und vom Kapselbände. Sein Fleisch ist anfangs dünne und schmal, dann etwas

9) Mayer, Band 3. Seite 535.

1) Weitbrecht Syndesmologia. Tab. 19. Fig. 57. k. Heister Compend. anat. Tab. I. Chirurgische Wahrnehm. Observ. 3^{te} und Bertin wollen sie doppelt gesehen haben, falls nicht eines davon ein solches Knöchelchen war, dergleichen man in den Schleimsäcken findet. Camper Diss. de Fractura Patellae. Haag 1789. Tab. I. Fig. I. k. behauptet, daß es sich im Menschen nie in der innern Sehne finde.

breiter und dicker, bis er gleich unter dem Kniegelenke früher von hinten, als vornen, in eine Sehne übergeht, die als die schmälfte, dünne und längste im ganzen Körper zwischen den Bäuchen, darauf längs der innern Seite der Sehne des Wadenmuskels herabläuft, sich ausbreitend oder gespalten neben derselben ans Ferseubein verliert.

A b w e i c h u n g.

Fehlt zuweilen. *ist bei manchen gering häufiger, kann einen sehr großen Theil der Bewegung des Kniees ausmachen*

Wirkung. *Vagus operatur an? Spindelkette folgt*

Sein Nutzen ist nicht deutlich ², doch scheint er wie eine Portion des Wadenmuskels zu wirken. — *Hallischer Lit. Zeitg 1788. N. 153.*

Dient er vielleicht, um die Falten der Gelenkkapsel bey starkem Beugen des Knies, — oder umgekehrt, das Falten des Kapselbandes des Fußgelenks zu hindern? oder den Schleimsack am Ende der Sehne des Wadenmuskels zu bewegen. *Siehe in einem Anhang des plantaris fistulae in dem Traktat von der Apoplexie und dem Trismus des Kinns in vinerischen Kniegelenk in vinerischen Traktat vom Kniegelenk*

2) Fourcroy Mem. de l'Acad. de sciences à Paris 1787. Seite 307. und Monro on bursae mucosae, S. 19. glauben, er diene, um das tranfige Wesen im Schleimsacke an der Sehne am Ferseubeine zu pressen, und den Schleimsack zu bewegen. Ersterer will bemerkt haben, daß dieser Schleimsack kleiner, feiner und schwächer sey, wenn das Muskeltchen fehlt: allein die Sehne verliert sich ja nicht in dieses Wesen. — Auch könnte der Muskel dazu näher liegen und seine Sehne folglich kürzer seyn. Die Ursache, weshalb er als ein abgesonderter Muskel erscheint, ist also noch auszumachen. *ist kleiner und liegt der Seite von der Sehne an der Ferse*

Wade
und
Sehne
höhe
unter
er
n
ein
das
k.
hre
welt
die
p.



Kniekehlmuskel.

Popliteus.

Albinus Tab. XXIII. Fig. 1.

§. 306.

Kommt stark sehnig, theils auß der Vertiefung unten an der äußern Seite des äußern Gelenkknopfs des Schenkelbeines, theils sehnig und fleischig von der Mitte des hinteren Theils des äußern mondformigen Knorpels, oder vom Kapselbande, wo ein mit der Gelenkkapsel in Verbindung stehender Schleimsack liegt. Er wird darauf bis zum Ende im schrägen Absteigen breiter, und schon von der Mitte seiner Länge an sehnig; — und setzt sich an den innern Rand des Schienbeins hinten gleich unter seinem obern Ende fest.

A b w e i c h u n g.

Man will ihn doppelt gesehen haben 3.

W i r k u n g.

Unterstützt die Kniebeugung. — Zieht den äußern mondformigen Knorpel nach hinten und unten. — Ist das Knie gebogen, so dreht er das Schienbein nach innen oder gegen das andere. Scheint einigermassen dem runden Vorwärtswender am Arme ähnlich.

3) Fabricius ab Aquapendente de motu animal.

Langer gemeinschaftlicher Zehenbeuger.

Flexor longus digitorum Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 6. 7. 8.

S. 307.

Kommt sehnig und dünne, längst der hintern Fläche des Schienbeins, und vom Bande zwischen dem Schien- und Wadenbeine, wird allmählig dicker und breiter, so daß er ohngefähr in der Mitte der Länge des Schienbeins, die ganze Breite des Schienbeins einnimmt; darauf wird er wieder schmaler, indem er ferner sehnig von dem gegen das Wadenbein gerichteten Rande des Schienbeins kommt. — Seine Fasern legen sich gegeneinander neigend an die Sehne, die sich inwendig schon zuoberst zeigt; sie entsteht am frühesten auswendig, sodann am innern Rande, ist rundlich, geht schief hinter dem innern Knöchel des Schienbeins herunter, und indem sie dicker, breiter und härter wird, schlägt sie sich in einer eigenen Rinne des Fersenbeins und durch ein sehniges Band umschlossen zur Fußsohle, in der sie wieder sich schmalernd schief vorwärts läuft.

In der Mitte der Fußsohle wird sie breiter, hat mit der Sehne des langen Beugers der großen Zehe einen gemeinschaftlichen Schleimsack ⁴ um sich liegen,

4) Moro Tab. 6. H. K. M. L.

und theilt sich, wie der Spalter in der Hand, in vier auseinander gehende Sehnen für die vier Zehen, außer der großen, und dient zur Anlage der Spulmuskeln. Diese Sehnen laufen dünne, rundlich, nach der Größe der Zehen verschieden an Stärke, und wie aus zwey gleichen Hälften zusammengesetzt durch die gespaltenen Sehnen des kurzen Zehenbeugers, bis sie an das vordere Ende der Mittelfußknochen kommen, wo sie anfangs breiter, flacher, dicker, härter, dann aber wieder schmaler und weicher werden, bis sie wieder in der Klammer auf dem ersten Gliede schmaler werden, dann auf dem Gelenke zwischen dem ersten und zweyten Gliede wieder breiter, dicker und härter, darauf wieder in der Klammer auf dem zweyten Gliede schmaler werden, bis sie sich verdünnen, ausbreiten und an die Wurzel des Nagelgliedes verlieren. Sie liegen in ihren Schleimsäcken, bis auf die Bändchen, die ihnen Gefäße zu- und abführen, ringsum frey.

Bisweilen sind diese Sehnen, indem sie durch die Sehnen des kurzen Beugers dringen, mit ihnen, besonders an der kleinen Zehe, verwachsen.

Zu dieser Sehne stößt aber in der Fußsohle eine ansehnliche Fleischportion, die vom untern Rande, und von der ganzen innern Seite des Höckers des Fersenbeins kommt, vorwärts lauft, anfangs sehnig, dünne und breit ist, dann ganz fleischig, und allmäh-

lig

lig dicker wird, bis sie mit einem dünnern Ende sich an den obern und äußern Seitentheil jener Sehne, ehe sie sich theilt, festsetzt. — Bisweilen bildet diese Sohlenportion, nachdem sie sich mit jener Sehne vereinigt hat, vier nach der Stärke der Zehen verschiedene Portionen.

Bisweilen bildet sie nur eine starke Sehne, die mit der Portion des langen Beugers der großen Zehe und mit dem langen Beuger der übrigen Zehen vereinigt, sich in starke kurze Sehnen spaltet, die sich an die Sehne des langen Beugers für die zweyte und dritte Zehe begeben, außer einer kleinen Portion, die sich an den vierten Spulmuskel legt.

Wirkung.

Beugt die Nagelglieder der vier Zehen, außer der großen, und dadurch zuletzt auch die zwey übrigen Glieder. — Beugt den Fuß im Gelenke der Knöchel nach hinten, und zieht ihn rückwärts und innwärts.

Spulmuskeln der Fußsohle.

Lumbricales.

Albinus Tab. XXV. Fig. 8.

S. 308.

Sind in Ansehung ihres Anfangs und Endes, ihrer Lage, Gestalt und Wirkung den gleichnamigen an der Hand ähnlich.

E. Muskellehre.

Na

Der erste Spulmuskel für die zweyte Zehe kommt theils von der Sehne des langen Beugers der großen Zehe, theils von der Sehne des Beugers der folgenden Zehe. — Der zweyte aus dem Winkel zwischen den Sehnen für die zweyte und dritte Zehe. — Der dritte aus dem Winkel zwischen den Sehnen für die dritte und vierte Zehe. — Der vierte für die fünfte oder kleinste Zehe bloß von der äußern Seite der Sehne für die vierte Zehe. — Statt dessen geht bisweilen eine dünne Sehne vom langen Beuger der Zehen ab.

Bisweilen erhalten alle, oder der vierte Spulmuskel allein, anfangs von außen sehnige Portionen von der Fußsohlenportion des langen Zehenbeugers.

Sie verlieren sich mit ihren Sehnen theils an die Wurzel des ersten oder hintersten Gliedes, theils an die Sehne des langen Streckers der Zehen.

Wirkung.

Wirken wie die Spulmuskeln in der Hand.

Langer Beuger der großen Zehe.

Flexor longus Pollicis Pedis.


Albinus Tab. XXV. Fig. 8. 10.

§. 309.

Kommt, wie der lange gemeinschaftliche Zehenbeuger vom Schienbeine, sehnig von den untern Zwey- dritteln der Länge des Wadenbeines, fast bis zum

Knöchel herunter. Sein anfangs schmales und dünnes Fleisch wird dicker und breiter, bis es, nachdem es eine Weile lang einerley Breite hatte, schnell wieder abnimmt.

Das Schiefes gegen das Schienbein




Handwritten text on the paper fragment, written upside down:
Mit einem ...
nicht ...
... 25 ...

einem Schleimsacke 7, tritt breiter, dicker und härter zwischen den Sehnenbeinchen durch, wird flacher durch eine Klammer auf dem ersten Gliede festgehalten, setzt,

- 5) Monro Tab. 5. x. y.
- 6) Monro Tab. 5. w. w.
- 7) Monro Tab. 6.

U a 2

Der erste Epulmuskel für die zweyte Zehe kommt
theils von der Sehne des langen Beugers der großen
Zehe, theils von der Sehne des Beugers der folgen-
den Zehe. — Der zweyte aus dem Winkel zwischen
den Sehnen für die zweyte und dritte Zehe. — Der



Flexor longus Pollicis Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 8. 10.

§. 309.

Kommt, wie der lange gemeinschaftliche Zehen-
beuger vom Schienbeine, sehnig von den untern Zwey-
dritteln der Länge des Wadenbeines, fast bis zum

Knöchel herunter. Sein anfangs schmales und dünnes Fleisch wird dicker und breiter, bis es, nachdem es eine Weile lang einerley Breite hatte, schnell wieder abnimmt.

Seine Fasern laufen schief gegen das Schienbein hinab, gehen endlich in eine Sehne über, die sich an der gegen das Schienbein gerichteten oder innern Seite sehr früh mitten im Fleische zeigt.

Diese Sehne läuft schief hinter dem Schienbeine in einem Canal ⁵, der aus einer glatten Rinne des Sprung- und Fersenbeines, und eigenen Bändern gebauet ist, mit einem Schleimsacke ⁶ umgeben, unter die Sehne des langen gemeinschaftlichen Zehenbeugers, liegt frey und ist bloß durch ein Gefäßband mit diesem Canale befestigt, und an dieser Stelle etwas breiter und härter, geht in der Fußsohle unter dem großen Zehen fort, schickt eine schmale Portion zu der noch ungetheilten Sehne des langen gemeinschaftlichen Zehenbeugers ab, ist bis zur Wurzel des ersten Gliedes der großen Zehe, schlank und rundlich, liegt in einem Schleimsacke ⁷, tritt breiter, dicker und härter zwischen den Sehnenbeinchen durch, wird flacher durch eine Klammer auf dem ersten Gliede festgehalten, setzt,

5) Monro Tab. 5. x. y.
6) Monro Tab. 5. w. w.
7) Monro Tab. 6.

kommt
großen
folgen
zwischen

hen
um



sich am Nagelgliede ausbreitend, und meist ein Sehnenbeinchen enthaltend, fest; und ist durchaus durch eine sehr sichtliche Scheidungslinie in zwey Hälften getheilt.

Abweichungen.

Seine zur Sehne des langen gemeinschaftlichen Zehenbeugers gehende Portion vereinigt sich bisweilen theils mit dessen Sohlenportion, theils mit der zur zweyten Zehe gehenden Portion, und dem ersten Spulmuskel. — Bisweilen beträgt diese Portion fast die Hälfte der ganzen Sehne, und spaltet sich für die zweyte und dritte Zehe in zwey Sehnen, die selbst stärker als die vom langen Beuger für diese beyden Zehen kommenden Sehnen sind ⁸. — Bisweilen vereinigt sie sich ganz mit der Sehne, die die Sohlenportion zum langen gemeinschaftlichen Zehenbeuger schiebt, so daß die aus dieser Vereinigung entstandene Sehne an die zweyte Zehe geht. — Bisweilen erzeugt die Sehne des langen gemeinschaftlichen Zehenbeugers eine dünne Portion, ehe die Sohlenportion zu ihr stößt, die sich mit der Sehne des langen Beugers der großen Zehe vereinigt. — Bisweilen fehlt die vierte Sehne für die kleine Zehe ⁹.

Wirkung.

Beugt die Glieder der großen Zehe im zweyten

8) Schenzer.

Hanfmanns Jagetbuch. Decem. 1719.

9) Mayer Band 3. Seite 555.

Gelenke, und wegen der Sehnenklammer auch im ersten Gelenke. — Unterstützt den langen gemeinschaftlichen Zehenbeuger, so wie er auch wechselseitig von ihm unterstützt wird. — Unterstützt den ersten Spulmuskel, insoferne er dessen Anfang befestigt. — Beugt auch das Fußgelenk am Sprungbeine. — Scheint auch die Gelenke zwischen dem Kahn-, Würfel- und Sprungbeine zu bewegen.

Hinterer Schienbeinmuskel.

Tibialis posticus.

Albinus Tab. XXIV. Fig. 13. 14.

§. 310.

Kommt von der ganzen gegen das Schienbein gewendeten Fläche des Wadenbeines, von ihrem obern Ende an über Dreyviertel ihrer Länge herunter; ferner von der hintern Fläche des Schienbeines, von der Stelle an, wo sich das Wadenbein anlegt; und vom Bande zwischen dem Waden- und Schienbeine.

Er ist anfangs und von außen lange sehnig, dünne, dann breiter, hinten gleichsam plattgedrückt, liegt mehrentheils im Zwischenraum des Schien- und Wadenbeines, wird dann wieder dünner, bis er in eine Sehne übergeht, die sich früh in der Mitte oft in beyden Portionen, sowohl der vom Wadenbeine, als der vom Schienbeine zeigt, und gegen die sich die

Fleischfasern von beyden Knochen schief anlegen, vom Wadenbeine bis nahe über den Knöchel herunter.

Diese Sehne läuft schief herüber unter den innern Knöchel, in einem ihr eigenen aus dem Knöchel und einem Bande gebildeten Canal in die Fußsohle, ist hier dicker, breiter, flacher, härter, mit einem Schleimsack^e umgeben,

und setzt sich mit ihrer Hauptportion an den Höcker des Kahnbeins, die weiter nach vornen zu an den untern Theil des ersten Keilbeins einen kleinen Theil abschickt; mit einer kleinern Portion, die in einer Rinne des Kahnbeins fortläuft, setzt sie sich, nachdem sie einen harten, flachen, eysförmigen bisweilen wahren knöchernen Knoten oder ^{den} Sehnenknoten gebildet hat, größtentheils an die Hervorragung des innern Keilbeins, theils mit einem oder zwey Streifen an den Mittelfußknochen der Mittelsten; bisweilen auch der zweyten Zehe; bisweilen auch eine oder zwey Portionen ans Würfelbein; bisweilen auch eine kleine Portion ans äußere Keilbein; bisweilen auch eine einfache oder faserige Portion zum Anfang des kurzen Beugers der großen Zehe.

Wirkung.

Streckt den Fuß so, daß die Sohle nach hinten

9) Monro Tab. 5. ZZ. Tab. 2. N.

schauf, zieht ihn rückwärts; oder steht der Fuß fest auf dem Boden, so zieht er den Unterschenkel nach hinten herunter. — Zieht den unter dem Knöchel frey hängenden Fuß nach innen und hinten, so daß die Sohle nach oben zu schauen anfängt. — Scheint bey jüngern Personen auch die Fußwurzelknochen, an die er sich festsetzt, zu bewegen.

Unterschenkelbinde, oder Sehnen Scheide des Unterschenkels.

Ihren untern Theil s. Barth Muskelchre Tab. 34.

S. 311.

Erstreckt sich von der Stelle, wo oben das Waden- und Schienbein aneinander liegen, mit der Sehnenbinde des Schenkels und der Sehne des zweybäuchigen Schenkelmuskels zusammenhängend, längs dem Waden- und Schienbeine herunter. Sie besteht aus deutlichen Fasern, die vom Schienbeine schief, vom Wadenbeine gerader absteigen. Oberhalb ist sie stärker, nach unten zu allmählig schwächer. — Zwey Fortsetzungen von ihr begeben sich zwischen die Muskeln. Die eine schwächere liegt zwischen dem langen Zehenstrecker und dem vordern Schienbeinmuskel, und verliert sich auf letzterm; die zweyte stärkere liegt von einer Seite zwischen dem langen und dem kurzen Wadenbeinmuskel, von der andern zwischen dem langen

gen, vom
ter.
den in-
Knöchel
ußohle,
t einem
Häcker
r un-
ab-
inne
m so
abren
t hat,
Keil-
den
ch der
ortio-
Por-
fache
ugers
inten



Streckter und dritten Wadenbeinmuskels, und geht bis zum dreyeckigen, fleischleeren Raume am äußern Knöchel herunter, wo sich ihre Fasern kreuzen. Von ihr kommen Fleischfasern für die oben genannten Muskeln.

Langer Wadenbeinmuskels,

Peroneus Longus.

Albinus Tab. XXV. Fig. 4. 5.

S. 312.

Kommt größtentheils vom äußeren Theile des obern Endes des Wadenbeines, und gewöhnlich auch in etwas vom obern Ende des Schienbeines, kleinern Theils fleischig, dünne und breit von der äußern scharfen Leiste des Wadenbeines, zum Theile auch von der ihn bedeckenden Sehnenbinde des Unterschenkels.

Seine Fasern laufen schräg vorwärts herunter, und bilden langsam einen länglichen Bauch, der schneller abnimmt, als er zunahm.

Gegen die Mitte des Unterschenkels fängt seine Sehne sich zu zeigen an, die zuerst breit und dünne, dann allmählig schmaler und dicker wird, hinter dem äußern Knöchel unter die Sehne des kurzen Wadenbeinmuskels, mit der er in einem Schleimsacke durch ein Bändchen zusammenhängt, in der Rinne des Ferse- und Würfelbeines mit einem starken Bande um-

1) Monro Tab. 5. P.

geschlossen sich in die Fußsohle herumschlägt, schief vorwärts läuft, und sich etwas ausgebreitet an den ersten und zweyten Mittelfußknochen, und an das große Keilbein festsetzt.

A b w e i c h u n g e n .

Bisweilen setzt sich die Sehne bloß an den Mittelfußknochen der großen Zehe; — bisweilen auch ans Band zwischen eben dem Mittelfußknochen und dem großen Keilbeine. — Bisweilen geht sie in den Anfang des ersten äußern Mittelfußmuskels der zweyten Zehe über. — Bisweilen findet man in der Sehne gleichsam Knoten, oder breite, harte, feste, knorpelige, fast knochenharte, glatte, länglich runde Körper, den größten, wo sie sich auf dem Würfelbeine reibt, einen kleinern am Höcker des Fersenbeines, den kleinsten am Knöchel, bisweilen auch wohl noch einen vierten kleinen Knoten gleich vor dem Würfelbeine.

W i r k u n g .

Streckt den Fuß; wendet die Fußsohle nach außen, ein wenig nach hinten, und macht sie hohl. — Lehnt den Unterschenkel hinterwärts, wenn der Fuß feststeht. — Macht den Mittelfußknochen der großen und zweyten Zehe gegen die Erde streben. — Bewegt auch die Zusammensetzung des Würfelbeines mit dem Fersenbeine, des Schiffbeines mit dem Sprungbeine, und des Fersenbeines mit dem Sprungbeine.

geht bis
rn Kno-
Von ihr
Muskeln.

des
auch
neen
Char-
den des
s.
unter,
der

seine
inne,
dem
aden-
Durch
Zer-
um-

Kurzer Wadenbeinmuskel.

Peroneus brevis.

Albinus Tab. XXIV Fig. 1. 2.

S. 313.

Kommt vom Wadenbeine, nicht weit über der Mitte seiner Länge, bis zum Knöchel herunter, meist von seiner äußern Fläche, unten aber von seiner hintern Leiste, ferner von der Sehnenbinde des Unterschenkels, ist anfangs dünne und schmal, dann dicker und breiter, bis seine schiefabsteigende Fleischfasern abnehmen, und in sehnige übergehen.

Seine Sehne entsteht früh, mitten im Fleische, beugt sich an der äußern Seite des Unterschenkels hinten um den äußern Knöchel in einen für sie und die Sehne des langen Wadenmuskels gemeinschaftlichen, aus einer Furche am Knöchel und einem Bande gebildeten Canal, krümmt sich nach vornen, geht unter dem Knöchel am obern Theile des Höckers des Fersenbeines mit einem zweyten Bande umschlossen, welches sie gleichfalls mit dem langen Wadenmuskel gemein hat, doch in einem eigenen Canal und eigenen Schleimsacke² läuft,

und setzt sich, bisweilen in Fasern gespalten, an den obern und hintern Theil der Wurzel des Höckers des Mittelfußknochens der kleinen Zehe.

2) Monro Tab. 5. 9.

269 273

Abweichung.

Bißweilen geht die Sehne gespalten zum Höcker des Mittelfußknochens und zur Wurzel des ersten Gliedes der kleinen Zehe. ^{Behrend.} Bißweilen sah man noch einen kürzern Wadenbeinmuskel.

Wirkung.

Wirkt wie der lange Wadenbeinmuskel, außer daß er noch den Mittelfußknochen rückwärts und aufwärts, und von den andern Mittelfußknochen zieht, folglich die Sohle breiter macht.

Vorderer Schienbeinmuskel.

Tibialis anticus.

Albinus Tab. XX. Fig. 6.7.

S. 314.

Kommt gleich unter dem Knie vom obern Ende und der äußern Fläche des Schienbeins, fast bis zur Mitte seiner Länge, zum Theile auch von der Membran zwischen dem Waden- und Schienbeine, und von der Sehnenhaut des Unterschenkels. —

Er ist anfangs schmal und dünne, dann dicker und breiter, bis er sich schmälert, und unter der Mitte des Unterschenkels in eine Sehne übergeht, die, sobald sie vom Fleische verlassen ist, von vornen rundlich, von hinten flach aussieht, dann platter wird, auf dem Rücken der Fußwurzel in einem eige-



nen, in beyden Hörnern des Querbandes befindlichen Canale, und mit einem eigenen Schleimsacke ² umgeben, schief nach innen lauft, unterdessen allmählig breiter wird,

und sich gespalten mit dem stärksten Theile an den innern und untern Theil des großen Keilbeins, mit dem kleinern an den benachbarten ersten Mittelfußknochen festsetzt. — Zwischen ihr und dem Rücken des Fußes liegt ein Schleimsack.

Wirkung.

Beugt den Fuß vorwärts in die Höhe gegen den Unterschenkel schief inwärts — neigt umgekehrt den Unterschenkel bey aufstehendem Fuße gegen den Fußrücken — beugt das Gelenk des Unterschenkels mit dem Sprungbeine, des Würfelbeines mit dem Fersenbeine und des ersten Keilbeines mit dem Kahnbeine und dem ersten Mittelfußknochen.

Langer gemeinschaftlicher Streckter der Zehen.

Extensor longus digitorum Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 1.

S. 315.

Kommt dicht vor dem anliegenden Kopfe des Wadenbeines vom obern Theile und von der vordern Leiste des Schienbeines, ferner von der vordern Leiste

4) Monro Tab. 3. I.

des Wadenbeines und seiner auf diese Leiste folgenden Fläche, und von der Sehnenbinde des Unterschenkels. — Der Theil vom Schienbeine ist schmal, dünne und sehnig, wird allmählig dicker, besteht aus meist gerade absteigenden Fasern, und wird über der Mitte der Länge des Unterschenkels sehnig. — Der Theil vom Wadenbeine ist breit, fleischig und dünner, wird erst tiefer sehnig, und legt seine Fasern schief absteigend an die Sehne. Gewöhnlich hängt er mit dem dritten Wadenbeinmuskel unzertrennlich zusammen.

Sein Fleisch ist vornen rundlich, an den Seiten flacher, indem von der einen Seite der lange und kurze Wadenbeinmuskel, von der andern der vordere Schienbeinmuskel nebst dem eigenen Strecken der großen Zehe auf ihm liegt.

Seine Sehne zeigt sich anfangs mehr an der gegen das Schienbein gerichteten Seite, dann vorwärts, geht unter dem Querverbande in einem gemeinschaftlichen Canale mit dem dritten Wadenbeinmuskel durch, und theilt sich in vier kleinere Sehnen, die auf dem Rücken des Fußes breiter, flacher und dünner, dann aber wieder schmaler werden. Nachdem sich drey von ihnen auf dem Rücken der Zehen mit den Sehnen des kurzen Streckers der Zehen vereinigt haben, breiten sie sich vorwärts laufend über den Rücken der Zehen

aus, erhalten am Gelenke des ersten Gliedes mit dem Mittelfußknochen von der inneren Seite, theils von der Gelenkkapsel, theils vom Mittelfußmuskel, theils vom Spulmuskel, theils von der innern Seite des ersten Gliedes schnige Fasern, die mit ihnen und mit ähnlichen von der äußern Seite kommenden sich verweben, so daß an der letzten Zehe an der äußern Seite Fasern von der Sehne des Abziehers hinzu kommen.

Diese gemeinschaftlichen Sehnen verbreiten sich über den Rücken der Zehen, und setzen sich vorzüglich ans mittlere Glied der Zehen. An der innern Seite aber laufen sie weiter bis zum Nagelgliede, wo sie mit einer ähnlichen Fortsetzung des kurzen Streckers der Zehen zuletzt in einen Winkel zusammenstoßen.

Wirkung.

Streckt die drey Glieder der vier kleinen Zehen, und hebt sie inwärts in die Höhe. — Zieht die Zehen aneinander. — Beugt den ganzen Fuß schief, so daß er ihn schief gegen den Unterschenkel hinaufzieht. — Steht der Fuß fest auf, so neigt er den Unterschenkel nach vorne herüber. — Scheint auch die Zusammenfügung des Würfel- und Fersenbeines, und des Würfel- und Kahnbeines zu verändern.

Dritter Wadenbeinmuskel.

Peroneus tertius.

Albinus Tab. XXV. Fig. 1.

S. 316.

271
Stellt gewöhnlich nur die äußere und untere Por-
tion des langen gemeinschaftlichen Zehenstreckers vor,
sollte von ihm nicht abgesondert werden.

Kommt oberhalb, nach innen zu mit dem langen
gemeinschaftlichen Zehenstrecker zusammenhängend,
an der äußern Theile der Fläche des Wadenbeines, und
an der Sehnenbinde des Unterschenkels. Ist anfangs
breit und dünne, sonach aber schmaler, und zeigt
deutlich seine Sehne, an die sich die Fleischfasern
aufsteigend legen.

Diese Sehne ist flach, geht durch einen gemein-
schaftlichen Canal mit dem langen gemeinschaftlichen
Zehenstrecker, wird auf dem Rücken der Fußwurzel
breiter, dünner, und setzt sich ausbreitend ein-
mal gespalten an die Wurzel des Mittelfußkno-
chens der kleinen Zehe, dicht an dessen Vereinigung
mit der vorletzten Zehe, und bisweilen auch an den
Mittelfußknochen dieser vorletzten Zehe.

Wirkung.

Beugt den Fuß vorwärts und etwas auswärts
gegen den Unterschenkel herauf. — Steht aber der
Fuß fest, so neigt er umgekehrt den Unterschenkel

aus, erhalten am Gelenke des ersten Gliedes mit dem Mittelfußknochen von der inneren Seite, theils von der Gelenkkapsel, theils vom Mittelfußmuskel, theils vom Spulmuskel, theils von der innern Seite des ersten Gliedes sehnige Fasern, die mit ihnen und mit ähnlichen von der äußern Seite kommenden sich weben, so daß an der letzten Zehe an der äußern Seite Fasern von der Sehne des Abziehers kommen.

Diese gemeinschaftlichen Sehnen verbreiten sich über den Rücken der Zehen, und setzen sich vorwärts an das mittlere Glied der Zehen. An der inneren Seite aber laufen sie weiter bis zum Nagelgliede, wo sie einer ähnlichen Fortsetzung des kurzen Streckmuskels der Zehen zuletzt in einen Winkel zusammenstoßen.

Wirkung.

Streckt die drey Glieder der vier kleinen Zehen und hebt sie inwärts in die Höhe. — Zieht die Zehen aneinander. — Beugt den ganzen Fuß schiefer, daß er ihn schief gegen den Unterschenkel hinauf hebt. — Steht der Fuß fest auf, so neigt er den Unterschenkel nach vorne herüber. — Scheint auch die Zusammenfügung des Würfel- und Fersebeines, und die Stellung des Würfel- und Kahnbeines zu verändern.

Dritter Wadenbeinmuskel.

Peroneus tertius.

Albinus Tab. XXV. Fig. 1.

S. 316.

Stellt gewöhnlich nur die äußere und untere Portion des langen gemeinschaftlichen Zehenstreckers vor, und sollte von ihm nicht abgefordert werden.

Kommt oberhalb, nach innen zu mit dem langen gemeinschaftlichen Zehenstrecker zusammenhängend, vom untern Theile der Fläche des Wadenbeines, und von der Sehnenbinde des Unterschenkels. Ist anfangs breit und dünne, sonach aber schmaler, und zeigt schon früh seine Sehne, an die sich die Fleischfasern schief absteigend legen.

Diese Sehne ist flach, geht durch einen gemeinschaftlichen Canal mit dem langen gemeinschaftlichen Zehenstrecker, wird auf dem Rücken der Fußwurzel etwas breiter, dünner, und setzt sich ausbreitend einfach oder gespalten an die Wurzel des Mittelfußknochens der kleinen Zehe, dicht an dessen Vereinigung mit der vorletzten Zehe, und bisweilen auch an den Mittelfußknochen dieser vorletzten Zehe.

Wirkung.

Beugt den Fuß vorwärts und etwas auswärts gegen den Unterschenkel herauf. — Steht aber der Fuß fest, so neigt er umgekehrt den Unterschenkel

es mit dem
theils von
kel, theils
Seite des
und mit

Handwritten notes on the left margin, including a small sketch of a foot and some illegible text.



gegen den Fußrücken. — Bewegt die Zusammensetzung des Fersenbeins mit dem Würfelbeine, des Kahnbeins mit dem Sprungbeine, und des Sprungbeines mit dem Fersenbeine.

Streckter der großen Zehe.

Extensor proprius Hallucis, oder Pollicis Pedis.
Albinus Tab. XXV. Fig. 11.

§. 317.

Kommt von der vordern gegen das Schienbein gefehrten Fläche, und der vordern Leiste des Wadenbeines, von der Membran zwischen dem Schienbeine und Wadenbeine, hieweisen auch unterhalb in etwas vom Schienbeine. Er ist anfangs dünne und schmal, aber breit, dann etwas stärker, von den Seiten gleichsam zwischen dem langen gemeinschaftlichen Zehenstrecker, dem dritten Wadenbeinmuskel und dem vordern Schienbeinmuskel zusammengedrückt, zeigt vorwärts und inwärts seine Sehne, an der die Fleischfasern schief abwärts liegen, die noch schiefer als der vordere Schienbeinmuskel durch beyde Hörner des Querbandes in einem eigenen Canale, und mit einem Schleimsacke umgeben ⁴⁾, zur großen Zehe herübergeht, auf deren Rücken sie sich verbreitet, an die Gelenk-

4) Monro Tab. 3. M.

Ienkkapseln zu beyden Seiten Fasern abschickt, und bis an die Wurzel des Nagelgliedes gelangt.

Abweichung.

Bisweilen biegt sich von seiner Sehne ein kleiner Theil entweder zur innern Seite der großen Zehe, oder auch zur Sehne, die vom kurzen Strecker zur großen Zehe herübergeht.

Wirkung.

Streckt beyde Glieder der großen Zehe. — Hilft den Fuß gegen den Unterschenkel in die Höhe heben. — Bewegt die Fußwurzelknochen, wie der vordere Schienbeinmuskel, nur weniger einwärts.

Kurzer Zehenstrecker.

Extensor brevis digitorum Pedis 5.

Albinus Tab. XXV. Fig. 9.

§. 318.

Kommt theils sehnig, besonders auf der untern Fläche, theils fleischig auf dem Rücken des Fußes, vom obern Theile des Fersenbeinhockers, wird etwas breiter und dicker, geht in vier nach der Größe der Zehen an Stärke verschiedene Portionen auseinander, die allmählig sich schmalernd in dünne flache Sehnen übergehen, nämlich die für die große Zehe in der Mitte,

5) Nur selten findet sich ein analoger auf dem Rücken der Hand.

Die übrigen zuerst an der äußern Seite. Die erste dieser Sehnen setzt sich ausbreitend an die Wurzel des ersten Gliedes der großen Zehe fest, die drey übrigen legen sich an die äußere Seite der Sehnen des langen Zehenstreckers, gehen über das mittlere Glied, bis sie mit ähnlichen Fortsetzungen, die von der inneren Seite des langen Zehenstreckers kommen, sich vereinigen, und ans Nagelglied festsetzen. — Am Gelenke des ersten Gliedes mit dem Mittelfußknochen erhalten sie ähnliche sehnige Ausbreitungen, wie der lange Zehenstreckler.

Abweichungen.

Bisweilen ist eine Portion doppelt, so daß der ungewöhnliche Theil an die nächste Zehe geht. — Bisweilen ist die Portion für die große oder für die kleine Zehe, bisweilen sind alle durchaus voneinander abgesondert, und stellen vier einzelne Muskeln vor. — Bisweilen fehlt eine Portion, die aber durch eine Sehne des kurzen Wadenbeinmuskels ersetzt wird ⁶.

Wirkung.

Streckt alle Gelenke der Zehen, richtet sie aufwärts und etwas auswärts, und zieht hiebei die Zehen ein wenig auseinander.

⁶) Mayer, Band 3. Seite 502.

Sehnenhaut der Fußsohle.

Courcelles Icones Musculorum Plantae Pedis. L. D.
1739. 4to Tab. I.

Albinus Tab. X. Fig. 18. — Barth am angez. Orte.

S. 319.

Entspringt dick und stark vom Höcker des Fersenbeines, breitet sich sehr gespannt gegen die Zehen in fünf Streifen aus, deren Stärke sich nach der Größe der Zehen richtet. Ihre Hauptfasern laufen zwar der Länge nach, doch sind sie durch Querfasern verflochten. Auch dient sie zur Anlage von Muskelfasern; denn von der innern Seite hängt sie mit der Sehnenhaut, die den Abzieher der großen Zehe bedeckt, zusammen, und schickt eine Fortsetzung zwischen den Abzieher der großen Zehe und den kurzen Zehenbeuger. Von der äußern Seite hängt sie mit der Sehnenhaut des Abziehers der kleinen Zehe zusammen, und schickt eine Fortsetzung zwischen den Abzieher der kleinen Zehe, den kurzen Zehenbeuger, und die Sohlenportion des langen Zehenbeugers.

Kurzer gemeinschaftlicher Zehenbeuger.

Flexor brevis digitorum Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 5.

S. 320.

Kommt sehnig vom untern Theile des Fersenbeins und von der Sehnenhaut der Sohle, hängt an-

fangs mit seinen Nachbarn, den Abziehern der großen und der kleinen Zehe, zusammen, geht in der Fußsohle gerade vorwärts, wird allmählig dicker und breiter, theilt sich in vier auseinander gehende, sich schmälende, und endlich oben früher sehnige Portionen für die vier kleinen Zehen (außer der großen), deren Stärke sich nach der Größe der Zehen richtet.

Diese Sehnen spalten sich auf dem zweyten Gliede, um die Sehnen des langen gemeinschaftlichen Zehenbeugers durchzulassen, und setzen sich mit ihren Zipfeln an die Wurzel des mittelsten Gliedes der Zehen fest.

In Ansehung ihrer Spaltung oder Theilung, Gestalt, Verbindung, Festsetzung, Dicke und Ueberzüge, sind sie wie die Sehnen des gespaltenen Muskels an den Fingern der Hand beschaffen (s. S. 264.).

Abweichung.

Bisweilen fehlt die Portion für die kleine Zehe.

Wirkung.

Beugt die mittelsten, und dadurch auch die ersten Zehenglieder; krümmt ferner die Fußsohle.

Abzieher der großen Zehe.

Abductor Hallucis.

Albinus im Zusammenhange Tab. X. Fig. 19. F. G. —
Tab. XXV. Fig. 12. 13.

S. 321.

Kommt stark sehnig größtentheils von der innern

Seite der Wurzel des Fersenbeinhöckers, und dünn-
 fehnig vom Bande, das die Sehne des langen Beu-
 gers einschließt. Diese anfangs getheilten Portionen
 werden bald fleischig, und stoßen in einen Muskel
 zusammen, der darauf stärker wird, in der Mitte
 und oberwärts eine Sehne hat, an die sich von innen-
 her noch ferner Fleischfasern legen, die stark, flach
 und lang ist, im Vorbegehen sich fest ans Gelenke
 des ersten Gliedes mit dem Mittelfußknochen heftet,
 und an den innern und untern Theil der Wurzel des
 ersten Gliedes der großen Zehe festsetzt. Oberhalb
 und an seine äußere Seite legt sich das Fleisch des
 kurzen Beugers der großen Zehe.

Wirkung.

Entfernt nicht nur die große Zehe von den übrige-
 gen, sondern beugt sie auch nach unten und einwärts,
 und krümmt dadurch auch die Fußsohle.

Kurzer Beuger der großen Zehe.

Flexor brevis Hallucis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 12.

§. 322.

Kommt fehnig vom dritten oder äußeren Keil-
 beine, von der Sehne des hintern Schienbeinmü-
 fels; bisweilen auch von der Fortsetzung der Sehnen-
 haut der Fußsohle, die zwischen dem Abzieher der

großen
 Fuß-
 drei-
 sich
 vertie-
 (sen),
 pht.
 Gliede,
 eben-
 feld
 ft.
 ung,
 ober-
 Mus-
 64.).
 he.
 ten
 -
 ern



großen Zehe und dem kurzen Zehenbeuger liegt; bisweilen von der Vorragung des Würfelbeines oder von den Bändern, die zwischen dem dritten Keilbeine und Würfelbeine, oder zwischen dem Fersenbeine und Würfelbeine liegen. — Anfangs ist er dünne und schmal, dann dicker, bis er wieder abnimmt, und sich theils mit seinem Fleische an die Sehne des Abziehers der großen Zehe begiebt, theils mit zwey sehnigen Enden, die die Sehnenbeinchen aufnehmen, sich an die Wurzel des ersten Gliedes der großen Zehe, und ans Gelenk derselben mit dem Mittelfußknochen festsetzt.

Wirkung.

Beugt das erste Glied der großen Zehe. — Scheint auch bey der Krümmung der Fußsohle die Fußwurzelknochen, an denen er liegt, zu bewegen.

Anzieher der großen Zehe.

Adductor Hallucis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 14.

S. 323.

Kommt theils vom Höcker am hintern Ende des Mittelfußknochens für die vorlegte Zehe, theils von der Wurzel des dritten, auch wohl des zweyten Mittelfußknochens, vom vordern Theile der Scheide, die die Sehne des dritten Wadenbeinmuskels einschließt, und bisweilen von der Sehne des langen Wadenbein-

*auf off. mit einem
Sattel von Profen
bain Seiler off. ant. Tafel
Page 1508 Vitab.*

muskel. Anfangs ist er sehnig, dünne und breit, darauf dicker und allmählig schmaler, bis er sich, zuerst von untenher sehnig, mit dem kurzen Beuger und dem Quermuskel der Sohle vereinigt, an den untern, hintern und äußern, das ist, gegen die zweyte Zehe gefehrten Theil des Sehnenbeinchens, und jenseit desselben ans Band, wodurch es am ersten Gliede der großen Zehe hängt, festsetzt.

Bißweilen geht die Sehne das Sehnenbeinchen vorbei, und setzt sich ans erste Glied der großen Zehe fest.

Wirkung.

Beugt das erste Glied der großen Zehe, und zieht es gegen die zweyte Zehe. — Beugt auch den Mittelfußknochen der zweyten Zehe nach unten und nach außen.

Quermuskel der Sohle.

Transversus Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 14.

§. 324.

Kommt sehnig, breit und dünne, bißweilen von der Gelenkkapsel des ersten Gliedes der kleinen Zehe mit seinem Mittelfußknochen, bißweilen auch von eben dem Gelenke der vorletzten Zehe; bißweilen theils vom vordern Ende des Mittelfußknochens der kleinen Zehe,

theiß von der Sehnenhaut, die den Abzieher der kleinen Zehe bedeckt. Sein Fleisch läuft queer in der Fußsohle, wird allmählig dicker, aber schmaler, zuletzt aber wieder dünner und sehnig,

und setzt sich, mit dem Anzieher der großen Zehe vereinigt, an äußere Sehnenbeinchen der großen Zehe fest; bisweilen läuft er mit dem Bande von diesem Sehnenbeinchen zum ersten Gliede der großen Zehe.

Wirkung.

Zieht den Mittelfußknochen der großen und kleinen Zehe gegeneinander.

Abzieher der kleinen Zehe.

Abductor digiti minimi.

Albinus Tab. XXV. Fig. 18. 19. in Zusammenfügung Tab. X. Fig. 19. A bis D.

S. 325.

Kommt sehnig von der äußern Seite der Wurzel des Fersenbeinhöckers. Sein Fleisch wird allmählig schmaler aber dicker, bis er wieder dünner und sehnig wird. Von seiner äußern Seite geht gewöhnlich eine kurze und schmale Portion ab, die sich sehnig an den hintern Theil des Höckers des Mittelfußknochens der kleinen Zehe festsetzt. Bisweilen ist diese Portion durchaus sehnig, und nach vornen zu über den kurzen Beuger der kleinen Zehe, Spulmuskel und Quermuskel der Sohle verbreitet. Der übrige Theil des

Fleisches wird schmaler, allmählig sehnig, geht in einer Furche der Wurzel des Mittelfußknochens der kleinen Zehe zur äußern Seite eben des Mittelfußknochens vorwärts, erhält fast bis zuletzt Fleischfasern, und setzt sich an den äußern Theil der Wurzel des ersten Gliedes der kleinen Zehe fest, so daß sie eine dünne Sehnenhaut zur Sehne des langen Zehenstreckers abschickt.

Abweichung.

Bisweilen ist er schon am Mittelfußknochen der kleinen Zehe ganz sehnig.

Wirkung.

Zieht die kleine Zehe von den übrigen ab, und beugt sie nach unten.

Kurzer Beuger der kleinen Zehe.

Flexor brevis digiti minimi Pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 25. 26.

S. 326.

Kommt sehnig von der Mitte und dem äußern Rande des untern Theils der Wurzel des Mittelfußknochens der kleinen Zehe, ferner von der Sehnen-scheide des langen Wadenbeinmuskels (bisweilen bloß von dieser Scheide, bisweilen bloß vom sehnigen Ueberzuge des Abziehers der kleinen Zehe; wird langsam fleischig und dicker, theilt sich gewöhnlich in

eine größere Portion, die sich als eine schmale Sehne an die Gelenkkapsel der kleinen Zehe mit ihrem Mittelfußknochen heftet, und zuletzt an die Wurzel des ersten Gliedes der kleinen Zehe festsetzt; und in eine kleinere, dünnere, mehr breite als dicke Portion, die sich mit einem zarten Ende an den äußern Rand des Mittelfußknochens der kleinen Zehe, gleich unter seinem vordern Ende festsetzt.

Wirkung.

Beugt das erste Glied der kleinen Zehe nach unten.

Innere Mittelfußmuskeln.

Interossei interni oder inferiores pedis.

Albinus Tab. XXV. Fig. 4.

S. 327.

Ihrer sind drey, sie liegen längs der innern Seite der drey letzten Mittelfußknochen. — Der erste gehört der mittelsten Zehe, der zweyte der vorletzten, und der dritte der letzten oder kleinen Zehe.

Folgendes haben sie miteinander gemein. Sie kommen anfangs sehnig, schmal und dünne, längs der innern oder gegen die große Zehe gewendeten Seite ihrer Mittelfußknochen; der zweyte und dritte auch noch von der Sehnnenscheide des langen Wadenbeinmuskels (der zweyte bisweilen auch von der Seh-

nenhaut der Fußsohle; der dritte auch wohl noch von der Sehnenhaut, die den Abzieher der kleinen Zehe bedeckt); werden allmählig breiter und dicker, an der innern Seite früh sehnig, bis sie wieder schmaler in eine lange flache Sehne übergehen, die sich an den untern Theil der innern oder gegen die große Zehe gerichteten Seite der Gelenkkapsel des Mittelfußknochens mit dem ersten Gliede, und an die Wurzel des ersten Gliedes dieser Zehe festsetzt, nachdem sie sich mit der Sehne des Spulmuskels und langen Zehenstrecker vereinigt hat.

Wirkung.

Sie beugen das erste Glied der drey letzten Zehen gegen die große Zehe, und etwas nach unten.

Äußere oder doppelbäuchige Mittelfußmuskeln.

Interossei externi.

Albinus Tab. XXV. Fig. 2. 3.

S. 328.

Zhrer sind vier. Der erste und zweyte gehört der zweyten Zehe, der dritte der dritten oder mittlern, und der vierte der vierten oder vorletzten Zehe.

Die drey letzten sind doppelbäuchig, weil jeder von zwey Mittelfußknochen kommt. Ihr dickerer oder äußerer Bauch ähnelt einem innern Mittelfuß-

Sehne
Mit-
el des
n eine
y die
d des
er sei-

en.

ern
Der
Der
en

ie
g
en
tte
en-
ph

muskel, ist aber von außen auf dem Rücken des Fußes sichtbar. Ihr innerer Bauch ist flacher, dünner, und mehr in der Fußsohle sichtbar. Beyde Bäuche aber sind anfangs sehnig, vereinigen ihre Fasern unter spitzen Winkeln, und werden gegen die Zehen zu sehnig.

Ihre Sehnen sind stärker und breiter, als die Sehnen der innern Mittelfußmuskeln; übrigens auf gleiche Art, nur bey den drey letztern von der äußern oder gegen die kleine Zehe gerichteter Seite an die Gelenkkapsel und das erste Glied ihrer Zehen befestigt.

Der erste äußere Mittelmuskel der zweyten Zehe kommt theils wie ein innerer, mit dem innern Bauche von dem hintern, mehr als die Hälfte der Länge betragenden, Theile des innern Randes seines eignen Mittelfußknochens; theils wie eine dünne sehnige Portion von der Sehne des langen Wadenbeinmuskels, vereinigt auch, wie ein innerer Mittelfußmuskel, seine Sehne mit der Sehne des Spulmuskels und mit der ihm gehörigen Sehne vom langen Zehenstrecker.

Der zweyte äußere Mittelfußmuskel der zweyten Zehe kommt mit dem dickern Bauche vom hintern, mehr als die Hälfte der Länge betragenden, Theile des innern Randes des Mittelfußknochens der mittelsten Zehe; mit dem kleinern oder dünnern Bauche

vom hintern Theile des äußern Randes seines eigenen oder des zweenen Mittelfußknochens.

Der dritte der dritten Zehe gehörige äußere Mittelfußmuskel kommt mit dem dickeren Bauche von mehr als der Hälfte des innern Randes des vierten Mittelfußknochens, mit dem dünnern Bauche vom äußern Rande seines eigenen Mittelfußknochens, und von der Sehnenhaut der Fußsohle.

Der vierte der vierten Zehe gehörige äußere Mittelfußmuskel kommt mit dem innern Bauche vom innern Rande des fünften Mittelfußknochens, mit dem äußern Bauche vom äußern Rande seines eigenen Mittelfußknochens, und von der Sehnen Scheide des langen Wadenbeinmuskels.

Wirkung.

Der erste äußere Mittelfußmuskel zieht die zweite Zehe gegen die große, und beugt sich nach unten. — Die drey übrigen beugen gleichfalls das erste Glied der Zehen nach unten, entfernen es hingegen von der großen Zehe.

Das Stehen ?

S. 329.

Beym Stehen wird der Fuß durch den Wadens

7 S. W. H. L. Borges de Nisu. Erlangae 1790.

A. Richerand sur la station en Arrière Deladeur. med. 2^e Émulat. Troisième année

genua Violin. 3^e de homine ad primum gradumque erectum per corpus fabricam Hippocri. Leg. Bat. 1795. 1796. 1797.

der Muskel des Fußes
früher als jetzt
ein Knie
Referat

muskel, den vordern Schienbein-, den langen und kurzen Wadenbeinmuskel, die langen Beuger sowohl der großen, als der übrigen Zehen, durch die kurzen Beuger der großen, der kleinen, und der mittlern Zehe, die Spulmuskeln und Mittelfußmuskeln gegen die Erde gestemmt; zu gleicher Zeit wird der Unterschenkel durch die meisten dieser Muskeln nach allen vier Seiten gleichsam gegen die Erde festgespannt, nach vornen durch die Strecken der großen und der übrigen Zehen und den dritten Wadenbeinmuskel, zum Theil auch durch den vordern Schienbeinmuskel; nach außen durch den langen und kurzen Wadenbeinmuskel; nach hinten durch den Wadenmuskel, den langsehnigen Muskel und die langen Beuger der Zehen; nach innen durch den vordern und hintern Schienbeinmuskel. Das Kniegelenk wird gesteuert durch den vierbäuchigen Kniestrecker, den der Spanner der Schenkelbinde unterstützt.

Das Becken und den Rumpf halten auf den Säulen der untern Gliedmaßen und auf dem Schenkelkopf im Gleichgewichte mit entgegengesetzten Kräften, von vornen der längste und der gerade Schenkelmuskel, die runden Lenden- und die Darmbeinmuskeln, von außen der Gesäßmuskel, und der Spanner der Schenkelbinde, von hinten der lange Bauch des zweybäuchigen, der halbsehnige, und halbmem-

brandse, von innen der Schaambein, dreybäuchige und schlanke Schenkelmuskel, die das Becken ringsum theils gegen den Schenkel, theils gegen das Kniegelenk spannen, so daß es weder rückwärts, noch inwärts, noch vorwärts, noch auswärts sinken kann. — Das Rückwärtsfallen, Vorwärtsinken, Links- und Rechtsneigen des übrigen Rumpfes hindern, oder den Rumpf selbst strecken von hinten die Strecker des Rückgrats (die eigentlichen innern und äußern Rückgratsstrecker, die absteigenden, die bauschähnlichen und die zweybäuchigen Nackenmuskeln, die Quermuskeln des Nackens, die Dornmuskeln des Nackens und des Rückens, die Halbdornmuskeln des Nackens, die vieltheiligen des Rückgrats und die Zwischenhornmuskeln); von vornen die Kopfnicker, der größere und kleinere innere gerade Kopfmuskel, der lange Halsmuskel, und die vordern Ribbenhalter; von den Seiten, rechts und links, der Nackenwarzenmuskel, die Seitenribbenhalter, Zwischenqueermuskeln, und geraden Seitenkopfmuskeln.

Endlich um den Kopf aufrecht zu halten, reichen die Kräfte der Kappenmuskeln, Bauschmuskeln des Kopfes, der zweybäuchigen Hals-, und der geraden hintern Kopfmuskeln zu.

Im Ganzen also sind die Kräfte, die den Körper von hinten her gerade halten, stärker, daher man

en und
wohl
kurzen
stücken
gegen
Inter-
allen
ant,
der
kel,
iel;
ein-
den
Be-
tern
urch
der
u-
pf
on
el,
von
der
des
em-



auch, wenn sie nachlassen, vorwärts fällt, weil Kopf und Rumpf von selbst durch ihr eigenes Gewicht vorwärts sinken.

Das Gehen.

S. 330.

Wir gehen, indem wir den Kopf, wie beym Stehen, aufrecht halten, und z. B. den linken Fuß so lange ruhig in der Stellung des Stehens lassen, bis der rechte gebogen, aufgehoben, vorwärts gebracht, und mit einer Vorwärtsneigung des Rumpfes niedergestellt ist, indem wir darauf den linken Fuß nachziehen, auf gleiche Art vor den rechten bringen, und nun wieder den rechten Fuß nachziehen, und auf gleiche Art bewegen.

Folglich ist das Gehen ein abwechselndes Vorwärts-sinken und Unterstügen des Körpers, welches aber gleichsam mit in einander schmelzenden Bewegungen geschieht, wobey der Natur nach auch die Hände mit bewegt werden, so daß mit dem Fuße der Arm der nämlichen Seite zugleich nach vorne oder nach hinten schwankt.

Näher betrachtet oder analysirt, geschieht folgendes beym Gehen. Indem die Strecken des rechten Fußes und der Fußwurzel (der Wadenmuskel, der langsehnige, der vordere und hintere Schienbeinmus-

kel,

Fel, und die Wadenbeinmuskeln), den Fuß heben, und den Unterschenkel vorwärts neigen, hebt zugleich der vierbäuchige Kniestrecker den Unterschenkel, und sonach auch der runde Lenden-, Darmbein-, Schaambein-, dreybäuchige, gerade, lange und schlanke Muskel, nebst dem Spanner der Schenkelbinde die ganze untere Gliedmaße in die Höhe, und bringen sie gestreckt vorwärts; darauf wird die rechte untere Gliedmaße mit gestrecktem Knie durchs Einhalten ihrer hegenden Muskeln, und der Rumpf durchs Einhalten der ihn aufrecht haltenden Muskeln vorwärts geneigt, und diese Gliedmaße vor die andere hingestellt. In dem nun der Rumpf durch die geraden, und selbst die schrägen Bauchmuskeln, und durch den runden Lenden- und Darmbeinmuskel noch mehr vorwärts geneigt, und gegen den Schenkel herabgezogen, und der Unterschenkel selbst durch die langen Strecker seiner Zehen, und den dritten Wadenbeinmuskel geneigt wird, müßte der Körper fallen, wenn nicht das Knie sich zur Erhaltung des Gleichgewichtes etwas beugte, und die Wirkung der linken untern Gliedmaße einträte. Denn diese wird hiebey nicht nur nachgezogen, sondern fängt nunmehr auch an, sich selbst zu bewegen.

Nämlich während daß die Zehenbeuger (Der lange Beuger der großen Zehe, der lange Beuger der übrigen Zehen, die kurzen Beuger der großen, der kleinen,

E. Muskellehre.

Ec

und der übrigen Zehen, und die Spulmuskeln), die Zehen gegen die Erde stemmen oder drücken, heben die übrigen Muskeln, der Wadenmuskel, der hintere und selbst der vordere Schienbeinmuskel, und die Wadenbeinmuskeln den Fuß so in die Höhe, daß die Sohle rückwärts schaut, das Knie sich beugt, und vortritt; sonach heben auch die runden Lendenmuskeln, die Schaambeinmuskeln, u. s. f. die ganze untere linke Gliedmaße in die Höhe, und bringen sie, gerade wie vorhin die rechte Gliedmaße, gestreckt vorwärts.

Das Laufen.

§. 331.

Das Laufen ist nicht bloß ein schnelleres Gehen, sondern eine eigene Fortbewegung; die untern Gliedmaßen werden nicht nur stärker, als beym Gehen, bewegt und verkürzt, sondern bleiben während des Laufes gebogen; der Schritt ist länger, oder das Vorbringen des einen Fußes vor den andern stärker, und erfolgt mit Hefigkeit; die gespanntern Füße berühren bloß mit den Zehen, und beym geschwindesten Laufen bloß mit den Spizen der Zehen die Erde; der Körper schwebt stärker vorhängend, und durch beträchtliches Schwanken der Hände wird der Erhaltung im Gleichgewichte nachgeholfen.

Wird nicht gedruckt.

(x) Note

Der Mensch beschleunigt sich beim Fallen, und beschleunigt sich beim Fallen.

Il semidiametro dell' arco circolare, che viene descritto ad ogni passo dal centro di gravità del corpo umano, non altro essendo che linea retta, la quale congiunge il detto centro col punto di mezzo della pianta del piede immobile, trovasi tal linea avere in un uomo di statura ordinaria la stessa lunghezza di 2,58 piedi. La misura poi della gravità terrestre, come insegna la teoria delle forze acceleratrici, non è altro che il doppio della caduta d'un grave nella quiete in un secondo di tempo, e in conseguenza è espressa da 30,2 piedi. Moltiplicando ora questi due numeri, e sul prodotto 77,916 estraendo la radice quadrata, trovasi 8,82 che appresi in piedi la velocità ricercata.

Greg. Fontana discorso sulla meccanica animale. Pisa 1793.

1793 pag. 21.

un-
trun-
war
fl.
ihwings

1.
46.



Der W
einer Secu

Vor j
maßen des
um durch
Erreckung
und der S
Körper gleic
durch ihren

in
in A. 17
f. 17
f.
Vf
man 17



— 403 —

Der Mensch durchläuft ohngefähr neun Fuß in einer Secunde.

Das Springen.


§. 332.

Vor jedem Sprung werden die untern Gliedmaßen des Stehenden oder Laufenden stark gebogen, um durch die darauf folgende heftige und schnelle Streckung der Fußsohle mittelst des Wadenmuskels, und der Schienbein- und Wadenbeinmuskeln den Körper gleichsam gegen die Erde zu schnellen, die ihn durch ihren Widerstand in die Höhe zurückwirft.

*ist das in der
Längsrichtung
des Fußes
nach hinten
und oben
wirkend.*

*Der Sprung steht mit der Länge der untern Gliedmaßen
in der Proportionalität mit dem Verhältniß des Fußes
zu sich in denselben Verhältniß zu stehen.*

*Der Sprung wird durch einen heftigen Anstoß
des Fußes nach hinten und oben
ausgeführt. Man bemerkt man einen heftigen Anstoß
des Fußes nach hinten und oben. Willinger p. 46.*



V e r z e i c h n i s s

einiger medicinischer und ökonomischer Verlagsbüchchen
von Warrentrapp und Wenner.

-
- Adams, Büsch u. Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen die Augen, nebst Anmerk. herausg. von C. Th. Sömmerring, 8. 797. 3te Aufl. 6 ggr.
- Anleitung zur Forstarithmetik für junge Jäger auf dem Lande, in Fragen u. Antworten. 8. 16 Stück 789. 3 ggr.
- Bemerkungen (praktische) zur Forstwissenschaft. 8. 783. 1-85. 16 bis 35 Hest. 16 ggr.
- Burggrave, (J. P.) auserlesene medicinische Fälle u. Gutachten. 8. 784. 20 ggr.
- Chomet, (P. Noei) großes u. vollständiges ökonomisch- und physikalisches Lexicon. 8 Theile, m. Kupf. Fol. 750. 24 Nthlr.
- Christ, (J. C.) Unterricht von der Landwirthschaft und Verbesserung des Feldbaues, insonderheit von Benutzung der Brache etc. 8. 781 mit Kupfern. 1 Nthlr. 14 ggr.
- Ehrmann, (Dr.) psychologische Fragmente zur Macrobioik, oder der Kunst, sein Leben zu verlängern. 8. 797. 5 ggr.
- Fatio (D. J.) vernünftige Behemutter. 4. mit Kupf. 20 ggr.
- Fibigs (J.) Handbuch der Mineralogie. 8. 787. 20 ggr.
- La Fosse, von dem wahren Sitze des Roges bei den Pferden, u. den Mitteln dagegen. U. d. Franz. mit Anmerk. v. D. G. Schrebern. 8. 754 m. K. 2 ggr.
- Langsdorf (J. W.) Einleitung zur Kenntniß in Salzwerkstoffen, nebst 3 Kupfertafeln. 8. 771. 8 ggr.
- Lehmann (J. C. v.) Grundsätze der Mineralogie. 8. 791. 1 Nthlr. 12 ggr.
- Metternich (M.) von dem Widerstande der Reibung, eine von der Jablonowskischen gelehrten Gesellschaft in Leipzig gekrönte Preisschrift. 8. 789. 6 ggr.
- Quatremere-Disjonval Araneologie, oder Naturgeschichte der Spinnen. U. dem Franz. der 2ten Ausgabe übersetzt. gr. 8. 798. 10 ggr.
- Sömmerring (C. Th.) über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer. 8. 785. veränderte Aufl. 9 ggr.
- Unterricht von der Hornviehseuche. 8. 1 ggr.
- Wedekind (D. G.) über medicinischen Unterricht. 4. 787. 4 ggr.
- Weiß (D. G. W.) Vorbereitung zum Unterricht in den Grundkenntnissen der Botanik. 4. 3 ggr.
- Werner (G. W.) Entwurf einer neuen Theorie der anziehenden Kräfte des Aethers, der Wärme und des Lichts. 8. 8 ggr.
-

Verlagsbücher
ner.

ichtige Pflichten
on S. Th. Sem.
6 ggr.
auf dem Lande
3 ggr.
8. 783. 1-85.
16 ggr.
Fälle u. Gut.
20 ggr.
nomika- und
o. 24 Nihlr.
i und Ver-
ugung der
r. 14 ggr.
Macro-
ängern. 8.
5 ggr.
pf. 20 ggr.
20 ggr.
en Pferden,
k. v. D. G.
2 ggr.
Salzwerts-
8 ggr.
8. 791.
12 ggr.
ung, eine
in Leipzig
6 ggr.
chichte der
gr. 8.
10 ggr.
biederheit
fl. 9 ggr.
1 ggr.
richt. 4.
4 ggr.
u Grund-
3 ggr.
er ansie-
Licht. 8.
8 ggr.

