Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 12.

Entomologische Correspondenz

von Karl Heinrich Georg

†

von Heyden.

C/F.

29256.

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

1.

3

Cantener, Louis, Prosper.

Avocat

in

Strasburg

war 1843, 1844 u. 1846 Fünfund-
wüster in Algier, war er Schatzmeister
sammelte. — 1845 Avocat in Hyères

✠

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1.

Je regrette beaucoup de ne pas avoir l'honneur de rencontrer M^r le Baron de Selys; je lui apporte des Diptères et Hyménoptères dernièrement nommés pour la plupart par M^r de St Fargeau. Je comptais partir demain pour Strasbourg, mais je resterai jusque demain matin 8 heures pendant que M^r de Selys aura l'obligeance de venir voir ce que j'ai avec moi.

Votre serviteur
Dervié

1846

Capitaine
Aide de Camp du Wurtemberg.

B. N. Je puis également mettre à votre disposition des collections d'étude de coléoptères et de coquilles marines, fluviatiles et terrestres au prix de 100 f. la collection, celle ci se composant de 400 sujets parmis les quels 250 à 300 espèces, le tout parfaitement nommé et conservé.

VO

L'ILL

INTER

M. Cayeux
se chargeant de
vraient lui
tres.
Chaque lot de
quels 4 à 500
par espèce ne dép
MM. les amateu
au prix de 150 fr
M. Cayeux
MM. les amateu
Il possède en
pere encore fort
année, et qu'il
prochain.
Ne pouvant p
marquières, H
au prix de 15 fr
M. Peyron
souscription à l
composera de
bles. Le nombr
Quant à la p
ver un plus tôt
ayant soin de
moyen de trai
Rien n'est p
On est prié
M. Cayeux
partir de cette
lettres lui parv

VOYAGE PAR SOUSCRIPTION

DANS

L'ILE DE SARDAIGNE

PENDANT UNE ANNÉE,

ENTREPRIS PAR MM. CANTENER ET PINTOR DE CABRAY.

M. CANTENER partira le 1er décembre prochain pour l'île de Sardaigne, se chargeant de toute la partie entomologique. MM. de SPINOLA et SOLIER veulent bien lui prêter leur concours pour classer et nommer les Coléoptères.

Chaque lot de Coléoptères se composant de 1500 individus, parmi lesquels 4 à 500 espèces, est du prix de 300 francs. Le nombre d'individus par espèce ne dépassera point le chiffre 6.

MM. les amateurs qui ne désireraient que la moitié d'un lot, le recevront au prix de 150 francs.

M. CANTENER traitera de gré à gré du prix des Lépidoptères avec MM. les amateurs.

Il possède en ce moment quelques Chrysalides du *Papilio hospiton*, espèce encore fort rare dans les collections, dont il a recueilli la chenille cette année, et qu'il compte rechercher d'une manière toute particulière l'an prochain.

Ne pouvant point s'engager à fournir un grand nombre de Diptères, Hyménoptères, Hémiptères, etc., il offre les insectes de ces différents ordres au prix de 15 francs le cent.

M. PINTOR est chargé de la conchyliologie et de l'ornithologie. Chaque souscription à la première de ces parties est de 250 francs. La collection se composera de 1000 à 1200 sujets, y compris les espèces terrestres et fluviatiles. Le nombre des individus par espèce ne dépassera point le chiffre 4.

Quant à la partie ornithologique, MM. les amateurs sont priés d'adresser au plus tôt à M. CANTENER, les noms des espèces qu'ils désirent, en ayant soin de mettre en regard le prix qu'ils se proposent d'en offrir, ce moyen de traiter lui paraissant le plus convenable.

Rien n'est payable d'avance.

On est prié de s'adresser, du 15 septembre jusqu'au 1er novembre, à M. CANTENER, chez M. BARTH, rue Mercière, 3, à Strasbourg. Puis, à partir de cette dernière époque, à Hyères (département du Var), d'où les lettres lui parviendront en Sardaigne.

STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN.

Cantener

P. S. Je puis également mettre à votre disposition des collections d'étude de coléoptères et de coquilles marines, fluviatiles et terrestres au prix de 100 f. la collection, celle ci se composant de 400 sujets parmis les quels 250 à 300 espèces, le tout parfaitement nommé et conservé.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(3)

Im October 1842 Jahre ist von Cantener
bei unserer Ausgrabung hier in Nassau
Insecten, besonders Carabicinen,
gefallen.

1845 war er hier in Frankfurt und
Jahr ist Käfer aus Algier von ihm ge-
fallen.

C. v. H.

---

européens me met à même de vous offrir au prix le plus modique une collection d'étude des insectes de cet ordre. Dans le cas où possesseur déjà d'une collection vous désireriez acquérir quelques espèces rares je vous serais obligé de me les indiquer au plustôt afin de pouvoir vous en adresser prix tablement le prix. Quant à la collection d'étude composée à mon choix et ne comprenant que des espèces de première fraicheur parfaitement étiquetées nommées et classées d'après le système du docteur Boisduval le prix de la première centaine est de 20 f. celui de la 2me de 10. de la 3me de 30 ainsi de suite, en ajoutant 10 f par chaque centaine.

Je possède en outre un grand nombre de doubles provenant de mes voyages en Suisse, en Espagne et dans les îles de Corse et de Sardaigne.

Dans l'attente que vous voudrez bien me honorer d'une commande
J'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée, Monsieur

Votre très humble et obéissant serviteur

Candeze

P. S. Je puis également mettre à votre disposition des collections d'étude de coléoptères et de coquilles marines, fluviatiles et terrestres au prix de 100 f. la collection, celle ci se composant de 400 sujets parmis les quels 250 à 300 espèces, le tout parfaitement nommé et conservé.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

5

Paris le 22 [illegible]

4

À Vendre en bloc ou au Cent une collection d'environ 2,000 espèces de Coléoptères de toutes les Contrées de l'Europe, bien nommées et renfermées dans 60 boîtes en Carton — Paris, le 7 Août 1835. — Rue de l'École de Médecine, N°. 26. —

M

L'acquisition récente de plusieurs milliers de Papillons européens me met à même de vous offrir au prix le plus modéré une collection d'étude des insectes de cet ordre. Dans le cas ou possesseur déjà d'une collection vous désiriez acquérir quelques espèces rares je vous serais obligé de me les indiquer au plustôt afin de pouvoir vous en adresser préalablement le prix. Quant à la collection d'étude composée à mon choix et ne comprenant que des espèces de première fraicheur parfaitement étalées nommées et classées d'après le système du docteur Boisduval le prix de la première centurie est de 30 f. celui de la 2me de 40, de la 3me de 50 ainsi de suite, en ajoutant 10 f. par chaque centurie.

Je possède en outre un grand nombre de doubles provenant de mes voyages en Suisse, en Espagne et dans les îles de Corse et de Sardaigne.

Dans l'attente que vous voudrez bien me honorer d'une commande j'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée, Monsieur

Votre très humble et obéissant serviteur

Candeze

P. S. Je puis également mettre à votre disposition des collections d'étude de coléoptères et de coquilles marines, fluviatiles et terrestres au prix de 100 f. la collection, celle ci se composant de 600 sujets parmis les quels 250 à 300 espèces, le tout parfaitement nommé et conservé.




5

Paris le 22 7bre 45

Quantity. 7: 29 sept 1845 u. einen Ballen von 70 fr. die Versicherung gestellt. Nicht die Sendung beim Empfang zu prüfen; kann ein Riss nicht gut passen. Die Arten sind sandig, Insect und verwahrt. Ist voller Cantharen von Hymenopt. Dipt. Orthopt. a 10 fr. assuriren das nicht die Arten mit den mycologischen Fällen, da auf sie vorkommenden Arten diese nicht mehr sind. Gewinn nothwendig zu hoffen. Es soll nur der Empfang des Ballen anzeigen 8

Monsieur le Baron,

J'ai l'honneur de vous prévenir que conformément à votre lettre en date du 15 de ce mois, j'ai remis à la Belgique une petite caisse contenant 2 boites renfermant 500 Coléoptères du midi de la France et de l'Algérie. Je crois espérer que vous serez satisfait de la composition de ce lot, qui renferment grand nombre d'espèces prises isolément tout du long d'une année et au dessus. Je regrette bien que nous n'ayons pas fait affaire pour les hyménoptères, car je me serais volontiers entendu avec vous pour le placement en tout ou quatre parties, enfin, comme vous l'auriez désiré. Comme vous vous occupez de tous les ordres, vous y gagneriez peut être à ne pas prendre une quantité à la fois, comme celle de la collection de Mr. de Fargeau, et je me propose, dès que je serai à Lyon, de faire former de petits lots distincts pour l'année et qui contiendront beaucoup plus frais et bien meilleur compte. Ainsi, je vous propose de vous livrer l'année prochaine, un lot de 1000 individus, tant Diptères, qu'hyménoptères et homoptères à raison de 10 f. le cent, l'un dans l'autre, en ayant soin qu'il n'y ait jamais plus de 4 individus par espèce. Je ne négligerai pas

de

vous vous occuperez aussi d'hyménoptères, je pourrais en parler à un de mes amis qui a été d'avis de mettre ces insects dans l'achat

vous plus les micro-Lepidoptères en me rappelant la bonne terre
des votres. Les Coléoptères que je vous adresse provenant presque tous de
la Collection H. Lucas ; vous y trouverez un genre nouveau de Curculio
qui malheureusement a perdu ses antennes, et que les Marchands vendent comme
S. fossor ; ce le Genre Lophyrus ; Mr. de Castelnau. Comme je
quitterai paris le 4 octobre, je vous serais obligé de m'envoyer en
effet les Lépis de f. 70, si toutefois vous pouvez mettre votre
lettre à la poste le 29 de ce mois ; si vous ne voyez pas d'inconvénient
à me l'adresser plustôt, sauf en cas de réclamation à m'écrire plus
tard à Hyères près Toulon (Var) je serais plus certain qu'elle me serait
remise avant mon départ. J'avais commencé à mettre une Gare au Midi
des environs de la ferme, et une croix au dessus de celle d'Alger,
mais j'ai dû y renoncer par la difficulté de la faire sans briser les
antennes. Les individus qui portent de petites pagnes vertes barrés tout tout
d'alger, mais il en est un grand nombre de ce pays, qui n'en portent pas ; je
pense qu'avec un peu d'habitude vous les reconnaitrez parfaitement. Je vous
remercie beaucoup d'avoir eu l'obligeance de faire remettre mes lettres à
Mrs Roche et Riche ; ainsi que de m'avoir écrit en caractères français ;
j'ai pu comprendre votre lettre moi même, sans la faire traduire.

En attendant que vous veuillez bien me répondre le plustôt
qu'il vous sera possible, j'ai l'honneur d'être avec la considération
la plus distinguée,

Votre serviteur dévoué
et reconnaissant
Cautain

C. Monsieur le Baron,

Rue de l'école de médecine, 26,
à Paris

vous vous occuper aussi d'hypnotisme, je
pourrais en parler à un de mes amis qui
a été à même de suivre de près dans l'acte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris le 3 Oct. 45

7 12

Monsieur et honorable ami

Je m'empresse de vous accuser reception de votre lettre et du billet qu'elle contenait

Paris le 11 9bre 1845.

Brauns. d: 15. sept. 1845 à 500 Coleopt. à 10 fr. ou Thlr 10

d: 16 sept. dem Stud. Gerlach einen Empfangschein darüber an die Adresse mitgegeben.

6.

Monsieur et Ami

Ayant fait à mon retour à Paris l'acquisition d'une deux nouvelles collections de Coléoptères Européens et d'Algérie, celle de Mr. Boileau Commandant d'artillerie à Bitche et Mr. Lucas, j'ai l'honneur de vous offrir un lot de 500 Coléoptères formant plus de 400 espèces au prix suivant:

1re Cent au choix	30 f.
2. d.	16
3.	12-50
4.	10 -"
5me et dernier	9 50
	Ct. 70

Si ma propositon vous convient, j'aurai obligé de m'en faire part le plus promptement possible, car mon dépôt de Paris pour hyver fini Octobre est fixé au 28 du courant. Dans le cas où vous vous occuperiez aussi d'hyménoptères, je pourrais en parler à un de mes amis qui a été d'assister en cas mais dans l'achat

de la Collection et Exigeam, et à qui le
lot des hyménoptères est échu en partage.
La Collection se compose de 30 grandes boîtes
assez peu garnies, mais soignées, et contient
1800 individus, non compris les pièces défectueuses.
Les doubles sont renfermés dans 14 boîtes, et
sont au nombre de 1400 ; total, 44 boîtes
et 3200 hyménoptères. Mon amie demande
15 francs de tout, boîtes comprises (elles
valent tout au plus 1 f 25 c. la pièce) ; j'espère
que on pourra obtenir un rabais de 30 à 40 p.
c. au moins. Cette Collection a une certaine
valeur par la bonne détermination ; j'ai
dit que j'allais vous écrire et j'ai pensé
devoir vous en dispenser avant que j'aie reçu
votre réponse.

Dans l'attente que vous voudrez bien me donner
de vos nouvelles le plus tôt qu'il vous sera
possible, j'ai l'honneur d'être avec la
plus parfaite considération

Votre très humble
et reconnaissant serviteur
Cantener

Rue de l'école de Médecine, 26
à Paris.

Paris le 3 Oct. 45

Monsieur et bien aimé

Je m'empresse de vous accuser réception de votre lettre et du billet qu'elle contenait, et d'y ajouter vous offrir bien pour faire remettre les deux en portefeuilles ci-dessus à leur adresse, dans le cas où [illegible] que en les jetant à la poste et cette [illegible] lettres, elles n'arriveraient pas à leur destination.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris le 3 Oct. 45

Monsieur et bien aimé

Je m'empresse de vous accuser reception de votre lettre et du billet qu'elle contenait, qui forme le solde de tout compte entre vous jusqu'à ce jour. Je me ferai un plaisir d'être utile à votre jeune ami et j'engage à ne pas arrêter de logement avant qu'il ne me soit vu, car si j'ai loge en ville, comme je compte le faire, je tacherai qu'il trouve une chambre dans la maison où je serai, et je le mettrai en rapport avec mes amis. Le compte me loge chez Mr Balliste maçon près de la fontaine à Lyon, et j'ai prié de lui

Lyon 8 bre 1823.

dire de venir me trouver directement
à la descente de la diligence. Je suis
à Hyères le 10 de ce mois ; mais vers le
18 ou le 20 je ferai un absence de trois
jours à Marseille.

Le pays d'ailleurs est fort intéressant pour
j'ai l'honneur d'être avec la considération
la plus distinguée,

Monsieur le Baron,

Votre très humble et obéissant

Cauteau

Cauteau à Hyères (Var)

Cauteau

Allemagne

13

18

1823.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

15

18

Carové, Friedrich Wilhelm, Dr.

in

Frankfurt a/M. (ältere Zeit.)

geb. 20. 6. 1789 in Coblenz. —

† 18. 3. 1852 in Heidelberg.

Germanist, Philosoph.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

15

18

bis 1823.

Theuerster Freund!

Anbei kommt mein schönstes Exemplar der Cur. imperialis, welches ich so ganz Ihrer Güte überlasse, und bitte von folgenden mir fehlenden Gattungen die mir gefälligst übersenden zu wollen:

Batyrrus	Orchesia	Anaspis	Lonechusa
Lycoperdina	Crodalus	Agalatus	Manticora
Eumorphus	Epitragus	Tetraonyx	Colliuris
Erotylus	Trachyscelis	Cerconota	Anthia
Languria	Coscinotus	Oenas.	Graphipterus
Sagra	Helia	Cebrio	Zuphium
Paradrepa.	Eurinus	Scirtes	Drypta
Merya	Tagenia	Rhipicera	Stagona
Nemosoma	Lepidium	Atractocerus	Moris
Cerylon	Molinius	Cupes	Pogonophorus
Cerapterus	Eurychora	Mastigus	Rhopalodera
Phloiotribus	Chirocelis	Scydmaenus	Megatoma
Rhizophagus	Ulota	Melyris	Oestrynes
Hetomera	Cryptocus	Cillus	Goliathus
Notaus	Coxicum	Trilus	Anisonyx
Calopus	Serapita	Gibbium	Glaphyras
Serropalpus	Leiodes	Ceraphytum	Rutela
Pytho.	Rhipiphorus	Mylabris	Aesalus
Nilio			Lampyris.

17

Vollständige Werke von Demeril über die Physogamen auf 14 Tage entbehren können würde ich für diesen Mittheilung sehr verbunden sein.

Vollständige gefälligenfalls nachstehende

Flore des Insectophiles v. Brez[illegible]

Theologie des Insectes v. trad. de Valleriere, avec des Remarques de Lyonnet

Roll. 1745 — Sammen gelobt haben verbleibe Ihnen zu Diensten.

Ergebenst gehorsamst

H. Lavoie

Mss 24 99/3

(Langestraße No 95)

16 [illegible] 30ten 8bris 1823.

18

17

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Montpellier den 30ten 8bris 1823.

18

Auf meine allerunterthänigste Vorstellung, worin ich Sie um Ihre Verwendung bitte, haben mir Hochgedachte Herr und Freund die besondere Ehre und das Vergnügen, mich in Ihrem Hochverehrlichen Andenken zu empfehlen, und Ihnen ein kleines Andenken

17

Chabrier, *François*

in

Montpellier

Ihnen

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Montpellier den 30ten 8bris 1823.

Nach einer allzulangen Abwesenheit, welche ich Sie um Verzeihung bitte, finde ich Hochgeschätzter Herr und Freund Ihr besonderes Schreiben und das Vergnügen, mich in Ihrem Andenken zu befestigen, und Ihnen ein kleines Andenken beizulegen, Abhandlung über die allgemeine Bewegung oder, Einleitung zur Geognosie – zweyer Planet zu nennen, Ihnen liebster Freund solches als ein kleines Andenken meiner Hochachtung zu gewerthigen; herzlich wünschend das wenn Sie alle werden Einsichten haben, meiner Meinung in betreff der in selbst gemachten Hypothesen Ihnen mögen.

Höchst erfreuend würde es mir seyn Sie Herr Professor Sie und Ihre ehemaligen Herrn Mitarbeiter und beliebten Zuhörer in der Casten Wasserfluth gemischen.

Sollten Sie geneigter Freund, von meinen Hierigen Land und Fluthen Nachrichten, Bücher und Zeichnungen Verlangen, werde ich mir ein Vergnügen machen, Ihnen solches zu verschaffen und, so viel in meinen Kräften zu gefälligst.

Von dem Herrn Professor Hochstetter habe ich ein Exemplar meiner Merkwürdigkeiten erhalten, mit Bitte der Seine Abhandlung und die Vorlage darüber Recht haben möge, habe ich seinen gefälligen Antwort erhalten, worin mir mich bestätigt das Herr Brongniart, mitglied der Akademie, sehr beschäftigt wordem, die Sammlung in der Erwartung wer die Einrichtung darüber zeigen wird. Eine gleiche Schrift, Nomenclature der Herrn Professor Freiesleben Werner'schen Mineralogie

Ihre Gesellschaft wünsche eine recht baldige Antwort gefälligst zu ertheilen.

In dieser Erwartung habe ich die besondere Ehre mich zu nennen Ihr Bruder Freund und Diener

J. Sabrier

Zu ersuchen

9

Ew. Hochwohlgeboren

Obrist Lieutenant

Secretaire der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellschaft

in Frankfurt a/m.

Ihrer Excellenz

Ober Leutenant von

Hützelmann

Autogr. d. 3 Dec. 1835.

Hochwohlgeboren

(10) Hochgeehrtester Herr!

Toussaint de Charpentier

geb: 1780.

† 4. 3. 1847.

War Königl. Preuß. Regierungsrath in

Dortmund

und wurde 1835 in gleicher Eigenschaft nach

Brieg in Schlesien

versetzt. Seine Sammlung besitzt das

Museum der Universität zu Königsberg

die Naturgattungen hat Schneider in Breslau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Elegans. 50

Ems. d. 3 Dec. 1835.

(10)

Hochwohlgeborner

Hochgeehrtester Herr!

Ich erwarte mit der Hochwohlgeborn wiederholt gemachten, daß ich für meinen Aufenthalt gewiß, die Verschaffung eines Platzes in Schlesien erwarten dürfe. Inzwischen kann ich aber die Absicht des Abgehens unverändert, ohne Frankfurth gleichen 2 Jahren, u. da ich in Schwerdt, der General v Thielmann in Coblenz sey mich gewöhnlich besuchen werden will, so gedenke ich über Ihr Hochwohlgeborn mein Logis von Ostern 2 meinen 2 gewesen 4 Januar 1836 Dresden in Sachsen einzutreffen. — Der Hochwohlgeborn ich für meinen 1/2 oder 2 Tägigen Aufenthalt in Frankfurth die Versicherung meiner Hochachtung, in Form mich so gütig gegeben Anweisungen, für meinen Fortgang, daß sich der Tägige Ausflug nach Wiesbaden Mainz/Amöneburg ist der

[illegible] Ihrer gütigen Antwort
[illegible] ich ergebenst in rebus naturalibus
[illegible] um die Zusendung des Rappolt
[illegible] und Asperula odorata nebst
[illegible] Ihnen und Ihrer guten Frau
[illegible] mit der Bitte [illegible]
[illegible] ich um Ihr gütiges Andenken
[illegible] so verbleibe ich
[illegible] Ihr
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Senator
von Heyden
Hochwohlgeboren
frey. 3 1/4 Frankfurth
a/Mayn

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main
DFG

24

Très cher Mr. Chevrier !

Je vous écrit français, ~~si bien comme~~ le mieux que je pourrai. Je vous suis très obligé, pour le catalogue des coléoptères et j'ai fait un choix, que je vous prie de m'envoyer, mais seulement de chaque espèce une exemplaire, qui sera faire en tout une somme de 40 frs.

23

Chevrier, Frédéric.

in

Genf.

H.

Elegans		50
Bicarinis. Steu.		75
H. Guttata		75
Celtis Bj ?		50
Arlequinus Mill.		50
Juniperi Mill.		50
Serraticornis Ent.		25
Pilosus Panz.		25
Polygraphus Gyl.		25
Intricatus Ahr.		25
Curvidens Mill.		75
Fici Bj		25
Chevrieri Mill.		25
Italica		50
Complus Gyl.		25
Cornutus Gyl.		25
Quadridens Mill.		50
Mandibularis Gyl.		40
Glabricollis		25
Cyllenhalii Bj		40
Rudi. Denticollis. Redt.		
Contractus.		50
Punctipennis. C.A.		75
Nitidus fab.		75
Aubei. Lefeb. Lin.		40
Denticollis. A.		50
Clematidis. Mill. C.A.		25
Parvulus Payk.		25
Crenatus. Gyl.		75
Longirostre Fisc.		40
Ebeninum		25
Stolidum.		25
Confluens.		25
Incanum Sup.		25
Melilloti		20
Fuvidum		25
Juniperi		30
Tubiferum		30
Setiferum		25
Escherii Mill.		20
Flavimanum		25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Très cher Mr Chevrier !

Je vous écrit français, ~~si bien comme~~ le mieux que je pourrai. Je vous suis très obligé, pour le catalogue des coléoptères et j'ai fait un choix, que je vous prie de m'envoyer, mais seulement de chaque espèce une exemplaire qui sera faire en tout une somme de 40 frs. Les temps sont si difficiles, qu'on ne peut compter sur ses revenus et c'est la cause pourquoi je vous ne prie pas, de m'envoyer des hyménoptères

J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus parfaite considération

Votre très humble serviteur

Francfort s/M le 21 Juin 1848.

	Elegans	50
	Bicornis Steu.	75
	N. Guttata	75
	Celtis Bsk?	50
	Arlequinus Mulsy	50
2	Juniperi Mulsi	50
	Serraticornis Gyll	25
	Filaris Panzb.	25
	Polygraphus Gyl	25
	Intricatus Redt.	25
2	Cornutus Mulsi	75
	Fici Bj	25
	Chevrieri Villa	25
	Italica	50
	Complus Gyl	25
	Cornutus Gyl	25
	Quadridens Mulsi	50
	Mandibularis Gyl	40
	Glabricollis	25
	Gyllenhalii Bj	40
12	Redt. Denticollis. Redt!	1
	Contractus.	50
	Punctipennis C.A.	75
	Nitidus fal	75
	Aubei. hofert.sin.	40
	Denticollis A	50
	Clematidis Mulsi C.H.	25
	Parvulus Muls.	25
	Crenatus Gyl	75
	Longirostre SSC	40
	Ebeninum	25
	Stolidum	25
	Confluens	25
	Incanum Sahl	25
	Melliloti	50
	Cavidium	25
	Juniperi	50
	Pusillum	50
	Sellatum	25
	Excisicollis Mulsi	50
	Planiusculum	25

Selmanii	50	Minutissima	"	25	Ochthebius	Granulatus Muls.	50
Prevostii	25	Exilis	B	25	Pschyptus	Prominulus S.	75
Cribratus	25	Notha		50	Platycerus	Tenebrioides	75
Aurulus	25	Nivalis	Mulsi	50	Upis	Italica	50
Flavofemoratus	25	Oxypoda Litigiosa	H.F.H	25	Dytilus	Laevis	1.50
Pinguis	50	Fromicena	" E	25	Nothus	Bipunctatus	75
						Nitidum	50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ueber Ihren Cleonicus

Ich bitte über Ihn im Französischen Tyrosch, so gütig zu sein und sehen zu lassen ob Er brauchbar sei das übrige Ihr Verzeichniß zu Dubletten bitte, jedoch von jeder Art nur 1 Ex. und wohl einen Betrag von 40 frs massenirend. Wie lebe sehr in einem Zustande, wo alle Geld-Einnahmen minder sind, als die nöthigen Bedürfnisse — Geld-Ausgabe massiren daß

Halodesia Forticornis E.	—	4	— 40	— Quadridens Chevr.	—	4	— 50
Hemiris Fusca Heer.	—	4	— 75	— Mandibularis Gyll.	—	4	— 40
Homalota Indigena Heer		4	— 25	— Glabriculus Gyll.	—	4	— 25
— Minutissima Heer		4	— 25	Ithinus Gyllenhalii Dej	—	4	— 40
— Nötha E.	—	4	— 30	Phloeostichus Denticollis Redt	—	1	—
— Nivalis Chev.	—	4	— 30	Teredus Paneticollis Dej.	—	4	— 75
Oxypoda Litigiosa Heer		4	— 25	— nitidus F.	—	4	— 75
— Promiscua E.	—	4	— 25	Calyptobium Rubei Lef.	—	4	— 40
Oxyporus Bifasciatus	—	1	— 50	Sylvanus Denticollis Dej.	—	4	— 30
— Variegata Dej		4	— 75	Xylon Incanum Sh.	—	4	— 25
Phyllocerus Flavipennis Dej		1	— 50	— Meliloti Sh.	—	4	— 30
Stenidion Thoracicum Dej.		1	—	— Juniperi Sh.	—	4	— 30
Anobium Villosum Bon.	—	4	— 25	— Escherii Chevr.	—	4	— 30
Ips Abbreviata Panz.	—	4	— 25	— Flavimanum Sh.	—	4	— 25
— Bipustulata Kunze	—	4	— 25	— Livescerum	—	4	— 25
Cryptophagus Paneticollis Chevr.		4	— 25	— Betulae	—	4	— 25
— Rubricollis Chevr.		4	— 25	— Cinerascens Gyll.	—	4	— 25
				— Aciculare	—	4	— 25
				— Prunnipes	—	4	— 30

20 / 55 c

15 / 45 c

Vide

Prevostii Duval.	Mus.	40	Indigena		25	Nitidum		30	
Selmanii		50	Minutissima		25	Ochthebius	Granulatus Mots.	30	
Prevostii		25	Exilis	E	25	Pachyplis	Punctatissimus Sch.	75	
Cribratus		25	Nötha		30	Platycerus	Carbonarius	75	
Auratus		25	Nivalis	Aubé	30	Upis	Italica	50	
Flavolemoratus		25	Oxypoda	Litigiosa H F M	25	Dytilus	Laevis	150	
Pinguis		50		Promiscua E	25	Nothus	Bipunctatus	75	

Elegans		50	Cornutus	Dej	75		
Bicornis	Chev.	75	Quadridens	Aubé	50		
4 Guttata		75	Mandibularis	Gyll	40		
Celtis	Dej	50	Glabriculus		25		
Arlequinus	Redt	50	Gyllenhalii	Dej	40		
Juniperi	Aubé	30	Phloeostichus	Redt.	Denticollis.	Redt	1
Serraticornis	Dej	25	Contractus		30		
Pilosus	Panz	25	Paneticollis	Dej	75		
Polygraphus	Gyll	25	Nitidus	Fab	75		
Intricatus	Ross	25	Xylon Aubei	Lefeb. Edit.	40		
Cornutus	Aubé	75	Denticollis	Dej	30		
Fici	Dej	25	Clematidis	Aubé	Dej	25	
			Parvulus	Rougem	25		
Italica		50	Crenatus	Gyll	75		
Longipes			Longirostre	Fab	40		
Cornutus	Gyll	75	Ebeninum		25		
Quadridens	Aubé	50	Stolidum		25		
Mandibularis	Gyll	40	Confluens		25		
Glabriculus		25	Incanum	Sup	25		
Gyllenhalii	Dej	40	Meliloti		30		
Phloeostichus	Redt.	Denticollis.	Redt	1	Paviduum		25
Contractus		30	Juniperi		30		
Paneticollis	Dej	75	Tubiferum		30		
Nitidus	Fab	75	Setiferum		25		
Xylon Aubei	Lefeb. Edit.	40	Escherii	Aubé	30		
Denticollis	Dej	30	Flavimanum		25		
Clematidis	Aubé	Dej	25				
Parvulus	Rougem	25					
Crenatus	Gyll	75					
Longirostre	Fab	40					
Ebeninum		25					
Stolidum		25					
Confluens		25					
Incanum	Sup	25					
Meliloti		30					
Paviduum		25					
Juniperi		30					
Tubiferum		30					
Setiferum		25					
Escherii	Aubé	30					
Flavimanum		25					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brüssel bei Chevrier. 21 Jun. 1848.

Rhysticlus Discoideus . . 40
Elesina Arctica
Cebrus Augustatus Dej.? 1 — 25
Carabus Dahlii Mariotti — „ — 40
Calathus Solieri Bassi — „ — 40
Trechus Micensis Villa — „ — 40
Cillenum Gyllenhalii Dej. — „ — 40
Hydroporus Miraculosus Aubé „ — 25
Stenus Longipes Heer. — „ — 25
—— Montivagus Heer — „ — 25
Platysthetus Splendens Heer „ — 25
Anthobium Atrum Heer. — „ — 25
—— Adustum Heer — „ — 40
Trichophyas Pilicornis E. — „ — 75
Aleochara Rufitarsis Heer „ — 30
—— Morosa Heer — „ — 30
—— Lugubris Chevr. — „ — 30
—— Pretexta E. — — „ — 25
Calodera Forticornis E. — „ — 40
Lemiris Fusca Heer. — „ — 75
Homalota Indigena Heer „ — 25
—— Minutissima Heer „ — 25
—— Notha E. — — „ — 30
—— Nivalis Chev. — „ — 30
Oxypoda Litigiosa Heer „ — 25
—— Promiscua E. — „ — 25
Leptusa Bipustulata — 1 — 50
—— Variegata Dej „ — 75
Phyllocerus Flavipennis Dej 1 — 50
Stenidion Thoracicum Dej. 1 — „
Anobium Villosum Bon. — „ — 25
Xys Abbreviata Panz. — „ — 25
— Bipustulata Kunze — „ — 25
Cryptophagus Punticollis Chevr. „ — 25
—— Rubricollis Chevr. „ — 25

Thoracites Ruficthorax Chevr — „ — 75
Calops Exochus maculosus Fr. — — — „ — 65
Calops Alpinus Gyll. — — — „ — 25
Atilium Angustatum Rtb. — — „ — 40
Octhebius Granulatus Muls. — „ — 30
Pachyppus Truncaticrons Dej.? — „ — 75
Dytilus laevis (Hydroporus?) 1 — 50
Corticus Celtis Dej.? — — — „ — 50
Salpingus Arlequinus Melly — „ — 50
Hylesinus Juniperi Chevr. — „ — 30
—— Serraticornis Rtz Dej — „ — 25
—— Pilosus Rtz. — — „ — 25
—— Polygraphus Gyl. — — „ — 25
Bostrichus Cornutus Chevr. — „ — 75
—— Fici Dej. — — — „ — 25
Cis Comptus Gyll. — — — „ — 25
— Cornutus Gyll. — — — „ — 25
— Quadridens Chevr. — — „ — 50
— Mandibularis Gyll. — — „ — 40
— Glabriculus Gyll. — — — „ — 25
Ephindus Gyllenhalii Dej — — — „ — 40
Phloeostichus Denticollis Redt. — 1 — „
Teredus Punticollis Dej. — „ — 75
—— nitidus F. — — — „ — 75
Calyptobium Aubei Lef. — — — „ — 40
Sylvanus Denticollis Dej. — — „ — 50
Ips Quadrinotatus Rtb. — — — „ — 25
— Mellilotae Rtb. — — — — „ — 30
— Juniperi Rtb. — — — — „ — 30
— Escherii Chevr. — — — „ — 30
— Flavimanum Rtb. — — — „ — 25
— Lineascens — — — — „ — 25
— Betulae — — — — — „ — 25
— Cinerascens Dahl — — „ — 25
— Aciculare — — — — — „ — 25
— Brunnipes — — — — „ — 30

Elegans . . 50
Bicornis Stev. 75
N. Quttata 75
Celtis Dej. 50
Arlequinus Melly 50
Juniperi 30
Serraticornis 25
Pilosus 25
Polygraphus 25
Intricatus 25
Cornutus 75
Fici Dej 25
Chevrieri 25
Italica 50
Comptus 25
Cornutus 25
Quadridens 50
Mandibularis 40
Glabriculus 25
Gyllenhalii 40
Denticollis Redt. 1
Contractus 50
Punctifollis 75
Nitidus 75
Aubei 40
Denticollis 50
Clematidis 25
Ervulus 25
Crenatus 75
Longirostre 40
Ebeninum 25
Stolidum 25
Confluens 25
Jucundum 25
Mellilotí 30
Pavidum 25
Juniperi 30
Tibiferum 30
Setiferum 25
Escherii 30
Flavimanum 25

Elevatus Dimidiatus 30 | Judiciosus 25 | Nitidum 30
Selmanii 40 | Minutissima 25 | Octhebius Granulatus 30
Prevostii 25 | Exilis 25 | Pachyppus Truncaticrons 25
Cribratus 25 | Notha 30 | Hatyceras Tenebrioides 25
Auratus 25 | Nivalis 30 | Upis Italica 50
Flavofemoratus 25 | Oxypoda Litigiosa | Dytilus Laevis 1 50
Pinguis 50 | Promiscua 25 | Nothus Bipunctatus 25

Rhamphus Aeneus Dej. — — 4 — 25
Nanophyes Obtusus Chevr. — — 4 — 25
—— Chevrieri Germ. — — 4 — 30
— Hemisphaericus — — 4 — 30
— Limbatus Chevr. — — 4 — 30
Erirhinus Gyrallus Marietti — — 4 — 40
Erirhinus Occallescens Sch. — — 4 — 20
Rhynchaenus Punctulatus Sch. — — 4 — 25
Anobium Striatellum Beck — — 4 — 25
Ptinus Hyemalis Chevr. — — 4 — 25
Malachius Naturalis Dej. — — 4 — 30
Nebria Germarii Heer. — — 4 — 75
Cryptocephalus Fasciatus Dej. — 4 — 25.

4 fr 50 c

~~16 fr 00 c~~
~~11 " 45~~
~~5 " 05~~
~~07 / 50~~

20 fr 55 c
15 " 45
4 " 5
~~99~~ / 55
46

2 fr 50 c

125
40
85

Cicindela	Maura	40	Milleri Redtb	50	Ruficollis F	25	Scabrosus	Elegans	50		
	Circumdata	40	Impressicollis Feyrol.	50	Impressus	Picatus	75	Tenebrio	Bicornis Stev.	75	
	Chloris	40	Stenopus	Nicaensis Villa	40		Flavicornis Redtb	75	Dircea	N. dentata	75
Drypta	Cylindricollis Spin	50	Perosus	Passerini	125		Appendiculata	1	Cortiens	Celtis Rossi	50
Polistichus	Discoideus	40		Erythrili	1		Festiva	1	Sulpingus	Arlequinus Mill	50
Aptinus	Alpinus	40		Villae Duvern.	125		Decastigma	1	Hylesinus	Juniperi Redtb	50
	Bollista	50	Perezus	Navaricus	40		Chrysostigma	75		Serraticornis Oliv	75
Brachinus	Cyanicornis	40	Gillenium	Benedicti	40		Varda	40		Filosus Duval	75
	Hispanicus	2	Hydroporus	Mauritanicus Redtb	25		Gemellata	50		Polygraphus Oliv	75
Clivina	Arctica	125	Haliplus	Fluviatilis	25		Maculicollis	40	Scolytus	Intricatus Redtb	25
Dilomus	Cordatus	40	Philosuthus	Rutilipennis F	50		Chevrieri Villa	50	Bostrichus	Cornutus Redtb	75
Cychrus	Schmidtii	1		Marginicollis	20		Bifasciatus	150		Ilici Rossi	25
	Angustatus Dej	5	Acylophorus	Glabricollis	30		4. Fasciata	75	Apate	Chevrieri Villa	75
Hyperbaeus	Alpes Italiae		Euryporus	Picipes	50		Variegata Dej	75	Psoa	Italica	50
	Italicus	75	Procinctus	Lefebvrei	150		Cupressi Redtb	1	Cis	Comptus Oliv	25
Harpalus	Hispanus	1	Stenus	Longipes Heer FH	25	Dima	Elateroides Dej	150		Cornutus Oliv	25
	Splendens	1		Montivagus	25	Phyllocerus	Flavipennis Dej	150		Quadridens Villa	50
	Festivus	1	Platysthetus	Splendens	25	Cebrio	Gigas Fab	150		Mandibularis Oliv	40
	Lefebvrei	2	Lesteva	Riparia	25	Eubria	Palustris	25		Glabriculus	25
	Monticola	30	Xylothebium	Atrum	25	Clenidium	Thoracicum Dej	1	Sphinduz	Gyllenhalii Dej	40
	Rossii	40		Aductum H FH	20	Ligia	Chloris Fab	150	Phlaeotichus	Rudis. Denticollis Redtb	1
	Meridionalis	50		Alpinum	20	Melyris	Costata	25	Bothrideres	Contractus	50
	Italicus	40	Tricophyus	Filicornis F	75	Anobium	Villosum Duftsch	25	Teredus	Punctipennis C A	75
	Vagans	40	Meoclarus	Rufitarsis H FH	30	Ips	Abbreviata Fabr	25		Nitidus Fab	75
	Ostilii Mannerh	40		Morosa Heer	50		Bipustulata Fabr	25	Calyptobium	Aubei Lefeb Edm	40
	Bonelli	40		Lugubris Nz Villa	30	Cryptophagus	Punctipennis Redtb	25	Sylvanus	Denticollis Dej	30
	Rotundicollis	50		Pretexta F	25		Rubricollis	25	Cucujus	Clavipalpis Redtb Oliv	25
Nebria	Brevicollis punctatissima	50	Silusa	Rubra	30	Thorictes	Rufithorax Redtb	75		Larvatus Hoffm	25
	Fossulata Latreille	50	Colodera	Corticeyrii	40		Calipes Mellg		Dendrophagus	Crenatus Dej	75
Omophron	Limbatum	15	Phloeoporus	Reclusus	25	Byrrhus	Maculosus Estrk	25	Apion	Longirostre Fab	40
	Variegatum	75	Lomechis	Fusca H FH	75	Nitidula	Flexuosa	25		Ebeninum	25
Chlaenius	Cruciger	1	Homalota	Bifasciicornis F		Calops	Alpinus Dej	25		Stolidum	25
Callistus	Sollieri Rossi Schil	40		Cuspidata	25	Ptilium	Angustatum Aub	40		Confluens	25
Platynus	Cyaneus	75		Talpa H FH Heer	25		Testaceum H FH	40		Juscanum Zoph	25
Platysthetus	Duvalii Villa	40		Judicosa	25		Nitidum	30		Melliloti	30
	Schmidtii	50		Minutissima	25	Ochthebius	Granulatus Mots	30		Fovidium	25
	Prevostii	25		Exilis	25	Eschynis	Praestitutus Dej	75		Juniperi	30
	Cribratus	25		Notha	30	Hatycerus	Tenebrioides	75		Tubiferum	30
	Aurutus	25		Nivalis Redtb	30	Upis	Italica	50		Seliferum	25
	Flavolimbatus	25	Oxypoda	Litigiosa H FH	25	Dolichus	Laevis	150		Escherii Redtb	30
	Pinguis	50		Promiscua H	25	Nothus	Bipunctatus	75		Flavimanum	25

Genève, le 21 Juin 1848.

	Ononis	20
	Angustatum	25
	Brevirostre	25
	Livescens	25
	Spencii	25
	Betulæ	25
	Cinerascens Bak	25
	Aciculares	25
	Brunnipes	30
Rhamphus	Æneus Bej.	25
Nanophyes	Obtusus Bak.	25
	Chevrieri Gem.	30
	Hemizphæricus	30
	Limbatus Bak.	30
Erirhinus	Occallescens Ll.	20
Acalyptus	Rufipennis	25
Rhynchœnus	Ovalis Fabricius	40
	Punctatulus Boh.	25
Anobium	Striatellum Duft.	25
Ptinus	Hyemalis Bak.	25
	Fœgalis Zoufr.	30
	Ornatus Muller	25
Malachius	Intaralis Bej.	30
	Trivittatus Fab.	
Nebria	Germarii Rue	75
Ditomus	Parma Dej.	125
Brachinus	Italicus	40
Feronia	Corsica	1
	Loricata	1
Cicindela	Ægyptiaca	40
Coccinella	Phalerata Zoh.	25
Cryptocephalus	Fuscatus Bej	25

Monsieur

Lorsque j'eus l'honneur de vous voir, à votre passage à Genève, vous me témoignates le désir, de faire l'emplette de quelques petits coléoptères, ainsi que j'eus récoltasse des Hymenoptères, Hemiptères pygmées. Maintenant que je vais recommencer mes chasses, je viens vous demander, si telle est toujours votre intention. Dans la supposition d'une réponse affirmative, j'aurais trouvé d'autre part, la note des coléoptères, dont je pense que plusieurs d'entr'eux, pourraient être agréables.

Quant aux Hymenoptères, Hemipt^res etc. je crois que vous aurez lieu d'entre satisfait, à en juger par les rapports que j'ai eu avec M^r le Marq^s Spinola à Gênes. Il y a quelques années, qu'il me pria de lui transmettre quelques centaines de ces petits insectes, qui tous étoient proprement collés par un atome de gomme à peine mon envoi étoit-il en ses mains qu'il m'invitoit à lui faire passer, tout ce qu'il me serait possible de lui récolter, ayant trouvé dans ma boîte, des choses charmantes. Depuis cette époque j'ai lui ai fait passer, en vérité des masses de ces petits insectes, à cela jusqu'au moment, où l'affaiblissement de la vue, la contraint à renoncer à l'étude des insectes en général; nous étions convenus de f 8.– de France, le 100 –

Si votre convenance se rencontrait à donner suite à la présente, veuillez me favoriser d'une réponse, je pense que d'ici à 3 – ou 4 mois, je serais à même de vous adresser les Hymén^p. Hemipt^res, en y joignant les coléoptères que vous pourriez désirer.

Ens

78 42

me rappelant toujours avec plaisir votre connoissance, j'ai l'honneur de
vous saluer avec la plus parfaite considération.

Votre très humble Serviteur
Fréd. Chevrier

Genève le 10 Mai 1848.

40

Mon adresse est, M^r Frédéric Chevrier
chez M^rs Heutsch & C^ie
à Genève.
Suisse.

Reçu le 15 Mai
Répondu le 17

Rhamph
Nerium
Erythrin
Acalypt
Rhamneæ
Arabian
Pinus
Melastom
Vebrin
Dilenn
Crotal
Cerinth
Cruciat
Cupulif

Monsieur

Monsieur le Conseiller De Heyden

à Francfort S/M

GENEVE 9 MAI

B 1 82

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main
DFG

Genève le 26 Juin 1848.

Très cher Monsieur

Je viens de recevoir votre lettre du 21. & je m'empresse de vous informer que je me suis plus maintenant à même de satisfaire à la commande que vous avez bien voulu me transmettre. Les événemens politiques du jour ont frappé cruellement notre ville, & moi surtout dans mon particulier, financièrement parlant. Dans cet état de choses, ayant trouvé à vendre passablement ma collection ainsi que tous mes doubles, j'en ai pas cru devoir laisser échapper cette occasion, quoique à mon grand regret, vous comprendrez donc l'impossibilité matérielle, où je me trouve pour vous envoyer les coléoptères, que vous avez pris la peine de me désigner. Quant aux Hyménoptères Diptères etc, dont je vous ai entretenu, si plus tard vous étiez disposé à m'en faire quelque demande, je ne manquerais pas de vous les établir, car par cela, la chose me sera toujours facile.

Gardant toujours un souvenir très agréable de votre bienveillante visite en ville je vous renouvelle l'assurance de ma haute & parfaite considération.

Vve Chevrier

Rhampt

Nzaropi

Eurhina

Acalypt

Rhyncol

Anobium

Ptinus

Mo

Malachiu

Nebria

Dilomu

Brentus

Feronia

Cicindel

Carabus

Cryptoce

31

30

London

geb. 1770. – † 16. 12. 1860.

M. 6 Pfennige

42

428

40

1829

von Natur

die fidelitas

ist der

Stolle Besitzer

Rhampl
Nanopt

Evirbium
Acalypt
Rhyncol

Arabium
Pinus

Malachia

Nebria
Ditomus
Brentus
Feronia

Cicindel
Carabus
Cryptoce

D 4

Benoit
Heyden

Frankfurt a/M.


GEF

Clark Bracy. Dr. med. vet.

in

London

geb. 1770. – † 16. 12. 1860.



Rhampl

Necrop

Eurhina

Acalypt

Rhyncol

Anobium

Ptinus

Mylabris

Nebria

Ditomus

Brentus

Leronia

Cicindel

Carabus

33

de Contamine

Lybicus. Oes. cinereus, thorace punctis quatuor, aliisque tribus, atris.

Habitat in Aegypto. ~~Rüpell~~ D. Rüppell.

Descr. magnitudo et statura ceteris ovis. Corpus totum c capite cylindriforme. Facies magna c antennis flavo-albis vertice fusco stirmatibus tribus nigris. Oculi majores rufescentes. Thorax cinereus antice foveolo impressus, ad latera punctis duobus pertusis atris, paribus posticis elongatis. Scutellum magnum cinereum lateribus alisque duobus anticis nigris. Abdomen breve, obtusum, argentes albicans, punctis fuscis inquinatum, latera dorsum scabriusculum punctis elevatis fuscis et quasi respiratoriis. Subtus albicans. Pedes rufescentes femoribus unico, tibiisque duobus, annulis nigris. Alæ albo-pellucidæ, basi nigricantes, puncto fusco transversâ flexuosâ costæ adnexa lineâque atris.

Hæc descriptio maris est. B: C. apr. 30 d. 1832.

B. Clark London

Dr. Ditis Victor Ditissimus Dominus Dr.

Schreber

Rhampl

Nemopt

Errhine

Acalypt

Rhyncal

Anobium

Ptinus

Melasoma

Nebria

Dilomus

Brachinus

Feronia

Cicindel

Carabus

de Contamine

à

Dole

(depart. de Jura)

Major und Regiments-Chef im
1ten Lanciers Regiment. Prinz Wil-
helms Regiments-Nr. ist jetzt im
Besitz von Pierret

† 7. 7. 1846 in Rambouillet

Rhampl

Nanops

Eurybia

Acalypt

Rhyncol

Anobium

Ptinus

Mylabris

Nebria

Dilomm.

Brachius

Feronia

Cicindel.

Carabici

Cryptoce

Cordier

Dôle le 18. Février 1845.

Monsieur et très honorable Collègue,

J'ai reçu l'honneur de vous voir à Strasbourg lors du Congrès scientifique, ainsi que le plaisir de vous posséder quelque tems chez moi à Schlestadt où vous vous êtes donné la peine de faire votre visite. Ayant formé une Collection de Polypiers, j'avais formé pour la belle saison de 1843, d'aller pour vous visiter à Francfort, mais le départ du Régiment qui a eu lieu en avril, m'a privé de ce plaisir.

J'ai donc remis pour le moment à ce voyage que j'ai l'intention de faire plus tard, en attendant je me suis décidé à vous écrire pour vous prier de me donner de vos nouvelles et qui me seront fort agréable, je vous prie de le croire. Je

Rhampt
Neurop

Erirhin
Acalypt
Rhyncol

Anobium
Ptinus

Malachius

Nebria
Ditomus
Brentus
Leronia

Cicindel
Coccinel
Cryptoce

Je profite également de l'occasion pour vous demander si vous n'auriez pas dans votre collection en double des Aspius du Jais de Lapponie, Suède, Norwège ou Islande ainsi que Cobitis Taenia, Phoxinus, Blennius, Polaris, Fringa, Freija, Buna, Charidus & Lucioperca Sandra, Thalictrum Jacobi, Catoscopa pacta, Satyrus norna, Silla, Cilla, Bida, Baldur, Bore, Nebria gelata, Loxia Bore, arctica, Sorex groenlandicus, Templii &c. —

Je désirais bien aussi avoir un exemplaire de Aspius Rapax que l'on nomme Asula dans vos environs, il manque à ma collection si vous me rendriez service de vouloir bien me le procurer ainsi que les espèces que vous citez plus haut, si vous pouviez disposer soit d'un exemplaire ou deux — alors ce que vous me

X

42

1825

40

1829

Cordier

35

Demandez en échange, je tacherai de mon
Côté de vous le procurer. Si toutefois je
ne pouvais me procurer tout ce que vous me
Demandez alors je vous serai infiniment obligé
de me les céder au prix qu'elles auront Coûté
et je vous ferai parvenir une traite sur Francfort,
La fille de Kindermann se nomme Antoinette
Sa rareté Voilà que

Melitea Adopensis — (mal
Lycaena Celestina —
— dem — Cyane —
— ? — Evanor —
Nostra — Cana —
Gastrop. Cramerii —
Plusia mandarina
Bisp. Tetonisa —

Cuculia Dracunculi —
Nostra Antanguidalis
Cucullia porphyrina
Satyr. Hyppolita
— Antonia
— amaillis —
Zygaena Centaureae
Hesperia Sylvanus H. Sp
(mal)

Je joins également Vous offres quelques espèces
de l'Espagne, du midi de la France et de la
Corse. ——

Il me sera également facile d'en à quelques
mois de Vous procurer une quantité de petites

Rhampl
Nanapi

Evirbius
Acalypt
Rhyncol

Anobium
Ptinus

Malachius

Nebria
Ditomus
Brentus
Leronia

Cicindel
Carabus
Cryptoce

Aspina (minor Linnæi) dans votre Faune
principalement. Collection. J'ai eu de me ami
qui est comme moi habitant du Dépt. du Nord
qui en fond des quantités, celle ci qui les
fournissait à Mr. Duponchel pour la
Continuation de son ouvrage sur les Lépidoptères
il les prise et les vale avec beaucoup de soin
Lisez Croyez, monsieur, que si nous avons quelq
relations inutiles, je ferai de mon Côté, tous ce
dépendra de moi pour les rendre agréables et
assurer la Continuation. Je suis extrêmement
flatté d'avoir eu l'honneur de faire votre connois
et j'aurai toujours le plus grand désir de la
Cultiver.

En attendant le plaisir de recevoir de Vot
nouvelles, que j'ai bien d'espérer, Accepter, je vo
prie, l'assurance de mes Sentimens les plus distingu
et veuillez me croire avec une haute Considération

Votre très devoué Serviteur et Collègue

de Cortamine

Major de 5e Regt. de Faune — à Dole

Cordier

in

Frankfurt a/M.

Hofrath. H.

Seine werthvolle Petrefactensammlung befindet sich im Besitz des Senkenberg. schen Museums daselbst.

geb. 15.8. 1773

†. 1823.

1824

den Natur-

. die fidelis

das

sie ist in Basalt selten, mehr aber auch noch einige andere der Senkenbergischen Sammlung fehlende Versteinerungen z.B. die Fulgora laternaria,

dass gestern ist der

Dr. Klinger

Rhampl
Nanopi

Erirhina
Acalypt
Rhyncol

Anobium
Ptinus

Molachius

Nebria
Ditomus
Brachus
Feronia

Cicindel
Carabus
Omaloso

Jobin, l'expedition de mon Sentiment sur le plan dont
il vous a plu me croire avec une haute Considération
Votre très dévoué Serviteur et Collègue
de Coëtlosquet
Major de S.t Hyac. de Fauvine — à Dole.

39

42

40

Cretzschmar, Phil. Jac.

37

14

Eine Geschwulst

[illegible]

Rhampl
Nemopt

Eurhina
Acalypt
Rhyncol

Anobium
Ptinus

Malachius

Nebria
Ditomus
Brentus
Feronia

Cicindel
Carabici
Cryptoce

Hierbey übersende ich Ihnen die Beschreibung
der Käfer, welche ich auf der Reise gesammelt habe.
Ich bitte Sie, mir Ihre Meinung darüber
gefällig mitzutheilen, damit ich mich in
Zukunft darnach richten kann.
Ich bin mit Hochachtung
Ihr
ergebenster
Frankfurt
d. 21. Feb. 1823.
Dr. Cordier

39

Cretzschmar, Phil. Jac.

38

150
150
104
104
104
54
54
54
45 — 54
110
12
60
27
27
8 — 30
14 — 6
1 — 30
1092 0

91/12
182
91
092/12
104

40

42

124

der 1829

Rhampl
Nauupi

Errhina
Acalypt
Rhyncot

Anobium
Ptinus

Malachia

Nebria
Ditomus
Brentus
Leredia

Cicindel
Carabici
Cryptoce

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

39

Cretzschmar, Phil. Jac.

Dr. med.

in

Frankfurt a/M.

geb. 11. 6. 1786. in Sulzbach b/Frkft.

† 4. 5. 1845.

42

40

1829

Rhampl

Naurop

Erirhin

Acalypt

Rhyncol

Anobium

Ptinus

Malachiu

Nebria

Dilomus

Brachus

Feronia

Cicindel

Carabus

Carab

16.

Frankfurth d 15ten Febr 1824

42

15

München
~~Frankfurth~~ d 18ten Febr 1824

40

Lieber Freund

Ich bin am 16ten glücklich hier angekommen
& gerne mit einer großen Cohorte von Natur-
forschern. Bey der Abreise in Frankfurth
waren wir zwei und dreißig Gelehrten & Künst-
ler hier ~~hier~~ für 23 ~~angekommen~~. Die Fidelität
war Gegenstand Unterredung, & wir haben bey unserm
Durchreisen durch Darmstadt, Heidelberg, Stuttgardt und
Augsburg Gesellschaften gegeben & genommen. Hier ist
bald a große Zahl & gute Künstler versammelt und
viel Kunstwerke sogar Sorgenkinder; denn Cornelius
haben wir gesehen & die Nicolai & Kinder
einige wünschen als ob wir hier geboren
oder schon lange Zeit hier wären. Die Stadt
sind viele alte höchst eigenthümliche Gebäude
sammlungen wiederum viel Gemälde Gobelins
& Kunst Gründe einige Kupfer. Am ersten
Tag ging's steif her, aber gestern ist der
Staub von den alten Leuten abgewischt
worden. Wir haben nachmittag zusammen
Abendessen beim Leo gehabt. Schellings

Gut dass Du dazu aufgelegt bist selbst
der alte Pfarrer Gut eine viel ganz andere
Bedeutung angelegt hier Flugblätter gebraucht.
Du sind dann die Gegnerinnen Rätsel
in Verlag Pfarrangelegenheiten viel einmal
eingeladen werden à ob ich für Dir wünschen
dass Sie keine mehr zum Flugblatt
kommen wird.

Diese Morgen Frauen die Pfarrer
ren, dass Katharina wird auch die Fürstenin
von Württemberg zuerst besteigen werden
es scheint dass Hellinger das katholische
Fürstin der Gesellschaft durch entkommen
wollen, damit das Wasser nachher das
Gemeinschaft desto richtiger in Einfluss
fließen können. Nun wir werden das
alles sehen.

Jetzt zur Erzählung. Ich habe
hier einen bedeutenden Freundschaft aufge-
laden à vollziehen. Wann Du alles schon
weißt und ich für mich acquiriert haben denn
wirst Du meine alte Dreimütigkeit in
einem gewissen parallelle mit Pfarrer Gastfreie
Gastmütigkeit finden. Lassen alle von
Dein entdeckten Affen à Mängel haben uns

16.

Frankfurt d 15ten Febr 1828

41

wohlthun. pritt. hyacinthinum cephalopterum
superbum gloxinia crepitans à leucojeflora, crassa
peruviana cicuvien magnari &c in genug
abzugeben 50-60 Stück gut eingetopfte Stängel.

Erste nun vorläufig den klösternen
amia felis jubeata à amian caeca
pictus avertebratus. Er soll sich alle mögliche
Mühe geben dieselben so schön als möglich
gesund zu senden, damit ich den Herren
Ihre Freyen können wie neun Dingstehen
auferlegt. der Hund mit ihrem Namen
diese beiden exemplare müssten starting
Vain bis ich komme dann ich will mich
expedit gleichen upon der Herr Freyen Meßen
das ihre wieder behilflich à bey weiteren
meine Forderung d d. in Leben Anderen
und will ich mich übertragen sind.

Grüße Herzlich alle Freunde
à Bekannten so wie

Ihnen Freundschaften

Dr Creizenach

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

MÜNCHEN

Der Hochgeehrten
Frau Oberlieutenant
Karl v. Heydenreich
Wohl
Frankfurt
a/M

16.

Frankfurt a/M 15ten Febr 1828

62

Lieber Freund

Durch Ihren Freund Hr Haber von hier erhielt ich die Gefälligkeit zu Ihrer Unterhaltung beyzutragen durch Mittheilung einiger Ihnen noch fehlenden Arten. Ich habe aufmerksam die Liste mit durch diesen Freund durchgesehen und gefunden daß Sie bereits die fünf letzten Hefte des Atlas besitzen. Was die Liste betrifft so sind eben nicht viele Lücken darinn zu bemerken, daß das von Ihnen vorgeschlagene Exemplar anadarcas zu streichen wäre, weil die beyden von Schneider Vulgo als Varietäten angeführt ist. diese Bemerkung ist bereits schon vollzogen in der kommenden Folge derselben abermalls angezeigen.

Einliegend sende ich die das Vorzeichniß meiner desiderata mit ich Sollte mit dem Catalog nur zurück senden. Sage der Vollen meinem Freunde Einsiedeln wen er bemerke ihm daß ich bereit bin mit dem Thierhandlung einen Tausch mein catalogue documentirt ist [illegible] wenn er einlänglich aequivalent gibt mir Ihnen wie die seinen Galago senegalensis [illegible] zu senden.
Der Englische Regierung die Mexicaner gallitta u otis cafra wünschen wir sehr willkommen sein. Sollte er sonstige neue Gegenstände als mexicanische Thiere bekommen, so wünschen wir diese dazugesellen

Sein verwandtlich Tractätlein ertan wird wie
in dieser Partikia Stund sind. Ehrst jeden
Fall wirst du stimmt mit bringen kunst
Sticken wie dich wieder ung bearbeiten zu tüb.
flenn so wirst ich dir in der Gedächtnis
zürich, dass du mir den Catalog der Doublett
Allegeis verdrossen die Terricaslagei
& die abgehandlung über die Dendro colapte
weitbringst, dann Eichstamstein hat mir
diese versprochen & wenn er sie mir geben
kann so wirst solche nachgehaben so. wie
die Berliner abgehandlungen &c.

Jetzt noch mein Bitte Grüsse den Otto
Wagler Freundlich von mir. sage ihm & ich
ihm sein Zimmer wirte & sein Zimmer gleich ihm
in Gewichtigkeit zu Ehr Ehren. Vielleicht könnt
ihr ihm einbringen Runge sage dass
ich mir ganz gründlich Mensch zu bestaun
bin pp Valentijnus verfasser mit bestaun
allen Freundlich Grüssen & Gruiba mein
Freundlich wo sein Schüng mir nächsten Jahre
sein wird. Noch wirdorten ich den dir dass du
mir das lithographirte Manuscript der an
Wesen der naturgemäss mitbringen wirst
Leitha Eichstamstein um an Exemplar gleis mich.
Meinen Freundlich Grüss an Neuberg & Bruch

Dein Freundgalerie

D Schadow

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Professor Dr. Hegel
Hochwohlgeboren
Wohlgeboren
in Berlin

von G. de Cristoforis bei Saiano
Aufgefunden dieses Jahr im Saltrio:
May. 1836.
Dorcadion Taurigum
Melyris costata
Cryptocephl. 12 pustulatus.
Macrogibbus 2 tuberculatus
Cossonus pallidipennis
Heteroc. minutus
Notoxus univittatus
Clerista palpalis
Blemus discus

de Cristofori, Giacomo

in

Mailand

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von G. de Cristoforis bei Saimb
Aufenthalt daselbst zu halten:
May. 1836.

Dorcadion Taurigum
Melyris costata
Cryptocephk. 12 punctulatus.
Macrongchus 2 tuberculatus
Cossonus palliditarsis
Heterosc. minutus
Notoxus univittatus
Clerisstes palpalis
Blemus discus
Cetonia albella.
Psoa italica.
Brentus italicus
Pedinus quadratus
Chrysomela Rossii.
grossa
Timarcha rugulosa.

Dagegen ist zu geschickt:
(d: 25 May 36. durch Hildebrandt)

Promecops episcopalis. Schönh.
Clythra pertinax. H. Hg
Cassida fucosa.
Tetratoma fungorum
Hister quadratus
Ramoecus 2punctatus.

18.

de Cristoforis aus Mailand war für May 1836.
ist 16 Rthl Päße von ihm erhalten. welche ihm
königl. dagegen an Hildebrandt schicken.

17

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19. Curtis in London hat im July 1862 [illegible]
Melly von mir gut Gibbs erhalten.

Lozotaenia Ameriana L. ♂ (Pyrastrana Hb.)
— — ♀ (Corgenerana Hb.)
Carpocapsa splendana Hb.
— amplana Hb.

Curtis, John

in

London

† 6. 10. 1862. (70 Jahre alt.)

19.

19. Curtis in London hat im July 1842 Briefe
Melly von mir gr[illegible] u. Falter.

Cozotaeria Ameriana L. ♂ (Pyrastrana Hb.)
——— ♀ (Congenerana Hb.)
Carpocapsa splendana Hb.
——— amplana Hb.
Rhecothroa rugosana Hb.
Coccyx Dipoltana Hb.
Myelois Elutella Hb.
Cerobasis Consociella Hb.
Cryptoptery x Abietella S.V.
Lampronia Hellifferella FR.
Swammerdamia cerasiella Hb.
——— Crotaegella L.
Gelechia Vaccinella Hyon (Taurella Hb. fig. 188.)
Cauchas Fibulella S.V.
Euplocamus Choragellus L. (Medicella Hb.)
Ypsolophus Marginellus F.
Oecophora Angustella Hb.
Leythris Cicadella Zell.
Yponomeuta Cedellus Tisch.
——— Plumbellus S.V.
Psecadia Echiella S.V.
Depressaria Emeritella Hübn.
Gelechia Pedisequella Hb.
——— Tripunctella Metzn.
——— Brizella Tisch.
——— Hermannella F.
Argyresthia Illuminatella FR.

Verte

endeavour to procure them for you; I should also feel obliged by your letting me know at that time, if any of my specimens are identical with Hübner's or any other published names of insects.

Some of your Species were duplicated to me, but about half of them I had before; I will therefore add a list of those which are duplicated with me; hoping that you may be able to supply me

1 Apiota Vibicella Hb.
1 Coleophora Peripennella FR.
1 —— Laricella ~~Tisch~~ Hb.
1 Coriscium Quercetellum Zell.
1 Schreckensteinia Roesella L.
1 —— Heydeniella FR.
1 —— Herrichella Hüb.
1 Oposlega Scitella Meyr.
1 Bucculatrix Hippocastani Zell.
1 Nepticula centifoliella Hüb.
1 Lithocolletis Cramerella F.
1 —— Ulmifoliella Hb.
1 —— Emberizaepennella Bouché
1 —— Schreberella F.
1 Ornix guttiferella Zell.

43 N.

Ich habe diesfalls das Erforderliche
von ihm verlangt, und von Hey[illegible]
wird die Sendung

Lepidoptera for the Senateur Ch. de Heyden from J. Curtis 48

60 St. 1842.

no

1 Pindica corticeana Hub
2 —— Botaletana Haw
3 Spilonota trimaculana Haw
4
5 —— flagiana
6 Tinagphera Hobulella Linn
7 Steganoptycha retiana Haw
8 —— subumbrana Haw
9 —— trimaculana Don
10 Anchylopera fractifasciana Haw
11 Philedea nigromaculana Haw
12 —— sociana Haw
13 —— bilunana Haw
14
15 —— exquilunana Haw
16 —— subocellana Don:
17 Carpocapsa nigricana Fal.
18 —— cana Haw
19 Aphelia paupérana Haw.
20 —— bipunctana Haw
21 Crephasia longana Haw
22 —— rectifasciana Haw.
23 Orthotænia Bentleyana
24 Cochylis obumbrana Haw
25 —— alternana Steph
26 —— maculosana Haw.
27 Acrophora subfulvella Fal.
28 Depressaria purpurea Haw
29 Anacampsis Populella Linn.
30 —— Betulea Haw
31 —— aspera Haw
32 —— nigra Haw
33 —— Diffinis Haw
34 —— subfusca Haw
35 —— Blabaniella Hub.

Oct. 20.

36 Batalis flavicapitella Haw
37 Parcolia Mercurella Linn.
38 —— Leuwenhoekella Linn
39 Gelechia cinerea Haw
40 —— Pinetella Don
41 Tinea ~~crinitella~~ vestianella Linn
42 Lampros minutella Linn.
43 Lampronia rupella Fab.
44 —— subpurpurella Haw
45 Gracillaria Humbergella Fab.
46 —— praeangustata Haw
47 Pterophorus trigonodactylus Haw

20

52

d, Middlesex.

54

52

leine
Herrn
ch er-
chtel
uch
e zu
urde,
rsehen.
ir
ung
reil
ter-
e.
de
e
ziel-
Ver-
e
affen
al
e-

ceived so much of my

to study the economy of

n London into the Country

I assure you it was not

ve your specimens Varieties

13, after making a Tour of

was getting so late in the

pleasure of seeing you &

of England, about so

most of their abdomens shaken off.

Should you wish for better specimens of any of them & will inform me when you again favor me with a box I will endeavor to procure them for you; I should also feel obliged by your letting me know at that time, if any of my specimens are identical with Walker's or any other published names of insects.

Some of your Species were duplicata to me, but about half of them I had before, I will therefore add a list of those which are duplicata with me; hoping that you may be able to so supply me

/ Apista Vib
/ Coleophora
/ ———
/ Coriscium
/ Schreckenste
/ ———
/ ———
/ Opostega Sc
/ Bucculatrix
/ Nepticula
/ Lithocollet
/ ———
/ ———
/ ———
/ Ornyx Gu
43 N.

er Post als unbestellbar
ck erhalten.

Frankfurt d. 1 Feb. 1846.

52

23.

Mein Herr!

Im Monat Mai 1844 überschickte ich Ihnen eine kleine
Schachtel mit Microlepidopteren, durch die Güte des Herrn
Hope, welcher mich zu jener Zeit durch seinen Besuch er-
freut hatte. Ich zweifele nicht, daß Ihnen diese Schachtel
zugekommen ist und will sie durch diesen Brief auch
nicht mahnen mir einige Microlepidopteren dagegen zu
schicken, welches mir freilich viele Freude machen würde,
... Blatten versehen.

Hallen d. 24 Aug. 1843
Dies. Prof. Hübner

Braunau 26 Mai 1844
u. 62 Microlep. gr. Fidel.

69

21.

Sir

Mr. Melly having been so obliging as to send me a
box of Lepidoptera which you had the kindness to direct to me
I now avail myself of his offer to return you some of the
duplicates you required. I very much regret that I have
no better specimens at present, but a large collection of these
small Lepidoptera which I sent to a correspondent in America
took away my good specimens unfortunately when I last removed
to my present residence my duplicates suffered very much & had
most of their abdomens shaken off.

Should you wish for better specimens of any of them &
will inform me when you again favor me with a box I will
endeavor to procure them for you; I should also feel obliged by your
letting me know at that time, if any of my specimens are identical
with Hübner's or any other published names of insects.

Some of your Species were dedicata to me, but about half
of them I had before; I will therefore add a list of those which are
dedicata with me, hoping that you may be able to supply me

...e, Middlesex.

...ment for your acknowledging
...obliging as to transmit to
...3, after making a Tour of
...was getting so late in the
...pleasure of seeing you &
...the attention I have to pay
...ers of England, absorb so
...received so much of my
...to study the economy of
...London into the Country
...I assure you it was not
...me your specimens & names

1 Apista Vib
1 Coleophora
1 ———
1 Coriscium
1 Schreckenste
1 ———
1 ———
1 Oposlega Sc
1 Bucculatrix
1 Nepticula
1 Lithocollet
1 ———
1 ———
1 ———
1 Cryptex Jü

43 N.

with them at a future opportunity as I am very desirous to have my Collections well named. You will see by my "Guide to an Arrangement of Brit. Insects that I possess a very large portion of our British Insects & I have added many hundreds since that book was published

I have the honor to remain

Sir

your obed.t & obliged Serv.t

John Curtis

11 Robert St. Hampstead Road, London

6.th Oct.r 1842.

P.S. I have retained your list of desiderata as I shall be able to set aside some of them as opportunities may offer & the Pyralides & Tortricites I have not had time to look over

Post als unbestellbar
e erhalten.

Frankfurt d. 1 Feb. 1846.

52

23.

Mein Herr!

n Monat Mai 1844 überschickte ich Ihnen eine kleine
chachtel mit Microlepidopteren, durch die Güte des Herrn
'ope, welcher mich zu jener Zeit durch seinen Besuch er-
reut hatte. Ich zweifele nicht, das Ihnen diese Schachtel
ugekommen ist und will Sie durch diesen Brief auch
icht mahnen mir einige Microlepidopteren dagegen zu
chicken, welches mir freilich viele Freude machen würde,
" " " " " " Doubletten versehen.

Lepidoptera which I wish to add to my collection

50

maurana Hüb.
Cavigana Fab.
obliquana Fab.
Moderiana Linn.
ochreana Hub.
adiva porphyrana Hub.
thuia Gentianana Hub.
Clavata Scheffleriana Peyr.
apholitha Lunalana Hub.
ebylopera cuspidana Hub.
Phalæna incarnatana Hub.
arpocapsa Hastana Hub.
uphasia roseana Hub.
—— rosaceana Hub.
—— Subligana Hüb.
grotis Latharniana Hub.
upucilia cinerana Hub.
rgyrotoza Hoffmannseggana Hub.
elerio cerusana Hub.
Penasa Logiana Linn
—— coronana Fabr.
—— Deniseana Hub.
—— profanana Fab.
Carotherisus Dilutanus Hub.
—— Lathamianus Curt.
Scopula nebulalis Hub.
—— diversalis Hub.
Botys glabralis Hub.
Pyralis murtinalis Hub. (Hermimia)
Hypena obesalis Treit.
—— palpalis Hub.
Chilo gigantellus Fab.
—— cuneellus Linn.
Crambus agnitellus Hub.
—— fuscelineellus Scher.
—— ericellus Hübn.
—— pratorellus Hub.
Adraxes Lapella Hub.
Phycita obtusella Hub
—— adornella Germ

Aedia Kobeltella Linn.
—— Scabiosella Scop.
Epicrostoma bractella Hub.
Aplota cristella Linn
Depressaria badiella Hub.
—— Carduella Hub.
—— Yeatsana Fab.
—— putridella Hub.
Anacampsis Listorella Linn
—— Populella Hub.
—— Granella Hub.
—— interruptella Hub.
—— Scopolella Hub.
Asphelostia Cbella Fab.
—— anthella Hub.
Brastania Gallipennella Hub.
—— Stentinipennella Hub.
Harpagas cristella Linn
Glyphipteryx metallella W. V.
—— Schaefferella Linn.
Microstia exiguella F.
—— quadrella Hub.
Argyromyzos multiplicella Hub.
—— cerasiella Hub.
—— Kollariella Fab.
—— Klemannella Fab.
—— Cytisiella Fab.
Telea ambiguella Hüb.
Ephemonita insorella Hub.
Euplocamus Anthracinellus Hub.
—— Fasciellus Linn.
Lepidocera Chenopodiella Hub.
Incurvaria pectinicella Fab.
Lampros Ephemerella Fab.
—— Sthella Hub.
—— Luzella Fab.
—— Megerlella Hub.
Gracillaria rufipennella Hub.
—— Mayerella V.
—— roscipennella Hub.
Pterophorus calodactylus Hub.

ed, Middlesex.

54

52

ment for acknowledging
obliging as to transmit to
3, after making a Tour of
was getting so late in the
pleasure of seeing you
the attention I leave to pay
ers of England, absorb so
received so much of my
to study the economy of
Linden with the Country
I assure you it was not
me your specimens Varanes

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

/ Apiota Vib
/ Coleophora
/ ———
/ Coriscium
/ Schreckenste
/ ———
/ ———
/ Opostega Sc
/ Bucculatrix
/ Nepticula
/ Lithocolleti
/ ———
/ ———
/ ———
/ Ornix gi
43 N.

Herr Senateur Ch. de Heyden

Francfort s/m.

Post als unbestellbar erhalten.

Frankfurt d. 1 Feb. 1846.

52

23.

Mein Herr!

Monat Mai 1844 überschickte ich Ihnen eine kleine
chachtel mit Microlepidopteren, durch die Güte des Herrn
ope, welcher mich zu jener Zeit durch seinen Besuch er-
eut hatte. Ich zweifele nicht, das Ihnen diese Schachtel
ugekommen ist und will Sie durch diesen Brief auch
icht mahnen mir einige Microlepidopteren dagegen zu
chicken, welches mir freilich viele Freude machen würde,
ber Sie sind vielleicht jetzt nicht mit Doubletten versehen.
ehr angenehm würde es mir aber sein, wenn Sie mir
ber die überschickten Arten, nur ganz kurz Mittheilung
ob solche vielleicht in England zum Theil

Am H. John Curtis in London am 26 May 1844
durch H. Hope geschickt. — 62 Stück. 51

22

Retinia Geniculana Hb.
Coccyx Strobilana Lin
Tortrix Lathoniana Hb
— Rutilana Hb
— Ochreana Hb.
Teras Cerusana Hb
Crambus Palpellus S.V.
— Bellus Hb.
Myelois Suavella Zk.
— Consociella Hb.
Chimabacche Phryganella Hb. ♂♀
Tinea Imella Hb.
— Biselliella Hummel (Crinella Tr.)
— Granella L. Hb. 2 Stück
— Fuscipunctella Haw. (Uvorella S.V.)
Micropteryx Calthella L.
Nemotois Scabiosellus Scop. ♂♀
Ypsolophus Semicostellus Hb.
Plutella Persicella S.V.
Ypsolophus Lemniscellus Fischer v. R.
Plutella Harpella S.V.

d. 1 Feb. 1846 an Curtis geschickt. Hope ausgegangen, diese Sendung
[illegible] Mittheilungen [illegible] Arten [illegible]
Hamburg [illegible] Stück [illegible] Arten [illegible] Stück
[illegible] Arten

/ Apista Vill
/ Coleophora
/ ———
/ Coriscium
/ Ochreeenste
/ ———
/ ———
/ Oposlega Sc
/ Bucculatrix
/ Nepticula
/ Lithocolleti
/ ———
/ ———
/ ———
/ Ornyx gi
43 N.

Ypsolophus Verbascellus S.V.
Striatellus S.V.
Anchinia Pyropella S.V.
Oecophora Lactgella S.V. (Betulinella Fr.)
— Schaefferella L.
— Cinnamomea Zeller
— Selinella Zell.
— Chenopodiella Hb (Tristella Fr.)
— Restigerella Mobner
Depressaria Liturella S.V.
— Assimilella Tisch.
— Cricella Tisch
— Depressana Fab
Gelechia Populella L.
— ——— var.
— ——— var. Tremulella S.V.
— Leucatella L.
— Terrella Hb (Czephyrella Fr.)
— Senectella Fischer v.R.
— Senebrella Hb
— Vulgella S.V.
— Nigriferella Zell
Glyphipteryx Loricatella Tisch
Argyresthia Arcuthina Zell
— Abdominalis Zell.
Coleophora Serenella Tisch
— Coturnella Fischer v.R.
— Ballotella Tisch v.R.

Post als unbestellbar
erhalten.

Frankfurt d. 1 Feb. 1846.

52

23.

Mein Herr!

Im Monat Mai 1844 überschickte ich Ihnen eine kleine Schachtel mit Microlepidopteren, durch die Güte des Herrn Hope, welcher mich zu jener Zeit durch seinen Besuch erfreut hatte. Ich zweifele nicht, das Ihnen diese Schachtel zugekommen ist und will Sie durch diesen Brief auch nicht mahnen mir einige Microlepidopteren dagegen zu schicken, welches mir freilich viele Freude machen würde, aber Sie sind vielleicht jetzt nicht mit Doubletten versehen. Sehr angenehm würde es mir aber sein, wenn Sie mir über die überschickten Arten, nur ganz kurz Mittheilung machen wollten, ob solche vielleicht in England zum Theil andere Namen führen, da es mich namentlich sehr interessirt, die Arten von Haworth näher kennen zu lernen. Da ich immer viele Doubletten besitze, so würde es mich sehr freuen mit einem Entomologen Englands, der sich gründlich mit den kleinen Lepidopteren beschäftiget, in Tausch treten zu können und können Sie mir hierzu vielleicht behülflich sein. — Könnte ich nicht durch Ihre Vermittelung Ihre Abhandlung über die „Insects affecting the Corn-crops" erhalten? Ich habe sie mir noch nicht verschaffen können, da besondere Abdrücke derselben aus dem Journal der Agricultural Society, wohl nicht in den Buchhandel gekommen sind. — Mit grösster Hochachtung Ihr ganz

ergebenster

von Heyden

54

...ed, Middlesex.

...ceived [illegible] acknowledging

...obliging us to transmit to

...23, after making a Tour of

...was getting so late in the

...chance of seeing you

...the attention I have to pay

...ers of England, about so

...I could so much of my

...to study the economy of

...Linden with the County

...I assure you it was not

...in your specimens I have

/ Apiosta
/ Coleoph
/ ——
/ Coriser
/ Schrecke
/ ——
/ ——
/ Oposleg
/ Buccul
/ Neptic
/ Lithoc
/ ——
/ ——
/ ——
/ Erney

43 N.

Serenella Fisch. v. R.
Tenebrella Hb.
Vulgella (v.)
Nanniferella Dell.
Elaphipteryx Loricatella Fisch.
Argyresthia Arcuathina Zell.
Abdominalis Zell.
Coleophora Serenella Fisch.
Coturnella Fisch. v. R.
Ballotella Fisch. v. R.

53

…d, Middlesex. 54

…vented from acknowledging

…bliging as to transmit to

…3, after making a Tour of

…t was getting so late in the

…the pleasure of seeing you

…his attention I have to pay

…ces of England, absorb so

…received so much of my

…to study the economy of

…n London into the Country

…assure you it was not

…ve your sparrows Yours

1 Apiota
1 Coleoph
1 ——
1 Corise
1 Schrecke
1 ——
1 ——
1 Opostege
1 Buccul
1 Neptic
1 Lithoc
1 ——
1 ——
1 ——
1 Conyx
43 N.

Mr Curtis
11 Robert's Hampstead Road
London
P.D.
Monsieur John Curtis
franco.
13/2

Serenella Fischer v. R.
Tenebrella Hb
Vulgella v. R.
Maculiferella Zell
Lithriptenyx Loricatella Tisch
Argyrestheia Arcuthina Zell
Abdominalis Zell.
Coleophora Serenella Tisch
Coturnella Tisch v. R.
Ballotella Tisch v. R.

Hayes near Uxbridge, Middlesex.
1st Dec. 1847.

24.

Sir

I regret exceedingly that I have been so long prevented from acknowledging the safe arrival of the Microlepidoptera, which you were so obliging as to transmit to me by Mr. Hope in May 1846.

As I returned to England in the Autumn of 1843, after making a Tour of Italy, I had hoped to be able to see you in Francfort, but it was getting so late in the year that I was obliged to hasten home, & was prevented the pleasure of seeing you & also M. de Selys Longchamps at Liege.

My regular engagements in three Periodicals & the attention I have to pay to the economy of the Insects injurious to the Farmer & Gardener of England, absorb so much of my time, that pure scientific Entomology has not received so much of my attention as my inclination would have given to it. The better to study the economy of Insects & with the hope of improving my health, I removed from London into the Country in 1846, which interfered with all my previous arrangements, & I assure you it was not until yesterday that I could devote the time required to compare your specimens & names with my own, so as to give you any useful information.

I hope you will therefore excuse my apparent neglect & should you no longer take an interest in this subject I should esteem it a favor if you would transmit my Notes to Mr. Zeller, whose Monographs have interested me exceedingly.

I am not aware if you ever saw my "Guide to an Arrangement of British Insects" if you have not & I know how to forward you the sheets comprising the Lepidoptera, you would see what the Genera & Species of this Country are & those which I possess. I wish at the same time I could send you some of your Tenderata, but there are very few that are so rare in England that I possess only single specimens, or at most the sexes.

I never received your remarks upon the species I sent you which I am sorry for.

The following observations are the result of a careful comparison of your specimens with my own. Those that are unnoticed, either agree exactly with my specimens, or they were new to me, as most of the beautiful species were.

Lozotænia americana ♂ ♀ are L. fulvana W.V. & T. asperana Lienig:
Cocyx shebilana L. is different to ours & most like Teras sphena rutilana Fab:
Orthotænia rubilana Haw. is the same as ours.
Cocyx dispoltana is Coshylis marginana Haw:
Rhopobota hastiana is P. Dentella Fab:
Myelois suavella Zink is the Phycita verruella Hub. in my Cabinet
Chimabache phryganella ♂ is our Leucomatosella & the ♀ is Haworth's Diana Novembris
Nemotois scabiosellus is Adela Frischella Linn:
Cambas fibulella S.V. is our Adela Latreillella
Depressaria emeritella is different to any of our species.
——— depressana is a var: of the D. Bluntii of any Brit: Cat:
——— liturella S.V. is a var: of D. Spaumanniana
——— assimilella is a var: probably of T. atomella Hub:

Vulgella (?)
Naeviferella Zell
Hyphipteryx Loricatella Tisch
Argyrolepia Arcuthina Zell
Abdominalis Zell
Colcophora serenella Tisch
Coturnella Tisch v. ?
Ballotella Tisch v. ?

Gelechia senectella Fisch is closely allied to Anacampsis affinis.
G. vulgella S.V. is Haworth's A. aspera
G. hispanella is very like Haworth's A. domestica, but they are distinct
G. pediscequella Hüb: is A. Maculatella Linn:
Your Acrophora castella is Anacampsis sarcitella Linn.
Ypsolophus semiostella is the Macrobila fasciunculella Linn.
Coleoph: cotunnella is obtidipennella Hüb: in my Cabinet.
——— Ballotella Fisch: is probably Haworth's T. lutarea.
Gelechia Hermannella F. is Zinckella Hüb:
Schrank: Persicinella F.R. is a beautiful N.S.
Your Lyonetia Clerckella is not the Linnean species, but the type of Argyromiges autumnella of Curtis's Brit. Ent: pl: 284 pub^d in 1829 with a Copper plate
Yponomeuta cognatella Hüb: is the true Linnean Y. Clerckella.
Hermannianna cerasiella Hüb: is the Y. cagnella Hüb: of our Cabinets.
Tinea Persicella S.V. is different to Haworth's species
Your var: of Tinea granella is our T. parasitella
Tinea luridella Hann: is T. flavescentella Haw: & T. destructa Steph: I believe.
——— spretella S.V. is fuscipunctella Haw.
Micropteryx Calthella is my Genus Eriocephala of Brit. Ent. pl & fol. 751. pub^d in 1839 with a Plate
Lampronia stellipennella is L. melanella Haw:

I shall be most happy to hear from you respecting Entomology

Dear Sir

Your obed.^t & obliged Serv.^t

John Curtis, F.L.S.

D 4
1912

Paid

15

M. Charles Von Heyden
Senator
Frankfort sur Mayne

FRANCO

13 Dec.

Vulgella (V.)
Naeviferella Zell
Typhioteryx Loricatella Tisch
Argyrolepia Arcuthina Zell
Abdominalio Zell
Colcophora Serenella Tisch
Coturnella Tisch v. H.
Ballotella Tisch v. H.

Dr. Meigen
Cosmop.

Döbling nächst Wien, 7 ten [illegible]

1826

Hochgeehrtester Herr!

25

Ich habe die Ehre Ihnen Hierdurch zu benachrichtigen
daß ich Ihren Werthen Zuschrift den 5 ten d. erhalten habe, und dem

56

Dahl, Georg

in

Wien

geb. in Ebertsheim b. Grünstadt i. d. Pfalz.

†. 1. 1. 1831. in Wien

Naturaliensammler und Reisender in Süd-Europa


Paid
15

Wöhring nächst Wien N 15te

1826

25

Hochgeehrtester Herr!

Ich habe die Ehre Ihnen Hierdurch zu benachrichtigen daß ich Ihren werthen Empfang vom 5ten d. erhalten habe, und um die Starkmehl Käfer von Coleopteren recht bald zu Ihnen kommen zu lassen, so habe ich auf der Wache allda bestens besorgt, und unter Ihrer Adresse Ihnen das Postwerthen heute übersenden, welches Montag d 16ten von hier abgeht.

Nur wenige Käfer von den bestimmt starkmehlen die ich in diesem Augenblick nicht mehr vorräthig hatte, habe ich Ihnen gleich Nun und wenige andere Käfer die Sie zum vergleichen verlangen, beigelegt.

Den Betrag bitte ich mir ja nicht Briefe zu senden weil es so viel porto kostet, Sie werden schon die Güte haben mir einen Wechsel auf ein hiesiges Haus zuzuschicken.

Für die 2 großen Käfer die ich Ihnen selbst machen lasse und mit heutigem Tage abgehen sind, werde ich die bitte mir 1. f. für beide zu berechnen.

Ich bedauere jedes Mal hätte ich gerne bemerkt, wie mir mein Diener auf der Liste diesen gesendet wie es der Expedition Rath Goëlner gethan hat, so war aber Nie gethan, indeß wollen Sie sich die Mühe nehmen bei einer andern Bestellung mir eine Copie zuzusenden, so will ich es gerne nachsehen.

Carabaeus haemisphaericus Oliv. P.T. Portugall — 2 1 30.

Im Monat März Preise ich nach Ungarn, wo diese Waare sehr zu bekommen, im Dezember Sept ich zurück zu kommen da ich allzeit mit 2 Schüssen in fremden Gegenden bin so sind die Abschlagen immer auf 6 Monat Baarschaft. Diese anwerbe ich die resp. alten die mich vor meiner Abreise mit 100 f wissen möchten, ich will gern für diesmal 25% Rabat zugestehen. Die fernen Exemplare wissen mich umgehend zu machen.

Commende Frühjahr wünsche ich die Ihre nun in Komplette Anzeigniss Schuh Assortiert bitten, Besonders die Schwäbische Waare ohne den Rost ganz gemeine Carabus auratus 12 Kr. der Hier nicht Assortiert.

Conchylien Preise ich nicht, ob ich aber mit Ihnen Tausch mit der sich Eilig damit beschäftigt. Wenn ich Ihnen Ihrer einen Gefallen erweisen so befehlen Sie.

Ich bin mit aller Hochachtung

Ihr

ergebenster

G. Dahl

Bei den sich sehr mehr Commende Arten bitte ich gefälligst zu Anzeichnen, Ihnen die Bestimmungen sind richtig.

Carabacus haemisphaericus Oliv. F.A. Fortunzell — 2 / 30.

Im
Vorn
Ihr
so si
anun
e
Ihr

a
Ihr
12 M.

Ihr Ihr
bitte ich
Ihr Ihr

	fl	xr
Lethrus. F.		
Cephalotes . . .	—	30
Armidens. Zig.		
Scarabaeus. F.		
Typhoeus . . .	—	15
Odontaeus. Zig.		
Scarabaeus. F.		
quadridens . . .	—	30
mobilicornis .	—	15.

Copris	fl	xr
affinis	—	15
media	—	4
subtriaca	—	15
nuchicornis	—	8
Xiphias	—	4
fracticornis	—	8
Coenobita	—	4
natans	—	8
Lemur	—	6
Schreberi	—	8
ovata	—	8
Sisyphus. Lat.		
Schäfferi	—	8

Aphodius	fl	xr
nigripes	—	8
obscurus	—	12
sericatus. Sahlb	—	20
moestus. Zi.	—	15
Porcus	—	8
scrapha	—	8
sordidus	—	8
4punctatus. f	—	6
rufescens	—	8
lugens. Creutz.	—	8
hydrochaeridis	—	20
immundus. Cr.	—	8
nitidulus		

Aphodius	fl	xr
porcatus	—	8
testudinarius	—	12
4maculatus	—	6
4pustulatus	—	6
serotinus. H.	—	20
scatidus	—	10
putridus. H.	—	15
plagiatus	—	10
niger. Illig	—	10
tristis. Pz.	—	12
sacrians. Duft.	—	4
constans. H.	—	16

Leby 1820.

No	Nomen	Vaterland	Thlr	fl	xr
1	Procerus caucasicus. ♂. Steven. nov. sp.	vom Taurischen Gebirge selten, und ist eine Zierde jeder Sammlung			
2.	—— tauricus. ♂. Oliv.	um Taurien	1	6	—
3.	Carabus cribratus. Schoenh.	♂ und ♀ Ungarn	1	6	
4.	—— Stevenii. Sch.	♂ aus Taurien nov. sp.	1	3	
5.	—— campestris. Steven. ♂ sp. nov.	Astrachan	1	3	
6.	—— exaratus. Schoenh.	aus Ungarn	1	3	
7.	Stomis glabrata. Pz. ♂. ♀. nov. sp.	Sicilien	2	2	
8.	Cerambyx ambrosiacus. ♂. Schoenh.	aus Astrachan	1	3	
9.	Pesomacha cruciata. ♂. F.	aus der Krim	1	3	
10.	—— sericata. ♂. ♀. Schoenh.	Sibirien	2	2	
11.	—— pigra. ♂. Steven.	Krim	1	1	
12.	—— holosericea. v. M. ♂. ♀.	Sotolien	2	2	
13.	Oritis uncalcar. P. ♀.	Taurien	1	2	
14.	—— Amyntas. Stev. ♂.	Astrachan. sp. nov.	1	2	
15.	—— irrorata. F. ♂.	Sicilien	1	1	30
16.	—— festiva. ♂. nov. sp. Stev.	Taurien	1	3	
17.	Tertyria taurica. Stev. nov. sp.	Taurien	1	—	18
18.	—— orbiculata. F. ♂. ♀.	Sicilien	2	1	30.
19.	—— laevigata. Stev.	Rußland	2	1	30
20.	Pandarus tauricus. Steven.	Taurien	1	—	45.
21.	Hister planus. F.	Dasselb Stück ♂ aus Taurien	1	1	
22	Copris fissicornis. Steven ♂. ♀.	Taurien	2	1	30.
23.	Scarabaeus haemisphaericus. Oliv. ♂. ♀.	Portugall	2	1	30.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Stück	f	kr
24.	Blaps gigantea. Dahl. nov. sp. ♀ Sicilien	1	3	—
25.	— striata. Dahl. nov. sp. ♂♀. do	2	4	—
26.	— lusitanica. Hoffg. ♂♀. Portugall	2	3	—
27.	— oculta. Dahl. ♂♀. Sicilien	2	4	—
28.	— cylindrica. Steven ♀. Crimea	1	2	—
29.	— obtusa. F. ♂♀. Sicilien	2	1	30.
30.	Pimelia verrucosa. Fab. ♂♀. Sicilien	2	3	—
31.	— perlata. Dahl. ♀. do	1	2	—
32.	— rugulosa. M. ♀. Ungarn	1	1	—
33.	— corrugata. Presel. ♂♀. nov. sp. Sicilien	2	2	—
34.	— aplanata. D. ♂♀. Erlenbrien	2	2	—
35.	Erodius gibbus. F. ♂♀. Portugall	2	1	30.
36.	— sulcatus. Pres. Sicilien	1	1	—
37.	Scaurus laticollis. Pres. do	1	2	—
38.	— sulcatus. Pres. do	1	1	30
39.	Akis sylphoides. Pres. ♂♀. do	2	3	—
40.	— reflexa. F. vera ♂♀. do	2	0	—
41.	— spinosa. F. ♂♀. do	2	2	—
42.	Silpha subpunctata. Ros. ♂♀. do	2	2	—
43.	Lytta erythrocephala. F. Crimea	1	1	—
44.	Mylabris anaiis. Pr. nov. sp. ♂♀. Sicilien	2	1	30.
45.	— melanura. F. ♂♀. do	2	1	30.
46.	Anisonyxa bombyliformis. F. ♂♀. Crimea	1	1	—
47.	— vulpes. F. ♂♀. do	2	1	—
48	Cerocoma praeusta. Steven. Astrocom, in Crimea			
49.	Tymaecha Blapoides. Ziegl. ♀. nov. sp. Sicilien	1	2	—
50.	Clythra taxicornis. F. ♂♀. Sicilien	1	1	—
		2	1	30.

Lethrus. F.	f xr	Copris	f xr	Aphodius	f xr	Aphodius	f xr
Cephalotes	30	affinis	15	nigripes	3	porcatus	3
Armidens. Zig.		media	4	obscurus	12	testudinarius	12
Icarabaeus. F.		subtriaca	15	sericatus. Gebl	20	4maculatus	6
Typhoeus	15	ruchicornis	3	moestus. Zi.	15	4pustulatus	6
Odontaeus. Zig.		Typhaeus	3	Roseus	8	serotinus. H.	20
Icarabaeus. F.		fracticornis	3	Scrapha	8	fostidus	10
quadridens	30	Coenobita	4	sordidus	3	putridus. H.	15
mobilicornis	15.	nutans	3	4punctatus. f	6	plagiatus	10
		Lemur	6	rufescens	3	niger. Illig	10
		Schreberi	3	lugens. Creutz.	3	tristis. Pz.	12
		ovata	3	hydrochaeridis	20	varians. Duft.	4
		Sisyphus. Lat.		immundus Cr.	8	constans. M.	15
		Schäfferi	8	nitidulus		Zig	15

		Stück	f.	xr.
1.	Pandarus striatus. Dejean. f. Pyrenäen	1		48
2	—— emarginatus. F. (Blaps) ♂ ♀	2	1	30
3	—— gibbus. v. M. Portugale	1		30
4.	—— Schmidtianus. M. Carnuol	1		40
5.	Trichodes ammios. F. Pyrenäen	1	1	
6.	Trogosita coerulea. F. Pfalzburg	1	1	
7.	Tenebrio socialis. D. Sicilien	1		24
8.	Odontus cylindricus. F. Lixus. Ungarn	1	2	
9.	Pimelia serricea. ♂♀. Otis. Egypten	2	4	
50.	—— hispida. ♂♀. Otis. ♂♀	2	3	
51	Gnata aranipes. Pr. ♂♀. Sicilien	2	3	
52	—— rugulosa. Pr. ♂♀. ♂♀	2	3	
53.	Rhyrobatus cinereus. D. Sundinen	1	1	
54.	Chrysomela regalis. Otis. Egypten	1	2	
65.	Meleus Sibertii. D. — ♂♀	1		45
66.	Sogenes amophylus. Steven. Sundinen	1	1	30
67.	—— punctatus. Steven. ♂♀	1	1	
68.	Archarius elephas. And. ♂♀. Oesterreich	2	1	
69	Pitho coeruleus. F. Schweden	1		45
70	—— festivus. F. ♂♀	1		48

N. 99. f 137. x 43

Von Basel 1820.

Leby 1820.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jm
Vorn
Hr:
Jo Jé
artun
e

2ú

a
Thy
12 M.
(

61

Cui Hrn
bitte ich ý
die Cons Bi

Lebz 1820.

	fr		fr		fr		fr
Lethrus. F.		**Copris**		**Aphodius**		**Aphodius**	
Cephalotes	30	affinis	15	nigripes	3	porcatus	3
Armidens. Zig.		media	4	obscurus	12	testudinarius	12
Scarabaeus. F.)		subtriaca	15	sericatus Dahl	20	4maculatus	6
		nuchicornis	3	moestus. Zi.	15	4pustulatus	6
		Xiphias	4	Rosens	8	serotinus. H.	20
Typhoeus	15	praticornis	3	Scrapha	4	foetidus	10
		Coenobita	4	sordidus	3	putritus. H.	15
Odontaeus. Z.		nutans	3	4punctatus f	6	plagiatus	10
Scarabaeus. F.)		Lemur	6	rufescens	3	niger. Illig	10
		Schreberi	3	lugens. Creutz.	3	tristis. Pz	12
		ovata	3				
		Sisyphus. Lat.		hydrochaeridis	20	saxicans Duft.	4
quadridens	30			immundus Cr.	8	constans. M.	15
mobilicornis	15	Schäfferi	8	nitidulus	6	rubens. Zig	15
Scarabaeus. F.				rufus	15	conjugatus	20
		Gymnopleurus. Ill.		merdarius	3	fossor	4
vernalis	4	gibbus Schneid.	20	serpentinus Pz	6	Moravicus. M.	15
alpinus. St.	24	Geoffroy	6	villosus. Gyll.	15	sulcicollis. Voigt.	15
Sylvaticus	4			limbatus. Zig	20	foetens	6
punctatocollis. Mnl.	12	**Ateuchus. F.**					
stercorarius	4	sacer	40	suis	4	fimetarius	3
politus	12	pius. Illig	30	sphacellatus. Pz	6	gibbus. Dahl	8
		laticollis	40	conspicuus	3	scybalarius	6
Onthophagus. Z.		variolosus	40	pallens Dahl	13	maculatus. St.	10
Copris. F.)		semipunctatus	24	lunatus. M.	8	tessulatus. St.	12
lunaris	4	morbillosus	45	pubescens. St.	6	haemorrhoidalis	3
emarginata	4	**Oxitis. F.**		dubius. M.	12	granarius	3
Hispana ♀	30	flavipes	4	punctatosulcatus St.	12	pusillus. Gyll.	6
Parisicus ♂	30	pallipes	15	prodromus	3	arenarius	8
Bubas. Z.				limicola. Pz	6	alpinus. Fröl	15
Oxitis. F.)		**Aphodius**		Aleticus. St.	10	carbonarius. St.	3
		erraticus	3	equestris Pz	12	sulcatus	15
Bison	20	subterraneus	3	contaminatus	12	elevatus	10
Copris. F.		scrutator	12	setosus. M.	18	sulcicollis. Ill.	8
		rufipes	4	conspurcatus	3	sulcatus. St.	12
Capra	10	pecari	6	nubilus. St.	8	**Trox. F.**	
Taurus	4	depressus	15	pictus. Cr.	12	hispidus	4
minor. M.	24	depressus Schwarz	20	inquinatus	3	arenarius	4
semicornis	15	interpunctatus. M.	15	centrolineatus. Pz	4	sabulosus	3
furcata	10	lividus	4	oblongus Dahl	12	**Aesalus. F.**	
vacca	6			caesus	8		
				asper	6	scarabaeoides	15

obscurus	18	elongatus Dahl	12	marginatus	8		
loripes. Ill	24	villosus	8	punctulatus	20	unilineatus. Sturm	6
curvipes	30	striatus	30	dimidiatus. Bergst	20	granularis	4
Phaleria. Latr.		austriacus. Dahl	12	latissimus	20	lineatus	4
culinaris	12	smaragdinus. Dahl	12	Röselii	15	paludstris	8
Erodius. F.		mergus. Aube	8	sulcatus	6	sexpunctatus	4
		viridis. M.	10	canaliculatus. Kn	12	nigrita	8
bilineatus	20	ater. M.	10	Hybneri	8	erythrocephalus	4
gibbus	20	minutus	6	transversalis	8	angustulus. Ko.	8
Scolytus. F.		cupreolineatus Dahl	30	stagnalis	20	planus	4
limbatus	10	**Enhydrus. M.**		agilis	6	pullus. Ko	8
Sperchaeus. F.		**Hydrophilus. F.)**		adspersus	6	parallelogramus. Kn	15
		testaceus	12	bipunctatus	8	alternans. Ko	8
emarginatus	8	ficolor	10	maculatus	8	picipes	4
		nigripes. M.	10	abbreviatus	12	confluens	6

	℔	ß
Allacantharus Fi		
Syrodendron		
communis	—	4
Geotrupes		
nasicornis	—	8
silanus.	—	20
monodon	—	15
punctatus	—	24
Melolontha		
vulgaris	—	3
hippocastani	—	10
fullo	—	15
Dz var. Italia	—	30
orientalis Koy	1	—
occidentalis	1	—
pilosa	—	20
transversa	—	24
aequinoctialis	—	10
verna Zig.	—	20
pilicollis. M.	—	24
solstitialis	—	3
tropica. Hn.	—	12
aprilina. Gr.	—	12
aestiva. Chs	—	12
Omaloplia s.M.		
Melolontha		
brunnea	—	12
ruricola	—	6
limbata. M.	—	10
variabilis	—	3
Anomala. M.		
Melontha		
Frischii	—	4
oblonga	—	15
Julii.	—	10
vitis	—	20
aurata	—	15
auricollis. Dahl	1	—

	℔	ß
Anisoplia s.M.		
Melontha		
austriaca	—	15
arvicola voll	—	15
arvicola Hoarz	—	15
arvicola Hellroj	—	15
praticola	—	6
agricola	—	8
crucigera Hbst	—	15
fruticola	—	8
fruticola var	—	8
segetis. Koy	—	15
floricola	—	15
Hoplia Ill.		
squamosa	—	8
pulvifera. And.	—	15
argentea. F.	—	4
pulverulenta	—	10
rupicola	—	20
pusilla	—	15
farinosa	—	20
graminicola	—	10
Cetonia		
fabulosa	—	15
affinis Hoppe	—	20
metallica	—	12
floricola	—	8
marmorata	—	4
italica M.	—	20
viridis	—	20
aurata	—	3
stictica	—	4
hirta	—	3
vulpina	—	15
morio	—	24
Amphicoma Lat.		
abdominalis	—	30
Trichius		
eremita	—	10
8 punctatus	—	20
nobilis	—	10
fasciatus	—	4

	℔	ß
Trichius		
succinctus	—	15
haemipterus	—	8
Necrophorus		
Germanicus	—	15
humator	—	10
curvipes. Ill.	—	10
vespillo	—	3
sepultor, And.	—	36
mortuorum	—	15
Lucifer.	1	—
Hister		
complanatus. Ill.	—	8
depressus	—	4
frontalis. Pk	—	10
oblongus	—	4
angustatus. E.H.	—	12
flavicornis	—	3
caesus	—	6
bisexstriatus. E.H.	—	8
12striatus. E.H.	—	8
distinctus. M.	—	12
carbonarius. E.H.	—	10
nigellatus. And.	—	10
stercorarius. E.H.	—	3
politus. Dahl	—	15
merdarius. E.H.	—	20
terricola Dahl	—	20
cadaverinus. E.H.	—	3
impressus	—	20
unicolor	—	4
inaequalis	—	15
medius	—	20
major	1	—
4notatus Ill.	—	3
4maculatus	—	10
sinuatus	—	8
Illigeri D.	—	12
limetarius E.H.	—	6
purpurascens	—	4
bimaculatus	—	8
semipunctatus	—	20

	℔	ß
Hister		
nitidulus E.H.	—	3
aeneus	—	8
rugiceps. Duftsch.	—	12
viridis. M.	—	15
metallicus	—	8
rugifrons. Pk.	—	18
rotundatus. E.H.	—	15
rufipes. Pk.	—	10
aereus. M.	—	15
conjungens Pk	—	8
globosus. E.H.	—	8
arenarius. Dahl	—	15
Hypsenor. M.		
Hister. F.		
striatus	—	12
sulcatus	—	18
canaliculatus Dahl	—	15
Scaphidium		
agaricinum	—	3
immaculatum	—	30
4maculatum	—	10
Sphaeridium		
lunatum	—	6
scarabaeoides	—	3
marginatum	—	6
4pustulatum	—	4
2pustulatum	—	4
renipustulatum. M.	—	8
Cambrus. M.		
Sphaeridium F.		
haemorrhoidalis	—	3
haemorrhous Gyll.	—	10
analis. St.	—	4
atomarius	—	3
unipunctatus	—	3
Agathidium F.		
nigrinum. St.	—	15
seminulum.	—	8
Anisotoma F.		
nigripenne	—	15

Phalacrus. Pk.	ƒ	ʒ
corticalis. Ill.		3
consuens. Pk.		3
ovalis. M.		8
aeneus		6
bicolor		4
haemorrhoidalis. M.		4
geminus. St.		4
nitidulus. Schüp.		8
abietis. Dahl		8

Byrrhus. F.

°echinatus. M.		10
semistriatus		15
°exillis. Zieg		6
nitens		8
aeneus		10
varius		4
°Stoicus. Müll.		10
murinus		16
°auratus		15
Gigas		20
ornatus. Pz.		40
°Dianae		20
°cinctus. Ill.		20
°cuniger. M.		15
°angulifer. M.		15
°coronatus. Ill.		18
pilula		3
oblongus. St.		12
°clandestinus. M.		15
fasciatus. F.		4
repandofasciatus. St.		10

Scymnus

bisbipustulatus.		3
4 lunulatus. Ill.		6
flavifrons. Dahl		6
bicinctus. M.		6
rufipes		6
nigrinus. Ill.		6
flavipes		6

pannulus		6
analis		6
litura		6
abietis. F.		8
Quercus. Dahl		6
nonis		6

Coccidula. Ill.

pectoralis		4
scutellata		4

Coccinella

ocellata		8
oblongopunctata		6
11 maculata		16
Argus. Scrib		18
7 punctata		8
9 punctata. Oliv.		12
distincta. M.		15
16 guttata.		16
10 guttata		18
bisexguttata.		15
tigrina		8
20 punctata		8
12 punctata		8
13 punctata		4
18 guttata.		6
19 punctata		6
mutabilis. Ill.		8
7 notata		8
14 guttata		8
bisecaguttata		4
4 punctata. L.		4
conglobata		8
14 punctulata		8
rosea. Deg.		8
humeralis. Schrank		6
diversa. Dahl		12
6 punctata. Dahl		12
nigra		15
5 punctata		8
2 punctata		8
4 pustulata		8
6 pustulata		8
4 verrucata		4
12 pustulata		8
2 pustulata.		8

Coccinella

24 punctata		8
livida. Hbst.		6
subglobosa. Dahl		10
impunctata		10
3 signata. Dahl		10
repensis. Hbst.		6
lateralis. Illig.		8
aurita. M.		8

Chrysomelina

		20

Phaedon. M.
Chrysomela. F.)

punctulatus. Duft.		8
armoraciae		8
cochleariae		8

Diaperis

Boleti		8

Colaphus. M.
Chrysomela. F.)

Sophiae		8

Chrysomela

°graminea. M.		8
graminicola. P.		8
pyritosa. Rossi		10
°carniolica. Scop.		12
hottentotta		8
°rufa. M.		20
°globosa. M.		12
°aerea. M.		16
°crassimargo. Ill.		16
°haemisphaerica. Rd.		12
°Rossia. Illig.		16
lamina		16
Bulgarensis. Schr.		10
°Dahlii. Kn.		16
haemoptera		4
Coerulea		16
°lucida. Oliv.		24
polita.		8
lurida		10
limbata		4
carnifex		12
analis		8
marginata		8

Chrysomela	ƒ	ʒ
Schach		4
aucta		4
°affinis. Dahl		8
Betulae		8
°collaris		12
°circumcincta. Ill.		8
°marginalis. M.		10
sanguinolenta		8
Banksii		12
Staphilaea		8
°chalcitis. Dahl		16
varians		8
fucata		6
°nigra. Dahl		12
°gemellata		6
°geminata		8
fastuosa		8
americana		16
cerealis		6
°Megerlei		12
violacea		10
°chalybaea. Dahl		16
fulgida		10
graminis		8
Menthae. Scott		4
°Raphani		12
Polygoni		8
Adonidis		8
°dorsalis. Schr.		8

Paropsis. Oliv.)
Chrysomela

6 punctata		8
lituna		6
decostigma. Rd.		12
nigripes. M.		10
vimenalis		4
dispar. Payk.		6
testacea. Dahl		10
nigella. Dahl		10
flavicollis. Dahl		15

°obscurus		12
loripes. Ill.		24
curvipes		30

Phaleria Latr.

culinaris		12

Erodius. F.

°bilineatus		20
°gibbus		20

Scolytus. F.

limbatus		10

Sperchaeus. F.

°emarginatus		8

°elongatus. Dahl		12
villosus		8
°striatus		30
°austriacus. Dahl		12
°smaragdinus. Dahl		12
mergus. Ahr.		8
°viridis. M.		10
°ater. M.		10
minutus		6
cupreolineatus. Dahl		30

Enhydrus. M.
Hydrophilus. F.)

testaceus		12
°ficolor		10
nigripes. M.		10

marginatus		8
punctulatus		20
dimidiatus. Bergst.		20
latissimus		20
°Röselii		15
sulcatus		6
°canaliculatus. Kn.		12
Hybneri		8
transversalis		8
stagnalis		20
agilis		6
adspersus		6
°bipunctatus		8
maculatus		8
°abbreviatus		12

°unilineatus. Schr.		6
granularis		4
lineatus		4
palustris		8
sexpunctatus		4
nigrita		8
erythrocephalus		4
°angustulus. Ko.		8
planus		4
°pullus. Ko.		8
parallelogramus. Kn.		15
alternans. Ko.		8
picipes		4
confluens		6

Febr 1820.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

Lina. M.
(Chrysomela. F.)

	f	x
20guttata		6
tremula		3
populi		3
cuprea		6
°tristis. Duft.		15
°praetiosa. Duft.		8
°gloriosa		10
°phalerata. Hoff.		20
°coeruleolineata. Duf.		8
°punctata. M.		10
aenea		3
vitellinae		3
°Hanoveranae		12
marginella		8
°Anderschii. M.		15

Timarcha. M.
(Chrysomela)

tenebricosa		8
pratensis. K.		15
°rugosa. Duft.		8
coriaria		4
°purpurascens M.		12
°gottingensis		8
°laticollis. M.		20
metallica. Pz.		12
gibba. Dahl		15

Helodes

violacea		8
phellandrii		3

Crioceris

4maculata		8
°adusta		12

Luperus. F.

rufipes		3
flavipes		3
Pinicola. And.		8
chalybaeipennis Zig.		15
Sysimbrii		6

Galleruca

minuta. Dahl		10
limbata. Fröhl		6
lineola		8
elongata. Dahl		15
calmariensis		8
Nymphaeae		6
Viburni. Pk.		8
tenella. Roff		6
Persicariae. Dahl		8
Lythri. Gyll		8
flaviventris Dahl		8
Capreae		3
interrupta		15
pallida. Duft.		15
rustica		4
marginata		12
circumdata. Duf.		12
Tanaceti		3
rufa. M.		10
haematidea. Ad.		10
sanguinea		3

Haltica

nigripes		3
Lepidii. E.H.		4
chalybea. Kn.		8
oleracea		3
coerulescens. Dahl		10
coerulea. E.H.		3
Hyosciami		10
Cardui. Dahl		10
Cuprea. Dahl		8
Pannonica. Dahl		12
metallica. Kn.		6
Caprae. Dahl		4
Helxines		3
sericea. Ill.		3
graminis. E.H.		15
globosa. Ill.		10
testacea		3
Akrensii. Germ		12
excoleta		3
novella. Kn.		6
fuscipes		4
collaris. Dahl		8

Haltica

rufipes		6
Echii. E.H.		8
dentipes. E.H.		3
Serpillii. Kn.		8
pubescens. E.H.		8
subglobosa. Dahl		12
Mercurialis		6
Verbasci. E.H.		6
Cyparissiae. E.H.		8
analis. Cr.		10
nemorum		3
flexuosa		6
Brassicae		4
laeta. Dahl		12
Moderi		3
semiaenea. E.H.		8
Cynoglossi. E.H.		8
testacea. Dahl		8

Eumolpus

arenarius		4
pusillus. M.		8
vitis		4
obscurus		8
praetiosus		10

Cryptocephalus

flavilabris		8
°alpinus. Dahl		12
°bisignatus. Dahl		15
°frontalis. Dahl		8
flavipes		3
°gemmeus. M.		6
labiatus		4
°sanguinicollis		8
Hybneri		4
marginatus		8
°terminatus. Cr.		10
2pustulatus		6
°bistripunctatus. Cr.		10
°salicis		15
2punctatus		3
lineola		6
vittatus		6
°connexus. Ill.		10
°Wavarius. Koy		15

Cryptocephalus

pygmaeus		12
°Bohemii		18
bilineatus. Pz.		6
°elegantulus. Koy		6
°frigoreus		10
pusillus		4
°interruptus. M.		8
minutus		6
°Populi. Dahl		8
Moraei		4
°cruciatus. Dahl		8
°4pustulatus. Ill.		15
°6guttatus		8
varians. Pk.		10
°flavescens		8
°detonsus		10
°10punctatus		12
bothnicus		12
hieroglyphicus		3
°de var. pfeuzy		6
°histrio		6
°scriptus. Dahl		10
°lignosus. Dahl		15
°fimbriolatus. Kn.		8
tristis. Laich		8
flavifrons		3
°bigeminus. Ill.		15
4pustulatus. Koy		15
°flavoguttatus. Oliv.		10
°villosulus. M.		15
tobatus		6
haemorrhoidalis		6
°auratus. M.		8
sericeus		3
°chlorodicus. Kn.		8
°Pratorum. M.		8
°intrusus. M.		10
°purpuratus. M.		6
°nitens		15
°Centaureae. M.		10
°viridis. M.		12
°subtilis. Dahl		15
°smaragdinus. Zig.		10
elongatus. Zig.		8
violaceus		8

Cryptocephalus

Coryli — 10
°dispar Dahl — 15
cordiger — 4
variabilis — 6
°variegatus — 8
sexpunctatus — 8
°10punctatus — 15
coloratus — 8
°axillaris Schh. — 15
Pini — 3
°Abietis Hbst — 12
°bactus — 15
°janthinus Sch. — 15

Clythra

°chalibaeicornis M — 15
°impressihumeca M — 15
°cyanicornis Dahl — 8
longimana — 6
°axillaris Dahl — 12
°fulgida Dahl — 12
humeralis — 15
brachialis Fig — 12
longipes. — 6
°4maculata — 10
4punctata — 10
calceata M. — 15
°laticollis M — 12
appendiculata M — 12
fasciata M — 3
Leopolina — 3
°macropus Ill — 15
°Horalis Dahl — 15
Flavicollis M. — 10
cyanea — 3
aurita — 3
affinis — 3
°collaris — 10
bucephala — 10
°concolor — 8

Colaspis

°Uterna Ill. — 20

Dorcatoma

Bovistae Gyll. — 8

Orion M.
Ptilinus F.

testaceus Cr. — 8
laticollis M. — 8
ater P2 — 8

Ptilinus

pectinicornis — 4

Anobium

tessellatum — 6
castaneum Ill. — 8
denticolle P2 — 8
abietis — 6
vulpes A. — 15
politum M — 8
pertinax — 3
paniceum — 3

Cis

Boleti — 3

Ecoptogaster

scolytus — 6
haemorrhous A — 8

Hylesinus

angustatus Ill. — 4
piniperda — 3

Platypus

cylindrus — 6

Bostrichus

decumanus Kug — 6
typographus — 3
laricis — 4
tenebrans Schh. — 8
hirtus Hr — 6
quadridens Hd. — 8
diodon Schh. — 8
dispar — 8
limbatus — 6
megacraphus — 8

Sinodendron

°muricatum — 20

Apate

capucina — 6

Psoa

viennensis — 24

Notoxus

°scutellaris M. — 18
mollis — 4
°pallidus Oliv — 40

Tillus

ambulans ♂ — 15
elongatus ♀ — 15

Triela M.
Clerus F.

unifasciata — 15

Corynetes

rufipes — 10
violaceus — 3
°cyanellus Hr. — 6

Trichodes

°Ammios — 30
8punctatus — 30
Apiarius — 4
°apicata Fig — 15
°favarius Ill. — 12
transversalis M. — 15
alvearius — 12

Clerus

mutillarius — 10
formicarius — 3
4maculatus — 24

Cicindela

germanica — 6
campestris — 3
sylvatica — 15
sylvicola M — 8
Danubialis M — 12
°intgra M. — 20
°nemoralis Oliv — 20
°littoralis — 20
sinuata — 10
infracta — 20

Elaphrus

sylvestris Hn. — 6
aquaticus — 3
semipunctatus — 4

Cyclonus M.
Elaphrus F.

uliginosus — 6
cupreus M. — 18
riparius — 3
littoralis M. — 8
austriacus Dahl — 15

Tachypus M.
Elaphrus F.

caraboides St. — 6
pallipes Duft — 12
flavipes — 3

Bembidion

paludosum — 6
°foraminosum St — 8
lucidulum — 8
striatum — 6
oxychalceum — 6

Leja M.
(ab Carabus)

aenea M. — 6
oxychalcea Ill — 3
pygmaea — 6
Loricis — 3
subfenestrata Dj — 8
assimilis Dahl — 6
bigutttata — 4

Lopha M.
(ab Carabus)

6guttata — 3
4maculata Ill. — 10
subfasciata Ko. — 3
4natata M. — 4
lineola M. — 6

---

obscurus — 10
°longatus Dahl — 12
villosus — 8
striatus — 30
austriacus Dahl — 12
smaragdinus Dahl — 12
mergus Aber — 8
viridis M. — 10
ater M — 10
minutus — 6
cupreolineatus Dahl — 30

Enhydrus M.
Hydrophilus F.

testaceus — 12
bicolor — 10
nigripes M. — 10

marginalis — 8
punctulatus — 20
dimidiatus Bergst — 20
latissimas — 20
Röselii — 15
sulcatus — 6
canaliculatus Hn — 12
Hybneri — 8
transversalis — 8
stagnalis — 20
agilis — 6
adspersus — 6
bipunctatus — 8
maculatus — 8
abbreviatus — 12

unilineatus Schr — 6
granularis — 4
lineatus — 4
palustris — 8
sexpunctatus — 4
nigrita — 8
erythrocephalus — 4
angustulus Ko. — 8
planus — 4
pullus Ko — 8
parallelogramus Ka — 15
alternans Ko — 8
picipes — 4
confluens — 6

Phaleria Latr.

cultinaris — 12

Erodius F.

bilineatus — 20
gibbus — 20

Scolytus F.

limbatus — 10

Sperchaeus F.

?emarginatus — 8

Feby 1820.

6

Gaysser

Gaysser

Gaysser

Dahl.

Dahl.

Periphus. M. (auch Carabus)	℔	ß
fasciolatus. M.	—	6
varicolor	—	12
lunulatus. D	—	8
rupestris	—	2
Andreae	—	6
modestus	—	4
decorus. Duft.	—	3
ahaenatus. Hll	—	8
luridus. Duft.	—	10
brunnipes. M.	—	10
tibialis. Duft.	—	8
humeralis. Z.	—	8
fluviatilis. Dej.	—	6
sabulosus. Zig	—	6

Notaphus. Zig. (auch Carabus)		
laticollis. Duft.	—	12
venustulus. Zig.	—	12
articulatus. Pz	—	6
flamulatus. M.	—	8
obliquus. Kn.	—	4
ustulatus	—	6
fumigatus. Cr.	—	6

Trechus. Clair. (auch Carabus)		
collaris. Pz.	—	6
coruscus. Kn.	—	8
Verbasci. Cr.	—	8
paludosus. Hst.	—	1
discus	—	24
cruciger	—	6
dorsalis	—	4

Lebia. Latr.		
cyanocephala	—	4
chlorocephala	—	6
Crux minor	—	10
turcica	—	24
haemorrhoidalis	—	15

Dromius. Bon.		
quadrillum. Cr.	—	6
4maculatus. M.	—	8
spilotus. Hll.	—	4
punctatellus. D.	—	6
maurus. M.	—	6

Discus. M. (auch Carabus)		
rubens	—	2

Paxillus. M. (auch Carabus)		
ephippiger. Duft.	—	8

Cimindis. Latr.		
humeralis	—	8
hemagrica. Duft.	—	10
axillaris	—	12
milaris	—	20
scapularis	—	20
angularis. Gyll.	—	20

Demetria. Bon.		
marginella	—	8
4maculata	—	6
fasciata	—	4
punctato striata	—	6
atricapilla	—	6
imperialis. Hll.	—	10
procera. Kn.	—	15
unipunctata. Cr.	—	6

Odacantha. F.		
melanura	—	15

Drypta. F.		
emarginata	—	20

Brachinus. F.		
crepitans	—	2
evaporans. M.	—	8
impunctatus. M.	—	8
sclopeta	—	4
flabratus. M.	—	8
explodens. Duft.	—	8

Anthomenus. Bon. (nch)	℔	ß
oblongus	—	4
prasinus	—	2
abbipes	—	4

Cychrus. F.		
attenuatus	—	20
rostratus	—	12
°silesiacus. Dahl	—	24
°elongatus	—	45

Procerus. M.		
Gigas. L	—	1

Procrustes. Bon		
coriaceus	—	6

Carabus. F.		
violaceus	—	6
glabratus	—	15
scabriusculus	—	20
hortensis	—	6
hungaricus	—	45
Preisslerii	—	45
purpuratus. St.	—	30
Scheidleri	—	24
Goldegii	—	2
Besseri. Zig.	—	2
oblongus. St.	—	40
nigricornis. M.	—	30
granulatus	—	10
cancellatus	—	6
assimilis. St.	—	30
emarginatus. M.	—	30
tuberculatus. Zig.	—	30
morbillosus	—	10
Ullrichii. Zig.	—	40
excisus. St.	—	30
auronitens.	—	20
nitens	—	24
gemmatus	—	20
sylvestris	—	30
alpestris. Zig.	1	—
convexus	—	12

Carabus	℔	ß
clathratus	1	30
nodulosus	1	—
catenatus	—	30
caelatus	—	45
cyaneus	—	6
Linnei	1	—
Fabricii	1	—
Creutzeri	—	45
irregularis	—	20

Alpaeus. Bon		
brunneus. M.	—	24
ferrugineus. St.	—	24
Hellwigii	—	30

Nebria. Jur		
sabulosa	—	20
picicornis	—	15
erythrocephala	—	20
Gyllenhalii. St.	—	30
Dahlii. St.	—	24
Jokischii. St.	—	30
brevicollis	—	4

Leistus. Fröl.		
terminatus. Pz.	—	15
rufescens	—	10
nitidus	—	30
rufomarginatus	—	24
spinibarbis	—	20
cirrhibarbis. Hlw.	—	24

Calosoma. F.		
sycophanta	—	8
inquisitor	—	4
indagator	1	—
sericeum	—	45

Raptor. M. (auch Carabus)		
multipunctatus	—	12
litteralis. M.	—	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Blethisa. Bon
pocalis — 24
Callistus. Bon
lunatus — 8
Loricera. Lat.
pilicornis — 6
Panagaeus
crux major — 4
bipustulatus K. 8
Synuchus. Gyll
Sturmii. Duft. — 15
atratulus. Kr. — 8
vivalis. Ill. — 16
rotundatus. Pz — 10
Agonum
parumpunctatum — 8
lineatopunctatum M. — 15
punctatum — 4
Ericeti. Kr. — 15
austriacum — 20
impressum — 12
nigricorne — 16
marginatum — 4
hilarae. Zig — 12
lugens. St. — 12
hungaricum D — 15
viduum. Ill. — 4
atratum. M. — 12
asphaltinum M — 15
moestum. Zig — 15
carbonarium M — 10
striatopunctatum Duftsch — 15
Chlaenius. Bon
spoliatus — 24
festivus — 24
velutinus — 1
vestitus — 8
coronatus Pz — 20

Dinodes. Bon.
rufipes Bon. — 24
Platylophus. M.
nigricornis — 6
Schrancki. Duft — 8
holosericeus — 18
quadrisulcatus Pz 30
Licinus. Lat.
cassideus — 15
Hoffmanseggii — 20
Badister. Bon
Zieglerii Pz — 16
sapotarium — 4
centromaculatus K. 20
bipustulatus — 8
Stenolophus. M.
gracilis. St. — 15
fuliginosus. Kr. — 8
picipes — 6
flavicornis — 30
Sphodrus. Latr
purpuratus. M. — 24
janthinus. St. — 20
subcyaneus. Ill. — 15
planus — 12
Synuchus. M.
niger — 8
maurus. M. — 15
Simichus. M.
Striatopunctatus Duftsch — 20
Patrobus. M
rufipes — 6
Platynus. Bon.
angusticollis — 3
scrobiculatus — 15

Pterostichus. B.
fasciatopunctatus — 15
Panzeri. Pz — 30
flavofemoratus Bon — 36
Jurinii. Pz — 20
Zieglerii. St. — 30
Mühlfeldii. Dahl — 30
Wellensii. Dahl — 20
Dahlii. M. — 40
interpunctatus — 45
Cep Cheporus. M.
metallicus — 8
striolatus — 20
Abax. Bon
Beckenhauptii Dej — 30
carinatus. Duft — 15
parallelus. D — 6
striatopunctatus. M — 15
transversalis. Duft — 15
ovalis. Duft — 6
striola — 8
laticollis. M. — 6
parallelepipedus — 20
inunctus. Gr — 10
unctulatus. Gr — 12
Calathus. Bon
melanocephalus — 8
ochropterus. Duft — 8
fuscus — 8
gilvipes. M. — 15
flavipes. Pk. — 6
cisteloides — 4
sulphuripes. Schh — 12
Lophorus. M.
major. M. — 8
femoratus. M — 8
nemorensis. M — 12
cupreus — 8
cupreoides. Ad — 8
coerulescens — 10

Percus. Bon.
Kugellanii Pz — 20
lepidus — 8
marginalis Dahl — 15
Koyii. Dahl — 18
cyaneus. M. — 12
nigerrimus — 20
melanus. M. — 10
melas. Gr — 10
Poecillus. Bon
crenatus. Duft — 4
gagathinus. M — 6
maurus — 20
nigrita — 8
aterrimus — 20
elongatus — 30
picimanus — 30
nitidus. M. — 12
corvinus. M. — 10
Argutor. M
inquietus. St. — 15
ochraceus. St. — 8
interstinctus. St. — 8
strenuus. Duft — 4
longicollis. Duft — 10
diligens. St. — 4
brunneus. M. — 10
rufus. M. — 10
Remulus. M.
oblongopunctatus — 6
Harpalus
punctulatus Pz — 4
cordatus. Duft — 15
germanus — 8
signaticornis — 12
turbidus. M. — 15
sabulicola — 15
Hospes. Gr — 20
ferrugineus — 15
obscurus — 15

Feby 1820.

obscurus — 10
horipes. Ill — 24
curvipes — 30
Phaleria Latr
cultinaris — 12
Erodius. F.
bilineatus — 20
gibbus — 20
Scolytus. F.
limbatus — 10
Sperchaeus. F.
emarginatus — 8

elongatus. Dahl — 12
villosus — 8
striatus — 30
austriacus. Dahl — 12
smaragdinus. Dahl — 12
mergus. Ahr — 8
viridis. M. — 10
ater. M. — 10
minutus — 6
cupreolineatus. Dahl — 30
Enhydrus. M.
Hydrophilus. F.
testaceus — 12
bicolor — 10
nigripes. M. — 10

marginalis — 8
punctulatus — 20
dimidiatus. Bergst — 20
latesignatus — 20
Röselii — 15
sulcatus — 6
canaliculatus. Kn — 12
Hybneri — 8
transversalis — 8
stagnalis — 20
agilis — 6
adspersus — 6
bipunctatus — 8
maculatus — 8
abbreviatus — 12

Dytiscus. F.
unilineatus. Schr — 6
granularis — 4
lineatus — 4
palustris — 8
sexpunctatus — 4
nigrita — 8
erythrocephalus — 4
angustulus. Ko. — 8
planus — 4
pullus. Ko — 8
parallelogramus. Kn — 15
alternans. Ko — 8
picipes — 4
confluens — 6

Harpalus ƒ x

reptans. Kn — 12
chlorophanus. Z — 8
griseus. Pz — 4
ruficornis — 8
bruniventris. Dahl — 8
picipes. M. — 10
nemorivagus. Kn — 4
pumilus. Helbst — 4
abacisformis. M. — 12
binotatus — 8
rufilabris. M. — 10
serotinus. M. — 8
serripes. Cr. — 8
semiviolaceus. P — 8
castanopterus. M — 8
fuscicornis. M. — 10
elatus. M. — 8
variabilis. M. — 8
meridionalis. M. — 10
strigiceps. M — 8
tarsatus. M. — 10
fulvipes — 6
angustatus. M. — 12
lentus. Cr — 8
circumdatus. M. — 10
azureus — 20
haematopus. M — 15
sulphuripes. Dahl — 12
latus. M. — 8
Proteus — 4
thalasinus. M. — 8
nitidus. St — 10
nigripes. M. — 6
punctiger. M. — 8
signatus. Koy — 12
conformis. St. — 12
hirtipes. Cr. — 15
sobrinus. M. — 8
rubricornis. M — 12
vernalis — 3
corvus — 15

Sibus. M ƒ x

helopioides — 8
obtusus. St. — 10

Amara. Bon

eurinota. M. — 4
metallica. Dahl — 8
montivaga. St. — 15
plebeja — 4
communis. Pz — 4
chlorophana. M — 10
ovata M. — 10
aurata. M — 10
ahaenata. M. — 8
fulvicornis. M. — 6
trivialis. Duft. — 8
tibialis. St. — 8
femoralis. M. — 8
vulgaris — 4
viridis. St. — 6
cyanella. M. — 8

Leirus. M.

ingenuus. Cr — 12
ventralis. St. — 10
aurichalceus M — 8
plebejus. Cr. — 8
apricarius Pz — 4
contractulus. D — 15
rusticus. Kn — 8
testaceus. Dahl — 8

Sogenes. M.

°spinipes — 24
(cf. Zabrus Blaptoides)
punctulatus — 15

Steropus. M

aethiops — 15
maditus — 6

Stomis. Latr.

cephalotes — 8
pumicata Pz — 6
rostrata. St. — 12

Plotus. M. ƒ 4

°Illigeri — 24
secalis Por — 8
rotundipennis. D. — 10

Molops. Stum

terricola — 8
brunnipes. M — 10
gagates. Pz — 8
elatus — 8
melas. St. — 10

Zabrus. Latr

gibbus. F. — 12
tenebrioides. Pz.

Cylindrus. M.

°magnus. M. — 48

Scarites. F.

gigas — 48

Zelotus. M.

arenarius — 4
discipennis. M. — 6
gibbicollis. M. — 6

Laena. M.

viennensis cf
Scaurus viennensis
Sturm — 40

Stenosis. F.

filiformis — 20

Scaurus. F.

striatus — 20
punctatus — 30
°gigantheus. M. — 1 —
°tristis. Oliv. — 40

Acida. M.
Akis. F.

acuminata — 45
reflexa. vera — 1 —
punctata — 30

Tagenia. M.
Helops. F.)

caraboides — 3
°quisquilia — 8

Helops. F.

lanipes — 8
°asphaltinus. M — 24
frivolicus. Dahl — 30
Schmidtianus. M. — 30

Blaps. F.

Gigas — 48
striata. Dahl — 1 30
mortisaga — 6
acuminata. M — 20
pannonica. Dahl — 24
punctata. M. — 20
latidica. Cr. — 15
obtusa. Hbst — 30

Moluris. Latr.

°laevigata — 20

Pedinus. M

helopioides. Germ. — 15
femoralis — 4
°punctatus. Dahl — 15
glaber — 3

Pandarus. M)
Blaps. F.)

°emarginatus — 24

Tentyria. Latr.

°laevigata — 24
orbiculata — 20

Pimelia. F.

rugulosa. M. — 40
bipunctata — 24
muricata — 24

Platynotus. F.

morbillosus — 24
°spurcatus. M. — 30
°variolosus — 24
°rugosus. Hbst — 30
°griseus — 24.

Cuphorhynchus M.

albolineatus — 10
complicatus Koy — 10

Loborhynchus M

chrysocomus M — 40
Bructeri M — 24
orbicularis — 12
Ligusticus — 4
subrotundus M — 12
regularis M — 15
Fagi M — 15
auricapillus M — 18

Loborhynchus

caudatus Rossi — 24
sulphuricifer — 15
flavellipes M — 18
hirtipes M — 18
nobilis M — 18
geniatus M — 12
chlorophanus M — 15
plumipes Dahl — 24
squamiger — 12
corruptor Letz — 20
hungaricus Dahl — 24

Dascillus

aeratus Kr — 8
cinerascens — 8
canescens M — 10
viridicollis — 8
betulae — 4
vespertinus — 4

Platyrhynchus M.

viridis — 4
pollinosus — 10
graminicola Ols — 12
Pallas M — 24

Hinnulus M.

Drosillus M.

°ventricosus Dahl — 12

Scotias M.

Psylloides Jacq — 6

Ptinus F.

ornatus Duft — 10
elegans M — 8
6punctatus — 15
bifasciatus Dahl — 8
castaneus Dahl — 12
rufipes — 8
germanus Pk — 8

Asida M.

(Opatrum F.)
°picta — 12

Opatrum F

tibiale — 8
viennense — 12
sabulosum — 3

Bolitophagus.

crenatus — 15
agricola — 6

Lithophilus Frol.

°connatus Pz
rufipellis Frol.) — 15

Hypophloeus

castaneus — 4
bicolor — 12

Trogosita.

coerulea — 48
caraboides — 4

Tenebrio.

transversalis S — 24
piceus M — 20
molitor — 6
opacus Duft — 30
obscurus — 15
bipes M — 24
curvipes — 30

Phaleria Latr

cadinaris — 12

Erodius F.

bilineatus — 20
°gibbus — 20

Colytus F.

limbatus — 10

Sperchaeus F.

°emarginatus — 8

Elophrus F.

nubilus — 8
grandis M — 6
flavipes
elegans Kr — 6
elevatus Dahl — 12
gemellatus M — 8
brevis Hbst — 8

Parnus F.

acuminatus — 36
auriculatus — 8
°obscurus M — 8
prolifericornis — 3
viennensis Dahl — 15
°Dumerilii Latr — 15
°villosus Savi — 15

Heterocerus F.

marginatus — 4

Hydrodromus M

(Dytiscus F.)

minutus — 3
interruptus Pz — 4
variegatus Ko — 12

Gyrinus F.

°bicolor — 10
°cylindricus M — 10
°elongatus Dahl — 12
°villosus — 8
°striatus — 30
°austriacus Dahl — 12
°smaragdinus Dahl — 12
meargus Ahr — 8
°viridis M — 10
°ater M — 10
°minutus — 6
cupreolineatus Dahl — 30

Enhydrus M.

(Hydrophilus F.)

testaceus — 12
bicolor — 10
nigripes M — 10

Enhydrus M

°Juloricollis Dahl — 12
°4punctatus Frol — 8
melanocephalus — 8
°limbatus Dahl — 10
°nitidus Kn — 6
Yaborus M — 8
orbicularis — 4
minutus — 4
globulus Pz — 4
°marginatus Duft — 8
truncatellus — 4

Hydrophilus F.

bipunctatus — 3
luridus — 6
°dentipennis M — 15
°signaticollis M — 10
fuscipes Lin — 10
°picipes — 15
scarabaeoides — 3
aeneus Dahl — 12
caraboides — 4
°pallipes M — 15
piceus — 6
°sulcisternalis M — 45

Dytiscus F.

circumflexus — 24
°circumcinctus Ill — 20
marginalis — 8
punctulatus — 20
dimidiatus Bergst — 20
latissimus — 20
Röselii — 15
sulcatus — 6
°canaliculatus Kn — 12
Hybneri — 8
transversalis — 8
stagnalis — 20
agilis — 6
adspersus — 6
°bipunctatus — 8
maculatus — 8
abbreviatus — 12

Dytiscus

°chalconatus Ill — 8
guttatus Pk — 8
4guttatus M — 15
°austriacus Dahl — 15
ater — 6
fuliginosus — 8
aeneus Ill — 8
fenestratus — 12
carbonarius — 15
paludosus — 12
uliginosus — 8
°femoralis Pz — 8
°affinis Pk — 20
bipustulatus — 3
°subtillis Ill — 12
niger Ill — 12
dolabratus Pk — 24
fuscus — 6
°patruosus Kn — 8
trabeatus Ill — 10
notatus — 6
Danubialis Dahl — 18
vitreus Pz — 15
oblongus Ill — 6
°arcticus Pk — 15

Hydroporus M

(Dytiscus F.)

unilineatus Schr — 6
granularis — 4
lineatus — 4
palustris — 8
sexpunctatus — 4
nigrita — 8
erythrocephalus — 4
°angustulus Ko — 8
planus — 4
°pullus Ko — 8
parallelogramus Kn — 15
alternans Ko — 8
picipes — 4
confluens — 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Harpalus f 4

reptans. Kn — 12
chlorophanus. Z — 8
griseus. Pz — 4
ruficornis — 8
bruniventris. Dahl — 8
picipes. M. — 10
nemoriphagus. Kn — 4
pumilus. Heller — 4
abaciformis. M. — 12
binotatus — 8
rufilabris. M. — 10
serotinus. M. — 8
serripes. Cr. — 8
semiviolaceus. B — 8

Sobus. M f 4

helopioides — 8
obtusus. St. — 10

Amara. Bon

eurinota. M. — 4
metallica. Dahl — 8
montivaga. St. — 15
plebeja — 4
communis. Pz — 4
chlorophana. M — 10
ovata M. — 10
aurata. M — 10
ahaenata. M. — 8

Plotus. M. f 4

°Illigeri — 24
secalis. Por — 8
rotundipennis. D. — 10

Molops. Bon

terricola — 8
brunnipes. M — 10
gagates. Pz — 8
elatus — 8
melas. St. — 10

Zabrus. Latr

gibbus. F. — 12
tenebrioides. Pz.)

Tagenia. M. (Helops. F.)

caraboides — 3
°quisquilia — 8

Helops. F.

lanipes — 8
°asphaltinus. M — 24
fruticicus. Dahl — 30
Schmidtianus. M. — 30

Blaps. F.

Gigas — 48
striata. Dahl — 30
mortisaga — 6

Hydroporus. f 4

areolatus. M. — 8
depressus — 15
°umbrinus. Dahl — 10
arcuatus — 6
geminus — 6
parvulus — 6

Noterus. M. (Dytiscus. F.)

crassicornis — 6
°capricornis. Aud. — 12

Cnemidotus. M

elevatus — 24
maculatus. Dahl — 12
dorsalis. Kn — 8
Herziniae. Dahl — 12
vienensis. Dahl — 12
austriacus. Dahl — 12
impressus — 6
ferrugineus — 6
lineolatus. Dahl — 8
°marginepunctatus. P — 6
alpinus. Dahl — 10
fulvus — 10
caesus. Daft — 8
tesellatus. Kn — 8
ruficollis. Kn — 8.

Hyphidrus. M.

4guttatus. Kn — 15
inaequalis — 6
ovalis. — 6

Hydrachna

°Herrmani — 30

Thymalus. Latr

limbatus — 12

Cassida. F. f 4

°azurea — 10
margaritacea — 6
rotundata. Kn — 8
°sulphurea. M — 12
tigrina. Deg. — 6
silesiaca. M. — 8
ferruginea — 8
nebulosa — 8
nobilis — 4
°sanguinosa. Cr. — 10
°cruenta. M. — 12
°signaticollis. M. — 15
lineola. Cr. — 12
°picturalis. Zig — 12
vibex — 8
°thoracica — 10
°austriaca — 12
graminis. Dahl — 20
sanguinolenta — 8
°maculata. Lin — 8
°atrata — 15
°vittata — 20
viridis. Lin — 6
muraea — 8
affinis — 6
°subreticulata. M. — 10
°Millefolii. Dahl — 12

Cossyphus. F.

depressus — 30

Nitidula. F.

varia — 6
marginata — 8
limbata — 12
depressa — 6
flexuosa — 15
10-guttata — 12
bipustulata — 6
obscura — 4
discoidea — 6

Nitidula f 1

bicolor. Hbst. — 6
rufipes — 6
atrata. Dahl — 8
lugubris. Schüp. — 8
6pustulata — 8
aenea — 8

Strongylus. Hbst

striatus. Oliv — 10
luteus — 8
pallidus. Dahl — 15

Lesteva. M. (Silpha. F.)

Blattoides. Kn — 12
multipuncta. Kn — 8
melanocephala — 6
Crataegi. Kn — 6

Eledona. Latr

°dentata — 40

Peltis. F.

oblonga — 10
ferruginea — 10
grossa — 24

Silpha. F.

carinata. Hbst — 24
°lunata — 20
atrata — 4
°multipunctata. M — 20
°brunnea. Gy — 10
°alpina. Brong — 24
nigrita. Cr — 20
°sublineatis. M. — 20
obscura. — 4
reticulata — 4
thoracica — 6
rugosa — 6
sinuata — 4
°dispar. M. — 15
opaca — 12
°gibba. M. — 24
laevigata — 8
°granulata. M. — 20

Tachys. M. (Silpha. F.) f 2

femorata. Müll. — 10
littoralis — 10

Endomychus. F

coccineus — 6
°cruciatus — 18
°4fasciatus — 18
°4punctatus — 8
Bovistae — 12
°alpinus. Dahl — 15

Ips. F.

ferruginea — 8
4notata — 6
4punctata — 6

Engis. F.

humeralis — 3
pallida. M. — 6

Tritoma. F.

rufipes — 12
bipustulata — 4

Triplax. F.

sanguinicollis — 12
aenea — 4

Mycetophagus

4maculatus — 3
punctatus — 4
piceus — 4
atomarius — 12
brunneus. Pz — 12
fulvicollis — 15
Alni. Dahl — 10
bifasciatus. Dahl — 15

Agyrtes. Frol.

castaneus — 10

Eustrophus. M.

dermestoides — 10

Febr 1820.

Cuphorhynchus M.	f	v
albolineatus	10	
complicatus Koy	10	

Loborhynchus M	f	v
chrysocomus M.	40	
Brucheri M.	24	
orbicularis	12	
Ligusticus	4	
subrotundus M.	12	
regularis M.	15	
Fagi M.	15	
auricapillus M.	18	

Loborhynchus	f	v
caudatus Rossi	24	
sulphurifer	15	
flavellipes M.	18	
hirtipes M.	15	
nobilis M.	18	
geniculatus M.	12	
chlorophanus M.	15	
plumipes Dahl	24	
squamiger	12	
corruptor Kirby	20	
hungaricus Dahl	24	

Dascillus	f	v
aeratus Kr.	8	
cinerascens	8	
cinerescens M.	10	
viridicollis	8	
betulae	4	
vespertinus	4	

Platyrhynchus M.	f	v
viridis	4	
pollinosus	10	
graminicola Olio	12	
Pallas M.	24	

Hinnulus M.

Drosillus M.	f	v
ventricosus Dahl	12	

Scotias M.	f	v
Psylloides Jacq.	6	

Ptinus F.	f	v
ornatus Deft.	10	
elegans M.	8	
6punctatus	15	
bifasciatus Dahl	8	
castaneus Dahl	12	
rufipes	8	
germanus Pk.	8	

Dermestes F.	f	v
ater Oliv	15	
murinus	10	
cadaverinus Pz	8	
vulpinus	3	
tigrinus	15	
12 fasciatus	8	
senex Dahl	15	
lardarius	8	

Trinodes M. (Dermestes F.)	f	v
vulpinus M.	6	
fumatus	3	

Attagenus Latr.	f	v
undatus	8	
macellarius	8	
pellio	3	
20 guttatus	15	
serra	10	

Anthrenus F.	f	v
Pimpinellae	4	
museorum	3	
Scrophulariae	8	
varius	3	
Verbasci	3	

Cateres Pk.	f	v
laticollis M.	8	
dissimulator	8	
fuscus Pz	8	
tristis Pz	6	
brunneus M.	8	
rufescens	6	

Cistela F.	f	v
Erenymi	8	
murina	12	
rufipes	6	
fulvipes	8	
ferruginea	8	
sericea Dahl	15	

Cistela	f	v
nigra Dahl	24	
atra	12	
nigritta Cr.	12	

Buphthalma M. (Cistela F.)	f	v
ceramboides	10	

Parandra M. (Cistela F.)	f	v
sulphurea	4	
ruficollis	20	
thoracica	10	
sulphuripes Koy	12	

Atopa F.	f	v
cinerea	8	
cervina	8	

Cebrio F.	f	v
Gigas	45	

Omophron M. (Cistela F.)	f	v
lepteroides Oliv	20	
elongatus M.	15	
Lepturoides	8	
pallidipennis M.	10	
picipes	12	
alpinus Dahl	18	

Allecula F.	f	v
axillaris Pk.	12	
humeralis	12	
picipes Dahl	15	
maura	15	
morio	8	

Trachys F.	f	v
pygmaea	10	
austriaca M.	15	
nana	10	
minuta	4	

Buprestis F.	f	v
mariana	6	
tenebrionis	15	
abbicollis Dahl	1	
lugubris	12	
carniolica	30	
berolinensis	20	
reticulata	1	
marginata M.	30	
austriaca	30	
moesta	1	
Rhini M.	45	
acuminata	1	
punctata	12	
rustica	15	
decostigma	12	
chrysostigma	30	
affinis	6	
8guttata	12	
rutilans	4	
amethystina S.	45	
flavomaculata	30	
cyanicornis	130	
Trochylus F.	130	
9maculata	10	
undata	1	
Rubi	10	
taeniata	4	
antiqua Hellw	45	
metallica	24	
elata	10	
manca	15	
cyanea	15	
tarda	20	
aurulenta	130	
Salicis	8	
nitida	12	
tacta	6	
nitidula	6	
foveolata	12	
sepulchralis	12	
4punctata	4	

Buprestis	66	f	v
Millefolii		15	
Cichorii Oliv		24	
biguttata		6	
Hyperici Cr.		10	
linearis		6	
aurulans M.		12	
angustula M.		12	
viridula Zieg		12	
longicornis Schr		10	
Gallii M.		12	
coerulea Rossi		12	
Rhum Cr.		15	

Melandrya F.	f	v
serrata	8	

Mystaxus Hugl.	f	v
bifasciatus	20	

Mordella F.	f	v
10guttata	30	
fasciata	4	
aculeata	8	
picea Dahl	15	
abdominalis	8	
flava	8	
convexa Dahl	8	

Ripiphorus F.	f	v
bimaculatus	24	

Melasis F.	f	v
flabellicornis	24	

Throscus Latr.	f	v
adstrictor	6	
pusillus Dahl	8	

Elater F.	f	v
aulicus Pz	24	
signatus Pz	20	
flavellicornis Dej	30	
pectinicornis	10	
angusticollis M.	20	

Zinza Vonn
K. zu Cassiel
Jos Hum
Gaijser
Gaijser
Gaijser

Harpalus

	ƒ
reptans. Kn.	12
chlorophanus. Z.	8
griseus. Pz.	4
ruficornis	8
bruniventris. Dahl	8
picipes. M.	10
nemoriphagus. Kn.	4
pumilus. Heltw.	4
abaciformis. M.	12
binotatus	8
rufilabris. M.	10
serotinus. M.	8
serripes. Cr.	8
semiviolaceus. P.	8

Sobus. M

	ƒ
helopioides	8
obtusus. St.	10

Amara. Bon

	ƒ
eurinota. M.	4
metallica. Dahl	8
montivaga. St.	15
plebeja.	4
communis. Pz.	4
chlorophana. M.	10
ovata M.	10
aurata. M.	10
ahaenata. M.	8

Plotus. M.

	ƒ
°Illigeri	24
secalis. Por	8
rotundipennis. D.	10

Molops. Stum

	ƒ
terricola	6
brunnipes. M.	10
gagates. Pz.	8
elatus	8
melas. St.	10

Fabrus. Latr

	ƒ
gibbus. F.	12
tenebrioides. Pz.	

Tagenia. M. (Helops. F.)

	ƒ
caraboides.	3
°quisquilia	8

Helops. F.

	ƒ
lanipes	8
°asphaltinus. M.	24
fruticus. Dahl	30
Schmidtianus. M.	30

Blaps. F.

	ƒ
Gigas.	48
striata. Dahl	130
mortisaga	6

Elater

	ƒ
cupreus	12
murinus	4
varius	15
atomarius	24
fasciatus	15
nigripes. Fröl.	8
ahaeneus. M.	8
sanguineus	4
glycereus. Pz.	6
praeustus	8
pomorum. Host	8
elongatulus	20
terminatus. Dahl	24
badius. Ill.	10
serraticornis. Zig	12
sanguinicollis.	24
holosericeus	8
cruciatus	12
aeneus	4
Alni. M.	15
latus	12
equestris	8
4pustulatus	8
bimaculatus	8
testaceus	12
advena	15
rufipes	8
lateralis	12
equiseti	12
discicollis. M.	24
pallipes. Dahl	10
ruficollis.	15
sinuatus. M.	18
thoracicus.	4
albipes. M.	10
rotundicollis. Dahl	12
limbatus	8
picipes. Fröl.	8
scutellaris. M.	10
axillaris. Dahl	10
politus	15

Elater.

	ƒ
lineares	8
sputator	4
gibbicollis. M.	10
antennatus. M.	8
flavicornis. Pz.	3
pilosus	10
variabilis	4
striolatus	4
limbatus. Payk.	12
ligitiosus. Rossi	10
atratus. Ill.	15
filiformis	12
marginatus. L.	6
circumcinctus. M.	12
fulvicollis. Dahl	15
nitidus. Dahl	20
vittatus	4
alpinus Dahl	12
tibialis. M.	10
marginellus M.	12
fusculus. Ill.	4
haemorrhoidalis	4
niger	4
griseus. Zig.	15
nitidicollis. M.	8
aterrimus	4
ovisensis. Dahl	20
obscurus	6
brunnipes. M.	12
impressus	15
scutellum. Kn.	18
tessellatus.	10
depressus. M.	24
metallicus. Pk.	12
asphaltinus. Kn.	10
°rufus	4
denticollis.	30
livens	15
mesomelus	20
haematodes	8

Platycerus (Lucanus. F.)

	ƒ
rufipes	4
caraboides	4 6

Tarandus. M. (Lucanus. F.)

	ƒ
tenebrioides	20

Dorcus. M. (Lucanus. F.)

	ƒ
parallelepipedus	4

Lucanus. F.

	ƒ
Cervus	8

Prionus. F.

	ƒ
coriarius	10
serrarius	20
Faber	20
scabricornis	30

Cerambyx. F.

	ƒ
alpinus	20
moschatus	6
heros	6
°Wellensii. Dahl	130
cerdo	4

Monochamus. (Lamia. F.)

	ƒ
°sartor	20
°sutor	20
°maculatus. M.	24
°conspersus	20
°subfasciatus. M.	30

Acanthocinus. Hoffg (Lamia. F.)

	ƒ
aedilis	4
varius	15
°atomarius	15
costatus	15

Pogonochorus. M. (Lamia et Cerambyx)

	ƒ
pilosus	6
fasciculatus	6
lusitanicus. Otto	15
hispidus	10
°arcuatus. M.	15
nebulosus	4

Melosa. M (Lamia. F.)

	ƒ
curculionoides	15

Lamia F.

	ƒ
textor	6
tristis	20

Parmena. M. (Lamia. F.)

	ƒ
°unifasciata. Rossi	18

Pesomacha. M. (Lamia. F.)

	ƒ
lineata	15
°dispar. M.	24
pedestris	20
vittigera	20
°decipiens. Koy	24
°vittata. M.	20
rufipes	8
°bilineata	45
°seductor. Zig	24
holosericea	4
molitor	20
fuliginator	20
fulva	12
morio	12

Donacia. F.

	ƒ
sagittariae	6
vittata. Pz	6
Lamnae	6
brevicornis. Mhr	18
sparganii. Mhr	24
Menyanthidis	10
reticulata. Latr.	24
crassipes	20

Cuphorhynchus M.

albolineatus	10
complicatus Koy	10

Loborhynchus M

chrysocomus M.	40
Bructeri M.	24
orbicula[illegible]tris	12
Ligustici	4
subrotundus M.	12
regularis M.	15
Fagi M.	15
auricapillus M.	18

Loborhynchus

caudatus Rossi	24
sulphucifer	15
flavellipes M.	18
hirtipes M.	15
nobilis M.	48
gematus M.	12
chlorophanus M.	15
plumipes Dahl	24
squamiger	12
corruptor Lato	20
hungaricus Dahl	24

Dascillus

aeratus Kr.	8
cinera[illegible]scens	8
canescens M.	10
viridicollis	8
betulae	4
vespertinus	4

Platyrhynchus M.

viridis	4
pollinosus	12
graminicola Olis	12
Pallas M.	24

Hinnulus M.

Drosillus M.

°ventricosus Dahl	12

Scotias M.

Psylloides Jacq.	6

Ptinus F.

ornatus Deft.	10
elegans M.	8
6punctatus	15
bifasciatus Dahl	8
castaneus Dahl	12
rufipes	8
germanus Pk.	8

Donacia

micans King	15
emarginata M.	20
dentipes	6
Caryophyllaca Dahl	20
Malinowskyi Ahr.	30
melanocephala M.	40
Typhae Brahm	18
tomentosa M.	20
simplex	8
bidens Olis	24
grisea M.	15
hydrochaeridis	15
variabilis Dahl	20
Nymphaea	6
sericea M.	6
dicolor Hoppe	4
thalassina Germ	15
hybrida Schüp.	10
nigra	15
gracilis Cr.	15

Haemonia M
(Donacia F.)

Equiseti	30

Orsodacne Latr
(Lema F.)

Cerasi	6
fabricollis	8
lineola	6

Lema F.

brunnea	6
merdigera	6
12notata Dahl	20
12punctata	4
14punctata	12
5punctata	12
suturalis M.	20
rugicollis Koy	8
melanopides Koy	15

Lema F.

Asparagi	3
melanopa	3
cyanella	3
melanocephala M.	8
subspinosa	6

Hispa F.

atra	3
testacea	18

Sarrotrium F

muticum	10

Lagria F.

hirta	3
pubescens	4

Dasytes F.

ater	8
alpinus Dahl	10
niger	8
auratus Dahl	8
aeneus	8
°nigricornis	8
punctatus Dahl	8
flavipes Pz	6
cyaneus M.	8
rubicundus Koy	12
rigidus M.	8
pectinicornis M.	10

Pyrochroa F.

coccinea	4
rubens	10

Pytho F.

°coeruleus	24

Lampyris F.

dalmatina M.	15
splendidula	4
noctiluca	4

Lycus F.

sanguineus	4
aurora	15
nigricollis M.	20
minutus	6

Omalysus F.

fasciatus	20

Callidium F.

rufipes	6
°unifasciatum	30
femoratum	18
°clavipes	15
violaceum	12
sanguineum	10
fennicum	4
praeustum	8
°testaceum	24
bajulus	4
striatum	4
°undatum	20
rusticum	10
variabile	18

Spondilis F.

buprestoides	6

Clytus F.

°semipunctatus	40
4punctatus	24
°ornatus	8
floralis	12
arcuatus	8
detritus	8
gazella	8
°agrorum Olis	20
°hieroglyphicus M.	24
°3fasciatus	24
plebejus	8
mysticus	6
°2a var. niger	8
massiliensis	10
haffniensis	8
Verbasci	15

Calopus F

serraticornis	20

Saperda F.

testacea	4
°rufipennis	15
virescens	6
°albilinea M.	24
cylindrica	12
°linearis	6
°punctata M.	15
scutellata	20
°hirsutula	20
°Bruglossi M.	24
°ephippium	15
affinis Pz	20
tremula	16
scalaris	15
carcharias	6
linearis	15
oculata	8
°opthalmica M.	30
°erythrocephala	8
°suturalis	20
°violacea M.	20
°maculicornis	20
Cardui	6
°Dahlii Koy	20
°marginella	15
°nigripes	12
populnea	4
°verbasci M.	45

Sparedrus M.
(Calopus F.)

°testaceus And.	20

Rhamnusium M
(Rhagium F.)

salicis	18

Rhagium F.

mordax	4
inquisitor	4
indagator	4
bifasciatum	10

Toxotus M.
(Rhagium F.)

noctis	10
cursor	10
humeralis	10
dispar	15
luridus	12

Febr 1820.

Gaysser

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

Harpalus

	f
reptans. Kn	12
chlorophanus. Z	8
griseus. Pz	4
ruficornis	8
bruniventris. Dahl	8
picipes. M.	10
nemorivagus. Kn	4
pumilus. Hellw	4
abaciformis. M.	12
binotatus	8
rufilabris. M.	10
serotinus. M.	8
serripes. Gr.	8

Sobus. M

	f
helopioides	8
obtusus. St.	10

Amara. Bon

	f
eurinota. Ill.	4
metallica. Dahl	8
montivaga. St.	15
plebeja	4
communis. Pz	4
chlorophana. M	10
ovata M.	10
aurata. M	10
ahaenata. M.	8

Plotus. M.

	f
°Illigeri	24
secalis. Por	8
rotundipennis. D.	10

Molops. Stern

	f
terricola	8
brunnipes. M	10
gagates. Pz	8
elatus	8
melas. St.	10

Zabrus. Latr

	f
gibbus. F.	12
tenebrioides. Pz.	

Tagenia. M. (Helops. F.)

	f
caraboides	3
°quisquilia	8

Helops. F.

	f
lanipes	8
°asphaltinus. M.	24
fruticus. Dahl	30
Schmidtianus. M.	30

Blaps. F.

	f
Gigas.	48
striata. Dahl	130
mortisaga	6

Pachyta. M. (Leptura et Rhagium)

	f
cincta	4
4maculata	12
6maculata	10
8maculata	8
virginea	10
collaris	4
°rufiventris. Dahl	24
°reticulata	20

Leptura. F.

	f
ruficornis	4
°varians. M.	20
°nigrita. Dahl	24
°femorata	12
°villosa. Koy	24
°velutina. M	24
4. guttata	10
praeusta	8
attenuata	8
arcuata	30
nigra	4
obscura	20
°pubescens. M	16
aurulenta	20
villica	20
virens	15
maculicornis	10
tomentosa	12
scutellata	10
4fasciata	8
hastata	20
rubra	4
rufipes	10
livida	4
Pastinacae Pz	4
sanguinolenta	12
7punctata	10
cincta	12
Chamomillae	24

Leptura.

	f
°bipunctata	30
unipunctata	12
cruciata. Olio	4
melanura	4
calcarata	4

Molorchus. F.

	f
abbreviatus	10
dimidiatus	8

Stenoptorus. F.

	f
rufus	6

Necydalis. F.

	f
collaris. Pz	15
flavicollis. Pz	10
°nigra	10
ruficollis	10
hybrida. Rossi	10
coerulea	15
podagrariae	4
annulata. M.	10
cyanea	8
clavipes	6
viridula. Dahl	8
thalassina. M	8
viridipes. M	15
violacea. Dahl	15

Osphia. Latr (Cantharis. F.)

	f
clavipes	18
bipunctata	10
°femorata. M.	12

Cantharis. F.

	f
obscura	6
°mutabilis. Hoff	15
°pallipennis. Dahl	20
livida. Ill	8
fusca	4
alpina. Dahl	15
melanura	6

Cantharis.

	f
rufa. Ill.	8
nigricans	8
testacea	6
nigriventris. M.	12
signaticollis. D	10
lateralis	6

Malachius. F.

	f
aeneus	4
rufus. Zig	8
sanguinolentus	6
bipustulatus	4
marginatus. Ko	10
bigguttatus. Dahl	8
viridis. Olio	12
sanguinicollis. O.	8
pulicarius	8

Rhinosimus. Olio (Bruchus. F.)

	f
sericeus	8
rufipes	8
suturalis	8

Bruchus. F.

	f
Pisi	8
flavimanus. Dahl	10
marginalis	12
granarius. Ill	4
nigripes. Dahl	10
varius. M.	8
villosus	8
luteicornis. Ko.	12
pilosus. Dahl	10
quadratus. Dahl	10
rotundatus. Ko	4
Cisti	6
impricornis	8
flavicornis	8
alpinus. Dahl	8

Paropus. M (Anthribus. F.)

	f
scabrosus	8
varius	6

Anthribus. F.

	f
brevirostris	18
albirostris	12
latirostris	10
albinus	12

Polismus. M. (Rhynchites. F.)

	f
attelaboides	8

Rhynomacer. F

	f
lepturoides	12

Mycterus. Olio (Rhynomacer. F.)

	f
curculionoides	10
fulvicornis. Ill.	12
umbellatarum. Olio	12

Apoderus. Olio (Attelabus. F.)

	f
intermedius	12
Coryli	3

Attelabus. F.

	f
curculionoides	8

Anisopus. M. (Attelabus. F.)

	f
betulae	2
austriacus. M	8
castaneus. M.	8

Rhynchites. Herbst

	f
hungaricus	15
Bacchus	8
giganteus. M.	8
Populi	3
Betuleti	3
purpurascens D.	12
pubescens	8
villosus. Dahl	15
coeruleus	6
nanus. Pz	6
cyaneus. Dahl	10
reticulatus. M.	8
cupreus	8
coeruleocephalus	10
aequatus	8

Cuphorhynchus. M.	♂	♀
albolineatus		10
complicatus. Koy		10

Loborhynchus M	♂	♀
chrysocomus. K.		10
Brucheri. Ill.		24
orbiculatus		12
Ligusticus		4
subrotundus. M.		12
regularis. M.		15
Fagi. M.		15
auricapillus. M		18

Loborhynchus	♂	♀
caudatus. Ros.		24
sulphuricifer		15
flavellipes. M.		15
hirtipes. M.		15
nobilis. M.		18
gematus. M.		12
chlorophanus. M		15
plumipes. Dahl		24
squamiger		12
corruptor. Hbst		20
hungaricus. Dahl		24

Dascillus	♂	♀
aeratus. Kr.		8
cinerascens		8
canescens. M.		10
viridicollis		8
betulae		4
vespertinus		4

Platyrhynchus. M.	♂	♀
viridis		4
pollinosus		10
graminicola. Dis.		12
fallax. Ill.		24
Hinnulus. M.		

Drosillus. M.	♂	♀
ventricosus. Dahl		12

Scotias. M.	♂	♀
Psylloides. Jack		6

Ptinus. F.	♂	♀
ornatus. Duft.		10
elegans. Ill		8
6punctatus		15
bifasciatus. Dahl		8
castaneus. Dahl		12
rufipes		8
germanus. Pz.		8

Apion	♂	♀
sanguineum. M.		4
frumentarium		4
chalybeum. Koy		6
ahaeneum. Dahl		8
apricans. Hbst		6
Viciae. Kirb		8
virens. Hbst		8
minimum. Hbst		6
plebejum. Schh		8
Pisi		8
calceatum. M.		8
rotundicolle. Rb.		8
ubglobosum. Rb.		8
punctirostre. M.		8
Pomonae		8
subulatum. Ill.		8
longirostre. M.		10
longicolle. M.		8
viridipenne		8
rumenium. Ill.		15
rufirostris. Hbst		12
tulipae. Dahl		10
subaeneum. Dahl		8
vernale		4
hirtellum. Rd.		8
difficile. Hbst		8
aeneum		8

Orchestes. Grz	♂	♀
alni		8
suturalis. Dahl		8
rusci. Ill.		10
Coniferae		8
confinis. M.		8
salicis		6
aterrimus M		6
crassirostris. Dahl		8
populi		4
scutellaris. Dahl		8
hirtus. M.		8
calcar		4
viminalis		8

Corcyra. M. (Rhynchaenus F.)	♂	♀
♂ sericea. Dahl		8
♀ velutina. M.		8

Platisma. M (Rhynchaenus F.)	♂	♀
campanulae		10
teter		6
verbasci. Ros.		10
rectangulus		8
melaraphus		10
senex. Dahl		8

Titra. M (Rhynchaenus F.)	♂	♀
♀ rubpinca. M.		12
tomentosa. Ill.		8
Saponariae. Dahl		8

Trachelus. M (Rhynchaenus F.)	♂	♀
5punctatus		6

Conus. Oliv.	♂	♀
Faginus		6
oleens		12
scrophulariae		4
multipunctatus. Rd.		8
Blattariae		6
verbasci		6

Sphaerula. M	♂	♀
♂ Ulmi. M.		8

Archarius. M. (wie Curculio)	♂	♀
♀ venosus. Kn.		10
Elephas. Rtz.		20
nucum		4
villosus		6
pustulosus. M.		8
Nuculae. Kn.		10
ferrugineus. M.		8
pusillus. Dahl		10
esuriens		10

Archarius.	♂	♀
salicivorus. Ill.		4
crux		4
flavicornis. M.		8
pygmaeus. Dahl		10

Calandra F.	♂	♀
granaria		4
abbreviata		8

Microrhynchus. M (Attelabus. F.? Rhynchaenus)	♂	♀
cyaneus. Dahl		12
atriplicis		8
artemisiae		4
coerulescens		8
cyanopennis. Dahl		10
collaris. M.		10
haemorrhoidalis		6
chloris		8
nitens. M.		12

Bulbifer. M.	♂	♀
♂ Tymaxidon		6

Rhyncolus. Grz	♂	♀
♂ crassirostris. Grz		10
tenuirostris. Grz		10
sulcirostris. Grz		10

Rhina. M. (wie Curculio)	♂	♀
carbonaria		8
violacea		8
pinastri. Dahl		12
rufa. M.		12
aterrima		8
virens. M.		10
nigerrima. M.		8
pruni		8
flavicornis. M.		10
nigritta. M.		8

Odontus. M. (Lixus. F.)	♂	♀
♂ cylindricus		120

Lixus. F.	♂	♀
paraplecticus		12
pulverulentus		18
appendiculatus. Ko.		20
elongatus		12
tigrinus. M.		12
filiformis		8
bardanae		10
bicolor. Pz.		20
Ascanii		8

Ophis. M. (Curculio F.)	♂	♀
marmorata		6
grammica		15
cinerea		12
sulcirostris		4
costata		8
alternans		8
albida		6
nebulosa		12
excoriata. Ill.		15
obliqua		10
declivis. Koy		20
lugens. Ill.		15
4carinata. M.		20

Rhinobatus. M	♂	♀
Cynarae		18
Laceae		10
planus		6
tigrinus. M.		10
acicdontalgicus		6
carinatus M.		10

Falciger. M	♂	♀
abbreviatulus		8
Echii		4
Pseudacori		8

Febr 1820.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

Harpalus

reptans. Kn.	12
chlorophanus. Z	6
griseus. Pz	4
ruficornis	6
bruniventris. Dahl	8
picipes. M.	10
nemorivagus. Kn.	4
pumilus. Heller	4
abaciformis. M.	12
binotatus	6
rufilabris. M.	10
serotinus. M.	8

Sibus. M

helopioides	8
obtusus. St.	10

Amara. Bon

eurinota. Ill.	4
metallica. Dahl	8
montivaga. St.	15
plebeja	4
communis. Pz	4
chlorophana. M	10
ovata M.	10
aurata. M	10

Plotus. M.

°Illigeri	24
secalis. Por	8
rotundipennis. D.	10

Molops. Stroem

terricola	8
brunnipes. M	10
gagates. Pz	8
elatus	8
melas. St.	10

Zabrus. Latr

gibbus. F.	12

Tagenia. M. (Helops. F.)

caraboides	3
quisquilia	8

Helops. F.

lanipes	8
°asphaltinus. M.	24
frivolus. Dahl	30
Schmidtianus. M.	30

Blaps. F.

Gigas	48
striata. Dahl	130
[illegible]	6

Falciger. M.

dearatus. Zig	15
albospersus. Dahl	20
horridus	10
glaucinus. Ill.	10
biguttatus. Frol.	10
guttula	6
albavittatus. D.	12
cruciger. Host	10
liturata	6
arcuatus. Hbst	8
pictus. Dahl	10
Lamii. Ill.	6
paroculus. Kn	10
trochlodytes	6
tuberculatus. H.	8
Saponariae. Dahl	10
Quercicola	6
dydimus	6
quercus	6
undatofasciatus. Kn	8
reflexus. Kn.	6
signatus. Dahl	12
elipticus. Hbst	8
sysimbrii	10
albosignatus. Dahl	10
affinis	6
raphani	8
lima. M.	10
immaculatus D.	10
pericarpius	6
melanasticus M	8
castor	15
alauda	6
Erysimi	8

Pallene. M

druparum	8
pomorum	6
varians	6

Pallene. M.

undata. M.	8
nucleorum	6
scalptor. Hbst	8

Rhynchaenus. F.

pectoralis. Koy	8
dorsalis	10
planatus. M.	8
plagiatus. M.	8
dissimilis. Hbst	6
rorax	8
caliginosus. Frol.	8
tremulae. Dahl	12
variegatus. M	10

Pilumnus. M

brunnirostris	8
Sparganii. Dahl	12
bipunctatus. Dahl	12

Ixus. M.

arundinis	18
Rumicis	8

Emblemus. M

Tamarisci	18
°repandus	20

Donus. M.

austriacus. M.	20
comatus. M	20
tessellatus	20
contaminatus. H.	8
alternans. M	15
oxalis. Hbst	10
variabilis. H	6
nigrirostris	4
Plantaginis	6
miles. Pk.	8
Pollux. M.	8

Donus. M

murinus. F.	6
°isabelinus. M	15
Taraxaci. Dahl	8
multipunctatus. D	10

Glanis. M.

laevifrons. M.	24
punctata	6
fasciculata	12

Liparus. Oliv.

cribrum. M.	10
crassicollis. Lud.	12
monachus. Germ	48
germanus	8
Fuscomaculatus	10
Flavomaculatus. Dh	20

Dirus. M.

arcticus.	30
distinctus	8
colon	8
semicolon. Hbst	6
binotatus	8

Ellegmus. M.

triguttatus	6
gamma. M.	10
Ni album. M	10
aereus. M.	12
obliquus. M.	12
V. griseum. M.	15
comma. M.	12

Callirus. M.

Pinetî	30
Abietis	6
scutellaris. M.	15
irroratus. M.	15
Fatuus. Rosf.	20

Piniphilus. M.

Picae. Ill.	10
Pini	6
notatus	4
Pinastri. Dahl	15

Arachnipes. M.

lapathi	4
fossulatus. M.	15
equiseti	6
camelus	12
echinatus. M.	12
hirtus. Clairv.	12
Hypocrita. Cr.	15
globosus. Dahl	10
porcatus. M.	10

Meleus. M.

variolosus	12
Megerlei	20
attenuatus. Dahl	36
Creutzeri. M.	30
Illigeri. Dahl	40
Schmidtii. M.	24

Festus. M.

angulicollis. M.	24
chrysops. Hbst	24
porculus	30
austriacus. M.	15

Brius. M.

lepidotus.	20
elevatus	10
cuprifer. Dahl	15

Merionus. M.

obscurus	6
hungaricus. Dahl	15

Gastrodus. M.

nubilus	6
gibbus. M.	20

	℔	ß
Cuphorhynchus. M.		
albolineatus		10
complicatus. Koy		10
Loborhynchus. M		
chrysocomus. K.		40
Bructeri. Ill.		24
orbicula[illegible]		12
Ligustici		4
subrotundus. K.		12
regularis. M.		15
Fagi. M.		15
auricapillus. M.		18
pertusus. M.		12
septentrionis. Pk.		6
ocellatus. K.		12
raucus		4
velutinus. M.		10
Myrmex. Ill.		8
ovatus		4
picipes		8
centropunctatus. M.		15
duinensis. Dahl		15
aeratus. M.		18
Zebra		12
Fraxini. Dahl		15
coecus. M.		20
niger		8
interstitialis. M.		15
castanipes. M.		15
unicolor. Hbst.		10
laevigatus		8
armadillo. Deg.		10
ventricosus. Dahl		12
geniculatus. M.		12
inflatus. M.		12
mastix. Helw.		8
selesiacus. M.		15
adspersus. Dahl		15
Goerzensis		24
planatus		12
deplanus. Dahl		20

	℔	ß
Loborhynchus		
caudatus. Ros.		24
sulphuricer		15
flavellipes. M.		15
hirtipes. M.		15
nobilis. M.		18
gematus. K.		12
chlorophanus. K.		15
plumipes. Dahl		24
squamiger		12
corruptor. Hbst.		20
hungaricus. Dahl		24
pulverulentus. K.		15
atomarius. M.		12
friulicus. Hbst.		12
carynthiacus. Dahl		20
istriensis. Dahl		20
brevicollis. K.		15
rugulosus. M.		15
perlatus. M.		15
unicolor. Hbst.		12
Simo. M.		
elegantulus. Dahl		15
hirticornis. Hbst.		6
turbidus. Gr.		8
Panaphilis. M.		
perdix. Deg.		12
Conipherus. M.		
Scopolii. Hug.		6
Dascillus. M.		
arborator. Hbst.		4
auratus. M.		8
oblongus		4
malachiticus. K.		6
viridinitens. K.		8
Mali		4
squamens. Gr.		6
aurulentus. M.		8
atomarius. Gr.		8
picus		8
albofasciatus. Ill.		6

	℔	ß
Dascillus		
aeratus. K.		8
cinerascens		8
cinerascens. M.		10
viridicollis		8
betulae		4
vespertinus		4
Platyrhynchus. M.		
viridis		4
pollinosus		10
graminicola. Oliv.		12
Pallas. Ill.		24
Hinnulus. M.		
palliatus		4
Curculio. F.		
lineatus		4
canipus. M.		6
hispidulus		4
trilineatus. Vill.		6
sublineatus. M.		6
crinitus. Hbst.		6
axillaris. M.		8
albolineatus. Dahl		8
discoideus. M.		8
ocator. Hbst.		6
nanus. Fröl.		6
arenicola. M.		6
longulus. M.		8
atomarius. Dahl		8
brunnipes. Dahl		6
Psallidium. Hell.		
maxillosum		15
Tabithus. M.		
muricatus		4
crataegi. Dahl		20
Adrius. M.		
bisignatus. Dahl		12
Brysfus. M.		
sphaeroides. Deg.		10
rotundatus		6
unicolor. K.		10
globulus. Dahl		10
sphaericus. Dahl		10

	℔	ß
Drosillus. M.		
ventricosus. Dahl		12
Scotias. M.		
Psylloides. Jack.		6
Ptinus. F.		
ornatus. Zeft.		10
elegans. Ill.		8
6punctatus		15
bifasciatus. Dahl		8
castaneus. Dahl		12
rufipes		8
germanus. Pk.		8
latro et fur		8
bicinctus. Dahl		8
brevicollis. Dahl		8
globulus. Mahn		8
pallipes. M.		8
pusillus. Dahl		8
imperialis		6
regalis. Dahl		15
Monoceros. M.		
cornutus		8
serricornis. Pz.		6
denticornis. M.		12
Anthicus. F.		
equestris		10
bimaculatus. K.		10
arenarius. Nz.		10
antherinus		6
Lymexylon. F.		
dermestoides		8
Cerocoma. F.		
Schreberi		8
Vahlii		8
Dahlii. Ill.		30

granularis	—	6
pictus	—	8
Staphylinus		
aeneocephalus	—	8
aeneus. Gr.	—	6
aereus. K.	—	12
attenuatus. Gr.	—	8
biguttatus. D.	—	12
bipustulatus. Gr.	—	8
castanopterus. Gr.	—	15
chloropterus	—	20
cinerascens. Gr.	—	8
coenosus. Gr.	—	20
cyanipennis. Gr.	—	24

splendens	—	8
stercorarius. Gr.	—	8
tenuis. Gr.	—	10
varians. Gr.	—	8
Xantholinus		
alternans. Gr.	—	12
elongatus. Gr.	—	8
fulminans. Gr.	—	15
lepidotus. D.	—	12
Latrobium.		
brunnipes. Gr.	—	8
elongatum. Gr.	—	6
fracticorne. Gr.	—	8
longulum. Gr.	—	8
multipunctatum. Gr.	—	12
terminatum. Gr.	—	10

[illegible]rocoma		
Mühlfeldii. Schönh.	—	18
Meloe		
majalis	—	10
proscarabaeus	—	8
tecta. F.	—	12
Necydalis.		
virescens	—	8
Anthribus.		
brevirostris. Pz.	—	18
Bruchela.		
rufipes	—	10
sericea	—	12
Bruchus.		
villosus	—	15

filiformis.		
[illegible]averda.		
pustula. M.		
Molorchus.		
pygmaeus. De		
Bonacia.		
aquatica		
dentipes.		
gracilis.		
impressa		
nicans. M		
tessata. Pz		

Ha

Zonitis. F.

repē ° bifasciata. Koy — 20
chlo ° sexnotata. M. — 30
grīs ° atrata. Koy — 20
ruf ° subpennis — 24
brus praeusta — 20
pici mutica — 18
nem 4punctata — 18
pur

Oenas. Latr.

abac ° crassicornis — 36
bin ° afra — 45
ruf
seri

Mylabris. F.

° algirica. — 40
° 3maculata — 20
° 4punctata — 24
° 10punctata — 24
° variabilis. Ill — 20
° crocata. Pall. — 24
° Lazera. M. — 30
° australis. Koy — 15
° cichorei — 8
° flexuosa. W. — 24
° alpina. Bon — 20
° Spartii. Germ — 20

Lytta. F.

verticalis. Ill — 15
vesicatoria — 4
° austriaca — 20
syriaca — 15

B. Wenn bey einer Lieferung für die runde Summa von 100 ff gemacht wird, so können um 20 ff Insecten mehr, als im Verzeichniß gegeben werden. Bey geringerer Lieferung bleiben unverändert die beygesetzten Preise. (Der f zu 3 20 Kreutzer Münze.

die Adresse ist.

G. Dahl. Naturaliensammler
in Währing nächst Wien.

---

apinis — 6
aphani — 8
ima. M. — 10
maculatus D. — 10
pericarpius — 6
melanasticus M. — 8
castor — 15
alauda — 6
Epilobii — 8

Pallene. M.

druparum — 8
pomorum — 6
varians — 6

Donus. M.

austriacus. M. — 20
comatus. M — 20
° tessellatus — 20
contaminatus. H. — 8
alternans. M — 15
oxalis. Hbst — 10
variabilis. H — 6
nigrirostris — 4
Plantaginis — 6
miles. Pk. — 8
Pollux. M. — 8

gamma. M. — 10
Ni album. M — 10
aereus. M. — 12
obliquus. M. — 12
V. griseum. M. — 15
comma. M. — 12

Callirus. M.

Pineti — 30
Abietis — 6
scutellaris. M. — 15
irroratus. M. — 15
fatuus. Rosf — 20

porculus — 30
austriacus. M — 15

Brius. M.

lepidotus — 20
elevatus — 10
° cuprifer. Dahl — 15

Merionus. M.

obscurus — 6
hungaricus. Dahl — 15

Gastrodus. M.

nubilus — 6
gibbus. M. — 20

81 Febr 1820.

granularis	—	6	splendens	—	8	Mühlfeldii. Schönh.	— 18
pictus	—	8	stercorarius. Gr.	—	8	**Meloe**	
Staphylinus			tenuis. Gr.	—	10	majalis	— 10
aeneocephalus	—	8	varians. Gr.	—	8	proscarabaeus	— 8
aeneus. Gr.	—	6	**Xantholinus**			tecta. F.	— 12
aereus. Kr.	—	12	alternans. Gr.	—	12	**Necydalis**	
alternatus. Gr.	—	8	elongatus. Gr.	—	8	virescens	— 8
biguttatus. D.	—	12	fulminans. Gr.	—	15	**Anthribus**	
bipustulatus. Gr.	—	8	lepidotus. D.	—	12	brevirostris. Pz.	— 18
castanopterus. Gr.	—	15	**Latrobium**			**Bruchela**	
chloropterus	—	20	brunnipes. Gr.	—	8	rufipes	— 20
cinerascens. Gr.	—	8	elongatum. Gr.	—	6	sericea	— 12
coenosus. Gr.	—	20	fracticorne. Gr.	—	8	**Bruchus**	
cyanipennis. Gr.	—	24	longulum. Gr.	—	8	villosus	— 15
			multipunctatum. Gr.	—	12		
			terminatum. Gr.	—	10		

Rhynchites
pilosus. D.
Orchestes
rufus. Ol.
Iota.
scutellaris
Faleiger
guttula.
Rhynchaen
pectoralis.
Pallene.
varians.
Dirus
binotatus.
semicolon
V. griseum.
Loborhync
plumipes. D
Thylacites
lateralis. Pz.
licinus. Hbst
setosus. D.
Omias
crinaceus.
Lixus
filiformis.
laverda.
pustula. M.
Molorchus
pygmaeus. De
Bonacia
aquatica Lin
dentipes.
gracilis. Gr.
impressa. P
micans. M.
tersata. P.

albosignatus. — 10
affinis — — 6
raphani — — 8
lima. M. — — 10
immaculatus. — 10
pericarpius — 6
melanastomus. M. — 8
castor — — 15
alauda — — 6
Erysim — — 8

Pallen. M
drupa — — 8
pomo — — 6
varia — — 6

Zonus. M.
austriacus. M. — 20
comatus. M — 20
tessellatus — — 20
contaminatus. H. — 8
alternans. M — 15
oxalis. Hbst — 10
variabilis. H — 6
nigrirostris — 4
Plantaginis — 6
miles. Pk — 8
Pollux. M. — 8

gamma. M. — 10
Ni album. M — 10
aereus. M. — — 12
obliquus. M. — — 12
V. griseum. M. — 15
comma. M. — — 12

Callirus. M.
Pinetis — — 30
Abietis — — 6
scutellaris. M. — 15
irroratus. M. — 15
fatuus. Rosf. — 20

posculus — — 30
austriacus. M. — 15

Brius. M.
lepidotus. — — 20
elevatus — — 10
cuprifer. Dahl — 15

Merionus. M.
obscurus — — 6
hungaricus. Dahl — 15

Gastrodus. M.
nubilus — — 6
gibbus. M. — — 20

31

Büdingen, den 18 Febr 1820.

Hochgeehrter Herr!

Ihr gütiges Schreiben vom 31ten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bestimmten Betrag mit 84 fl. 10 Xr. in Cassen-

Die hier folgenden Käfer wünschte ich im Tausch zu erhalten:

29

von Heyden

№	Lethrus	fl	Xr	№	Byrrhus	fl	Xr	№	Lina	fl	Xr
1	Cephalotes		30								

28

Zum Vergnügen wären noch folgende vorgan-

Poecilus	fl	Xr
coerulescens.		12
femoratus. M.		12
major. M.		10
Pterostichus		
Sellmanni Dyst	1	
Harpalus		
laevicollis. D.		20
semiviolaceus Koch		19
Stenolophus		
vespertinus. Pz		12
Notaphus.		
flammulatus. M.		8
fumigatus. Gr.		10
Leja.		
affinis. Gyll.		10
Colymbetes.		
fenestratus.		15
Hydroporus		
depressus.		15
erythrocephalus.		8
granularis.		6
pictus.		8
Staphylinus		
aeneocephalus.		8
aeneus. Gr.		6
aereus. Kn.		12
attenuatus. Gr.		8
biguttatus. D.		12
bipustulatus. Gr.		8
castanopterus. Gr.		15
chloropterus.		20
cinerascens. Gr.		8
coenosus. Gr.		20
cyanipennis. Gr.		24

Staphylinus	fl	Xr
decorus. Gr.		8
discoideus. Gr.		15
erythropterus. Gr.		4
fossor.		15
fuliginosus. Gr.		10
fulvipes. Gr.		4
fuscatus. Gr.		15
impressus. Gr.		8
laminatus. Gr.		10
latebricola. Gr.		15
lateralis. Gr.		20
lepidus. Gyll.		15
lucidus. Gr.		12
micans. Gr.		8
morio.		10
nebulosus.		4
nigritta. Gr.		4
nitidus.		15
opacus. Gr.		8
politus.		4
pubescens.		4
sanguinolentus. Gr		6
scitus. Gr.		15
similis.		6
splendens.		8
stercorarius. Gr.		8
tenuis. Gr.		10
varians. Gr.		8
Xantholinus		
alternans. Gr.		12
elongatus. Gr.		8
fulminans. Gr.		15
lepidotus. D.		12
Latrobium.		
brunnipes. Gr.		8
elongatum. Gr.		6
fracticorne. Gr.		8
longulum. Gr.		8
multipunctatum. Gr		12
terminatum. Gr.		10

Paede	fl	Xr
angusta		
bicolor.		
littoral		
orbicul		
procer		
ripari		
rufico		
Hes		
argus.		
bigutt		
binot		
boops		
cicina		
circul		
Juno		
oculat		
pallip		
Oxy		
carin		
cornu		
cortic		
depre		
flavi		
mors		
pice		
Ant		
alpis		
arm		
cara		
dich		
Om		
flori		
mela		
ran		
rivu		
strig		
vibu		
?		
anal		
cerv		
incl		

Transport.

Melolontha	fl	Xr
pilosa.		20
Anisoplia		
austriaca.		20
Pimelia		
muricata.		30
Diaperis.		
armata. M.		48
Anisotoma		
nigripenne.		24
Hallomenus.		
humeralis.		20
Hyxulus.		
dubius.		20
Mycetophila		
axillaris. Pz.		20
humeralis.		20
Cistela		
rufipes.		10
Monocerus.		
integer. M.		4
Knaspis		
humeralis.		15
Cerocoma		
Mühlfeldii. Schönh.		18
Meloe		
majalis.		10
proscarabaeus.		8
tecta. F.		12
Necydalis.		
virescens.		8
Anthribus.		
brevirostris. Pz.		18
Bruchela.		
rufipes.		10
sericea.		12
Bruchus.		
villosus.		15

Rhynchites	fl	Xr
pilosus. D		
Orchestes		
rufus. Ol.		
Iota.		
scutellaris		
Faleiger		
guttula.		
Rhynchaen		
pectoralis.		
Pallene.		
varians.		
Dixus		
binotatus.		
semicolon		
V. griseum.		
Loborhync		
plumipes. Z		
Thylacites		
lateralis. Pz.		
licinus. Hbst		
setosus. D.		
Omias		
Erinaceus.		
Lixus		
filiformis.		
Sayerda.		
pustula. M.		
Molorchus		
pygmaeus. D		
Donacia.		
aquatica. Li		
dentipes.		
gracilis. Gr.		
impressa. Pz		
micans. M.		
tarsata. Pz.		

Gaysser

Gaysser

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

Büdingen nächst Wien d 8ten Febr 1820.

Hochzuehrender Herr!

Ihre gütige Zuschrift vom 31ten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bezeichneten Betrag mit 84 fl. 10 Xr. in Cassiren [illegible] 12 [illegible] 8 [illegible] 8 [illegible] 8

Transport.

Melolontha		Rhynchites		Orsodacna	
pilosa	— 20	pilosus. D.	— 18	cerasi	— 10
Anisoplia		Orchestes		glabrata	— 12
austriaca	— 20	rufus. Ol.	— 15	Galleruca	
Pimelia		Iota	— 15	Lythri. Gyll.	— 10
muricata	— 30	scutellaris	— 8	tibialis. M.	— 8
Diaperis		Faleiger		Altica	
armata. M.	— 48	guttula	— 4	Cynoglossi. Ent. M.	— 12
Anisotoma		Rhynchaenus		Echii. Ent. M.	— 10
nigripenne	— 24	pectoralis	— 8	fuscicornis. L.	— 10
Hallomenus		Pallene		holsatica	— 12
humeralis	— 20	varians	— 8	hortensis. Pz.	— 8
Hypulus		Dirus		Hyoscyami. Ent. M.	— 10
dubius	— 20	binotatus	— 8	muscorum. Ent. M.	— 15
Mycetophila		semicolon. Hbst.	— 12	Napi. Ent. M.	— 8
axillaris. Pk.	— 20	V. griseum. M.	— 12	4-maculata. Ent. M.	— 12
humeralis	— 20	Loborhynchus		4-pustulata	— 10
Cistela		plumipes. D.	— 30	suturalis. Kn.	— 8
rufipes	— 10	Thylacites		Chrysomela	
Monocerus		lateralis. Pk.	— 8	Ericae. D.	— 15
integer. M.	— 4	licinus. Hbst.	— 8	Agathidium	
Anaspis		setosus. D.	— 15	atratum. St.	— 15
humeralis	— 15	Omias		marginatum St.	— 20
Cerocoma		Erinaceus	— 8	nigrinum. St.	— 12
Mühlfeldii. Schönh.	— 18	Lixus		seminulum. St.	— 12
Meloe		filiformis	— 8	Coccinella	
majalis	— 10	Saperda		decemguttata	— 15
proscarabaeus	— 8	pustula. M.	— 15	9-punctata. Olis.	— 10
tecta. St.	— 12	Molorchus		14-punctata	— 6
Necydalis		pygmaeus. Sej.	— 20	vigintiguttata	— 6
virescens	— 8	Donacia			
Anthribus		aquatica. Lin.	— 18		
brevirostris. Pz.	— 18	dentipes	— 12		
Bruchela		gracilis. Gr.	— 15		
rufipes	— 10	impressa. Pk.	— 18		
sericea	— 12	micans. M.	— 10		
Bruchus		tersata. Pz.	— 20		
villosus	— 15				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ha

repl
chlo
gris
ruf
brus
pice
nem
pun
abac
bin
ruf
seri

Zonit

bifascie
sexnota
atrata
subvirp
praeust
mutica
hyaneta

Oena

crassicor
atra

Mylabr

algeric
6maculat
4punctat

Orsodacna.

cerasi . . . . — 10
glabrata . . . — 12

Galleruca

Lythri. Gyll. . . — 10
tibialis. M. . . — 8

Altica.

Cynoglossi. Ent. W. — 12
Echii. Ent. W. . . — 10
fuscicornis. L. . . — 10
holsatica . . . . — 12
hortensis. Pz. . . — 8
Hyoscyami. Ent. W. — 10
muscorum. Ent. W. — 15
Napi. Ent. W. . . — 8
4-maculata. Ent. W. — 12
4-pustulata . . . — 10
suturalis. Hn. . . — 8

Chrysomela.

Ericae. Z. . . . — 15

Agathidium

atratum. St. . . . — 15
marginatum St. — 20
nigrinum. St. . — 12
seminulum. St. — 12

Coccinella.

decemguttata . . — 15
9-punctata. Olis. — 10
14-punctata . . . — 6
vigintiguttata . . — 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

Düsseldorf nächst Wien d 8ten Febr 1820.

Hochgeehrtester Herr!

Ihre gütige Zuschrift vom 31sten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bemerkten Betrag mit 84 fl. 10 Xr. in Cassiren

Die hier folgenden Käfer wünschte ich im Tausch zu erhalten:

29

von Leyden

№		fl	Xr
	Lethrus		
1.	cephalotes		30
	Scarabaeus		
2.	alpinus. St.		24
	Gymnopleurus		
3.	gibbus. Schneid.		20
	Ateuchus		
4.	pius. Ill.		30
5.	variolosus		40
	Aphodius		
6.	depressus		20
7.	depressus. Thunb.		15
8.	sericatus. Dahl		20
9.	moestus. Lig		15
10.	vespertinus. F.		6
11.	conjugatus		20
12.	moravicus. M.		15
13.	suturalis. Kugl		15
14.	alpinus. Fröl.		15
15.	sulcatus		15
16.	elevatus		10
17.	sulcicollis. Ill.		8
18.	vulneratus. St.		12
	Aesalus		
19.	scarabaeoides		15
	Cetonia		
20.	italica M.		20
21.	viridis		20
22.	vulpina		15
	Amphicoma		
23.	abdominalis		30
	Necrophorus		
~~24.~~	sepultor And.		36
~~25.~~	Lucifer	~~1~~	~~—~~
	Byrrhus.		
26.	echinatus. M.		10
27.	exilis. Lig		6
		9	2

№		fl	Xr
	Byrrhus		
28.	stoicus. Müll.		10
29.	auratus		15
30.	gigas		20
31.	Dianae		20
32.	cinctus. Ill.		30
33.	Tuniger. M.		15
34.	angulifer. M.		15
35.	coronatus. Ill.		15
36.	oblongus. St.		12
37.	clandestinus. M.		15
38.	repandofasciatus M.		10
	Coccinella		
~~39.~~	chrysomelina		20
	Chrysomela		
40.	gramica. M.		8
41.	graminicola		8
42.	carniolica Duft		12
43.	rufa. M.		20
44.	globosa M.		12
45.	aerea. M.		15
46.	crassimargo. Ill.		15
47.	haemisphaerica		12
48.	Rossia. Ill.		15
49.	Dahlii. Kr.		15
50.	lucida. Kis.		24
51.	affinis. Dahl		8
52.	collaris		12
53.	circumcincta		8
54.	marginalis M.		10
55.	chalcitis. Dahl		15
56.	nigra. Dahl		12
57.	gemellata		6
~~58.~~	geminata		8
59.	Megerlei		12
60.	chalybaea. Dahl		15
61.	fulgida		10
62.	Raphani		12
63.	dorsalis. Sahl.		8
	Lina		
64.	tristis. Duft		15
		8	24

№		fl	Xr
	Lina		
65.	praetiosa. Duft		8
66.	gloriosa		10
67.	phalerata H.		20
68.	coeruleolineata D.		8
69.	punctata. M.		10
70.	Hanoverana		12
71.	Anderschii. M.		15
	Timarcha		
72.	pratensis. M.		15
~~73.~~	rugosa. Duft		8
74.	purpurascens H.		12
75.	goettingensis		8
76.	laticollis. M.		20
	Crioceris		
77.	adusta		12
	Cryptocephalus		
78.	alpinus. Dahl		12
79.	bisignatus. Dahl		15
80.	frontalis. Dahl		8
81.	geminus. M.		6
82.	sanguinicollis		8
83.	terminatus. Cr.		10
84.	bistripunctatus G.		15
85.	salicis		15
86.	connexus. Ill.		10
87.	Wawarius. Hoy		15
88.	Böhmii		18
89.	elegantulus. Hoy		6
90.	strigosus		10
91.	interruptus. M.		8
92.	populi. Dahl		8
93.	cruciatus. Dahl		8
94.	8. pustulatus. Ill.		15
95.	8. guttatus		8
96.	flavescens		8
97.	2e var.		10
98.	10. punctatus		12
			23

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zonit
bifasciat
sex-notat
atrata
subcyl
praeust
mutica
4punct
Oena
crassicor
affr

№	Cryptocephalus	℔	ß
99	hieroglyph. var ffb	—	6
100	histrio	—	6
101	scriptus. Dahl	—	10
102	lignosus. Dahl	—	15
103	fimbriolatus. K	—	8
104	tristis. Laich	—	8
105	bigerminus. Ill	—	15
106	4. pustulatus. K	—	15
107	flavoguttatus. Ol	—	15
108	villosulus. M	—	15
109	auratus. M	—	8
110	chlorodicus. K	—	8
111	Fratorum. M.	—	8
112	intrusus. M.	—	10
113	purpuratus. M	—	6
114	nitens	—	15
115	Centaureae. M.	—	10
116	viridis. M.	—	12
117	subtilis. Dahl	—	15
118	smaragdinus. Z	—	10
119	elongatus. Z	—	8
120	dispar. Dahl	—	15
121	variegatus	—	8
122	12. punctatus	—	15
123	axillaris. Dahl	—	15
124	abietis. K	—	12
125	laetus	—	15
126	janthinus. K	—	15

Clythra.

№		℔	ß
127	chalibaeicornis. K	—	15
128	impressihumera	—	15
129	cyanicornis. Dahl	—	8
130	axillaris. Dahl	—	12
131	fulgida. Dahl	—	12
132	humeralis.	—	15
133	brachialis. Zig	—	12
134	4. maculata	—	10
135	calceata. M.	—	15
136	elaticollis. M.	—	12
137	appendicina. M	—	12
138	fasciata. M.	—	3
		7	44

№	Clythra	℔	ß
139	macropus. Ill	—	15
140	floralis. Dahl	—	15
141	flavicollis. M.	—	10
142	collaris	—	10
143	concolor	—	8

Colaspis

144	Ulema. Ill.	—	20

Sinodendron

145	muricatum	—	20

Notoxus

146	scutellaris. M.	—	18
147	pallidus. Oliv	—	40

Corynetes

148	cyanellus. Hn	—	6

Trichodes

149	Ammios	—	30
150	apicata. Zig	—	15
151	favarius. Ill.	—	12
152	transversalis. M	—	15

Cicindela

153	sylvicola. M.	—	8
154	danubialis. M	—	12
155	integra. M	—	20
156	nemoralis. Oliv	—	20
157	littoralis	—	20
158	infracta	—	20

Cychrus

159	silesiacus. Dahl	—	24
160	elongatus	—	45

Blethisa.

161	borealis	—	24

Chlaenius

162	spoliatus	—	24
163	festivus	—	24
164	velutinus	1	—
165	zonatus. Pz	—	20

Dinodes

166	rufipes. Bon.	—	24
		9	39

№	Licinus	℔	ß
167	Hoffmannseggii	—	20
168	Idriensis. Dahl	—	24

Sphodrus

169	purpuratus. M.	—	24

Simichus

170	striatopunctatus. D	—	20

Pterostichus

171	flavofemoratus. B	—	36
172	Dahlii. M.	—	40

Sogenes

173	spinipes	—	24

Plotus

174	Illigeri	—	24

Cylindrus

175	magnus. M.	—	48

Scaurus

176	giganteus. M	1	—
177	tristis. Oliv	—	40

Tagenia.

178	quisquilia	—	8

Helops

179	asphaltinus. M.	—	24

Moluris

180	laevigata	—	20

Pedinus

181	punctatus. Dahl	—	15

Pandarus

182	emarginatus	—	24

Tentyria

183	laevigata	—	24
		7	55

Platynotus
morbillosus
spurcatus
variolosus
rugosus. H
griseus
Abida
picta
Lithophilus
connatus
Trogosita
caerulea
Erodius
bilineatus
gibbus
Sperchaeus
emarginat
Parnus
obscurus
vienensis
Dumerilli
villosus
Gyrinus
bicolor
cylindri
elongatus
striatus
austriacu
smaragdi
viridis
ater M.
caspicolin
Enhydr
nigripe
fulvicoll
4. punct
limbat
nitidus
fulvus
margin

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

Wöhrung nächst Wien 4 8ten Febr 1820.

Hochgeehrtester Herr!

Ihre gütige Zuschrift vom 31sten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bezeichneten Betrag pr 84 fl. 10 Xr. in Cassien-

№	Platynotus	fl	Xr
184	morbilosus		24
185	spurcatus. M.		30
186	variolosus		24
187	rugosus. Hbst		30
188	griseus.		24
	Afsida		
189	picta		12
	Lithophilus		
190	connatus. Pz		15
	Trogosita		
191	coerulea		48
	Erodius		
192	bilineatus		20
193	gibbus		20
	Sperchaeus		
	emarginatus		8
	Parnus		
195	obscurus. M.		8
196	vienensis. Dahl		15
197	Dumerillii. Lat		15
198	villosus. Latr		15
	Gyrinus		
199	bicolor		10
200	cylindricus. M		10
201	elongatus. Dahl		12
202	striatus		30
203	austriacus. Dahl		12
204	smaragdinus. Dahl		12
205	viridis. M.		10
206	ater. M.		10
	cupreolineatus.		30
	Enhydrus		
208	nigripes. M.		10
209	fulvicollis. Dahl		12
210	4. punctatus. Fr.		8
211	limbatus. Dahl		10
212	nitidus. Hn.		6
213	fulvus. M.		8
214	marginatus. Pz		8
		8	26

№	Hydrophilus	fl	Xr
215	dentipennis. M.		15
216	signaticollis. M.		10
217	fuscipes. Lin.		10
218	picipes		15
219	aeneus. Dahl		12
220	pallipes. M.		15
221	sulcisternalis. M		45
	Dytiscus		
222	canaliculatus. M		12
223	bipunctatus		8
224	4-guttatus. M.		15
225	austriacus. Dahl		15
226	carbonarius		15
227	femoralis. Pk.		8
228	affinis. Pk.		20
229	subtillis. Ill.		12
230	niger. Ill.		12
231	dolabratus. Pk.		24
232	pulverosus. Kn		8
233	trabeatus. Ill		10
234	danubialis. Dahl		18
235	arcticus. Pk.		15
	Hydroporus		
236	angustulus. Ko		8
237	pullus. Ko		8
238	umbrinus. Dahl		10
	Noterus		
239	capricornis. And.		12
	Hydrachna		
	Hermanni		30
	Cassida		
241	azurea		15
242	sulphurea. M.		12
243	tigrina. Deg.		6
244	silesiaca. M.		8
245	sanguinosa. Gr.		10
246	cruenta. M.		12
247	signaticollis. M.		15
248	suturalis. Zig		12
249	thoracica		40
250	austriaca		12
		8	44

№	Cassida.	fl	Xr
251	graminis. Dahl		20
252	maculata. Lin.		8
253	atrata		15
254	vittata		20
255	subreticulata. M.		15
256	Millefolii. Dahl		12
	Eledona		
257	dentata		40
	Silpha		
258	lunata		20
259	multipunctata. M.		20
260	brunnea. H.		10
261	alpina. Brong		24
262	sublinearis. M.		20
263	dispar. Ill.		15
264	gibba. M.		24
265	granulata. M.		20
	Endomychus		
266	cruciatus		18
267	fasciatus		18
268	4pustulatus.		8
269	alpinus. Dahl		15
	Cebrio		
	gigas		45
	Omophron		
271	tephroides. Olis		20
272	elongatus. M.		15
	Buprestis		
273	albicollis. Dahl	1	
274	alni. M.		45
	amethystina. M		45
276	antiqua. Hellw.		45
277	foveolata		12
278	sepulchralis		12
279	millefolii.		15
280	cichorii. Ol		24
281	Hyperici. Cr.		10
	lineariis		6
283	aurulans. M.		12
284	viridula. Zig		12
		12	-

sind nicht

Dr. Gaßer

Dahl

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		℔	ß
	Buprestis.		
	longicornis. Fb.	—	10
286	Gallii. M.	—	12
287	coerulea. Rossi	—	12
288	filum. Gr.	—	15
	Mystaxus.		
289	bifasciatus	—	20
	Melasis		
290	flabellicornis	—	24
	Elater		
291	rufus	1	—
	Prionus.		
293	scabricornis	—	30
	Cerambyx		
294	Wellensii Dahl	1	30
	Monochamus		
295	sartor	—	20
296	sutor	—	20
297	maculatus. M.	—	24
298	conspersus	—	20
299	subfasciatus. M.	—	30
	Acanthocinus		
300	aegrotus	—	15
301	costatus	—	15
	Pogonochorus		
302	lusitanicus. Oliv.	—	15
303	arcuatus. M.	—	15
	Parmena.		
304	unifasciata. Roy	—	48
	Pesomacha		
305	dispar. M.	—	24
306	vittigera	—	20
307	decipiens Hoy	—	24
308	vittata. M.	—	30
309	bilineata	—	45
310	seductor Zig.	—	24
311	holosericea	1	—
	Hispa		
312	testacea	—	18
		12	20

№		℔	ß
	Pitho.		
313	coeruleus	—	24
	Callidium		
314	unifasciatum	—	30
315	clavipes	—	15
316	undatum	—	20
	Clytus.		
317	semipunctatus	—	40
318	4 punctatus	—	24
319	agrorum. Oliv.	—	20
320	hieroglyphicus. M.	—	24
321	3 fasciatus	—	24
	Saperda.		
322	testaceus. Fab.	—	20
	Saperda		
323	rufimana	—	15
324	albilinea. M.	—	24
325	lineola	—	6
326	pustulata. M.	—	15
327	scutellata	—	20
328	hirsutula	—	20
329	Buglossi. M.	—	24
330	ephippium	—	15
331	affinis. Pz	—	20
332	opthalmica. Ill	—	30
333	erythrocephala	—	8
334	suturalis	—	20
335	violacea. M.	—	20
336	maculicornis	—	20
337	Dahlii. Hoy	—	20
338	marginella	—	15
339	nigripes	—	12
340	verbasci. M.	—	45
	Pachyta		
341	rufiventris. Dahl	—	24
342	reticulata	—	20
	Leptura		
343	varians. M.	—	20
344	nigrita. Dahl	—	24
345	femorata	—	12
346	villosa. Hoy	—	24
		11	54

№		℔	ß
	Leptura		
347	velutina. M.	—	24
348	4 guttata	—	10
349	pubescens. M.	—	18
350	livida	—	4
351	Chamomillae	—	24
352	bipunctata	—	30
	Necydalis.		
353	nigra.	—	10
	Osphia.		
354	clavipes	—	15
355	femorata. M.	—	12
	Cantharis.		
356	mutabilis. Hoff	—	15
357	pallipennis. Dahl	—	20
358	alpina. Dahl	—	15
	Corcyra		
359	sericea. Dahl	—	8
360	velutina. M.	—	8
	Titra		
361	vulpina. M.	—	12
	Sphaerula.		
362	Ulmi. M.	—	8
	Bulbifer.		
363	Lymexilon	—	6
	Rhyncolus		
364	crassirostris. Gr	—	10
	Odontus		
365	cylindricus	1	30
	Emblemus		
366	repandus	—	20
	Donus		
367	isabelinus. M.	—	15
	Brius		
368	cuprifer Dahl	—	15
	Cuphorhynchus		
369	complicatus. Hoy	—	10
		6	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

Pöstyény utolsó Nov 18 Febr 1820.

Hochgeehrtester Herr!

Ihr gütiges Schreiben vom 31sten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bestimmten Betrag mit 84 fl. 10 Xr. im Cassier

Nebria
picicornis.
erythrocephala.
Gyllenhalii. H.
Dahlii. H.
Jockischii. H.
Leistus
terminatus. Pz.
nitidus.
rufomarginatus
spinibarbis.
cirrhibarbis. Illig.
Calosoma
indagator.
sericeum.
Platylophus.
holosericeus.
Licinus
cassideus
Badister.
centromaculatus
Sphodrus
subcyaneus. H.
Agmatheta
maurus. H.
Platynus
serobiculatus
Pterostichus
Panzeri.
Jurinii.
Ziegleri.
Mühlfeldii.
interpunctatus.
Chrysorus
striolatus.
Abax
Beckenhauptii.
striato punctatus.
transversalis.
laticollis.
parallelopipedus
inunctus
unctulatus.
Xophorus
major.
femoratus
nemorensis
aeneoides.

Lophorus
coerulescens
marginalis
Kayi.
cyaneus
nigerrimus
melanus
melas
Poecillus
gagathinus
maurus
aterrimus
elongatus
picimanus
nitidus
corvinus
Harpalus
cordatus
sobus
obtusus
Zelotus
discipennis
gibbicollis.
Scaurus
punctatus
Acida
acuminata
punctata
Helops
frivolus.
Schmidtianus
Blaps
striata
acuminata
pannonica
punctata.
Pedinus
helopioides
femoralis.
Tentyria
orbiculata.
Pimelia
rugosa.
muricata
Tenebrio
transversalis.
piceus.
opacus.
obscurus.
loripes.
curvipes.

Elophorus
elegans
elevatus
gemellatus
brevis.
Hydrodromus
interruptus.
variegatus.
Cnemidotus
elevatus
maculatus
dorsalis
Herziniae
viennensis
austriacus
impressus
ferrugineus
lineolatus
alpinus
tessellatus.
ruficollis.
Hyphidrus
4guttatus.
Dermestes
ater. Oliv.
tigrinus
senex
Triacus
vulpinus
Attagenus
macellarius
Cistela
ferruginea
sericea.
nigra
atra
nigritta
Parandra
ruficollis.
thoracica
sulphuripes
Omophron
pallidipennis
alpinus
Allecula
axillaris
humeralis
picipes.

Trachys
pygmaea
austriaca
nana.
Buprestis
carniolica
reticulata
marginata
chrysostigma
cyanicornis
Trochylus
undata
metallica
cyanea
aurulenta
Mordella
10guttata
picea
convexa
Throscus
pusillus
Elater
aulicus
signatus
flavellicornis
angusticollis.
varius
atomarius
aheneus
glycereus
pomorum
terminatus
badius
serraticornis
alni.
advena.
discicollis.
pallipes
ruficollis
sinuatus
albipes
rotundicollis
limbatus
picipes
scutellaris
axillaris
positus.
gibbicollis.
antennatus.

Ha

repī
chlo
gris
ruf
brus
pic
nem
pur
aba
bin
ruf
seri

Zonit

bifascia
sexnota
atrata
fulvipe
praust
mutica
hyaenot

Oena

crassicor
af

Clater

flavicornis
striatulus
limbatus
ligitiosus
atratus
filiformis
marginatus
circumcinctus
fulvicollis
nitidus
alpinus
tibialis
marginellus
fusculus
haemorrhoidalis
griseus
nitidicollis.
ovirensis
brunnipes
impressus
metallicus
asphaltinus
mesomelus

Prionus

serrarius

Donacia

reticulata
emarginata
Carynthiaca
melanocephala
bidens
grisea
variabilis
gracilis

Lema

12notata
14punctata
5punctata
suturalis
rugicollis
melanopides
melanocephala

Dasytes.

alpinus
auratus
aeneus
punctatus.
cyaneus
rubicundus
rigidus
pectinicornis

Lampyris

dalmatina

Lycus

aurora
nigricollis.

Toxotus

humeralis
dispar.

Necydalis

collaris.
flavicollis.
ruficollis
hybrida
annulata
viridula
viridipes
violacea

Cantharis

nigriventris
signaticollis.

Malachius

marginatus
4guttatus.

Rhynomacer

Lipturoides

Mycterus

fulvicornis
umbellatarum.

Apoderus

intermedius

Anisopus

austriacus
castaneus

Rhynchites

hungaricus
gigas teus
purpurascens
villosus
coeruleus
cyaneus
reticulatus

Archarius

venosus

Elephas

villosus
nubeculatus

Nucleï

ferrugineus
mollis
spurius
flavicollis
pygmaeus.

Lixus

pulverulentus
appendiculatus
elongatus
tigrinus
bicolor.

Ophis

grammica
alternans
excoriata
declivis
lugens
4carinata.

Rhinobatus

planus
tigrinus
carinatus

Faleiger

albopersus
glaucus
biguttatus
albosuturatus
pictus
paroculus

Saponariae

undatofasciatus
reflexus
signatus
elipticus
albosignatus
lima
immaculatus
melanostictus

Palene

undata

Rhynchaenus

pectoralis
planatus
plagiatus
dissimilis
caliginosus
tremulae
variegatus

Plumnus

brunirostris
parganii
bipunctatus

Taxus

arundinis

Emblemus

Tamarisci.

Sonus

austriacus
cornutus
testaceatus.

Donus

contaminatus
alternans
oxalis
miles
pollux
murinus

Taraxaci.

multipunctatus

Glanis

laevifrons
fasciculata

Lixarus

cribrum. M
crassicollis
monachus
fuscovaculatus

Dytus

arcticus

Elegmus

gamma
Ni. album
aeneus
obliquus
V. griseum
comma.

Callirus

scutellaris
irroratus
latus.

Pinizphilus

piceae
pinastri.

Arachipes

fossulatus
camelas
echinatus
hirtus

Hypocerita

globosus
porcatus

Meleus

variolosus
attenuatus
Creutzeri.
Illigeri
Schmidtii.

Tachys

chrysops
porculus
austriacus

Brius

lepidotus
elevatus

Neronus.

hungaricus

Gastrodus

gibbus

Cleorhynchus

albolineatus

Loborhynchus

chrysocomus
Bructeri
subrotundus
regularis
fagi
auricapillus
pertusus.
ocellatus
vellutinus.
Myrmex
centropunctatus
duinensis.
aeratus
Zebra
Fraxini.
coccus
interstitialis.
castanipes
unicolor.
armadillo
sentricosus.
inflatus
silesiacus
adspersus.
Goerzensis.
planatus
deplanatus
caudatus
faselliformis.
hirtipes
nobilis
chlorophanus
squamiger
corruptor
hungaricus
pulverulentus
atomarius
carythiacus
istriensis
brevicollis
rugulosus
plebejus
unicolor

Sine.

hirticornis
turbidus

Dascillus

auratus
squamens
aurulentus
atomarius
picus
albofasciatus
aerbtus
cinerascens
capreolus
betulae

Platyrhinchus

pollinosus
graminicola
Pallas
Tabithus
crataegi.

Brysfus

unicolor
globosus
sphaericus.

Sine.

argentatus Dahl
Limpheropus.
Scopoli. Kug
Adrius
insignatus Dahl
Brysfus
Sphaerroides. Cr.
Trosillus
sentricosus Dahl
Carocoma
Dahlii. Hl.

91 2
8 — 24
6 — 23
7 — 44
9 — 30
7 — 55
8 — 1
6 — 4
12 —
12 — 2
11 —
6 —
1 —
5 —
4 —
120 —

31

Büdingen wohlst Dien 4 8br Febr 1820.

Hochzuehrender Herr!

Ihre gütige Zuschrift vom 31ten v. M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir bezeichneten Betrag mit 84 fl. 10 Xr. in Cassiren

№		fl	Xr
	Sinis.		
370	elegantulus. Dahl	—	15
	Conipherus.		
371	Scopoli. Hug	—	6
	Adrius		
372	bisignatus. Dahl	—	12
	Brysfus		
373	sphaeroides. Cr.	—	10
	Drosillus		
374	ventricosus. Dahl	—	12
	Cerocoma		
375	Dahlii. Ill.	—	30
		1	25

№		fl	Xr
	Zonitis.		
376	bifasciata. Koy	—	20
377	sexnotata. M.	—	30
378	atrata. Koy	—	20
379	fulvipennis	—	24
380	4. punctata	—	45
	Oenas		
381	crassicornis	—	36
382	afra	—	45
	Mylabris		
383	algirica	—	40
384	3. maculata	—	20
385	4. punctata	—	24
		5	4

№		fl	Xr
	Mylabris.		
386	10. punctata	—	24
387	Lazarpa. M.	—	30
388	australis. Koy	—	15
389	flexuosa. W.	—	24
390	alpina. Bon	—	20
391	Spartii. Germ	—	20
	Lytta.		
392	austriaca. Zig.	—	20
		3	33
	Aphodius		
393	interpunctatus. M.	—	15
394	obscurus	—	12
395	lugens. Cr.	—	8
396	hydrochaeridis	—	20
397	villosus. Gyll.	—	15
398	limbatus. Zig.	—	20
399	pallens. Dahl	—	15
400	varians. Duft.	—	4
		4	22

9 fl	2 Xr	
8 "	— 24 "	
6 "	— 23 "	
7 "	— 44 "	
9 "	— 39 "	
7 "	— 55 "	
8 "	— 26 "	
8 "	— 44 "	
12 "	— — "	
12 "	— 20 "	
11 "	— 54 "	
6 "	— 39 "	
1 "	— 25 "	
5 "	— 4 "	
4 "	— 22	
120 fl	— 1 Xr	

Meine Insecten sind nicht [illegible] gut gespießt

Ihr gehorsamster Diener
Dr. Gaßer

[illegible] 30 Xr Spitze

[illegible] Ihr [illegible]

Ihr [illegible]
Dr. Gaßer

[illegible]

Ihr
Verehrungsvoller
Dr. Dahl

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zonit
bifasciu
sexnota
atrata
subcrip
praust
mutico
4punct
Oena
oraticor
af

Ha
repl
chlor
gris
ruf
brus
pic
nem
pun
abac
bin
ruf
seri

Sollten von den, von mir bestimmten Käfern mir alle mir vorhanden sein, bitte ich von den fünf folgenden, die Nummern zu vergleichen.

Scarabaeus	Anisoplia	Coccinella	Lebia
4dens. ♂. ___	arvicola.	diversa. Dahl.	turcica.
Copris.	crucigera. H.	6punctata. Dahl.	haemorrhoidalis
Paniscus.	fruticola.	nigra.	Tromius
Copris.	segetis. Koy	livida. H.	quadrillum. C.
minor. M.	Horticola.	subglobosa. Dahl.	spilotus. M.
semicornis.	Hoplia.	3.signata. Dahl.	maurus. M.
Ateuchus	pulvicera. And.	Phaedon	Cimindis
morbillosus	rupicola.	punctatus. Duft.	homagrica. H.
Onitis	pusilla	Paropsis.	axillaris
pallipes.	Cetonia	decostigma. H.	milaris
Aphodius.	metallica	nigripes. M.	scapularis
lunatus. M.	Necrophorus.	testacea. Dahl	angularis. Gyll.
dubius. M.	curvipes. M.	nigella. Dahl	Demetria
limicola. Pz.	Hister.	flavicollis. Dahl.	fasciata
equestris. Pz.	complanatus. M.	Crioceris	imperialis. M.
setosus. M.	distinctus. M.	4maculata.	procera. Kn.
oblongus. Dahl.	nigellatus. Aud.	Luperus	unipunctata G.
serotinus. St.	politus. Dahl.	chalybaeipennis. Z.	Brachinus
putritus. St.	terricola. Dahl	Sysembrii.	evaporans. M.
plagiatus.	impressus.	Galleruca	impunctatus. M.
constans. M.	medius.	minuta. Dahl	glabratus. M.
rubens. Zig.	major.	limbata. Fröl.	Carabus
gibbus. Dahl.	Illigeri. H.	elongata. Dahl.	scabriusculus
maculatus. St.	rugiceps. Duft.	Viburni. Pk.	hungaricus.
tessulatus. St.	viridis. M.	Persicariae. H.	purpuratus. St.
Melolontha.	rugifrons. Pk.	Lythri. Gyll.	Scheidleri.
fullo. var.	rufipes. Pk.	flaoiventris. H.	Goldegii.
orientalis. Koy.	aereus. M.	interrupta.	Besserii. Z.
transversa	arenarius. Dahl.	pallida. Duft.	oblongus. St.
verna. Zig.	Hypsenor.	marginata.	nigricornis. M.
pilicollis. M.	sulcatus.	circumdata. Dft.	assimilis. St.
tropica. Kn.	canaliculatus. Ill	rufa. M.	emarginatus. M.
Omaloplia.	Sphaeridium.	haematidea. Ad.	tuberculatus. Z.
limbata. M.	renipustulatum. M	Trichodes	excisus. St.
Anomala.	Coccinella	8punctatus.	alpestris. Zig.
oblonga	distincta. M.	Lopha	nodulosus.
aurata.	bisepiemgattata	subfasciata. Ko.	catenatus.
auricollis. Dahl.	biseptemguttata	4notata. M.	Alpaeus
	4punctata. Lin.	lineola. M.	brunneus. M.
	humeralis. Ill.		ferrugineus. St.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

Büdingen nächst Wien d 8ten Febr 1820.

Hochgeehrter Herr!

Ihr gütiges Zuschreiben vom 31ten v.M. ist mir richtig zugekommen und ich habe den mir Eingeschlossenen Wechsel à 84 fl. 10 kr. in Cassiren wieder muß ich um Nachsicht bitten daß mir Ihre Commission noch nicht besorgen ist, die Schuld meiner Abwesenheit sind nicht in 24 St. Stund, sondern in Hindernissen Besorgung Geld die gehabt 3. 20 Tagen Arbeit verursacht, wie die von Herrn Rath Hübner von dem ich 112 fl. und von Herrn Inspector Professor Gaßer 83 fl. für die Herren Gebrüder von Cordier Schwaz werden, einbezahlt worden habe, ich kann mir dieser wenig gut 16 fl. 30 kr. Einige Mitg. Auf diesen Kleinen Entwurf werden die mir wohl von der Einrichtung Ihrer Commission, über der Herr Prof. Gaßer der Ihnen Empfohlen hat wird auch Herrn diesen Kleinen Entwurf eine gute Einrichtung, so bald es mir möglich wird daß die Ihr Wünsche, Ihnen zu meinen vorhabenden Reise muß ich selbst benutzen wo ich etwas zu gut habe.

Das Verzeichniß wo ich den Antheil jeder Art beigesetzt habe selbst mehr zurück.

Das Verzeichniß Ihrer Doppletten wird mir Vermuthen Herbst sehr angenehm sein es zu erhalten.

Ich bin mit wahrer Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

G. Dahl.

Eudora. ♂♀ ... 1 4 —	Thersamon ♂♀ ... 2 — —	Chlorbs. H. ♂♀ ... 1 4 —
Dejanira ♂♀ ... 1 4 —	Hippothoe. ♂♀ ... 1 4 30.	Geryon. H. ♂♀ ... 1 4 —
	Virgaurea. ♂♀ ... — 4 24.	Atices. ♂♀ ... — 4 20.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Xylena.
Vetusta. ♂♀
Exoleta. ♂♀
Conformis. ♂
Rizolitha. ♂
Petrificata ♂
Conspicillaris.
Polyodon. ♂
Petroriza. ♂♀
Pulla. ♂♀
Porosicillaris ♂

Melitaea.
Artemis. ♂
Cinxia. ♂
Dilyma ♂♀
Lucina. ♂
Parthenie

Arg
Dia ♂♀
Pales. ♂♀
Hecate ♂
Ino ♂♀
Latonia
Niobe
Cleodoxa
Adippe
Aglaja

Va
Antiop
Punctum

Boris
Hes
Aret
Fide
Pasi
Eud
Dey

1	Anomala. oblonga aurata. auricollis. Dahl.	distincta. M. biseptemgattata bisexguttata 4punctata. Lin. humeralis. Sch.	Lopha. subfasciata. Ha. 4notata. M. lineola. M.	Alpoecus. brunneus. M. ferrugineus. St.
2				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

33

Xylena.	℔	ßr
Vetusta ♂♀	2	—
Exoleta ♂♀	1	—
Conformis ♂♀	1	—
Rizolitha ♂♀	—	30
Petrificata ♂♀	1	—
Conspicillaris ♂♀	1	—
Polyodon ♂♀	—	30
Petroriza ♂♀	2	—
Pulla ♂♀	4	—
Perspicillaris ♂♀	1	20

Heliotis.	℔	ßr
Dipsacea ♂♀	—	30
Scutosa ♂♀	2	—

Aconthia		
Solaris ♂♀	1	—

Anthophila		
Purpurina ♀	5	—

Ophiusa.		
Craccae ♂♀	3	—

Geometra	℔	ßr
Dilucidaria ♂♀	1	—
Flavicaria ♂♀	1	—
Favillacearia ♂♀	1	—
Conspersaria ♂	—	30
Capreolaria ♂♀	1	—
Caesiata ♂♀	1	—
Tristata ♂	—	12
Sertata ♂♀	1	—
Artesiaria ♂♀	—	40

32

Index Systematicus Verzeichniß von 1820 (im Handel)

Melitaea. O.	℔	ßr
Artemis ♂♀	—	40
Cinxia ♂♀	—	30
Didyma ♂♀	—	30
Lucina ♂♀	—	20
Parthenie ♂♀	—	20

Argynnis. O.		
Dia ♂♀	—	30
Pales ♂♀	1	—
Hecate ♂♀	1	—
Ino ♂♀	1	—
Latonia ♂♀	—	20
Niobe ♂♀	—	40
Cleodoxa B. var Adippe ♂♀	1	30
Aglaja ♂♀	—	30

Vanessa. O.		
Antiopa ♂♀	—	40
Punctum album Mazola ♂♀	2	—

Hipparchia		
Briseis (sub Ungaro Var. grossa und Nigra) ♂♀	1	—
Arethusa ♀	—	30
Fidia ♂	1	—
Pasiphäe ♂♀	2	—
Eudora ♂♀	1	—
Dejanira ♂♀	1	—

Hipparchia.	℔	ßr
Lachesis ♂♀	2	—
Clotho ♂♀	3	—
dito ♀ var.	2	—
Syllius ♂♀	3	—
Euryale ♂♀	1	30
Pronoe ♂♀	2	30
Pitho. Hübn. ♂♀	3	—
Ligea ♂♀	1	—
Hero ♂	—	24
Arcania ♂♀	—	30

Lycaena. O.		
Arion ♂♀	—	30
Alcon ♂♀	1	—
Euphemus ♂♀	1	—
Cyllarus ♂♀	—	30
Damon ♂♀	—	30
Daphnis ♂	—	40
dto ♀	1	—
Corydon ♂♀	—	24
Dorylas ♂	—	30
dto ♀	—	45
Icarius ♂	1	—
Eumedon ♂♀	1	—
Admetus ♂♀	3	—
Hylas ♂♀	1	—
Battus ♂♀	1	—
Circe ♂♀	—	30
Thersamon ♂♀	2	—
Hippothoe ♂♀	1	30
Virgaurea ♂♀	—	24

Lycaena. O.	℔	ßr
Quercus ♂♀	—	30
Acaciae ♂♀	1	30
Betulae ♂♀	—	30

Porthia. O.		
Belia ♂	1	30
Euphero ♂♀	2	—

Colias. O.		
Chrysotheme ♂	1	—
Palaeno ♂♀	2	—
Cleopatra ♂♀	2	—

Hesperia. O.		
Malvarum ♂♀	—	24
Lavatherae ♂♀	2	—
Tessellum H. ♂♀	3	—
Carthami ♂♀	—	48
Steropes ♂♀	2	—
Sylvius ♂	1	—

Chimaera. O.		
pumila ♂♀	4	—
appendiculata ♂♀	1	—
pusilla. G. nov. sp. sub Ungaro ♂	2	—

Atychia. O.		
infausta ♂	—	45
Globulariae ♂♀	1	—
Chloros. H. ♂♀	1	—
Geryon. H. ♂♀	1	—
Statices ♂♀	—	20

Zygaena. O.

Minos. ♂♀ —„24.
Brizae. ♂♀ 2„—.
Scabiosae. ♂♀ 1„—.
Achilleae. ♂♀ —„30.
Cynarae. ♂♀ 1„36.
Meliloti. ♂♀ —„40.
Loniceae. ♂♀ —„30.
Hippocrepidis. ♂♀ 1„36.
Angelicae ♂♀ 1„30.
Coronillae ♂♀ 1„—.
Lavandulae ♂♀ 3„—.
Radamanthus. ♂♀ 2„—.
Onobrychis. ♂♀ —„24.
Hedysari ♂ ♀ Föhn var. ♂♀ —„48.
Fausta. ♂♀ 1„—.

Thyris. O.

Fenestrina ♂♀ 1„—.

Sesia. O.

Cynipiformis. ♂ 1„—.
Tipuliformis. ♂♀ 1„—.
Scoliaeformis. ♂♀ 1„30.

Deilephila. O.

Nerii ♀ rund Italien, ♂ ♀ Föhn und groß 10„—.
Galii. ♂♀ 1„30.

Saturnia. O.

Pyri. ♂♀ 2„—.

Harpyia. O.

Bifida. ♂♀ —„48.
Ulmi. ♂♀ 1„36.

Notodonta. O.

Dromedarius. ♂♀ 1„—.
Cucullina. ♂♀ 4„—.
Camelina. ♂♀ —„40.
Argentina. ♂♀ 4„—.
Palpina. ♂♀ —„40.
Plumigera. ♂♀ 1„—.
Bicolora. ♂♀ 3„—.
Dodonea. ♂♀ 1„30.
Chaonia. ♂♀ —„40.
Trepida. ♂♀ 1„—.

Cossus. O.

Pantherinus ♂♀ ♂ ♀ Föhn 6„—.

Liparis. O.

Monacha. ♂♀ —„40.
Detrita. ♂♀ 2„—.
rubea ♂♀ frisch Herzogsp. 8„—.

Orgyia. O.

Antiquoides ♂ 3„—.

Gastropacha. O.

Populifolia ♀ 2„—.
Quercifolia ♂ —„30.
potatoria. ♂♀ —„18.
♂ = var. ♀ aus Italien aus der Puppe 1„30.

Gastropacha

Trifolii ♂♀ 1„—.
Medicaginis ♂♀ 1„—.
Taraxaci ♂♀ 4„—.
Dumeti ♂ 3„—.
Populi. ♂♀ —„40.
Crataegi. ♂♀ —„40.
Catax. ♂♀ 1„—.
Everia. ♂♀ 1„—.
Lanestris. ♂♀ —„40.
Castrensis. ♂♀ —„48.

Eyprepia. O.

Cribrum. ♂♀ 1„20.
pulchra. ♀ 1„—.
Gramica. ♂♀ —„40.
Plantaginis. ♂♀ 1„—.
Hospita. ♂ —„30.
Dominula. ♂♀ —„48.
Hera. ♂♀ 1„—.
purpurea. ♂♀ 1„—.
Aulica. ♂♀ 1„—.
Villica. ♂♀ 1„—.
Hebe ♂♀ 1„—.
Casta. ♂♀ 6„—.
Maculosa. ♂♀ 2„—.
♂ = var. ♂♀ 3„—.
Parisita. ♂ 6„—.
Luctifera. ♂♀ 1„—.
Mendica ♂♀ 1„—.
Menthastri. ♂♀ —„40.
Lubricipeda. ♂♀ —„40.

Xylena
Vetusta ♂♀
Exoleta ♂♀
Conformis ♂♀
Rurea
Rhizolitha ♂♀
Petrificata ♂♀
Conspicillaris ♂♀
Polyodon ♂♀
Retroriza ♂♀
Pulla ♂♀
Arenacea
Arenacea ♂♀
Acronicta
Rumicis ♂♀
Megacephala
Diphthera
Ludifica ♂♀
Orion ♂♀
Cerigo
Coryli ♂♀
Geographica
Tethea
retusa ♂♀
rubetra ♂♀
Oo ♂♀
Xanthocera
rupicollis
♂ = var.
Diluta
Or ♂♀
Fluctuosa
Flavicornis
Salicalis
Epione
Gothica

Xylena.

Vetusta ♂♀ ... 2 4 —.
Exoleta ♂♀ ... 1 4 —.
Conformis ♂♀ ... 1 4 —.
Rizolitha ♂♀ ... —,30.
Petrificata ♂♀ ... 1 4 —.
Conspicillaris ♂♀ ... 1 4 —.
Polyodon ♂♀ ... —,30.
Petroriza ♂♀ ... 2 4 —.
Pulla ♂♀ ... 4 4 —.
Perspicillaris ♂♀ ... 1,20

Heliotis.

Dipsacea ♂♀ ... —,30.
Scutosa ♂♀ ... 2 4 —.

Aconthia

Solaris ♂♀ ... 1 4 —.

Anthophila

Purpurina ♀ ... 5 4 —.

Ophiusa.

Craccae ♂♀ ... 3 4 —.

Geometra

Dilucidaria ♂♀ 1 4 —.
Flavicaria ♂♀ 1 4 —.
Favillacearia ♂♀ 1 4 —.
Conspersaria ♂ —,30.
Capreolaria ♂♀ 1 4 —.
Caesiata ♂♀ 1 4 —.
Tristata ♂ —,12.
Sertata ♂♀ 1 4 —.
Artesiaria ♂♀ —,40.

Acronicta.O.

Psi ♂♀ —,30.
Menyanthidis ♂♀ 1,30.
Auricoma ♀ —,24.
Rumicis ♂♀ —,24.
Euphorbiae ♂♀ 1,30.
Aceris ♂♀ —,24.
Megacephala ♂♀ —,30.

Diphtera.O.

Ludifica ♀ 3 4 —.
Orion ♂♀ 1 4 —.

Colocasia.O.

Coryli ♂♀ —,30.
Geographica ♂♀ 3 4 —.

Tethea.O

retusa ♂♀ —,24.
subtusa ♂♀ 1,30.
Oo ♂♀ —,48.
Xanthoceros ♂♀ —,30.
ruficollis ♂♀ 3 4 —.
do = var ♂♀ 3 4 —.
Diluta ♂♀ 1 4 —.
Or ♂♀ —,48.
Fluctа nov. sp. ♂♀ 2 4 —.
Flavicornis ♂♀ —,30.
Saliceti ♂♀ 1 4 —.

Episema.O

Gothica ♂♀ —,40.

Agrotis.O

Vitta ♂♀ 2 4 —.
Tritici ♂♀ 1 4 —.
Eruta H. ♂♀ 1,30.
Aquilina ♂♀ 2 4 —.
Famosa ♂♀ 1 4 —.
Ursina P. ♂♀ 2 4 —.
Obelisca ♂♀ 1,12.
Ruris ♂♀ 2 4 —.
Rustica D. ♂♀ 2 4 —.
Suffusa ♂♀ —,40.
Segetum ♂♀ —,40.
Fuscata Esp. ♂♀ 1 4 —.
Corticea ♂♀ 1,30.
Exclamationis ♂♀ —,30.
Forcipula ♂♀ 2 4 —.
Signifera ♂♀ 2 4 —.
Tenebrosa ♂♀ 1 4 —.

Graphiphera.

Augur ♂♀ —,40.
Baja ♂♀ 1 4 —.
Candelisequa ♀ 2 4 —.
Brunnea ♂♀ 1 4 —.
Dahlii ♂♀ 3 4 —.
Festiva ♂♀ 2 4 —.
Rhomboidea ♂♀ 2 4 —.
Triangulum ♂♀ —,40.
Tristigma ♂♀ 1,30.
Polygona ♂♀ 2 4 —.
C. nigrum ♂♀ —,40.
Plecta ♂♀ —,40.

Trisphaena.

Subsequa ♂♀ 1 4 —.
Comes ♀ 2 4 —.
Pronuba ♂♀ —,30.
Fimbria ♂♀ 1,12.

Amphipyra.

Tragopogonis ♂♀ —,30.
Cinnamomea ♂♀ 3 4 —.
Perflua ♂♀ 6 4 —.

Mormo

Typica ♂♀ —,40.

Hadena.

Saponariae ♂♀ 1 4 —.
Popularis ♂♀ 1 4 —.
Pteridis ♂♀ 4 4 —.
Meticulosa ♂♀ —,30.
Gemina ♂♀ 1 4 —.
Genistae ♂♀ —,30.
Aeruginea ♂♀ 4 4 —.
Convergens ♂♀ 1,30.
Distans ♂♀ 2 4 —.
Protea ♂♀ —,24.
Ligustri ♂♀ 1 4 —.

Miselia.O.

Culta ♂♀ 2 4 —.
Aprilina ♂♀ —,40.
Bimaculosa ♂♀ 2 4 —.

Polia O.	♂	♀
Chi	— „ 48.	
Serena		— „ 24.
Serratilinea	4 „ — .	
Advena		1 „ — .
Trachea. O.		
Praecox	3 „ — .	
Porphyrea	1 „ — .	
Apamea. O.		
Nictitans	1 „ — .	
Didyma	— „ 30.	
Secalina	— „ 30.	
Basilinea	— „ 40.	
Infesta		— „ 30.
Cespitis	2 „ — .	
Graminis	1 „ 30.	
umbrosa	4 „ — .	
Cuprea		3 „ — .
Mamestra.		
Pisi	— „ 40.	
Inasa	1 „ — .	
Albicolon	3 „ — .	
Persicariae	— „ 30.	
Thyatira. O		
Batis	1 „ — .	
Derasa	1 „ — .	

Mythimna	♂	♀
Oxalina	4 „ — .	
Acetosellae		1 „ — .
Turca	1 „ 30.	
Lithargyria	— „ 40.	
Albipuncta	1 „ 30.	
Xanthographa	1 „ — .	
Orthosia.		
Coecimacula	2 „ — .	
Instabilis	— „ 30.	
Ypsilon	— „ 30.	
♂ = var.	— „ 40.	
Lota	— „ 40.	
Gracilis	— „ 40.	
Stabilis	— „ 30.	
Miniosa	— „ 40.	
Nitida		2 „ — .
Lychnidis	2 „ — .	
Pistacina	1 „ — .	
Litura	1 „ — .	
Caradrina		
Superstes		1 „ — .
Ambigua	1 „ — .	
Alsines	— „ 48.	
Respersa	2 „ — .	
Trilinea	1 „ — .	
Simyra.		
Nervosa		1 „ — .

Leucania. O.	♂	♀
Pallens	— „ 40.	
Impura	1 „ — .	
Obsoleta	3 „ — .	
L. album	— „ 40.	
Nonagrica.		
Sparganii	3 „ — .	
Paludicola	4 „ — .	
Typhae	1 „ — .	
Xanthia		
Echii	2 „ — .	
Ochroleuca	1 „ — .	
Rufina	— „ 30.	
Ferruginea	— „ 30.	
Badiago		2 „ — .
Citrago	— „ 40.	
Croceago	— „ 24.	
Sulphurago	2 „ — .	
Cerago	— „ 24.	
Palleago	1 „ — .	
Cosmia.		
affinis	— „ 48.	
Cerastis		
Vaccinii	— „ 24.	
Polita H.	1 „ — .	
Erythrocephala	2 „ — .	
Glabra	2 „ — .	
Silene	1 „ — .	

Xylena.
Vetusta ♂♀
Exoleta ♂♀
Conformis ♂♀
Rizolitha ♂♀
Petrificata ♂♀
Conspicillaris ♂♀
Polygona ♂♀
Petroriza ♂♀
Pulla ♂♀
Despicillaris ♂♀
Radiosa ♂♀
Lunili hepta
Cinariae ♂♀
Delphinii ♂♀
Cucullia
Scrotani ♂♀
Absynthii ♂♀
Tanaceti ♂♀
Artemisiae
Umbratica ♂♀
Lucifuga ♂♀
Asteris ♂♀
Verbasci ♂♀
Plusia
Illustris ♂♀
Moneta ♂♀
Concha ♂♀
Festucae ♂♀
Percontationis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

33

Xylena.

Vetusta ♂♀ . . 2₄ —.
Exoleta ♂♀ . . . 1₄ —.
Conformis ♂♀ . . 1₄ —.
Rizolitha ♂♀ . . —₄30.
Petrificata ♂♀ . . 1₄ —.
Conspicillaris ♂♀ . . 1₄ —.
Polyodon ♂♀ . . —₄30.
Petroriza ♂♀ . . . 2₄ —.
Pulla ♂♀ . . . . 4₄ —.
Perspicillaris ♂♀ . . 1₄30.
Radiosa ♂♀ Emilii Anarta ♂ } 8₄ —.
Linariae ♀ . . . —₄20.
Delphinii ♂♀ . . . 2₄ —.

Cucullia.

Abrotani ♂♀ . . . —₄48.
Absynthii ♂ . . . —₄30.
Tanaceti ♀ . . . 1₄ —.
Artemisiae ♂♀ . . . 1₄30.
Umbratica ♂♀ . . . —₄40.
Lucifuga ♀ . . . 1₄ —.
Asteris ♂♀ . . . 2₄ —.
Verbasci ♂♀ . . . —₄40.

Plusia.

Illustris ♂♀ . . . 4₄ —.
Moneta ♂♀ . . . 6₄ —.
Concha ♂♀ . . . 6₄ —.
Festucae ♂♀ . . . 1₄ —.
Percontationis ♀ . . 1₄ —.

Heliotis.

Dipsacea ♂♀ . . . —₄30.
Scutosa ♂♀ . . . . 2₄ —.

Aconthia

Solaris ♂♀ . . . . 1₄ —.

Anthophila

Purpurina ♀ . . . . 5₄ —.

Ophiusa.

Craccae ♂♀ . . . . 3₄ —.
Lunaris ♀ . . . . . 1₄ —.

Catocula.

Elocata ♂♀ . . . . 1₄ —.
Nupta ♂♀ . . . . —₄40.
Sponsa ♂♀ . . . . —₄40.
Marita ♀ mit gelben Hinterflügeln } 3₄ —.

Brephos.

Puella ♂♀ . . . . 1₄30.
Notha ♀ . . . . . —₄30.

Enclidia.

Triquetra ♂♀ . . . 2₄ —.

Geometra.

Plumistaria ♂♀ . . 2₄ —.
Plumaria ♂♀ . . . —₄48.
Decusaria ♂♀ . . . 1₄ —.
do var. ♂♀ . . . 1₄ —.
Sericeata ♂♀ . . . 1₄30.

Geometra

Dilucidaria ♂♀ . 1₄ —.
Flavicaria ♂♀ . . 1₄ —.
Favillacearia ♂♀ 1₄ —.
Conspersaria ♂ . . —₄30.
Capreolaria ♂♀ . . 1₄ —.
Caesiata ♂♀ . . . 1₄ —.
Tristata ♂ . . . —₄12.
Sertata ♂♀ . . . 1₄ —.
Artesiaria ♂♀ . —₄40.
Cinctaria ♂♀ . . —₄24.
Defoliaria ♂ . . . —₄12.
Elutata ♂♀ . . . —₄40.
Secundaria ♂ . —₄30.
Sambucaria ♂♀ . —₄30.
Lineolata ♂♀ . . —₄40.
Almiaria ♂ . . . —₄20.
Moeniata ♂♀ . . —₄30.
Quaretata ♂♀ . . —₄48.
Decoraria ♂♀ . . —₄30.
Obscuraria ♂♀ . —₄30.
Evonymaria ♂♀ . —₄48.
Repandaria ♂♀ . —₄40.
Advenaria ♂ . . . —₄20.
Cervinata ♀ . . . —₄30.
Elinguaria ♂♀ . —₄40.
Derivata ♂ . . . —₄24.

15 depressus. 4 — — —
19 —— var. niger. 4. Italien
20 limbatus Zig. nov. sp. 6. Taurus
21 lugens. Cr. 4 —
22 immundus. Cr. 4 Astrachan
23 sericatus. Ho. 4. Amasia —
24 obscurus. 4 Kirg. Casta —
25 signatus. Ho. 4. Cast. — — 20
26 rubexs. Zig. 4. Schuschenburg —
27 contaminatus. Fvera. 4. Italien
28 constans. M. 4. Taurus —

Hadena

50 inaequalis. 4. Cast —
51 semipunctatus. 4. Italien
52 tericola. Dahl. 2. Cast —

Melotontha

53 orientalis. Koy. B. Ungarn
54 pilosa. 2. Ungarn —
55 verna. Zig. 20. 24. Cast. Pfingstrose
Lässt von 56 durch die Flügel
das ♂ zu unterscheiden
56 aequinoctialis. 20. 24. Cast —

Geometra	fl	Xr
Aurantiaria. ♂.	—	„ 15.
Pomonaria. ♂.	—	„ 20.
Hispidaria. ♂.	—	„ 20.
Melanaria. ♂♀.	1	„ 30.
Lunaria. ♂♀.	—	„ 48.
Illunaria. ♂♀.	—	„ 48.

die Preise sind in Conv. Mtz den Gulden zu 3. 20xr gerechnet
wo den Preisen ♂♀ beigefügt ist, gilt der Preis für
Paar, wo nur ♂ mas oder ♀ foemina steht, ist nur ein Stück
vorhanden. Alles ist schon zubereitet, und versende
von mir selbst und der Raupen wegen; Preise und rein
die Bestimmungen sind neue Ausgabe, bey Geometra
neue Gattung.

G. Dahl

zu Adelsheim
unweit Mosbach.

in Spray eingelegt.

Pisi. ♂♀ — „ 40.
Inasa. ♂♀ 1 „ —.
Albicolon. ♂♀ 3 „ —.
Persicariae. ♂♀ — „ 30.

Thyatira. O

Batis. ♂♀ 1 „ —.
Derasa. ♂♀ 1 „ —.

Caradrina

Superstes. ♂ 1 „ —.
Ambigua. ♂♀ 1 „ —.
Alsines. ♂♀ — „ 48.
Respersa. ♂♀ 2 „ —.
Trilinea. ♂♀ 1 „ —.

Simyra.

Nervosa. ♀ 1 „ —.

Cerago. ♂♀ — „ 24.
Palleago. ♂♀ 1 „ —.

Cosmia.

affinis. ♂♀ — „ 48.

Cerastis

Vaccinii. ♂♀ — „ 24.
Polita. H. ♂♀ 1 „ —.
Erythrocephala ♂♀ 2 „ —.
Glabra. ♂♀ 2 „ —.
Silene. ♂♀ 1 „ —.

Xylena.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Geometra		
Aurantiaria	—	15
Pomonaria	—	20
Hispidaria	—	20
Melanaria	1	30
Lunaria	—	48
Illunaria	—	48

Die Preise sind in
wo der Preis o
Preuss, wo nur
verstanden. Alle
von mir selbst
Die Exemplare
aus Suhum.

	♂	♀
Car. aeneipennis	1	30
Pterost. Mineckwitzii	—	40
—— Wellensii	—	20
Harpal. latipes	—	24
Calath. rufus	—	15
Acidia spinosa	1	
Moluris spiripes	—	30
Saperda gracilis	—	24

Pisi ♂♀ — 40
Inasa ♂♀ 1 — .
Albicolon ♂♀ 3 — .
Persicariae ♂♀ — 20.

Thyatira. O

Batis ♂♀ 1 — .
Derasa ♂♀ 1 — .

Caradrina

Superstes ♂ 1 — .
Ambigua ♂♀ 1 — .
Alsines ♂♀ — 48.
Respersa ♂♀ 2 — .
Trilinea ♂♀ 1 — .

Simyra.

Nervosa ♂♀ 1 — .

Cerago ♂♀ — 24.
Palleago ♂♀ 1 — .

Cosmia.

affinis ♂♀ — 48.

Cerastis

Vaccinii ♂♀ — 24.
Polita H. ♂♀ 1 — .
Erythrocephala ♂♀ 2 — .
Glabra ♂♀ 2 — .
Silene ♂♀ 1 — .

Xylena.

Aphod. maculatus v. dorsal = testulatus. 81

Saprinus

aeneus. Koy. 4. Ungarn
semicornis. F. 2. d. —
striatus. F. 4. d. —
foliiea. M. 4. d. —
canaliculata. Naturforsch.
agus. 4. d. — 45
virens. F. 4. d. —
nitidum 4. Oest. —
placea. 4. d. —

Exodius 35 82

testulatus. St. 4. Oest. —
maculatus. St. 2 d. —
alpinus. Fr. 4. Pyrenäen —
putridus. Gr. 4. Oester. — 24
pallens. Zebl. 4. Berlin
rufus. St. Gr. 4. Dürenfl. —
aeneus. 4. Ungarn —
vespertinus. 4. Oester. —
villosus. Gyll. 2. Oest. —
sulcatus. 4. ungarn —
dubius. M. 4. d. — 15
gibbus. Kaulf. 2. Pyrenäen — 20
serotinus. Gr. 2. Oester. — 24
niger. Hl. vera 2. Frankr. —
moravicus. M. 2. Mähren
sulcicollis. Hl. 2. Ungarn
vulneratus. H. 4. Ungarn

Geotrupes

46 stercorosus. 4. Ungarn
47 punctatus. 3. Berlin —

Bubas. Zig.

48. 49. bison. 4. Portugal

Hister

50 inaequalis. 4. Oest. —
51 semipunctatus. 4. Berl. —
52 terricola. Dahl. 2. Oest. —

Melolontha

53 orientalis. Koy. B. Ungarn
54. picea. 2. Ungarn
55. vernia. Zig. 20. 24. Oest. Mähr. — 20
Einl. von 56 durch die Fühler
durch 57 zu unterscheiden
56 aequinoctialis. 20. 24. Oest. —

13 morbillosus. 1 Berlin —
14 impius. Hbst. 2. Berlin —
15 semipronotatus. 4. Berlin !

Aphodius

16 scrutator. 4. Oest. —
17 fasciatus. 4. Ungarn —
18 depressus. 4 — —
19 — var. niger. 4. Berlin
20 limbatus. Zig. nov. sp. 6. Sammel
21 lugens. Gr. 4.
22 immundus. Gr. 4. Oesterr. —
23 sericatus. Hg. 4. Dürenfl. —
24 obscurus. 4. Mitteld. Oester. —
25 signatus. Hg. 4. Oest. — — 20
26 rubens. Zig. 4. Pyrenäen —
27 contaminatus. Frivera. 4. Berlin —
28 constans. M. 4. Sammel —

Geometra

Aurantiaria. ♂. — „ 1
Pomonaria. ♂. — „ 2
Hispidaria. ♂. — „ 2
Melanaria. ♂♀. 1 „ 3
Lunaria. ♂♀. — „ 4
Illunaria. ♂♀. — „ 4

Die Preise sind in
wo dass Zeichen o
Preuss, wo nur
vorfinden. Alle
von mir selbst
Die Bestimmun
von Guenée.

in Herrg. eingetrag

Pisi. ♂♀. — „ 40.
Inasa. ♂♀. 1 „ —
Albicolon. ♂♀. 3 „ —
Persicariae. ♂♀. — „ 30.

Thyatira. ♂

Batis. ♂♀. 1 „ —
Derasa. ♂♀. 1 „ —

Cucullia. ♂♀. 1 „ —

Charadrina

Superstes. ♂. 1 „ —
Ambigua. ♂♀. 1 „ —
Alsines. ♂♀. — „ 48.
Respersa. ♂♀. 2 „ —
Trilinea. ♂♀. 1 „ —

Leucania.

Nervosa. ♂. 1 „ —

Asphalago. ♂♀. 2 „ —
Cerago. ♂♀. — „ 24.
Palleago. ♂♀. 1 „ —

Cosmia.

affinis. ♂♀. — „ 48.

Cerastis

Vaccinii. ♂♀. — „ 24.
Polita. H. ♂♀. 1 „ —
Erythrocephala. ♂♀. 2 „ —
Glabra. ♂♀. 2 „ —
Silene. ♂♀. 1 „ —

Xylena.

Phaleria.

193 cultinaris. 2 Ostpr. —
94 ferruginea. Best. Volhyn. 4 — ✕ 20 —

Pedinus

95 laevigatus. M. nov. sp. 4. Ungarn ✕ 15
96 latus. M. nov. sp. 4 ♂♀ — ✕ 15

Tentyria

97 orbiculata. Sicilien 2 —

Erodius

Saperda

218 Dahlii. Koy. 4. Ungarn
19 maculicornis. Fr. 2. ♂♀ —
20 suturalis. F. 4. ♂♀ —
21 salbolinea. M. 4. ♂♀ —
v. canaliculata. Naturforsch.
22 argus. 4. ♂♀ — ~~45~~
23 affinis. F. 4. ♂♀ —
24 ephippium 4. Ostpr. —
25 violacea. 4 ♂♀ —

No Dahls Verzeichniß von 1821. 1 pr. Mark 16

Lethrus

1. cephalotes ~~2 ♂♀~~ 22. Ungarn

Scarabaeus

2. ~~alpinus~~ St. 4 N. Ungarn —
3. laevigatus. 1 Italien — — 45

Copris

4. ~~austriaca~~ F. 2. — —
5. ~~alces~~ F. 4. — — —
6. ~~cameleo~~ 4. — — — 15
7. furcata 4. — — — 15.
8. vacca. 2 — —
9. affinis. 2. — —

Gymnopleurus

10 pilularius. F. vera, Italien — 30

Ateuchus

11 pius. Hl. 4 N. Ungarn —
12 variolosus. 2 Portugall
13 morbillosus. 1 Italien —
14 impius. Hbst. 2. Italien —
15 semipunctatus. 4. Italien !

Aphodius

16 scrutator. 4. Ostpr. —
17 fasciatus. 4 Ungarn —
18 depressus. 4 — — —
19 — var. niger. 4. Italien
20 limbatus Zig. nov. sp. 6. Caucas
21 lugens. Cr. 4
22 immundus. Cr. 4 Ostpr.
23 sericatus. Hg. 4. Ungarn —
24 obscurus. 4 Nizza —
25 signatus. Hg. 4. Ostpr. — — — 20
26 rubens. Zig. 4. Pyrenäen —
27 contaminatus. F. vera. 4. Italien
28 constans. M. 4. Caucas —

Oxyomus

29 testudinatus. St. 4. Ostpr. —
30 maculatus. St. 2 ♂♀ —
31 alpinus. Fr. 4. Pyrenäen —
32 putridus. Cr. 4. Ostpr. — ~~1 36~~ 24
33 pallens. Zahl. 4 Italien
34 rufus. St. Cr. 4. Ungarn —
35 porcus. 4. Ungarn —
36 vespertinus. 4. Ostpr. —
37 villosus. Gyll. 2. Ostpr. —
38 sulcatus. 4. Ungarn —
39 dubius. M. 4 ♂♀ — ~~1 20~~ 15.
40 gibbus. Kaulf. 2. Pyrenäen — 20
41 serotinus. Cr. 2. Ostpr. — 24
42 niger. Hl. ♂ vera 2 ♀ Griech. —
43 moravicus. M. 2. Mähren —
44 sulcicollis. Hl. 2 Ungarn —
45 vulneratus. St. 4. Ungarn —

Geotrupes

46 monodon. 4 Ungarn —
47 punctatus. 3 Italien —

Bubas. Zig

48. } Bison. 4. Portugall
49. }

Hister

50 inaequalis. 4. Ostpr. —
51 semipunctatus. 4. Italien
52 terricola. Dahl. 2. Ostpr. —

Melolontha

53 orientalis. Koy. B. Ungarn —
54. pilosa. 2. Ungarn —
55. verna. Zig. 20. 24. Ostpr. Diese
hilft von 56 durch die Fühler
durch 9 zu unterscheiden
56 aequinoctialis. 20. 24. Ostpr. —

— 20
— 15
— 24
— 20
— 18
— 20
— 18
— 12
— 15
— 15
— 8
— 18
— 18
— 10
— 20
— 15
— 15
— 10
— 8
— 15
— 8
— 15
— 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		ℳ	₰
	Geometra		
	Aurantiaria. ♂.	—	15
	Pomonaria. ♂.	—	20
	Hispidaria. ♂.	—	20
	Melanaria. ♂♀.	1	30.
	Lunaria. ♂♀.	—	48
	Illunaria. ♂♀.	—	48.

№		ℳ	₰
	Melolontha		
57.	aprilina. ♂. 3. Cast		
58	transversa. F. 4. Dalmatin		
59	pilicollis. M. 2. Ungar		
60	tropica. Krock. 2. Dalmat		
	Anomaloplia		
61	vitis. Hal. Ungar	—	4
62	auricollis. D. 2. Dürnitz		
63	aurata. F. Dresden	—	4
64.	nigritta. F. 4. Dürnitz	—	24.
	Anisoplia		
65	austriaca. F. 2. Cast		
66.	arvicola. F. in 6 var. zwischen allen 12 M. Illyrien		
67	segetis. M. 26. 27. Ungar		
68	fruticola. F. 26. 27. Schweden	~~1 48~~ —	~~36~~ 24
69	praticola. And. 2. Italien	~~—~~ —	~~24~~ 16
	Amphicoma		
70	abdominalis. 4. Italien		
	Cetonia		
71	viridis. F. mit var. 6. Ungar		
72	vulpina. M. 4. Ungar		
	Trichius		
73	8punctatus. Oesterreich 2.		
74	fasciatus. F. 2. wie gemein		
75	succinctus. F. 4. Illyrien		
	Cetonia Fonsk.		
76	lineola. ♂♀. Diese Cyrenaica sind nicht die Cyrenaica	3.	—
	Byrrhus		
77	ornatus. Pz cinctus. Ill. 4. Nigrita Kunstfleiß.	ℳ 1.	—
78	gigas. 4. Dürnitz	—	—

№		ℳ	₰	
	Byrrhus			
79.	nigerrimus. Zig. 2. Savoyen	ℳ	30.	
80	lunigerus. M. 4. Dürnitz	—	20	
81	coronatus. Ill.* Gorlitz 2			
82	cinctus. M. 1. Illyrien	—	30.	
	Cicindela.			
83	integra. M. 4 Ungar	ℳ	30.	
84	soluta. M. 4 ♂♀	ℳ	30.	
86	danubialis. Natt. 4. Cast.			
86	littoralis. 4. Italien			
87	sinuata. 4. Cast	—		
88	infracta. Zig. 4. Savoyen			
	Ocydromus			
89	littoralis. M. 4 Illyrien			
	Tachypus			
90	caraboides. Schr. 4 Cast			
91	pallipes. M. 4 Cast	—		
	Bembidium			
92	foraminosum. St. 4. Cast			
93	orichalceum Duftsch. 4 ♂♀	ℳ	15	
94	striatum. F. 4. ♂♀	— —	ℳ	15
	Peryphus. M.			
93	fasciolatus. M. 4. Dürnitz			
96	tibialis. Dufft. 4. Cast	—	ℳ	15
97	brunnipes. M. 4. Oesterreich		ℳ	15
98	varicolor. F. 4 ♂♀	—		
	Lebia			
99	cruxminor. 4. Cast			
100	turcica. Dufft. humeralis. M. 4. Cast			
	Cimindis			
1	miliaris. F. 4.			
2	homagrica. Dufft. 4.			
3	humeralis. F. 4.			
4.	axillaris. F. 4.			

Phaleria.

193 culinaris. 2 Ostr —

94 ferruginea. Besf Volsin 4 — ✕ 20 —

Pedinus

95 laevigatus. M. nov. sp. 4. Ungv ✕ 15

96 latus. M. nov. sp. 4 ♂♀ — ✕ 15

Tentyria

97 orbiculata. Sicilien 2 —

Erodius

105 Demetria imperialis. Ill. 4. Gorz —

Odacantha

6 melanura. F. 4. Ungv —

Crypta

7 emarginata. 4. Ostr —

Brachinus

8 mutillatus. 4. Ostr — 20

Cychrus

9 subcarinatus. Zig. 4. Italien 1 —

10 attenuatus. 4. Livland —

Procerus

11 gigas. Cr. 4. Rossia —

Carabus.

12 virens. St. 3♂ 3♀. Ungvar ✕2. —
wahrsch. Baltha-fall?

13 coeruleus. Pz. 4. Ungv — ✕2. —

14 excellens. F. 4 — ♂♀ — ✕2 —

15 Preisleri. C. 4. Schlesien

16 varians. Zig. nov. sp. 8 — ✕ 30

17 emarginatus. St. 2 Rossia

18 Germari. St. 4. ♂♀ —

19 catenatus. Pz. 2. ♂♀ —

20 caelatus. F. 4. ♂♀ —

21 Goldegii. St. 4. Kobolin —

22 Goldegii. var. 1 — —

23 Bessei. 2. Zig. Kobolin —

24 Hungaricus. F. 2 —

25 purpuratus. St. 4. Ostr —

26 aeneipennis. St. 2 Cosel ✕1. 30

27 clathratus. 2. Krumau

28 Ulrichii. Zig. 2. Schlesien

29 Linnei. M. 1. Amurgeb

Saperda

218 Dahlii. Koy. 4. Ungvar

19 maculicornis. F. 2. ♂♀ —

20 suturalis. F. 4. ♂♀ —

21 alboliniea. M. 4. ♂♀ —
v. canaliculata. Naturforsch.

22 argus. 4. ♂♀ — ✕ 45

23 affinis. F. 4. ♂♀ —

24 ephippium 4. Ostr —

25 violacea. 4 ♂♀ —

Carabus

130. nitens 2. Krain —

31 Fabricii 2. Pisanitzy —

32 sylvestris 2. Gorz —

33 Creutzeri. 4. Livland —

34 scabriusculus. Oliv. agrestis. Creutz. 4. Ostr —

35 dalmatinus. 4. ♂♀. Lithauen 6 —

Abaeus

36 Hellwigii. Pz. 4. Pisanitzy

37 ferrugineus. St. 4. ♂♀ — ✕ 30.

Nebria

38 sabulosa. 4. Ostr —

39 Dahlii. St. 2. Livland —

40 Gyllenhalii. 1 —

41 picicornis. 2. Livland —

42 erythrocephala. Pz. 2 Ostr ✕ 30.

Leistus

43 rufomarginatus. Duft. 4. Ostr

Synuchus Gyll.

44 Sturmii. Duft. 4. Ostr —

Agonum

43 impressum. 4. Ostr —

46 lugens. St. 4. Ungv —

47 nigricorne. F. 2. Livland —

Anchomenus. Zig. Latr.

48 chalybeipennis. Zig. nov. sp. 4. Ungvar ✕ 30.

Limonius. M.

49 spoliatus. 2. Pillau —

Dinodes

50 rufipes. 2. Italien —

Platylophus. M.

51. 4 sulcatus. Ill. 2. Krumau

84

85

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geometra

Aurantiaria. ♂. — „ 1
Pomonaria. ♂. — „ 2
Hispidaria. ♂. — „ 2
Melanaria. ♂♀. 1 „ 3
Lunaria. ♂♀. — „ 4
Illunaria. ♂♀. — „ 4

		℔	ß
	Licinus		
52	casideus. 2. Ons.	—	
53	Hoffmannseggii. 4. Pfunzb.		
	Badister		
54	Zieglerii. Bz. 4. Ons.	—	
	Stenolophus. M.		
55	flavicornis. F. Oest.	—	4
	Sphodrus		
56	planthinus. H. 2. Aosta	—	
	Limichus. M.		
57	striatopunctatus. Duft. 6. Carl.		
	Platynus. Bon.		
58	scrobiculatus. 4. Aosta		
	Pterostichus		
59	Wellersii. Dahl. 4. Aosta		
60	Minckwitzii. D. 4. Bozzol.	—	40
61	Dahlii. M. 4. Pfunzb.		
62	Turinii. Bz. 4. do.	—	
63	fasciatopunctatus. Cr. 4. Aosta		
64	Zieglerii. Dahl. 2. Aosta		
65	Mühlfeldii. D. 2. do.	—	
	Chaporus. M.		
66	striolatus. 4. Aosta	—	
	Abax.		
67	inunctus. H. 4. Aosta		
	Percus.		
68	Kojis. Dahl. 2. Illyr.	—	
69	marginalis. M. 4. Ung.	—	
70	melas. Cr. 4. Ons.	—	
	Harpalus.		
71	hospes. Cr. 4. Ung.	—	
72	latipes. Dej. rev. sp. 2 do.	—	24

		℔	ß
	Leirus		
173	contractulus. Duft. 4. Pfunzb.		20
	~~ignavus~~.		
174	ingenuus. Cr. 4. Ons.	—	
	Sogenes		
75	spinipes. 4. Ung.	—	
	Plotus.		
76	Illigeri. 4. Pfunzb.	—	
	Calathus		
77	rufus. Zig. 4. Ons.	—	15
	Cylindrus		
78	magnus. M. 4. Lommat.	—	
	Laena		
79	viennensis. H. Scaurus. 2 Ons.		
	Scaurus		
80	striatus. 2. Frankf.	—	
	Gibbium. M.		
81	dentipes. M. 2. Lommat.	—	21.
	Acidia. M.		
82	spinosa. F. 2. Sicilien	—	1
83	punctata. v. reflexa. 2. Pfunzb.		21.
	Helops		
84	coerulens. 2. Lommat.	—	21.
85	lanipes. 2. Ons.	—	
86	friulicus. D. 4. Friaul		
87	asphaltinus. M. 4. Italien		
	Trogosita		
88	coerulea. Oberösterr. 4.	—	
	Tenebrio		
89	lobipes. M.* 4. Italien		
90	opacus. Duft. 4. Ons.	—	
91	transversalis. Duft. 2 do.	—	
92	curvipes. F. 2. Aosta		

Phaleria.

193 culinaris. 2 Ost —
94 ferruginea. Best Wolfsin 4 — ✕ 20 —

Pedinus

95 laevigatus. M. nov. sp. 4. Ungv ✕ 15
96 latus. M. nov. sp. 4 ♂♀ — ✕ 15

Tentyria

97 orbiculata. Sicil 2 —

Erodius

98 bilineatus. Sicil 2 —

Moluris

99 spinipes. 4. Ungv — — 30

Blaps

200 pannonica. H. 4 Ungv
1 gages. 2. Mongol — 1 —
2 attenuata. M. 2. Frankf. — 40
3 acuminata. M. 2 Ost
4 fatidica. Gr. 2 ♂♀ —

Pimelia

5 rugulosa. M. 2. Mongol.

Lamia.

6 tristis. 4. Ungv —

Cerambyx

7 alpinus. 4. Croat —
538 Wellensii. Fahl. 2. Ital —

Pesomacha

208 decipiens. Koy 4. Ungv —
9 bicarinata F. 4. ♂♀ —
10 vittigera. F. 4 ♂♀ —
11 bilineata. Mll. 4. Sarmat —
12 seductor. Zig. 4 Illyr —
13 holosericea. M 2. Volsin —
14 pedestris. F. 4. Ital —
15 rufipes. F. 4. Ost —
16 fulva. Sch. 4. ♂♀ —
17 morio. 2. ♂♀ —

Saperda

218 Dahlii. Koy. 4. Ungv —
19 maculicornis. F. 2. ♂♀ —
20 suturalis. F. 4. ♂♀ —
21 alboliniea. M. 4. ♂♀ —
v. canaliculata. Naturforsch.
22 argus. 4. ♂♀ — ✕ 45
23 affinis. F. 4. ♂♀ —
24 ephippium 4. Ost —
25 violacea. 4 ♂♀ —
26 albosculellata. M. 6. Ungv ✕ 40.
27 rufimana. 4. ♂♀ —
28 cylindrica. F. 4 ♂♀ —
29 pustulata. M. 4 ♂♀ —
30 ferrea. F. 3. ♂♀ — ✕ 30.
31 nigripes. F. 2. Virgulf
32 hirsutula. F. 4. Ungv
33 marginella. F. 4. Pass
34 gracilis. Gr. Ungv 4 — — 24
35 testacea. F. 2. Ost

Saphanus. M.

36 spinosus. F. Call. 1. Croat — 48.

Clytus.

37 semipunctatus. F. 2. Ungv
38 3fasciatus. F. 4. Ital ✕ 1. —
39 floralis. F. 4. Pass
40 massiliensis. F. 4. Ital
41 plebejus. F. 2. Ost

Leptura

42 } villosa. Koy. 4 Ungv
43 }
44 velutina. M. 4 ♂♀ —
45 bipunctata 4. Sarmat
46 unipunctata. 4. Ost
47 villica. 4. Ost —
48 cincta. 4. ♂♀ 26. 27 —
49 sanguinolenta 16. 17. Ost
50. Chamomillae 2 ♂♀ —

ormii. M. 6. Ungv — 18
18. salicis. F. 6. Illyr — 15
19. 4guttatus. Koy. 6. Ungv — 10
(ist 1a Progressa 4punctulatus. Koy. =)
20. marginatus. F. 6. Illyr — 8.
21. flavoguttatus. Oliv. 6. Ungv — 15
22. smaragdinus. Zi. 6. Ost — 10
23. coloratus. F. 6. Ost — 8
24. laetus. F. 4 Ungv — 15

10. longipes. F. 4. Ost
49. 4punctata. F. 6. Illyr
50. collaris. F. 4. Ost
51. flavicollis. M. 4. Croat
52. bucephala. F. 6. Ungv
53. concolor. F. 4. ♂♀
54. 4maculata. F. 4. ♂♀

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cestura

251. pubescens. F. ♂. auriflua. M. 4. Corsika
252 obscura. 4. Bayern —
253 7punctata 4. Oest —
54 rufipes. 2. ♂ —
55 hastata. 4 Italien —

Pachyta.

56 virginea. 2. Pfunby
57 6maculata. 4. Oest —
58 reticulata 4. Corsika
59 lurida. 4. ♂ —
60 4maculata 4 ♂ —
61 cincta. 4. Oest —
62 dispar. 4. ♂ —
63 humeralis. F. 2 ♂ —

Zonitis.

64 atrata. Koy 4. Ungarn
65 bifasciata. Koy 4. ♂ —
66 6notata. M. 4 ♂ (Portugal) 10
67 mutica. 4 ♂ —
68 fulvipennis. 4. ♂ —

Oenas

69 crassicornis. 2. Dalmat

Cerocoma

70 Dahlii. M. 6. Dalmat.

Ripiphorus

71 bimaculatus. 4. Ungarn — 45

Hier von Schluß wo ist
Fortsetzung nicht selbst
sind Preise angesetzt
die andern sind
nach dem vorig
Verzeichniß zu setzen.

Perens.

64 Kojei. Dahl. 2. Illyrien
65 marginalis. M. 4. Ungarn
70 melas. Cr. 4. Oest —

Harpalus.

hospes. Cr. 4. Ungarn
latipes. Dej. nov. sp. 2 ♂ — 24

Fortsetzung des
vorigen Verzeichnisses
(2te Auflage)
1821.

272 Balidium Helw.
maculosum. 6 M. — 15

Leiorhynchus. ♂ M.

73 Goertzensis. H. 6. Illyr — 24
74 Frivaldii. H. 6. Friaul — 12
75 Carynthiacus. Dahl. 4. Kärnth — 20
76 Istriensis. Dahl. 4. Istrien — 20
77 sulphuripes. H. 2 Corsica — 18
78 flavellipes. M. 4 Corsica — 18
79. caudatus. F. 6. Italien — 24
80. Hungaricus. Dahl. Ung. 6. — 24
81 longicollis. M. 2. Corsica — 30.
82 planus. F. 6. Pfunzberg — 12
83 deplanus. Dahl. 4. Corsika — 20
84 unicolor. H. 4. Gorz — 10
85 perlatus. ♂M. 6. nov. Pfunzberg — 20
86 haematopus. ♂M. 4. Pfalzen — 20
87 rugulosus. ♂M. 6. Pfunzberg — 15
88 ater. Flbst. 2. Gorz —
89. coecus. M. 4. Kärnth — 20
90. pulverulentus. M. 6. ♂ — 15
91. Armadillo. Rossi. 6 ♂ — 10
92. Gazella. Germ. und Corruptor. Jaquin 6. Illyrien — 20
93. gemmatus. F. 4. Pfunby — 12
94. chlorophanus. M. 6. Krain — 15
95. hirtipes. M. 6. ♂ — 15
96 auricapillus. M. 6. Kärnth — 18
97. brevicollis. M. nov. 4. Pfunby — 18
98. atomarius. M. 6. Kärnth — 12
99. mastix. Helw. 6. Oest — 8
300. geniculatus. M. 6. Oest — 12

Trogosita

88 coerulea. Oberösterr 4. —

Tenebrio

89 loripes. H.* 4 Italien —
90 opacus. Duft. 4. Oest —
91 transversalis. Duft. 2 ♂ —
92 curripes. F. 2 Kärnth —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coborhynchus. M.

301	fasciculatus. Dahl. 6. Kärnth	—	20	
2	plumipes. Dahl. 17. Livon	—	(1.)	
3.	adspersus. Dahl. 6. Ungarn	—	15	
4.	Garzensis. Triepke. 4. pp. Pfronten	—	20.	
5.	lasandus. Köy. 6. Ungarn			
6.	nobilis. M. 6. Ins. Elgau Kärnth	—	48.	
7.	centropunctatus. M. 6. do			
8.	Fraxini. Dahl. 6. Illyrien	—	15	
9.	auricomus. M. 4. Kärnth			
10.	Zebra. F. 6. Oest	—	12	
11.	squamiger. F. 4. Goertz	—	12	
12.	exasperatus. M. 2. Pfronten	—	24.	
13.	Livonensis. Dahl. 6. Livon	—	15	
14.	fehlt.			
15.	picipes. F. singularis. H. 4. Böhm	—	8	
16.	subrotundus. M. 6. Oest	—	12	
17.	Fagi. M. 4. Kärnth	—	15	
18.	Gallii. Gold: regularis. M. 2. Oest			
19.	velutinus. M. 2. Oest	—	12	
20.	aratus. M. 4. Kärnth	—	18	
21.	Bructeri. Ill. 4. Ins. Goertz	—	24	
22.	Silesiacus. M. 2. Schlesien	—	15	
23.	raucus. F. 2. alle Oest	—	4	
24.	ocellatus. M. Oest. 6.	—	12	
25.	laevigatus. F. do 2.	—	8	
26.	Septentrionis. H. 6. Goertz	—	6	
27.	pertusus. M. 6. Kärnth	—	12	
28.	Myrmex. F. 4. Oest	—	8	
29.	polygranosus. M. 2. Illyrien	—	40.	

Titonus. M.

Vid. Coborhynchus.

30.	agnatus. M. 6. Ungarn	—	20	
31.	subtilis. Dahl. 3. Italien	—	20	
32.	orbicularis. Hbst. 6. Oest	—	12	
33.	Chrysocomus. Natt. 4. Ins. Elg	—	10.	

Nr.	Ophis. M.	85	℔	ß
334.	obliqua. F. 6. Oest	—		10
35.	excoriata. Ill. 2. do	—		15
36.	declivis. Köy. 6. Ungarn	—		20
37.	lugens. Ill. 2. Oest	—		15
38.	costata. F. 4. do	—		8
39.	cinerea. F. 2. do	—		12
40.	alternans. F. 2. do	—		8

Achrus. M.

Vid. Lixus.

41.	appendiculatus. Ko. 2.	—		20
42.	paraplecticus. F. 2	—		12

Lixus. F.

43.	angustatus. F. 6. Ungarn			
44.	Tigrinus. M. 6. do	—		12
45.	elongatus. Dahl. 2. do	—		20.

Rhynobatus. M.

46.	Cynarae. F. 6. Ungarn			

Liparus. Ols.

347.	glabratus. F. 4. Oest			
48.	flavomaculatus. Dahl. 4. Ungarn	—		20
49.	fuscomaculatus. F. 4. Oest	—		10.

Orygmus. M.

50.	variolosus. F. Senex. Rossi 6. Oest	—		12

Meleus. M.

51.	Megerlei. F. 4. Livon	—		20
52.	Creutzeri. M. 6. Kärnth	—		30
53.	Illigeri. Dahl. 2. do	—		10
54.	attenuatus. M. 4. do	—		36

Festus. M.

55.	chrysops. H. 4. Kärnth	—		24
56.	austriacus. M. 6. do	—		15

	nnis. Ill. 6. Ungarn	—		18
18.	salicis. F. 6. Illyrien	—		15
19.	4guttatus. Köy. 6. Ungarn (im 1ten Nachtrag 4punctatus. Köy. =)			
20.	marginatus. F. 6. Illyrien	—		8.
21.	flavoguttatus. Ols. 6. Ungarn	—		15
22.	smaragdinus. Zi. 6. Oest	—		10
23.	coloratus. F. 6. Oest	—		8
24.	laetus. F. 4 Ungarn	—		15
48.	longipes. F. 4. Oest			
49.	4punctata. F. 6. Illyrien			
50.	collaris. F. 4. Oest			
51.	flavicollis. M. 4. Kärnth			
52.	bucephala. F. 6. Ungarn			
53.	concolor. F. 4. do			
54.	4maculata. F. 4. do			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Solenus. M.

357 porculus. F. 6. Fisf. Meleus carinatus) — 30

Piniphilus. M.

58. piceae. Ill. 4. Oest — 10
59. Pinastri. Dahl. 4. Angern — 15

Elegmus. M.

Fisf. Birus.

60. obliquus. M. 4. Oest — 12
61. Ni album. M. 4. do — 10

Merionus. M.

62. Hungaricus. Dahl. 4. Ungv — 15

Panaphilis. M.

63. perdix. Grtz. 6. Oest — 12

Platyrhynchus. M

64. flavoviridis. Ill. 6. Ungv
65. viridis. F. 2 — 4
66. pollinosus. F. 6. Oest — 10
67. fallax. Ill. 6. Ungv — 24

Limo. M

68. elegantulus. Dahl. 6. Illyr — 15

Brius. M.

69. elevatus. M. 4. Oest — 10
70. cuprifer. Dahl. 4. do — 15

Dascillus. M.

71. squameus. Grtz. 6. Oest — 6
72. aurulentus. Grtz. 6. do — 8
73 annulatus. M. 4. Dunby
74. canescens. M. 4. Kärnth — 10

Pilumnus. M.

75. Sparganii. Dahl. 6. Ungv — 12
76. brunirostris. F. 4. Braunschweig — 8

67

[illegible]ercus.

[illegible] Hoyii. Dahl. 2. Illyr
[illegible] marginalis. M. 4. Ungv
[illegible] melas. Cr. 4. Oest

Harpalus.

[illegible] hospes. Cr. 4. Ungv
[illegible] latipes. Zig. rev. sp. 2 do — 24

Porrothus. M.

377. Creutzeri. 6. Illyr — 15

Liparus. Ol.

78. crassicollis. And. 4. Oest — 12

Dascillus. M.

79. setosus. Dahl. 6. Illyr
80. Picus. F. 4. Oest — 8
81. Ovulum. M. 4. Oest
82. tessellatus. Dahl. 2. Ungv
83. atomarius. Cr. 4. Oest — 8
84. sinuatus. Cr. M. 4. Oest
85. ruficornis. M. 4. do
86. lateralis. M. 6. do — 16

Adrius. M.

87. bisignatus. Dahl. 4. Illyr — 15

Drosillus. M.

88. Tigrinus. M. 4. Ungv — 15

Brysfus. M.

89. Sphaeroides. Koy. Grtz. 4. Ungv — 10
90. albolineatus. F. 6. do
91. haemisphaericus. Dahl. 6. Ungv — 10
92. rotundatus. F. 4. Oest
93. lanuginosus. Grtz. 4. do
94. setosus. Dahl. 6. Oest — 12
95. globulus. Dahl. 4. Ungv — 10

Cyphorhynchus. M.

96. complicatus. Koy. 4. Ungv — 10

Emblemus. M.

97. Tamarisci. F. 6. Provence — 18
98. repandus. F. var. 2. do — 20

Rhina. M.

99. violacea. F. 6. Oest — 8
400. Carbonaria. F. 6. do — 8
1. Pinastri. Dahl. 6. do — 12
2. rufa. M. 4. do — 12

Prozosita

88 coerulea. Oberösterr. 4. —

Tenebrio

89 lateipes. Ill.* 4 Illyrien
90 opacus. Duft. 4. Oest
91 transversalis. Duft. 2 do
92 curvipes. F. 2 Kärnth

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Dr. Falb 22 Trendung 1821 bezahlt if.

274.	Loborhyn. frisulicus		12	330	Pitonus agnatus		20
275.	— Caryntiacus. (vom friaul. misst man 93)		20	332	— orbicularis		12
276.	— Istriensis		20.	333.	— Chrysocomus		40
279.	— caudatus		24	335.	Ophisea corticata		15
280	— hungaricus.		24	336.	— declivis		20
281.	— longicollis		30.	338.	— lugens.		15
283.	— deplanus		20	340	— costata.		8
284.	— unicolor		10	341	— alternans		8.
285.	— perlatus		20	342.	Achenus appendiculatus		20
286	— haematopus		20		— (paraplectus?) [illegible]		
287.	— rugulosus		15	343	[illegible] paraplectus. = 341.		12
289	— coecus		20		Lixus angustatus		
290	— pulverulentus		15	344	— tigrinus		12
291	— armadillo		10	345	— elongatus		20
292	— gazella		20	346	Rhynobatus Cynarae		18.
294	— chlorophanus		15	347.	Lixarus glabratus		
296.	— auricapillus		18	348	— flavomaculatus		20.
297.	— brevicollis		18	350	Orygmus variolosus.		12
298.	— atomarius		12	351.	Meleus Megerlei		20
299	— nubilus		16	352.	— Creutzeri		30
300	— genienlatus.		12	353	— Illigeri		40
301	— fasciolaris.		20	354	— attenuatus		36.
303	— adspersus		15	355	Festus chrysops		24
304	— Garzensis Fuss		20	356	— austriacus		15
305	— lavandus Koy			357.	Tolenus porculus		30
306.	— nobilis		48	358.	Piniphilus piceus. Ill		10
307.	— centropunctatus			360	Elegnus obliquus		12
308.	— Fraxini		15	362	Merionus hungaricus		15
309.	— auricomus			363	Paraphilis perdix		12
310	— Zebra		12	364.	Platyrhynchus flaviviridis		
311	— squamiger		12	366.	— pollinosus		10
312	— exasperatus		24	367.	— fallax		24
313	— dunensis		15	369.	Brius elevatus		10
315.	— picipes		8	371	Dascillus squameus		6
316.	— subrotundus		12	373	— annulatus		
317	— Fagi		15	374.	— canescens		10
318	— Gallii. Gotz			375	Pilumnus Sparganii		12
320	— aratus		18	376	— brunirostris		8
321	— Bructeri		24	377.	Porrothus Creutzeri		15
322	— silesiacus		15	378.	Liparus crassicollis		12
327	— pertusus		12	379	Dascillus setosus		
328	— Myrmeca		8	380	— piceus		
329	— polygranosus		40	381	— ovulum		

Cryptocephalus. F.

17. Böhmii. Ill. 6. Ungar
18. salicis. F. 6. Illyr
19. 4guttatus. Koy. 6. Ungar (sin. 1. Progn. 4punctulatus. Koy. =)
20. marginatus. F. 6. Illyr
21. flavoguttatus. Oliv. 6. Ungar
22. smaragdinus. Fi. 6. Östr
23. coloratus. F. 6. Östr
24. laetus. F. 4. Ungar

48. longipes. F. 4. Östr
49. 4punctata. F. 6. Illyr
50. collaris. F. 4. Östr
51. flavicollis. M. 4. Amur
52. bucephala. F. 6. Ungar
53. concolor. F. 4. do
54. 4maculata. F. 4. do

357	382.	Bascillus tessellatus			492	xema paracentesis	
	383	—— atomarius		8.	493	—— 11punctata	12
	384	—— sinuatus			494	—— 5punctata	12
	385	—— rubicornis			495	—— rugicollis	8
	387	Adrius bisignatus		10	496	—— melanopides	15
58	388.	Drosillus tigrinus		15	497	Galleruca pallida	15
	390	Brysfus albolineatus			499	—— rufa	10
59	391	—— haemiopharicus		10	500	—— haematidea	10
	394	—— setosus		12	501	—— Crataegi	
	395	—— globulus		10	502	—— calmariensis	
	399	Rhina violacea.		8	503	—— minuta	
60	400	—— carbonaria		8	504	—— Persicariae	
	401	—— Pinastri		12	505	Cathrastus trimaculatas	2
61	402	—— ruta		12	506	Lupseus xanthopus	
	403	Microrhynchus chalybeus			508	Coccinella 11maculata	15
	404	—— collaris		10	510	—— bisepteguttata	1
	405	—— cyanipennis		10	512	—— signata	1
62	406.	Anacrisjes hirtus		12	513	Hallica Ahrensii	1
	407.	Rhynchites hungaricus		15	516	Corynetes rufipes	1
	408	—— villosus		15	523	Cassida pannonica	1
63	410	Donus Budensis		20	531	Mylabris crocata	2
	411	—— tessellatus		20	534	—— Fuesslini	8
	412	—— alpinus			538	—— melanura	
	413	—— austriacus		20	539	Lampyris dalmatina	1
64	414	Mycterus umbellatarum		12	540	Rhynonacer lepturoides	1
65	423	Drapetes mollacei			545	Elater signatus	1
		Cryptocephalus coloratus		8	546	—— atomarius	2
66	425	—— 8guttatus	2 R.	16	549	—— cyaneus	
67	428	—— flavescens	2 R.	16	552	—— ovierensis	2
	431	—— alpinus.		12	555	—— depressus	2
	437	—— connexus		10	558	—— rubripes. F	8
69	441	Clythra maccoyus		15	561	—— serraticornis	1
	443	—— atrapaxidis. Koy			562	—— advena	1
	444	—— fulgida.		12	563	—— equiseti	1
69	445	—— cyanicornis		8	576	Buprestis 9maculata	2 R. 2
	446	—— axillaris		12	578	—— 8guttata	2
70	449	—— 4punctata		10	581	Dermestes ater	1
	453	—— concolor		8	582	Ptinus ornatus	1
	454	—— 4maculata		10	583	Cnemidotes elevatus	1
71	462	Chrysomela Gypsophila		20	584	—— viennensis	1
71	463	—— carnifex		12	585	Eubia palustris	2 R. 2
	464	—— marginalis		10			
71	466	—— marginata		8			
72	472	—— lurida	2 R.	20			
6	476	—— pyritosa. F		10			
6	477	—— gramica		8.			
6	478	—— Molochina		30.			
7.	484	Lina speciosa					
	485	—— punctata		10			
6	7						

67

...ereus.

64 Kojii Sahl. 2. Alb...

69 marginalis. M. 4. Ung...

70 melas. Cr. 4. Cast...

Harpalus.

...ipes. Cr. 4. Ung...

...latipes. Dej. cat. sp. 2 Fr. — 24

Trogosita

88 coerulea. Abrost... 4.

Tenebrio

89 laripes. M.* 4 Stol...

90 opacus. Duft. 4. Cast...

91 transversalis. Duft. 2 Fr...

92 curvipes. F. 2 Kraatz...

39

sida situralis. ♂ variirt auf Blume
cornuta. ♀ Kindung = C. sanguinosa ♂ u. ♀.
ta verticalis. ♂ = erythrocephala mihi
labris variabilis. ♂ = Aurora mihi
australis ♂. Die gelbe Binde vor der Mitte, verbindet sich zuweilen am Rande
und mit einem gelben Flecken welcher am Rand unterhalb der Basis die Binde
stößt. — Dieser Flecken fehlt öfters ganz.
partii. Die 2 Binden sind untereinander ganz, oder eine oder beyden manchmal ab
zwey unterbrochen.
melanura. Der gemeinschaftliche Strich an der Naht ist fast immer da, fehlt
oft, wenn auf jeder Decke ein Flecken. Nr. 1 die Mittelbinde [illegible]

Nr.		♂	♀
	Microrhynchus. M.		
403.	chalybeus. M. 6. Ungar		
404.	collaris. M. 4. Oest		10.
5.	cyanipennis. Dahl. 4. ♂♀		10
	Arachtipes. M.		
6.	hirtus. Clairville. 6. Illyr		12
	Rhynchites. H.		
7.	Hungaricus. F. 6. Ungar		15
8.	villosus. Dahl. 4. ♂♀		15
9.	purpuratus. Dahl. Kiesenw. 4		12.
	Donus. M.		
10.	Budensis. Dahl. nov. 6. Ungar		20.
11.	tessellatus. H. 4. Oest		20
12.	alpinus. Dahl. 6. Kiesenw		
13.	austriacus. M. 2. Kiesenw		20
	Nycterus. Oliv.		
14.	umbellatarum und fulvicornis. Ill. 4. Ungar		12
	Diaperis. F.		
15.	violacea. F. 2. Nord		
	Colaspis. F.		
16.	Ulema. Ill. 6. Dauval		20
	Cryptocephalus. F.		
17.	Böhmii. Ill. 6. Ungar		
18.	salicis. F. 6. Illyr		18
19.	4guttatus. Koy. 6. Ungar (ein 1te Progress? 4punctulatus. Koy. =)		13
20.	marginatus. F. 6. Illyr		
21.	flavoguttatus. Oliv. 6. Ungar		8.
22.	smaragdinus. Ziegl. 6. Oest		15
23.	coloratus. F. 6. Oest		10
24.	laetus. F. 4 Ungar		8
			15

Nr.		♂	♀
	Cryptocephalus. F.		
425	8guttatus. F. 4. Ungar		
26.	Coryli. F. 4. Oest		
27.	villosulus. M. 30.38. 6. Oest		
28.	flavescens. F. 38.39. 4 var. 10 11. Oest		
29.	bistripunctatus. Cr. 4. Oest		
30.	bisignatus. Dahl. 4. Kiesenw		
31.	alpinus. Dahl. 4. ♂♀		
32.	elongatus. Ziegl. 4. Oest		
33.	lignosus. Dahl. nov. Oest		15
34.	scriptus. Dahl. 4. Kiesenw		
35	axillaris. Dahl. 4. ♂♀		10
36.	terminatus. Creutz. 2. Illyr		15
37.	connexus. Ill. 6. Ungar		10
38.	bigeminus. Ill. 2. Sweden		10
39.	intrusus. M. nov. 6. Ungar		15
40.	histrio. F. 4. Oest		
	Clythra. F.		
41.	macropus. Ill. 6. Ungar		15.
42.	humeralis. F. 4. Oest		
43.	atrafaxidis. Koy. 4. Ungar		15
44.	fulgida. Bud. 4. ♂♀		
45.	cyaricornis. Dahl. 4. Oest		
46.	axillaris. Dahl. 4. ♂♀		
47.	brachyalis. Ziegl. 4. Stettin		12
48.	longipes. F. 4. Oest		
49.	4punctata. F. 6. Illyrien		
50.	collaris. F. 4. Oest		
51.	flavicollis. M. 4. Kiesenw		
52.	bucephala. F. 6. Ungar		
53.	concolor. F. 4. ♂♀		
54.	4maculata. F. 4. ♂♀		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

382. Dasicillus tessellatus
383. —— atomarius
384. —— sinuatus
385 —— rubicornis
387. Adrias bisignatus
388. Drosillus tigrinus
390 Brysus albolineatus
391 —— haemisphaericus
394 —— setosus
395 —— globulus
399 Rhina violacea.
400 —— carbonaria
401 —— Pinastri
402 —— rufa
403 Microrhynchus chalybeus
404 —— collaris

Timarcha. M.

455. pratensis. M. 6. Illyrien
56. gibba. M. 4. do
57. metallica. F. 4. Yorkz

Chrysomela. F.

58. coerulea. F. 4. Livon
59. haemisphaerica. A. 4. do
60. globosa. M. 2. do
61. Rossia. Ill. 6. Sibirien
62. Gypsophila Dahl. rep. 6. Ungar
63. carnifex. F. 4. Pensylv
64. marginalis. M. 4. Oest
65. chalybea. Dahl. 4. Sibirien
66. marginata. F. 4. Oest
67. Megerlei. F. 6. do
68. Adonidis. F. 4. Oest
69. dorsalis. Schnd. 4. do
70. Schach. F. 4. do
71. analis. F. 4. do
72. lurida. F. 4. Ungar
73. chalcitis Dahl 2. do
74. collaris. F. 2. Prus
75. carniolica. M. 4. Kärnth
76. pyritosa. Rossi. 4. do
77. gramica. M. 4. Oest
78. Molochina. D. 2. Ungar

Lina. M.

79. tristis. Duftsch. 6. Livon
80 phallerata. Hoffeg. 4. do
81. gloriosa. F. 4. Kärnth
82. coeruleolineata. M. 4. do

492 Lema paracentesis
493 —— 4punctata
494 —— 5punctata
495 —— rugicollis
496 —— melanopides
497 Galleruca pallida
499 —— rufa
500 —— haematidea
501 —— Crataegi
502 —— calmariensis
503 —— minuta
504 —— Persicariae
505 Cathrastus trimaculatus
506 Lupereus xanthopus
508 Coccinella 11maculata
510

Lina. M.

483. Senecionis. R. 6. Pensylv
84. speciosa. M. 4. Livon
85. punctata. M. 2. Pfurnby
86. 20punctata. F. 4. Oest
87. Cuprea. F. 2. do
88. Hanoverana. F. 4. Braunschw

Chrysomela. F.

89. lucida. Sturm. Mongol

Paropsis. M.

90. 6punctata. F. 4. Oest

Crioceris. F.

91. adusta. F. 6. Ungarn. Oest

Lema. F.

92 paracentesis. R. 6. Italien
93. 4punctata. F. 4. Ungar
94. 5punctata. F. 2. do
95. rugicollis. Ill. 4. Oest
96. melanopides. K. 2. Ungar

Galleruca. F.

97. pallida. Duftsch. 6. Ungar
98. elongata. Dahl. 2. Mongol.
99. rufa. M. 4. Oest
500 haematidea. And. 4. do
1 Crataegi. Schott. 4. Ungar
2. calmariensis. F. 4. Oest
3. minuta. Dahl. 2. Livon
4. Persicariae. Dahl. 4. Oest

Cathrastus. M.

5. trimaculatus. M. 6. Ungar

Lupereus. F.

6. xanthopus. Ill. 4. Ungar
7. Pinicola. And. 4. Pfurnby

sfida suturalis. ♂. variirt auf Blume
cruenta. ♀ Rudow = C. sanguinosa ♂. id.
ta. verticalis. ♂ = erythrocephala mihi
labris variabilis. ♂ = Sturm mihi
australis ♂. die gelbe binde vor der Mitte, verbindet sich zuweilen mit der
und mit einem gelben Flecken vorher am Rand, und der Corselet die beiden
Hfl. — Einige Flecken fehlen öfters ganz.
spartii. die 2 Binden sind zuweilen ganz, oder eine oder beyde nimmer ab
zuweil unterbrochen.
melanura. der gemeine Hfl. Fleck an der Wurz. ist fast immer da, selten
oft, nur auf jeden Deckschild ein Punct.

Coccinella. F.

508. 11maculata. F. 4. Pflzjn — 15
9. 9punctata. Oliv. 4. Ungarn — 12
10. biseptemguttata. F. 4. Pflzjn — 15
11. aurita. M. 4. Oester — 8
12. signata. Dahl. 4. Norwegen — 10

Haltica. F.

13. Ahrensii. Germ. 4. Oester — 12

Clerus. F.

14. 4maculatus. F. 4. Forst — 24
15. unifasciatus. F. 2. Comm.

Corynetes. F.

16. rufipes. F. 4. Pflzjn — 10

Pyrochroa. F.

17. rubens. F. 4. Oester — 10

Cassida. F.

18. austriaca. F. 4. Oester — 12
19. lineola. Cr. 4. Gallizien — 12
20. suturalis. Zig. 4. Oester — 12
21 azurea. F. 4. Ungarn — 15
22 cruenta. M. 4. do — 12
23. Pannonica. Dahl. 4. do — 15
24. atra. F. 4. Oester — 15
25. silesiaca. M. 4. do — 8

Helops. F.

26. caeruleus. F. 2. Comm. — 1

Gibbium

27. dentipes. F. 2. do — 1

Psoa. F.

28. viennensis. F. 6. Comm. — 30

Lytta. F.

29. verticalis. Hl. 4. Oester — 15
30. syriaca. F. 4. do — 15

Mylabris. F.

531. 8maculata. F. 4. Ungarn — 20
32. crocata. Pall. 4. do — 24
33. variabilis. M. 4. Comm. — 20
34. Fuesslini. F. 4. Oester — 8
35. australis. Koy. 4. Ungarn — 15
36. Spartii. Germ. variabilis. Oliv. 4. Pflzjn — 20
37. lacera. M. 4. Königsb. — 30
38. melanura. F. 4. Sicilien

Lampyris. F.

39. Dalmatina. M. 4. Steyrm. — 15

Rhynomacer.

40. Lepturoides. F. 4. Oester — 12

Opatrum. F.

(Assida. Meg.)

41. pictum. 4. Ungarn — 12

Parnus. F.

42. viennensis. Dahl. 4. Oester — 15
43. obscurus. M. 4. Ungarn — 8

Elater.

44. rufus. F. 4. Oberösterr. — 1
45. signatus. Pz. 2. Preussen — 20
46. atomarius. F. 2. Italien — 24
47. fasciatus. F. 2. Oester — 15
48. varius. F. 2. Oester — 15
49. cyaneus. M. 4. Oest. — 15
Borealis. Pk. 3
50. pyrrhopterus. F. denticollis. Hellw. 4. Livland — 30
51. livens. F. et linearis. 2. Oester — 15
52. ovierensis. Dahl. 2. Livland — 20
53. scutellum. Kn. 2. Frankf. — 10
54. filiformis. F. 4. Ungarn — 12
55. depressus. F. 2. do — 24

357	382.	Dascillus tessellatus			492	aema paracentesis	
	383	—— atomarius		8.	493	—— 4punctata	12
	384	—— sinuatus			494	—— 8punctata	12
	385	—— ruficornis			495	—— rugicollis	8
	387.	Adrias bisignatus	15		496	—— melanopides	15
58	388	Drosillus tigrinus	15		497	Galleruca pallida	15
	390	Brysfus albolineatus			499	—— rufa	10
59	391	—— haemisphaericus	10		500	—— haematidea	10
	394	—— setosus	12		501	—— Crataegi	
	395	—— globulus	10		502	—— calmariensis	
	399	Rhina violacea	8		503	—— minuta	
60	400	—— carbonaria	8		504	—— Persicariae	
	401	—— Pinastri	12		523	Cathrastus trimaculatus	2
61	402	—— rufa	12		506	Lupeonus xanthopus	
	403	Nicorhynchus chalybeus			508	Coccinella 11maculata	1
					510		

Elater. F.

6	556.	impressus. F. 2. Dürrnst	15
6	57.	cupreus. F. 2. ~~Dürrnst~~ Oester	12
	58.	rubripes. D. 4. Ungarn ~~Oester~~	8
	59.	griseus. Zig. 4. ~~Ungarn~~	15
6	60.	latus. F. 4. Oester	12
6	61.	serraticornis. Zig. 4. do	12
6	62.	advena. F. 4. do	15
6	63.	equiseti. F. 4. do	12

Carabus.

6	64.	sirens. St. im Frassparch. 4	4 —
6	65.	sirens. ♂. ist schön var.	4. —
7	66.	Scheidleri oder jährig varians. Zig. var. ♂	—

Lucanus.

7	67.	tenebrioides. ♂. Dürrn	20

Silpha. F.

7	68.	lunata. F. 4. Oester	20

Cossiphus

7	69.	Hoffmannseggii. M. 2. Portugal	

Thymalus

6	70.	limbatus. F. 2. Dürrnst	12

Buprestis.

6	71	austriaca. H. v. marginata. 4. Dürrn	30
7	72.	Alni. M. 2. Illyrien	15
	73.	punctata. F. 4. Oester	12
7	74.	acuminata. F. 2. Dürrnst	1 —
7	75	lugubris. F. 2. Oester	12
	76.	9maculata. F. 4. Oester	10

Buprestis.

7	577	tarda. F. 2. Oester	20
	78.	8guttata. F. 2. Dürrnst	12
	79.	Rubi. F. 4. Ungarn	10
	80.	antiqua. Helw. 2. Oester	15

Dermestes.

	81.	ater. Oliv. 2. Oester	15

Ptinus

	82.	ornatus. Duftsch. 4. Ungarn	10

Cnemidotus. Kn.

	83.	elevatus. F. 4. Yorck	24
	84.	vienensis. Dahl. 4. Oester	12

Eubia. Zigl.

	85.	palustris. D. 4. Oester	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniß [illegible] Herrn Doctor Boger
[illegible] Herrn Hofrath Hebenstreit medic. Facultät
[illegible] Herrn Dr. Friedrich Wilh.
[illegible] Herrn Dr. Joh. Friedrich
[illegible] Herrn Dr. Joh.

Dr. Boger
Aufbewahrer

Frankfurt den 18ten Januar 1821.

357	382.		
	383.		
	384.		
	385		
	387.		
58	388.		
	390		
59	391		
	394		
	395		
	399		
60	400		
	401		
61	402		
	403		
6			
	556.		
6	57.		
	58.		
	59.		
6	60.		
6	61.		
6	62.		
6	63.		
6			
	64.		
6	65.		
7	66.		
7			
7	67.		
7			
	68.		
	69.		
6	7		
67	70.	limbatus. F. 2. Oesterr.	12
		Buprestis.	
68	71	austriaca. H. v. marginata. L.	30
69		Oesterr.	
70	72.	Alni. M. 2. Illyr.	15
	73.	punctata. F. 4. Oester.	12
71	74.	acuminata. F. 2. Oesterr.	1
72	75.	lugubris. F. 2. Oester.	12
	76.	gmaculata. F. 4. Oester.	10

Folgende Käfer habe ich von dem Bezirke des Schlosses Trautenegg erhalten. 1821.

41

№		℔	kr
23	Aphodius sericatus		20
26	——— rubens		15
28	——— constans		15
32	——— putridus		15
39	——— dubius		12
40	——— gibbus		20
41	——— serotinus		20
52	Hister terricola		20
53	Melolontha orientalis	1	
56	——— transversa		24.
59	——— pilicollis		24.

№		℔	kr
	Transp.	28	5
173	Leirus contractulus		15
174.	——— ingenuus		12
181	Gibbium lentipes	1	
184	Helops coeruleus	1	
186	——— strigicus		30
189	Tenebrio lonipes		24.
190	——— opacus		30
191	——— transversalis		24.
192	——— curvipes		30.
195	Pol.		15

Folgende Käfer die ich schon früher hatte, habe ich mit den beschriebenen verglichen und nicht verschieden gefunden. 40
und andere Bemerkungen.

Aborhynchus goerzensis. = Dahl

——— flabellipes. D. = plumipes. Germ. S. M.

——— hungaricus. ich habe ein ♂ und ♀ Pärchen breiter und die Punktstreifen der Decken sind kaum fühlbar.

——— sulphuripes. = Dahl.

——— longicollis die Füsse der Stengelhafte sind ganz wie Clown hyzinus Fabricius.

——— planus. = Dahl

te und der deplanus haben ein abgerundet auf der Oberfläche besonders in der Nähe eine grüne Einfassung.

——— niger. Aristus = Dahl. ater. H.

——— gemmatus. nicki = Dahl.

——— hirtipes. Dahl = cribrosus. Germ.

——— brevicollis. Dahl. kann von geniculatus. Germ. verschieden sein. Dahl schreibt: Augen klein, Stirne breit, Halsschild kaum länger als breit, Flügeldecken kaum gestreift (v. länger?)

——— mastix u. geniculatus haben oft rothe, oft vollkommen braune

——— plumipes Dahl zu gehören scheint mir vom flabellipes durch die vollkommen braune Farbe und besser unterschieden

——— picipes. Dahl scheint mir nur eine Varietät von picipes zu sein. Die Punkte sind ocellatus. D. = maximus. Mannerh. punctatus. F. ganz gleich und gross.

Laborhynchus laevigatus. D. ist mein C. cornicinus. besonders gemein in den Pyrenäen. Hungarn oder A?

——— septentrionalis. Dahl = dem auricinus

Pitonus subtilis Dahl = meinem C. catenulatus. Parz. -

Oplis obliqua = Dahl.

Oplis cinerea. Dahl = L. antiquus. mihi.

Ochrus paraplecticus = Dahl.

(Um schliesse dieser Gattung und unter paraplecticus und ist auch als solcher im Kreis von mir bestellt worden, ist ein viel kleiner = appendiculatus.

Lixus glabratus. Dahl = L. dirus. H.

——— fuscomaculatus. = Dahl.

Meleus Creutzeri. D. das Fallbeinen der Decken fast zusammen so sind gerne über, dass die gerne Linie kaum noch vorhanden ist

Meleus Megerli von Sturm = Dahl. (Das Exemplar ist von Dahl, gelbhaarig.)

Piniphilus Pinastri. Dahl = P. pini. F. P. mihi.

Platyrinchus cavirostris Dahl = ~~picicornis~~ Fabricius

Baselius squameus Dahl = C. fritillum. mihi

——— aurulentus. Dahl = C. Iris. mihi. D.

Pilumnus Sparganii. D. zuweilen ist ganz einfarbig grün

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anmerkungen zu Herrn Dahl's Systematik

Asellus picus. Dahl = C. chrysostictus n. g. Kirsten.
—— tessellatus. D. = ? C. Iris nihi var. viridi.
—— ruficornis. D. der grünen Abänderung fällt öfters ins grünliche wie oder weniger.
—— lateralis. D. = mein C. micans die grünliche Varietät.
Adonis signatus. ist sehr dem C. 4 pustulatus ähnlich nur ist das Halsschild einfarbig und nicht allenthalben klein punktirt (wie bei Dahl)
Brystus rotundatus. Dahl = C. pustinoides. nihi.
—— sanguinosus Dahl = C. squamulatus. nihi.
Emblemus repandus der 1te Punkt ist von dem Emb. Tamarisci der 2te Punkt. sind zu unterscheiden.
Emb. repandus. F. var. ist nur dadurch unterschieden, dass die Goldfarbe der Decken weiter hinten abgerieben, und daher die schwarze Grundfarbe als gabelige Binde vortritt.
Rhynchites purpuratus. Dahl = R. cupreus. nihi.
Cryptocephalus Böhmii. D. die 2 gelben Punkte auf dem Halsschild fehlen öfters.
—— coloratus. Dahl. alles grünlich Goldfarbene ist der Dahl'sche Pinsel nicht.
—— 4 gittatus. Koy D. = 4 pustulatus. Koy. D.
—— marginatus. Dahl = nihi.
—— flavoguttatus. die beiden gelben Flecken sind nur junge grünliche noch Reife-rand zu setzen.
—— smaragdinus Dahl grün, Brust blau.
—— coryli. Dahl = nihi.
—— lignosus. D. die Schenkel sind an der Basis gelb, sind grünlich-schwarz.
—— axillaris. D. der gelbe Längsstreif am Halsschild ist gewöhnlich feiner, der Mittelstreif unterbrochen, öfters ganz, öfters breiter, mit einem Schwarzen Längsstreifen versehen.
Clythra longipes. D. = nihi.
—— bucephala. D. = nihi.
—— 4maculata. D. = C. rubicunda. nihi.

Timarcha gibba. D. = T. nihi.
—— metallica. D. = nihi.
Chrysomela coerulea. D. = nihi.
—— Rossia. auf rund gelbem Kopf.
—— carnifex. D. = nihi.
unter Dahls Exemplaren waren auch solche, die oben ganz schwarz sind, und ist dasselbe mit nasuta.
—— Regerbei D. die Füsse sind ganz schwarz, so wie der Kopf, das Thorax fast ganz einfarbig kupfrig roth und glänzt.
—— Schach. Dahl = nihi.
—— analis. Dahl = C. marginata. nihi.
—— carniolica. D. auf Dahlsyrum.
Lina gloriosa. variirt. der Hinterrand des Halsschilds blau; — alles grün ohne Goldglanz; — der Mittelstreif grün blau, mit Schwarz in der Mitte. Der Aussenrand fein blau.
—— senecionis D. = alpicola Richter.
Paropsis 4punctata. D. = Dahlsch. v. Nihi.
Gallerica Crataegi. D. ein neuer abwechselnd gefärbter Halsschild der Thorax ist schwarz, mit der Seitenrand ist roth.
Lyperus pinicola D. = nihi. Halsschild und Flügeldecken
Coccinella 9punctata = 7maculata. nihi. die Mittelflecken sind gelb, der Halsschild schwarz. Rand des Thorax ganz rund mit 9 Flecken ganz gelb, einmal kaum sichtbar eingedrückt, die Decken sind einmal kaum sichtbar eingedrückt, mit einander eine unregelmässige Querlinie ob Verbindung.
—— aurita. D. = nihi.
—— signata. D. ? unterscheidet sich die ganze Mittelbinde ist fast gerade, und ungefähr die Hälfte breit, der Zahnfortsatz ist nicht gross, und nicht in die Länge gezogen.
Clerus unifasciatus von Dahl so gross als einem Clerus 4maculatus, fast ganz blau.
—— 4maculatus. D. = nihi.
Cassida austriaca. Dahl. Der 3te Punkt fehlt ganz und der 2te verschwindet fast ganz, so dass nur 4 Punkte übrig bleiben, wie bei Cassida stigmatica, wie die Farbung

Folgende Käfer habe ich von dem hiesigen daselbst Trudinger erhalten. 1821.

41

№		℔	Xr
23	Aphodius sericatus		20
26	— rubens		15
28	— constans		15
32	— putridus		15
39	— dubius		12
40	— gibbus		20
41	— serotinus		20
52	Hister terricola		20
53	Melolontha orientalis	1	
56	— transversa		24.
59	— pilicollis		24.
60.	— tropica		18.
62.	Anomalopl. auricollis	1	
68.	Anisoplia fruticola. ♂		16.
79	Byrrhus nigerrimus		30.
84	Cicindel. soluta		30.
92	Bembid. foraminosum		8.
100	Lebia turcica		24.
101.	Cymindis miliaris		20
102.	— hemagrica		10
104.	— axillaris		12
112.	Carabus virens ♂	4	
113.	— coeruleus	2	
114	— excellens	2	
115	— Preisleri		45.
116	— varians	1	30.
121	— Goldeggii	2	
123	— Besseri	2	
137	Alpaeus ferrugineus		24.
140	Nebria Gyllenhalii		30
146	Tachus Stormii		15
147	Agonum nigricorne		15
148	Argoleus chalybaeipennis		30
151	Platylophus 4sulcatus	1	30
155	Pterolophus flavicornis		30
164	Pterostichus Ziegleri		30
165	— Mühlfeldii		30
167	Abax inunctus		10
168	Percus Koyii		18
169	— marginalis		15
171	Harpalus hospes		20
		28	5
	rev.		

№		℔	Xr
	Transp.	28	5
173	Leirus contractulus		15
174.	— ingenuus		12
181	Gibbium dentipes	1	
184	Helops coeruleus	1	
186	— striatus		30
189	Tenebrio laripes		24.
190	— opacus		30
191	— transversalis		24.
192	— curvipes		30.
195	Pedinus laevigatus		15
196	— latus		15
197	Tentyria orbiculata		20
200	Blaps pannonica		24
203	— acuminata		20
206	Lamia tristis	2	40
207	Cerambyx alpinus		20
222	Saperda argus		45
226	— albosenteliata		40
230	— ferrea		30
237	Clytus semipunctatus		40
256	Pachyta virginea		10
3.	Scarabaeus laevigatus		45
14.	Ateuchus impius	1	
25.	Aphodius signatus		20
34.	— rufus		15
43.	— moravicus		15
57.	Melolontha aprilina		12
64	Anomaloplia nigritta		24.
126	Carabus aeneipennis	1	30
159	Pterostichus Wellensii		20
160	— Minckwitzii		40
172	Harpalus latipes		24
177	Calathus rufus		15
182	Acidia spinosa	1	
199	Moluris spinipes		30
234	Saperda gracilis		24.
		46	23
	rev.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		℔	ß	№		℔	ß
	Transport	46	23		Transport	58	7
274	Loborhynchus friaulicus		12	330	Titonus agnatus		20
275	carynthiacus		20	332	orbicularis		12
276	Stiriensis		20	333	Chrysocomus		40
279	caudatus		24	335	Ophis excorticata		15
280	hungaricus		24	336	declivis		20
281	longicollis		30	337	lugens		15
283	deplanus		20	338	costata		8
284	unicolor		10	340	alternans		8
285	perlatus		20	341	Achrus appendiculatus		20
286	haematopus		20	342	paraplecticus		12
287.	rugulosus		15	343	~~Lixus angustatus~~		
289.	coccus		20	344	Lixus tigrinus		12
290	pulverulentus		15	345	elongatus		20
291	armadillo		10	346	Rhynobatus Cynarae		18
292	gazella		20	348	Liparus flavomaculatus		20
294	chlorophanus		15	350	Crygmus variolosus		12
296.	auricapillus		18	352	Meleus Creutzeri		30
297.	brevicollis		18	353	Illigeri		40
298.	atomarius		12	354	attenuatus		36
299	mastix	2 ℔.	16	355	Festus chrysops		24
300	geniculatus		12	356	austriacus		15
301	fasciularis		20	357	Solenus porcatus		30
303	adspersus		15	358	Pinisphilis piceae. Ill		10
304	Garzensis Tripxa		20	360	Elegmus obliquus		12
306	nobilis		48	362	Merionus hungaricus		15
308	Fraxini		15	363	Panaphilis perdix		12
310	zebra		12	366	Platyrhynchus pollinosus		10
311	squamiger		12	367	fallax		24
312	exasperatus		24	369	Brius elevatus		10
313	duinensis		15	371	Dascillus squameus		6
315	picipes		8	374	canescens		10
316	subrotundus		12	375	Alumnus spargani		12
317	Fagi		15	376	brunirostris		8
320	aratus		18	377	Porrothus Creutzeri		15
321	Bructeri		24	378	Liparus crasicollis		12
322	silesiacus		15	382	Dascillus atomarius		8
327	pertusus		12	385	Erosillus tigrinus		15
328	Myrmex		8	391	Bryssus hemisphaericus		10
329	polygranosus		40	394	setosus		12
				395	globulus		10
		58	47			68	45

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		℔	ß
	Transport	68	45
399	Rhina violacea	8	
400	—— carbonaria	8	
401	—— Pinastri	12	
402	—— rufa	12	
404	Microrhynchus collaris	10	
405	—— cyanipennis	10	
406	Arachnipses hirtus	12	
407	Rhynchites hungaricus	15	
408	—— villosus	15	
410	Bonus budensis	20	
411	—— tesselatus	20	
413	—— austriacus	20	
414	Mycterus umbellatarum	12	
423	Cryptocephalus coloratus	8	
425	—— 8guttatus ♂♀	16	
428	—— flavescens ♂♀	16	
431	—— alpinus	12	
437	—— conaeatus	10	
441	Clythra macropus	15	
444	—— fulgida	12	
445	—— cyanicornis	8	
446	—— axillaris	12	
449	—— 4punctata	10	
453	—— concolor	8	
454	—— 4maculata	10	
462	Chrysomela Gypsophila	20	
463	—— carnifex	12	
464	—— marginalis	10	
466	—— marginata	8	
472	—— lurida ♂♀	20	
476	—— pyritosa	10	
477	—— gramica	8	
478	—— Molochina	30	
485	Lina punctata	10	
493	Lina 14 punctata	12	
494	—— 5punctata	12	
495	—— rugicollis	8	
496	—— melanopides	15	
497	Galleruca pallida	15	
499	—— rufa	10	
500	—— haematidea	10	
505	Cathrastes trimaculatus	20	
		77	46

№		℔	ß
	Transport	77	46
508	Coccinella 11maculata	15	
510	—— biseptemguttata	15	
512	—— signata	12	
513	Hattica Ahrensii	12	
516	Corynetes rufipes	10	20
523	Cassida panonica	15	20
532	Mylabris crocata	24	30
534	—— Fuesslini	8	
538	~~melanura~~		20
539	Lampyris dalmatina	15	0
540	Rhynomacer bipturoides	12	0
545	Elater signatus	20	0
546	—— stomarius	24	5
552	—— ovirensis	20	0
555	—— depressus	24	8
558	—— rubripes	8	4
561	—— serraticornis	12	0
562	—— advena	15	
563	—— Equiseti	12	8
576	Buprestis 9maculata ♂♀	20	8
578	—— 8guttata	12	0
581	Dermestes ater	15	5
582	Ptinus ornatus	10	4
583	Cnemidotus elevatus	24	4
584	—— vienensis	12	4
585	Eubia palustris ♂♀	20	4
305	Loborhynchus lavarsus	20	0
307	—— centropunctatus	15	0
309	—— auricomus	20	0
318	—— Gallii	20	0
343	Lixus angustatus	18	0
347	Liparus glabratus	20	0
364	Platyrhynchus flavoviridis	15	0
373	Dascillus annulatus	10	4
379	—— setosus	12	4
381	—— ovulum	8	4
382	—— tesselatus	15	0
384	—— sinuatus	12	5
385	—— ruficornis	8	0
390	Bryssus albolineatus	10	0
403	Microrhynchus chalybeus	15	0
412	Bonus alpinus	20	0
415	Diaperis violacea	30	0
		88	40
	rest.	4.	
		20.	
		36	

Claviger testaceus — 36 — alpa — 6
Cathaerites pygmaeus — 12 — nigra — 4
Cryptoph. hirtus. — 6 — Spondyl. buprest. — 8
— nigripennis — 8 — Apate capucin — 12
— bicoloratus — 4 — Attelab. curculion — 4
Dorcat. dresdense — 12 — Rhynchit. Bacchus — 10
— rubens — 18 — Apion nigritarse — 6
Nitidula 4punctata — 10 — — fuscirostre — 4
— reticulata — 6 — Genistae — 12
Nitidula 10guttata — 6 — Ononid — 8
— strigata — 6 — Astragali — 12
— imperialis — 6 — Malvae — 12
— lutea — 12 — Orchest. Alni — 12
— 6punctulata — 6
— sulcata — 6

№		Transport	fl	xr
			88	40
35	443	Clythra atraphaxidis. Koy		24
	484	Lina speciosa		15
	492	Lema paracentesis		20
	501	Gallerica Crataegi		8
58	502	——— calmariensis		8
59	503	——— minuta		10
	504	——— Persicariae		8
	506	Luperus xanthopus		15
	538	Mylabris melanura		30
	549	Elater cyaneus		24
60				
61		Item		
		Mylabris Fuesslinii — — 1 M.		8
		Lina 20 punctata — — —		6
6		Chrysomela Adonidis — 2 M.		16
		——— dorsalis — —		8
5		Buprestis punctata — 2 M.		24
		——— Rubi — — 2 M.		20
6		Gallerica pallida. Suft — —		15
		macht	92	59 im 20 fl Fuß
6		oder	111	35 im 24 fl Fuß
6		hievon ab	22	1 gold 20 % Rabatt.
6		so bleiben	89	16
6		steuer ab	30	32 für übersendete Käfer 113 Stück
		so bleiben	58	44 an diese zu schicken.
6				
6				
6				
7				
7				
7				
7				
6				
6				
7				
6				
7				
6				
7				
64				
69				
70				
71				
72				

77 f
7 f 55
Einlage Stuttgart circa 6 f
90 f 55
ab 60 f 32
Vorschuß 60 f 23
1 37

— hyacinus. Z. Die schwarzen Flecken
des Rückens sind grün eingefaßt ganz wie
Coffen.
— axillaris. Z. der gelbe Fleck hinter
der Schulter ist zweifelhaft. Fühler
der Mitte unterbrochen; Flügeldecken
ohne ganz deutlichen Streifen, mit einem
schwarzen Längsstreifen vor dem
Ende.
Clythra longipes. Z. = zitki.
— bicephala. Z. = mihi.
— 4maculata. Z. = C. rubicunda. mihi

— 4maculatus mihi. Fühler
Kniglocken ganz rein und mit 9 Flecken
mein einzeln Kniegl. die Farben
meinen zum mehr einzelnen Flecken
ob Verbindung.
— aurita. Z. = mihi.
— signata. Z. [illegible] Fleck ganz klein und
[illegible] Fleck [illegible] Flügeldecken
der Schulterfleck ist zu weilen groß
in die Länge gezogen
Clerus unifasciatus von Bahl so groß als einem
Clerus 4maculatus. fast
— 4maculatus. Z. = mihi. ganz klein
Cassida austriaca. Der Kniegl. Der 2te Fleck
[illegible] ganz und der 2te vorderste fl
[illegible]

(48)

Dazel Sendung in Winter 1821 auf 1822.
(Was vor diesen [illegible] 1821 in Mazedonien)

№	Namen	Stück	Vaterland	pr. Stück fl	kr	№	Namen	Stück	Vaterland	pr. Stück fl	kr
1.	Carabus Escheri. Z.	36	34	Provinz	3	—	38	Pachygaster chrysocomus	6	Lemnos Gebürg	—	20
2.	—— Kollari . . .	36	37	Wallachey	3	—	39	—— cuprifer	6	dto	—	20
3.	—— fastuosus . . .	26	27	Lemnos	3	—	40	—— Banaticus	6	dto	—	20
4.	—— graniger . .	26	28	dto	2	—	41	—— chrysonus	6	dto Gebürg	—	30
5.	—— Zoppii	36	27	dto	1	30	42	—— Gazella	4	dto dto	—	20
6.	—— Fabricii var.	26	28	Tymphrestus	1	—	43	—— alpestris	4	dto	—	20
7.	Cychrus semigranosus	36	37	Lemnos	2	—	44	Lixus gracilis	6	dto Elyas	—	20
8.	—— [illegible]						45	Hypera M. L.		dto	—	30
9.	Carabus [illegible]									dto Elyas	—	45
											—	30
											—	18
											—	24
											—	30
											—	18
											—	18
											—	20
											—	45
											—	24
											—	24
											—	24
											—	20
											—	20
											—	20
											—	30
											—	30
											—	15
											—	24
											—	24
											—	24
											—	24
											—	20
											—	18
											—	20
											—	15
											—	18
											—	12
											—	15
											—	15
											—	8
											—	18
											—	18
											—	10
											—	20
											—	15
											—	15
											—	15
											—	10
											—	8
											—	15
											—	8
											—	15
											—	15

(42)

	fl	kr
Coprin affinis Hg	—	24
Aphodius pictus	—	12
—— astilatus Hg.	—	24
—— testudinarius	—	10
—— conspurcatus	—	8
—— sus	—	12
—— nitidulus	—	8
—— porcus	—	12
—— 4punct.	—	6
—— asper	—	6
Hister caesus	—	6
—— depressus	—	10
—— flavicornis	—	6
Sphaerid. haemorrhoid.	—	4
Nosodend. fasciculare	—	12
Boletophagus agaricola	—	6
Scaritus thoracicus	—	12
—— arenarius	—	8
—— gibbus	—	4
Procrustes coriaceus	—	24
Carabus morbillosus	—	24
—— planatus	—	24
—— hortensis	—	20
Leistus rufescens	—	12
Patrobus metallicus	—	10
Platysma nigrum	—	12
—— rufipes	—	8
Chlaenius nigricornis	—	12
—— vestitus	—	12
Agonum austriae	—	12
Feroloplus Zigleri	—	15
Olenus areolatus	—	12
Bemb. modestum	—	12
—— flavipes	—	8
Dromius punctatillus	—	6
—— atricapillus	—	8
Odacantha melanura	—	24
Cicind germanica	—	10
Elaphrus nubilus	—	6
Trichodes alvearius	—	12
Clavigr testaceus	—	36
Cathaniste pygmaeus	—	12
Cryptoph. hirtus	—	6
—— nigripennis	—	8
—— bicolor nitid	—	4
Dorcat. dresdense	—	12
—— rubens	—	18
Silpha 4punctata	—	10
—— reticulata	—	6
Nitidula 10guttata	—	6
—— Strigata	—	6
—— imperialis	—	6
—— lutea	—	12
—— 6punctulata	—	6
—— sulcata	—	6
Coccin. 5punct.	—	10
—— 11maculata	—	18
—— 19punct.	—	6
—— 16gutt.	—	6
—— aurita	—	10
Lymnus pallens. Hb.	—	12
Eumolpus obscurus	—	6
—— arenar.	—	10
Chrys. cuprea	—	12
Strongyl. nector	—	4
—— litigiatus	—	4
Helodes Hellanderi	—	4
—— violacea	—	10
Lupenus saturella	—	12
Haltica rufipes	—	4
—— Dulcamarae	—	6
—— chrysocephala	—	6
—— coerulea	—	4
—— pubescens	—	8
—— Lepidii	—	6
—— antennata Hg.	—	18
—— Agchusae	—	8
Brassican. Ol.	—	6
Cyphon lividus	—	6
—— melanurus	—	12
Trichius strigicoll.	—	12
Melol. Hippocast. Hg.	—	12
—— villosa	—	24
Buprest. cinctella	—	18
—— nitidula	—	12
Lamia rufipes	—	18
Clytus plebejus	—	10
Leptura melanura Hg.	—	12
—— bifasciata Hg.	—	12
—— atra	—	6
—— nigra	—	4
Spondyl. buprest.	—	8
Apate capucin	—	12
Attelab. curculion	—	4
Rhynchit. Bacchus	—	10
Apion nigritarse	—	6
—— fuscirostre	—	4
—— Genistae	—	12
—— Ononis	—	8
—— Astragali	—	12
—— Malvae	—	12
Orchest. Alni	—	12
Cionus Verbasci	—	6
—— Blattariae	—	10
—— olens	—	12
Lixus paraplecticus	—	12
—— antiodontalgicus	—	12
Curculio ebion	—	10
—— 3guttatus	—	6
—— pallidatus	—	12
—— gressorius	—	10
—— Ligustici	—	10
Rhynchaenus Echii	—	10
—— cruciger. Hb.	—	12
—— Geranii	—	10
—— Lemnae	—	10
Engis rufifrons	—	10
Scaphidium agaricinum	—	6
Hallomenus micans	—	20
Stratiomys pulchella. M.	—	12
—— viridula	—	10
—— tigrina	—	10
—— strigata	—	12
Nemotelus pantherinus M.	—	8
Pachygaster ater	—	12
Beris vallata. Meig	—	10
	15	36

	№		Transport	℔	ß
				88	40
35	443	Clythra atraphaxidis. Koy			24
	484	Lina speciosa			15
	492	Lema paracentesis			20
	501	Gallerica Crataegi			8
58	502	——— calmariensis			8
	503	——— minuta			10
59	504	——— Persicariae			8
	506	Luperus xanthopus			15
	538	Mylabris melanura			30
	549	Elater cyaneus			24
60					
61					

Nylabris [illegible]
Lina 20 pr
Chrysome
Buprestis
Gallerica

Nach Sperrern Pfd 3 à 72 ß = ℔.

		℔	ß
Nüdr			
4	Aph. tristis. Dutzd 12 ß, Nürn ?	1	36
4	Aph. tristis. Dutzd 12 ß	1	36
8	" pictus. Dutzd 12 ß		40
2	" abbreviatus 20 ß		12
2	Hister caesus. Dutzd 12 ß		16
2	" minutus. 8 ß		30
2	Byrrhus arenarius 15 ß		48
4	Nosodendron fasciculare. Nürn 12 ß	2	40
8	Carabus auratus. Nürn 20 ß	1	40
5	" catenulatus Nürn 20 ß		20
2+2	Enhydrus hyemalis. 10 ß		24
2	Sylvanus unidentatus. 12 ß		16
2	" inermis. 8 ß		16
2	Dorcatoma Bovistae Dutzd 8/12 ß	2	—
8	" rubens. 15 ß	2	—
8	" dresdensis. 15 ß		30
2	Mordella 4notata 15 ß		24
2	Limnius obscurus. 12 ß		12
6	Nitidula 10guttata. Dutzd 12 ß	1	—
2	Chrysomela alnicola Dutzd 30 ß	1	36
8	Gallerica nigricornis 12 ß	1	30
2	Buprestis cincta 45 ß	1	40
4	Callianistes pygmaeus Nürn 10 ß		—
4	Scaphidium immac. Dutzd 30/36 ß	4	18
2	Clavigor foveolatus 24 ß		18
6	Haltica 4ternata 3 18 ß	1	18
6	" " ♀ 18 ß	1	18

115 Pfd

30/32

Dutzd 3 Pfd Dutzd rechnet.

Clythra [illegible]
[illegible] bu
[illegible] hum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(18)

Dafel Sammlung im Winter 1821 auf 1822.
([illegible] vor diesen [illegible] 1821 in Mansfeld)

№	Namen	Preis	Vaterland	pr. Mk ß	₰	№	Namen	Preis	Vaterland	pr. Mk ß	₰
1.	Carabus Escheri. D.	36.38	Persien	3	—	38	Pachygaster chrysocomus	6	Banat Gyurg	—	20
2.	—— Hollari . .	36.38	Wallachey	3	—	39	—— cuprifer	6	♂♀	—	20
3.	—— fastuosus . . .	28.28	Banat	3	—	40	—— Bannaticus	6	♂♀	—	20
4.	—— graniger . .	28.28	♂♀	2	—	41	—— chrysonus	6	♂♀ Gyurg	—	30
5.	—— Zippii	36.28	♂♀	1	30	42	—— Gazella	4	♂♀ ♂♀	—	20
6.	—— Fabricii var.	28.28	Gyurg	1	—	43	—— alpestris	4	♂♀	—	20
7.	Cychrus semigranosus	36.38	Banat	2	—	44	Lixus gracilis	6	♂♀ Alyan	—	20
8.	—— angustatus. Hopp.	16.18	♂♀	1	—	45	Hypera Mehadiensis	36.38	♂♀	—	30
9.	Abax Schüppelii	36.28	Persien	2	—	46	—— elegans	36.38	♂♀ Alyan	—	45
10.	—— latus . . .	36.38	Banat	—	45	47	—— palustris	4	♂♀	—	30
11	Nomaius Cophosioides	36.38	♂♀	1	—	48	Ophis tigrina	6	♂♀	—	18
12	—— italicus. Bon	36.38	♂♀	—	45	49	Meleus bannaticus	2	♂♀	—	24
13	Molops robustus	28	♂♀ Alyan	1	—	50	Gastrodus Chamomillae	4	♂♀ Alyan	—	30
14	—— alpestris	20.28	♂♀ ♂♀	—	30	51	Rhynchites versicolor	6	♂♀	—	18
15	—— gracilis	16.18	♂♀	—	24	52	Lepyrus biguttatus	6	♂♀ Gyurg	—	18
16	Harpalus rusticus	2	♂♀	—	20	53	Gibbium dentipes	4	♂♀	—	20
17.	—— erythrostomus	28	♂♀	—	20	54	Omaloplia nigra	6	♂♀	—	45
18.	Ophonus Harpalinus	36.38	♂♀	—	15	55	—— erythroptera	6	♂♀	—	24
19.	Sphodrus punctatus	1	♂♀ Alya	1	—	56	—— sericea	4	♂♀	—	24
20	Agonum discopunctatum	36.38	♂♀	—	20	57	Anisoplia dispar	28.28	♂♀ Gyurg	—	24
21	Zorcadion Murrayi. Kol.	36.38	Banat	1	—	58	Hoplia praticola. Duft.	4	♂♀	—	20
22	Clytus semipunctatus. F.	4	♂♀ et Ungar	—	45	59	—— obscura. var.	2	♂♀	—	20
23	—— Temesiensis. M.	6	Banat	—	30	60	Tymasche globata	36.38	♂♀	—	20
24	Callidium castaneum M.	6	♂♀	—	24	61	—— orbiculata	2	♂♀	—	30
25	—— crassipes. M.	6	♂♀	—	20	62	Chrysomela alpina	6	♂♀ Alyan	—	30
26	—— unifasciatum. F.	2	♂♀ et Ungar	—	30	63	—— ahaenea	4	♂♀ ♂♀	—	30
27	—— axillare	2	Banat	—	36	64	—— globata	4	♂♀ Gyurg	—	24
28	—— alni. F.	4	♂♀	—	20	65	—— ericeti	4	♂♀ ♂♀	—	24
29	Saperda Quercus	4	♂♀ Gyurg	1	—	66	—— saphyrea	4	♂♀ ♂♀	—	24
30	—— Argus. F.	2	Ungar	—	45	67	—— oliwacea	4	♂♀ ♂♀	—	20
31	—— Flavimana.	4	Banat	—	30	68	—— pulchra	4	♂♀ ♂♀	—	15
32	Leptura binotata	36.38	♂♀	1	—	69	—— chalybeipennis	4	♂♀ ♂♀	—	20
33	Chlorima elegans	6	♂♀	1	—	70	Lina lucluosa. Oliv.	4	♂♀	—	30
34.	Pachygaster dives	6	♂♀ Alyan	—	30	71	Clythra crocata. Fi.	4	♂♀ Gyurg	—	30
35.	—— var	4		—	30	72	—— pilicollis	36.38	♂♀	—	20
36	—— chrysescens	6	♂♀ ♂♀	—	30	73	—— salicis	36.38	♂♀	—	20
37	—— maculatus	6	♂♀	—	20	74	—— melanocephala	6	♂♀	—	20
				35	39	75	Cryptocephalus Temesiensis	28.28	♂♀	—	15
						76	—— picticeps	36.38	♂♀	—	24
										—	20
										15	36

Gyurg mit Ungarischen, wenig abweichend
vom übrigen Gyurg.

Carabus aeneipennis. St. Ein Varietät: Decken u. Halsschild
kupferschwarz, die Seitenränder lebhaft
grün.

Pterostichus Sellmanni. Scheint von dem ostsibirischen P. Wilkensii
sehr wenig u. vielleicht nur kleinere Varietät
(Kopf etwas kleiner als mein P. Mincowitzii)
etwas Schwärzer von Verfärbung, die zwei
eingedrückten Punkte Streifen, die beyden Hals-
schildgruben nicht so lang; die Farbe dunkler
als bey P. u. scheint vielleicht nur durch andere Verfärbung v. Wilk.

№	Nomen	Stück	Vaterland	fl.	xr.
77	Lema collaris	18.17	Taunus Gebürg	—	24
78	— dodecastigma. Dejean	4	do	—	20
79	Endomychus thoracicus. K.	6	do	—	30
80	Lycoperdina binotata	2	do	—	10
81	— rubricollis	4	do	—	20
82	Coccinella magnifica. Zi.	4	do	—	20
83	— 7maculata	4	do Gebürg	—	20
84	Cassida thoracica. Pz	2	do	—	30
85	— variabilis	6	do	—	30
86	— fenestrata. Mühlf.	6	do	—	20
87	Crsodacne flavicollis	4	do Gebürg	—	15
88	Bembidion elegans. Kol.	6	do	—	24
89	Diaperis cornuta. Dej.	2	do	1	—
90	Dima elateroides. Zi.	2	do Gebürg	1	—
91	Zonitis praeusta. F.	4	do	—	24
92	— subpunctata	2	do	—	48
93	Lampyris Mehadiensis	6	do	—	40
94	Elater mesomelas	24	do	—	24
95	— anceps	36	do Gebürg	—	30
96	— sinuatus. o.M.	4	do	—	20
97	— analis. F.	4	do Gebürg	—	20
98	— vitta	4	do do	—	20
99	— pustulatus.	6	do do	—	20
100	— lucidulus. Zi.	4	do	—	15
101	Buprestis cyanicornis	26	do	1	—
2	— Trochilus	28	do	1	—
102	— Cichorei. Olis.	4	do	—	20
103	— Chamomillae	4	do	—	20
104	— signaticollis	2	do	—	24
105	— foveolata	4	do	—	20
106	— derasofasciata. Dej.	4	do	—	15
5	Donacia varicolor	6	do Gebürg	—	20
6	Leptura 7punctata. var.?	4	do	—	15
7	Molorchus affinis.	4	do	—	20
8	Stenopterus fugax. F.	4	do	—	24
9	Cistela melanocephala. Zi.	2	do	—	30
10	— axillaris. Pz	18.17	do	—	15
11	— variabilis	4	do	—	15
12	Pogonogonus lusitanicus. Dis.	4	do	—	20
13	Mycdalis annulata. M.	4	do	—	20
14	Dasytes carbonarius	4	do	—	15
15	— virens	4	do	—	15
				18	22

№	Nomen	Stück	Vaterland	fl.	xr.
116	Bolitophagus crenatus. F.	4	Taunus	—	10
17	— interruptus. F.	2	do	—	30
18	— tuberculatus.	4	do	—	20
19	Synchita picta	2	do	—	15
20	Scaphidium limbatum	4	do	—	15
21	Salpingus ruficollis.	4	do	—	20
22	Triplax scutellaris. Dej.	4	do	—	20
23	Minomidia haemorrhoidalis	4	do	—	10
24	Strongilus dimidiatus. Zi.	4	do	—	15
25	Dircaea repanda. Dej.	2	do	—	20
26	Lycus rubens. F.	2	do	—	20
27	Cucujus depressus. F.	2	do	3	30
28	Myas chalybeus. Zi.	18.17	do	3	—
29	Helops coeruleus. F.	2	do	1	—
30	— badius	18.17	do	—	30
31	Tachinus interruptus. Dej.	4	do	—	12
32	Buprestis micans	2	Italien	2	30
33	Saperda irrorata. F.	1	Portugal	2	—
34	Calandra picea. F.	1	Ungarn	—	45
35	Buprestis splendida. Schr.	2	Schweden	—	45
36	Callidium insubricum. Zi.	1	Helvetien	3	—
37	— hungaricum. F.	1	Ungarn	1	30
38	Aptinus ballista. Illig.	2	Pyrenäen	1	30
39	Callidium sericeum. F.	2	Italien	1	30
40	Carabus Oestreicheri. Bess.	1	Wolfgang	1	00
41	— costatus. Illig	1	Pyrenäen	3	—
42	— aeneipennis. St.	1	Karlsbrunn	1	30
43	Pterostichus sellenaaii. Dufts	1	Charlottenbrunn	1	—
44	Scarites subterraneus. F.	1	Pyrenäen	1	—
45	— arenarius. Dej.	1	do	1	—
46	— laevigatus. Olis.	1	do	1	—
47	Steropus globosus. F.	1	do	1	—
48	Procus piger. Latr.	18.17	do	1	—
49	Abax exaratus. Bonn.	1	Italien	—	40
50	Prionus depsarius. F.	18.17	Ungarn	2	—
51	Lamia lugubris. F.	18.17	Pyrenäen	2	—
52	Melolontha hyscia. Guld.	2	Ofenpest	—	45
53	— rufescens. Latr.	2	Italien	—	30
54	— Aceris. Zi.	18.17	Niederösterreich	1	—
				43	52

Die Nomen sind nach dem Catalog des Bn Dejean.

No	Benennungen	Stück	Vaterland	pr. Stück ℔	ß
1	Pap. melas. ♂. Nelo. H. —	20	Mosardia	3	—
2	— melas — —	28	♂♀	5	—
3	— Euphemus. nov. sp.	20	♂♀	3	—
4	Geometra Cribraria. H.	10	♂♀	2	—
5.	— Flavicaria. H.	10.	♂♀	2	—

i. Lay. eingehangen

Steyrg mit Augsburg Zimmer, wenig gelungen
und übrige Steyrg.

Carabus aeneipennis. St. ein Vorrath: Baden u. Gelb Feld
Augsburg, die Baden under Lebst
gern.

Pterostichus Fellmanni: Ist dem von dort wohlbenannten P. Wilkensii
sehr ähnlich u. vielleicht nur kleiner Vorrath
Roy etwas kleiner als mein P. Minerwitzii
etwas Schmäler und Parallel, die ein-
gedrückten Punkte Streifen, die beyden Fuld
Feldgruben mit Farbung; die Fühler dunkler
als beim P. v. Dahl vielleicht nur Varietät v. Wilk

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(45) Anmerkungen über dasselb Vaudoux 1822. (von der Reise im Sommer)

Carabus Escheri. D. bey den 6 Ruten die in sehr (1837) war beim Unterschied von einen C. auronitens und den Odenwald zu finden. Freilich war bey allen Exemplaren das Halsschild sehr lebhaft kupferroth, doch finden sich auch bey einer Ruten die hiesigen nicht rein vorhanden. Die Farben waren bey allen ziemlich schwarz, und in

(14) zu dasselb Vaudoux 1822.

~~Bembidium~~

Aptinus ballista. M. die Beschreibung Dejean Icon. Dufour. Apt. displosor. Latr. ~~die~~ der Brust sind einzelne blaue Punkte.

Carabus Oestreicheri. dem Car. Lippii ähnlich aber etwas kleiner. die Farben wie bey diesem mit einer Mauer fast einigen bildenden Erhabenheiten übersäet nur sind Erhabenheiten ~~grosse~~ feiner. Das Halsschild ist kleiner und die Hinterwinkel nicht so verlängert. die Farben ist ebenso und die Farben schwarz violett gemischt. Die Rippen di Glongali hier lang genau.

Carabus costatus von der Größe des C. auratus. Das Halsschild ist besonders lang gezogen u. die Ruten fast parallel laufend. die Hinterwinkel klein und sehr verlängert. die Farben sehr schwarz. die Rippen sehr abwechselnd stark, die andern sehr schwach. Die Rippen haben kleine erhabene Punkte, welche in der Mitte jeder Furche, fast eine Reihe bilden. Halsschild u. Farben sind schwarz mit Kupferglanz, wenig glänzend das übrige schwarz.

Carabus aemisperrnis. M. ein Varietät: Farben u. Halsschild kupferschwarz, die Farben wenig glänzend.

Pterostichus Sellmanni. Schon von dem verstorbenen P. Villersii sehr ähnlich u. vielleicht nur kleinere Varietät (Key etwas kleiner als mein P. Mincowitzii) etwas schmäler und Verhältniß, die eingedrückten Punkte stärker, die beyden Halsgruben nicht so lang; die Farben dunkler als bey P. v. dessen vielleicht nur Varietät v. Villersii

Scarites subterraneus. Von der Größe d. Broscus cephal. Halsschild vornen viell gerundet, Mittellinie glatt. Decken glattgestreift, glatt, die Rippen wenig sichtbar.

Scarites arenarius. Dej. dem vorigen sehr ähnlich aber von der Größe d. S. laevigatus. die Streifen seiner Längsreihen; der Körper als beim vorigen, vornen viel wenig ausgerandet, aber gerade. Mittellinie. Decken fein gestreift, die Zwischenräume undeutlich. Der Hinterrand fein gerandet. Halsschild Hinterecken wie beim S. laevigatus.

Steropus globosus. Dem von mir vor A. aethiops (beschriebenen) gehaltenen Käfer im Ganzen sehr ähnlich. Aber mehr gewölbt (stark gewölbt) u. die Decken weniger länglich. Auch größer (Größe d. A. concinnus A.) das Halsschild hat einen scharfen Längsstrich u. beiderseits einen eingedrückten, grubenartigen Punkt. Die Decken sind glatt, gestreift (in den Streifen eine Reihe von Punkten) Knapp vor der 3. Streifen steht nach hinten (innerwärts) ein eingedrückter Punkt. Schwarz, glänzend.

Broscus piger. Latr. d. so groß wie B. cephal. ♀ noch größer viel breiter, besonders Körper u. Halsschild. Halsschild hinten ziemlich breit u. viell gerundet. Decken fein gestreift, die Zwischenräume nur schwach gewölbt, glatt, poliert. — Schwarz, glänzend.

Abax exaratus. Bon. Der kleinste Typus d. A. parallelus ähnlich aber gestreift. Formen ähnlich, aber viel flacher. Die Mittellinie des Halsschilds ist in eine Längsfurche eingedrückt u. hinten u. vornen abgekürzt. Die Hinterecken beiderseits sind tief, bilden aber keine so lange Furche. Die Decken sind fein gestreift, die Zwischenräume eben, undeutlich punktiert. Halsschild glänzend.

Bemerkungen über dasselbe Bandung 1822. (Von der Zeit (A38 im Sommer)

Carabus Escheri. D. Von den 6 Stücken die ich sah (1837) war kein Unterschied von meinen C. auronitens und dem Odenwald zu finden. Freilich war bey allen Exemplaren der Halsschild sehr lebhaft kupferroth, doch finden sich auch bey einigen Stücken die Farben nicht rein vorhanden. Die Rippen waren bey allen ziemlich schmal, und in

97

Lamia lugubris. Mit auffallendem Unterschied ob ich wollten sich auf den Decken 2 mehr braune finden bilden

Melolontha hyscia Guld. Ist kaum von meiner M. atra zu unterscheiden. Die Decken sind dunkler braun und nicht so dunkelig punctirt, sondern durch Querrunzeln runzlig. Die Afterschiene ist nicht so stark gezähnelt und nicht so dunkelig punctirt.

Melolontha rufescens Latr. = meiner M. assimilina D. (Meyer)

Melolontha aceris. L. Von dem kürzeren, gedrungenen Bau der Mel. Hippocast. Kopf u. Halsschild schwarz mit ziemlich langen grauen Filzhaaren dicht besetzt. Fühlern bis fast zur Spitze gezähnt. Farben wie bey M. Hippocast. aber der Rand nicht schwarz. Afterschiene ab so lang, fast länger, als bey Hipp.; die Ab ist gar nicht verlängert, sondern der Afterrand abgerundet zugespitzt. Letzte Fühlerglied braun. Unterseite fast wie bey Hipp. — beyde Exemplare (5 et 7) waren so zwar wie kleine Hipp.-

Bonacia varicolor. Variirt auch Zimbelblau, Lebhaft grün, ll

Der Beg. der 1ª Bandung v. Saltaun Sinodendron
muricatum (№ 145) Talta ist für (Bosk) muricatus. Oliv
von Fab. wonzu der Dürlich 6 (Fab 8) Zorsum.
Apate muricata Fab soll = sein bispinosum. Oliv. u.
Dirsch wären dann wohl der von Bengal und Afrika
genannte Käfer, doch hat er gelbe Füßler. —
Latr. Käfer zu reticulum?

Anmerkungen über dasselb Bandung 1822. (von der Zeit an im Sommer)

Carabus Escheri. D. Lng den 6 Nuten die ich fing (1837) war kein Unterschied von unsern C. auronitens und dem Odenwald zu finden. Freilich war bey allen Exemplaren der Halsschild sehr erhaben kupferroth, doch finden sich auch bey uns Nuten die fast nicht vorhanden. Die Rippen waren bey allen ziemlich schmal, und in den Furchen punctirt, doch deutlicher als bey den Exemplaren wo beyder noch mehr der Fall ist.

Car. Kollari. Varirt dunkelblau u. etwas hellerblau mit grünen od. violetten Rand. Auch ganz violett. die Rippen sind in allen Fällen abwechselnd breiter. —

Car. fastuosus. bald mehr grün, bald mehr kupferfarb. immer schön glänzend.

Car. graniger. der Randstreifen zieht sich mehr oder weniger ins rothe. der Rand ist zuweilen grünlich. sonst wie beschrieben.

Cychrus semigranosus. die Farbe ganz schwarz, oder ins violette oder kupferbraune. Die Halsschildseiten sind gekörnelt, die Körner stehen in einander, so daß sie etwas scharfe Längslinien bilden. Nach hinten zu sind diese Körner immer deutlicher und eingedrückt.

und röthlich zu fallen. Die Rippen um wenig breiter.

Elater analis = minimum E. subfuscus. Harr.

Elater sitta ist E. lateralis. Oliv. (v. Fabr.) sehr ähnlich u. vielleicht nur Varietät. das Halsschild ist [illegible] hat schwarz u. nur die Hinterwinkel sind röthlich. Die Rippen sind breiter u. dunkler schwarz; auch der Rand ist dunkel. die Größe ist dieselbe. ♂ ist vielleicht Gyllenh. 6 Rippen u. lateralis die Varietät.

Elater lucidulus. Lig. ist sicher keine Varietät von minimum E. minutus.

Abax latus. Das ♂ ist etwas schmäler und die Zwischenräume der Streifen etwas mehr gewölbt.

Nomalus cophosioides. ♂ ♀ nicht bedeutend verschieden. Auf den dreien sind auf der 2ten Streife 2 eingedrückte Puncte einer etwas unter der Mitte u. einer unter der Spitze zu. Das vordere dieser Puncte fehlt u. sind bald mehrere bald einander gegenüber da.

Harpalus rusticus. misst bis 7 Linien lang, aber die Streifen sind auf beyden Decken gleichförmig gebildet. Farbe der selben dunkel und denselben Farbe, grünlichen Glanz u. rothe Beinspitzen.

Harp. erythrostomus. Ausser den ganz rothen Beinen u. Fühlern sind ich keinen Unterschied von meinem Harp. xy. auch die Größe ist dieselbe.

Dorcadion Murrayi Kol. Ich habe nur ♀ erhalten, das ♂ ist etwas schmäler

Clytus tenestriensis. M. Variirt etwas in der Größe. Schenkel zuweilen dunkelbraun

Callidium castaneum. M. ♂ Fühler fast so lang als der Körper; ♀ kürzer.

——— crassipes. M. ♂ Fühler so lang od. etwas länger als der Körper; ♀ kürzer.

Leptura binotata. ich habe nur ♀. das ♂ ist schmäler. — die 2 schwarzen Puncte sind zuweilen fast verloschen.

Pachygaster dives. var. (No 35. Tabl.) die sonst grünen Schienen, sind hier mehr fleischfarbig

——— maculatus. stimmt nur vom Laborhynchus adspersus. D. insbesondere darin zu sagen. ich finde keinen Unterschied als dass alle Theile stärker mit einem gelblichen Haarstaub umgeben sind und der maculatus ist diese wohl nur einmal grün.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pachygaster Bannaticus. Stellenweise nur Varietät von L. Frivaldszkyi. Denn ich finde nämlich dass die Spitzen der Decken ein wenig mehr vortreten und die Decken vor der Spitze ein wenig mehr glänzend sind. Einen Unterschied.

Hypera Mehadiensis. ist sonst wie P. Delphinensis breiter, besonders die Decken.

—— elegans. ist sonst wie P. Delphinensis schmäler.

—— palustris. die Decken sind zuweilen mehr in einander fallend, und die Streifen der Decken treten mehr hervorgehoben.

Ophistigrina. kommt mir hier vor und ich halte sie als C. marmoratus bestimmt.

Meleus bannaticus. ist wohl kaum von Festus austriacus. M. als Art verschieden. Er ist ein wenig breiter (?) und die Punctreihen der Decken etwas tiefer und dadurch die Zwischenräume der Reihen hoch als erhoben erscheinen. Sonst finde ich keinen Unterschied. Auch die erhabenen Reihen sind ebenso.

Lepyrus biguttatus. Ob von C. Colon gehörig verschieden? die 4 weissen Flecke sind bei allen 6 Exempl. vorhanden nur aber gleicht stets die übrigen weissen Flecken.

Hoplia praticola. Gyll. (v. Dorst) = minor Mel. squamosa. F. von Gyll.

und vollkommen zu fallen. Die Decken um wenig breiter. Grösse der grossen Exempl. der E. pectinicornis.

Elater analis = minimus E. subfuscus. Herr.

Elater sitta ist E. lateralis. Oliv. (v. Gyll.) sehr ähnlich u. vielleicht nur Varietät. Das Halsschild ist [illegible] roth schwarz u. nur die Hinterwinkel sind röthlich. Die Nath ist breiter u. dunkler schwarz; auch der Rand ist dunkel. Die Grösse ist dieselbe. E. ist vielleicht Gyllenhali Dietr. u. lateralis die Varietät.

Elater lucidulus. Lig. ist sonst keinen Unterschied von minimus E. minutus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cymaeha globata. (ist sehr rar ♂) doch ♂ ist etwas kleiner.
— tyrannica var. etwas violett.

Chrysomela pulchra stimmt mir meistens als einer lebhaft gefärbten
C. fastuosa (mit Lanium nur selten) zu sein; sie finde
keinen Unterschied als dass mehr ins
ins Grüne gold, sie mehr ins Kupfergold
ist; auch ist sie kleiner, Vorderschildchen und
Beine rothgold.

Clytra salicis. die grüne Farbe zieht zuweilen mehr in die blaue.
Clytra melanocephala ist finde keinen Unterschied von der grösseren
rothbeinen C. flavicollis.

~~Clyt.~~
Cryptocephalus pieticeps. ist selten rar ♂. doch ♂ hat einen gelben
Mund, einen hufeisenförmigen gelben
Vorderfleck, und — einwärts stehenden
Fühler, und schmalen gelben Vorder-
rand des Halsschild. — bey einem
tyrannischen ♂ war das Halsschild mehr grün
als die Farben. die ♂ etwas kleiner.

Clytra crocata. Fig. von Clytra 238 Klaal (v. Wien) müsste unterschieden
Lema collaris. ♂. — doch ♂ ist etwas grösser. — stimmt mit einem
Pärchen von L. brunnea zu sein, denn
ist finde keinen Unterschied als dass
d. Halsschild unter der Basis schwarzlich
ist.

Endomychus thoracicus. ♀. ist nur wenig v. E. coc. verschieden und nicht
nur Varietät. in allen Theilen nur wenig
breiter, das Halsschild nur wenig mehr
convex und bis auf den Vorderrand
dunkel. (röthlichschwarz) die Flecken u. Punctirung
dieselben.

Rhynchites versicolor. die blaue Farbe fällt mehr od. weniger ins
Grüne, oder ins ♂. Lycoperd.

An Spuren von Hyde von Kahl fl
Cryptidactylen nekünft:

41

1 Papilio Roxelana (von oben) - - - - 9 f - x
1 — D. album - - - - - - 2 " 30 x
1 Sphinx croatica - - - - - 15 " - "

100 30 x

Bemerkungen zu Heft 6 Sendung 1872.

46

Lycoperdina bimotata. Scheint mir nur Varietät der L. cruciata zu sein. Der einzige Unterschied den ich bemerken konnte ist der, daß die Seitenbinden der Flügeldecken nicht verwischen, sondern durch die rothe Farbe derselben abgegrenzt sind.

Cassida variabilis. Der Eng minimum Exemplare zusammengehörende Flecke der Decken, ist absolut in nichts minores getrennt, von verschiedener Größe.

Zonitis subpunctata. ist vielleicht Varietät der Z. 4punctata wo die Flecken entweder ganz oder doch fast verlassen sind. Die Größe bleibt gleich.

Elater anceps. Die 30 die ich sah waren von E. pectinicornis nur wenig verschieden. Die Fühler waren ein wenig länger besonders aber waren die Kämme länger. Die Größe des Halsschilds ein wenig länger und so gross. Die Farben war dunkelgrau, oben sind und vollkommen gelben. Die Decken ein wenig breiter. Größe die größten Exemplare des E. pectinicornis.

Elater analis = maximus E. subfuscus. Harr.

Elater sitta ist E. lateralis. Oliv. v. Fabr. sehr ähnlich u. vielleicht nur Varietät. Das Halsschild ist ~~roth~~ roth schwarz u. nur die Hinterwinkel sind röthlich. Die Naht ist breiter u. dunkler schwarz; auch der Raum ist dunkel. Die Größe ist dieselbe.

Elater lucidulus. Lig. ist sicher kleiner Unterschied von maximus E. minutus

E. ist vielleicht Hybrid von 6 Arten u. lateralis die Varietät.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tymarcha globata. (ist sehr einf.) Der Ö ist etwas blauer.
Die Flügeldecken werden etwas violett.

Chrysomela pulchra scheint mir nichts als eine Farbenabart
C. fastuosa (mit Lanium am Leben) zu sein; sie finden
keinen Unterschied als dass mehr Exemplare
auf den Dünen gold, hier mehr kupfergold
ist; auch ist hier Kopf, Vorderschildschild und
Beine rothgold.

Clytra salicis. Die Flügeldecken werden zuerst grünlich mehr in die blaue
Clytra melanocephala [illegible] Beine Clytra Bird von der braune

Buprestis Cichorii. Mein Exemplar Flügeldecken nur mit
verschieden von dem auf Wasserdost
millefolii, nur etwas als etwas grösser, sie
sehen als dieser jetzt sind ausgetrocknet.

Buprestis signaticollis. Bey dem einen Flügeldecken waren die 2
Halsschildflecken fast verlassen u. dieser fast ganz
wie B. laeta. Nur etwas mehr glänzend und
die Rippen mehr klingegen.

Buprestis Chamomillae. auch im Odenwald (v. Heyden)

Bup. foveolata Die 4 Ex. dieser Ausbeute waren dunkelblau,
wenig ins grüne fallend. Bey einem war
der Halsschild mehr grün.

Bup. 109x. diese Käfer waren 4 Ex. verschieden waren, fast
im Vergleich. Ihr Vaterland wäre wie bei
den übrigen, doch [illegible] sagen.

Bup. derasofasciata = dem kleinen Exemp. meiner B. angustula. M.
welche der Norm? Ich finden Farben

Leptura 7punctata. var.? ist nicht als eine Varietät, wo die Punkte
fast verlassen sind, nur das in der Mitte bleibt
noch immer deutlicher, als die übrigen.

Molorchus affinis. 2 Exemp. waren von M. umbell. gar nicht zu unterscheiden

Stenost. fugax. auch etwas kleiner.

Cistela melanocephala. Grösse u. Gestalt meiner C. ceramboides
aber der Halsschild ist mit den Decken gleich-
farbig.

Cistela variabilis scheint mir = meiner C. murina zu sein.
Mit Ausnahme u. mit braunen Beinen. Ich fand keinen
Unterschied, als dass sie mir etwas konvexer
u. der Halsschild waren ein wenig breiter scheinen.
Doch unbedeutend.

An Spuren von Raub von Vahlen
Lepidopteren verkauft:

41

1	Papilio Roxelana (von oben)	2 f – x
1	— V. album	2 " 30 x
1	Sphinx croatica	– " 15 " –
		30 "

Pogonag. lusitan. fabr ist gegen drei kleinere Exemplare verbräunt,
Salpingus ruficollis rührt in kleinere Exemplare und nicht verschieden
Lycus rubens rührt ist denselben Käfer von Gyllenhal unter dem Namen L. aurora, nur ist der Halsschild lebhafter roth (kleiner)
Nyas chalybeus. ♂ sehr ♂. doch ♀ sind Hinterbeine Fußglieder.
Helops badius. ♂ sehr ein ♂. doch ♀ ist im Halsschild u. Decken etwas breiter u. H. aspatinus sehr ähnlich; doch ist der Halsschild etwas länger, die Decken sind zusammen mehr ins braune fallend u. die Zwischenräume der Punktstreifen sind zuweilen etwas fein punctirt.
Lina lactuosa. Clic. Von dem größeren Exemplare Dibolia cyanea Gyll. kaum zu unterscheiden. Der Halsschild ein wenig breiter u. die Punkte etwas öfter in einander geflossen. Schienen (Beine) dicker aber kaum heller, da sie bei L. cyanea eben so wenig od. mehr zusammenfließen.
Sphodrus punctatus. sieht von der Größe des Sph. janthinus und ihm auch ähnlich, aber die Decken sind schwärzer und weniger glänzend, ziemlich tief u. stark gestreift, die Streifen von der Mitte beginnend, in der Nähe etwas gekerbt. die Zwischenräume glatt. Der Halsschild ist etwas kleiner, die Seiten nach hinten weniger gerundet, und die beiden hinteren Eindrücke tiefer und hinten ein wenig aber sehr undeutlich punktirt. Der Körper ist mehr glänzend, ganz schwarz, nur die Decken sind dunkelblau.
Warum — punctatus?

		— 20
		— 15
		— 24
	lud.	
	s. Gyl.	— 20
	v.	— 18
	q.	— 20
		— 18
		— 12
	8.	— 15
		— 15
	7.	— 8
	M.	— 18
		— 18
	3.	— 10
		— 20
		— 15
		—
		— 15
	Hist.	— 10
		— 8
		— 15
	2 Ex.	— 8
		— 15
	M.	— 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tymarcha globata. (ist sehr zimf.) doch ist etwas kleiner.
— (Tymnes var. atrocoerulea violett.

Chrysomela pulchra stimmt mir mittels als einer Lebensart zu färbte C. fastuosa (mit Lanium im Leibe) zu sagen; sie findet keinen Unterschied als dass man bey mir auf den Decken gold, hier mehr kupfergold ist; auch ist sie Kopf, Vorderrandschild und Seiten rothgold.

Clytra salicis. die Flügeldecken sind grünlich und in den blauen Clytra melanocephala ist die beiden Flecken rund um die Brüste

Cistela antennata. — bey dem einen Geschlecht ist das Fühlerglied nicht verdickt und daher der C. murina sehr ähnlich, doch vorzüglich durch den ganzen und einen Längsfurche versehenen Halsschild kenntlich. beyden gehören Tymnes varietät Thorax. die Flügeldecken.

Buprestis micans, Bup. marginatus. Gestalt wie vorgemeldt aber etwas kleiner, Fühler (besonders Halsschild u. Kopf). die Decken lebhaft grün, der Flügelrand breit grünlich gold farbig. Kopf, Halsschild u. Unterseite goldgrün. Halsschild nicht so dicht aber tiefer punctirt.

Buprestis splendida. Illig. = B. [redacted] plebeja. von Grimm
Calandra picea mein Geschlecht Abbildung.
ist stärker.
Callidium hungaricum ist grösser als C. variabile. die Decken sind schwarzgrün mit Kupferschimmer. der Halsschild ist in der Mitte weniger punctirt, mit einer Längslinie. die Decken [redacted] mehr als gerundet, fast ein vorspringendes in der Mitte bildend; schwarz. Fühler u. Beine schwarz. Fühler körperlang.
Callidium insubricum. ♂. grösser u. breiter als hungaricum. grösser als C. clavipes u. viel breiter. die Decken dunkelgrün, ins Blaue fallend, feinpunktirt glänzend (under der Loupe sehr tief) punctirt, das nicht so grob punctirt als bey hungaricum u. variabile. der Halsschild in der Mitte fast glänzend unpunctirt, die Decken mehr gerundet als bey hungaricum. Fühler auf die Decken gerückt. Thorax. die Fühler körperlang.

Latreille

An Spuren von Hymenopteren und Dahlbom
Cryptidoptera verkauft:

4f

1 Papilio Rosetana (von oben) - - - - 9 f - x
1 — P. album - - - - - - 2 f 30 x
1 Sphinx croatica - - - - - 15 f -

26 f 30 x

Diese 26 f 30 x (oder 31 f 48 im Zeft.) sorgfältig aufbewahren.

Ich muß Sie nun ersuchen, mir Ihre Preise auf die strengste Art zu erfüllen.

Ich bin mit Achtung

Ihre ergebenste

G. Dahl.

	Alpaeus	
35	transylvanicus. Kol.	— 48
	Leistus	
34	analis	— 20
38	nitidus. M.	— 24
46	spinibarbis	— 24
	Licinus	
27	Nebrioides. A.	— 24
	Badister	
28	humeralis. Bon.	— 12
	Chlaenius	
29	velutinus	— 40
		17 4

	Argutor	
	brunneus. M.	— 18
	eruditus. M.	— 10
	diligens. A.	— 6
	inquietus. M.	— 20
	neglectus. M.	— 18
	pumilus. Z.	— 12
	Poecilus	
	cyaneus. M.	— 12
	medius. M.	— 8
	nemorensis. M.	— 15
		11 27

Verbasci. L.	— 20
virens. Dahl. t.	— 15
Notaphus	
laticollis. Duft.	
Bembidium	— 24
2punctatum.	
lucidulum. Z.	
Peryphus	
aenatus. Ill.	
brunnipes. A.	— 18
lunulatus. M.	— 20
sabulosus. Z.	— 18
tibialis. M.	— 12
Leja	— 15
aenea. M.	— 15
orichalcica. Ill.	— 8
sulphuripes. D.	— 18
subfenestrata. D.	— 18
venustula. Z.	— 10
Lopha	— 20
subfasciata. Kol.	— 15
Nothiophilus	— 15
sylvaticus. Kn.	— 10
Dytiscus	— 8
Roeselii	— 15
Colymbetes	— 8
umbrinus. Baad.	— 15
Laccophilus	— 15
variegatus. Kol.	
Hydroporus	
arcuatus	
areolatus. Ill.	
canaliculatus. Ill.	
palustris	
parallelogramus. Kn.	
Silphoides. Bon.	
umlineatus. Schr.	

Dahl.

65 / 26
57
122 / 26
72 / 9
194. 35
138. 44
155 41

Mg 66 Scarabaeus koniophaecius
" 134 Calcar elongatus . . . . 30 x
" 9 Blaps lilatata . . . . 1.— "
" 84 Rhysodes europaeus . . . 1.30 "
" 60 Rhyzobius praeustus . . . —.24
3 / 54 x

194-11 55
195/10 26
35

Buprestis splendida. Sikes. = B. [redacted] plebeja. von Grimm
Calandra picea wie Herbst abbildung.
Callidium hungaricum ist grösser als C. variabile. die Decken sind
schwarzgrün mit Kupferschimmer. der Halsschild ist in der Mitte wenig
ausgerandet grünlich, mit einer Längslinie. die Decken [redacted] mehr als
grünlich, fast ein wenig ins Violette in der Mitte bildend; schwarz. Füsse
u. Beine schwarz. Fühler körperlang.
Callidium insubricum. ♂. Grösser u. breiter als hungaricum. Grösser
als C. clavipes u. viel breiter. Die Decken
dunkelgrün, ins Blaue fallend, fein punktirt
fliessend (under der Loupe sehr kurz) punktirt, doch
nicht so grob punktirt als bei hungaricum u.
variabile. der Halsschild in der Mitte fast
glänzend unpunktirt, die Decken nur gerunzelt
als bei hungaricum. Fühler auf die Decken gelegt
schwarz. die Füsse körperlang.

48. Wüsering unfrankirt Wien d 8ten Febr 1823

Euer Hochwohlgeboren

Da ich so lange meinen Nützlichkeitstrieb
an vorhandenen Gedruckten Catalog zu üben suchte
ist der Titte, Nr 2 te Exemplar des Inser=
ber Aggallerien Verz Hochdero mehr Nutzen
barkeit zu befördern. Ich werde mich
denn mit Euer Hochwohlgeboren in
ein Directe Verbindung zu setzen
so ich nicht Ermangeln werde Ihnen
meine Dienste auf die strengste zu erfüllen
Ich bin mit Wahrer Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

G. Dahl.

Alpaeus.
93 transylvanicus. Kol. — 48

Leistus.
34 analis — 20
35 nitidus. M. — 24
36 spinibarbis — 24

Licinus.
37 Nebrioides. F. — 24

Badister.
38 humeralis. Bon. — 12

Chlaenius.
39 velutinus — 40
17 4

Argutor.
brunneus. M. — 18.
eruditus. M. — 10.
diligens. F. — 6
inquietus. M. — 20
neglectus. M. — 18
pumilus. Z. — 12

Poecilus.
cyaneus. M. — 12
medius. M. — 8
nemorensis. M. — 15
11 27

Hypera.
— 20
— 30
— 12
— 15
— 15
— 6

Harpalus
sericatus. Dahl. — 15
smaragdinus. M. — 18
sobrius. M. — 15
sulphuripes. Z. — 10
serotinus. M. — 20
satyrus. F. — 8
torridus — 18
turgidus. Z. — 12
tarsatus. M. — 15
thalassinus. Z. — 15
unipunctatus. M. — 15
variabilis. M. — 12
viridinitens. Z.
virescens. Z. — 12
varians. Z. — 15
Stenolophus. — 8
centromaculatus. — 18
dorsalis. F. — 20
Trechus. — 15
coruscus. Kn. — 15
cruciger.
paludosus. Heller.
verbasci. Cr. — 20
virens. Dahl. — 15
Notaphus.
laticollis. Duft.
Bembidium. — 24
2punctatum.
lucidulum. Z.
Peryphus.
aenatus. M. — 18
brunnipes. F. — 20
lunulatus. M. — 18
sabulosus. Z. — 12
tibialis. M. — 15
Leja.
aenea. M. — 15
orichalcica. M. — 8
sulphuripes. Z. — 18
subfenestrata. Z. — 18
venustula. Z. — 10
Lopha — 20
subfasciata. Kol. — 15
Nothiophilus. — 10
sylvaticus. Kn. — 8
Dytiscus. — 15
Roeselii — 8
Colymbetes. — 15
umbrinus. Baad. — 15
Laccophilus.
variegatus. Kol.
Hydroporus.
arcuatus
areolatus. M.
canaliculatus. M.
palustris.
parallelogramus. Kn.
silphoides. Bon.
unilineatus. Mrz.

Dahl.

194-11
55
1951/10
20
35

Bupreſtis ſplen
Calandra pice
Callidium hungar

Callidium insubricum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

50

106

Rhamphus

tomentosus. Voyt. — 10

Falciger

bipustulatus

Archarius

Hypera

Actum Aus Dasselbe gedruckten Katalog

49

		ℳ	₰
	Dromius.		
1.	elongatulus Zoft.	—	8
2.	fasciatus	—	4
3	glabratus M.	—	10
4.	maurus. M.	—	8
5.	piceus. M.	—	8
6.	quadrillum. Cr.	—	8
7.	spilotus. Ill.	—	10
	Cymindis		
8.	Dianae	—	20
9.	lunaris. Dahl	—	30
10	punctata. F.	—	20
11	scapularis. And.	—	30
	Brachinus		
12	evaporans. M.	—	10
13	glabratus. M.	—	10
14	impunctatus. M.	—	12
15	nigripennis. M.	—	10
	Aptinus		
16	Balista. Hellw.	1	—
	Scarites		
17	subterraneus	—	48
	Dischirius		
18	aeneus. Schott	—	6
19	striatus	—	6
	Clivina		
20	discipennis. M.	—	8
	Ditomus		
21	bucephalus. Oliv.	—	20
	Atomis		
22	rostrata. F.	—	15
	Cychrus		
23	simplex. M.	1	30
	Carabus		
24	assimilis. F.	—	24
25	excisus. F.	—	45
26	femoralis. M.	—	45
27	nigricornis. M.	1	12
28	pomeranus. Oliv.	—	45
29	sabaudus. M.	—	20
30	sulcosus. M.	—	45
31	tuberculatus. Z.	—	45
	Calosoma		
32	sericeum	—	40
	Alpaeus		
33	transylvanicus. Kol.	—	48
	Leistus		
34	analis	—	20
35	nitidus. M.	—	24
36	spinibarbis	—	24
	Licinus		
37	Nebrioides. F.	—	24
	Badister		
38	humeralis. Bon.	—	12
	Chlaenius		
39	velutinus	—	40
		17	4

		ℳ	₰
	Odes		
40	notatus. M.	—	15
41	obtusus. F.	—	20
	Amara		
42	aurata. M.	—	20
43	chloredica. M.	—	10
44	chlorophana. M.	—	15
45	cuprea. M.	—	8
46	femoralis. M.	—	10
47	lata. F.	—	12
48	montivaga. F.	—	15
49	nigripes. M.	—	10
50	ovata. M.	—	10
51	plebeja. M.	—	8
52	tibialis. F.	—	8
53	trivialis. Zoft.	—	8
54	vespertina. M.	—	6
55	vetva. Cr.	—	15
	Leirus		
56	aurichalceus. M.	—	15
57	brunneus. Kn.	—	15
58	municipalis. Cr.	—	20
59	plebejus. Cr.	—	10
60	rusticus. Kn.	—	8
61	ventralis. F.	—	12
	Platynus		
62	piceus. M.	—	15
	Agonum		
63	atratum. M.	—	15
64	asphaltinum. Dahl	—	15
65	ericeti. Kn.	—	20
	elongatum. Dej.	—	20
	fuliginosum. Kn.	—	12
	hilare. Z.	—	20
	lugens. F.	—	15
	subaeneum. Z.	—	15
	Syphodrus		
	coeruleus. Bon.	—	30
	subcyaneus. Ill.	—	24
	Calathus		
	gilvipes. Dahl	—	20
	lapidosus. Kn.	—	12
	metallicus	—	45
	ochropterus. Zoft.	—	8
	sulphuripes. Schönh.	—	12
	Argutor		
	brunneus. M.	—	18
	eruditus. M.	—	10
	diligens. F.	—	6
	inquietus. M.	—	20
	neglectus. M.	—	18
	pumilus. Z.	—	12
	Poecilus		
	cyaneus. M.	—	12
	medius. M.	—	8
	nemorensis. M.	—	15
		11	27

Omaseus

aterrimus

elongatus. Duf

italicus. Bon

melas. Cr.

melanus. M.

nigerrimus.

nitidus. M.

Platysma

maura. M.

Pterostichu

angustatus.

Klugii. Dahl

maurus. D

monticola.

Panzeri. P

Abax

Beckenhaup

crenatus.

punctatostri

unctulatus.

Steropus

madidus.

Molops

aequilatus.

brunnipes.

ovatus. Z.

picipes. M

punctulatu

rubripes.

Ophonu

cordatus. D

infaustus.

obscurus.

opacus. D.

platicola.

reptans.

signaticor

spurcatico

turbidus.

Harp

angustus.

clavipes. Z

crassipes.

crinipes.

coracinu

corvinus

Harpalus

sericatus. Dahl — 15

smaragdinus. M — 18

sobrius. M. — 15

sulphuripes. D. — 10

serotinus. M. — 20

Satyrus. F. — 8

torridus — 18

turgidus. Z. — 12

tarsatus. M. — 15

thalassinus. Z. — 15

unipunctatus. M. — 15

variabilis. M. — 12

viridinitens. D.

virescens. D. — 12

varians. D. — 15

Stenolophus

centromaculatus. — 8

dorsalis. F. — 18

Trechus

coruscus. Kn. — 20

cruciger. — 15

paludosus. Hellw. — 15

Verbasci. Cr. — 20

virens. Dahl — 15

Notaphus

laticollis. Duft. — 15

Bembidium

2punctatum — 24

lucidulum. Z.

Peryphus

ahenatus. Ill.

brunnipes. F.

lunulatus. M.

sabulosus. Z.

tibialis. M.

Leja

aenea. M.

orichalcica. Ill.

sulphuripes. D.

subfenestrata. D.

venustula. Z.

Lopha

subfasciata. Kol.

Nothiophilus

sylvaticus. Kn. — 8

Dytiscus

Roeselii — 15

Colymbetes

umbrinus. Baad. — 15

Laccophilus

variegatus. Kol.

Hydroporus

arcuatus

areolatus. Ill.

canaliculatus. Ill.

palustris

parallelogramus. Kn.

silphoides. Bon.

unilineatus. Mrs.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

50

106

Rhamphus

mentosus. Payk. — 10

Falciger

bipustulatus

Archarius

Hypera

104

Retour dans dasselbe gedruckten Catalog dieses Jahres 1823, pflanzen

49

	℔	ß
Dromius		
1. elongatulus Duft.	—	8
2. fasciatus	—	4
3. glabratus M.	—	10
4. maurus M.	—	8
5. piceus M.	—	8
6. quadrillum Gr.	—	8
7. spilotus Ill.	—	10
Cymindis		
8. Dianae	—	20
9. lunaris Dahl	—	30
10. punctata Fabr.	—	20
11 scapularis Andr.	—	30
Brachinus		
12 evaporans M.	—	10
13 glabratus M.	—	10
14 impunctatus M.	—	12
15 nigripennis M.	—	10
Aptinus		
16 Baliota Hellw.	1	—
Scarites		
17 subterraneus	—	48
Dischirius		
18 aeneus Schott	—	6
19 striatus	—	6
Clivina		
20 discipennis M.	—	8
Ditomus		
21 bucephalus Oliv.	—	20
Atomus		
22 rostratus Fabr.	—	15
Cychrus		
23 simplex M.	1	30
Carabus		
24 assimilis Fabr.	—	24
25 excisus Fabr.	—	48
26 femoralis M.	—	45
27 nigricornis M.	1	12
28 pomeranus Oliv.	—	45
29 rabaudus M.	—	20
30 sulcosus M.	—	45
31 tuberculatus Z.	—	45
Calosoma		
32 sericeum	—	40
Alpaeus		
33 transylvanicus Kol.	—	48
Leistus		
34 analis	—	20
35 nitidus M.	—	24
36 spinibarbis	—	24
Licinus		
37 Nebrioides Fabr.	—	24
Badister		
38 humeralis Bon.	—	12
Chlaenius		
39 velutinus	—	40
	17	4

	℔	ß
Oodes		
40 notatus M.	—	15
41 obtusus Fabr.	—	20
Amara		
42 aurata M.	—	20
43 chlorodica M.	—	10
44 chlorophana M.	—	15
45 cuprea M.	—	8
46 femoralis M.	—	10
47 lata Fabr.	—	12
48 montivaga Fabr.	—	15
49 nigripes M.	—	10
50 ovata M.	—	10
51 plebeja M.	—	8
52 tibialis Fabr.	—	8
53 trivialis Duft.	—	8
54 vespertina M.	—	6
55 serva Gr.	—	15
Leirus		
56 aurichalceus M.	—	15
57 brunneus Kn.	—	15
58 municipalis Gr.	—	20
59 plebejus Gr.	—	10
60 rusticus Kn.	—	8
61 ventralis Fabr.	—	12
Platynus		
62 piceus M.	—	15
Agonum		
63 atratum M.	—	15
64 asphaltinum Dahl	—	15
65 ericeti Kn.	—	20
elongatum Dej.	—	20
fuliginosum Kn.	—	12
hilare Z.	—	20
lugens Fabr.	—	15
subaeneum Z.	—	15
Sphodrus		
coeruleus Bon.	—	30
subcyaneus Ill.	—	24
Calathus		
gilvipes Dahl	—	20
lapidosus Kn.	—	12
metallicus	—	45
ochropterus Duft.	—	8
sulphuripes Schönh.	—	12
Argutor		
brunneus M.	—	18
eruditus M.	—	10
diligens Fabr.	—	6
ingluctus M.	—	20
neglectus M.	—	18
pumilus Z.	—	12
Poecilus		
cyaneus M.	—	12
medius M.	—	8
nemorensis M.	—	15
	11	27

	℔	ß
Omaseus		
aterrimus	—	20
elongatus Duft.	—	20
italicus Bon.	—	24
melas Cr.	—	10
melanus M.	—	12
nigerrimus M.	—	15
nitidus M.	—	15
Platysma		
maura M.	—	20
Pterostichus		
angustatus Duft.	—	15
Klugii Dahl	1	—
maurus Duft.	—	20
monticola Bon.	—	24
Panzeri Pz.	—	24
Abax		
Beckenhauptii D.	—	30
crenatus Dahl	—	24
punctatostriatus	—	15
unctulatus Gr.	—	12
Steropus		
madidus	—	15
Molops		
aequilatus Z.	—	20
brunnipes M.	—	15
ovatus Z.	—	15
picipes M.	—	15
punctulatus Z.	—	18
rubripes D.	—	20
Ophonus		
cordatus Duft.	—	15
infaustus Z.	—	20
obscurus	—	15
opacus D.	—	30
platicola M.	—	15
reptans Kn.	—	15
signaticornis M.	—	15
spurcaticornis Z.	—	15
turbidus M.	—	15
Harpalus		
angustus M.	—	18
clavipes Z.	—	24
crassipes Fabr.	—	20
crinipes Z.	—	10
coracinus Fabr.	—	15
corvinus M.	—	15
	12	15

	℔	ß
Harpalus		
coeruleus M.	—	20
castanipes D.	—	20
circumdatus M.	—	18
chalybaeus M.	—	18
conformis M.	—	18
castanopterus M.	—	16
chalybeatus Z.	—	15
corvus Bonsh.	—	15
chalybeipennis M.	—	18
didymus M.	—	20
Duftschmidtii Z.	—	15
elatus M.	—	15
Fröhlichii Fabr.	—	15
fusculus M.	—	15
flexus M.	—	18
fuscipalpis Z.	—	18
fuscicornis M.	—	15
fulvipes	—	12
ferrugineus	—	18
fulvocalceatus M.	—	20
femoratus M.	—	15
gilvipes Z.	—	15
Gravenhorstii Koll.	—	24
glabricollis D.	—	20
hematopus M.	—	15
informis	—	20
lentus Gr.	—	15
latus	—	18
leiriformis M.	—	15
meridionalis M.	—	15
micans Z.	—	15
marginalis M.	—	15
nigrocæruleus M.	—	18
nitidus Fabr.	—	15
nemorivagus Kn.	—	8
nigriceps M.	—	15
ovalis M.	—	15
piger Duft.	—	15
poeciliformis M.	—	15
pumilus Hellw.	—	8
punctiger M.	—	15
picipes M.	—	15
pallipes M.	—	15
Proteus Pk.	—	8
rufilabris M.	—	15
rubricornis M.	—	20
signipes M.	—	15
strigiceps M.	—	18
	12	43

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Harpalus.	ƒ	ʒ
sericatus. Dahl	—	20
smaragdinus. M.	—	15
sobrinus. M.	—	15
sulphuripes. D.	—	15
serotinus. M.	—	18
Satyrus. Ft.	—	10
torridus	—	15
turgidus. Z.	—	15
tarsatus. M.	—	15
thalasinus. Z.	—	15
unipunctatus. M.	—	20
variabilis. M.	—	12
viridinitens. D.	—	20
virescens. D.	—	15
varians. D.	—	15
Stenolophus.		
centromaculatus. M.	—	18
dorsalis. Ft.	—	12
Trechus.		
coruscus. Kn.	—	15
cruciger.	—	8
paludosus. Heller	—	6
Verbasci. Ir.	—	10
virens. Dahl.	—	15
Notaphus.		
laticollis. Duft.	—	15
Bembidium.		
2punctatum	—	20
lucidulum. Z.	—	15
Peryphus.		
ahenatus. Ill.	—	15
brunnipes. Ft.	—	15
lunulatus. M.	—	12
sabulosus. Z.	—	8
tibialis. M.	—	15
Leja.		
aenea. M.	—	10
orichalcica. Ill.	—	6
sulphuripes. D.	—	12
subfenestrata. D.	—	15
venustula. Z.	—	12
Lopha.		
subfasciata. Kol.	—	6
Nothiophilus.		
sylvaticus. Kn.	—	12
Dytiscus.		
Roeselii	—	15
Colymbetes.		
umbrinus. Baad.	—	15
Laccophilus.		
variegatus. Kol.	—	15
Hydroporus.		
arcuatus	—	8
areolatus. Ill.	—	8
canaliculatus. Ill.	—	15
palustris	—	10
parallelogramus. Kn.	—	24
Silphoides. Bon.	—	18
unilineatus. Schr.	—	8
	10	43

Hyphidrus.	ƒ	ʒ
quadriguttatus.	—	15
Haliplus.		
caesus. Duft.	—	12
fulvus	—	10
ferrugineus. Rx.	—	10
Hartzianae. D.	—	15
lineolatus	—	15
maculatus. D.	—	15
ruficollis. Kn.	—	10
Gyrinus.		
angustatus. D.	—	15
nitidus. M.	—	15
nitidulus. D.	—	15
stagnalis. D.	—	12
splendidus. M.	—	12
velox	—	16
Staphylinus.		
alpestris. D.	—	20
alpinus. D.	—	15
assimilis. D.	—	8
aterrimus. Gr.	—	8
brunnipennis. D.	—	15
carinthiacus. D.	—	20
chalybeipennis. D.	—	15
cyanescens. Z.	—	15
Dahlii. Dej.	—	15
debilis. Gr.	—	8
fimbriatus. D.	—	15
flavicornis. Dej.	—	20
floralis. D.	—	20
fumigatus. D.	—	15
fuscipes. D.	—	24
hortensis. D.	—	15
latipennis. D.	—	15
merdarius. Gr.	—	10
molochinus. Kn.	—	10
monticola. D.	—	20
nigrans. Gr.	—	8
occultus. D.	—	20
obsidianus. Kn.	—	10
planus. D.	—	15
picipennis. M.	—	12
punctatus. D.	—	15
splendidus. D.	—	16
subaeneus. D.	—	20
subterraneus. D.	—	15
Xantholinus.		
batychrus. Kn.	—	8
cadaverinus. D.	—	15
parvulus	—	8
rufipennis. D.	—	12
Astrapaeus.		
Ulmi. Gr.	—	24
Latrobium.		
angusticolle. D.	—	20
bigutattum. M.	—	12
scutellare. M.	—	12
	12	11

Paederus.	ƒ	ʒ
analis. D.	—	10
brevipennis. D.	—	15
fusculus. Gr.	—	12
longipennis. D.	—	15
megacephalus. Kn.	—	8
sanguinicollis. D.	—	15
scabricollis. Gr.	—	12
speculator. D.	—	15
subtilis. D.	—	10
Stenus.		
ater. D.	—	12
bipunctatus. D.	—	15
canaliculatus. Kn.	—	8
niger. D.	—	10
speculator. Gr.	—	10
Oxytelus.		
impressus. Gr.	—	4
Procerus. D.	—	10
rugosus	—	12
Antophagus		
saturalis. Z.	—	15
variegatus. D.	—	15
Omalium.		
bipustulatum. D.	—	15
sulcatum. Gr.	—	6
Tachinus.		
bimaculatus. Kn.	—	10
brunneus. Ill.	—	15
Dahlii. Dej.	—	15
nitidulus. Gr.	—	6
nitidus. D.	—	8
pronus. Gr.	—	8
Tachyporus. Gr.		
cordatus. D.	—	6
humerosus. Gr.	—	6
interruptus. Dej.	—	12
pisciculus. Kn.	—	6
rufescens. D.	—	10
scutellaris. D.	—	10
trinotatus. D.	—	10
tristis. D.	—	12
variegatus. D.	—	8
Aleochara		
atricapilla. D.	—	10
filiformis. Kn.	—	10
fubcicornis. D.	—	15
grandicollis. Gr.	—	15
nitidicollis. D.	—	12
oblonga. Kn.	—	8
rufipennis. D.	—	12
	7	48

Buprestis	ƒ	ʒ
carniolica	—	45
chrysostigma	—	40
metallica	—	30
nitida	—	10
4lineata. Hbst.	1	30
tenebricosa	—	30
variolosa. Payr.	—	48
Agrilus		
aeneicollis. M.	—	15
brevicornis. D.	—	15
chalconatus. M.	—	15
chalybeus. M.	—	15
chlorodicus. M.	—	15
chryseus. Fröhl.	—	15
coryli. And.	—	15
cupreus. M.	—	12
fuscipennis. M.	—	15
gracilicornis. M.	—	12
graminis. Rz.	—	15
longicornis. Schr.	—	15
nigricornis. M.	—	15
olivaceus. Schr.	—	15
Spartii. D.	—	24
viridanus. M.	—	15
viridipennis. M.	—	15
Trachys.		
austriaca. M.	—	24
scrobiculata. M.	—	15
Aphanisticus		
emarginatus	—	12
Elater.		
ahaeneus. M.	—	8
albipes. M.	—	10
alni. M.	—	20
alpinus. D.	—	20
anceps. Z.	—	18
angusticollis. M.	—	15
antennatus. M.	—	15
asphaltinus. Kn.	—	15
atratus. Ill.	—	20
aulicus. Rz.	—	24
axillaris. M.	—	18
badius. Ill.	—	15
bisbimaculatus	—	20
brunnipes. M.	—	18
chrysocomus. D.	—	24
flabellicornis. D.	—	24
flavicornis. Rz.	—	4
Fraxini. D.	—	15
fulvicollis. D.	—	18
fusculus. Ill.	—	4
gibbicollis. M.	—	15
glycerus. Rz.	—	8
impressus	—	20
	18	10

Elater
spilopterus. Rz.
limbatus. Rtzb.
lineatus
marginellus. M.
niciatus. M.
nigritus. M.
nitidus. D.
nitidus. M.
pallipes. D.
picipes. Fröhl.
pomorum. Schr.
rotundicollis. D.
Schneideri. M.
sericatus. M.
sticticus. Rz.
striolatus.
terminatus. D.
thalis. M.
unicolor. Kn.
ursorsulus. D.
Cyphon.
bicolor. Ft.
longatus. M.
haemorrhoidalis
inflatus. Fröhl.
minutus. Vogt.
pallidus.
Lampyris
italica.
Cantharis
malis.
apicalis. M.
cincta. M.
discicollis. M.
erythroleuca
fumata. Hall.
lividipennis
pectoralis. Z.
pilosa. M.
rubricollis.
tenebrosa. M.
Silis
spinicollis. M.
Malthinus
minimus
Malachius
bimoralis
bipustulatus
fasciatus
flavidus
fulvus
gibbosus
marginellus
pellucidus
rufus
viridis.
Rhamphus

	f	x
		20
		15
		15
		15
		18
		10
		15
		15
		15
		15
		20
		12
		20
		15
		15
N.		18
		12
		15
		8
		6
		10
		15
		20
		15
		15
		15
		12
		8
		15
		10
		6
		12
		15
		12
		6
		15
67		
		15
68		
69		15
70		
		8
		8
		15
71		10
		24
72		18
		8
	10	43

Hyphidrus.

	f	x
quadriguttatus. .		15

Haliplus.

	f	x
caesus. Duft. . .		12
fulvus.		10
ferrugineus. Pk.		10
Hartiniae. D. .		15
lineolatus. . . .		15
maculatus. D. .		15
ruficollis. Kn. .		10

Gyrinus.

	f	x
angustatus. D. .		15
nitidus. M. . . .		15
nitidulus. D. . .		15
stagnalis. D. . .		12
splendidus. M. .		12
velox		15

Staphylinus.

	f	x
alpestris. D. . . .		20
alpinus. D. . . .		15
assimilis. D. . . .		8
aterrimus. Gr. . .		8
brunnipennis. D.		15
carinthiacus. D. .		20
chalybeipennis. D.		15
cyanescens. Z. . .		15
Dahlii. Dej. . . .		15
debilis. Gr. . . .		8
fimbriatus. D. . .		15
flavicornis. Dej. .		20
floralis. D. . . .		20
fumigatus. D. . .		15
fuscipes. D. . . .		24
hortensis. D. . . .		15
latipennis. D. . .		15
merdarius. Gr. . .		10
molochinus. Kn. .		10
monticola. D. . .		20
nigrans. Gr. . . .		8
occultus. D. . . .		20
obsidianus. Kn. .		10
planus. D. . . .		15
picipennis. M. . .		12
punctatus. D. . . .		15
splendidus. D. . .		16
subeyaneus. D. . .		20
subterraneus. D. .		15

Xantholinus.

	f	x
batychrus. Kn. . .		8
cadaverinus. D. . .		15
parvulus		8
rufipennis. D. . .		12

Astrapaeus.

	f	x
Ulmi. Gr.		24

Latrobium.

	f	x
angusticolle. D. . .		20
biguttatum. M. . .		12
scutellare. M. . .		12
	12	11

Paederus.

	f	x
analis. D.		10
brevipennis. D. . .		15
fusculus. Gr. . . .		12
longipennis. D. . .		15
megacephalus. Kn.		8
sanguinicollis. D. .		15
scabricollis. Gr. . .		12
speculator. D. . . .		15
subtilis. D.		10

Stenus.

	f	x
ater. D.		12
bipunctatus. D. . .		15
canaliculatus. Kn. .		8
niger. D.		10
speculator. Gr. . . .		10

Oxytelus.

	f	x
impressus. Gr. . . .		4
Procerus. D.		10
rugosus		12

Antophagus

	f	x
saturalis. Z. . . .		15
variegatus. D. . . .		15

Omalium.

	f	x
bipustulatum. D. .		15
sulcatum. Gr. . . .		6

Tachinus.

	f	x
bimaculatus. Kn. . .		10
brunneus. Ill. . . .		15
Dahlii. Dej		15
nitidulus. Gr. . . .		6
nitidus. D.		8
pronus. Gr. . . .		8

Tachyporus. Gr.

	f	x
cordatus. D. . . .		6
humerosus. Gr. . .		6
interruptus. Dej. .		12
pisciculus. Kn. . .		6
rufescens. D. . . .		10
scutellaris. D. . .		10
trinotatus. D. . .		10
triotis. D.		12
variegatus. D. . .		8

Aleochara

	f	x
atricapilla. D. . .		10
filiformis. Kn. . .		10
fubicornis. D. . .		15
grandicollis. Gr. . .		15
nitidicollis. D. . .		12
oblonga. Kn. . . .		8
rufipennis. D. . .		12
	7	48

Buprestis

	f	x
carniolica.		45
chrysostigma . . .		40
metallica.		30
nitida.		10
4 lineata. Hbst. . .	1	30
tenebricosa . . .		30
variolosa. Payk. .		48

Agrilus.

	f	x
aeneicollis. M. . .		15
brevicornis. D. . .		15
chalconatus. M. . .		15
chalybeus. M. . . .		15
chlorodicus. M. . .		15
chryseus. Fröl. . .		15
coryli. And. . . .		15
cupreus. M. . . .		12
fuscipennis. M. . .		15
gracilicornis. M.		12
graminis. Pz. . .		15
longicornis. Schr.		15
nigricornis. M. . .		15
olivaceus. Schr. .		15
Spartii. D.		24
viridanus. M. . .		15
viridipennis. M. .		15

Trachys.

	f	x
austriaca. M. . .		24
scrobiculata. M. .		15

Aphanisticus

	f	x
emarginatus. . .		12

Elater.

	f	x
ahaeneus. M. . .		8
albipes. M. . . .		10
alni. M.		20
alpinus. D. . .		20
anceps. Z. . . .		18
angusticollis. M.		15
antennatus. M.		15
asphaltinus. Kn. .		15
atratus. Ill. . . .		20
aulicus. Pz. . . .		24
axillaris. M. . .		18
badius. Ill. . . .		15
bisbimaculatus.		20
brunnipes. M. .		18
chrysocomus. D. .		24
flabellicornis. D. .		24
flavicornis. Pz. .		4
Fraxini. D. . . .		15
fulvicollis. D. . .		18
fusculus. Ill. . .		4
gibbicollis. M. .		15
glycerus. Pz. . .		8
impressus. . . .		20
	16	10

50

106

Rhamphus

tomentosus. Vost. — 10

Falciger

Archarius

Hypera

is. . . — 20
ca. D. . — 30
. M. . . — 12
ata. Hbst. — 15
M. . . . — 15
nata. Hbst — 6
. . . . — 15
. D. . . — 18
pubescens. St. s. M. . . — 15
punctatosulcatu . . . . — 10
quadrimaculat Hbst. . . — 20
sanguineus. D. Dej. . . — 8
sulcatus . . . D. D. . . — 18

Elater

lepidopterus. Pz . . . — 40
limbatus. Peirol. . . — 18
linearis . . . . . — 20
litigiosus. Rosh. . . — 12
marginellus M. . . — 18
miniatus. M. . . — 10
nigritus. M. . . . — 20
nitidus. D. . . . — 20
nitidus. M. . . . — 15
pallipes D. . . . — 15
picipes. Fröhl. . . — 15
pomorum. Schw. — 10
rotundicollis. D. . — 10
Schneideri. M. . . — 20
sericatus. M. . . — 24
sticticus. Pz . . . — 12
striolatus. . . . — 6
terminatus. D. . — 24
tibialis. M. . . . — 15
unicolor. Ka. . . — 15
villosulus. D. . . — 15

Cyphon

discolor. St. . . . — 8
elongatus. M. . . — 8
haemorrhoidalis M — 8
limbatus. Fröhl. . — 8
minutus. Vogt . . — 8
pallidus . . . . — 12

Lampyris

italica. . . . . — 20

Cantharis

analis. . . . . — 15
apicalis. M. . . . — 12
cincta. M. . . . — 15
discicollis. M. . . — 15
erythroleuca. M. . — 15
fumata. Hellw. . . — 24
lividipennis. M. . — 12
pectoralis. D. . . — 15
pilosa. M. . . . — 15
rubricollis. M. . . — 15
tenebrosa. Ill. . . — 15

Silis

spinicollis. M. . . — 20

Malthinus

minimus. . . . . — 8

Malachius

femoralis. And. . — 15
pedicularis . . . — 8
rufus. . . . . — 12
viridis. . . . . — 15

11 10

Dasytes

aeneus. . . . . — 12
alpinus. D. . . . — 15
asphaltinus. M. . . — 12
aurarius. Hellw. . — 10
coeruleus. . . . — 10
crinitus. D. . . . — 20
micans. D. . . . — 12
nitidus. M. . . . — 12
pulverulentus. Dej. — 20
rubidus. Koy . . — 15
rufipinus. D. . . — 8

Drylus

flavescens. . . . — 20

Ptilinus

serraticornis. M. . — 15

Xyletinus

laticollis. M. . . — 15
testaceus. St. . . — 20

Dorcatoma

chrysomelinus. M. . — 15

Anobium

abietis. . . . . — 10
aeneicolle. M. . . — 20
aeneum. M. . . . — 20
castaneum. . . . — 18
crenulatum. M. . — 18
politum. M. . . . — 15
velutinum. M. . . — 20
villosum. Peirol. . — 20

Hedobia

vulpes. Z. . . . . — 24

Ptinus

bicinctus. D. . . . — 10
brunneus. M. . . . — 15
germanus. . . . — 10
regalis. D. . . . — 18
sexpunctatus. Pz . — 18

Scydmaenus

collaris. Ka. . . . — 15

Tillus

ambulans. . . . — 15

Trichodes

crassipedarius. M. — 15

Corynetes

pygmaeus. M. . . — 10
scutellaris. Pz . . — 18

Necrophorus

sepultor. Aad. . . — 30
Stygius. D. . . . 1 —

10 20

Silpha

cassidea. D.
ferruginea.
pertusa. M.
subsinuata.

Colobicus

axillaris. M

Ips

quadrinotat

Cambrus

discoideus.

Strongylus

pallidus. M.
striatus. Oliv

Nitidula

atra. D. . .
lugubris. Schi
pallida. D.
picea. M.
rufipes.

Cercus

bipustulatu
melanocephi
nigripes. M
scutellaris

Antherop

ferrugineu
pallens. Pz

Cryptopha

niger. Schü
picipes. Pz
porculus. M
ruficollis.
vini. Fröh

Catops

agilis.
badius. M.
brunneus
castanopt
dermestoi
fummatu
fuscus. Pz
laticollis
minutus
morio. Pz
rufescens

Derme

atomariu
catta. Pz
tigrinus

Attage

fulvipes.
Megatom

Aphodius

plagiatus. . . .
pubescens. St.
punctatosulcatu
quadrimaculat Hbst.
sanguineus. D. Dej.
sulcatus . . . D. D.

Scarabaeus

haemisphaericus.
Hypocrita. Schal
merdarius. M.

Geotrupes

ventricosus M.

Melolontha

aceris. Z. . . .
marginata. Hbst.

Anomala

errans. . . .

Anisoplia

arvicola. . . .
crucigera. Hbst
segetum. Hbst.

Omaloplia

carbonaria. Deflus.
limbata. M. . . .

Hoplia

pulverulenta.
pulvifera. And
pusilla. M. . .
rupicola. Bon.

Chasmatopterus

hirtula. Ill. . .
pilosula. Ill. . .

Cetonia

angustata. M.
lucidula. Z. . .
metallica. . . .

Platycerus

chalybeus. M. .

Axis

acuminata . . .

Tentyria

punctata. D. .

Blaps

cuspidata. M. .
punctata. M. .

Heliophilus

gibbus. . . . .
lusitanicus. Hbst.

Pandarus

clypeatus. Hellw.

nchus.
tatus. Gyl. — 20
s. M. . . — 18
Jacq. — 20
D. . . — 18
M. . — 12
us. D. — 15
. D. . — 15
s. Pz . — 8
lis. M. — 18
. . . . — 18
. . . . — 10
M. . . — 20
M. . . — 15
s. Dej. . — 8
. . . . — 15
us. Hbst. — 10
tus. . — 8
D. . . — 15
iatus. Ka — 8
D. . . — 15
ris. M. — 15

50

106

105

Rhamphus

rentosus. Vogt. — 10

Falciger

biguttatus

Archarius

elephas And

Hypera

Elater

lepidopterus Pz. — 40
limbatus Peirol. — 18
linearis — 20
litigiosus Rosh. — 12
marginellus M. — 18
miniatus M. — 10
nigritus M. — 20
nitidus D. — 20
nitidus M. — 15
pallipes D. — 15
picipes Fröhl. — 15
pomorum Schw. — 10
rotundicollis D. — 10
Schneideri M. — 20
sericatus M. — 24
sticticus Pz. — 12
striolatus — 6
terminatus D. — 24
tibialis M. — 15
unicolor Kn. — 15
villosulus D. — 15

Cyphon

discolor St. — 8
elongatus M. — 8
haemorrhoidalis M. — 8
limbatus Fröhl. — 8
minutus Vogt — 8
pallidus — 12

Lampyris

italica — 20

Cantharis

analis — 15
apicalis M. — 12
cincta M. — 15
discicollis M. — 15
erythroleuca M. — 15
fumata Hellw. — 24
lividipennis M. — 12
pectoralis D. — 15
pilosa M. — 15
rubricollis M. — 15
tenebrosa Ill. — 15

Silis

spinicollis M. — 20

Malthinus

minimus — 8

Malachius

femoralis And. — 15
pedicularis — 8
rufus — 12
viridis — 15

11 10

Dasytes

aeneus — 12
alpinus D. — 15
asphaltinus M. — 12
aurarius Hellw. — 10
coeruleus — 10
crinitus D. — 20
micans D. — 12
nitidus M. — 12
pulverulentus Dej. — 20
rubidus Koy — 15
rulpinus D. — 8

Drylus

flavescens — 20

Ptilinus

serraticornis M. — 15

Xyletinus

laticollis M. — 15
testaceus St. — 20

Dorcatoma

chrysomelinus M. — 15

Anobium

abietis — 10
aeneicolle M. — 20
aeneum M. — 20
castaneum — 18
crenulatum M. — 18
politum M. — 15
velutinum M. — 20
villosum Peird. — 20

Hedobia

vulpes Z. — 24

Ptinus

bicinctus D. — 10
brunneus M. — 15
germanus — 10
regalis D. — 18
sexpunctatus Pz. — 18

Scydmaenus

collaris Kn. — 15

Tillus

ambulans — 15

Trichodes

crassipedarius M. — 15

Corynetes

pygmaeus M. — 10
scutellaris Pz. — 18

Necrophorus

sepultor And. — 30
stygius D. — 1 —

10 20

Silpha

cassidea D. — 30
ferruginea Hbst. — 10
pertusa M. — 15
subsinuata Dej. — 30

Colobicus

axillaris And. — 24

Ips

quadrinotata — 15

Cambrus

discoideus M. — 8

Strongylus

pallidus M. — 15
striatus Oliv — 10

Nitidula

atra D. — 8
lugubris Schüpp — 8
pallida D. — 8
picea M. — 8
rufipes — 6

Cercus

bipustulatus — 8
melanocephalus M. — 8
nigripes M. — 8
scutellaris M. — 8

Antherophagus

ferrugineus Kn. — 20
pallens Pk. — 15

Cryptophagus

niger Schüpp — 15
picipes Pz — 8
porculus M. — 10
ruficollis M. — 8
vini Fröhl. — 12

Catops

agilis — 12
badius M. — 10
brunneus Kn. — 10
castanopterus M. — 12
dermestoides Pz. — 10
fummatus D. — 10
fuscus Pz — 12
laticollis M. — 12
minutus M. — 8
morio Pk. — 20
rufescens — 10

Dermestes

atomarius Z. — 20
catta Pz — 8
tigrinus — 18

Attagenus

falvipes D. — 18

Megatoma — 15

Trochoderma

elongatula — 10
subfasciata D. — 15
villosa D. — 15

Trogus

claricornis M. — 10

Arpidiphorus

viennensis M. — 15

Hister

aereus M. — 18
arenarius D. — 15
asphaltinus And. — 15
distinctus M. — 15
impressus — 24
metallicus — 10
nigellatus And. — 10
politus D. — 18
pygmaeus — 15
rufipes Payk. — 15
rugiceps Duft. — 15
variabilis M. — 10
viridis M. — 15

Hololepta

complanata Pk. — 18

Hypsenor

canaliculatus M. — 20
sulcatus — 24

Byrrhus

discoideus M. — 15
maurus M. — 20

Parnus

rufipes D. — 24

Elophorus

elegans Kn. — 15

Hydrochus

bicolor D. — 18
brevis Hbst. — 18
filiformis M. — 15
gemellus Ill. — 15

Hydrophilus

geminato-lineatus M. — 10

Sphaeridium

renipustulatum M. — 12

Copris

semicornis Pz — 15

Aphodius

anachoreta — 12
ater — 15
biguttatus D. — 20
congener M. — 20
interpunctatus M. — 12
moravicus M. — 15

	ℳ	₰
Aphodius.		
plagiatus. . . .	—	18
pubescens. St. . .	—	10
punctatosulcatus St.	—	12
quadrimaculatus	—	15
sanguineus. D. . .	—	18
sulcatus.	—	18
Scarabaeus.		
haemisphaericus. Ol.	—	30
Hypocrita. Schd. .	—	30
merdarius. M. .	—	15
Geotrupes.		
ventricosus. M. .	—	30
Melolontha.		
aceris. Z.	1	—
marginata. Hbst.	—	30
Anomala.		
errans.	—	24
Anisoplia.		
arvicola. . . .	—	24
crucigera. Hbst. .	—	24
segetum. Hbst. .	—	20
Omaloplia.		
carbonaria. Dej.	—	14
limbata. M. . .	—	15
Hoplia.		
pulverulenta. .	—	15
pulvifera. Ind.	—	15
pusilla. M. . . .	—	24
rupicola. Bon. .	—	24
Chasmatopterus		
hirtula. Ill. . .	—	24
pilosula. Ill. . .	—	24
Cetonia.		
angustata. M. .	—	24
lucidula. Z. . .	—	20
metallica. . . .	—	15
Platycerus		
chalybeus. M. . .	—	15
Axis.		
acuminata. . . .	—	48
Tentiria.		
punctata. D. . .	—	30
Blaps.		
cuspidata. M. . .	1	—
punctata. M. . .	—	20
Heliopsilus.		
gibbus.	—	24
lusitanicus. Hbst	—	24
Pandarus.		
clypeatus. Hellw.	—	30

	ℳ	₰
Phylax.		
lusitanicus. Schd.	—	24
Ulyssiponensis. Hell.	—	24
Isocerus.		
verrucosum. Germ	—	20
Tenebrio.		
ferrugineus. M. .	—	18
laticollis. Duft. .	—	24
Diodesma.		
unicolor. M. . . .	—	20
Hypophloeus.		
brunneus. M. . .	—	15
depressus. . . .	—	12
linearis.	—	8
Ulona.		
castanea. M. . .	—	24
Phaleria.		
unicolor. M. . .	—	18
Diaperis.		
bicolor.	—	20
Helops.		
aeneus. D.	—	24
Schmidtianus. M. .	—	40
Mycetophila.		
atra. D.	—	18
basalis. D.	—	20
filiformis. M. . .	—	15
Cistela		
atra.	—	18
nigritta. Gr. . .	—	15
ruficollis. . . .	—	24
sericea. D. . . .	—	20
sulphuripes. D. .	—	18
thoracica. . . .	—	18
Omophilus.		
pallidipennis. M. .	—	15
Anthicus.		
arenarius. D. . .	—	15
equestris. . . .	—	15
hirtellus. . . .	—	10
Monocerus.		
platycerus. Hoff. .	—	15
Scraptia.		
fusca.	—	20
Mordella.		
atomaria. . . .	—	15
axillaris. Ind. .	—	15
12 punctata. Rossi.	—	30
guttatofasciata. M.	—	10
testacea. . . .	—	6
unicolor. M. . .	—	10

	ℳ	₰
Anaspis.		
pallida. M. . . .	—	10
Meloe.		
cyanea.	—	10
glabrata. M. . .	—	12
laevigata. . . .	—	12
limbata. . . .	—	20
nodicollis. M. . .	—	15
punctata. . . .	—	10
scabricula. M. .	—	10
Zonitis.		
sexmaculata. .	—	30
varians. M. . .	—	30
Nothus.		
praeustus. Ols. .	—	20
Necydalis		
arundinis. D. . .	—	18
concolor. St. . .	—	8
seladonia. M. . .	—	20
subcyanea. D. . .	—	20
viridescens. M. . .	—	8
Oedemera.		
adusta. Pz. . . .	—	18
bipartita. Schr. .	—	20
chalybea. M. . .	—	15
cyanea. M. . . .	—	12
gagathina. M. . .	—	15
grisescens. M. . .	—	10
lurida. Gyll. . .	—	10
ruficollis. . . .	—	15
sanguinicollis. .	—	12
Salpingus.		
nitidus. M. . . .	—	12
Paropus.		
scabrosus. . . .	—	8
Anthribus.		
bisignatus. D. . .	—	40
~~brevirostris. Dr.~~	—	~~18~~
nigrirostris. M. .	—	18
obscurus. D. . .	—	24
peregrinus. Hbst.	—	15
Bruchus.		
imbricornis. . .	—	12
luteicornis. Pz. . .	—	12
~~marginellus~~		
nebulosus. Ols. .	—	12
nigripes. D. . . .	—	15
pilosus. M. . . .	—	15
quadratus. D. . .	—	15
rignipes. D. . . .	—	15
variegatus. M. . .	—	15
varius. Ols. . . .	—	15.

	ℳ	₰
Rhinomacer.		
necydaloides. M. .	—	15
Doidyrhinchus.		
austriacus. M. .	—	12
castaneus. M. . .	—	24
pallidus. M. . .	—	12
Rhynchites.		
aereus. D. . . .	—	12
azureus. Dej. . .	—	12
coeruleus. . . .	—	8
elongatus. Dej. .	—	12
giganteus. M. . .	—	10
hirtus. M. . . .	—	15
niger. M. . . .	—	12
nitens. D. . . .	—	18
opalizans. Z. . .	—	8
reticulatus. D. .	—	8
rotundicollis. D.	—	18
viridis. M. . . .	—	15
Apion.		
ahaeneum. D. . .	—	10
calceatum. M. .	—	8
campanulae. Kn.	—	8
chalybeum. Kug.	—	8
coerulescens. D. .	—	15
coeruleum. Hbst.	—	8
difficile. Hbst. .	—	10
dissimile. Schüp.	—	12
frigidum. Schüp.	—	8
fulvipes. D. . .	—	12
graminis. Kn. .	—	8
hirtellum. And. .	—	8
incrassatum. Schüp.	—	12
intermedium. Frölich	—	10
longicolle. M. .	—	12
longirostre. Ols.	—	12
numenius. Ill. .	—	15
oblongum. Kn. .	—	12
Pisi. M. . . .	—	10
punctirostre. M.	—	10
rotundicolle. M.	—	8
rufoannulatum. M.	—	8
rufirostre. . . .	—	12
sanguineum. M. .	—	4
semiaeneum. M.	—	10
subaeneum. D. .	—	12
subglobosum. And.	—	8
subulatum. Ill. .	—	8
sulcifrons. M. .	—	12
terrebrator. M. .	—	10
Viciae. Kirby . .	—	8
virescens. D. . .	—	10
viridipenne. M.	—	8

	℔	ß
		18
		10
s.M.		12
is		15
		18
		18
M.		30
		30
		15
		30
	1	—
		30
		24
		24
		24
		20
		14
		15
		15
		15
		24
		24
		24
		24
		24
		20
		15
		15
		48
		30
	1	—
		20
		24
		24
		30

Phylax.

lusitanicus. Schad.	—	24
Ulyssiponensis. Hell.	—	24

Isocerus.

verrucosum. Germ.	—	20

Tenebrio.

ferrugineus. M.	—	18
laticollis. Duft.	—	24

Diodesma.

unicolor. M.	—	20

Hypophloeus.

brunneus. M.	—	15
depressus	—	12
linearis	—	8

Ulona.

castanea. M.	—	24

Phaleria.

unicolor. M.	—	18

Diaperis.

bicolor.	—	20

Helops.

aeneus. D.	—	24
Schmidtianus. M.	—	40

Mycetophila.

atra. D.	—	18
basalis. D.	—	20
filiformis. M.	—	15

Cistela.

atra	—	18
nigritta. Gr.	—	15
ruficollis	—	24
sericea. D.	—	20
sulphuripes. D.	—	18
thoracica	—	18

Omophilus.

pallidipennis. M.	—	15

Anthicus.

arenarius. D.	—	15
equestris.	—	15
hirtellus	—	10

Monocerus.

platycerus. Hoff.	—	15

Scraptia.

fusca	—	20

Mordella.

atomaria	—	15
axillaris. And.	—	15
12 punctata. Rossi	—	30
guttatofasciata. M.	—	10
testacea	—	6
unicolor. M.	—	10

Anaspis.

pallida. M.	—	10

Meloe.

cyanea	—	10
glabrata. M.	—	12
laevigata	—	12
limbata	—	20
nodicollis. M.	—	15
punctata	—	10
scabricula. M.	—	10

Zonitis.

sexmaculata	—	30
varians. M.	—	30

Nothus.

praeustus. Olio.	—	20

Necydalis

arundinis. D.	—	18
concolor. ft.	—	8
seladonia. M.	—	20
subcyanea. D.	—	20
viridescens. M.	—	8

Oedemera.

adusta. Pz.	—	18
bipartita. Schr.	—	20
chalybea. M.	—	15
cyanea. M.	—	12
gagathina. M.	—	15
grisescens. M.	—	10
lurida. Gyll.	—	10
ruficollis	—	15
sanguinicollis	—	12

Salpingus.

nitidus. M.	—	12

Paropus.

scabrosus	—	8

Anthribus.

bisignatus. D.	—	40
~~brevirostris. D.~~	—	~~18~~
nigrirostris. M.	—	18
obscurus. D.	—	24
peregrinus. Hbst.	—	15

Bruchus.

imbricornis	—	12
luteicornis. Pz.	—	12
~~marginellus~~		
nebulosus. Olio.	—	12
nigripes. D.	—	15
pilosus. M.	—	15
quadratus. D.	—	15
signipes. D.	—	15
variegatus. M.	—	15
varius. Olio.	—	15.

Rhinomacer.

necydaloides. M.	—	15

Doidyrhinchus.

austriacus. M.	—	15
castaneus. M.	—	24
pallidus. M.	—	15

Rhynchites.

aereus. D.	—	12
azureus. Dej.	—	15
coeruleus	—	8
elongatus. Dej.	—	12
giganteus. M.	—	10
hirtus. M.	—	15
niger. M.	—	12
nitens. D.	—	18
opalizans. Z.	—	8
reticulatus. D.	—	8
rotundicollis. D.	—	18
viridis. M.	—	15

Apion.

ahaeneum. D.	—	10
calceatum. M.	—	8
campanulae. Kn.	—	8
chalybeum. Kug.	—	8
coerulescens. D.	—	15
coeruleum. Hbst.	—	8
difficile. Hbst.	—	10
dissimile. Schüp.	—	12
frigidum. Schüp.	—	8
fulvipes. D.	—	12
graminis. Kn.	—	8
hirtellum. And.	—	8
incrassatum. Schüp.	—	12
intermedium. Frölich	—	10
longicolle. M.	—	12
longirostre. Olis.	—	12
numenius. Ill.	—	15
oblongum. Kn.	—	12
Pisi. M.	—	10
punctirostre. M.	—	10
rotundicolle. M.	—	8
rufoannulatum. M.	—	8
rufirostre	—	12
sanguineum. M.	—	4
semiaeneum. M.	—	10
subaeneum. D.	—	12
subglobosum. And.	—	8
subulatum. Ill.	—	8
sulcifrons. M.	—	12
terrebrator. M.	—	10
Viciae. Kirby	—	8
virescens. D.	—	10
viridipenne. M.	—	8

50

106

Rhamphus

tomentosus. Vgt. — 10

Orchestes

aterrimus. Meg. — 8
confinis. M. — 8
flavicornis. D. — 15
hirtus. D. — 10
maurus. M. — 8
pilosus. Oliv. — 15
populeti. M. — 8
Rusci. Ill. — 15

Stenorhynchus

signatus. M. — 24

Cionus

distinctus. — 15

Cleopus

Anthyrini. Pz. — 10
elypticus. Hbst. — 8
flavocalceatus. M. — 12
labilis. Hbst. — 18
melaraphus. Hbst. — 18
pusillus. D. — 12
Ranunculi. Mill. — 12
scutellaris. D. — 15
Verbasci. Rosh. — 12

Sibinia

cinerea. D. — 12
nigrirostris. D. — 12
picirostris. — 4
polygrata. M. — 8
simplex. M. — 10
sparsuta. Oliv. — 15
suturalis. M. — 15
tomentosa. Hbst. — 10
velutina. D. — 12
vittata. D. — 20
vulpina. M. — 12

Sphaerula

globosa. — 15
Illmi. M. — 8
variabilis. M. — 8

Falciger

abbreviatulus — 8
Abjynthii. D. — 15
accipitrinus. Rosh. — 12
affinis. Panz. — 6
alauda. Hbst. — 4
albiventris. D. — 18
albosignatus. D. — 12
Andropogonis. Koch. — 15
arenatus. Hellw. — 15
asperatus. Hbst. — 15

Falciger

biguttatus. Fröhl. — 10
bruchoides. Hbst. — 12
campestris. M. — 12
Castor. — 4
crassulus. Kn. — 12
cribrum. D. — 12
cyaneonitens. Kn. — 10
cyaneopennis. M. — 12
deauratus. D. — 20
elypticus. Hbst. — 6
floralis. — 6
glaucinus. Ill. — 15
globulus. Ill. — 10
guttatus. Gr. — 10
haemorrhous. Hbst. — 12
horridus. Pz. — 12
immaculatus. D. — 12
intersectus. Kn. — 10
Lamii. Ill. — 8
Lima. M. — 12
maurus. M. — 8
melanasticus. Marsh. — 12
nanus. M. — 8
notula. Schüpp. — 12
Paroculus. Kn. — 15
pictus. D. — 12
pilosellus. Ill. — 6
pipperatus. D. — 18
punctum. D. — 15
quadricornis. Pz. — 12
reflexus. Kn. — 6
Roboris. Ill. — 8
rufipes. M. — 12
scriptus. D. — 20
scutellaris. D. — 15
signatus. D. — 15
smaragdinus. Dej. — 10
Sparganii. D. — 18
suturatus. M. — 18
trimaculatus. — 8
trivialis. Schüpp. — 12
undatofasciatus. Kn. — 8
vernalis. D. — 15
viridipennis. M. — 12

Arachnipes

alpestris. D. — 15
camelus. — 15
echinatus. M. — 15
fossulatus. M. — 15
Hypocrita. Gr. — 15
Lima. M. — 15
porcatus. M. — 12

Comasinus

sulcipennis. M. — 24

Archarius

elaphas. And. — 24
ferrugineus. M. — 12
nebulosus. M. — 15
nucleae. Kn. — 12
ornatus. M. — 15
pustulosus. M. — 15
pygmaeus. D. — 15
rufipes. D. — 15
scolopax. Fröhl. — 8
tigrinus. M. — 15
venosus. Kn. — 12
villosus. — 8

Rhynchaenus

affinis. Pk. — 8
agnatus. M. — 8
caliginosus. Fröhl. — 8
dissimilis. Hbst. — 8
interruptus. M. — 8
macropus. Fröhl. — 12
marmoratus. M. — 12
plagiatus. M. — 8
scalptor. Hbst. — 15
villosulus. M. — 10
tigrinus. D. — 12
tremulae. — 12
variabilis. D. — 8

Pilumnus

bipunctatus. D. — 18
brunnipes. M. — 12
funeralis. M. — 12
obliteratus. Hbst. — 15
Rhamni. — 15
Scirpi. — 12

Pallene

avara. M. — 10
Crataegi. D. — 10
humeralis. M. — 12
nigrirostris. M. — 10

Ellescus

sericatus. M. — 8
sericeus. D. — 12

Piniphilus

Hercyniae. Gyll. — 20

Callirus

irroratus. M. — 18
cribrum. Linaeus. M. — 15
monachus. Germ. — 30

Dirus

arcticus. Gl. — 30
biguttatus. D. — 18
distinctus. — 8

Hypera

arundinis. — 20
carniolica. D. — 30
cinerea. M. — 12
comaculata. Hbst. — 15
comata. M. — 15
contaminata. Hbst. — 6
Dauci. Ol. — 15
isabellina. D. — 18
laevifrons. M. — 15
murina. — 10
Oxalis. Hbst. — 20
pallida. Dej. — 8
palustris. D. — 18
perpensa. Rosh. — 12
piperata. M. — 15
Pollux. Gyll. — 15
punctata. M. — 15
Taraxaci. D. — 12

Macropelmus

Chamomillae. Koch — 12
didymus. M. — 15
frit. Hbst. — 8
filiformis. D. — 18
ornatus. M. — 20
productus. Ill. — 15
tempestivus. M. — 15
tibialis. M. — 15

Merionus

Hercyniae. M. — 20
honorus. Hbst. — 15

Gastrodus

gibbus. M. — 24

Loborhynchus

aeneopunctatus. Gyl. — 20
castanipes. M. — 18
corruptor. Jacq. — 20
Crataegi. D. — 18
distinctus. M. — 12
erythropus. D. — 15
glabratus. D. — 15
gracilipes. Pz. — 8
interstitialis. M. — 18
morio. — 18
ovulum. M. — 10
regularis. M. — 20
rubripes. M. — 15
ragusensis. Dej. — 1
setosus. M. — 15
tenebricosus. Hbst. — 10
trimaculatus. — 8
Troglodytes. — 15
undatofasciatus. Kn. — 8
vernalis. D. — 15
viridipennis. M. — 15

7 ℔ 12 ß

G. Gahl

	f	x
Prius.		
austriacus. .	—	18
lepidotus. Hbst	—	15
Mercurialis . .	—	18
Sims.		
fasciatus. M. .	—	15
hirticornis. Hbst	—	6
Chlorima		
flavescens. . .	—	15
graminicola. Ol	—	12
Polydrusus.		
aeratus. Kg. . .	—	10
albofasciatus. Hbst	—	10
arborator. Hbst. .	—	8
chrysolepis. Hoff. .	—	15
chrysomelus. Ol. .	—	20
cinerascens. M.	—	12
cyaneus. D. . .	—	15
distinctus. D. .	—	6
femoralis. M. .	—	15
floricola. Hbst.	—	6
grameus. D. . .	—	12
maculatus. D.	—	15
melanogaster. M	—	8
melanus. M. .	—	10
messor. Hbst. .	—	6
nigripes. M. .	—	10
nobilis. D. . .	—	18
ovulum. M. .	—	6
prasinus. Ol. .	—	15
punctulatus. M.	—	12
Scopoli. Kug. .	—	6
seladonius. D. .	—	15
sericatus. D. .	—	18
sparsus. D. . .	—	15
squamosus. Ka.	—	8
viridipes. M. .	—	10
Curculio		
albolineatus. D.	—	15
arenicola. M. .	—	12
atomarius. D. .	—	12
axillaris. M. .	—	12
caninus. . .	—	12
crinitus. Hbst.	—	8
discoideus. M.	—	8
erinaceus. D.	—	8
femoratus. M.	—	12
latirostris. Hbst	—	10
occator. Hbst. .	—	8
pertusus. M. .	—	10
plagiatus. M. .	—	12
setulosus. M. .	—	8
strigatus. M. .	—	10
sublineatus. M.	—	8

	f	x
Curculio.		
supinus. M. .	—	10
tibialis. Hbst. .	—	10
trilineatus. Vogt.	—	8
vulgaris. Cr. . .	—	8
Thylacites		
aurarius. Dej. .	—	15
avellanae. M. .	—	15
limbatus. . . .	—	15
porculus. D. . .	—	18
signatus. D. . .	—	18
Orodinus.		
femoralis. M. .	—	18
asphaltinus. Z.	—	24
Omias.		
albovittatus. D. .	—	8
bisignatus. D. .	—	15
geminatus. . .	—	15
hirtulus. D. . .	—	12
pallidus. D. . .	—	15
pilosulus. D. . .	—	15
rufipes. D. . .	—	15
rufulus. D. . .	—	12
scutellaris. M. .	—	15
sphaeroides. Cr.	—	12
ventricosus. D.	—	15
Ephradus.		
notulatus. M. .	—	15
ornatus. M. .	—	15
porculus. M. .	—	10
Cleonis.		
ericeti. D. . .	—	30
grammica. . .	—	18
4-carinata. M. .	—	20
Lixus.		
ferrugatus. . .	—	15
pulverulentus. .	—	18
Rhinobatus.		
brevis. Hbst. .	—	12
planus.	—	15
sturnus. . . .	—	15
teres.	—	12
tigrinus. . .	—	15
Rhinodes.		
aterrima. . . .	—	8
bipunctata. M. .	—	8
chalybea. M. . .	—	15
cyanea. M. . .	—	15
flavicornis. D. .	—	8
nigritta. M. . .	—	8
virens. M. . .	—	15

	f	x
Hexaphyllus.		
haemorrhoidalis.	—	4
haemorrhous. M. .	—	10
scutellaris. M. .	—	10
variegatus. M. .	—	18
Microrhynchus.		
attenuatus. M. .	—	12
chloris.	—	10
chlorodius. M. .	—	12
coeruleus. D. . .	—	15
cyaneus. M. . .	—	15
Lysfentericus. Rosf.	—	24
nitidus. M. . .	—	15
timidus. Rosf. .	—	15
Cossonus.		
castaneus. M. .	—	15
ferrugineus. M.	—	15
parallelepipedus. H	—	20
Rhyncolus.		
brevirostris. M.	—	10
crassirostris. Gr.	—	12
curvirostris. M.	—	15
gracilirostris. M	—	15
latirostris. M. .	—	12
longirostris. M.	—	12
sulcirostris. Cr.	—	12
tenuirostris. Cr.	—	15
Hylurchus.		
marginatus. Fröhl	—	10
opacus. Ill. . .	—	12
pinicola. Zk. . .	—	8
Hylesinus.		
minutus. . . .	—	8
varius.	—	8
Scolytus.		
destructor. Olis.	—	8
haemorrhous. M.	—	12
pusillus. M. . .	—	10
Bostrichus.		
decumanus. Kug.	—	12
dio don. Schüpp.	—	15
dispar. . . .	—	12
lithographus. Schüp.	—	12
megagraphus. M.	—	12
micrographus. .	—	12
pinastri. M. . .	—	10
pusillus. M. . .	—	12
signatus. F. (Apate)	—	15
terebrans. Schüpp	—	15
Tiliae. F. (Apate)	—	12
typographus . . .	—	4

	f	x
Apate		
sinuata	—	15
Cis.		
castanea. M. . .	—	8
micans.	—	8
nitida.	—	8
polita. Ill. . . .	—	8
reticulata . . .	—	8
Latridius.		
asperatus. M. . .	—	8
castaneipennis. M.	—	8
elongatus. Schüp.	—	8
fenestralis. . .	—	8
parvulus. Schüp.	—	8
rotundatus. Ill.	—	8
Mycetophagus.		
decempunctatus	—	8
fulvicollis. . .	—	8
variabilis. D. .	—	8
Triphyllus.		
obscurus. Dej. .	—	8
Synchita.		
variegata. Hbst.	—	8
Rhyzophagus.		
cylindricus. Pz.	—	8
Bitoma.		
contracta. . .	—	8
Colydium.		
filiforme. . . .	—	8
Lyctus.		
coronatus. M. . .	—	8
laevigatus. D. . .	—	8
nitidus. D. . .	—	8
pubescens. Pz. .	—	8
subarmatus. M.	—	8
Monohammus.		
piperatus. M. . .	—	8
sutor.	—	8
Acanthocinus.		
griseus. . . .	—	8
Pogonocherus.		
balteatus. . . .	—	8
Lamia.		
lugubris. . . .	—	8
Mesosa.		
curculionoides.	—	8
Dorcadion.		
atrum. Ill. . .	—	8

varius. Olis. . . . — 15.

...ricae. Kirby . .	—	8
virescens. D. . .	—	10
viridipenne. M.	—	8

	ℳ	₰
Saperda.		
rulescens. Schr.	—	8
bia.	—	18
ii. D.	—	20
thalmica. Ill.	—	30
tellaris. Böhm	—	30
escens.	—	8
Callidium.		
neum.		
enopoterus.		
tellatus. M.	—	24
eptura.		
ignata. D.	—	40
rura. M.	—	24
llens. D.	—	30
Tonacia.		
lens. Peirol.	—	18
linowskyi	—	24
lanocephala	—	30
ticulata. Latr.	—	24
riabilis. D.	—	18
Prsodacna.		
rulescens. M.	—	10
nea. M.	—	12
vicollis	—	12
neralis. Ol.	—	12
bata. Duft.	—	10
rola.	—	10
ricollis. Duft.	—	12
ripes. Duft.	—	12
acanthae. Abeille	—	8
ipennis. M.	—	12
tellaris. M.	—	12
Luchenia.		
rnocephala. M.	—	12
Lema.		
rpestris.	—	12
lybea. Hn.	—	10
nipennis. M.	—	12
ralis. Hellw.	—	15
assida.		
rgaritacea.	—	8
sina.	—	6
chella. Pz.	—	8
ndata. Hn.	—	15
biginosa. Ill.	—	15
gularis. M.	—	15
alleruca.		
ngata. D.	—	18
viventris D.	—	10

	ℳ	₰
Adimonia.		
circumdata.	—	12
marginata.	—	12
Altica.		
analis. Cr.	—	12
Belladonnae. D.	—	12
collaris. D.	—	15
cuprea. D.	—	12
metallica. Kn.	—	8
novella. Kn.	—	8
pannonica. D.	—	15
rufescens.	—	6
sericea.	—	8
Serpilli. Kn.	—	15
subcyanea. D.	—	10
subglobosa. D.	—	15
Phaedon		
punctatus. M.	—	15
Chrysomela.		
Centaurei.	—	8
femoralis. Oliv.	—	20
geminata. Payk.	—	10
grossa.	—	24
heteropuncta. M.	—	20
haemoptera.	—	18
Hyperici. M.	—	20
lurida.	—	15
marginata.	—	8
punctata. D.	—	20
subaenea. M.	—	20
Paropsis.		
decostigma. And.	—	24
flavicollis. D.	—	30
testacea. D.	—	20
tibialis. M.	—	18
Lina.		
alpina. D.	—	24
speciosissima. Scop.	—	40
Eumolpus.		
villosus. Rossi.	—	12
Clytra.		
chloris. D.	—	24
collaris. M.	—	12
nigripes. D.	—	15
rufipennis. Dej.	—	24
sexmaculata.	—	20
temesiensis. D.	—	18
tridentata. L.	—	10
Cryptocephalus.		
elongatulus. Z.	—	12
janthinus. Schüpp.	—	20
octoguttatus.	—	12

	ℳ	₰
Triplax.		
collaris.	—	15
elongata. Dej.	—	20
melanocephala. M.	—	20
rufipes.	—	12
sanguinicollis.	—	15
Phalacrus.		
haemorrhoidalis. M.	—	8
metallicus. M.	—	8
nitidulus. Schüpp.	—	10
Coccinella.		
bissexguttata.	—	8
Chrysomelina.	—	15
distincta. M.	—	12
gibba. M.	—	10
lunigera. M.	—	12
marginella.	—	8
19-maculata. M.	—	8
15-guttata.	—	8
15-punctata.	—	8
subglobosa. D.	—	8
6-punctata. D.	—	12
Scymnus.		
abietis.	—	8
bicinctus. M.	—	8
litura.	—	8
lunulatus. Ill.	—	8
minutissimus. Schr.	—	8
minutus. M.	—	8
Quercus. D.	—	8
rufipes.	—	6
Coccidula.		
bipunctata. M.	—	12
Lycoperdina.		
binotata. D.	—	40
Dapsa.		
nigricollis. D.	—	30.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No.

1. Lucan
2. Copris
3. —
4. Ateuch
5. Geotru
6. Melolo
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
12. —

13 Cetoni

14 —
15. —
16. —
17. —
18. —
19 —
20. Elate
21 —
22 —
23 Buprest
24. —
25. Alur

2 —

variabilis. Oliv. . . . — 15.

viridis. Kirby. . . — 8
virescens. D. . . — 10
viridipenne. M. — 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(57)

Verzeichniss der Käfer

№		ℳ	₰
1.	Lucanus femoratus. F. Oliv. ♂.	4	—
2.	Copris auricollis. M. ♂	—	3
3.	—— ciliata. M. C. ♀	—	1
4.	Ateuchus smaragdinus. F. ♂. ♀	—	3
5.	Geotrupes striatopunctatus. M. C. ♂	—	3
6.	Melolontha glauca. Oliv. ♂	—	3
7.	—— cerealis. M. C. ♂	—	3
8.	—— aenea. ♀. M. C.	—	1 30.
9.	—— nigriceps. M. C. ♂	—	2
10.	—— albosuturellata. M. C. ♂	—	1 30.
11.	—— undata. Oliv. ♀	—	— 48.
12.	—— rugicollis. Dejean. (fehlt im Fabricius)	—	30.
13.	Cetonia tetradactyla. F. Oliv. ♀	—	1
14.	—— fissifrons. M. C. ♀	—	1 20
15.	—— quadrivittata. Oliv. ♂	—	3
16.	—— lineola. F. ♀.	—	1.
17.	—— ephippium. F. ♀	—	— 48
18.	—— nebulosa. M. C. ♀.	—	1
19.	—— punctata. M. C. ♂	—	2
20.	Elater porcatus. Oliv. ♂.	—	5
21.	—— noctilucus. F. ♀	—	2
22.	—— suturalis. Oliv. ♂	—	3
23.	Buprestis bimaculata. Ill. ♂. (nicht gigantea)	—	4
24.	—— attenuata. F. ♂. ♀	—	6
25.	Alurnus limbatus. Ill. ♂.	—	6

№		ℳ	₰
26.	Curculio imperialis. F. ♂. ♀	—	10
27.	—— nobilis. Hbst. ♀	—	5
28.	—— hilaris. M. C. ♀.	—	5
29.	—— quadridens. M. ♂ ♀	—	6
30.	—— niveus. Oliv. ♂	—	4
31.	—— albidus. M. C. ♂ ♀	—	4
32.	—— leprosus. M. C. ♀	—	1
33.	—— bellicosus. Hbst. ♀	—	1 45.
34.	—— gibber. Hbst. ♂ ♀	—	2
35.	Rhinobatus pollinosus. M. C. ♂ ♀	—	2
36.	—— gemmatus. M. C. ♂ ♀.	—	3
37.	—— rufomaculatus. M. C. ♂ ♀	—	4
38.	Curculio nitidulus. F. ♀	—	1 30
39.	—— trilineatus. M. C. ♀	—	— 40
40.	—— stigma. M. C. ♂ ♀	—	1. 20
41.	—— albomaculatus. M. ♂ ♀.	—	1 30
42.	—— detritus. M. C. ♀.	—	— 40
43.	—— squameus. M. C. ♀.	—	— 48
44.	Falciger sanguinicollis. M. ♀	—	— 40.
45.	Lixus gigas. M. C. ♀.	—	1 30
46.	Cryptorhynchus nodulosus. M. C. ♂ ♀	—	8
47.	Calandra palmarum. F. ♂ ♀.	—	2
48.	—— deplana. M. C. ♂ ♀	—	3
49.	Brentus anchorago. F. ♀.	—	2
50.	—— ruficollis. Hbst. ♀.	—	1 30.
51.	Trichius adspersus. M. C. ♂ ♀	—	8.
52.	—— crinitus. M. C. ♂ ♀	—	2
53.	Synodendron barbatum. M. C. ♀	—	2

Mit Gruß und Handschlag

Ihr Freund

G. Dahl

№		℔	ʒ	ß
54.	Upis aeruginosa. F. ♂♀.	—	3	—
55.	Helops haemorrhoidalis. M.C. ♂♀	2	—	
56.	—— cupreus. M.C. 1.	—	1.	—
57.	—— azureus. M.C. ♂♀	—	2.	—
58.	—— bifasciatus. M. 1.	—	1	30.
59.	Gyrinus chalybeus. M.C. 1.	—	2	—
60.	Cassida gibbosa. Olis. 2.	—	4	—
61.	—— variolosa. M.C. 1	—	2	30.
62.	—— inaequalis. F. 2.	—	3	—
63.	—— 6guttata. F. 2.	—	3	—
64.	—— suturalis. Olis. 1	—	1	30
65.	—— axillaris. M.C. 1.	—	1	30
66.	—— bispinosa. M.C. 2.	—	3	—
67.	—— bidens. Olis. 1.	—	1	30.
68	—— chrysostigma. M.C. 2	—	3	—
69.	—— dives. M.C. 2.	—	1	30.
70.	—— centrata. M.C. 1.	—	1.	40.
71.	—— cincta. M.C. 1.	—	—	30.
72.	Eurolpus ignitus. Olis. ♂♀	—	4.	—
73.	—— brasiliensis. F. ♂.	—	1.	30.
74.	Colaspis nobilis. M.C. 1.	—	1.	—
75.	Coccinella limbata. Olis. 2.	—	1	30.
76.	—— chalybea. M.C. 1	—	—	30.
77.	Erotylus immaculatus. Olis. 1.	—	1.	—
78.	Chrysomela picta. M.C. 2.	—	3	—
79.	—— albocincta. M.C. 2.	—	3.	—
80.	Haltica thoracica. Ill. 1.	—	—	40.
81.	—— aequinoctialis. Ill. 2.	—	1.	40.
82	Lampyris flavellicornis. Olis. 1	—	—	48.
83.	Tenebrio occulata. M.C. 1.	—	—	40.
84.	Stenopterus sericeus. M.C. 2.	—	3.	—
85.	Stenocorus 4maculatus. M.C. 1.	1.	30.	
86.	Callidium regale. M.C. 1.	—	3	—
87.	Saperda humeralis. M.C. 1.	—	2	—
88.	—— lugens. M.C. 1.	—	2	30.
89.	—— bicornis. Olis. 1.	—	1	30.
90.	Callidium aeneicollis. M. 1.	—	1	—
91.	—— obscurum. M.C. 1.	—	—	48.
92.	—— spinicornis. M.C. 1.	—	1	30.
93.	—— amoenum. M.C. 1	—	—	45.
94.	Molorchus setosus. M.C. 1.	—	—	40.
95.	Prionus speciosus. Olis. ♀.	—	4.	—
96.	Stenocorus subocellatus. Olis. ♂.	3.	—	
97.	—— farinosus. F. ♂.	—	2.	—
98.	—— sericeus. M.C. ♂.	—	1.	—
99.	—— 6maculatus. M.C. ♂.	—	2.	—
100.	—— bicolor. M.C. ♀	—	2.	—
101.	Cerambyx sulcatus. Olis. ♂.	—	2.	—
102.	—— vittatus. Olis. ♂♀	—	5.	—
103	—— plumicornis. M.C. ♂.	—	2.	—
104.	—— rufipes. F. ♀	—	1	30.
105.	—— succinctus. F. ♂♀.	—	2	—
106.	—— papulosus. Olis. ♂.	—	3.	—
107.	—— batus. Olis. ♂.	—	2	30.
108.	—— barbatus. Olis. ♂♀.	—	8.	—
109.	Lytta canescens. M.C. ♂♀.	—	3.	—
			℔265	—

varius. Olis. . . . — 15.

ferrugineus. Kirby . . — 8
virescens. D. . . — 10
viridipenne. M. — 8

№		fl	xr
	Aus Ostindien		
110.	Cassida miliaris. F. 2.	—	2 —
111.	Cossiphus planus. F. 2.	—	1 30.
112.	Dytiscus festivus. Ill. 2.	—	1 30.
113.	Gymnopleurus granulatus. F. 2.		1. 30.
114.	Malachius latus. F. 2.	—	— 48.
115	Clythra pallens. F. 2.	—	— 48.
116.	Cryptocephalus Herbstii. M. 2.	1	—.
117.	——— plagiatus. M.	—	— 30.
118.	Pausus denticornis. M. 2.	—	3. —
		fl 12	6.
	Aus Egypten		
119.	Pimelia sericea. Olis. ♂.	—	4 —
120	——— hispida. Olis. ♂.	—	3 —
		fl 7	—
	Aus Brasilien blos Gattal	—	265 —
	" Ostindien " "	—	12 6.
	" Egypten " "	—	7. —
		fl 284	6

Die Kostspieligkeit mit Ausnahme Gattungen nur im Ganzen angegeben werden.
M. Ces. bedeutet dass die Bestimmung von dem k. k. Museum in Wien ist, und doch Insect neu ist.

№		fl	xr
	Aus Brasilien (109)		
	gelb Gattal.		
1.	Curculio imperialis. ♂	10	—
2.	Buprestis attenuata. ♂	6	—
3.	——— bimaculata. Ill. 1.	2	—
4.	Elater porcatus. Olis. 1.	—	2 —
5.	Cassida gibbosa. Olis. 1.	—	2 —
6.	——— inaequalis. F. 1.	—	1. 30.
7.	——— 6 guttata. F. 1.	—	1. 30.
8.	Cetonia 4 vittata. Olis. 1.	—	1 30.
9.	——— punctata. M. C. 1.	—	1 —
10.	Melolontha glauca. Olis. ♂.	3	—
11.	Copris auricollis. M. C. var.	1	30.
12.	Ateuchus smaragdinus. ♂	3	—
	Aus Ostindien		
	gelb Gattal.		
13.	Lamia rubus. F. 1.	—	1 30.
14.	Cassida miliaris. F. 2.	—	2. —
15	Cossiphus planus. F. 2.	—	1 30.
16.	Dytiscus festivus. Ill. 2	—	1 30.
17.	Gymnopleurus granulatus. F. ♂	1	—
18.	Pausus denticornis. M. ♂.	3.	—
19	Clythra pallens. F. 2.	—	— 48.
20.	Malachius latus. F. 2	—	— 48.
	Aus Egypten		
	gelb Gattal		
21	Pimelia sericea. Olis. ♂	—	4 —
		fl 51.	6.

110

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

varius. Olis. . . . — 15.

virescens. D. . . — 10
viridipenne. M. — 8

(52)

Ragusa d. 23 ten Juny 1823.

110

An Hochwohlgeboren

Wird Ihnen und Gebrüder, Ihr Befehl für die Lieferung meiner Uhren zur gefälligen Ueberlieferung gesandte Quittung in meine Freundliche und Ihnen ergebenste zu lesen, die ich so aufgesetzt habe wie meine Vorschriften sind, und bitte sie, solche, um diese Forderung Ihres zu Vollziehen. Von das auch Ew Hochwohl mir das Interessente verschaffen, eine Uhr Gelegenheit zu Senden.

Ich Ihnen nicht Ihnen Vollst und meiner Empfehlung bis zu meiner Zurückkunft bei sich zu behalten und Ihnen bitten werden selbe an den bestimmten Ort zu befördern. Auf welchen Ihr Empfehlungsschreiben wohl sich auf mich Ihr Hochwohlgeboren Gnadenbrief, Ihr Geschäftsfreund in Ihrer Angelegenheit Cordier bitten meinen gehorsamst zu Ihnen.

Mit Gruß und Hochachtung

Ew Hochwohlgeboren

ganz Ergebenster

G. Dahl

Von Wien

Von Gruner Grafen

Von Lieutenant

Von Heyden

Von

Von Linz

Von Steyr

FRANK
AI

varu

53

Verehrung nächst Bern Ujhely den 8ber 1823.

Euer Hochwohlgeboren

Wie ich so frey war einen Beitrag meiner Kenntniß der Schmetterlinge zu Ihrer Sammlung zu setzen, die ich für Sie dieselbe bis zu Ihrer gefälligen Rückkunft bei Seite gestellt habe, und so wird mir Ihnen sagen die Ihnen Danken zu können. Inzwischen befinde ich mich einen gedruckten Catalog einsenden und Ihnen meine Bereitwilligkeit zu bezeugen.

Wenden Euer Hochwohlgeboren diejenige Arten die ich zu meiner letzten Bereicherung beigegeben, behalten was übrig ist, oder belieben ist jene Arten zurück zu behalten Ihnen anheimgestellt wie was die billig finden Ihnen anzuweisen.

Ist Ihnen die Ihnen letzte Sendung in 12 Exemplaren bestanden alle elegant gespannt richtig bestimmt, alle rein und gut behandelt um den Betrag von 300 fl. Mz bei dem dortigen Mz Amte einst anzuweisen? ich würde Ihr Freund sein.

Die außerordentliche Seltenheiten Puncte ist die Ihnen Eulen Geometra Croatica 6 ♂ Saturnia Ihnen im äußersten Preis zu 30 fl. Sphinx Ocellata. 6 ♂ 12 Ihnen Ihnen. 10 fl. ein Ihnen. Nemeobius Lucina. 6 ♂ 12 fl. ein Ihnen. Pap: Podalirius 6 ein 12 fl.

— Agrotina.	319	—	20
Saperda opthalmica	332	—	30
Coreyra Cerisa.	359	—	8
— Velutina	360	—	8
			7 fl 12 kr

zu 10 ℔. und 9 dann zu 15 ℔ das Stück. Das Aimere sehr fein
f. 4 ℔. 96 ℔. Das Hippocrethuba. 2. f. a 2 ℔. d. 87. Das Bode
f. und 9 wunderschön 5 ℔.

Dann Minder Pulcher Aston sehr rein Schild rezogen
Das Lucilla. ein Stück 1 f. Camilla. ein Stück 1 f. Aust Cingulat
9 ℔ die in Croatien gestanden ein gestickt Stuer 8 ℔.

Eine gefällige Antwort entgegen Darauf bin ich mit

Gruß und Hochachtung

Ihr Ergebenster

Georg Langenbucher
G. Pabl.

An Wien
Die
WIEN
Wohlgeboren Herrn Herrn
Gottlieb Cordier
Für
Lehrer
Frankfurt
a/M.

Agrotum.	319	—	20
Saperda ophthalmica	332	—	30
Coreyna Serica.	339	—	8
— Velutina	340	—	8
			7 fl 12 kr

		fl	kr
		—	30
		1	36
		—	45
		1	36
		2	—
		1	36
		1	—
		3	—
		41	—
		15	—
		6	—
		49	30

Zu 10 ß
d. 4 ß.
d. und 9 ₰

Item M
Pap Zu
d. ₰ Si

Folgende Verkäufe sind vom Jahr 1824 gemacht worden:

No.		fl.	kr.	
3	Carabus delicatus	1	30	
~~4~~	~~Wolffii~~	~~3~~		
5.	semetricus	3		
7.	Cychrus granosus	3		
9.	Pterostichus ~~Dusallii~~	1	30	. . . 1/30
10	Heyderii			
13	Alpaeus transyloanicus	1	30	
16	Nebria Hoppferi	2	—	
18	Aptinus pyrenaeus	1	—	

55.

Nicht vorräthig waren von den bestellten Arten.

113

54

Necrophorus Sepultor	N 24	~~fl~~ kr 36	
——— Lucifer	— 25	1. —	
Coccinella Chrysomelina	— 39	— . 20	
Chrysomela Geminata	— 58.	— . 8	
Timarcha rugosa	— 73	— . 8	
Cryptocephalus janthinus	— 126.	— . 15	
Chlaenius velutinus.	— 164	1. —	
Sperchus emarginatus	— 194	— . 8	
Gyrinus cupreolineatus	207	— . 30	
Hydrachna Hermanni	— 240	— . 30	
Cassida vittata	— 254	— . 20	
Cebrio Gigas	270	1 — 45	
Buprestis chrysostigma	— 275	— 45	
——— cincta	— 282	— 6	
——— conjecta	— 285	— 10	
Acanthocinus atomarius	300	— 15	
Callidium unifasciatum	314	— 30	
Clytus semipunctatus	317	— 40	
——— agrorum.	319	— 20	
Saperda ophthalmica	332	— . 30	
Coreyra Servica.	354	— 8	
——— velutina	360	— 8	
		7 fl 12 kr	

Nr.

Dem Pyrame	10. —		
Del	3. —		
"	1.	30	
"	3. —		
"	3. —		
"	2. —		
"	3. —		
"	2. —		
"	1.	30	
Lemarbr Oleg	—	—	
"	1.	—	
"	—	. 30	
"	—	. 1.	30
"	—	. —	45
"	—	. 1.	36
"	2. Kl.	2. —	
"	—	. 1.	36
"	—	. 1.	—
"			
"		3. —	
"		41. —	
"		15. —	
"		6. —	
"		49.	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zu 10 ß
d. 4 ß.
d. und ß

Dann M.
Pap Zu
d ß Si

Spal. 7ß.12
Sphaerula ulmi Nov 262 — 18
Aphodius interpunctatus 390 7 — 1 15

ynsg Summa 8ß 15₰

Insignen Kunde ist
Leider Gattung

1. Pimelia planata. D. 211. 2ß —
2. ——. rugulosa. M. 133 1ß —
3. Akis reflexa. F. ucra 111 1ß —
4 Ophis 4. Signata. D. 233 1ß 30
5. Carabus purpuratus. St ß
6 —— Scabriusculus ß
7. —— Hungaricus. 111
8 —— Catenatus. 111.
9 Helcia erythrocephala ß 10
10 —— Dahlii. St. 111

Bitte die Schnecke auf meinem Verzeichniß dazu zu setzen und ob wird sich mit obiger Summe ausgleichen.

Folgende Insecten Preise vom Feb. 1824 wurde in Erfurt:

No			
3	Carabus delicatus	1	30
~~4~~	~~—— Wolffii~~	~~3~~	
5	—— semetricus	3	
7	Cychrus granosus	3	
9	Pterostichus ~~Dusallii~~	~~1~~	~~30~~
10	—— Heydenii		
15	Alpaeus transyloanicus	1	30
16	Nebria Hoppreri	2	—
18	Aptinus pyrenaeus	1	—
19	Chlaenius anaclypticus	3	—
21	Amblycerus bisuncatus		30
22	Argutor rufipes		48
25	Carabus gibbosus	2	—
~~26~~	~~Trichodes interruptus~~	~~1~~	~~30~~
28	Hyalus bimaculatus	3	—
	~~Diaperis armata~~		~~40~~
30	~~Tropiar violaceus~~		~~40~~
31	Brachycerus	1	—
32	Cleonis nebulosa	4	15 ~~30~~
34	—— scutcata		24
38	Loborhynchus ragasanus	1	—
~~37~~	—— glabratus		15 ~~30~~
39	Elater pyrenaeus		40
40	Clythra chloris		48
41	—— ~~cupripennis~~		~~48~~
~~42~~	~~Melolontha vagans~~		~~40~~
43	Calathus metallicus	1	30
44	—— gilvipes		48
45	Aromala rugipennis	*	30
		~~38~~	~~36~~
		33	28
		5	10
		38	(44) 36

55.

Dass alles für 50 Gulden kann ist wird dass wohl niemand unglauben.

im 20 fl. W.F. = 46 fl. 28 kr. in 24 fl. K.M.F.
36 fl. — — — für Cordier
82 fl. 28 kr. habe ich 31 July 1824 an Dahl geschickt.
288 fl.

Im Monat Januar 1823 machte ich meinen Freund Zeder die Lust zu Dem mir Unbekannten Dahl & Sohn Cordier ob wer mir Insecten Depositen wollte um die Hand Summa von 100 fl. C.M. [illegible]

Rx		
Herr Pyrame	10	—
— Del	3	—
— —	1	30
— —	3	—
— —	3	—
— —	2	—
— —	3	—
—	2	—
—	1	30
— —		
—		30
—	1	36
—		45
—	1	36
—	1	—
—		30
—	1	—
—		30
—		36
—		36
—		30
—		36
—	1	—
—		30
—	1	—
—		30
—		36
—		36
—		30
—		36
—		36
—		30
—		36
—		36

Zu 10 ℔
D. 4 ℔ .
H. und 9 ℔

Dann M
Sap Zu
d℔ ℔ Si

10 — Tabl. H. 13.

Bitte die Schrift mit meinem
Vergnügen dazu zu setzen und
ob vielleicht sich mit obiger Summe
abzufinden.

+ Räume eine also 34 ℔ gut, wo ich
mich mit 30 ℔ begnügen werde.
und arbeite ich mich mit diesen Gaben
die 10/56 Kr zu entschädigen, und die
übrige Zeit zu Nutzen.

Wissing nächst Wien 15 ten Febr
1824.

Für Hochwohlgeboren 56

Anzeigen, daß ich so frey bin ohnen
Ueber mein Schaffen mit Baltimore
Coleopteren und Lepidopteren zu Dir
zu Handen, da ich ohnen Sie in einer
Angelegenheit wegen die Herrligen
Cb Sysst. Cordier mich an Hochdieselben
zu wenden habe, glaubte ich mich zu
der Ansicht und Herstellung mehrerer
dieser Gattungen beste Arten zum Mittel
und da wird mich Gefälligst freuen, wenn ich
den Zweck nicht verfehlt habe.

Nun zur Sache

Im Monat Januar 1823 machte ich mein
Reise und Zeder die beste zu Dem
mir Unbekannten Band Cb Syst Cordier
als über mein Verzeichniß Lepidopteren welche
mir die Herr Inna über 100 ℔ Cb Ke be-

und den Syrana		10.—
—	del	3.—
—	ler	1.30
—	—	3.—
—	—	3.—
—	—	2.—
—	berg	3.—
—	ordnung Fl	2.—
—	—	1.30
—	Bernardus Reg	—
—	—	1.—
—	—	.30
—	—	1.36
—	—	.45
—	—	1.36
—	ner L. Reg	2.—
—	Dr	1.36
—	—	1.—
—	ist 18 Jahre	
—	in Leinwand	3.—
—	—	41.—
—	Ernst	15.—
—	—	6.—
—	—	49.30

Zu 10 ℔
d°. 4 ℔ .-
d°. und ℔

Dem M.
Pap Zu
d° ℔ Si

a Dingen war, Sr aber bei dem gehab
sich zeigte, daß unsere Acten nicht
schreiben Conservirt werden, und
folgende Acten wegbleiben, als
Pap. Pandora . 1. Bd. 1 ℔ 30
— Eumedon — 1 ℔ —
— Helle — — — 20
— Sylvius — — — 1 ℔ —
Bomb Spini. 2 — 2 ℔ —
— Arundinis. 1. — 2 ℔ —
Not Tetra — 1 ℔ 12
— Occulta . 1. — 1 ℔ 24
— Lateritia 1 — — 30
Summa 10 ℔ 56
c
um diese Zeitung abbleiben Anbezeichnete
habe ich zur actes folgende Acten mit
genommen.
Bro.
1. Pap Phoebus. 2 Bnd 2 ℔ 30
2. — Callidice 2 — 2 ℔ —

+ Räume eine alle 34 f gut, wo ist
mich mit 30 f begnügen werde.
Arbeitsse ist mich sind diesen Gratu
die 20/36 Kr zu entschädigen, und sol
übrige zurück zu nehmen.

Neu 4/30
3. Pap. Cynthia . f. — 2/30
4. — Gordius f. 2/40
5. — Sida . f. 12/—
6. — Phicomone f. 3/—
7. — Leander . f. 7/—
8. Nat. Lineckenii . f. 10/—
40.40

Dem der Extra Anlage
9. Nat. Menyanthidis 4 Mai f 4 —
(in Chorg. eingetragen) Summa 44 f. 40 Kr.

Sie werden mein Vorgehen
Recht finden.

Gütige Grüße mir der Bruder
Ernst Sie möchte mir
Ihr Einverständnis sagen, und Ihnen mich
mit Hochachtung empfehlen. Ihr
ergebener Freund Ihr aufrichtiger
Freund und besonders wenn Sie

Kr
Und den Figuren 10.—
— — der 3.—
— — 1.30
1.— — 3.—
— — 3.—
— — 2.—
— — 3.—
— — 2.—
— — 1.30
Dunkler Weg — —
— 1.—
— — .30
— — 1.36
— — .45
— 1.36
Lauer L. Weg 2.—
Dr 1.36
— 1.—
Mai 18 Falter
in Leipzig 3.—
Summa 41.—
Ernst 15.—
Hoffbeck 6.—
— —
49.30

zu 10
d. 4 ß.
d. und 4

Dann M
Pass Zu
d 4 Si

ob wieder Frühling, wo wegen niemanden
bei mir die Correspondenz aufhört, und
ich hatte im Gedanken meinen Entschluß
Ihnen und Ihnen selbst in Ihr schuldi Meine
Antwort, bis ich zum nachsinnen der Sache
die ich Ihnen Meinen Wunsch Ihnen
nachsuche, ich wendete mich an die Leben
und bin noch jetzt ohne Nachricht.

Da mir Ihr Brief sagte daß die
Gemeinschaft der Angehörigen die ganze
Sammlung, an die dortige Gesellschaft
der Naturforschenden Freunde gehören
sollen, und ich mich an Sie selbigen wenden
sollte. So wenig ich Sie Ihnen bitten
mir zu meinem Entschluß behilflich
zu sein, so ist Ihnen zu gut bekannt
daß ich Ihre Angelegenheiten besitze, und
ob wenn wohl nicht Ihnen ich Sie
Ihnen sollte.

Ich komme also 34 Kisten, wo ich
mich mit 30 K begnügen werde.
Meine Arbeiten ist mir bei diesen Gästen
die 20/36 Kr zu entschädigen, und die
übrige Zeit zu Reisen.

Ich Windrosse diese meine Dienste
Hr. bitte, sie mir bei der Gesell-
schaft zu accordiren.

Was die Lepidopteren meines
Herrn Bruders betrifft, sind gross
Raritäten, und ich bitte solche in
meinen Rechnungen der Doctrin Bern-
ley zuzutragen.

Die meine Raritäten Art der
Pterostichus, welche sich in den Gebirgen
Ihrer Gegend findet, wer ich so frey
Ihren Gütigen Namen in der
Entomologie zu verewigen, Ihr
Diese familia / a linda Reisen

viridis		Rap	muricatum
vulpina.		dor	Notoxus
Amphicoma			scutellaris. M.
abdominalis		tris	pallidus. Oliv.
Byrrhus		pra	Corynetes
echinatus. M		glo	cyanellus. Kr.
exilis. Zig		pha	Trichodes
stoicus. Müll		coeruleol	ammios
auratus.		puncta	apicita. Zig.
			fasciarius. Ill.
			transversalis M.

Rthlr		
und den Pyrame	10.	—
— — Sel	3.	—
— — ien	1.	30
1 — —	3.	—
— —	3.	—
— —	2.	—
— — berg	3.	—
— — ettinger Tid	2.	—
— —	1.	30
— — Bremischer Neg	1.	—
— —	—	30
— —	1.	36
— —	—	45
— —	1.	36
— — ner L. Neg	2.	—
— — Dr	1.	36
— —	1.	—
— — ist (18 Jahre		
— — in Leipzig	3.	—
— —	41.	—
— —	15.	—
— — Liebh.	6.	—
— —	—	—
	49.	30

zu 10 ß
d. 4 ß.
d. und 4

dann M
Pas Zu
d 4 Sie

Wirdiger Herr Pfarrer Lehrer. ich Hatte erst
8. Stück, worin 3. St und Tabelle, 1 St.
den L. L. Mustern Sie, und 2 den
Herr Hofrat unter diesen Adressen
Adressaten sind, Erwarten Sachen wird ich
Ihr Andenken Pfarrer, Sie ich meinen
Commentar fünd Herr Kreuz Einmachen
Jemand Sie, so ist der nächste Herr
Pfarrer, oder Sie ich Herr Hofrat
Gelehrten und Einsen nicht da Herr
Adressiren.

Wollten Herr die Collectoren
alle Diener, so bin ich bereit bei
den nicht übrigen Herrn Sachen
69 ß. 48 x. und die Stück Dinn ohne 30 ß.
zu übrigen, und bei den Lepidopteren
wird ich Hatte 49 ß 30 + 40 ß. rechnen.

Wollte aber Herr Hofrat Pfarrer
nur einzel Sachen, so Hatte ich Einband

nur zu meinem Gutachten beschränken
zu Herr, ob ich Ihnen zu gut Herr Land
noch ein Exemplar besitze, und
ob wir wohl nicht Pflicht wenn ich Sie
Lügen sollte.

geht Ungarn ab übrigens an Herrn
Oberregt. Schenner zu Dresden zu senden
Wenn ich recht Zeit über 8 Tage so wäre
Ich Ihnen eine Sendung machen könnte
Wir sind nun mit der Gegensendung Ihr
E. Hochw. die Kosten ohne Porto bezahlen
Hochdero schätzbaren Briefe.

Ich Empfehle mich Ihrer Freundschaft
und bin mit Wahrer Hochachtung

Ihr Hochwohlgeboren

Ganz Ergebenster
G. Dahl.

viridis	—	—	
vulpina.	—	—	
Amphicoma			
abdominalis	—	—	
Byrrhus			
echinatus. M	—	—	
exilis. Zig	—	—	
stoicus. Müll	—	—	
auratus.	—	—	

Rap			
dor			
Le			
tris			
pra			
glo			
pha			
coeruleo			
puncta			

muricatum			
Notoxus			
scutellaris. M.			
pallidus. Oliv.			
Corynetes			
cyanellus. Kz.			
Trichodes			
ammios	—	—	
apicita. Zig.	—	—	
fasciarius. Ill.	—	—	
transversalis. M.	—	—	

		M.	Pf.
1 Stück			
durch den Expreß		40.	—
—	—	3.	—
—	—	1.	30
1	—	3.	—
—	—	3.	—
—	—	2.	—
—	—	3.	—
—	—	2.	—
—	—	1.	30
—	—	—	—
—	—	1.	—
—	—	—	30
—	—	1.	36
—	—	—	45
—	—	1.	36
—	—	2.	—
—	—	1.	36
—	—	1.	—
		3.	—
		41.	—
		15.	—
		6.	—
		49.	30

zu 10 ß
d°. 4 ß.-
d°. und 9 ₰

Dann M.
Pap Zu
d° ₰ Si

[illegible] zu einem Gutsherrn [illegible]
zu sagen, ob er Ihnen zu gut [illegible]
Dass Sie Ihre Antwort [illegible], und
ob wir wohl einst Brandenburg sie
Lissabon sollen.

Bis — Ostern 1824

1. Carabus Rutilans. L. — — —

Bis

59 — Frühj. 1824

1. Carabus rutilans. 1 — Herbstst. Dahl. Ins. Tyrana. 10. —
1. —— Costatus. 1. —— —— Del. 3. —

Lethrus	Rossw?	Byrrhus	Rossw?	Lina	Rossw?
cephalotes — —		gigas.		Hanoverana	
Scarabaeus		Dianae		Anderschii M.	
alpinus. St. —		cinctus. Ill.		Crioceris	
Gymnopleurus		luniger. M.		adusta	
gibbus. Schneid.		angulifer. M.		Cryptocephalus	
Ateuchus		coronatus. Ill.		alpinus. Dahl	
pius. Ill — —		oblongus. St.		bisignatus. D.	
variolosus —		clandestinus. M.		frontalis. D	
Aphodius		repandofasciatus		geminus. M.	
depressus — —		Chrysomela		sanguinicollis	
depressus. Schwarz		gramica. M. —		terminatus. Gr	
sericatus. Dahl		graminicola. Pz		bis-tripunctatus	
moestus. Zig. —		carniolica. Duft		salicis	
vespertinus. Pz —		rufa. M.		connexus. Ill. —	
conjugatus —		globosa. M.		Wavarius. Fog	
moravicus. M. —		aerea. M.		Böhmii	
suturalis. Voigt.		crassimargo. M		elegantulus. K.	
alpinus. Frol.		haemisphaerica		strigosus	
sulcatus ——		Rossia. Ill.		interruptus. M.	
elevatus ——		Dahlii. Kn.		populi. Dahl.	
sulcicollis ——		lucida. Oliv.		cruciatus. Dahl	
vulneratus ——		affinis. Dahl		8partitus Ill.	
obscurus ——		collaris.		flavescens	
lugens. Cr. —		circumcincta. D		D° var.	
hydrochaeridis		marginalis M.		10punctatus	
villosus. Gyll. —		chalcitis. Dahl.		hyeroglyph. var aig	
limbatus. Zig —		nigra. Dahl.		histrio	
pallens. Dahl —		gemellata		scriptus Dahl	
varians. Duft.		Megerlei.		lignosus. Dahl	
Aesalus		chalybaea. Dahl		fimbriolatus. K.	
scarabaeoides —		fulgida.		tristis. Laich.	
Cetonia		Raphani		bigeminus. Ill.	
italica. M. ——		dorsalis		4pustulatus. K.	
viridis ——		Lina		flavoguttatus. Ol.	
vulpina. ——		tristis. Duft. —		villosulus. M.	
Amphicoma		praetiosa. Duft.		auratus. M.	
abdominalis —		gloriosa.		chlorodicus. Kr.	
Byrrhus		phalerata. Ill.		Fratorum. M.	
echinatus. M —		coeruleolineata		intrusus. M.	
exilis. Zig ——		punctata. M.		purpuratus. M	
stoicus. Müll —				nitens.	
auratus. ——					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zu 10
D. 4 ß.-
D. um 9 ß

Cryptocephalus
Centaureae. M.
viridis. M.
subtilis. Dahl
smaragdinus. Z
elongatus. Z
dispar. D.
variegatus
12 punctatus
axillaris. D.
abietis. Kr.
laetus
Clythra
chalibaeicornis.
impressifumera
cyanicornis. D.
axillaris. D.
fulgida. D.
humeralis
brachialis. Z.
4maculata —
calceata. M. —
elaticollis. M. —
appendicina M.
fasciata. M. —
macropus. M.
Horalis. D. —
flavicollis. M —
collaris —
concolor —
Colaspis
Ulema. —
Sinodendron
muricatum
Notoxus
scutellaris. M.
pallidus. Oliv.
Corynetes
cyanellus. Kr.
Trichodes
ammios —
apicita. Zig.
fasciarius. Ill.
transversalis M.

Cicindela
sylvicola. M. —
danubialis. M
integra. M.
nemoralis. Oliv.
littoralis
infracta
Cychrus
silesiacus. D.
elongatus
Blethisa
borealis
Chlaenius
spoliatus
festivus
zonatus. Pz
Dinodes
rufipes. Bon
Licinus
Hoffmannseggii
Idriensis. Dahl
Sphodrus
purpuratus. M.
Simichus
striatopunctatus
Pterostichus
flavofemoratus
Dahlii. M.
Sogenes
spinipes
Plotus
Illigeri
Cylindrus
magnus. M.
Carabus
purpuratus. Fl.
scabriusculus
hungaricus
catenatus

Nebria
erythrocephala
Dahlii. Fl. —
Scaurus
giganteus. M.
tristis. Oliv
Pinelia
planata. D.
rugulosa. M.
Axis
reflexa. F.
Tageria
quisquilia
Helops
asphaltinus. M.
Moluris
laevigata.
Pedinus
punctatus. Dahl
Pandarus
emarginatus
Tentyria
laevigata
Platyrotus
morbillosus
spurcatus. M.
variolosus.
rugosus. Hbst.
griseus.
Rosida
picta —
Lithophilus
connatus. Pz
Trogosita
coerulea
Erodius
bilineatus —
gibbus —
Parnus
obscurus. M.
vienensis. D.
Dumerilii. L.
villosus. Savi.

zu 10
d. 4
d. und 4

Idem M.
Pap Zu
d 4 Si

Cicindela
sylvicola. M. –
danubialis. M
integra. M.
nemoralis. Oliv.
littoralis
infracta

Cychrus
silesiacus. D.
elongatus

Blethisa
borealis

Chlaenius
spoliatus
festivus
zonatus. Pz

Dinodes
rufipes. Bon

Licinus
Hoffmannseggii
Idriensis. Dahl

Sphodrus
purpuratus. M.

Simichus
striatopunctatus

Pterostichus
Haaofemoratus
Dahlii. M.

Sogenes
spinipes

Plotus
Illigeri

Cylindrus
magnus. M.

Carabus
purpuratus. St.
scabriusculus
hungaricus
catenatus

Nebria
erythrocephala
Dahlii. St. –

Scaurus
gigantheus. M.
tristis. Oliv

Pinelia
planata. D.
rugulosa. M.

Axis
reflexa. F.

Tageria
quisquilia

Helops
asphaltinus. M.

Moluris
laevigata.

Pedinus
punctatus. Dahl

Pandarus
emarginatus

Tentyria
laevigata

Platynotus
morbilosus
spurcatus. M.
variolosus.
rugosus. Hbst.
griseus.

Asida
picta —

Lithophilus
connatus. Pz

Trogosita
coerulea

Erodius
bilineatus —
gibbus —

Parnus
obscurus. M.
vienensis. D.
Dumerilii. L.
villosus. Savi.

59

1. Carabus rutilans. 1 [illegible] Pyrame. 10.—
1. —— Costatus. 1. —— —— Del. 3.—

Gyrinus
bicolor
cylindricus. M.
elongatus. D.
striatus —
austriacus. D.
smaragdinus. D.
viridis. M.
ater. M.

Enhydrus
nigripes. M.
fulvicollis. D.
4-punctatus. Fr.
limbatus. D.
nitidus. Kr.
fulvus. M. —
marginatus D.
dentipennis. M.
signaticollis. M.
fuscipes. Lin
picipes
aeneus. D.
pallipes. M.
sulcisternalis. M.

Dytiscus
canaliculatus. K.
bipunctatus
4guttatus. M.
austriacus. D.
carbonarius
femoralis Pz.
affinis. Pz.
subtilis. Ill.
niger. Ill.
dolabratus Pz.
paloerosus. Kn.
trabeatus. Ill.
danubialis. D.
arcticus. Pz.

Hydroporus
angustulus. K.
pullus. Ko.
umbrinus. D.

Noterus
capricornis. Hrd.

Clytus
4punctatus
hieroglyphicus. M.
3fasciatus —
Sparedrus
testaceus. And.
M. [illegible] rufimana albilineata M.
[illegible] M. lineola
pustulata. M.
scutellata
hirsutula
Bugloffi. M.
ephippium
affinis. Pz
erythrocephala
suturalis.
violacea. M.
maculicornis.
Dahlii. Koy
margin [illegible]
niz ipes.
Verbasci. M.

Pachyta
quisentris. Dahl
reticulata.

Leptura
varians. M. —
nigrita. Dahl
femorata
villosa. Koy
velutina. M.
4guttata.
pubescens. M.
livida.
Chamomillae
bipunctata

Necydalis
nigra.

Osphia
clavipes.
femorata. M.

[illegible] Pyrame. 10.—
[illegible] Del. 3.—
[illegible] yer —— 1. 30
1 — —— 3.—
—— —— 3.—
[illegible] —— 2.—
[illegible] —— 3.—
[illegible] —— 2.—
[illegible] —— 1. 30
[illegible] Pz —— ——
—— 1.—
—— —— —— .30
—— 1. 30
—— —— .15
—— 1. 36
[illegible] Pz 2.—
[illegible] 1. 36
—— 1.—
[illegible] (18 Jahr
in Dresden 3.—
[illegible] 41.—
[illegible] 15.—
[illegible] 6.—
[illegible] 49. 30

Nro

59

1. Carabus rutilans S. 1 [illegible] Pyrane. 10. —

1. —— Costatus . 1. —— —— Del . 3. —

Gyrinus
bicolor
cylindricus. M.
elongatus. D.
striatus ——
austriacus. D.
smaragdinus. D.
viridis. M.
ater. M.

Enhydrus
nigripes. M.
fulvicollis. D.
4-punctatus. Fr.
limbatus. D.
nitidus. Kr.
fulvus. M. —
marginatus D.
dentipennis. M.
signaticollis. M.
fuscipes. Lin
picipes
aeneus. D.
pallipes. M.
sulcisternalis. M.

Dytiscus
canaliculatus. K.
bipunctatus
4guttatus. M.
austriacus. D.
carbonarius
femoralis Pk.
affinis. Pk.
subtilis. Ill.
niger. Ill.
dolabratus Pk.
paloerosus. Kn.
trabeatus. Ill.
danubialis. D.
arcticus. Pk.

Hydroporus
angustulus. Ko.
pullus. Ko.
umbrinus. D.

Noterus
capricornis. Hxd.

Cassida
azurea
sulphurea. M.
tigrina. Deg
silesiaca. M.
sanguinosa. Cr.
cruenta. M. —
signaticollis. M.
suturalis. Zig.
thoracica
austriaca
graminis. D.
maculata. Lin
atrata
subreticulata. M
Millefolii. D.

Eledona
dentata

Silpha
lunata
multipunc
brunnea.
alpina. B
sublinear
dispar. M
gibba. M
granulata. M.

Endomychus
cruciatus
fasciatus
4pustulatus.
alpinus. D.

Omophron
lepheroides. Olis.
elongatus. M.

Buprestis
albicollis. D.
alni. M.
antiqua. Hellw.
foveolata.
sepulchralis
millefolii
Cichorii. Olis.
Hyperici. Cr.
aurulans. M.
viridula. Zig.

Cytis 4-signata M. Calabria Rud.

Buprestis
Gallii. M.
coerulea. Rossi
filum. Cr.

Mystacus
bifasciatus

Melasis
flabellicornis

Elater
rufus

Prionus
scabricornis

Cerambyx
Wellensii. D.

Monochamus
sartor
sutor
maculatus. M.
conspersus.
subfasciatus. M

Acanthocinus
aedilis.

Pogonochorus
lusitanicus Ol.
arcuatus. M.

Parmena
unifasciata. Ross.

Pesomacha
dispar. M.
vittigera.
decipiens. K.
vittata. M.
bilineata
seductor. Zig.
holosericea.

Hispa
testacea

Pitho
coeruleus

Callidium
clavipes
undatum

Nro

59

1824

1. Carabus nitidus. 1 [illegible] Fyrana. 10. —

2. —— Costatus. 1. —— —— Del. 3. —

Gyrinus
bicolor
cylindricus. M.
elongatus. D.
striatus —
austriacus. D.
smaragdinus. D.
viridis. M.
ater. M.

Enhydrus
nigripes. M.
fulvicollis. D.
4-punctatus. Fr.
limbatus. D.
nitidus. Kr.
fulvus. M. —
marginatus. D.
dentipennis. M.
signaticollis. M.
fuscipes. Lin
picipes
aeneus. D.
pallipes. M.
sulcisternalis. M.

Dytiscus
canaliculatus. K.
bipunctatus
4guttatus. M.
austriacus. D.
carbonarius
femoralis Pk.
affinis. Pk.
subtilis. Ill.
niger. Ill.
dolabratus. Pk.
paloerosus. Kn.
trabeatus. Ill.
danubialis. D.
arcticus. Pk.

Hydroporus
angustulus. Ko.
pullus. Ko.
umbrinus. D.

Noterus
capricornis. Axd.

Cassida
azurea
sulphurea. M.
tigrina. Deg
silesiaca. M.
sanguinosa. Cr.
cruenta. M. —
signaticollis. M.
suturalis. Zig.
thoracica
austriaca
graminis. D.
maculata. D.
atrata
subreticulata
Millefolii. D.

Eledona
dentata

Silpha
lunata
multipunctata
brunnea. Hb.
alpina. Pz.
sublinearis. M.
dispar. Ill.
gibba. M.
granulata. M.

Endomychus
cruciatus
fasciatus
4pustulatus.
alpinus. D.

Omophron
lepheroides. Ols.
elongatus. M.

Buprestis
albicollis. D.
alni. M.
antiqua. Hellw.
foveolata.
sepulchralis
millefolii
Cichorii. Ols.
Hyperici. Cr.
aurulans. M.
viridula. Zig.

Buprestis
Gallii. M.
coerulea. Ross
filum. Cr.

Mystacus
bifasciatus

Melasis
flabellicornis

Elater
rufus

Prionus
scabricornis

Cerambyx
Wellensii. D.

Monochamus
sartor
sutor
maculatus. M.
conspersus.
subfasciatus. M.

Acanthocinus
costatus.

Pogonochorus
lusitanicus. M.
arcuatus. M.

Parmena
unifasciata. Ross.

Pesomacha
dispar. M.
vittigera.
decipiens. K.
vittata. M.
bilineata
seductor. Zig.
holosericea.

Hispa.
testacea

Pitho
coeruleus

Callidium
clavipes
undatum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Clytus
4punctatus
hieroglyphicus. M.
3fasciatus —
Sparedrus
testaceus. And.
a rufinana
albilineata
M. lineola
pustulata. M.
scutellata
hirsutula
Buglosi. M.
ephippium
affinis. Pz
erythrocephala
suturalis.
violacea. M.
maculicornis.
Dahlii. Koy
margin
noi ripes.
Verbasci. M.
Pachyta
ufiventris. Dahl
reticulata.
Leptura
varians. M.
nigrita. Dahl
femorata
villosa. Koy
velutina. M.
4guttata.
pubescens. M.
livida.
Chamomillae
bipunctata
Necydalis
nigra.
Osphia
clavipes.
femorata. M.

Carlharis
mutabilis. Hoff.
pallipennis. Dahl
alpina. Dahl
Cerogra
Tetra
vulpina. M.
Bulbifer
Cymaxilon
Rhyncolus
crassirostris. Cr.
Odontus
cylindricus —
Emblemus
repandus.
Sonus
isabelinus. M.
Brius
cuprifer. Dahl
Cuphorhynchus
complicatus. Koy
Simo
elegantulus. Z.
Conipherus
Scopoli. Kug.
Adrius
bisignatus. D.
Bryssus
sphaeroides. Cr.
Prosillus
ventricosus. D.
Cerocoma
Dahlii. Ill.
Zonitis
bifasciata. K.
sexnotata. M.
atrata. K.
fulvipennis.
4punctata
Oenas
crassicornis
afra.

Mylabris
algirica
3. maculata
4punctata
10punctata
Lazera. M.
australis. K.
flexuosa. W.
alpina. Bon.
Spartii. Germ
Lytta
austriaca. Zig.
Ophis
4signata. D.
Calabrica

Zu 10
D. 4 K.
K. und 9

Item M.
Pap Zu
K. 4 Si

Cantharis
mutabilis Hoff.
pallipennis. Dahl
alpina. Dahl
~~Cangra~~
Pitra
vulpina. M.
Bulbifer
Cymaxilon
Rhyncolus
crassirostris. G.
Odontus
cylindricus –
Emblemus
repandus.
Donus
isabelinus. M.
Brius
cuprifer. Dahl
Cuphorhynchus
complicatus. Koy
Simo
elegantulus. Z.
Conipherus
scopoli. Kug.
Adrius
bisignatus. D.
Bryaxis
sphaeroides. Cr.
Prosillus
ventricosus. D.
Cerocoma
Dahlii. Ill. –
Zonitis
bifasciata. K.
sexnotata. M.
atrata. K.
fulvipennis.
4punctata
Oenas
crassicornis
afra.

Mylabris
algirica
3. maculata
4. punctata
10punctata
Lazera. M.
australis. K.
flexuosa. W.
alpina. Bon.
Spartii. Germ
Lytta
austriaca. Fig.
Ophis
4signata. D.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(59) — Juli 1824

No		M.	Pf.
1.	Carabus Rutilans. ♂ aus Piemont, Stück aus dem Pyrenäen	10.	—
2.	——— Costatus. ♂. ——— ——— ———	3.	—
3	——— Delicatus. ♀ ♂ - ♂ aus Savoyen	1.	30
4	——— Wolffii. Neue Art. ♂ ♀ Lemnat	3.	—
5	——— Semistriatus. ♂ ♀. ♂ ♀	3.	—
6.	Procr: Bannaticus. ♂ Exemplar Dej.	2.	—
7.	Cychrus Granatus. ♂. neue Art. ♂ ♀ Steyerberg	3.	—
8.	Pterostichus parumpunctatus. Dej: Exemplar ♂	2.	—
9.	——— Duvalii. ♂. Savoyen	1.	30
10	——— Heydenii. Dahl ♂ ♀ aus dem Banat	—	—
11	——— Fischeli. ♂ ♀	1.	—
12	——— Fischeli. var wohl Stück	—	30
13	Alpaeus. Transsylvanicus. ♂ ♀	1.	36
14	——— brunneus. ♂. ♂ Savoyen	—	45
15	Nebria Reichii. ♂ ♀	1.	36
16	——— Hopfneri. ♂. ♂ aus Lapland ♂ ♀	2.	—
17	——— Heegeri. ♂ ♀	1.	36
18	Aystinus Pyranaus. Dej. ♂	1.	—
19	Chlaenius Oraclystieus. in Kleinen zieht sich		
	Kein Blutsystem, schwarz ist sie in Bewegung	3.	—
		41.	—
	[illegible]	15.	—
5.	Lycaena Dalia. ♂ ♀ in einem neuen Kasten	6.	—
6	Nerina Ambusta. neuen Art Dalia	10.	—
		49.	30

Nro		Tpl.	ℳ	₰
20.	Elaphrus Cupreus. auf Aspen	1	—	30
21.	Amblycerus bipunctatus. v Müller. nur 1 Stück		—	30
22	Aryutor rufipes. D. nur 1 Stück		—	48
23	Stenolophus melanocephalus. D. nur 1 Stück		—	24
24	Steropus. Concinnus. 1 Stück Savoyen		—	40
25	Carabus Gibbosus. Sieht. 1 Lausanne in Zimmt		2	—
26	Eleonophorus. Collaris. Mittelst Fenster. 1		2	30
27	Trichodes interruptus. v. M. 1 Zimmt		1	30
28	Apalus bimaculatus. 1 St.		3	—
29	Diapseris. Armata 1.		—	48
30	Triplax violaceus. Dy Croatien	1	—	40
31	Brachycerus. ?? Nur Savoyen		1	—
32.	Cleonis nebulosa. D. nur 1 Stück. 2		Zeitung	1 30
33	——— Ericeti. Nov. 1. Pfälzen		—	45
34	——— 3 Sulcata. 1 Aspen Gyllenhal		—	84
35	Loborhynchus. Ragusanus. Dey		1	—
36	——— Aneopsunctatus. Gyllenh. 2 Aspen		—	48.
37	——— Glabratus. D. 2 Dem: Wegen.		—	30
38	Silpha Subterranea. Dey. 1. Schaumburg		1	—
39	Elater Pyranaus. Dey: 1 St.		—	40
40	Clythra Chloris. Da. 1 Zimmt		—	48
			63	42

4punctata
Oenas
crassicornis
afra.

61.

Ich habe bezahlen
v. Hessl Frankfurt. Frühling 1824

No		Typ.	fl. kr.
	60		63. 42
41.	Clythra rufipennis. Dej. Fl. spanien	—	— 48
42	Melolontha Pagana. Oliv. I. Croatien	—	— 40
43	Calathus metallicus. D. Linn: Ungarn	—	1. 30
44	——— Gilvipes. Ill. Oesterreich	—	— 48
45	Anomala rufipennis. D. 2. var sp. Frankf.		1. —
46	Lina Speciosissima. Fl. Savoyen	—	1. 20.
	= gloriosa von Macaire		
		Summa fl.	69 48

An Lepidopteren wobey No.

1. Pap: Hexelana. 1 St. den oben 1 St. den unten im gemein Exempl, und den Türkischen Vollerey die Niemand zu besitzen hat 16 kr. — 18. —
2. —— Alcinoe. St. allen allen die sehr schön — — 4. —
3 —— V album in Oesterreich zu haben sehr selten 1 fl. — 2. 30
4 Sphinx Croatica St. in Croatien nie sehr schön Exempl. Aber nur selbst Leben zu haben — 15. —
5. Zygaena Lota. St. fl. in ungarn zu haben sehr selten — 6. —
6 Noctua Ambusta. zu haben sehr selten 10. — — 49. 30

Neu

Tpl. 41.157.

20. Elaphrus Cupreus. Duft. Schneider 1 — — — 30

den 26 May von Dahl geschrieben u. wieder für circa 30 ℔ Schaalen
u. bis Anfang July in die 30 ℔ v. der Gesellschaft 15te Stücke

61.

Ist Suba bezahlt
v. Forst. Vrednung. Frühling 1824

123

№ 3.	Carabus delicatus. M. 1N.		1–x
" 5.	Cscmetricus. Z. 1 N		1–30
" 7.	Cychrus granosus. 2N.		3–4
" 9.	Pterostichus Duvallii. 1N		1–30
" 10.	—— Heydenii. D. 84		4–4
" 13.	Alpaeus transylvanicus. 84		1–30
" 16.	Nebria Höpfneri. 84		2–4
~~" 18~~	~~Aptinus pyrenaeus. Dej. 1N~~		~~1–4~~
" 19.	Chlaenius anaclypticus. Kr. 84.		3–4
" 21	Amblycerus bipunctatus. M. 1N		4–30
" 22	Argutor rufipes. D. 84		4–48
" 25	Carabus gibbosus. 1N.		2–4
~~" 27~~	~~Trichodes interruptus. 1N~~		~~—~~
" 28.	Apalus bimaculatus. 1N		3–4
" 30	Triplax violaceus. Dej. 1N.		4–40
" 31.	Brachycerus?? 1N.		1–4
" 32	Cleonis nebulosa. D. 1N		4–45
" 34	—— sulcata. 1N		4–24
" 35.	Laborhynchus ragusanus. 1N.		1–4
" 37.	—— glabratus. D. 1N		4–15
" 39	Elater pyrenaeus. Dej. 1N		4–40
" 40	Clythra chloris. D. 84.		4–48
" 41	—— rufipennis. Dej. 84		4–48
" 42	Melolontha pagana. M. 1N		4–40
" 43	Calathus metallicus. D. 84		1–30
" 44	—— gilvipes. Z. 84		4–48
" 45	Aromala rugipennis. D. 1N		4–30
" 5	Zygaena laeta. 1N		3–4
" 6	Noctua ambusta. 1N		4–4
			38 / 36

Ferner Ist H. v. Apfaltr
zurückbekommen:

№ 1.	Papilio Roxelana 1N. v. stan	1–4
" 3.	—— v. album. 1N	9–4
" 4.	Sphinx croatica. 1N.	2–30
" 18	Aptinus pyrenaeus. Dej. 1N.	15–4
	Ferner Suba v. Apfaltr	1–4
		27 / 30

ytta chalybea — 2 – 48
rabus gemellatus — 1 – 30
30 / 45

21 / 16
30 / 45
52 / 1

Diese Suba ist von Dasse gegen Quittung
zurück behalten.

24
30
30
30
45
30
24
32 24

No

20. Class.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

63

Wien den 10ten Juny 1824.

125

Herrn Hochwohlgeboren

62 f—v

Carabus nitidans	10 —	Carabus delicatus	1—30
—— costatus	3 —	Chrysomela purpurea	—30
Procerus bannaticus	2 —	Tymarcha nervosa ♂♀	1 —
Cerostichus Findeliensar	—30	Acinopus scaritoides	—40
Ulpaeus brunneus	—45	Laborhynchus dulcis	—20
Carabaeus autumnalis ♂♀	1 —	Leptura velutina ♂♀	1 —
Chodeus chrysomelinus	—18	—— bisignata	—40
Hynchites praeustus	—24	Phylachites aurigrius	—15
Labrus incrassatus	—30	—— signatus	—18
Masceus elongatus	—20	Buprestis cariosa	3 —
Agenia filiformis ♂♀	—30	—— moerens ♂♀	3 —
Cyctophila atra	—20	—— reticulata	1 —
Lucanus depressus ♂♀	3 —	Laborhynchus ragusensis	1 —
Chlaenius 4sulcatus ♂♀	1—30	Coccinella chrysomelina	—18
Carabus excisus ♂♀	1—30	Opatrum verrucosum	—20
—— scyticus ♂♀	1 —	Purpuricenus ephippium	1 —
Pedinus helopioides	—30	Nyphona saperdoides	2—30
—— gibbulus ♂	—20	Saperda Cynarae	—45
Psilida Parensis	—30	—— distincta	1 —
—— fasciularis	—30	20 / 6	
Cylta chalybea	—18	Leptura apicalis	30
Carabus gemellatus	1—30	Ophonus columbinus	20
30 / 45		Hinnulus suturalis	20
		21 / 16	
		30 / 45	
		52 / 1	

Diese Sorten wie von diese ganz [illegible]
zurück behalten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No

20. Class

63

Wien den 10ten Juny 1824.

Euer Hochwohlgeboren

gefertigtes Schreiben de dato 24ten May, habe ich Ihnen mit folgendem zu beantworten: Dass Dieselben mich und meinen Mann, den sie daraufhin prüfen in Ragusa besuchen, recht sehr verbindlich machen würden, wenn Sie einstweilen auf Ihren Credit gegen 30 p. C. M. welche Sie gerade gefällig wären, dass Ihnen gütige Verwendung ertheilen will, und die 30 p. C. M. welche Sie für die gemachten Späse finden wollen, unten Einem also 60 p. C. M. mir durch Anweisung an die Herren Geymüller et Compagny zukommen, und die anliegende Liste bis zur Rückkunft Dahlo, die Sie behalten wollen.

Euer Hochwohlgeboren wegwerthen mir, dass Dieselben

Standende bei der Wiener Gesellschaft
[illegible] Gesellschaft in der
[illegible] Liste Gesellschaft Cordier
Da mir die Zeit so knapp zugemessen ist
so muss ich Ihnen mein Abreisen, die

No
20. Class

gesellschaft bei Hülfe der Auslagen, und schicken mich in dem Rund meinem Mann bis Geld in genugen stunden zu können.

für den Nichtzurückzahlungsfall bitte ich anzuschreiben, wünschte ich dennoch, dass Sie mir 30 f. nicht retour schicken, als bis zum 30 f. der Gesellschaft — welche sie im July oder dem nächsten Monath retour liquid machen sollen — dazugekommen sind, damit ich solchen unter Zinsen, die 60 f. C. M. auf Verbinnerungen Ostry wiederum können mögen.

Genehmigen Sie die Versicherung der vollkommensten Hochachtung mit welcher ich verharre

Euer Hochwohlgeboren

ergebenste Dienerin
Friderica Sahl

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ulmo

WIEN

Von der Zensur

Zensur Obre Lieutenant v. Heyden

Lebensklapbesamm

zu Frankfurt

am Mayn

Ko

10. Eloy

Wüsseny nächst Bin 24 Dec 824.

(65)

Hochedelgeborner

Ihr mich so sehr zu beunruhigen Ihr Morgen
p. st. I. ein Kistell unter Adr Westen Adresse
Brief An gleichen Inn Hier abgesch.
Inhalt Pr. [illegible]

Wüsseny nächst Bin 24 Nov 824

(64)

Mein hochgeehrtester Herr und Freund

Nur wenige Zeilen, Ihnen
meinen herzlichen Dank für Ihre
Zuvorkommenheit, mit der
Sie meine Wünsche, und die meines
Freundes Rayda erfüllten, in diesen schönen
Tagen Ihnen gesund, und sehr Arbeit
Ihnen reichen zu können. Descidoyt ad Collegium
mitgebracht, die ich Ihnen nicht in Ordnung
zu bringen Suche, da ich Ihnen selbst es
Ihnen Tochter werde um einen Ihnen
und Ihrer Familie zu unterhalten.

Ihr meinen herzlichsten Dank sich
Die gewünschten Exemplare, für Ihre gütigst
Anerbietungen bei der Naturforscher Gesellschaft
Ihnen meinen Gehorsam zu Füssen mir
Unterzeichneten Bericht Lichtenstein Cordier.

Da mir die Zeit so kümmerlich zugemessen ist
so muss ich Ihnen mein Abreisen, die

[illegible] 1824.

[illegible] 109 28.

[illegible] 3.. —

[illegible] 130

[illegible]	4 — 45
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 15
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 30
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 15
[illegible]	4 — 24
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 24
[illegible]	4 — 20
[illegible]	4 — 30
[illegible]	4 — 30
[illegible]	4 — 24
[illegible]	4 — 30
[illegible]	4 — 30
[illegible]	4 — 45
[illegible]	1 — 30
[illegible]	4 — 24
[illegible]	32 24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No

20. Class

Die Nummer ist, Namlich ich werde
Ihnen eine Sendung einsenden, deren
vollen Namen weder ich mit gebührlicher
weder Collegial angabe, Diese Sendung will
ich beifügen weder ich einsenden und finden
Sie den, Durchlaucht in beiliegenden Catalog
verzeichnet sind, Die übrigen Bücher
Die mir Ihnen Kisten, Ich übrige Bücher
Sie mir Ihnen Kisten Ihnen
werden, weder nach den der letzten Sen-
dung bei Ihnen steht. ist die gewöhnliche
nicht abgemangelt wie niemal den
Publicken Collegial in Ihrer Gebrauch
gegen jene Orten die dort stehen
so mache ich mir die Anzeigung Ihnen
und bitte zur weder mir ein Exemplaren
beizufügen, Ich mir den gütigen und
Conservierten Frieden.

Wiesbaden nächst Bonn d 4 ten December 824.

(65)

Der Hochwohlgeborne

Ihr ich so frey zu benachrichtigen daß morgen
d 5 d. J. ein Kistchen unter Adresse Adolph
Graf von Nassau
Ihnen per Fuhrwagen von hier abgehen.
Wird Sie per 1 Pf. 11 Sgr. Porto.

Ich bitte um eine gefällige spätere
Rückantwort, und Sonnst wird meine An-
ordnung folgen.

Empfehle mich unserm gemeinschaftlichen
Freund Herrn Obergerichts Rath Göthe
bitte zu empfehlen.

Mit Hochachtung Ergebenheit

Ihr ganz ergebener Diener
G. Pahl.

129

1824.

128

130

Clandius Z. IN.	4	45
Claudius D. IN.	4	20
Cornelius Ill. IN.	4	20
Cornelius Dej. IN.	4	20
Coletus Dej. IN.	4	20
Corinus D. IN.	4	15
Corbinus Gr. IN.	4	20
Crotanus IN.	4	30
Curtius IN.	4	20
Cephalus IN.	4	24
Gr. Dej.	1	30
Cus Hill. Dej.	1	30
Cus G. IN.	4	30
Claudius D. IN.	4	20
Cius D. IN.	4	15
Cus D. IN.	4	24
Ca D. IN.	4	20
Custus Peyrol IN.	4	24
IN.	4	20
Cretius D. IN.	4	20
Collis Dej IN.	4	20
Cosus Dej IN.	4	20
Call. IN.	4	24
D. IN.	4	20
Cius D. IN.	4	30
Cinus Z. IN.	4	30
Gr. IN.	4	24
D. IN.	4	30
IN.	4	30
Cs Ill. IN.	4	30
IN.	4	45
IN.	1	30
Cens. Dej IN.	4	24
IN.		

32 24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No

20. Class

Büttering nächst Prien 24 ten December 1824.

(65)

Euer Hochwohlgeboren

Hier ist so frey zu Verzeichnissen des Herrn Pfarrer Dahl in Tirol unter dem 20ten October d. J. ein Kistchen mit Insecten abgesandt. Darin befindet sich eine Schachtel worin 259 Stück Coleoptera sich befinden. Auf dem Boden des Kistchens sind die Numern die auf Verzeichniß der weiter aufgestellten nebst der nachherigen Berichtigung über die aufgestellten 26 fl.

Müssten die zum Theil wegen Insecten beschädigt sind, und ich offeriere Ihnen den 100 fl. 25. Procent Rabatt.

Ich verbleibe Ihrer gütigen Zusendung und bin mit Hochachtung und Verehrung

Euer Hochwohlgeboren

ganz gehorsamster Diener

G. Dahl.

103.	Cicindela chlorosa. Gr. 1 N.	4 — 30
101.	Halyplus bicolor. Dej. 1 N.	4 — 30
100.	— rufus. D. 1 N.	4 — 12
99.	Colymbetes 4punctatus. D. 1 N.	4 — 15
98.	Hydrophila atra. D. 1 N.	4 — 20
97.	Brylus flavescens. 1 N.	4 — 20
96.	Oxyteles [illegible] 2 N.	4 — 20
94.	— Taurus. D. 2 N.	4 — 30
93.	Xantholinus fulvipennis. D. 1 N.	4 — 18
92.	Staphylinus speculifer. D. 1 N.	4 — 24
91.	— Hamifer. D. 1 N.	4 — 24
90.	— granulatus. D. 1 N.	4 — 20
89.	— punctatissimus. Z. 1 N.	4 — 30
88.	— alutaceus. Gr. 1 N.	4 — 30
87.	— cribrosus. D. 1 N.	4 — 24
86.	— Lauri. D. 1 N.	4 — 30
85.	Cleonis flavicans. Ill. 1 N.	4 — 30
83.	— ulvericollis. 1 N.	4 — 30
82.	— ocularis. F. 1 N.	4 — 45
81.	Rhyzobates flavescens. Dej. 1 N.	1 — 30
80.	— Ursus. F. 1 N.	4 — 24

32 24

Nro

20. Class

67

Anmerkungen zu dem 6ten Bandes Fünfte 1824.
(vorzüglich über zweifelhafte Arten.)

Lytta chalybea. Faurh. Diese Ly. war ⅓ größer als mein von Ster. erhaltener (auch etwas größer als Lytta sp. n. Ster. № 14) u. die ~~Farbe~~ Farbe war dunkelgrün (wie die Farbe von Lytta sp. n. Ster. № 14.) Doch ist sie nicht zu unterscheiden.

Pimelia verrucosa. Gr. demselben Orte sehr häufig in mehreren Ly. von Grimm als P. subglobosa. erhalten. Diese deutsche Varietät ist ♂ ♀ ~~♂~~ ♀ unv.

Die Erhaltung des 6ten Bandes 130
Ende 1824

66

№		ℳ — ₰
146	Lytta flabellicornis. 2 N.	2 — 4
145	Pimelia subglobosa. 1 N.	1 — 4
141	Melolontha fulvicollis. ♀ N.	4 — 40
140.	—— dispar. ♂♀ 2 N.	1 — 30
139.	Opatrum elongatum. D. 2 N.	4 — 30
138.	—— verrucosum. 1 N.	4 — 20
136.	Asida fascicularis. Dej. 1 N.	4 — 30
135.	—— Zarensis. D. 1 N.	4 — 30
133.	Helops aeneus. D. 1 N.	4 — 20
130.	Pandarus dalmatinus. Dej. 2 N.	1 — 4
120.	Helops Rossii. G. 1 N.	
118.	Nicholas interruptus. 1 N.	
116.	Coccinella unicolor. D. 1 N.	4 — 20
115.	—— Pini. D. 1 N.	4 — 20
114.	—— chrysomelina. F. 1 N.	4 — 18
~~113.~~	~~Cryptocephalus pallifrons. Gyll. 1 N.~~	~~4 — 16~~
112.	Calleruca littoralis. Dej. 1 N.	4 — 20
111.	Lema marginicollis. D. 1 N.	4 — 24
110.	Clythra dentipes. Dis. 2 N.	4 — 48
108.	Chrysomela subaenea. Gr. 1 N.	4 — 20
107.	—— femoralis. Dej. 1 N.	4 — 20
106.	~~—— fabricae. Dej. 1 N.~~	~~4 — 20~~
104	—— cribrosa. Gr. 1 N.	4 — 30
103.	—— bicolor. Dej. 1 N.	4 — 30
101.	Haliplus pictus. D. 1 N.	4 — 12
100.	—— rufus. D. 1 N.	4 — 15
99.	Colymbetes hyunitatus. D. 1 N.	4 — 20
98.	Hydrophila atra. D. 1 N. ?	4 — 20
97.	Brylus flavescens. 1 N.	4 — 20
95.	Oxyteles ~~Taurus~~ unicornis. 2 N.	4 — 16
94.	—— Taurus. D. 2 N.	4 — 48
93.	Xantholinus fulvipennis. D. 1 N.	4 — 20
92.	Staphylinus speculifer. D. 1 N.	4 — 24

№		ℳ — ₰
80.	Sphodrus complanatus Z. 1 N.	4 — 45
79.	Pynchus punctatus. D. 1 N.	4 — 20
78.	Pogonus flavipes. Ill. 1 N.	4 — 20
77.	—— riparius. Dej. 1 N.	4 — 20
74.	Harpalus obsoletus. Dej. 1 N.	4 — 20
73.	—— thalassinus. D. 1 N.	4 — 15
72.	—— columbinus. Gr. 1 N.	4 — 20
71.	Aeropus montanus. 1 N.	4 — 30
70.	Omaseus elongatus. 1 N.	4 — 20
68.	Acinopus megacephalus. 1 N.	4 — 24
67.	Ditomus Dama. Gr. ♂♀.	1 — 30
66.	—— calidonius Hell. ♂♀.	1 — 30
63.	Zabrus inerassatus. G. 1 N.	4 — 30
64.	Polydrusus elegantulus. D. 1 N.	4 — 20
63.	Pylochites setulosus. D. 1 N.	4 — 15
62.	—— echinus. D. 1 N.	4 — 24
61.	Hypera ragusana. D. 1 N.	4 — 20
60.	Rhynchites praeustus. Peyrol. 1 N.	4 — 24
58.	Hianulus ? 1 N.	4 — 20
57.	Laborhynchus terrestris. D. 1 N.	4 — 20
56.	—— sulcicollis. Dej. 1 N.	4 — 20
55.	—— maxillosus. Dej. 1 N.	4 — 20
54.	—— Illicis. Dahl. 1 N.	4 — 24
52.	—— Rhamni. D. 1 N.	4 — 20
51.	—— granulatus. D. 1 N.	4 — 30
50.	—— punctatissimus Z. 1 N.	4 — 30
49.	—— lutaceus. Gr. 1 N.	4 — 24
48.	—— cribrosus. D. 1 N.	4 — 30
47.	—— Lauri. D. 1 N.	4 — 30
44.	Cleonis flavicans. Ill. 1 N.	4 — 30
43.	—— ulcericollis. 1 N.	4 — 45
42.	—— ocularis. F. 1 N.	1 — 30
41.	Rhynobates flavescens. Dej. 1 N.	4 — 24
40.	—— Ursus. F. 1 N.	
39.	Lix	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

67

Anmerkungen zu dem 6ten Bandes Ende 1824.
(vorzüglich über zweifelhafte Arten.)

Lytta chalybea. Faurh. Diese Ex. war ½ größer als wie von Fres. erhalten (noch etwas größer als Lytta sp. n. Fres. № 14) u. die Farbe mehr ins Dunkelgrüne (wie die Farbe von Lytta sp. n. Fres. № 14.) Dass sie nicht zu unterscheiden

Pimelia verrucosa. Gr. denselben Käfer habe ich in mehreren Ex. von Grimm als P. subglobosa. erhalten. Dieser deutsche Käfer ist v. d. P. ... D. inv.

66

Fortsetzung des 6ten Bandes Ende 1824

130

№		
146	Lytta flabellicornis. 2 M.	1 — 4
145	Pimelia subglobosa. 1 M.	2 — 4
141	Melolontha fulvicollis. 1 M.	1 — 4
140.	——— dispar. ♂♀ 2 M.	4 — 40
139.	Opatrum elongatum. D. 2 M.	1 — 30
138.	——— verrucosum. 1 M.	4 — 30
136.	Asida fasicularis. Dej. 1 M.	4 — 20
135.	———	4 — 30
133.	Helops aeneus. D. 1 M.	4 — 30
130.	Pandarus dalmatinus. Dej. 2 M.	4 — 20
129.	Helops Rossii. Gr. 1 M.	1 — 4
118.	Tricholes interruptus. 1 M.	1 — 4
116.	Coccinella unicolor. D. 1 M.	4 — 20
115	——— Pini. D. 1 M.	4 — 20
114.	——— chrysomelina. F. 1 M.	4 — 18
~~113.~~	~~Cryptocephalus pallifrons. Gyll. 1 M.~~	~~4 — 18~~
112.	Calleruca littoralis. Dej. 1 M.	4 — 20
111.	Lema marginecollis. D. 1 M.	4 — 24
110.	Clythra dentipes. Ols. 2 M.	4 — 48
108.	Chrysomela subaenea. Gr. 1 M.	4 — 20
107.	——— femoralis. Dej. 1 M.	4 — 20.
~~106.~~	~~——— labiata. Dej. 1 M.~~	~~4 — 20~~
104	——— cribrosa. Gr. 1 M.	4 — 30
103.	——— bicolor. Dej. 1 M.	4 — 30
101.	Haliplus pictus. D. 1 M.	4 — 12
100.	——— rufus. D. 1 M.	4 — 15
99.	Colymbetes 4punctatus. D. 1 M.	4 — 20
98.	Hydrophila atra. D. 1 M.	4 — 20
97.	Brylus flavescens. 1 M.	4 — 20
95.	Oxyletes ~~Taurus~~ unicornis. 2 M.	4 — 40
94	——— Taurus. D. 2 M.	4 — 48
93.	Xantholinus fulvipennis. D. 1 M.	4 — 20
92.	Staphylinus speculifer. D. 1 M.	4 — 24
90.	——— Dejeanii. D. 1 M.	4 — 45
~~87.~~	~~Melyris thalassina. D. 1 M.~~	~~4 — 24~~
84.	Rhyssodes europaeus. Dej. 1 M.	1 — 30
81.	Perystus dalmatinus. Dej. 1 M.	4 — 18.

20/~~27~~ 22

№		
80.	Sphodrus complanatus Z. 1 M.	1 — 45
79.	Synuchus punctatus. D. 1 M.	4 — 20
78.	Pogonus flavipes. Ill. 1 M.	4 — 20
77.	——— riparius. Dej. 1 M.	4 — 20
76.	Harpalus obsoletus. Dej. 1 M.	4 — 20
73.	——— thalassinus. D. 1 M.	4 — 15
72.	——— columbinus. Gr. 1 M.	4 — 20
71.	Aeropus montanus. 1 M.	4 — 30
70.	Omaseus elongatus. 1 M.	4 — 20
68.	Acinopus nigracephalus. 1 M.	4 — 24
67.	Ditomus Dama. Gr. ♂♀.	1 — 30
66	——— calidonius Hell. ♂♀.	1 — 30
63.	Zabrus inerassatus. G. 1 M.	4 — 30
64.	Polydrusus elegantulus. D. 1 M.	4 — 20
63.	Sylvechites setulosus. D. 1 M.	4 — 15
62.	——— echinus. D. 1 M.	4 — 24
61.	Hypera ragusana. D. 1 M.	4 — 20
60.	Rhynchites praeustus. Peyrol. 1 M.	4 — 24
58.	Hianulus? 1 M.	4 — 20
57.	Laborhynchus terrestris. D. 1 M.	4 — 20
56.	——— sulcicollis. Dej. 1 M.	4 — 20
55.	——— maxillosus. Dej. 1 M.	4 — 20
52.	——— Illicis. Gall. 1 M.	4 — 24
51.	——— Rhamni. D. 1 M.	4 — 20
50.	——— granulatus. D. 1 M.	4 — 30
49.	——— punctatissimus Z. 1 M.	4 — 30
48.	——— alutaceus. Gr. 1 M.	4 — 24
47.	——— cribrosus. D. 1 M.	4 — 30
44.	——— Lauri. D. 1 M.	4 — 30
43.	Cleonis flavicans. Ill. 1 M.	4 — 30
42.	——— ulcericollis. 1 M.	4 — 45
41.	——— oculatus F. 1 M.	1 — 30
40.	Rhynobates flavescens. Dej. 1 M.	4 — 24
39.	Lixus Ursus. F. 1 M.	4 — 30
38.	——— scolopax. Dej. 1 M.	1 — 4
37.	——— elegantulus. D. 1 M.	1 — 4
36.	——— rubiginosus. Dej. 1 M.	1 — 4
35.	——— Myagri. D. 1 M.	1 — 4
	——— 8lineatus. F. 1 M.	2 — 4

23/14

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro

20. Elap

Nº		ℳ — ₰
34.	Buprestis inculta. Gr. 1 M.	4 — 24.
33.	~~appendiculata.~~	
32.	— setulosa. D. 1 M.	1 — 30
31.	— 4lineata. Z. 1 M.	1 — 30
29.	— reticulata. R. 1 M.	1 — 4
27.	— cariosa. F. 1 M.	3 — 4
25.	Clytus Rhamnatis. Gr. 1 M.	4 — 30
24.	Callidium ~~sparsatum~~ dilicis. D. 2 M.	1 — 4
22.	Leptura apicalis. Dej. 1 M.	4 — 30
21.	Henopterus flavicornis. Dej. 1 M.	4 — 24
18.	Saperda distincta. D. 1 M.	1 — 4
17.	— Cynarae. G. 1 M.	4 — 45.
16.	Nyphona ~~sperdoides~~. Z. 1 M.	2 — 30
15.	Hamatycherus Sus. D. 2 M.	6 — 4
13.	Lysirhus albiventris. D. 2 M.	1 — 30
12.	Cetonia purpurascens. D. 1 M.	1 — 4
11.	— angustata. Dej. 1 M.	1 — 45
10.	Blaps occulta. D. 1 M.	1 — 4
9.	— dilatata. D. 1 M.	1 — 4
5.	Ortis Breyellii. Z. 1 M.	1 — 30
4.	— furcifera. R. 1 M.	4 — 45
2	Scarabaeus glabratus. Hoppe. 1 M.	4 — 30
1.	— bicolor. Z. 1 M.	4 — 30

	29	33
Columne 1.	20	22
" 2.	23	14
	73	69 ₰

No

20. Elap

No			
		ƒ	ß
34.	Buprestis inculta. Gr. 1 N.	—	24.
33.	~~appendiculata.~~		
32.	—— setulosa. D. 1 N.	1	30
31.	—— 4 lineata. Z. 1 N.	1	30
29.	—— reticulata. R. 1 N.	1	4
27.	—— cariosa. F. 1 N.	3	4
25. 26.	Clytus Rhamni. Gr. 1 N.	—	30
24.	Callidium illicis. D. 2 N.	—	4
22.	Leptura apicalis. Dej. 1 N.	—	30
21.	Henopterus flavicornis. Dej. 1 N.	—	24
18.	Saperda distincta. D. 1 N.	1	4
17.	—— Cynarae. G. 1 N.	—	45.
16.	Nyphona saperdoides. Z. 1 N.	2	30
15.	Hamatycherus Sax. D. 2 N.	6	4
13.	Lysipus albiventris. D. 2 N.	1	30
12.	Cetonia purpurascens. D. 1 N.	1	4
11.	—— angurtata. Dej. 1 N.	—	45
10.	Blaps occulta. D. 1 N.	1	4
9.	—— dilatata. D. 1 N.	1	4
5.	Ortis Breyellii. Zi. 1 N.	1	30
4.	—— furcifera. R. 1 N.	—	45
2.	Carabaeus glabratus. Hoppe. 1 N.	—	30
1.	—— bicolor. Z. 1 N.	—	30
		29	33
	Columne 1.	20	22
	" 2.	23	14
		73	69

67

Anmerkungen zu der 6ten Abtheilung Lieferung 1824.
(vorzüglich über zurückgeschickte Stücke.)

Lytta chalybea. Faurch. Diese Ly. war ⅓ größer als mein von Hes. erhaltener (auch etwas größer als Lytta sp. n. Hes. № 14) u. die ~~Farbe~~ Farben dunkelgrüner (wie die Farbe von Lytta sp. n. Hes. № 14.) Sonst nicht zu unterscheiden.

Pimelia verrucosa. Gr. demselben Käfer sehr ähnlich in unserer Ly. von Grimm als P. subglobosa. erhalten. Dieser beschriebene Käfer ist auch von Grimm. Ob dieser Käfer den Namen gründet, bezweifle oder gewonnen hat, weiß ich nicht. Den Käfer den Dejean als subglobosa schickte habe ich behalten.

Asida grisea — war Platynotus morbillosus der 1ten Lieferung
— fasicularis. Dej. Der zurückgeschickte Exemplare (♂?) war etwas kleiner u. schmaler und die gelben so wie die abgekürzte Längslinien der Decken etwas schwächer schwarz u. viel weniger ausgezeichnet.

— Zarensis. A. Bey dem zurückgeschickten Ly. war der Halsschild verhältnißmäßig kürzer als bey meinem. Ich finde aber diese Abweichung nicht so bedeutend zu sagen.

Calcar elongatus, maximum portug. Ly. ganz glatt, nur die Furchstreifen der Decken tiefer, fast von glatter Breite mit den Zwischenräumen. Diese nur etwas stärker punctirt.

Zuweilen etwas kleiner (♀) und nur der Mund gelb, die Beine aber schwarz.

Carabus rutilans. Größe u. Gestalt des C. cyaneus. Halsschild fast von der Gestalt des cyaneus. Oberseite glänzend goldgrün. Die Decken glatt mit 3 feinen eingedrückten Punkten. Fühler, Beine u. Unterseite schwarz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro

20. Clas

Helops aeneus. ♂. Dieses Ex. war etwas größer, mein H. caraboides
Pedinus gibbulus. ♂. ist in allen Theilen etwas schmaler
als P. latus. M. sonst aber von ihm nicht zu
unterscheiden u. dieser vielleicht das ♂.

— helopioides. G. ♂. Das ♂ besitze ich schon von Nürn.
das ♀ ist etwas größer u. seine Decken
sind nicht wie beym ♂ nach hinten verschmälert

Carabus scyticus. Koll. ♂. Farbe ist nicht deutlich. Er ist ganz wie
mein Car. granularis. M. u. noch nicht verglichen
die einzigen Merkmale die finden konnte, war
daß die hinteren Leiste des Halsschilds von der
Spitze ein wenig auswärts weichen, als an
diesem Ex. (wenig als bey den andern Ex. von gran.
die Tuberkeln u. Reihen waren ziemlich
stark abgerieben, etwas stärker als bey
meinem M. — Das Halsschild von dieser
Form u. Größe. Auch die Farbe. Die
Flügeldecken.

— excisus. St. ♂. Das ♂ ist von meinem C. gran. A. nicht zu unter-
scheiden, außer daß es etwas größer ist, und
die Tuberkeln ein wenig stärker u. glänzender
sind. — Farbe ganz gleich
Das ♀ gleicht ganz meinem C. gran. B. in Größe
u. Farbe, nur sind Halsschild u. Decken etwas
mehr convex, und auch zwischen hinter der Quer-
eindrücke sein beym C. gran. A. die Tuberkeln
sind ebenso stark u. glänzend als beym ♂.
Sonst finde ich keinen Unterschied.
Es wird wohl nur Var. von C. gran.
Auch das breitere schmalere Halsschild vom scyticus verschie-

	29	33
Columne 1. .	20	22
" 2. .	23	14
	73	89

Cymindis dorsalis. von Grimm = C. angularis. Gyll. (nach Dahl.)

—— miliaris von Grimm fort Dahl C. punctularis genannt.

Trichodes interruptus. bey einem Ex. war die vordere (unterbrochene) Binde fast verloschen.

Aphodius vaccinarius. H. Lebt auf Schaf von Gyssela verfolgen, diese (auf den Weiden) verlassen den Mist sie gegen die Nacht schwärzlich

Coccinella unicolor. D. Das eine Ex. war etwas grösser, u. Corp. u. Schildchen etwas dunkler. als die beiden.

—— Pini. D. die Flecken, besonders nach aussen zu, mehr zusammen geflossen.

Chrysomela elaticollis. D. Ich kenne diese Art deutlich mit C. graminis. unterscheiden. die beyden Ex. waren unter sich selbst nicht ganz gleich. bey dem einen war das Schildchen beiderseits etwas eingedrückt. bey dem andern war dasselbe mit der Stirn u. Schildchen u. Decken roth, mehr und verwaschener punctirt. die Farbe grün goldig, wie bey graminis.

—— subaenea. Gr. Das eine Ex. war etwas grösser und nicht so dunkel, sondern mehr vor die Farbe des C. alpina. D. — Auch war der Rand des Schildchens nicht wulstig, sondern schief, war kaum durch einen Querstrich eingedrückt angezeigt. Ich war in Versuchung sie für C. alpina. D. zu halten, doch ist bey dieser der Wulst eines viel deutlicher (besonders hinten) umgrenzt

—— Saliciae. Fej. Das Thier ziemlich mehr oder weniger mit gelb. Farbe auf dem Thorax erhalten. Das Thoracische Ex. etwas kleiner als =

Zuweilen etwas kleiner (Ex.) und mit der Mund gelb, die Beine aber schwarz.

Carabus nitidans. Grösse u. Gestalt des C. cyaneus. Schildchen fast von der Gestalt des cyaneus. Oberseite glänzend goldgrün. die Decken glatt und 3 Reihen eingedrückter Punkten. Fühler, Beine u. Unterseite schwarz.

Chrysomela purpurea. D. etwas größer und weiter violett als
C. chalybea. Dahl. sonst rein nur Stirn nicht
verschieden. Auch hat das Halsschild vorn
vor vorn ein Längsstrichelchen. (Zeigt vorn
abgab Farbenlinien punctata Stelle)
—— cribrosa. Gr. die Farbe zuweilen sonst ohne Farbenunterschied.
—— bicolor. Fab. Auf den Decken braunrot wenn bey einigen
Ex. daß die Zwischenräume der Punctreihen
schwarzblau eingefasst haben u. dann
einige ganz schwarz sind. Dadurch ist Kirbi
nur bey vollständigen Exx. kenntbar.
Zuweilen etwas kleiner.

Tymarcha nervosa. D. Farbe ist nicht verschieden von T. pratensis. M.
daß größer ♂ hat die schwarze Nähte einen
gedrückten Längsstrich auf dem Halsschild.
daß ♀ mit breiteren Fühlblättern hatte gar
keinen Längsstrich.
Mann T. pratensis. M. (ein ♂) zeigt die schwarze
Nähte einen schwachen Längsstrich.
Sonst finde ich keinen Unterschied.

Colymbetes 4punctatus. D. bey dem andern Ex. wovon die vordere Punct
reihe geschwindet, und daß Punctchen an der
Spitze fehlen. Scheint Abänderung mit 4 guttatus M.
aber die Beulenbinde verschieden.

Mycetophila atra. D. daß Grundgeschlecht ♂ wovon drey ♂ ganz gleich in
Farbe u. Beulenbinde, nur wovon ab schwärzer, besonders
Schild daß Halsschild. daß die Unterleib
braun war, war wohl Folge der Jungend.

Columne 1. .	29	33
" 2. .	20	22
	23	14
	73	69

Elater castanipes. Dahl. Ich kenne diesen Käfer von E. castaneipes Payk. nur unterschieden, besonders ist die Fühlglieder gegen sein breit maximam (E. castaneipes var. ped. obscurioribus. K. Die Beine vollkommen rein braun den ganzen Leib.
Die Farben des Halsschildes sind ganz wie bei E. rufipes, ebenso bei den folgenden Arten, das einzige Merkmal ist zu finden konnte, das ist dieses ganz unmerklich u. wohl nur zufällig.

Melyris thalassina. D. Fühl. abgrob. kleiner u. gröber punktirt von Sturm als Dasytes. No 31 erhalten.

Diaperis armata. Grösser als D. cornuta. Beg. von dort erhalten. Die beiden Vorderhörner sind zusammen etwas kürzer.

Rhysodes europaeus. Dej. Fühl etwas klainer.

Tagenia filiformis. ist ganz = den südfrankreichischen Ex.

Peryphus dalmatinus. Dej. Der andere ~~Ex~~ Ex (?) war etwas grösser, und die Beine u. Unterseite blasser. Hat nicht lange aufgeweicht.

Sphodrus complanatus. Z. Der eine Ex. war etwas klainer, u. der andere noch nicht lange aufgeweicht war, ganz braun.

Synuchus punctatus D. Der eine Ex. war etwas klainer, und die Beine ganz braun

Pogonus littoralis. Mg. = maximus alter Ex. Ein Ex. war etwas grösser u. oben glatt gegraben. Der andere oben glatt gross, die Beine aber lebhaft dunkelgrün.

Pogonus pallidipennis. Dej. = P. luridipennis. Germ.

——— riparius. Dej. ist von maximus nicht verschieden. Ex (v. Wien) Der eine etwas grösser als der andere. Bei dem andern Ex sind Fühler u. Beine etwas dunkler.

Zuweilen etwas klainer (5 Ex) und mit der Mund gelb, die Beine aber schwarz.

Carabus nitidans. Grösse u. Gestalt des C. cyaneus. Halsschild fast von der Gestalt des cyaneus. Oberseite glänzend goldgrün. Die Decken glatt mit 3 feinen eingedrückten Furchen. Fühler, Beine u. Unterseite schwarz.

31. 32+24

Nro

20. Clas

Acinopus scaritoides. Dj. wäre von ~~dem~~ warum Harpalus sabulosus von Nurn
nicht zu unterscheiden. Er hatte die Größe mit
kleinern Ex. — Ob von Ac. megacephalus zu
scheiden? die einzigen Unterscheide die ich
finden konnte sind; kleiner, die Füsse
etwas länger. —

Zabrus incrassatus. G. Ist/eben dass d'vorhalben. doch ist etwas
größere und die Decken sind nicht so glänz
(nur ein Fettglanz) ebenso sind die Fühlhörn
etwas schwärzer u. die Zwischenräume flach. Nr 58. Ha
Auch war die Farbe nicht so tief schwarz,
sondern fiel mehr ins braune. Die
Unterseite war ganz braun, etwas dunk Loborky
nicht ein jüngeres Ex. sein müssen braun.

Polydrosus elegantulus. D. Bey dem andern Ex. war die braune Farb
etwas dunkler, u. die binden artige Zeichn
weniger deutlich, obgleich nicht abgerieben.

Tylodites setulosus. D. Vorzüglich etwas größere u. das grünen nicht
ins gelbe fallend.

—— echinus. D. Vorzüglich kleiner und mit weniger hell
gemischten Decken, die Füsse schwarzbraun, die
Stirn viel Fallen hat.

Hypera ragusana. D. ist vielleicht = Donus budensis D.?

Rhynchites praeustus. Peyrol. Vorzüglich mit ganz schwarzen u. mit ganz rothen
Nr 39. —— saturalis. D. Decken.
Ich halte diesen Käfer nur für eine Abart des
C. geoffroius unserer Gegend. Er gleicht ihm in der
Färbung vollkommen, (besonders dem nicht ganz abgeb

Columne 1.. 29/33
" 2.. 20/22
23/14
73/89 Ar

Fuß gefärbten Kniegelenken). Nur zeigt er sich dadurch auch daß die Zwischenräume der 2. u. 3. Punktreihe, welche bei den hiesigen Stücken dunkelbraun gefleckt ist, hier fast ganz schwarz, u. nur selten durch hellere Farbe unterbrochen wird. Die unteren Seiten ist nicht so silberweiß wie bei unseren, sondern fällt ins gelbliche. (Das auf der Tafel so) das Halsschild kaum so abgerundet länger. Vielleicht zufällig.

№ 58. Hiamulus? mihi gracilis (Dahl.) Das ganze Thier etwas klainer u. die Decken dunkler u. mehr ins Farbig.

Laborhynchus terrestris. D. Das ♂ ist ein wenig schmaler.

—— sulcicollis. Dej

—— dulcis. Gr. Die beiden Fühler (Vorderbeine) breiter, als mein von Gyll. u. der sie ganz rein weißen, mit rothgelben gemein Füssen bedeckt. Taster mit gelben.
Vielleicht ♀? — Füßler rothbraun.

—— Rhamni. D. Das ganze Thier etwas klainer, glänzender u. weniger behaart. ♂?

—— punctatissimus. Z. Das ♂ bedeutend schmäler u. etwas kleiner.

—— alutaceus. Gr. Ein Bein vorigen

—— cribrosus. D. für ♀ etwas breiter. ♀?

—— Lauri. D. Das ♂ etwas schmäler.

—— ragusensis. Dej. Ich besitze von Dahl ein ♀. Das ♂ ist etwas schmäler, auch gewölbter etwas weniger glänzend. Bei ganz frischen Ex. ist die ganze Oberfläche rothbraun, auch die Fühler und Füße, mit einem weißen Reif überzogen. ganz = kahlen

Zuweilen etwas kleiner (♂?) und mit der Mund gelb, die Beine aber schwarz.

Carabus rutilans. Größe u. Gestalt des C. cyaneus. Halsschild fast von der Gestalt des cyaneus. Oberseite glänzend goldgrün. Die Decken glatt mit 3 feinen eingedrückten Furchen. Füßler, Beine u. Unterseite schwarz.

31. 32. 24

Nro

20. Elaph

Dasytes pulverulentus Dej. = D. carbonaris. D. der Paudung von Mosander.

Cleonis flavicans. Ulr. Bey einem Ex. wovon die Decken nicht so viel gelbliche Farbung, sondern weniger.

— ulcericollis. D. Die beyden schiefen Binden sind zuweilen etwas breiter. Auch etwas grösser. ♀?

— ocularis. F. Auch ein wenig grösser. ♀?

Rhinobates Ursus. F. Das ♂ Ex. (♀) der Rüssel ein wenig kürzer ($\frac{1}{3}$''')

Lixus scolopax. Dej. Auch etwas kleiner.

— elegantulus. D. Ein Ex. (♂) wovon ¼ kleiner u. die Decken wenig einfarbig bestaubt, das weisse Flecken. Der Rüssel kaum merklich kürzer.

— 8lineatus. F. Auch etwas grösser.

Buprestis appendiculata. Beyde Ex. wovon 1''' kleiner als mein Individuum Ex. sonst nicht verschieden von mir Heimat.

— reticulata. L. Das einen Ex. [illegible] wenig etwas kleiner.

— moerens. Z. = B. albicollis. Dahl (fremder Paudung) Ich finde unter Ex. B. albicollis gegen ein B. moerens verglichen. Ein Ex. wenig etwas grösser, die Punctstreifen etwas tiefer gröber u. offener (♂)

Clytus Rhamni. Gr. Auch etwas kleiner.

Leptura velutina. Auch etwas grösser. Zuweilen die Beine der Füsse etwas braunlich.

— apicalis. Dej. Das ♂ ist etwas kleiner.

Stenopterus flavicornis. Dej. Das ♂ ist kleiner.

— scutellaris. D. = St. fugax. F. (Dess v. Mosander.)

Saperda smaragdina. Dej. = S. violacea. Meg. (v. Dahl gesehen)

Nyphona saperdoides. L. Auch etwas kleiner.

Columne 1. . 29 | 33 | 22 | 47
" 2 . . 23 " 14
73 | 89

70

Von Holzgrabern Roten Exemplare eines Theils 1824 für
Meine Freundschaft 1824 Käfer
(B. H. sind alle Roten des Catalogs (mit Fragezeichen) die mir noch fehlen

~~Cicindela riparia Meg~~		12	Trachys austriaca. M.		24	Cantharis analis		15	Aphodius moravicus
Colymbetes fenestratus		15	— scrobiculata. M.		15	— apicalis M.		12	
— umbrinus. Payk		15	Aphanisticus emarginatus		12	— cincta M.		15	
Laccophilus variegatus. Kol		15	Elater ahaeneus. M.		8	— discicollis. M.		15	
Hydrophorus arcuatus		8	— albipes. M.		10	— erythroleuca.		15	
— areolatus		8	— alni. M.		20	— fumata. Hellis		24	
— canaliculatus. Hl.		15	— alpinus. Zahl.		20	— lividipennis. M.		12	
— erythrocephalus		8	— ancepos. Ziegl.		18	— melanocephala		8	
— granularis		6	— angusticollis. M.		15	— pectoralis. D.		15	
						— pilosa. M.		15	
						— rubricollis. M.		15	

69

135

Cetonia angustata. Dej. Die 2 eingedrückten Punctlinien auf dem Halsschild minder kenntlich. Sind zu Anfang oder sie dem rud. ähnlich.

Blaps dilatata. D. Das andere ♂ (??) etwas breiter u. die Decken in der Mitte mehr flach gedrückt. Die Decken neben der Naht und sehr schwach aber dicht gestreift. Noch etwas schwächer aber ungefähr noch einmal so oft, als bei B. oculata. D. (Auch behalten)

Ontis furcifer. R. Ein einem sonst ganz gleichen ♂ waren die beiden kleinen Vorsprünge am Vorderrand des Halsschilds, kaum bemerkbar.

Carabaeus glabratus. Hoppe. Einen ♂ ist der vordere Thorax gehalten, wie bei C. vernalis.

Carabaeus bicolor. Z. Scheint dem Mangel der Mittelrinne mit C. laevigatus sehr verwandt.

Cryptocephalus pallifrons. Gyll. auch von Wien ganz = gehalten Zuweilen etwas kleiner (♂) und mit der Mund gelb, die Brust aber schwarz.

Carabus nitidans. Grösse u. Gestalt des C. cyaneus. Halsschild fast von der Gestalt des cyaneus. Oberseite glänzend goldgrün. Die Decken glatt mit 3 feinen eingedrückten Punkten. Fühler, Beine u. Unterseite schwarz.

Dasytes pulverulentus Dej. = D. carbonaris. A. der Bindung von Masonder.

Cleonis flavicans. Ulr. Bey einem Ex. wovon die Decken nicht so viel gelbliche Farbung, sondern rothgrün.

— ulcericollis. D. Die beyden schiefen Binden sind zuweilen abwärts breiter. Rüssel abwärts grösser. ?!

— ocularis. F. Rüssel nur wenig grösser. ?!

Rhinobates Ursus. F. Das 1 Ex. (♂) der Rüssel nur wenig kürzer (1/3 III)

Lixus scolopax. Dej. B. 1 1 02.

70

Von folgenden Arten kann ich nur 1 Stück liefern

Meine Bestimmung dieser Arten ist 1824 Stück 4 109 28.

B. C. sind alle Arten des Entwurfs (mit Fragezeichen) die mir noch fehlen 3..

	℔	ß
~~Cicindela riparia Meg~~		12
Colymbetes fenestratus		15
— umbrinus Bad		15
Laccophilus variegatus Kol		15
Hydrophorus arcuatus		8
— areolatus		8
— canaliculatus Hl.		15
— erythrocephalus		8
— granularis		6
— palustris		8
— parallelogrammus Kn		24
— pictus		8
— silphoides Boe		18
— unilineatus Schr		8
Hyphidrus 4guttatus		15
Haliplus fulvus		10
— ferrugineus Pk		10
— Harziniae D.		15
— lineolatus		15
— maculatus D.		15
— ruficollis Kn		10
Gyrinus angustatus A		15
— nitidus Meg		15
— nitidulus Zahl		15
— stagnalis D.		12
— splendidus M.		12
— velox		15
Buprestis carniolica		15
— chrysostigma		40
— maculicollis Dej		30
— metallica		30
— nitida		10
— variolosa Pk		18
Agrilus aeneicollis Meg		15
— brevicornis D.		15
— chalconatus M.		15
— chalybeus M.		15
— chlorodius M.		15
— chryseus Frohl		15
— coryli And.		15
— cupreus M.		12
— fuscipennis M.		15
— graecilicornis M		12
— graminis Pz		15
— longicornis Schr		15
— nigricornis M		15
— olivaceus Fabr		15
— spartii D.		24
— viridanus M.		15
— viridipennis M.		15
	13	11

	℔	ß
Trachys austriaca M		24
— scrobiculata M.		15
Aphanisticus emarginatus		12
Elater ahaeneus M.		8
— albipes M.		10
— alni M.		20
— alpinus Zahl		20
— anceps Ziegl		18
— angusticollis M.		15
— aptenpatus M.		15
— asphaltinus Kn.		15
— atratus Hl.		20
— aulicus Pz		24
— axillaris M.		18
— badius Hl.		15
— bisbimaculatus		20
— chrysocomus L.		24
— flabellicornis D.		24
— flavicornis Pz		4
— fraxini L.		15
— fulvicollis D.		18
— fusculus Hl.		4
— gibbicollis M.		15
— glycerus Pz		8
— impressus		20
— lepidopterus Pz		40
— limbatus Peir		18
— linearis		20
— litigiosus Rossi		12
— marginatus L.		12
— marginellus M.		18
— miniatus M.		10
— nigripus Kug		12
— nigritus M.		20
— nitidus D.		20
— nitidus M.		15
— obscurus		18
— pallipes D.		15
— picipes Fro		15
— pomorum Sch		10
— rotundicollis D.		10
— schneideri M.		20
— sericatus M.		24
— sticticus Pz		12
— striolatus		6
— terminatus D.		24
— tibialis M.		15
— unicolor Kn.		15
— villosulus D.		15
— vittatus Zahl		20
Cyphon discolor St.		9
— elongatus M.		8
— haemorrhoidalis M		8
— limbatus Fröl		8
— minutus Vogt		8
— pallidus		12
	14	29

	℔	ß
Cantharis analis		15
— apicalis M.		12
— cincta M.		15
— discicollis M.		15
— erythrolenca		15
— fumata Hellw		24
— lividipennis M.		12
— melanocephala		8
— pectoralis D.		15
— pilosa M.		15
— rubricollis M.		15
— tenebrosa Hl.		15
Malachius spinicollis M.		20
Malthinus minimus		8
Malachius femoralis Kn		15
— pallipes M.		8
— pedicularius		4
— ruficollis		10
— rufus		12
— viridis		15
Dasytes aeneus		12
— alpinus D.		15
— asphaltinus M.		12
— aurarius Hellw		10
— crinitus L.		20
— micans L.		12
— nitidus M.		12
~~— pubicornis Dej~~		
— rubidus Kug		15
— vulpinus D.		8
Trylus ater Dej		12
Ptilinus serraticornis M		15
Xyletinus ater Pz		12
— laticollis M.		15
— testaceus St.		20
Torneuma chrysomelinum		15
Hedobia Vulpes E.		24
Ptinus bicinctus L.		10
— brunneus M.		15
— germanus		10
— regalis D.		15
— sexpunctatus		18
Trichodes crassipedarius		15
Corynetes pygmaeus		10
— scutellaris		18
Silpha cassidea D.		30
— ferruginea M		10
— pertusa M.		15
Colobicus subsinuata Dej		30
Colobicus axillaris Ahr		24
Ips 4-notata		15
Cambrus discoideus M		8
Antherophagus pallens Pz		15
— ferrugineus Kn		20
	13	0

Aphodius moravicus

18 — Distincta D. — Kayser . 2. 2.

nicht Dahli. Die Fussfärbung nicht

gleich H.

. 31. 32

Nro

20. Elaph

is		12
ius. M.		10
aeus. Kr.		10
cnopterus. M.		12
mestoides. K.		10
pumatus. Z.		10
fuscus. K.		12
laticollis. M.		12
minutus. M.		8
morio. Payk.		20
rufescens.		10
sericeus.		8
tristis. K.		10
Dermestes domarius. Z.		20
calla. K.		8
tigrinus.		18
Attagenus fulvipes. D.		18
Megatoma.		15
Trogoderma elongata		10
subfasciata		15
villosa. D.		15
Trogus clavicornis. M.		10
Aryidiphorus vicinensis		15
Byrrhus discoideus. M.		15
maurus. M.		20
Parnus rufipes. D.		24
Elophorus elegans. Kr.		15
Hydrochus bicolor. D.		18
filiformis. M.		15
gemellus. Ill.		15
Hydrophilus seminate-lineatus		10
Sphaeridium renipustulatum		12
Copris semicornis. K.		15
Aphodius Anachoreta		12
ater		15
2guttatus. D.		20
cognatus. M.		20
interpunctatus. M.		12
plagiatus		18
puberescens. St.		10
punctato-sulcatus. St.		12
4 maculatus		15
sanguineus. D.		18
sulcatus		18
Carabaeus haemisphaericus		30
Hypocrita. Ill.		30
merdarius. Meg.		15
Gedrupes ventricosus. M.		30
Melolontha aceris. Z.		1
marginata. Ill.		30
pilosa.		20
Axomala errans		24
Anisoplia arvicola		24
comigera. H.		24
segetum. H.		20
Omaloplia carbonaria. Dej.		14
limbata. Meg.		15
Hoplia pulverulenta		15
pulvifera. Andr.		15
pusilla. M.		24
rupicola. Bon.		24
		16 12

(all elongata Z.)		
Cetonia argentata. M.		24
lucidula. Z.		20
metallica.		15
Platycerus chalybeus. M.		15
Diodesma unicolor. M.		20
Hypophloeus brunneus. M.		15
depressus		12
linearis.		8
Diaperis bicolor.		20
Scraptia fusca. Lat.		20
Meloe cyanea.		10
glabrata. M.		12
laevigata.		12
limbata		20
majalis. K.		10
nodicollis. M.		15
proscarabaeus		8
punctata		10
scabricula. M.		10
tecta. St.		12
Nothus praeustus. Ol.		20
Necydalis arundinis. D.		18
concolor. St.		8
seladonia. M.		20
subcyanea. Z.		20
virescens.		8
viridescens. M.		8
Oedemera bipartita. Sch.		20
chalybea. M.		15
cyanea. M.		12
fagathina. M.		15
grisescens. M.		10
lurida. Gyll.		10
nuficollis.		15
sanguinicollis		12
violacea		
Salpingus nitidus. M.		12
Pterorhynchus signatus. M.		24
Orodinus femoralis. M.		18
asphaltinus. D.		24
Dorydyrhynchus austriacus		15
castaneus		20
pallidus		18
Comasinus sulcipennis. M.		24
Monohammus piperitus. M.		20
Acanthocinus griseus		15
Pogonocherus bifasciatus		12
Mesosa curculionoides		18
Saperda coerulescens. K.		8
dufria.		18
Echii. Fahl.		20
ophthalmica. Ill.		30
scutellaris. Böh.		30
virescens		8
Leptura bisignata. D.		40
maura. M.		24
pallens. D.		30
	15	27

Crsodacna cerasi.		10
coerulescens. M.		10
cyanea. M.		12
fulvicollis.		12
glabrata		12
humeralis. Ol.		12
limbata. Duft.		10
lineola.		10
nigricollis. Duft.		12
nigripes. Duft.		12
Oxyaeanthae. Schr.		8
picipennis. M.		12
scutellaris. M.		12
Luchenia melanocephala		12
Lema campestris.		12
chalybea. Kr.		10
cyanipennis. M.		12
suturalis. Fabr.		15
Cassida margaritacea		8
prasina		6
pulchella. K.		8
rotundata. Kr.		15
rubiginosa. Ill.		15
singularis. M.		15
Gallerucca elongata. D.		18
flaviventris. D.		10
tibialis. M.		8
Adimonia circumdata		12
marginata		12
Phaedon punctatus. M.		15
Chrysomela Centaurei		8
femoralis. Ol.		20
geminata. K.		10
grossa.		24
heteropunctata		20
haemoptera		18
Hyperici. M.		20
lurida.		15
marginata		8
punctata. D.		20
Paropsis decostigma		24
flavicollis. D.		30
testacea. D.		20
tibialis. M.		18
Lina alpina. D.		24
speciosissima. Scop.		40
Eumolpus villosus. Ross.		12
Clytra collaris. M.		12
nigripes. D.		15
6maculata		20
tamesiensis. D.		18
tridentata. L.		10
Cryptocephalus elongatulus. Z.		12
janthinus. Schr.		20
8guttatus.		12
Triplax collaris.		15
elongata. Dej.		20
melanocephala.		20
sanguinicollis.		15
	14	27

Coccinella bivulnerata		8
distincta. M.		12
gibba. M.		10
lunigera. M.		12
marginella.		8
19 maculata. M.		8
14 punctata		6
15 guttata.		8
15 punctata		8
subglobosa. D.		8
6punctata. D.		12
Scymnus abietis.		8
bicinctus. M.		8
litura		8
luxulatus. Ill.		8
minutissimus. Kr.		8
mixtus. M.		8
Quercus. D.		8
rufipes		6
Coccidula 2punctata		12
Lycoperdina bivotata. K.		40
Lapsa nigricollis. D.		30
Codes notatus. M.		15
obtusus. St.		20
Platysma maura. M.		20
Anobium abietis.		10
aeneicolle. M.		20
aeneum. M.		20
castaneum		18
crenulatum. M.		18
denticolle. Z.		15
politum. M.		10
seluterum. M.		20
villosum. Fab.		20
Atrongylus pallidus. M.		15
striatus. Ol.		10
Nitidula atra. Zahl.		8
lugubris. Alp.		8
pallida. D.		8
picea. M.		8
rufipes.		6
Cercus 2pustulatus		8
melanocephalus. K.		8
nigripes. M.		8
scutellaris. M.		8
Hypsenor canaliculatus		20
sulcatus		24
Phylax lusitanicus		24
Alyssiponensis		24
Blaps cuspidata. M.	1	
punctata. K.		20
Mycetophila striata		16
axillaris		20
basalis. D.		20
filiformis		15
humeralis		20
Cistela atra		18
nigrita. Gr.		15
ruficollis.		24
sericea. D.		20
sulphuripes. D.		18
thoracica.		18
Omophlus pallidipennis		18
		15 25

66

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro			Aufenthalt	Stück	fl.	kr.
				154	109	28.
84	Physodes Europaeus. Dej.	— —	Croatien	2	3	—
85	Diasperis Armata.		Carlstadt	2	1	36
86	Hololepta Plana. F.	— —	Österr.	2	2	—

Nro			Aufenthalt	Stück	fl.	kr.
1.	Scarabaeus Bicolor. Zigl.	— —	Sara	2	1	— 8
2.	——— Quadratus. Hoppe	— —	Triest	2	1	— 8
3.	——— Autumnalis. L.	— —	dto	2	1	—
4.	Onitis Furcifer. Ill.	— —	Dagusa	2	1	30
5.	——— Bellesellei. Sz.	— —	Pyrlin	1	1	30
6.	——— Amyntas. Ser.	— —	Steyermark	2	2	—
7.	——— Falleyes. F.	— — —	dto	1	—	36
8.	Onthophagus Ovis Schaumelinus.		Österr.	1	—	18
9.	Copris Hilaris. L.	— — —	Insul Croma	2	2	—
10	——— Oculata. L.		Dagusa	1	1	—
11	Cetonia Augustata. Sz. Findet sich in meinem Catalog Punctata ist Elongata. Sz.		dto	2	1	30
12.	——— Purpurascens. D.	—	Insul Croma	2	2	—
13.	Trichius Abdominalis. L.		Dagusa	2	1	30
14.	Hister major.	— — —	dto	—	1	1
15.	Hamatychelus. Duft. L.	— —	dto	—	2	6
16	Nyssbona Saperdoides. Sz.	— —	Insul St. Cosan	2	3	—
17.	Saperda Cynara. Germ.	—	Dreemutin	2	1	30
18	——— Distincta. L. nicht Dahl. Die Fussglieder sind roth	— —	Dagusa	2	2	—
				31	32	22

Nro															

Nro				Aufenthalt	Stück	fl.	kr.
					154	109	28.
84	Physodes Europaeus. Dej.	—	—	Croatien	2	3	—
85	Diaperis Armata.			Lerchenfeld	2	1	36
86	Hololepta Plana. F.	—	—	Österr.	2	2	—

Nro				Aufenthalt	Stück	fl.	kr.
						2	48
					70.	70	30.
40.	Rhinobatus Wsus. F.	—	—	Ragusa	2	1	—
41.	——— Flavescens. Dej.			Dito	—	2	—
42	Aconis ocularis. F.	—	—	Zara	—	2	3
43	———. ulcericollis. Dahl			Dito		2	1
44	———. Flavicans. ulk.	—		Triest		2	1
45	Dasytes. Pulverulentus. Dej.			Ragusa		2	—
46	Zoborhynchus Ragusensis. Dej.			Dito		2	2
47	——— Zauri. Dahl	—	—	Dito		2	1
48	———. Cribrosus. Dahl	—		Dito	—	2	1
49	———. Alutaceus. Germ.	—		Dito	—	2	—
50	———. Punctatissimus. Dj.			Dito	—	2	1
51	———. Granulatus. De	—		Dito	—	1	—
52	———. Phamni. Dahl	—	—	Dito	—	2	—
53	———. Dulcis. Germ.	—		Triest	—	2	—
54	———. Illicis. Dahl	—	—	Ragusa		2	—
55	———. Maxillosus. Dj.	—		Dito	—	1	—
56	———. Subcollis. Dj.	—	—	Dito	—	2	—
57	———. Terrestris. Dahl	—		Insel Croma		2	—
58	Hirmulus. ? insul Cressanus	—		Dito		2	
59	——— Suturalis. Dahl	—		Ragusa	—	2	
60	Rhynchites. Praustus. Germ.			Dito		2	
						111	

Nro											
20. Elaph											

						Stück	fg.	kr.
						154	109	28.
84	Phyllodes Europaeus. Dej.	—	—	Croatien		2	3	—
85	Diapsenis Armata.			Lerchenfeld		2	1	36
86	Hololepta Plana. F.	—	—	Österreich		2	2	—
87	Melyris. Thalassina. Dahl.	—	—	Zara		2	—	48
88	Hylecoetus St. Mario. F.	—	—	Krajarn		2	—	48
89	—— Proboscideus. F.	—	—	Idem		2	—	48
90	Staphilinus Dejeanii. Dahl.	—	—	Insel Croma		2	1	30
91	—— Specalifer. Da.	—	—	Ragusa		1	—	24
92	Xantholinus. Fulvipennis. Da.	—	—	Idem		2	—	40
93	Oxytelus. Taurus. Dej.	—	—	Triest		2	—	48
95	—— unicornis. Ulr.	—	—	Idem		2	—	40
96	Elater Castanipes. Dahl.	—	—	Ragusa		2	—	48
97	Drilus Flavescens. F.	—	—	Zara		1	—	24
98	Mycetophila. Atra. Da.	—	—	Krajarn		2	—	40
99	Colymbetes 12 Punctatus. Dahl.	—	—	Ragusa		2	—	40
100	Haliplus. Ruficollis. Da.	—	—	Triest		2	—	30
101	—— Fictus. Da.	—	—	Idem		1	—	12
102	Tymarcha Nervosa. Dahl.	—	—	Zara		2	1	—
103	Chrysomela Bicolor. Dej.	—	—	Idem		2	1	—
104	—— Cribrosa. Germ.	—	—	Ragusa		2	1	—
105	—— Purpurea. Da.	—	—	Idem		1	—	30
106	—— Salvia. Dej.	—	—	Triest		2	—	40
						194	130	

46 Tyrinus italicus — " 30
47. Atranchus striatus — 1 — 30
48. Tymarcha carbonaria — " — 45
49 Chrysomela grossa — " — 20
38 / 39

96 — hispidulus. D. " — 15
98 Helew serrea. Rossi. " — 20
98 Tylathites pini. B. " — 20
99 —— 2punctatus. D. " — 40
14 / 6

pallidus. 6 f 44

Catops 2 f 18

einella 3

Nro	Nro							
							194	130 —
20.	107.	Chrysomela	Femoralis	Dej.		Ugrien	1 . —	40
	108	———	Subanea	Gl. — —		Ungarn	2 . —	40
	109	———	Elaticollis	Da. —		Ragusa	2 . —	40
	110	Clythra	Dentipes	Oliv.		Dto	2 . —	48
	111.	Lema	Marginecollis	Da —		Lara	1 . —	24
	112	Galleruca	Littoralis	Dej —		Triest	1 . —	20
	113	Cryptocephalus	Pallifrons	Gyllenh		Ofenb.	2 . —	30
	114	Coccinella	Chrysomelina	F —		Lara	2 . —	36
	115	———	Pini	Da — —		Ragusa	2 . —	40
	116	———	Unicolor	Da — —		Dto	2 . —	40
	117.	Hyperis	Vaccinarius	Fanz.		Pottenst.	2 . —	36
	118.	Trichodes	Interruptus	var. v. M.		Ofenb.	2 . 1 .	20
	119	Cucujus	Depressus	Hell 7. f. —		Dto	2 . 3 .	—
	120	Purpuricenus	Purpuricenus	Ephippium	Sch	Preßburg	1 . 1 .	—
	121	Amphicoma	Hirta	Dej.		Dto	1 . —	45
	122	———	Vulpes	Dej. — —		Dto	1 . —	45
	123	Bleps	Abbreviata	Fis. — —		Dto	1 . 1 .	—
	124	Cymindis	Punctularis	Da —		Dto	1 . —	30
	125	———	Angularis	Gyll —		Dto	1 . —	30
	126	Chlaenius	4 Sulcatus	Fbg. — —		Pottenst.	2 . 1 .	30
							225	146 [illegible]
		[illegible]	Punctatus	Da —		Ragusa	2 . —	40
		[illegible]hodes	Complanatus	Gi.		Insel Croma	2 . 1 .	20
		[illegible]hus	Dalmatinus	Dej —		Ragusa	2 . —	36
		[illegible]rites	Lævigatus	— —		Pottenst.	1 . 1 .	—
		[illegible]genia	Filiformis	—		Ragusa	2 . —	30
							154	109 [illegible]

Nro				Aufenthalt	Mrk.	ℳ	₰
					225	146	54.
127	Carabus	Excisus. Ill.	— —	Oesterreich	2.	1.	30
128	——	Scyticus. Kol.	— —	Carlsbad	2.	1.	—
129	Helops	Rossi. Germ	— — —	Ragusa	—	2.	2 —
130	Pandarus	Dalmatinus. Dej.		Idem	2.	1.	—
131	Pedinus	Helopioides. Germ. vera		Idem	2.	1.	—
132	——	Gibbulus. De	— —	Idem	1.	—	20
133	Helops	Aneus. De	— —	Brussa	2.	—	40
134	Calcar	Elongatus. Ill	— —	Syrien	2.	1.	—
135	Asida	Jurensis. De	— —	Jura	2.	1.	—
136	——	Fascicularis. Dej		Ragusa	2.	1.	—
137	——	Grisea. F	— ——	Corsica	1.	—	—
138	Opatrum	Verrucosum. Germ		Ragusa	2.	—	40
139	——	Elongatum. Dal	—	Idem	2.	—	30
140	Melolontha	Dispar. Da. ♂♀		Corsica	2.	1.	30
141	——	Fulvicollis. Ulr.	— —	Idem	1.	—	40
142	Cimelia	Littoralis. Fis	— ——	Russland	1.	1.	—
143	——	Neglecta. Fis	— —	Idem	1.	1.	—
144	——	Verrucosa. Ge	— —	Idem	—	1.	1. —
145	——	Subglobosa.	— —	Idem	—	1.	1. —
146	Lytta	Flavellicornis. Germ.		Dalmat.	2.	2.	
147	——	Chalybea. Faldm.		Russland	1.	—	
					259		

46 Hypnus italicus — — 30
47. Atonchus striatus — 1 — 30
48. Tymarcha carbonaria — — 45
49 Chrysomela grossa — — 20
38 / 39

65 — hispidulus. D. . . — 15
66 Helew serrex. Rossi . . — 20
98 Tylachites pini. D. . . — 20
99 —— 2punctatus. D. . . — 40
14 / 6

6 ♂ 2♀ pallidus. 6 ♂ 4♀ Catops

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro

20.

Mein Hochgeehrtester Herr!

Ich werde mich in der Rechnung um 2 Kr. betrogen finden, ich wird Ihnen gestern nur 166 fl. 52 Kr. betragen

Wenn Ihnen Sind beliebig die Fortsetzung zu machen Ist übrigens bitte gut Angestellt, Sind jenen Alten die Ihre Lagster Sendung, auch bei Ihnen Sind Sind Ihre Bestellungen an mich zu Senden mit der Bemerkung Zurück gesandt Gestorben ein

Bastl 3 fl. C. M.

Bald sind jenen Alten Ihre Pflanzen Sind Ihnen so ist es mir Leid Ihnen Sind Ihnen Alten, Dass mir Ihr bitte nicht zu Senden weil Defect wäre, einigst im Glauben Bastl Arten zu erhalten.

Mit Gruß und Hochachtung

Ihr ergebener
G. Fahl

Anbei die Rechnung Quittung über die erhaltenen 36 fl. im 24 fl. Fuß.

	Sempervivum Funckianum. Da.	—	Bayuda	2 :- 40
	Sempervivum Complanatum. Gi.		Insel Croma	2 . 1 . 20
18	Sempervivum Dalmaticum. Dej	—	Bayuda	2 . — 36
20	Saxifraga Cavigata.	—	Gemein	1 . 1 . —
	Hieracium Filiformis.	—	Bayuda	2 . — 30
				154 109 68

Frankfurt am Main, den 26. Jan 1805

NOTA

von Heinrich Ludwig Brönner.

Buchhändler, Hornmarkt Lit. J No 148.

Zu bezahlen Antrikt

№	f	x
1 Brach. pectoralis	—	30
2 —— fumans	—	30
3 —— Prophia	—	24
4 —— sclopeta	—	20
5 Euphium olens	2	—
6 Ophonus etruscus	—	30
7 —— rotundicollis	—	24
9 Calathus limbatus	—	20
11 Pecilus punctatostriat.	—	24
12 Angoleus chalybeipennis	—	30
13 Harpalus etruscus 2 M	—	
14 —— virens. 2 M	—	40
15 —— alpinus. 2 M	—	40
17 Amphreas morio	3	—
18 Aphodius dalmatinus	—	18
19 —— elongatus D	—	40
20 Apotomus rufus	1	20
21 Carabus Zonbroffii	2	—
23 —— rugulosus	3	—
24 —— palustris	—	45
25 Leistus cyrtinibarbis	—	40
27 Agonum picipennis	—	20
28 —— pusillum	—	15
29 Melolontha solstitialis	2	—
32 —— pubescens	1	—
33 Anomala devota	—	45
34 —— signaticollis	—	45
35 —— Junii	—	30
36 Hoplia rupicola 2 M	—	40
37 Cetonia floralis 2 M	1	30
38 —— pisana 2 M	1	—
39 Armideas monoceros 2 M	3	—
40 Scarabeus splendens	1	—
41 —— hypocrita	—	24
42 Oritis Samon 2 M.	2	—
46 Syrigus italicus	—	30
47 Altenchus striatus	1	30
48 Tymarcha carbonaria	—	45
49 Chrysomela grossa	—	20
	38	39

Zu bezahlen 73

№	f	x
52 Clytra melanocephala	—	20
53 Cryptoceph. tricolor.	—	24
54 —— Blockii	—	24
55 —— marginellus	—	20
56 —— Helvigii	—	20
57 —— signaticollis	—	15
58 Colaspus auratus	—	15
59 Eumolpus nitidus D.	—	15
60 Dapsles viridis D.	—	18
61 —— splendidulus	—	15
62 —— cylindricus	—	20
63 —— filicollis	—	18
65 Aphodius planus D.	—	24
66 Apate luctuosa K.	1	—
67 Zonitis nigripennis Dej	—	15
69 Helops tenebrioides	—	20
70 —— piceus	—	20
71 Stenopterus praeustus F.	—	30
72 —— ater F.	—	30
73 Dorcadion etruscum 2 M.	1	30
74 Hamatych. Audax 3 M.	4	30
76 Lixus rupicolor	—	40
77 Lagria glabrata K.	—	30
79 Arthribus centromaculatus	—	30
80 Pinax regalis	—	20
81 Cleonis Cardui	—	20
82 —— marginicollis	—	48
83 —— pieta D.	—	40
84 —— Isoynbrii D.	—	30
85 Lixus lateralis K.	—	45
86 Cartharis terminata D.	—	20
87 Lixus arcadinus	—	40
88 Lôborhyn. spalatrensis	—	48
89 —— crenosus D.	—	24
90 —— auriger D.	—	30
91 —— vittatus D.	—	48
92 —— sulcipennis D.	—	45
93 —— gibbipes D.	—	20
94 —— putridus D.	—	20
95 —— hispidulus D.	—	15
96 Meleus senex Rossi	—	20
98 Tylacites pini D.	—	20
99 —— 2punctatus D.	—	40
	14	6

141

№	f	x
100 Baias Ericeti D.	—	20
101 —— globulus D.	—	15
102 Macropelmus bisignatus	—	15
104 Polydrusus aloidus	—	15
105 Falciger Isymbrii D.	—	15
106 Hypera hispida D.	—	24
107 —— punctulata D.	—	15
108 —— etrusca D.	—	20
109 Brachycerus tuberculat.	—	40
110 —— ??	—	40
111 Ipatrum parillum	—	15
112 —— rotundicolle D.	—	20
113 Asida oblonga D.	—	40
114 —— gibbosa D.	—	40
115 Pedinus sericeicollis	—	30
116 —— elongatus	—	24
117 Haltica ruficollis D.	—	15
118 Elater rufipennis	—	24
119 —— subvittatus D.	—	24
120 —— cruciger	—	20
121 —— phaleratus	—	24
122 Buprestis aerea	—	20
123 —— scutellaris	—	30
124 —— splendidula	—	20
126 —— Cypressi Dej	2	—
	11	25

2. 15.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meine Hochgeehrteste Herr!

Ich werde mich in der Rechnung um 2 fl. betrogen
finden, es wird mir gewiß um 166 fl. 52 xr betragen

Ich bin Ihnen Nicht bekannt die Ursache zu wissen

Frankfurt am Main. den 26. Jan 1805

NOTA

von Heinrich Ludwig Brönner.

Buchhändler, Kornmarkt Lit. B. No 148.

Zufolge Anrichts

1	Guilloud Atlas maj.		2. 15

Hydrophorus arcuatus
4 arcolatus
canaliculatus
5 erythrocephalus
granularis
5 palustris
parallelogramus
pictus
silphoides. B.
unilineatus. Mk.
Hydrobius 4 guttatus.
Haliplus fulvus
8 ferrugineus
9 flavicinctus
10 lineolatus
11 maculatus
12 ruficollis. Ka.
Gyrinus angustatus
nitidus. M.
14 nitidulus.
stagnalis. B.
splendidus. M.
velox
Buprestis carniolica.
chrysostigma
17 maculicollis.
18 metallica.
nitida
19 variolosa.
Agrilus aeneicollis. M.
brevicornis.
chalcogatus. M.
chalybeus. M.
chlorocinus. M.
chryseus. Fr.
cotyli. And.
21 cupreus. M.
fuscipennis. M.
gracilicornis. M.
graminis. B.
longicornis. Mk.
nigricornis. M.
olivaceus. Schr.
partitus. B.
22 viridanicus. M.
23 viridipennis. M.

Elater ahaeneus. M.
alpigen. M.
alni. M.
alpinus. B.
anceps. L.
angusticollis. M.
antennatus. M.
26 asphaltinus. M.
atratus. Mll.
aulicus. B.
axillaris. M.
badius. Mll.
bibimaculatus.
27 chrysocomus. L.
28 flabellicornis. L.
flavicornis. B.
29 fraxini. L.
30 fulvicollis. L.
31 fuscus. Mll.
gibbicollis. M.
glycereus. B.
32 impressus
lepidopterus. B.
limbatus. Nor.
34 linearis
35 litigiosus. B.
marginatus. L.
36 marginellus. M.
miliaris. M.
nigrinus. Kug.
37 nigritus. M.
nitidus. L.
38 nitidus. M.
39 obscurus.
pallipes. L.
40 picipes. Fr.
41 pomorum. Mk.
42 rotundicollis. L.
Schneideri. M.
serricatus. M.
Sticticus. B.
striolatus.
43 terminatus. L.
tibialis. M.
tricolor. Kn.
villosulus. B.
44 vittatus. Vall.
discolor. M.
elongatus. M.
haemorrhoidalis. M.
limbatus. B.
nitidus. Vogt.
pallidus.

Cyphon

Synaptus sericeus emarginatus.
Malthinus minimus.
Malachius femoralis. B.
pallipes. Ol.
pedicularius.
ruficollis
rufus
viridis
Dasytes aeneus
nigripinus. L.
asphaltinus. M.
aurarius. Hl.
crinitus. L.
micans. L.
nitidus. M.
rubidus. Kug.
sulpinus. L.
Drylus ater. Vog.
Ptilinus serratiformis. M.
Lyctinus ater.
laticollis. M.
testaceus. Fab.
Dorcatoma chrysomelina. M.
Hedobia pubescens.
Ptinus bicinctus. L.
brunneus. M.
germanus.
regalis. L.
sexpunctatus.
Trichodes crassipedarius.
Corynetes pygmaeus
scutellaris.
Silpha cassidea. L.
ferruginea. M.
pertusa. M.
subsinuata. Vog.
Colobicus axillaris
Ips 4-notata.
Cambrus discoideus. M.
Antherophagus pallens. B.
ferrugineus.

Catops

discicollis. M.
erythropeca. M.
fumata. Kollis.
lividipennis. M.
melanocephala.
pectoralis. L.
pilosa. M.
rubricollis. M.
tenebrosa. Mll.
spinicollis. M.

Encnemis
Boros
Lircaea 4
3.
Aphod.
Pachyta
Lepis. Cer
Silpha Lapp
Blaps
Cetonia
Tymarcha
Lina Smar
inella

Nr 2

3 Bupreſtis lucanicola, n. ſp. — 1 1/0

7 Mylabris ruficrus, n. ſp. — 6

10 Cimex platypus Fabr. — 3

5 Syrinas ſericeus n. ſp. — 4

6 Apate dentiformis. n. ſp. — 2

9 Crocidura polonica St. — 4

2 Aptinus collaris n. ſp. — 6

(v. truncatus v. Hbst.)

4 Pompilus unicolor. n. ſp. — 8

1 Trapezites variegatus — 4

8 Brachypalpus pallens — 2

52

Sucht 10 Exemplare und Style einzutauſchen

Fabricius

19 ß — 11
38 — 44
57 — 55

15 1/2

19 — 89
17 — 36
11 — 23
8 1/2 — 28
4 — 39
2 3/4 — 35
1 — 11

19 8 1/2

52

154 109

Genera filiformia.

76

Pösing nächst Wien d 14 ten Dec 825.

Mein Hochgeehrtester Herr und Freund

Haben Sie gestatt Schreiben Sie vom 27. Dec
erhalten und trotz meiner bisherigen Zeit
wegen meiner früheren Übersiedlung Ihnen und
Ihren mir geschenkten Anzeichnis 300 Arten
Käfern gestatt, welche statt 59 6 + 62 + 13
betragen, d Rubr 7 01 3

Im 1825 Jahre folgenden Arten Ihres Verzeichnisses
(75.) Bitte bis zur Umtauschung Nummer einer
Beilage Anmerkung auf den bemerkten Käfern
zu tragen: (Nach dem gedruckten Verzeichnis)

Colymbetes fenestratus 15
umbrinus. B. 15
Laccophilus variegatus K. 20
Hydroporus arcuatus
4 arcolatus 8
cancellatus
5 erythrocephalus 8
granularis
5 palustris 10
parallelogramus
pictus
silphoides. B.
undulatus. M.
Hyphidrus 4 guttatus. 15
Haliplus fulvus
8 ferrugineus 10
9 Harrisiae. B. 15
10 lineolatus 15
11 maculatus 2 15
12 ruficollis. K. 10
3 Gyrinus angustatus. B. 18
nitidus. M.
14 nitidulus. Z. 15
stagnalis. B.
splendidus. M.
15 velox 15
Buprestis carniolica 45
chrysostigma
17 maculicollis. Dej
18 metallica 30
nitida
19 variolosa. Pz. 48
Agrilus aeneicollis. M.
28 brevicorpis. B. 15
chalcogatus. M.
chalybeus. M.
chlorodius. M.
chryseus. Fr.
coryli. Rud.
21 cupreus. M. 12
fuscipennis. M.
gracilicornis. M.
graminis. Pz.
longicornis. M.
nigricornis. M.
olivaceus. Schr.
Cyphon
partitus. B.
22 viridanus. M. 15
22 viridipennis. M. 15

6 p 31 +

Trachys austriaca. M.
scrobiculata. M.
Aphanistes emarginatus 12
Elater aeneus. M. 8
albipes. M.
alni. M.
alpinus. B.
anceps. Z.
angusticollis. M.
antennatus. M.
26 asphaltinus. M. 15
atratus. Hl.
aulicus. Pz.
axillaris. M.
badius. Hl.
bimaculatus.
27 chrysocomus. B. 24
28 flabelliformis. B. 24
flavicornis. Pz.
29 fraxini. B.
30 fulvicollis. B.
31 fusculus. Hl.
gibbicollis. M.
glycereus. Pz.
32 impressus
lepidopterus. Pz.
+ 33 limbatus. Fuss. 18
34 linearis 20
35 litigiosus. R. 13
marginatus. L.
36 marginellus. M. 18
miniatus. M.
nigrinus. Kug.
37 nigritus. M. 20
nitidus. Z.
38 nitidus. M. 15
39 obscurus. 15
pallipes. B.
40 picipes. Fr. 10
41 pomorum. Sch. 10
42 rotundicollis. Z.
Schneideri. M.
segnetus. M.
Stictieus. Pz.
striolatus
43 terminatus. B. 24
tibialis. M.
unicolor. Kn.
villosulus. B.
44 vittatus. Zebl. 20
discolor. F.
elongatus. M.
haemorrhoidalis. M.
limbatus. F.
minutus. Dej.
pallidus.

6 p 14 +

Cantharis analis
apicalis. M.
cincta. M.
discicollis. M.
erythrocnema. M.
fumata. Redtenb.
lividipennis. M.
melanocephala.
pectoralis. B.
pilosa. M.
rubricollis. M.
tenebrosa. Hl.
Silis 45 spinicollis. M. 20
Malthinus minimus.
Malachius femoralis. Kr.
pallipes. Ol.
pedicularius.
ruficollis
rufus
47 viridis 15
Lasytes aeneus 12
alpinus. B. 15
asphaltinus. M.
51 aurarius. Hl. 10
52 crinitus. B. 20
53 micans. Z. 15
54 nitidus. M. 12
55 rubidus. Kug. 15
sulpinus. Kr.
Dryops ater. Dej.
Ptilinus serraticornis. M.
Lyctinus ater. B.
laticollis. M.
56 testaceus. Fourc. 20
Dorcatoma chrysomelina. M.
Hedobia pulpes.
Ptinus bicinctus. B.
brunneus. M.
germanus.
regalis. B.
sexpunctatus.
crassipedarius.
pygmaeus
Trichodes scutellaris.
Corynetes castidea. B.
ferruginea. M.
pertusa. M.
subsignata. Dej.
Silpha 2 Colobicus axillaris
3ps 4-notata
Cambrus discoideus. M.
Antherophagus pallens. B.
ferrugineus.

Catop

Ly
Colas
Dytiscus
Colymbetes
Dyt: Dola
Elater Me
Gyro
Encaomis
Boros Th
Sircoa 4
3.
Aphod. Za
Pachyta P
Lyps. Cer
Silpha Zapp
Blaps
Cistoma Vo
Tymarcha
Lina Sma
einella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Catops agilis.
basus
brunneus
castanopterus
dermestoides
fumatus
fuscus
laticollis
minutus
morio.
nigrescens
sericeus.
tristis.
Dermestes atomarius
Gatta
tigrinus
Attagenus pulicipes 18
Megatoma
Trogoderma elongata
subfasciata.
villosa.
Trogosita dasycornis M.
Rhipidophorus viennensis
Byrrhus discoideus.
maurus.
Parnus riufipes
Elephorus elegans
Hydrochus bicolor
filiformis
pygmaeus.
Hydrophilus geniculatus lineatus
Sphaeridium scriptum
Copris semicornis
Aphodius Anachoreta 12
fossor
4 guttatus
congener
interpunctatus
plagiatus
pubescens
4 maculatus
sanguineus
scitulus
Carabaeus hamiosphaericus
Hypocrita
merdarius
Gymnopleurus ventricosus
Melolontha aceris
marginata
pilosa
Anomala errans
Anisoplia agricola
crucigera
segetum
Omaloplia carbonaria
limbata
Hoplia pulverulenta
pulvifera
parilla
rupicola
Cetonia aeruginata
lucidula
metallica
Platycerus chalybeus.

Diodesma unicolor
Hypophloeus brunneus
depressus
linearis
Diaperis bicolor
Serraptia fusca
Meloe cyanea
glabrata
laevigata
limbata
majalis
nodicollis
proscarabaeus
punctata.
scabricula.
tecta.
Mylabris praeustus
Necydalis arundinis
concolor
selandonia
subcyanea
virescens
viridescens.
Oedemera bipartita
chalybea
cyanea
gagatina
grisescens
lurida
rufipes
sanguinicollis.
Salpingus nitidus.
Rhinosimus signatus.
Oedinus femoralis
syphantinus
Dorytomus salicinus
castaneus
pallidus.
Comazinus sulcipennis.
Monohammus piperatus.
Acanthocinus griseus
Leptura balteatus
Necydalis coeruleocephalus
Saperda coerulescens
dubia
Lema
ophthalmica
scutellata
virescens
Leptura bisignata
maura. M.
pallens. F.
Oxydacne
Aukenia melanocephala
Lema campestris
chalybea
cyanipennis
sutturalis.
Cassida margaritacea
prasina
pulchella
rotundata
rubiginosa.
singularis.

Galleruca elongata
flaviventris
tibialis
Adimonia circumdata
marginata
Thaedon punctatus
Chrysomela Centaurei
fanorubi
gemigata
Phytodecta
heteropunctata
thiaemoptera
Hyperici M.
lurida
marginata
punctata.
Phyllobius
Paropsis flaccidellis
testacea
tibialis
Lina alpina
speciosissima
Eastopus villosus
Clythra collaris
nigripes
6maculata
temesiensis
tridentata lin.
Cryptocephalus elongatulus
janthinus
4guttatus
Triplax collaris
elongata
melanocephala
sanguinicollis
Coccinella bisagittata
distincta.
gibba
lunigera
marginella
novemdecimpunctata
15punctata
15guttata
15punctata
subglobosa
6punctata.
Scymnus abietis.
bicinctus
liturg
lunulatus
minutissimus
minutus
Aquaeus
rufipes
Coccidula 7punctata.
Lycoperdina bivotata.
Dapsa nigricollis.
Codes notatus
obtusus.
Platysma maura.
Exobium abietis
aeneicolle
aeneum
castaneum
crenulatum
denticolle
polityn
velutinum
villosum.

Ycnia filiformis

76

Wien 14 Dec 1825.

Mein Hochgeehrtester Herr und Freund

Ich habe Ihr geehrtes Schreiben vom 27. Dec. erhalten und trotz meiner beschränkten Zeit wegen meiner früheren Abreise Ihnen und Ihren mir geschenkten Insecten 200 Arten Käfer[illegible] welche Anfangs 59 [illegible] 6 + 62 + 13 betragen, ist Ihnen [illegible] 81 [illegible] 3

Strongylus pallidus
striatus
Nitidula atra
lugubris
pallida
mica
rufipes
Cercus 2punctatus
melanocephalus
nigripes
scutellaris.
Hypsenot canaliculatus
sulcatus
Phylax lusitanicus.
Ulyssiponensis
Blaps carpidata
punctata
Mycetophila axillaris
basalis
filiformis
humeralis
Cistela atra
nigrita Gr.
rufricollis
sericea
sulphuripes
thoracica
Omophlus pallidipennis
Hylurgus marginatus
opacus
pinicola
Hylesinus minutus
varius
Colydius destructor
haemorrhous
pusillus
Bostrichus decumanus
Dendron
dispar
lithographus
megdographus
micrographus
pusillus
signatus
terebrans
tiliae
pinastri M.
typographus.
Ayate sinuata
Cis castanea
micans
nitida
polita
reticulata
Latheridius asperatus
castaniparus
elongatus
fenestralis
parvulus
rotundatus
Mycetophagus decempunctatus
fulvicollis
variabilis
Trichyllus obscurus.
Cenchyta variegata
Rhizophagus cylindricus
Silvana contracta
Cyclus coronatus
laevigatus
nitidus
pubescens
subarmatus

Scydmaenus collaris
Pillus ambulans
Necrophorus sepultor
stygius
Engis pallida
Cryptophagus ater
niger
picipes
pusillus
rufricollis
vini
Elmis pygmaeus
Heterocerus laevigatus
marginatus
Exhydrus minutus
Trox hispidus
Chasmatopterus hispidula
pilosula
Pimelia muricata
Anis acuminata
Tentyria punctata
Heliophilus gibbus
lusitanicus
Pandarus clypeatus
Opatrum serraticorne
Penthrio ferrugineus
laticollis
Ulona castanea
Phaleria unicolor
Anisotoma axillare
nigripenne
Hallomenus humeralis
Hypulus dubius
Helops Schmidtianus
Anthicus arenarius
equestris
hirtellus
Monoceros integer
Platycerus.
Mordella axillaris
12punctata
guttato fasciata.
testacea
unicolor
Anaspis humeralis
pallida
Cerocoma Mühlfeldii
Zonitis 6maculata
varians
Lamia lugubris
Dorcadion atrum.
Molorchus pygmaeus
Dolichia aquatica
bidens?
dentipes
gracilis
impressa
Malinderstyi
melanocephala
micans
reticulata
tersata
variabilis

Hoplia analis
Balladerme
collaris
cuprea
cynoglossi.
Cohi.
fusicornis
holsatica
hortensis
Hyoscyami.
metallica.
novella.
pannonica.
4-maculata.
4-punctata.
rufescens
sericea
Serpilli.
subcyanea
subglobosa
suturalis.
Hister aeneus.
arenarius
asphaltinus
distinctus
impressus
metallicus.
nigellatus.
politus.
pygmaeus
rufipes
ungicos
variabilis.
viridis.
Hololepta complanata
Saprinus scabrosus
Anthribus bisignatus
brevirostris
nigrirostris
obscurus
peregrinus
rufipes
sericea
sylvaticus
Brachela imbricornis
granarius
luteicornis
nebulosus
nigripes
pilosus
quadratus
sigripes
subfasciatus
villosus.
Rhinomacer nervosaloides
Rhynchites aeneus
auratus
coeruleus
elongatus
giganteus
hirtus
niger
nitens
Apalizans
pilosus
reticulatus
rotundicollis
viridis.

Apion ahaenum
calceatum
campanulatum
chalybeum
coeruleascens
cyaneum
difficile
dissimile
frigidum
fulvipes
graminis
hirtellum
incrassatum
interpedium
longicolle
longirostre
nigrianus
oblongum
pisi
punctirostre
rufirostre
rufipes
sanguineum
semiaeneum
subglobosum
subulatum
sulcifrons
terebrator
vicias
virescens
viridipenne

Lyttha Erich
Cedas
Dytiscus
Colymbetes
Syst: Dola
Elater Me
Gn
Gno
Eucnemis
Boros Th
Dircaea 4
3. e
Aphod. Za
Cychyta Sc
Lepis. Cero
Silpha Zapp
Blaps At
Cetonia Vo
Tymarcha
Lina Sma
cinella

1825 148 165

Rhamphus tomentosus
Orchestes alternimus
confinis
flavicornis
127 hirtus - 10
fota
maurus
pilosus
138 populeti 8
131 rufus 18
rufaci
Cionus 133 scutellaris 8
Cleonus distinctus 15
Cleodus Rathorhini 10
elypticus
131 Phytoscaleeatus 12
labilis
melanophus
pusillus
136 ranunculi
scutellaris
Rhinomacer 137 cerbasci - 12
cinerea
nigrirostris
138 picirostris 4
polygonata 8
140 simplex 10
142 parsuta 30
suturalis
tomentosa
143 velutina 12
144 villata 20
Sphaeroderma sculpina 12
ulmi
Palinges variabilis
abbreviatus 8
Absynthii
137 aeneirostris 12
affinis 8
angulata 4
abdominalis
Pallene 15 albo signatus 12
Anthropeginis 15
avenatus
15 asperatus 15
bigultatus
15 bimaculatus 12
campestris
158 castor 13
crassulus
crithrum
cyaneonitens
cyaneopennis
155 deauratus 20
elypticus
floralis
15 glaucanus 15
15 globulus 16
184 guttatus 10
haemorrhous
158 horridus 12
160 immaculatus 12
interstictus
162 lanii 8
lineola 12
maurus
165 megacephalus 12
166 nebulosa 12
maculosus
pictus
pilosellus
piceatus
165 punctum 15
quadricornis
reflexus
rogeris
rufipes
serpentus
scutellaris
signatus
sparaginus
spargani
suturalis
trivialis
166 undatofasciatus
168 venalis 15
viridipennis

Brachinipes alvearis
canalus
169 echinatus 15
169 foliculatus 15
170 Hypocrita 15
lima
nopeatus
Archarius elephas 24
172 ferrugineus 12
173 nebulosus 15
174 maculae 12
ornatus
175 pustulosus 15
pygmaeus
rufipes
scalopaae
tigrinus
serosus
176 villosus. 8
Rhynchaenus affinis
agnatus
albiginosus
dissimilis
interruptus
macropus
marmoratus
pectorolis
plagiatus
sculptor
stilbonus
tigrinus
tremulae
variabilis
Pilumnus bipunctatus
bipunctatus
funeralis
obliteratus
Rhamni
scirpi.
asara
crataegi.
humeralis
nigrirostris
striana
sericatus
sericeus
Hercyniae
irroratus
cribrum
monachus 2
nigritus 2
177 pulicarius 2
178 scalatus
distinctus
fasciatus
Hypera arundinis 28
carniolica
178 cinerea 12
143 comata 2 30
comatula
144 contaminata 1
Dauci
145 laesirostris 15
maderina
146 oxalis 20
pallida
147 palustris 14
perpensa
pyperata
pollux
punctata
148 Taramacci. 12
Macropelmus Chamomillae
didymus
fagi
filiformis
ornatus
prometheus
Leppeletius
tibialis
Marionus Hercyniae
hoperus
Gastrodus gibbus

Loborhynchus aeneopunctatus
cuspidipes
corruptor
crataegi
distinctus
erythropus
gravidipes
interstitialis
morio
ovulum
plumipes
regularis
rubripes
setosus
tenebricosus
trimaculatus
troglodytes
undato fasciatus
vernalis
viridipennis
Brinus austriacus
lepidotus
mercurialis
Simo fasciatus
Chlorima flavescens
graminicola
Polydrusus aeratus
albofasciatus
arborator
chrysolepis
chrysomelus
193 cinerascens
cyaneus
distinctus
femoralis
floricola
graneus
Polydrusus 194 maculatus 15
melanogaster
malacus
mester
nigripes
195 nobilis 18
ovulum
196 prasinus
punctulatus
seladonius
sericatus
197 sparsus 15
198 squamosus 8
viridipes
Curculio albolineatus
arenicola
atomarius
axillaris
caninus
crinitus
discoideus
erinaceus
femoratus
latirostris
occator
perforatus
phagiatus
stultosus
strigatus
sublineatus
supinus
tibialis
trilineatus
vulgaris
Thylacites auratus
augliane
lateralis
Liriopus
limbatus
porculus
setosus
signatus

Omias albovittatus
assignatus
geminatus
hirtulus
pallidus
pilosulus
rufipes
rufulus
scutellaris
Ephradus notulatus
ornatus
porculus.
Cleonis bicarinata.
Lixus filiformis
pulverulentus
Rhinobatus brevis
planus
sternus
teres
tigrinus
Rhinodes aterrima
cyanipetata
chalybea
cyanea
Hadrognemis
nigritta.
viridis.
Hexaphyllus haemorrhoidalis
haemorrhous
scutellaris
variegatus
Myerorhynchus 200 albicinctus
chloris
chloridas
cornutus
cyaneus
dysphoterinus
nitidus
timidus
Cosonus castaneus
ferrugineus
parallelepipedus
Rhyncolus brevirostris
curvirostris
gracilirostris
latirostris
longirostris
sulcirostris
tenuirostris

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

76

Wüsburg nächst Wien d 14 ten Dec 825.

Mein Hochgeehrtester Herr und Freund

Ihnen Ihr geehrtes Schreiben vom 27. Dec
erhalten und trotz meiner beschränkten Zeit
wegen meiner baldigen Abreise Ihnen und
den mir gesendeten Anzeichnis 200 Arten
Insecten gestellt, welche statt 59 fl 6 + 6 fl 13
betragen, ich habe mir die Freyheit, dass
bei mir gewesene und gestorbene Insecten ist
worauf Sie sich anzeichnen können.

Um Ihnen die Mühe zu ersparen
in Falle unter denen Arten die Sie mir
anzeichnet haben, sich einige Stücke, was
die unter einen andern Namen hatten
so habe ich 40 Arten um Betrag von 49 fl 17 +
Extra beigegeben, und da ohnedies eine Ver=
änderung statt findet, so haben die Freund
was Ihnen nicht anständig ist.

Ich ersuche Sie besonders, die beigesetzte
Zeit zu berücksichtigen, die Sendung so bald
als möglich

und Absenden ist, die mir

12. ——— Punctularis L. — —
13 ——— Angularis Gyll. — —
14 ——— Maculatis Marsh.
15 Bembid. 4 Striatum Gyllenh.

Lytta Erich
—— Collar
Dytiscus
——
——
Colymbetes
Hyd: Dola
Clater Me
—— Cu
—— Gyr
Encnemis
Boros Sch
Circea 4
—— 3.
Aphod. La
Pachyta Sa
——
Hypid. Cer
Silpha Lapp
Blaps At
Cetonia Vo
Tymarcha
Linia Sma
inella

Möglich zusammen zu bringen und auf dem
Platze der Wahl ab zu geben.

Wenden die gesamte Lepidopteren einst-
gen Arminische und Arabische Colleopteren
für die Mühewaltung, so Einzelne
ist Ihnen diese Besonders, die ich Noctuelana
Hy Lata und N. ambusta einst mehr in diese
Gegend abgeholt haben, ich bitte diese diese
Schmetterlinge in mein Schrift allein zu tauschen
Die rest bestehen in

2. St. ♂.	Hyp. Noctuelana	a 9/	18/—
1. — ♂.	— Elimene	—	4/—
1 — ♀	— Valbum		2/30
1 — ♂	Sphinx Croatica	—	15/—
2 — ♂♀	Hyp: Lata	—	6/—
1 —	Noct. Ambusta		4/—
		Summa.	49/30.+

Wenn ich Ihnen von den gedachten
Colleopt. gefallen Etwas, solche Bemühung
nicht Umsonst zu Ihnen, und bitte ich um gewog

Exemplare und wo Doppletten vorhanden sind
werde ich dann jedes mal 4 Exemplare einsenden
damit nicht alle Mineralien gleich, die Herrschaft
über Ihre Güte und Billigkeit.

Zwischen Cardinia und Lyrcilina ist nun
die Entscheidung noch meiner Meinung.

Ich bin mit Gruß und aller Hochachtung

Ihr Ergebenster

G. Dahl

Ich bin nicht mehr nimmer allein Nachforschungen
haben, denke ich Ihr geschätzt den 27. Januar
retour, wo Dieselbe wieder gesund anlangte.

Ihren Empfehlungen

G. Dahl

und Blenden ist, die mir abgeht

12. ——— Annularis. L. —

13 ——— Anyularis Gyllh. —

14 ——— Maculatis. Mannerh

15 Bembid. 4 Striatum Gyllenh.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Der Betrag ist

der vorherigen Seite	83 fl 13 x.
der zur Unterschrift präsentirten	28 fl 17 x.
Summa	111 fl 30 x.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

78 Anmerkungen zu Dahl Bandung Jan. 1875 148

Colymbet

Königl. Academische Museum Kasse Nro Lad 18. 40.

1. Carabus Delicatus v. M. 87 — 77
2. ——— Impressus D. S. — —
3. ——— Gemellatus. Golden 87 Silb
Von Flossi. Sachsen ist Dahl wenn sie
4. Clerostichus Invalidus. 87 mit Var
5. ——— Tarsenpunctatus. mit var
6. ——— Zahlbr. Kinesis. D. nov
7. Alpaus Castaneus. Bor.
ist Dahlen und die ist Ihnen Aurich
und Braunens gehört. und mit Cat
8. ——— Foetidus. Zahlb: nov. Sp. mit
die Bestimmung sind sicher
9 Elater Rugosus. v. M. — —
10 Ceroscyrtum Elateroides. Latr. 87 mit
Voltenzeit — —
11 Cymindis Angularis. Gyllenh. Diese
ist mit Humboldt unter diesem Namen
Hemd über Nr. 2a/3a, da die
mit Rhenden ist, die mir über
12. ——— Punctularis. D. — —
13 ——— Angularis Gyllh. — —
14 ——— Maculatus. Mannerh. —
15 Bembid. 4 Striatum Gyllenh.

17 Lytta Erich
7. ——— Cedar
18 Dytiscus
19 ———.
20. ———. D
21. Colymbetes
22 ———
23 Hyd: Dola
4 Elater Me
25. ——— Cu
6 ——— Gno
7 Encaomis
8 Boros Th
9 Limnea 4.
0 ——— 3. e
Agabus. La
2 Pachyta Pa
3 ———
4 Lepis. Cero
5 Silpha Lapp
6 Blaps A
7. Cetonia Vo
Tymarcha
Limnea Sma
stinella 3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

78 Anmerkungen zu Dessl Vandiemen Jan. 1875

Colymbet

Nieß Sammlungen Arten Nro Cat. N. 40. Vaterland. Stück

77

1. Carabus Delicatus v. Sk. S.f — Sarajevo . 2 . 3 . —
2. —— Impressus . L. S. — — — Monte Seminite 1 . 3 . —
3. —— Gemellatus Goldbg. S.f Vielleicht var und die folgende Vrapa Planina 2 . 3 . —
Von Hoppe. Dass die Thiere etwas stellenweise
4. Pterostichus Invalidus. S.f mit A var — Sarajevo und Umgebung 2 . 3 . —
5. —— Parumpunctatus mit var — dito — 2 . 2 . —
6. —— Gallbrunneus . L. nov Sp. Vrapa Planina 2 . 1 . 3
7. Alpaeus Castaneus. Bon. — Umgebung . 1 . — 4
Ich bin Dissellen und die ich Herrn Apotheker Jeschke
und Brunnen gesandt. und mein Castaneus sind Ich
8. —— Foetidus. Gallb: nov. Sp. nicht abstehen
die Flügeldecken sind schwarz und die Vrapa Planina 1 . — 4
9 Elater Rugosus. v. Sk. — — — Sarajevo . 2 . 2 . —
10 Cerophytum Elateroides. Latr. S.f nicht gross Voltagnit — — — dito . 2 . 4 . —
11 Cymindis Angularis. Gyllenh. Diese scheint Russland unter diesem Namen Russland 3
Hoffmannsegg zu haben, da die folgende und Rhenanen ist, die mir aber so genannt wird 3
12. —— Punctularis. L. — — — Russland . 1 . — 3
13 —— Angularis Gyllh. — — — Rhenanen . 2 . 1 . 3
14 —— Maculatis. Mannerh. — — — Finnland . 1 . — 3
15 Bembid. 4 Striatum Gyllenh. dito — 1 . —

23

16	Lytta Erythrocephala. F.	—	—	Rußland	1	—	30
17	—— Collaris. F.	—	—	Dito	1	2	—
18	Lytta Bogemannii. Sahlb.	—	—	Finnland	1	—	30
19	——. Striatus. F. vera	—	—	Dito	1	—	30
20	——. Lapponicus. G. Hf	—	—	Lappland	2	2	—
21	Calymbetes Asiaticus. Gz	—	—	Dito	—	1	— 24
22	—— Serricornis. Pz	—	—	Dito	—	1	— 30
23	Lyt: Dolabratus. Pz.	—	—	Dito	—	1	— 30
24	Elater Melancholicus. Sahlb.	—	—	Dito	—	2	1 —
25	—— Quercus. Gyll.	—	—	Finnland	2	—	45
26	—— Quadrum Gyll.	—	—	Upland	2	—	40
27	Encnemis Lygmaus. F.	—	—	Dito	—	1	— 45
28	Byrrhus Thoracicus. F.	—	—	Dito	2	2	—
29	Dircaea 4 Pustulata. nov. Lp	—	—	Dito	—	1	1 30
30	—— 3. guttata. Sahlb	—	—	Finnland	2	1	—
	Aphod. Lapponum.	—	—	Lappland	1	—	24
32	Pachyta Strigilata	—	—	Upland	2	1	—
33	—— Interrogationis.	—	—	Dito	—	2	1 30
34	Hypis. Cerambioides.	—	—	Dito	—	1	1 20
35	Silpha Lapponica.	—	—	Lappland	1	—	30
36	Blaps Attenuata. Fis	—	—	Finnland	1	1	—
37	Cetonia Volhyniensis. Dej	—	—	Volhynien	1	—	40
	Tymarcha Styriaca. Zubk. nov. sp.			Sofia Bg. Volg	2	1	—
	Leia Smaragdula. Dej.	—	—	Dito	1	—	20
	Cincella 3 fasciata. Fz	—	—	Upland	1	—	20

				23	25 39
Hirocephala. F.	—	—	Rußland	1	— 30
is. F.	—	—	Dito	1	2 —
Bogemannii. Saalb.	—	—	Finnland	1	— 30
Striatus. F. vera	—	—	Dito	1	— 30
apponicus. G. Fl.	—	—	Lappland	2	2 —
Arcticus. Gr.	—	—	Dito	—	1 — 24
Sericornis. Pk.	—	—	Dito	—	1 — 30
bratus. Pk.	—	—	Dito	—	1 — 30
anicholicus. Saalb.	—	—	Dito	—	2 1 —
reus. Gyll.	—	—	Finnland	2	— 45
drenus. Gyll.	—	—	Schweden	2	— 40
tygmaeus. F.	—	—	Dito	—	1 — 45
racicus. F.	—	—	Dito	2	2 —
Pustulata. nov. sp.	—	—	Dito	—	1 1 30
nttata. Saalb.	—	—	Finnland	2	1 —
sponnus.	—	—	Lappland	1	— 24
rigilata.	—	—	Schweden	2	1 —
errogationis.	—	—	Dito	—	2 1 30
mbroides.	—	—	Dito	—	1 1 20
onica.	—	—	Lappland	1	— 30
ennata. Fis.	—	—	Finnland	1	1 —
Rhenensis. Dej.	—	—	Volhynien	1	— 40
Syriaca. Zubk. nov. sp.			Sarepta a. d. Wolga	2	1 —
bgdula. Dej.	—	—	Dito	1	— 20
fasciata. Fl.	—	—	Schweden	1	— 20
				57	40 17

78 Samenkörner zur Insekt Vandüng Jan. 1875 148

Colymbetes fenestratus = maximus Gyll. var. c.)

Hydrophorus palustris = dem finsigen.
Faliger castor = dem finsigen.
Hydrophorus areolatus = dem finsigen. H. affinis. mihi.
Pogonocherus balteatus = dem finsigen
Hydrophorus erythrocephalus = maximus H. tristis.
Hypera laevifrons. Z. = dem finsigen
Clater pomorum = dem finsigen
— litigiosus. = dem finsigen (filiformis
Clater nitidus. M. = dem finsigen
Bembidion 4-striatum. Gyll. = dem finsigen
Aphanisticus emarginatus = minimus pusillus Ohs.
Polydrusus squamosus = dem finsigen
Sibinia vittata. = dem finsigen
Faliger accipitrinus = dem finsigen
— asperatus = dem vorbord (mit fine minis glandis)
Agrilus viridipennis = dem vorbord (mit fine?)
Rhynchites hirtus = dem vom 3 Fichtenfrig.
Archarias nebulosus = dem finsigen
Elater flabellicornis ♂ = dem reinen Ex. v. Klank.
Elater fuscatus = dem reinen von Klank
Faliger Lamii = dem finsigen, nur ein wenig grösser.
Sibinia subpina = einem Rhynch discariae
Faliger Lima = R. Geranii Payk (mihi)

— variabilis = der finsteren D. varicolor.
Rhynchites azureus = dem finsteren R. versicolor.
Sibinia sparsuta mit schwarz Elytren (♂?) u. die schwarze Zeichnung mit weiss gemischt, u. dessen undeutlicher.
Faliger undato-fasciatus scheint nur von einem Quercus dass mittle verschieden zu sein, als dass bey den beiden u. andern gelben Fasern Schuppen statt gelb, weiss sind.
Rhynchites pilosus = dem finsteren villosus. D. einigermassen gegen den finsteren.

Falciger Andropogonis = minimus Rhyncht. Symphiti.
Archarias ferrugineus = minima Avellanae (ferrugineus)
Buprestis maculicollis = B. laeta. von fine (mit zu unterst Gelb
unter vorne die unteren, Laeta nicht
so roth-glänzend, sondern mehr grün

Attagenus fulvipes = dem finnigen.
Cetonia angustata (fil. elongata) rare = Cet. angustata Lej. die vorige
Sibina polyneata = Bandung
Dasytes crinitus = Parallelon lineatum. v. Gyll. N. 10
— alpinus = Colpotis albipilla. v. Gyll. N. 8.
Haliplus ruficollis = Dasytes nitens. v. Gyll.
Rhynchites aereus = H. variegatus. Lej. v. Gyll.
— coeruleus = dem finnigen
Xylethinus testaceus = dem finnigen
Elater fraxini = Orion rufus v. Gyll.
Rhynchites opalizans = dem finnigen
— giganteus = dem finnigen. (Bacchus?)
Falciger guttatus = dem finnigen
Archarias villosus = dem viel dem Bonsdorff.
Cetonia volhynensis = kann ich von finnigen &c. nicht unterscheiden
Rhynchites elongatus = dem finnigen
Buprestis variolosa = minima plebeja v. Gyll.
Elater impressus = habe ich schon

[illegible] — — — Dehn — . 2 . 1 . 30
[illegible]. — — — Del — . 1 . 1 . 20
[illegible] — — — Lycoht . 1 . — . 30
[illegible]. Fis — — — Kirschland . 1 . 1 . —
[illegible]. Dej — — — Volhynien . 1 . — . 40
[illegible]. Zubr. nov. sp. Sch. M. velg . 2 . 1 . —
[illegible]. Dej — — — Del . 1 . — 20
[illegible]. Fi — — — Schuh . 1 . — 20

Falciger deauratus = wenn sind sonst Nr 47 von Turm

Elater chrysocomus = ist wegen Größe als E. holosericeus genau zu unterscheiden. Die Hals Seiten sind [illegible] fast gar nicht punktirt.

Triplax collaris = rufipes von Turm

Haliplus Harziniae ist wohl nicht von maximus fr. obliquus zu unterscheiden. Er ist nur wenig kleiner. Die Flügeldecken der Mitte sind gleichseitige schwarz. Die schwarze Binde hängt nicht mit den vorderen schwarzen Flecken zusammen. Der Halsschild ist nach hinten schwarz gesäumt. Bei fr. obliquus sind die Seiten von der Basis ein wenig eingedrückt mit einigen gröberen Punkten, welche bei diesem nicht ist. Sonst Gestalt u. Punktirung gleich.

—— lineolatus = fr. der sonstigen marginc-punctatus.

Elater linearis = von und dem Odenwald. Nur wenn von dem dessen fr. die Rothe nicht so breit dunkel.

Apkodius 2guttatus = A. Zenkeri von dem Odenwald.

—— 4maculatus = dem Nürnberger und Nachbarkreis.

Carabaeus haemisphaericus = ist von dem sonst schattirten bicolor wohl nicht zu unterscheiden, denn die Punkte kleiner Unterschied als dass der Halsschild ein wenig dichter u. unter grösseren punktirt ist, und die schwarzen Punktstreifen der Decken, wenn dem Aussenrand und der Spitze zu ein wenig unter eingedrückt sind. Auch ein wenig kleiner, und oben kürzer mit blonden Haaren.

Melolontha pilosa ist [illegible] von kleiner, dunkler fr. der villosa zu unterscheiden. Die Hinterleibsspitze ist nicht der Oberflügel nur mit dunkleren kurzen feinen Härchen bedeckt, bei villosa fast gelblich.

—— marginata = vagans der früheren Bestimmung.

—— = von den schwärzeren fr. der D. hybrida von Kunze nicht zu unterscheiden.

—— variabilis = der früheren D. varicolor.

Rhynchites azureus = dem früheren R. versicolor.

Orchesia sparsuta wenig kleiner (Ø?) u. die schwarze Zeichnung mit mehr gelben gemischt, u. daher undeutlicher.

Falciger undato-fasciatus Stimmt nur von maximus Quercus dass nichts zu unterscheiden zu sagen, als dass bei den beiden u. andern gelben Flügeldecken statt gelb, weiss sind.

Rhynchites pilosus = dem früheren villosus. D. ungefähr ganz dem früheren.

Anisoplia crucigera = unicum ♂.
—— segetum. ♂. = A. fruticola der früheren Bearbeitung (s. Abrede)
doch hatte das ♂ die gezähnte Mittellinie des Hals-
schildes nicht, sondern war auf der Scheibe; und
das ♀ hatte die dunkle Umgebung des Schildschens
aber nicht die dunkle Stelle am Aussenrand der
Decken, sondern die Decken waren nur an
der Naht u. am Rande fein schwarzbraun.
Omaloplia carbonaria = O. nigra der früheren Bearbeitung
Orchestes rufus = dem fünfzig.
Saperda Echii. Dahl = der fünfzig.
—— scutellaris = S. alboscutellata der früheren Bearbeitung. u. gegen das
frühere jetzt vertauscht. ~~Die~~ Die Zeichnung.
des Hüfte ♂. waren 1''' kleiner ~~als~~
u. verschiedlich ♂.
Leptura bisignata = L. binotata. D. der früheren Bearbeitung. (gegen das früher
vertauscht.) das ♂ ist etwas kleiner u. schmaler.
der gelbrote Mittelfleck ist zuweilen fast ganz
verschwunden. die Decken zuweilen etwas
dunkler (fallbraungelb)
Aucheria melanocephala = unicum A. flavicollis. Marsh.
Lema suturalis = L. paracentesis der früheren Bearbeitung. der gelbe
Fleck vor der Deckenspitze hängt gewöhnlich mit
der Naht zusammen, doch zuweilen auch nicht.
Chrysomela grossa = Chrys. lucida-Ol. der früheren Bearbeitung.
Chrysomela heteropunctata kommt auch etwas grösser (5''') u. dunkler metallisch vor
—— lurida = der früheren.
—— marginata = der früheren. die beyden ostindischen ♂
waren kleiner gleichfarbig, als der hiesige ♂ war
ist garnicht vergleichen konnte. Ob immer?
Gegen der früheren vertauscht.

ferrogationis.	— — —	Oelve	2.	1. 30
umbrides.	— — —	Oel	1.	1. 20
onica.	— — —	Lüneburg	1.	— 30
ennata. Fis	— — —	Kirchhund	1.	1. —
hiniensis. Dej	— — —	Volhynien	1.	— 40
Syriaca. Zabl. nov. sp.		Sarepta. Volga	2	1. —
bagdula. Dej.	— — —	Oel	1	— 20
fasciata. Fs	— — —	Astrabad	1	— 20
			17.	10. 17

80

Meissner

Mit gefälliger Zuschrift sehe ich Ihrer gefälligen Antwort entgegen

Ihr ergebenster Diener

Meissner

150

Anmerkungen zu dessen Sendung Jan. 1825.

Lina speciosissima = L. gloriosissima der grösseren Sendung
= gloriosa von Macaire. Vorderstheil grösser u. klarer als meine L.
Das Schildchen gewöhnlich ganz grün, zu weilen blaugrün; auch das grüne der Decken ist oft blaugrün. Die Naht und die mit der grünen Mittelstrieme oft fast ganz blau. Unterseite u. Beine stahlblau, oder weniger Goldgrün. Das Schildchen ist gewöhnlich etwas gröber punctirt; auch gewöhnlich der Seitenrand desselben mehr wulstig.

Clytra collaris = Clytra collaris der grösseren Sendung.

Cryptocephalus 8guttatus = dem grösseren.

Pimelia muricata = genau wie Beschreibung von Chabrier.

Donacia aquatica = meine Nymphaea dentata. Kby.

— bidens. P. das ♂ ist etwas schmäler u. fast etwas länger Lissler.

— dentipes = der grösseren.

— gracilis = von den schmälsten Ex. der D. hybrida von Kunze nicht zu unterscheiden.

— variabilis = der grösseren D. varicolor.

Rhynchites azureus = dem grösseren R. versicolor.

Cibiria sparsuta auch etwas kleiner (♂?) u. die schwarze Zeichnung mit mehr grün gemischt, u. daher undeutlicher.

Fabricius urnato-fasciatus Scheint mir von meinem Querceus durch nichts verschieden zu sein, als dass bei ihm die Beine u. auch die Schenkel stahlgrün statt gelb, wären sind.

Rhynchites pilosus = dem grösseren villosus. D. ungefähr ganz wie der grössere.

Anisoplia oreigera = auxinus fy.

—— segetum. Sf. = A. fruticola der früheren Bandung (s. Apfrodis)
Das Halsschild ist 5. die gegitterten Mittellinien des Halsschildes nicht, sondern nur auf der Scheibe; und das Halsschild 4. die dunkle Umgebung des Schildchens aber nicht die dunkle Stelle am Flügelrand der Decken, sondern die Decken waren nur an der Naht u. am Rande schwarzbraun.

Omaloplia carbonaria = O. nigra der früheren Bandung

Orchest[illegible]

Saper[illegible]

Lipsanus monachus. Das andere fy. war ½ kleiner. Vor den Augen steht auf jeder Seite des Kopfes ein Zahnstreif. Schenkel ist das Schulterblatt bedeckt. Das Schildchen ist so wie die andere Behaarung (wie Germ) gewesen abgerieben.

Lepte

Dirus biguttatus = dem früheren Lepyrus biguttatus.

—— V. griseum = dem früheren D. obliquus. M.

Hypera arundinis = der Paykullsche.

—— comata = Donus alpinus. Die früheren Bandung. Zuweilen etwas breiter (?) Auch etwas stärker fallbraun gefleckt.

Auch

Lem

—— oxalis = Donus tesselatus der früheren Bandung. Auch größer u. breiter.

—— palustris = der früheren von Nasidia. Die Breiten wovon die Seitenorgane stehen, sind öfters fallbraun als die übrige Farbe. Zuweilen überhaupt fallbraun.

Chry

Chry

Polydrusus cinerascens = Dasicllus canescens der früheren Bandung.

—— ovulum = Dasicllus ovulum der früheren Band. Zuweilen mehr gelblichgrün.

Thylacites aurarius = dem feinsigen. Nur ist die Farbe bräunlich oder wollartige Zeichnung der Decken, etwas deutlicher, als an meinen Ex.

—— ~~vitta~~ signatus. Scheint mir nur Var. des vorigen zu sein. Ist wenig größer u. die Grundfarbe dunkler, daher die falbe Zeichnung deutlicher (die wollartige Zeichnung ist auch feiner). Die Beine ist bis fast ½ mit rötlichen Haaren untermischt.

Carabus delicatus die Farbe ist zuweilen ganz dunkel metallisch die Furche hinter der Mitte des Halsschild ist nicht immer glatt deutlich. Die Decken sind vor der Spitze nicht so stark niedergedrückt.

80

Wien 8ten März 1825

Carabus gemellatus. Goldegg ist ganz schwarz Varietät von C. Hoppé
wenigstens finde ich keinen Unterschied.

Pterostichus parumpunctatus. = ist mir der Fauna helvetica dynastica
Varietät schwarz

—— Zahlbruckneri. 4 voneinander sich glänzend in Färbung

Elater rugosus beyde Ex. voneinander sich glänzend, nur daß eines etwas kleiner

Cymindis angularis. Gyll. das Kupferblaue = C. dorsalis von Heim.

—— punctularis D. = C. miliaris. das Kupferblaue von Heim.

—— angularis. Gyll. das Schwarze. H. habe beyde beisammen, da daß
eine Ex. kleiner ist).

Elater Quercus daß eine Ex. (♂) etwas kleiner ist. Flügeldecken = dem Thorax

—— quadrum. Auch daß andere etwas größere ist Flügeldecken ♂ etwas
etwas gröber und der Strich an der Spitze ist viereckig
mehr verbliechen, oder größer.

Corros thoracicus daß andere Ex. war nicht so dunkel, mehr braun. Fühler rothbraun

Graeca 3guttata. Mill. H. habe 1 Ex. beisammen, daß Varietät ist, die Hinterbrust
war etwas beschädigt. Vor der Mitte beyderseits ein
gelber Fleck u. gegen die Spitze zu ein gemeinschaftl.
kleiner ⊕. — daß 2te Feld hat beiderseits vorn Hinter-
wärts ein gelbes Fleckchen.

Marcha styriaca. etwas etwas kleiner. daß 2te Feld gemeinsam einen
Streifen, in der Mitte unterbrochen, eingedrückte Längslinie.

152

Besoldung
den 3 Assistenten
Reisenzuschuß
argutoides fl. —
maraginat. 1-30
longatus " -30
thymicus " -40
3 fl 40

Anisoplia orvicigera = arvicola Fr.

—— segetum. Sf. = A. fruticola der früheren Bearbeitung (s. Abhandl.)
Doch hatte der S. die zugeführten Mittelform der Gelb-
füßler nicht, sondern nur die gewöhnliche; und
doch hatte die dunkle Angabe des Pflückens
aber nicht die dunkle Stelle am Thorax und der
Decken, sondern die Decken waren nur an
der Naht u. am Rande schwarzbraun.

Omaloplia carbonaria = O. nigra der früheren Bearbeitung

Orchest[illegible]

Saper[illegible]

Lepta[illegible]

Auch[illegible]

Lem[illegible]

Chry[illegible]

Chry[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

80

Pisa den 8ten März 1825

Mein Hochgeehrtester Herr und Freund!

Mit großer Beschämung sehe ich, daß ich Ihnen noch
auf meine Nachricht von Genua gar nicht
allein ist März Monat Accord mit Ihnen
hat, ob ich mit meinem Reisegeld
in Ordnung bin oder nicht.

Ihnen Gnade und Bitte ich Sie unter
meinen Adress Hierher mir zu schicken
zu senden damit mir meine Familie
Pfingsten nicht ohne Sie.

Ich Reise nach Florenz, die Umgebung
von Pisa und Florenz wird mir Stabilen
Platz Lüge, ob ist der Gestalt von Italien
bleib ich gesund, so Hoffe ich Ihnen Dank
zu schicken 40 bis 50 Ducaten mit meinem Vetturino
der Liquet mich mit Rest, oder ohne gänzlich
in 15 Tag nach Florenz ist Hoffe gesund Sie

Jan. 1826. (Florenz)

n. 1825.

48	Dasy						
50	—— asphaltinus	—	12	133	Cionus gibbicollis	—	12
51	—— aurarius	—	10	134	Cleonus Anthyrisi	—	10
53	—— micans	—	12	135	—— fasciolatus	—	12
54	—— nitidus	—	12	136	—— ranunculi	—	12
55	—— rubidus	—	15	137	—— verbasci	—	12
58	Copris semicornis Pz	—	30	138	Sibinia cinerea	—	15
59	Aphodius Anachoreta	—	12	139	—— picirostris	—	30
60	—— ater	—	15	141	—— simplex	—	12
62	—— congener	—	20	142	—— sparsuta	—	15
63	—— plagiatus	—	18	143	—— velutina	—	12
65	—— sulcatus	—	18	145	Falciger abbreviatus	—	8
67	Melolontha aceris Pz	2	—	148	—— affinis	—	6
68	—— marginata	—	30	149	—— alauda	—	4
69	—— pilosa	—	20	150	—— albosignatus	—	12
		13	13	153	—— bructoides	—	12
				156	—— glaucinus	—	15
				157	—— globulus	—	10
						14	54

24	Cleonus mesacholcus	—	30
26	—— fuscus	—	20
26	—— quadrum	—	20
27	Eucnemis pygmaea	—	45
28	Boros thoracicus	1	—
29	Silvanus bipustul.	1	30
30	—— 5guttata	—	30
33	Brachys interrogat.	—	45
38	Cymindis styriaca	—	30
39	—— humeralis	—	20
		28	33
			33

Fauna Corsalba
ist durch den Herausgeber
Herr Ehrenbreitenstein zu
N° 12. Cetonia purpurascens 1–
" 19 Legeria smaragdina 1–30
" 134 Calcar elongatus " –30
" 37 Cetonia volhynensis " –40
3 / 48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anisoplia orucigera =
—— segetum. St. =

Omaloplia carbonaria =

Leptu

Auch
Lem

Chry
Chry

Cr

Cr

Cr

Verstreute in Dein d. 21ten Januar 1826.

154

82

Der Kastenschlesser

Habe ich die Ehre Anzuzeigen, daß mit

Dem Schlusse des Jahres Abgerechnet

Verbleiben im Cassa [illegible]

81 Cassa von dessen Ordnung Jan. 1825.

No.		℔	ß	No.		℔	ß	No.		℔	ß
3	Laccophilus variegatus		15	70	Anisoplia arvicola 3.	1	12	159	Paliger horridus		12
7	Hydaticus transversalis		15	74	Omaloplia limbata		15	161	— immaculatus		12
8	Haliplus ferrugineus		10	75	Hoplia pulvifera		15	163	— Lamii		8
9	— flavicollis		[illegible]	77	Cetonia lucidula		20	164	— relanatiformis		12
10	— lineatocollis		[illegible]	78	— metallica		15	155	— notula		12
11	— maculatus		15	79	Oxyptilia fusca		20	167	— punctum		15
13	Gyrinus angustatus		15	80	Notheus praeustus		20	168	— vernalis		15
14	— nitidus 2		15	81	Necydalis arundinis 2		20	169	Archaires echinatus		15
15	— velox		15	82	— salicadonia		20	170	— sorfulatus		15
16	Buprestis carniolica		45	83	Oedemera biguttata 2		40	171	— Hypocrita		15
18	— metallica		30	84	— ruficollis 2		30	174	Archarius elephas		24
20	Agrilus brevicornis		15	85	— sanguinicollis 2		24	175	— nucularis		12
21	— cupreus		12	86	Oxidorynchus austriacus		15	176	— pustulosus		15
22	— viridanus		15	87	— pallidus		18	179	Cleonus monachus		30
25	Elater ahaeneus		8	89	Mesosa curculionoides 2		36	182	Sirus 2 notatus		8
26	— asphaltinus		15	95	Gallerucca elongata		18	184	Hypera cinerea		12
30	— fulvicollis		18	97	Chrysomela heterospinae		20	188	— contaminata		6
32	— [illegible]		[illegible]	98	— haemoptera		18	189	— Tarraci		12
33	— limbatus. Peir		18	99	— [illegible]		[illegible]	190	2 [illegible]		
34	— tricarinatus		[illegible]	101	— punctata		20	191	2 [illegible]		
37	— nigritus. M.		20	102	Paropsis decostigma		24	192			
39	— obscurus		18	104	Eumolpus villosus		12	194	Polydrusus maculatus		15
40	— piceus		15	106	Cryptocephl. elongatulus		12	195	— nobilis		18
42	— rotundicollis		10	109	Triplax melanocephala		20	197	— sparsus		15
43	— terminatus		24	110	— sanguinicollis		15	199	Hylobius [illegible]		[illegible]
44	— vittatus. Z.		20	111	Dapsa nigricollis		30	200	— [illegible]		[illegible]
45	Silis spinicollis		20	112	Apate 4 pinita 2		36	2	Carabus impressus	3	
46	Malachius femoralis		15	115	Donacia bidens. Peir		18	4	Pterostich. Dorsalis		30
47	— viridis		15	118	— reticulata 2		48	5	— parumpunctat	1	
48	Dasytes aeneus		12	128	Hydrobius piloso		[illegible]	6	— Dahlbruckeri	1	
50	— asphaltinus		12	129	Orchestes hirtus		10	7	Alpaeus castaneus		45
51	— aurarius		10	130	— populeti		8	8	— foetidus		10
53	— micans		12	132	— scutellaris		8	9	Elater rugosus	1	
54	— nitidus		12	133	Cionus distinctus		15	10	Corymbites elaterides	4	
55	— rubidus		15	138	Cleonus Anthyrhizi		10	13	Cymindis angularis	1	
58	Copris semicornis. Pz		30	139	— flavescalcaratus		12	14	— maculatus		30
59	Aphodius fracchorata		12	141	— ranunculi		12	18	Dytiscus Roscnani		30
60	— ater		15	142	— verbasci		12	19	— striatus		30
62	— conspersus		20	143	Sibinia cinerea		12	20	— lapponicus 8	2	
63	— plagiatus		18	146	— picirostris		1	24	Elater melanocholicus		30
65	— sulcatus		18	148	— simplex		10	26	— Apicatus		[illegible]
67	Melolontha aceris Pz	2		149	— sparsita		15	26	— quadrum		20
68	— marginata		30	150	— selutina		12	27	Exocamis pygmaeus		45
69	— pilosa		20	153	Falciger abbreviatus		8	28	Boros thoracicus	1	
		13	13	156	— affinis		6	29	Dircaea 4 pustul.	1	30
				157	— alaudae		4	30	— 4 guttata		30
					— albosignatus		12	33	Pachyta interrogat.		45
					— bructeroides		12	38	Tymarcha strigosa		30
					— glaucinus		15	39	Clinia smaragdula		20
					— globulus		10			28	[illegible]
						14	54				33

Neue Cassa
ist rein [illegible]
Der Elenbeinsammlung
No 2. Cetonia purpurea 4 –
" 19 Lepida smaragdina 2 – 30
" 134 Cassor elongatus " – 30
" 137 Cetonia volhynensis " – 40
3 ℔ 40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anisoplia crucigera =
—— segetum. Sf. =

Omaloplia carbonaria -

20 / 22 x
23 . 14
29 . 33
68 26
13 13
14 54
28 33

198 / 15

Abrechnung mit Dessl (März 1825)

Er soll Ihnen baar restiren . . . 38 – 44
Sie restirt hier baar . . . . 130 – 30
25% Rabatt auf diesen 130/30 x . . 32 – 87

201 / 51

Für diese 201/51 xr haben wir Körner restirt

Wiesbaden nächst Mainz 21ten Januar 1826.

82

Hochwohlgeboren

Habe ich die Ehre anzuzeigen, daß mit dem Juchs den Euer Wohlgeboren mir Anfangs Dezember vorigen Jahres bezeichnet worden ist, ebenfalls 4 Schachteln nebst einem Brief und Ab Anzeigeschein der mit dem Juchs acquirierten Collecte & 2 Rezensionen Schachteln wie auch die übrigen Exemplare, welchen die Ehre Ihnen gefällig zu übersenden mit der Bitte solche gütigst Ihnen besorgen zu lassen. Daß ich meinen Aufenthalt ab Ihnen Ihnen gefällig zu übersenden mit der Bitte solche gütigst Ihnen besorgen zu lassen. Daß ich meinen Aufenthalt ab Ihnen

(Stolin)

49	Chrysom.			
50	—— Alo			
51	Clythra Fl			
52	—— mela			
53	Cryptoceph:			
54	—— Blan			
55	—— marg			
56	—— Flel			
57	—— Signa			
58	Colaphus Lam			
59	Eumolpus Fe			
60	Dasyles			
61	—— Spia			
62	—— Cyl			
63	—— pisi			
64	—— Cyp			
65	Aphthonus			
66	Apate			
67	Bostrichus			
68	Heleps			
69	—— Tene			
70	—— pic			
71	Necrophorus			
72	—— ate			
73	Forcadion			

20	Apotomus rufus Oliv	rothbr.	♂	1	1	20	
21	Carabus Bonelli	Do.	♂	2	4	—	
22	—— Splendr.	Andalus.	♂	1	5	—	
23	—— rugulosus Creutz.	Toskan.	♂	1	3	—	
	Dej. Bonel.						
24	—— pallustris	Do.	♂	1	—	45	

43	Onitis						
44	——						
45	Onthophagus						
46	Typhoeus						
47	Aphodius						
48	Typaeus						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anisoplia oruciger
—— segetum

Omaloplia carbonaria

ist nicht Anzeigen.

Bitten Sie Hochwohlgeboren meine Verbindlichkeit über Ihren Irrthum, Ihnen die nicht bestellten Bücher zugesandt zu haben, gütigst Nachricht, so bald es mir möglich sein werden Ihnen Ihre Bestellung zu senden, der mir meinen Irrthum zu entschuldigen gütigst, Ihr ich aber meine Ehre darin setzen werde

Die Preise der Bücher ist auf das billigste gestellt der meisten Autoren worden die mindesten Bücher, die ich für die Herren gestellten Catalog angestrichen habe ist nur 6 gr / 1 fl. gute rechnet das Viertel gut Ihnen worden Herr Hofprediger von Degear gut eine für 1 Rthl einen Carl. Linnaeus gesandt, den Herr Ihnen 10 % rabattirt

Die Herr wolle nun billig zu sagen gesandte ist Ihnen Einband etwa 100 % 25 % Rabat. und sollten die Ihnen ganze übernehmen, so willkommen 30. % per Hundert

(Stralsund)

alb einen Abzug gestellen lassen, auf ein
Hundert Personen 35 fl. Da ist diesen Sommer
eine Reise der Berge, die eben so Kostspielig
sein wird als die letzte.

Ich bin gesonnen, wenn ich mein Reise
Geld zusammen bringe, mit Anfang Merz
dieses zu Anfang, nach Livorno
einzuschiffen, und den Sommer über in Corsika
zuzubringen, ich gehe in Sicilien über einen
Kurz Rückkehr der Frühjahr der mir nun
Angelegen ist, Collectaneen, die mir
ein einem Aufenthalt von 10 Jahr Gelegenheit
gegeben, die mich allein Anfangen alles
zu wagen, nun Reisen zu Machen.

Ich wird es mir sehr Wenn Ihr Gesinnung
zu Einem Unternehmen beistimmen so ist
mich bei meiner Zurückkunft Gelegenheit
machen werde. Besitzen Sie Ihre Carabus
Hispanus Splendens. Vagans. ist gefällig

20	Apotomus Rufus Oliv.	variolosus	Tosk.	1. 1.	20.
21	Carabus Bonelli Fr.			2	1.
22	— Splendens	rutilans	Andal.	1.	5.
23	— irregularis	Creutz.	Tosk.	1.	3.
		Rossi. Bonel.			
24	— pallidipes	Fr.		1.	1.

45 Orthocerus Koxanus Fr. 1. 1. 20.
44 — Latreillii Dej. 2 1. —
45 Orthocerus Schreibersii Dej. 1. 5. —
46 Leistus Spinibarbis Fr. 1. 3. —
47 Nebria Livida Fr. 1. 1. —
48 Elaphrus Riparius Fr. 1. 1. —

Axisoplia orneig
—— segetus

Omaloplia carbo

20 / 2
23 . 1.
29 . 3
68 2
13 1
14 3
28
198 /

in Zeit 8 bis 10 Tage Transporte
Wenn man anfangs für die Tiere sorgt
wird, so wird es mir ein Rätsel bleiben
müssen, wenn die mir empfohlenen Tiere
nicht gedeihen wollen, auch Kotiland Räume
ist für diese Tiere geeignet. Sie werden
10 Pfund 9 Pfund.

Lasse sich diese Käfer schwierig aufbewahren
und Präparate mit den Tieren machen
Nicht müssen? Ich könnte Ihnen Ihre
Bitte Leipzig, die Tiere Ihnen
Durch mich senden.

Ich wünsche Ihnen Erholung und Ihnen
recht viel Käfer. Entschuldigen mir
ich habe Ihnen gestern ein Thema vorgelegt
zu machen.

Mit Gruß und Hochachtung bin ich
Ihr Hochgeb
ganz Ergebenster
G. Dahl.

(84) Bemerkungen zu Dahls Reise Jan. 1826. 158 Ja
(Stralsund)

(83)

No	Namen	Patria	Thlr	Sgr	Pf
	Brachinus pectoralis Zgl.	Toskana	2	1	—
	—— fumans Stülp.	"	2	1	—
	—— psophia Sanitali	"	2	—	48
	—— sclopeta vera	"	2	—	40
	Cephalus Olens. Dahlb.		2	4	—
	Ophonus Etruscus. Bon	"	2	1	—
	—— rotundicollis Dej.	"	2	—	48
	—— mendax. Rossi	"	2	—	40
	Calathus limbatus. Dej	"	2	—	40
	Olisthus Schrÿbocephalus Pz	"	2	1	20
	Poecilus punctatostriatus. Da	"	2	—	48
	Argutor Chalybaipennis Zgl	"	2	1	—
	Harpalus Etruscus Da	"	2	1	—
	—— Virens. D.	"	2	—	40
	—— Alpinus D.	"	2	—	40
	Dromius rufipes. Var.	"	1	—	24
	Omphreus morio. Zg.	Cattaro	1	3	—
	Sphodrus Dalmatinus Zg.	Dalm.	1	—	48
	—— elongatus. Zg.	"	2	1	20
	Apotomus rufus. Olivier	Toskana	1	1	20
	Carabus Dahlbohmii Da	"	2	4	—
	—— Splendens rutilans. Dej	Andalusien	1	5	—
	—— irregularis. Creutz. Dahlii. Bonel.	Toskana	1	3	—
	—— pallidus Da	"	1	—	45

No	Namen	No	Namen
25	Leistus	49	Chrÿsom.
26	—— Spi	50	—— Olea
27	Agonum p	51	Clythra Ti
28	—— V	52	—— mela
29	Dytiscus	53	Cryptoceph: e
30	Melolontha	54	—— Blond
31	—— Albo	55	—— marÿp
32	—— pub	56	—— Stell
33	Anomala	57	—— Signa
34	—— Signata	58	Colaphus Sinu
35	—— Juno	59	Eumolpus Ve
36	Hoplia	61	—— Spi
37	Cetonia	62	—— Cyl
38	—— Gi		—— pi
39	Arrideus	64	—— Cyp.
40	Scarabaeus	65	Aphodius
41	—— hypo	66	Apate
42	—— har	67	Lyctus nig
43	Onitis	68	Helops
		69	—— Tene
44	—— Da	70	—— pic
45	Onticellus		Heteroceru
46	Sisyphus		—— at
47	Ateuchus	73	Lucanus Cephalus
48	Typhoeus		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(84) Bemerkungen zu Dahls Reise Jan. 1826 (Stolin) Ja

(83)

No	Insecten	Patria	Mus.	fl	x
	Brachinus pectoralis Dej.	Toskana	2.	1.	—
	—— fumans Fabric.	"	2.	1.	—
	—— psophia Sturm.	"	2.	—	48.
	—— Selopeta vera	"	2.	—	40
	Lesphium Hens. Dahl.	"	2	4	—
	Ophonus Ethiops. Bon	"	2.	1.	—
	—— rotundicollis Dej.	"	2.	—	48
	—— mendax. Rossi	"	2.	—	40
9	Calathus limbatus. Dej	"	2.	—	40
	Olisthus Chrysocephalus Rossi	"	2.	1.	20.
	Poecilus punctatostriatus. Da	"	2.	—	48
	Argutor Chalybaeipennis. Zigl	"	2	1.	—
	Harpalus Ethiops Da	"	2	1.	—
14	—— Virens. D.	"	2.	—	40
15	—— Alpinus D.	"	2.	—	40.
16	Dromius rufipes. Var.	"	1.	—	24
17	Amphreus morio. Zig.	Cattaro	1.	3.	—
18	Syntomus Dalmatinus Zig.	Dalm.	1.	—	48
19	—— elongatus. Zig.	"	2.	1.	20.
20	Apotomus rufus. Olivier	Toskana	1.	1.	20.
21	Carabus Bonelli Da	"	2	4	—
22	—— Splendens rutilans	Andalusien	1.	5.	—
23	—— irregularis Creutz. Rossi. Bonel.	Toskana	1.	3.	—
24	—— pallidus Da	"	1.	—	45

No	Insecten	Patria	Mus.	fl	x
			41	35	41
25	Leistus Cyclicaudis Dahl	Toskana	1.	—	40
26	—— Spinibarbis	Frankr.	1.	—	40
27	Agonum picipenne Da	Toskana	2.	—	40
28	—— pusillum Da	"	2.	—	30
29	Bembidium Fulvatum	Frankr.	1.	—	30
30	Melolontha marginalis Ma	Toskana	2	4	—
31	—— Albosentellata Da	"	—	—	—
32	—— pubescens Da	Bologn.	1.	1.	—
33	Anomala devota Creutz	Toskana	2.	1.	30
34	—— Signaticollis Dej.	"	2	1.	30
35	—— Junii Duftsch.	"	2.	1.	—
36	Hoplia Lupicola. Bon	"	2.	—	40
37	Cetonia florentina Fabr	"	3.	6	
38	—— Gisana Da	"	2	—	
39	Trichius monocerus Da	"	4.	6.	
40	Scarabaeus Splendens Zigl Spr		4	12	
41	—— hypocrita Schrk	"	1.	—	24
42	—— hemisphaericus Oliv	"	2.	1.	—
43	Onitis irroratus Dahl	"	3	4.	30
44	—— Damon. Dej.	"	2.	2.	—
45	Onticellus pallens Zig.	"	2	1.	—
46	Sisyphus Italicus D.	"	2.	1.	—
47	Ateuchus Striatus. Dej.	Appenin	2.	3.	
48	Typaeus Carbonarius Da	Toskana	2.	1.	30
			92	79	10

Anisoplia oruein in Zirk 8 Tab 20 Leha 2 spreg. Transporte

Nr	Nahmen	Patria	Stück	Fr	Xr	Nr	Nahmen	Patria	Stück	fl	kr
			92	79	15					240	110
49	Chrysom. Grossa F	Tosk	2	—	40	74	Hamatych: Audax Scop.	Tosk	3	4	
50	— Chloromana Hoffm.	D	2	1	—	75	Procerulus Strebus Dej.	Sullen	1	1	
51	Clythra Taxicornis F	D	2	1	—	76	Lixus Varicolor. Da	Tosk	4	2	
52	— melanocephala Da	D	1	—	20	77	Lagria Glabrata Oliv	D	1	—	
53	Cryptoceph: tricolor Rossi	D	2	—	48	78	Hister major	—	D	1	—
54	— Bloudii Rossi	D	2	—	48	79	Anthribus centromaculatus Da	D	2	1	
55	— marginellus Oliv	D	2	—	40	80	Pinax Regalis v M.	D	2	—	
56	— Hellwigii Da	D	2	—	40	81	Cleonis Cardui Sam.	D	2	—	
57	— Signaticollis Da	D	2	—	20	82	— marginicollis Da	D	1	—	
58	Colaphus auratus Da	D	2	—	30	83	— picta Da	D	3	2	
59	Eumolpus viridis Da	D	2	—	30	84	— Sisymbr Da	D	2	1	
60	Daphnes viridis Da	D	2	—	36	85	Lixus lateralis Scop.	D	2	1	
61	— Splendidulus Da	D	2	—	20	86	Cantharis terminata Da	D	2	—	
62	— Cylindricus Da	D	2	—	40	87	Lixus Arundinis Da	D	1	—	
63	— pilicollis Da	D	2	—	36	88	Coboriza: Spalatrensis Gi	Sull	1	—	
64	— Cynosbatus Fa	D	2	—	40	89	— Cerealis Da	Tosk	2	—	
65	Aphodius plagus Da	D	2	—	48	90	— auriger Da	D	2	1	
66	Apate luctuosa Oliv	D	1	1	—	91	— Vittatus Da	Sull	1	—	
67	Zonitis nigripennis Dej	D	2	1	30	92	— Sulcipennis	D	—	1	—
68	Helops Rufescens Da	D	2	—	40	93	— Gilvipes Da	D	—	2	—
69	— Tenebrioides Da	D	2	—	40	94	— putridus Da	D	—	1	—
70	— picipes Da	D	2	—	40	95	— hispidulus	D	Tosk	2	—
71	Neroptera praustus F	D	2	1	—	96	Melans Senex Rossi	D	—	2	—
	— alter F	D	2	1	—	97	Hirmulus lupinus Da	D		2	—
73	Dorcadion Arenar Da	D	2	1	30						
			140	110						15	

Anisophlia cruciger in Zahl 8 bis 10 dieser Sprosse Transporte

	Patria	Mrd	Fx	Ad		Patria	Mrd	Fx	Ad
		92	79	15					240 110
Grossa F	Fossk	2	–	40	74 Hamatych: Audax Scol.	Fossk	3	4	30
romana Hoffm	D	2	1	–	75 Procerulus Sphecod. Dej.	Sulla	1	1	30
Lixi nis F	D	2	1	–	76 Lixus Varicolor Da.	Fossk	4	2	20
nocephala Da	D	1	–	20	77 Leptia Glabrata Oliv	D	1	–	30
tricolor Rossi	D	2	–	48	78 Hister major	–	D	1	– 45
Rossi	D	2	–	48	79 Anthribus cinctomaculatus Da	D	2	1	–
pinellus Oliv	D	2	–	40	80 Pirata Regalis v M.	D	2	–	40
virgii Da	D	2	–	40	81 Aleonis Cardui Sam.	D	2	–	40
nicollis Da	D	2	–	30	82 — marginicollis Da	D	1	–	45
uratus Da	D	2	–	30	83 — picta Da	D	3	2	–
ntridus Da	D	2	–	30	84 — Sisymbr Da	D	2	1	–
Fridi Da	D	2	–	36	85 Lixus lateralis Scol.	D	2	1	30
endiculus Da	D	2	–	30					
indricus Da	D	2	–	40	86 Cartharis terminata Da	D	2	–	40
ellicollis Da	D	2	–	36	87 Lixus Arundinis Da	D	1	–	45
ustulatus Fa	D	2	–	40	88 Toborkyn: Spalatrocnsis Hj.	Sulla	1	–	45
plumbeus Da	D	2	–	48	89 — Cremidis Da	Fossk	2	–	40
ctuosa Oliv	D	1	1	–	90 — auriger Da	D	2	1	–
ripennis Dej	D	2	1	30	91 — Vittatus Da	Sulla	1	–	45
fasciatus Da	D	2	–	40	92 — Subpennis D	D	–	1	– 45
brioides Da	D	2	–	40	93 — Gilvipes Da	D	–	2	– 40
pes Da	D	2	–	40	94 — putridus Da	D	–	1	– 25
praustus F	D	2	1	–	95 — hispidulus D	Fossk	2	–	30
F	D	2	1	–	96 Melens Senex Rossi	D	–	2	– 40
Strabonn Do	D	2	1	30	97 Hirmulus lupinus Da	D		2	– 40
		140	110	1/1					18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(84) Erwerbungen zu Dahls Reise Jan. 1826 – 158
(Stolin)

No	Namen	Gattung	Bd	Heft	Nro	Namen	No	Namen
			1831 37-40					
98	Typhachites Pini	Da	Tosk	2. – 40	122	Bupst.	area	Colymbetes
99	—— Cupressaceus	Da	d	. 1. – 40	123	——	Scut	——
100	Omicus Ericeti	Da	d	. 2. – 40	124	——	Sylle	——
101	—— Globulus	Da	d	. 2. – 30	125	——	Can	——
102	Macrocephalus Cupressaceus	Da	d	. 2. – 30	126	——	Cyper	Gyrinus
103	—— Arundinis	Da	d	. 2. – 00	127	——	Flo	——
104	Polydrusus albidus	Da	d	. 2. – 00	128	Donacia		Staphil
105	Taleiger Sibyrnbri	Da	d	. 2. – 30	129	——	Ar	——
106	Hyspera hispida	Da	d	. 2. – 48	130	——	Linn	——
107	—— punctulata	Da	d	. 2. – 30	131	Hyphidrus	va	Nomacia
108	—— Strabea	Da	d	. 2. – 40	132	——	ma	Serymus
109	Brachycerus tuberculatus	Kol.	d	. 2. 1. 20	133	Hydroma		Scraptia
110	—— ?	——	Julu	. 1. – 40	134	Haliplus		158 ——
111	Cyphorum pusillum	Tosk		. 2. – 30	135	——	G	159 ——
112	—— rotundicolle	Da	d	. 2. – 40	136	Hydrophi		160 Xyletin
113	Hylobius Oblongus	D.	flor	. 2 1. 20	137	Hydropor		161 Lema Can
114	—— Gibbosus	Da	Oczemin	2 1. 40	138	——	nigr	Tiefler m
115	Cedinus Sericeicollis	D.	Dek	. 2 1. –	139	——	ruf	Brachus
116	—— elegantus	D.	Tosk	. 1. – 24	140	——	Lat	Callidium
117	Hadrus ruficollis	Da	d	. 2. – 30	141	——	Linn	Clerus Mutilus
118	Cleonus rufipennis	Da	d	. 2. – 48	142	Blaps	Cs	Calath. Sc.
119	—— Subvittatus	Da	d	. 2. – 48	143	Cnemia	Cs	
120	—— Cruciger	Da	d	. 2. – 40	144	Dytiscus	C	Elytrus G
121	—— Scalaratus	Da	d	. 2. – 48	145	——	pust	Typhilus

208. 157

(84) Anmerkungen zu Dahls Bestimmung Jan. 1826. 158 Ja
(Stralsund)

No	Nahmen	Gattung	Rthl	ßl	₰	No	Nahmen	Gattung	Rthl	ßl	₰
			183 137-42								228
98	Tylechilus Pini	Da	Tolk	2	— 40	122	Bupst. area	Da	Tolk	2	—
99	—— Cinnamomeus	Da		1	— 40	123	—— Scutellaris	Da	Cathalo	2	1 —
100	Omicus Ericeti	Da		2	— 40	124	—— Splendidula	Da	Tolk	2	— 40
101	—— Globulus	Da		2	— 30	125	—— Carduus			2	2 —
102	Macrocelmus bicingulatus	Da		2	— 30	126	—— Cyparissiae	Dej	Gf. magyath. Kalk	2	14 —
103	—— Arundinis	Da		2	— 00	127	—— Florentina	Da	Tolk	2	14 —
104	Polydrusus Albidus	Da		2	— 30	128	Sonacia elegans	Da		2	— 48
105	Falagyes Schönherri	Da		2	— 30	129	—— Aenea	Da		2	— 48
106	Hypera hispida	Da		2	— 48	130	—— limbata	Da		2	—
107	—— punctulata	Da		2	— 30	131	Hyphidrus variegatus	Gyll		2	—
108	—— Erusea	Da		2	— 40	132	—— maculatus	Da		2	—
109	Brachycerus tuberculatus	Kol.		2	1 20	133	Hydroma Cruciata	Da		2	— 48
110	—— ? ?	Islm.		1	— 40	134	Halyplus rotundatus	Da		2	— 40
111	Dytiscus pusillus	Tolk		2	— 30	135	—— Guttatus	Da		2	— 40
112	—— rotundicollis	Da		2	— 40	136	Hydroporus nanus	Da		2	— 30
113	Agabus Oblongus	Da	flor.	2	1 20	137	Hydroporus auritus	Da		2	40
114	—— Gibbosus	Da	Cegenin	2	1 40	138	—— nigricollis	Da		2	—
115	Gyrinus Sericeicollis	Da		2	1 —	139	—— rufipes	Da	Cegen	2	—
116	—— elegantus	Da	Tolk	1	— 24	140	—— fasciatus	Da	Tolk	2	— 40
117	Haliplus ruficollis	Da		2	— 30	141	—— Lineolatus	Da		2	— 30
118	Elater rufipennis	Da		2	— 48	142	Blaps Australis	Dej		2	1 20
119	—— Subvittatus	Da		2	— 48	143	Colonia Cardui	Dej	Hyrtin	1	1 —
120	—— Cruciger	Da		2	— 40	144	Dytiscus Coriaceus	Gyll	Tolk	2	3 —
121	—— Scalaratus	Da		2	— 48	145	—— pustulatus	Fbr.			

228. 15r

Anisoplia ornata in Gyps & Lib. d. Lebh. Expreß. Transporte

				273	183 11
146	Colyntes marginalis. Ge	Tosk.	2.	1.	—
147	—— binotatus. De	d	2	1.	—
148	—— marmoratus. De	d		1.	— 20
149	—— elongatus.	d		2.	— 40
150	Gyrinus Cupreolineatus. De	d		2.	— 40
151.	Laemophl. Italicus	d		2.	— 40
152	Staphilinus bicolor. De	d		1.	— 24
153	—— Chrysocephalus. Oliv.	d	1.	—	30
154	—— Chlorovenatus. De.	d	2.	—	40
	Nomicia angustula. D.	d		2.	— 40
	Scymnus fimbriatus. D.	d	2.	—	36
	Scraptia 4 maculata. De	d	2.	—	36
158	—— Testacea. D	d	2.	—	36
159	—— bisignata. D	d		1.	— 18
160	Xylesinus 4 maculatus. Ge. Ro		1.	—	24
161	Lema Campestris. F. Tosk		2.	—	40
162	Fidler maculatus. Rossi	d		2.	1. 30
163	Bruchus Lineatus. De	d		1.	— 20
164	Callidium holosericeum. Ross	d	2	2.	20
165	Clerus Myrmecodes. Hoffm	d		1.	— 48
166	Catal. Scheidleri v. d. in Ver. Ofen.		4.	2.	—
	Rhynch. Gibbosus. Ross.	Tosk.	1.	—	48
	Summa.		314	200	51

Buprest. Florentina bitte mir für 1804 [illegible] d. Ges.
und d. Insektur Sr. Excellenz und d. Hofgerichtsrath Dahl Esqr.
Aus Catal. Insectol. C. Rossii. Von selben ist mir
Ex Gryllus Segetum mir für 1 Kr. Catal. Hrn. Pfarrer Scheidler
Aus Cat. Rutilans Dahl ist Ofen. Sr. Excellenz

Anisoplia oruein in Zirk 8 Stk zu Lebs. Expreß. Transporte.

	Pattie	Thlr	Sgr.	x
		27	18	11
marginalis. Sc	Tor.	2.	1.	–
inotatus. Sc	d	2	1.	–
ermoratus. Sc	d	1.	–	20
longatus.	d	2.	–	40
Cupreolineatus Sc	d	2.	–	40
8 flavicus	d	2.	–	40
nus bicolor. Sc	d	1.	–	24
Nocephalus Ostr.	d	1.	–	30
rovenstris. Sc.	d	2.	–	40
angustulus Sc.	d	2.	–	40
8 fimbriatus. Sc.	d	2.	–	36
4 maculata Sc	d	2.	–	36
testacea. Sc	d	2.	–	36
Signata. Sc	d	1.	–	18
us 4 maculatus Li. Sc		1.	–	24
pestris. F.	Tor.	2.	–	40
aculatus. Rosh.	d	2.	1.	30
Cincta. Sc	d	1.	–	20
Scholosericeum Rosh	d	2	2.	20
Simecodes. Hoffs.	d	1.	–	48
Scheidler. vor in ver. Obrigk		4.	2.	–
ibbosus Rosh.	Tor.	1.	–	48
Summa		3/4	200	1

Bupr. Florentina bitte mich hier von [illegible] a
mit d. Angabe Sr. Plätze und d. Preises. Del Lasta
Aem. Catab. angulatus Cr. Bosn. Von Sulz ist mir
Cetonia Speciosa Pal. mir Linn. 1 St. Catab. Hirsch
Aem. Cat. rutilans Dalm. ist Ihnen Sr. Hochwohl

(84) Bemerkungen zu Dahl's Eintheilung Jan. 1826. 158
(Stolin)

Zuphium olens. Das andere Exemplar ein wenig kleiner und in allen Theilen schwärzer (♂?) Die hintere Mandel war nicht so bestimmt, sondern verlohr sich der Naht hinauf

Ophonus etruscus. Das ♂ ist ein wenig grösser und breiter, und alle Puncturen feiner. Auf dem Halsschild nicht so zusammengeflossen und auf den Decken auch gleich stark. Ein Baum ♂ die Decken waren fast ganz vollbraun u. nur an der Spitze ein verloschener dunkler Fleck.

Ophonus rotundicollis. Das Braun geht auch ins grünliche über.

Ophonus mendax Rossi = O. Reichenbachii. Sturm.

Calathus limbatus. Dej. Das ♂ ein wenig schwärzer u. die Streifen der Decken etwas tiefer.

Dinodes rufipes. var. grün, braun ins blaue Holland.

Sphodrus elongatus. Z. Das ♂ war etwas kleiner u. die Decken noch ein wenig gewölbter. Der blaue Schimmer schwächer.

Carabus Zonbroffii. Z. Das ♂ hatte etwas kalbfarbene Bronzeglanz u. war etwas schmäler. 1ste Antennenglied auch dem eingedrückten Punct.?

Leistus spinibarbis. ist vom Friedberger spinibarbis nicht verschieden.

Agonum picipenne. Das ♂ etwas breiter u. grösser. die Eindrücke an der Spitze der Decken characteristisch.

Hirmulus lupinus. Z. hatte ich von dem Grafen Schaltenbrand (Hirmulus? von Ragusa 1838) nicht verschieden gefunden nicht so dunkel, sondern alles braunroth, nur gewölbt. Das selbe Abweichung von Hell u. Dunkelroth.

Melolontha matutatis. beym ♂ sind die Füsse des Clypeus nicht
nicht abgerundet, sondern bilden einen rechten, doch
abgerundeten Winkel (⌐). Die Fühlerkolbe so gross
wie bey M. hirta pilosa. Alle Flügen ausgenommen.
Die Flügeln der Oberflügel sind ungemein grün,
sondern nicht ins braune fallend.

Melolontha alboscutellata. ♂. (ein ♂.) Ist derselben Grösse wie Melolontha
mit langen (der Flügeln). Das Halsschild ist ungefähr
so breit, doch kürzer, einen Flügeln beträchtlich
abgerundeten ungef. einen abgekürzten Mittel.
stumpfen das Halsschild, das Schildchen und die
Unterseite sind lang gelblichgrau wollicht.

Anomala signaticollis. Beym. beym einem ♂. ungef. die Einfassung
des Halsschild deutlicher und schön grün. (die
auch seiten abgekürzten Mittelkiele, nach jeder Seite
2 Kerben u. die Mitte des Rückens) Auf abwärts
kleiner.

Anomala Junii. Beym dem andern ♂. ungef. die Gegend um das
Schildchen gar dunkelgrün, fast pianokleiz
Flecken umgeben. Die Beine gelb, mit den
Fussklauen ein ansehnlicher Flecke. Die Unterseite
rothbraun.

Cetonia florentina. Das Grün ist gemischt mit einem merklich gelblichen
Schein. Halsschild aber dem Schildchen immer violett. –

Cetonia pisana. Varietät ♂. Oben ganz grün, unten rothgolden
wie die C. aurata. (ausser die Brustseite). – Oben
ganz kupferroth, unten dunkelgrün.

Armidens monoceros. Varietät mit blauen, grünen u. violetten Flecken.
Auf abwärts kleiner.

Melolontha Sericea Roß d 2 2.20
Hemecodes. Hoffm. d .1.– 48
Melolontha Vill. in Ver. Obrigk. 4.2.–

38 Melolontha Roß. Fasc. 1.– 48

Summa. 3/4 200,5/1

Buprestis Fla
Scopoli
Index Catal. Lugd.
Gyllenhal Species
Index Cat. Schön.

Scarabaeus
Atem
Orit
Orit
Chry
Chry
Cryp
Cryp
Tym

Scarabaeus splendens. ♀. Ist von diesen Käfer (Hfg) nicht genau zu unterscheiden. Das Grün mehr bis 3 fg. ins Kupferrothe (Kupfergrün) übergehend. 1 fg. mehr nur ein Anflug ins Kupferroth ziehend, sonst fg. grün wie autumnalis. (Beim Durchstechen am Rand. — Auch eine halb so große. Da kleiner ja Flügeldecken die Querrunzeln der Dekken die 3 andern fg. mehren stärker kupferglänzend (Tafelfl violettgrün)

Ateuchus striatus. Dej. Das andere fg. mehr nicht so matt, sondern glänzend.

Onitis irroratus. Die 2 ♂ waren größer u. hatten stärkere Beine u. Zähne (auch längere Vorderbeine) als das Weibchen fg. № 4. — Das ♀ war wie das v. Steven mehrfarbene fg. O. Moeris (№ 6.) nur etwas größer u. die Dekken mehr Beine ♂ gelb gefärbt.

Criticellus pallens = dem weißlichen von Genua.

Tymarcha carbonaria. Das ♂ etwas kleiner u. breite Fußblätter. ♀ war etwas ins blaue Schwarz. — Von tenebricosa Duj. das wenige an den Seiten gerundete Halsschild groß. Chrysomela grossa. ♂ das Schild u. Unterseite bald grün, bald blau.

Chrysomela chloromaura Fbg. = Ch. lucida. Klug. (dessen kürzere Bildung)

Cryptocephalus Blockii. Zoss. Das eine ♀ war etwas kleiner u. die schwarze Makel in der Mitte des Rückenrandes fehlte.

Cryptoc. marginellus. Ol. das eine ♀ (♂?) war etwas größer, die 2 gelben Randflecken hellen, die gelbe Linie hell in der Mitte vor der Basis einen schwarzen Fleck. Die Beine u. Füße waren gelb

Hinnulus lupinus. A. Hatte ich von dem früher erhaltenen (Hinnulus ? von Ragusa № 58) nicht wesentlich verschieden nur so dunkel, sondern selbst braunes mehr grünlich. Doch die selbe Abweichung von hell u. dunkler.

Cryptoceph. Hellwigii. D. Auch etwas kleiner u. das kleine gelbe Mittelquadrat des Halsschilds fehlt.

Cryptoceph. signaticollis. Auch etwas kleiner. Das Dunkle der Decken mehr verloschen

Eumolpus nitidus. D. Auch etwas kleiner

Bassytes cylindricus. D. Die Eindrücke des Halsschilds weniger tief als an dem andern Ex. nicht so stark.

Zonitis rugipennis Dej. Das eine Ex. nur 1½‴ klein. Die Eindrücke der Decken weniger tief. Sind zerstreuter und die unglatte Farbe des Halsschilds. (u. kleiner (Borum

Helops picipes. D. Das eine Ex. nur ⅓ größer u. das Halsschild weniger

Helops rufescens. D. Ich halte diesen Käfer vom H. picipes. D. für nicht verschieden. Das eine Ex. nur kaum etwas kleiner als mein Ex. von picipes, aber dadurch vollkommen u. wahrscheinlich nur nicht lange ausgewachsen. Das andere Ex. nur sehr klein (1‴ kleiner als mein Ex. v. picipes.) und fast ebenso dunkel als picipes, nur das Halsschild nur wenig dunkel braunroth. Bei dem ganz kleinen, wo kaum die Hinterecken der Decken ein wenig mehr gerötet.

Stenopterus praeustus. Das eine Ex. nur wenig kleiner als H. rufus, von Heidelberg (mit etwas dunkeln Flügeldecken) u. unterscheidet sich durch weniger dunkel gefärbte Fühler. Das andere Ex. fast ebenso groß als H. rufus, nur die Hinterecken der Decken etwas dunkler braun.

Stenopt. alter Nur ein Ex. [illegible]

[illegible] mecodes. Hoffm. d. 1.— 48

[illegible] heidler. Vrn in Ver. Ohrigk. 4. 2.—

[illegible] Schluß Post. Forts. 1.— 48

Summa. 3¼ 200/61

Bayer. Fa[illegible] d. Insektur

Aus Cabinet Suffrian

Aus Cab. Dejean

Aus Cab. Redtenbacher

(88)

Nro	Aus Sardinien nebst Nro	Mens.	♂	♀
1.	Cicindela. Cruciata. Da.	6	2.	2. —
2.	——. Imperialis. Da.	6	2.	2. —
3.	Arobanus. plagiatus. Zi.	6	2.	2. —
4.	Ditomus. Cornutus. Dj.	6	2.	1. 40.
5.	——. Capito. Sdlg.	6	2.	1. 40.
6.	——. Sphaerocephalus. Oliv.	6	2.	1. 20.
7.	——. Affinis. Dj.	6	2.	1. 20.
8.	——. Gebleri. Dj.	6	2.	1. 20.

Nro	Aus Sardinien	Aus Ja
46.	Hydrophilus.	Sibinia.
47.	Onitis. Schrei	94. ——
48.	Onitigellus.	95. Hyperea.
49.	Aphodius.	96. ——
50.	—— Fer	97. ——
51.	Troa. nodul	98. Linus.
52.	Hybosorus.	99. ——
53.	Armidius.	100. ——
54.	Scarabaus.	101. Rhynobatbaus.
544.	——. imp	102. ——
55.	Pachynus. Cor	——
		——

(85)

zu Dahls Ordnung Jan. 1826 (Berlin (Fortsetzung)

160

Lixus varicolor. D. Zunächst ist das noch am meisten sch. fallgelb ist, nicht bestäubt. — Zunächst grün nicht bestäubt. —

Anthribus centromaculatus. Auf ½ kleiner

Pinax regalis. Sieg. Auf kleiner u. schmäler. ♂ —

Cleonis picta. D. Ein sch. rost fast falb- so groß u. ein rundes Fleck die falben Balken, auf gelbroth bestäubt und daher nicht so deutlich gezeichnet. doch ziemlich deutlich 3 Querbinden zu unterscheiden.

Lixus lateralis. Kol. Bis dem einen sch. rost die vorderen Fühler Rüssel rostgelb und die Seitenstriemen etwas breiter falb.

Loborhynchus crenosus. Dahl. der Rüssel ♀ noch viel breiter — (wie mein L. gartzensis. Priepke)

Loborhynchus gilvipes. D. Auf etwas breiter. ♀?

Lobork. hispidulus. D. Auf etwas kleiner u. schmäler. (♂)

~~Die Flügel~~ Ganz schwarzbraun, kaum rostfarbig (junges?)

Meleus senex. Rossi. durch nur 3 deutliche Linien von dem der ersteren Ordnung, wie es scheint, verschieden? Gewöhnlich ganz mit grauer Erde überschmiert.

Hinnulus lupinus. D. Falbe ist von dem ersten Exemplare (Hinnulus? von Ragusa 1824) nicht merklich verschieden nicht so dunkel, sondern selbst bronzen ins grünliche. doch die selbe Abzeichnung von Fell u. dunkler.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptoceph. Hellwigii. D. Auf etwas kleiner u. das kleine gelbe Mittenmackel an der Gelbschilde fehlt.

Cryptoceph. signaticollis. Auf etwas kleiner. Das Dunkle an der Decken war verloschen

Eumolpus nitidus. D. Auf etwas kleiner

Tylachites pini. D. Auf fast halb so groß (6?) u. etwas schmäler. Auf der Scheibe etwas mehr vorne stand.

Onias globulus. D. Die dunkeln Flecken der Decken zusammen fließen dunkler, aber die 2 Längsstriche der Gelbschilde [illegible] dunkler.

Macropelmus bisignatus. D. Auf etwas kleiner u. die dunklere Zeichnung kaum sichtbar

Macropelmus Arundinis. D. = mein gemeiniglich ~~gregarius~~ Stigmatis. Gyll. v. Fröl.

Hypera hispida. D. Das mir bezeichnete ~~[illegible]~~ Weibchen breiter, Decken auf welchen die Seiten der Gelbschilde bis zum Vorderrande weißlich mit einem dunklern Punkt vorne am Vorderrande

Hypera punctulata. D. Das andere Ex. zu wenig kleiner u. schmäler. ♂?

Hypera etrusca. D. Das mir bezeichnete ♂ stimmt genau die Größe, Gestalt u. Farbe meinem Hy. vandoma budensis (N. 410) nur waren die Streifen der Decken feiner u. weit größer punctirt.

Brachycerus tuberculatus. Kol. Das mir bezeichnete ♂ war von der Größe meinem B. algirus von Zeitz an und die Höcker der Decken nur wenig abgerieben, diese auch vor Spitze mit einem kleinen, sehr kurzen Büschel weißer Borsten versehen. Die Wolle war ebenso filzig.

Aspida oblonga. Zahl. Das andere Ex. (♂?) war größer, wie A. rotundicollis und ganz mit hellen (fast weißen) zerfließenden Flecken überzogen u. das Halsschild der Decken weniger erhaben u. weniger borstig.

Pedinus sericicollis. D. ist sehr das ♂. Das ♀ ist breiter und besonders sind die Decken vorne hinten nicht so gerundet, die Streifen der Decken nicht so tief u. die Zwischenräume breiter. Die Hinterschenkel nicht gezahnt, die vordern nicht gezähnelt. Die Vordertarsen nicht verbreitert. Auch etwas größer. Die Hintertibien nicht gebogen.

3/4 200,37

Nro	Aus Sardinien nebst Nro	Mark			Nro	Aus Sardinien	Aus Ja
1.	Cicindela. Craciata. Da.	6½	2.	2. —	46.	Hydrophilus.	Sibinia.
2.	——. Imperialis. Da.	6½	2.	2. —	47.	Onitis. Schrei	95. ——
3.	Atrobanus. plagiatus. Zi.	6½	2.	2. —	48.	Onitiscellus.	95. Hypera.
4.	Ditomus. Cornutus. Dej.	6½	2.	1. 40.	49.	Aphodius.	96. ——
5.	——. Capito. Selg.	6½	2.	1. 40.	50.	—— Fer	97. ——
6.	——. Sphaerocephalus. Olia	6½	2.	1. 20.	51.	Trox. nodul	98. Linus.
7.	——. Affinis. Dej.	6½	2.	1. 20.	52.	Hybosorus.	99. ——
8.	——. Gallicus. Dej.	6½	2.	1. 20.	53.	Arminius.	100. ——
					54.	Scarabaeus.	101. Rhynobatbaus.
					54a.	—— impr	102. ——
					55.	Pachypus. Cor	

(86) Zu Deshs Sendung 1826 (Sardinien) Fortsetzung 161

Elater rufipennis. D. Roth u. Fühlerfeld gänzlich (Schildrand dunkler) rest die Decken (dunkelbraun)

Elater subvittatus D. ganz rothgelb klainer.

Elater cruciger. D. Gänzlich rothgelb klainer u. selbst Thorax zeigt breiter [illegible]

Buprestis aerea D. ganz rothgelb klainer

Buprestis scutellaris D. Ganz rothgelb klainer. Roth, Fühlerfeld, Unterseite u. Beine nicht so blaugrün, sondern reiner grün, Fühlerfeld oder auch die 2 grossen, undeutlichen blaulichen Flecken. Decken hochgewölbt, nicht so breit wie die Decken, ganz rothgelb, besonders nach der Basis zu, Fühlerfeld

Buprestis splendidula. D. Decken 1 Zeile weit rothgelb klainer, sonst ganz [illegible]

Buprestis cardens. Der blaugrüne Fühlerfeld, Roth u. Unterseite weit hier mehr oder weniger grün. Ebenso der blauschwarze Fühlerfeld u. die Decken fast ganz schwarz mit sehr schwachem grünlichem Schimmer. Die schwarze Mittelzeichnung der Decken kömmt weiter hin der Naht herunter (bis ⅓ von der Spitze)

Buprestis Cyprestis. Dej. Obgleich der andere Exemplar reiner bestäubt war, so habe ich es doch nicht behalten, weil die Decken durch einige zufällige Eindrücken nicht schön waren. Der Fühlerfeld ist sehr dick bepudert, u. lässt nur den hintern Theil der Mittellinie, auf der Mitte 2 Punkte und einen Theil der Hinterrandes frey. Die Decken Roth u. Unterseite (mit Beinen) sind auch reich bestäubt aber nicht dick, sondern nur wie bereift. Die gelben Flecken der Decken waren auch da, und sind also nicht beständig.

Cryptoceph. Hellwigii. ♂. Auf oberseits klainer u. dort klainer gelber Mittelmackel des Halsschildes steht.

Cryptoceph. signaticollis. Auf oberseits klainer. dort dunkler ♂ Exemplar

Eumolpus nitidus. ♂. Auf oberseits klainer

1826

88

Nro	Aus Sardinien nebst Nro	Kind	♂	♀	Nro	Aus Sardinien	Aus Sa
1.	Cicindela. Cruciata. Da.	6/4	2.	2.	—	46. Hydrophilus.	Sibinia.
2.	——. Imperialis. Da.	6/4	2.	2.	—	47. Onitis. Schrei	
3.	Atrobanus. plagiatus. Zi.	6/4	2.	2.	—	48. Onitiscellus.	
4.	Ditomus. Cornutus. Dj.	6/4	2.	1.	40.	49. Aphodius.	
5.	——. Capito. Helg.	6/4	2.	1.	40.	50. —— Fer	
6.	——. Sphaerocephalus. Olia	6/4	2.	1.	20.	51. Troa. nodul	
7.	——. Affinis. Dj.	6/4	2.	1.	20.	52. Hybocerus.	
8.	——. Gebleri. Dj.	6/4	2.	1.	20.	53. Armidius.	
		6/4	2.	1.		54. Scarabaeus.	
					161	—— . imp	
						Pachypus. Cor	
						etonia. Aard	
						—— . Car	
						—— . Card	
						dius. biline	
						imelia. A	
						—— . moeb	
						—— . Corag	
						tis. impl	
						Angus	
						anocpherus.	
						entyria.	
						—— . Subs	
						—— . Glab	
						—— . Iris	
						aurus. Gig	
						—— . Lugen	
						—— . Atrat	
						—— . Stri	
						Vida. Oblon	
						Blaps. Stri	
						—— . Oculat	
						liophilus. Ag	
						intarus. He	
						natrum. La	
						rosum Germ. Fusc	
						rypticus. Ha	
						ona. Unico	
						elops. Gibb	
						anuria. Met	
						Pria. Phal	
						Xenostoma.	
						Zoboocea.	
						Rhynchites.	
						—— . Chal	
						Hycterus. Palv	
						—— . rusicor	
						Brachycerus. ?	

Bedeutung meiner Nummern 1826

87

Für Coleopteren.

Gütigst Anordnungen, auf meine
fernere Kisten dürfte meine diesjährigen
meine Insecten, ich Bitte um
Kiste Packe Nun hier ab. und Jahrgang
in 15e Jahr in Livorno zu Lager, schreck
meine mir Ihr zu sein in Corsica
Insecten Insecten aber in Sardinien
Wunsch Ich zum Ober bleiben ist Post
Nicht Schein! Ihr Sammlung Einander
Sorgfalt zur unbedingt Dank zu Ihnen
Meine Bitte ist die mir offerierten
1000 fr. auf C.o bald wie möglich unter
meiner Adresse gütigst Ihr Andreas
zu lassen, Ich mit meine Familie
et meinen Ihnen.

Cryptoceph. Hellwigii. D. Auf oberer Klaue u. der Klaue gelb
Mittelgrundfarbe des Halsschildes steht.

Cryptoceph. signaticollis. Auf oberer Klaue. der Dunkle der Deckschilde
unter verloschen

Eumolpus nitidus. D. Auf oberer Klaue

Herr Lacordaire wünscht ich wohl
zu leben und gesund zu bleiben
damit ich auch seine wenige
so interessante Freund Insecten mir
näher ansehen und genauer untersuchen könne.

Mit Hochachtung und Ergebenheit

Ihr gehorsamster Diener

Georg Freyherr von

G. Dahl

1826

88

Aus Sardinien weiss Horo

1.	Cicindela.	Cruciata.	Da.	2.	2.	—
2.	———	Imperialis.	Da.	2.	2.	—
3.	Arobanus.	plagiatus.	Zi.	2.	2.	—
4.	Ditomus.	Cornutus.	Dj.	2.	1.	40.
5.	———	Capito.	Selg.	2.	1.	40.
6.	———	Sphaerocephalus.	Olia	2.	1.	20.
7.	———	Affinis.	Dj.	2.	1.	20.
8.	———	Helvipes.	Dahl.	2.	1.	20.
9.	Carabus.	Constans.	Ull.	2.	4.	—
10.	Calosoma.	Indagator.	F.	2.	3.	—
11.	Licinus.	Granulatus.	Dj.	2.	1.	20.
12.	Sirdenus.	Filiformis.	Zi.	2.	1.	20.
13.	Leirus.	Metallescens.	Da.	3.	—	48.
14.	Percus.	paralelepipedus.	Dj.	3.	3.	—
15.	Zabrus.	Gravis.	Dj.	1.	—	40.
16.	Harpalus.	Sardeus.	Da.	2.	—	48.
17.	Calathus.	Ovalis.	Da.	2.	—	48.
18.	Scarites.	Glabratus.	Da.	2.	2.	—
19.	Sphodrus.	Sardeus.	Da.	2.	1.	20.
20.	———	Angusticollis.	Da	2.	1.	20.
21.	Dytiscus.	Hispanicus.	Dj.	2.	4.	—
22.	———	Sardeus.	Dj.	2.	3.	—
23.	Dytiscus.	Ornatus.	Da.	2.	3.	—
24.	Colymbetes.	Callaris.	Da.	2.	1.	—
25.	Hydroporus.	Frontalis.	Da.	2.	—	48.
26.	———	margineguttatus.	Da.	2.	—	48.
27.	———	Subsriatus.	Da.	2.	—	48.
28.	———	hieroglyphicus.	Da.	2.	—	48.
29.	———	Ferrugatus.	Da.	2.	—	48.
30.	———	Analis.	Da.	2.	—	48.
31.	———	6 guttatus.		2.	—	48.
32.	Buprestis.	Pisana.		1.	4.	—
33.	———	Cylindrica.	F.	2.	1.	40.
34.	———	Inrorata.	Da.	2.	1.	40.
35.	———	Orichalcea.	Da.	1.	1.	—
36.	———	Euphorbia.	Da.	2.	1.	—
37.	Elater.	Fascicollis.	Da.	2.	1.	—
38.	———	maculicollis.	Da.	1.	—	30.
39.	———	Granulatus.	Da.	1.	—	30.
40.	Dasyter.	Nobilis.	Da.	1.	—	30.
41.	———	Metallicus.	Da.	1.	—	24.
42.	———	Subaeneus.	Da.	1.	—	20.
43.	Trichodes.	Affinis.	Da.	2.	1.	20.
44.	Clerus.	Erassicornis.	F.	2.	1.	—
45.	Cistela.	Granulata.	Oliv.	2.	1.	—

Aus Sardinien weiss Horo

46.	Hydrophilus.					
47.	Onitis.	Schrei				
48.	Onitiscellus.					
49.	Aphodius.					
50.	———	Fer				
51.	Trox.	nodul				
52.	Hybosorus.					
53.	Armidius.					
54.	Scarabaeus.					
54a.	———	imp				
55.	Pachypus.	Cor				
56.	Cetonia.	Sard				
57.	———	Car				
58.	———	Card				
59.	Erodius.	bilin				
60.	Pimelia.	A				
61.	———	mor				
62.	———	Corag				
63.	Akis.	ampli				
64.	———	Angus				
65.	Clanopterus.					
66.	Tentyria.					
67.	———	Subs				
68.	———	Glabr				
69.	———	long				
70.	Scaurus.	Gigan				
71.	———	Luger				
72.	———	Hirac				
73.	———	Stri				
74.	Asida.	Oblon				
75.	Blaps.	Stri				
76.	———	Cault				
77.	Heliophilus.	Ag				
78.	Dendarus.	Hi				
79.	Opatrum.	Lat				
80.	———					
81.	Cryptichus.	Ha				
82.	Ulona.	Unico				
83.	Helops.	Gibb				
84.	Tanaria.	Met				
85.	Miria.	Phale				
86.	Stenostoma.					
87.	Proboscea.					
88.	Rhynchites.					
89.	———	Chal				
90.	Mycterus.	Pulv				
91.	———	rufico				
92.	Brachycerus.	?				

Aus Sa

		Sibinia				
95.	Hypera.					
96.	———					
97.	———					
98.	Linus.					
99.	———					
100.	———					
101.	Rhynobatbaus.					
102.	———	tus				
103.	———	lont.				
	annulus					
	zonies.					
106.	Leberhyn					
107.	Naupactus.					
108.	Liparus.					
109.	Hypera.	icoma				
110.	Apate.					
111.	Saperda.					
112.	Vesperus.					
113.	Callidium					
114.	———	nia				
115.	Stenopte					
116.	Sitaris.					
117.	Rhipiphor					
118.	Tymar A					
119.	Chrysome	lia				
120.	Galleruca					
121.	Cocinella					
122.	Clythra.					
123.	———					
124.	———					
125	———					
126.	———					
127.	Cryptocephalia					
128.	———	ium				
129.	Cassida.					
130.	Corynetes					
131.	Hister.					
132.	———					
133.	Nitidula.					
134.	Agyon.					
	Sphaerul					
	Blemus.					
		eliophilus				

Diesen Abschnitt und Einschnitten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro	Aus Sardinien vom Hrn	Münz	℔	ß	Nro	Aus Sardinien vom Hrn	Münz	℔	ß
1.	Cicindela. Cruciata. Da.	℔	2.	2. —	46.	Hydrophilus. Convexus. Jelg.	℔	2.	1.
2.	——. Imperialis. Da.	℔	2.	2. —	47.	Onitis. Schreiberoü. Da.	℔	2.	4.
3.	Arobanus. plagiatus. Zi.	℔	2.	2. —	48.	Onitigellus. Constans. Da.	℔	2.	1. 20.
4.	Ditomus. Cornutus. Dej.	℔	2.	1. 40.	49.	Aphodius. Lineatus. Sz.	℔	2.	1. —
5.	——. Capito. Jelg.	℔	2.	1. 40.	50.	—— Ferrugineus. Da.	℔	2.	1. —
6.	——. Sphaerocephalus. Oliv.	℔	2.	1. 20.	51.	Trox. nodulosus. Da.	℔	2.	1. —
7.	——. Affinis. Dej.	℔	2.	1. 20.	52.	Hybosorus. Oblongus. Da.	℔	2.	4.
8.	—— Gallipes. Fabr.	℔	2.	1. 20.	53.	Ateuchus. Taurus. Da.	℔	2.	6.
9.	Carabus. Constans. Ulr.	℔	2.	1. 20.	54.	Scarabaeus. Sardeus. Da.	℔	2.	3.
10.	Calosoma. Indagator. F.	℔	2.	4. —	54†.	—— impressus. Da.	℔	2.	2.
11.	Licinus. Granulatus. Dej.	℔	2.	3. —	55.	Pachypus. Cornutus. Oil.	℔	2.	8.
12.	Sirdenus. Filiformis. Zi.	℔	2.	1. 20.	56.	Cetonia. Sardea. Da.		3.	3.
13.	Leirus. Metallescens. Da.	℔	2.	1. 20.	57.	—— Carthami Da.		3.	2.
14.	Percus. paralelepipedus. Dej	℔	3.	— 48.	58.	—— Cardui. Dej	℔	2.	2.
15.	Zabrus. Gravis. Dej.		3.	3. —	59.	Erodius. bilineatus. F.	℔	2.	1.
16.	Harpalus. Sardeus. Da.	℔	1.	— 40.	60.	Pimelia. Aspera. Zi.	℔	2.	4.
17.	Calathus. Ovalis. Da.	℔	2.	— 48.	61.	—— morbillosa. Da.	℔	2.	3.
18.	Siagites. Glabratus. Da.	℔	2.	— 48.	62.	—— Corrugata. Zi.	℔	2.	2.
19.	Sphodrus. Sardeus. Da.	℔	2.	2. —	63.	Akis. Amplicollis Zi.	℔	2.	2.
20.	——. Angusticollis. Da.	℔	2.	1. 20.	64.	—— Angusticollis. Da.	℔	2.	2.
21.	Dytiscus. Hispanicus. Dej.	℔	2.	1. 20.	65.	Blaniopherus. Collaris. F.	℔	2.	2.
22.	——. Sardeus. Dej.	℔	2.	4. —	66.	Tentyria. Grossa. Dej.	℔	2.	1. 20.
23.	Dytiscus. Ornatus. Da.	℔	2.	3. —	67.	—— Substriata. Dej.	℔	2.	1. 20.
24.	Colymbetes. Collaris. Da.	℔	2.	3. —	68.	—— Glabrata. Jelg.	℔	2.	1. 20.
25.	Hydroporus. Frontalis. Da.	℔	2.	1. —	69.	—— Rugosa. Da.	℔	2.	1. 20.
26.	——. marginepunctatus. Da.	℔	2.	— 48.	70.	Scaurus. Gigantheus. M.	℔	2.	2. —
27.	——. Substriatus. Da.	℔	2.	— 48.	71.	—— Lugens. Da.	℔	2.	1. 20.
28.	——. hieroglyphicus. Da.	℔	2.	— 48.	72.	—— Atratus. F.	℔	2.	1. —
29.	——. Ferrugatus. Da.	℔	2.	— 48.	73.	—— Striatus. F.	℔	2.	— 40
30.	——. Analis. Da.	℔	2.	— 48.	74.	Asida. Oblonga. Dej.	℔	2.	2. —
31.	——. 6 guttatus.	℔	2.	— 48.	75.	Blaps. Striata. Dej.	℔	2.	2. —
32.	Buprestis. Pisana.		1.	4. —	76.	—— Oculta. Da.	℔	2.	— 20
33.	——. Cylindrica. F.	℔	2.	1. 40.	77.	Heliophilus. Agrestis. Dej.	℔	2.	1. 20.
34.	——. Irrorata. Da.	℔	2.	1. 40.	78.	Tentarus. Melopioides Da.	℔	2.	1. 20.
35.	——. Orichalcea. Da.	℔	1.	1. —	79.	Opatrum. Laticollis. Da.	℔	2.	1. 20.
36.	——. Cuphorbia. Da.	℔	2.	1. —	80.	—— terrosum Germ. Fuscum. H.	℔	2.	— 48.
37.	Elater. Fasciculis. Da.	℔	2.	1. —	81.	Cryptichus. Harpalinus. H.	℔	2.	— 40.
38.	——. maculicollis. Da.		1.	— 30.	82.	Ulona. Unicolor. Da.	℔	2.	1. 20.
39.	——. Annulatus. Da.		1.	— 30.	83.	Helops. Gibbicollis. Ho.	℔	2.	1. 48.
40.	Dasytes. Debilis. Da.		1.	— 30.	84.	Tanuria. Metallescens. Zi.	℔	2.	1.
41.	—— Metallicus. Da.		1.	— 24.	85.	Mirin. Phalerioides. Zi.	℔	2.	2. —
42.	——. Subaeneus. Da.		1.	— 20.	86.	Stenostoma. Rostrata. Dej	℔	2.	2. —
43.	Trichodes. Affinis. Da.	℔	2.	1. 20.	87.	Proboscea. Viridana. Zi.	℔	2.	2. —
44.	Clerus. Formicarius. H.	℔	2.	1. —	88.	Rhynchites. Ater. Da.	℔	2.	— 40
45.	Elops. Granulata. Oliv.	℔	2.	—	89.	—— Chalybeceus. Da.	℔	2.	— 40
					90.	Mycterus. Pulverulentus. Da.	℔	2.	— 40
					91.	—— ruficornis. Da.	℔	2.	1.
					92.	Brachycerus. ?		1.	—

Diesen Abschied und Empfehlen.

Aus Sardinien Rolfs Ausb.

					180.	158.	28.
94.	Sibinia	Albofasciata	Da.	♂♀	2.	1.	—
95.	——	elegans	Da.	♂♀	2.	—	48.
96.	Hypera	Limbata	Da.	♂♀	2.	1.	20.
97.	——	Fasciculatis	Da.	♂♀	2.	—	48.
98.	——	Salicis	Da.	♂♀	2.	—	20.
99.	Lixus	Scutellaris	Da.	♂♀	2.	1.	—
100.	——	Puncii	Da.	♂♀	2.	1.	20.
101.	——	bidens	Da.	♂♀	2.	1.	20.
102.	Rhynobatus	Irroratus	Da.	♂♀	2.	1.	20.
103.	——	bilineatus	Da.	♂♀	2.	—	48.
104.	——	maculatus	Da.	♂♀	2.	—	48.
105.	Tinnulus	Variegatus	Da.	♂♀	2.	—	48.
106.	Leonus	bipunctus	Da.	♂♀	2.	1.	—
107.	Leberhynchus	Scabriusculus	Das.	♂♀	2.	—	48.
108.	Haupactus	Ilicis	Da.	♂♀	2.	—	48.
109.	Liparus	Costatus	Zi.	♂♀	1.	1.	—
110.	Hypera	Albida	Da.	♂♀	2.	1.	—
111.	Apate	humeralis	Dej.	♂♀	2.	1.	20.
112.	Saperda	Signaticornis	Da.	♂♀	2.	2.	—
113.	Vesperus	Luridus	Rofs.	♂♀	1.	2.	20.
114.	Callidium	Strepens	F.	♂♀	1.	2.	20.
115.	——	Irroratum	Ko.	♂♀	1.	4.	—
116.	Stenopterus	nigripes	Da.	♂♀	2.	1.	—
117.	Sitaris	humeralis	F.	♂♀	2.	2.	—
118.	Rhipiphorus	bimaculatus	?	♂♀	2.	1.	20.
119.	Tymarcha	Lavicollis	Da.	♂♀	2.	1.	20.
120.	Chrysomela	Viridana	Da.	♂♀	2.	—	48.
121.	Galleruca	Sardea	Da.	♂♀	2.	1.	48.
122.	Coccinella	Variegata	Da.	♂♀	2.	—	48.
123.	Clythra	Capricornis	Da.	♂♀	2.	2.	—
124.	——	9 punctata	Oliv.	♂♀	2.	1.	20.
125.	——	Variabilis	Da.	♂♀	2.	1.	20.
126.	——	Centromaculata	Da.	♂♀	2.	1.	20.
127.	——	Cyanocephala	Da.	♂♀	2.	1.	—
128.	Cryptocephalus	Ornatus	Da.	♂♀	2.	1.	20.
129.	——	Fulvicollis	Da.	♂♀	2.	—	40.
130.	Cassida	testacea	Da.	♂♀	2.	—	40.
131.	Corynetes	Fulvipes	Da.	♂♀	2.	—	40.
132.	Hister						
133.	——						
134.	Nitidula	Cinerea	Da.	♂♀			
	Apion	nov.	Sp.	♂♀	2.	—	40.
	Sphaerula	Signatipennis	Da.	♂♀	2.	—	20.
	Blem[illegible]	Signatus	Da.	♂♀	2.	—	40.
					258.	209.	[illegible]

Aus Sizilien Lucas Ausb.

1.	Cetonia	Cuprea	Fi.	♂♀	2.	2.	—
2.	——	Chlorana	K.	♂♀	2.	1.	20.
3.	——	Oblonga	Dej.	♂♀	2.	2.	—
4.	Crodius	Gibbus	F.	♂♀	2.	1.	20.
5.	Meloba	Tenebrioides	Fi.	♂♀	2.	1.	20.
6.	Athis	Inflata	Ko.	♂♀	2.	2.	—
7.	Dorcadion	Abruptum	M.	♂♀	2.	2.	—
8.	Licinus	punctatus	H.	♂♀	1.	—	48.
9.	Anomala	Flavifrons	D.	♂♀	2.	2.	—
10.	——	dito var.		♂♀	2.	2.	—
11.	——	Aurata	M.	♂♀	1.	—	48.
12.	Cebrio	testaceus	Dej.	♂♀	2.	1.	20.
13.	Anisoplia	Variegata	D.	♂♀	2.	1.	—
14.	Mylabris	Schreibersii	H.	♂♀	2.	1.	40.
15.	——	mutabilis	Dej.	♂♀	2.	1.	—
16.	Alphaus	Kratteri	Ko.	♂♀	2.	1.	40.
17.	Leberhynchus	cupripennis	Da.		2.	1.	—
18.	——				2.	1.	—
19.	Buprestis	4. lineata	M.		1.	2.	—
20.	——	lugens	Da.		1.	—	48.
21	——	punctiventris	D.		1.	—	48.
					37.	20.	13.

Die aus Sardinien betragen 258. 209. 48.
Die aus Sizilien betragen 37. 20. 13.
295. 240. 1x

Ist 24 Dec. 26. gemacht. ist voller alkohol
nun 100 f. nachgesehen, und Nichts für H.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wiesing müsst Wien d 15ten Decemb 1826

Euer Hochwohlgeboren

89

164

Erlauben gütigst mir Ihnen die Anzeige zu machen, daß ich in diesen Tagen die Sammlung Coleopteren, welche ich Ihnen versprochen, absenden werde. Ich habe mir erlaubt, Ihnen 165 Species in 27 Gattungen, welche ich doppelt besitze, zu übersenden, damit Sie davon diejenigen auswählen können, welche Ihnen fehlen, und mir den Preis, welchen Sie dafür bestimmen, gefälligst bemerken. Ich bitte Sie, mir auch die Species, welche Sie schon haben, zu bemerken, damit ich sie ausstreichen kann, weil ich Ihnen nicht doppelte Species senden will. Ich bitte Sie, mir die Species, welche Sie wünschen, recht deutlich zu bemerken, damit ich nicht Irrthümer begehe.

Ich erwarte mit Sehnsucht Ihre gefällige Antwort, um die Sammlung absenden zu können, und offerire Ihnen alle Species, die ich Ihnen anbiete, um 30 pCt. Abzug, welchen Sie gewiß billig finden werden.

Ich bitte gütigst der Billigkeit angedenken

Ich bin mit der Hochachtung

Ihr

ergebenster

Diener

Wiesing

Ich habe mit der Feder 165 Species bezeichnet und den mir mit meinem Namen gezeichneten Catalog Ihnen zugeschickt. Die 6 Neue Species habe ich Ihnen auch beschrieben. Ich bitte Sie, den H. Prof. Borelli zu grüßen. Dieser hat mir einige Species abgekauft und bezahlt.

Orthophag
Caprip
Geotrupes
Scarabaeus
Oryctes
Melolont.
Amphicoma
Cetonia
Pimelia
Akis
Asida
Tentyria
Sepidium
Blaps
Phylax
Pedinus.
Heliophilus

				180.
	Albofasciata	Da.	♂♀	2.
	elegans	Da.	♂♀	2.
	Limbata	Da.	♂♀	2.
	Fasciculavis	Da.	♂♀	2.
	Salicis	Da.	♂♀	2.
	Cautellaris	Da.	♂♀	2.
	Punctü	Da.	♂♀	2.
	idens	Da.	♂♀	2.
	us. Irroratus	Da.	♂♀	2.
	bilineatus	Da.	♂♀	2.
	maculatus	Da.	♂♀	2.
	Fasciagatus	Da.	♂♀	2.
	bipunctata	Da.	♂♀	2.
	hus. Scabriusculus	Da.	♂♀	2
	Ilicis	Da.	♂♀	2.
	Costatus	Fi.		1.
	Albida	Da.	♂♀	2.
	humeralis	Dej.	♂♀	2.
	Signaticornis	Da.	♂♀	2
	luridus	Rossi.		1.
	Strepens	F.		1.
	Irroratum	Ho.	♂♀	1.
	rus. nigripes	Da.	♂♀	2
	humeralis	F.	♂♀	2.
	us. bimaculatus	?	♂♀	2
	Lavicollis	Da.	♂♀	2.
	la. Viridana	Da.	♂♀	2
	Sardea	Da.	♂♀	2
	Variegata	Da.	♂♀	2.
	Capricornis	Da.	♂♀	2
	punctata	Oliv.	♂♀	2.
	Variabilis	Da.	♂♀	2
	Centromaculata	Da.	♂♀	2
	Cyanocephala	Da.	♂♀	2
	alus. Ornatus	Da.	♂♀	2
	Fulvicollis	Da.	♂♀	2
	testacea	Da.	♂♀	2
	Fulvipes	Da.	♂♀	2. — 40.
	Cinerea	Da.	♂♀	
	noo	Fl.	♂♀	2 — 40.
	Signatipennis	Da.	♂♀	— 20.
	Signatus	Da.	♂♀	— 20.
38				
20	Summa			

Ich habe diesen Brief schon vor Ostern angefangen, aber bis jetzt nicht fortsetzen können, weil ich mich mit den dringendsten Arbeiten zur Fortsetzung meiner Preise nicht zu beschäftigen konnte. Ich habe den Herrn Graf Mannerheim, Herrn Gyllenhal, Herrn Schönherr, Herrn Dejean, Herrn Boisduval, Herrn Hoffmannsegg, Herrn Fischer, Herrn Latreille, Herrn Germar, Herrn Klug, Herrn Ahrens, Herrn Kunze, Herrn Erichson, Herrn Gravenhorst, Herrn Ratzeburg, Herrn Zetterstedt

Vienna mense Maio Anno 1827.

Ad Hochwohlgeborenen 90

Gestern habe ich den 24ten Dec. Jahres
ihr Schreiben erhalten, und beantworte es mich
ehestens Ihnen Dienst. Ergebenst.

Die schon so lange gewünschte Gelegenheit
an Ihr Hochwohlg. selben einige Insecten von
Sardinien einzusenden, ist jetzt da. Ich
habe 108 St. C-M. zu, und es bleibt die alte
Gewogenheit anempfohlen.

Einige jetzige sind der andern Arten
der Lepidopteren und Sardinien, wobei
eine der schönsten Neuen Sphinx, den
ich Ihnen mit der Bruyere erzogen, und
den unter meinen Nahmen gemacht ist
die 6 Neue Beschreibung sind bereits
von H. Prof. Borelli zu Turin Ihnen
schon abgebildet und beschrieben.

Papilio Machaon
Parnassius Apollo
Thais Polyxena
Pieris Napi
Colias Edusa
Gonepteryx Rhamni
Leucophasia Sinapis
Argynnis Paphia
Melitaea Cinxia
Vanessa Antiopa
Polychloros
Urticae
Atalanta
Cardui
Limenitis Camilla
Apatura Iris
Satyrus Hermione
Arethusa
Briseis
Semele
Egeria
Circumflexa
Fugens
Maura
Circumscripta
Dilacerata

Pieris Rapae
Daplidice
Sinapis
Cratagi
Brassicae
Rapae
Napi
Callidice
Phicomone
Chrysotheme
Hyale
Edusa
Rhamni
Cleopatra
Sinapis
Lathonia
Aglaja
Niobe
Adippe
Paphia
Pandora
Cinxia
Phoebe
Dictynna
Aurinia
Maturna
Antiopa
Polychloros
Urticae
C. album
Atalanta
Cardui
Camilla
Iris
Hermione
Arethusa
Briseis
Semele
Egeria

Perius Passerinii
Devaricum
Steinopus ruficornis
Cithonus ochsenheimeri
incisus
Lepidus
marginicollis
rufa
Lucasii
bipunctatus
Bonelli
Grisea
Stictes. nigrita
constans
Sulcicollis
hirsuta
Arnaudi
Taurica
Ligniperda
Carinata
Armata
Stictica
Flavomaculata
Antiqua
unifasciata
Hispanica
hamorrhoidalis
Gibbosa
Scutellata
Splendida
Philus pilosus
Damicornis
Dicerca
Hellops

Onthophagus
Copris
Geotrupes
Scarabaeus
Oryctes
Melolontha
Amphicoma
Cetonia
Pimelia
Akis
Adida
Tenebrio
Sepidium
Blaps
Phylax
Pedinus
Heliophilus

	Sardinien	Kolfs	Moro	Mark
				180.
	Albofasciata. Da.			2.
	elegans. Da.			2.
	Limbata. Da.			2.
	Fasciculatis. Da.			2.
	Salicis. Da.			2.
	Cuttellaris. Da.			2.
	Puncti. Da.			2.
	bidens. Da.			2.
	tus. Irroratus. Da.			
	bilineatus. Da.			
	maculatus. Da.			
	Variegatus. Da.			
	bipunctata. Da.			
	thus. Scabriusculus			
	Salicis. Da.			
	Costatus. Fi.			
	Albida. Da.			
	humeralis. Dej.			
	Signaticornis. Da.			
	luridus. Rossi.			
	v. Strepens. F.			
	Irroratum. Ho.			
	rus. nigripes. Da.			
	humeralis. F.			
	us. bimaculatus. ?			
	v. Lavicollis. Da.			
	la. Viridana. Da.			
	Sardea. Da.			
	Variegata. Da.			
	Capricornis. Da.			
	9punctata. Oliv.			
	Variabilis. Da.			
	centromaculata. Da			
	yanocephala. Da.			
	alus. Ornatus. Da.			
	Fulvicollis. Da.			
	testacea. Da.			
	Fulvipes. Da.			
	v. Cinerea. Da.			
	noo. Sp.			
	Signatipennis. Da.			
	Signatus. Da.			
38				
39	Summa			

Das ganze Diesel Präparat wird Vorsichtig
Dass ist was jetzt wird.
Es kann mit dem Vorigen Präparat
Durch öfters gütige Anwendung zur

Es ist sehr nöthig wenn es besorgt.

Mit Gruß und Handschlag

Ihr Hochwohlgeboren

ganz Ergebenster

G. Dahl

Nat.

ulle

(in

Patria Ex.

Cimbela Aegiptica Catt Sizilien — 40
——— Circumflexa Da detto — 30
——— Lugens Da detto — 24
——— maura Da detto — 24
——— circumscripta Da Sardinien — 30
——— dilaceraata Tirol Borgo — 40

166

und Sardinien

Sphinx Dahlii. Mulz. 6 St 50 fl —
Vanessa Jgnida. Bon 6 St 12 fl —
Argynnis Cyrene. Bon 6 St 12 fl —
Hipparchia Dolans. Bon 6 St 10 fl —
——— Aristaeus. Bon 6 St 10 fl —
———. Tigelius. Bon 6 St 6 fl —
———. Borax. Bon 6 St 7 fl —
Bomb. Peregrina. Dresd. 6 St 6 fl —

nicht in den Schmetterlingen.

(in Herz. eingetragen)

Perus Passerinü
——— Devaricu
Acinopus. rufipe
Ophonus. rotund
——— incisus.
——— Lepidus.
——— marginec
tomus rufu
oreus Luca
thus bipunt
liscus Bone
——— Grise
mbetes. nig
——— consta
troponus Cru
prestio.
——— Sul
——— hirs
——— Arnac
——— Taur
——— Ligna
——— Can
ytes. Arm
Rhodes Jun
——— Flavo
——— Antiq
oxus unifa
Opha Hio
——— bamo
ter Gibb
——— Scut
——— Splen
Drophilus pi
itis Dam
——— Nica
gticellus

Onthophag
Copris L.
———
———
———
———
Geotrupes
Scarabaeus
Oryctes
Melolont.
———
———
Amphicoma
———
———
———
———
Cetonia
———
———
———
———
Pimelia
———
———
Akis
———
Asida
Tenebrio
Lepidium
———
Blaps
Phylax
Pedinus.
———
———
———
Heliophilus

…rdinien Kosta Hero Mai

180.

…Alb. fasciata. Da. ♂♀ 2.
…elegans. Da. ♂♀ 2.
…Limbata. Da. ♂♀ 2.
…Fasciculanis. Da. ♂♀ 2.
…Salicis. Da. ♂♀ 2.
…Cantellaris. Da. ♂♀ 2.
…Pygmäa. Da. ♂♀ 2.
…bidens. Da. ♂♀ 2.
…us. Irroratus. Da. 10 s
…bilineatus. Da.
…maculatus. Da. o
…Variegatus. Da. o
…bipunctata. Da. o
…thus. Scabriusculus
…Alicis. Da. ♂♀
…Costatus. Fi.
…Albida. Da. ♂
…humeralis. Dej. o
…Signaticornis. Da.
…Luridus. Rofs.
…v. Strepens. F.
…Irroratum. Ho.
…rus. nigripes. Da.
…humeralis. F. ♂♀
…us. bimaculatus. ?
…v. Lavicollis. Da.
…la. Viridana. Da
…Sardea. Da. ♂♀
…Variegata. Da. o
…Capricornis. Da.
…9 punctata. Oliv. o
…Variabilis. Da. o
…Centromaculata. Da
…Cyanocephala. Da. o
…alus. Ornatus. Da.
…Fulvicollis. Da.
…testacea. Da. ♂♀
…Fulvipes. Da. o

…Cinerea. Da
…noo. Fi. ♂♀
…Signatipennis. Da.
…Signatus. Da. ♂

Das ganze Insekt schmeckt nach Terpentin
Das ist was sich jetzt wird.
Ich kann mit den bisherigen Mitteln
Dieses Thier gänzliche Anwendung zur

Cicindela	Aegyptica	Lätt	Sizilien	— 40
———	Circumflexa	Da	detto	— 30
———	Lugens	Da	detto	— 24
———	maura	K	detto	— 24
———	circumscripta	Da	Sardinien	— 20
———	dilacerata	Kol	Korfu	— 40
Lebia	Fulgicollis	B.	Italien	— 48
———	Cyathigera	K	detto	— 30
Cymindis	phalerata	Da	Sizilien	— 20
———	Alpina	Da	Piemont	— 20
Crypta	cylindricollis	v. M	Sizilien	2 —
Polistichus	Fasciolatus	B	Florenz	— 24
Brachinus.	Sulcipennis	Da	Sizilien	— 40
Cephalothes	Levigatus	Dej	detto	1 —
Siagona	Europea	Dej	detto	1 —
Sitomus	Inermis	Kl	Sardinien	1 —
———	Obscurus.	Sto	Grim	— 20
Cychrus	Italicus	Bo	Appenin	2 —
Scaphites.	polyphemus	Hdw	Spanien	2 —
———	Terricola	Dej	Neapel	— 20
———	Nitidus	v. M.	Sizili	— 48
Procrustes.	Cracus	Kol	Korfu	1 —
Procerus	Tauricus	"	Grim	2 —
Carabus	Klugii	Da	Sizilien	4 —
———	Lefebrii	Dej	detto	4 —
Nebria	Schreibersii	Da	detto	— 45
Licinus	Siculus	Dej	detto	— 40
———	Granulatus	Dejean	Spanien	1 —
———	Croaticus	Da	Croatien	— 40
Spomis	Circumscriptus	Dft	Sizili	1 20
Chlaenius	cingulatus	Da	detto	1. —
———	Auricollis	Da	Korfu	— 20
———	tibialis.	Dej	Frankr	— 24
Peirus	Siculus	Da	Sizilien	1 —
Peecilus	Glabrellus	Da	detto	— 20
———	Cyaneus	Wald	Spanien	— 40
Pterus	Paykullii	Pass	Appanien	1 20

Perus	Passerinii			
———	Devaricus			
Steinopus.	rufipes			
Ophonus.	rotund			
———	incisus.			
———	Lepidus.			
———	marginec			
Apotomus	rufus			
Masoreus	Luxa			
Periphus	bipunct			
Dytiscus	Bone			
———	Grise			
Polymbetes.	nig			
———	consta			
Hytroporus	Cru			
Bupprestis.				
———	Sub			
———	hirs			
———	Arnac			
———	Taur			
———	Lign			
———	Can			
Dasytes.	Strm			
Trichodes	Gu			
———	Flavo			
———	Antiq			
Notoxus	unifa			
Silpha	Hio			
———	bamo			
Hister	Gibb			
———	Scut			
———	Splen			
Hydrophilus	pi			
Onitis	Dam			
———	Nice			
Onyticellus	G			

Onthophag				
Copris	L			
———				
———				
———				
———				
Geotrupes				
Scarabaus				
Oryctus				
Melolont				
———				
———				
———				
Amphicoma				
———				
———				
———				
Cetonia				
———				
———				
———				
———				
Pimelia				
———				
———				
Akis				
———				
Asida				
Tentyria				
Sepidium				
———				
Blaps				
Phylax				
Pedinus.				
———				
———				
———				
Heliophilus				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Patria		
Cindela	Aegiptica	Latt	Sizilien	—	40
———	Circumflexa	Da	detto	—	30
———	Lugens	Da	detto	—	24
———	maura	F	detto	—	24
———	circumscripta	Da	Sardinien	—	30
———	dilacerata	Kol	Korfu	—	40
Cebria	Fulgicollis	B.	Italien	—	48
———	Cyathigera	A	detto	—	30
Cymindis	phalerata	Da	Sizilien	—	30
———	Alpina	Da	Piemont	—	30
Cryptа	cylindricollis	c. M	Sizilien	2	—
Colistichus	Fasciolatus	B	Florenz	—	24
Brachinus	Sulcipennis	Da	Sizilien	—	40
Cephalothes	Lavigatus	Dej	detto	1	—
Siagona	Europea	Dej	detto	1	—
Ditomus	Inermis	Zi	Sardinien	1	—
———	Obscurus.	Steo	Grim	—	30
Cychrus	Italicus	Bo	Appenine	2	—
Scarites.	polyphemus	Hdw	Spanien	2	—
———	Terricola	Dej	Neapel	—	30
———	Bitidus	s. M.	Sizili	—	48
Procrustes.	Cracus	Kol	Korfu	1	—
Procerus	Tauricus		Grim	2	—
Carabus	Klugii	Da	Sizilien	4	—
———	Lefebrii	Dej	detto	4	—
Nebria	Schreibersii	Da	detto	—	45
Licinus	Siculus	Dej	detto	—	40
———	Granulatus	Dgoera	Spanien	1	—
———	Croaticus	Da	Croatien	—	40
Spomis	Circumscriptus	Dft	Sizili	1	30
Chlaenius	cingulatus	Da	detto	1	—
———	Auricollis	Da	Korfu	—	30
———	tibialis.	Dej	Frankr	—	24
Peirus	Siculus	Da	Sizilien	1	—
Poecillus	Glabrellus	Da	detto	—	30
———	Cyaneus	Mald	Spanien	—	40
Percus	Paykullii	Pass	Appenien	1	30

			Patria		
Percus	Passerinii	Dej	Appenninen		
———	Devaricus	Dej	detto	1	—
Steinopus.	rufipes.	Da	Spanien	—	40
Cephenus.	ochantricollis	Dej	Sizilien	—	40
———	incisus.	Dej	detto	—	30
———	Lepidus.	Da	detto	—	40
———	margineocollis.	Da	Ragusa	—	20
Apotomus	rufus	Bo	Spanien	—	40
Masoreus	luxatus	Zi	Oesterreich	—	40
Periphus	bipunctatus	Da	Sizilien	—	24
Dytiscus	Bonelli	Da	detto	2	—
———	Grisens	F.	detto	—	36
Colymbetes.	nigricollis		detto	—	24
———	constans.		detto	—	20
Hydroporus	Cruciatus	Da	detto	—	18
Buprestis.	Pisana	Lat	Florenz	3	—
———	Sulcata	Da	Sizilien	1	—
———	hirsutula	Dej	detto	—	45
———	Armacanthe	Par	Grim	1	20
———	Taurica	Pas	detto	—	30
———	Lignaticollis	Par	detto	—	24
———	Laudens.		Dallmati	—	30
Dasytes.	Armatus	Fz	Wald Spanien	1	—
Trichodes	Gulo	Par	Korfu	1	30
———	Flavocinctus	Da	Korsika	1	—
———	Antigus	Kol	Korfu	—	30
Notoxus	unifasciatus	Ross	Sizilien	—	30
Silpha	Hispanica	Dej	Spanien	1	—
———	hemorhoidalis	Par	Grim	—	45
Hister	Gibbus	Da	Sardinien	1	—
———	Scutellaris	Da	Sizilien	1	—
———	Splenditus	Da	detto	—	20
Hydrophilus	pistaceus	Da	detto	1	—
Onitis	Damatas	Steo	Grim	1	—
———	Adicatas.	Steo	detto	—	40
Onyticellus	Gibbipes.	Pas	Sizilien	—	24

		Patria	ƒ	x
Onthophagus	Mackii Jaq	Spanien	–	30
Copris L.				
———	maculipennis Da	Sizilien	–	30
———	Kollarii Wald	Spanien	–	30
———	Fisicornis L. 6ſ	Korfu	1	20
———	nigellus. Jaq	Grim	–	45
Geotrupes L. Scarabaeus F. Oryctes	Siculus Da	Sizilien	1	—
	latus Dej 6ſ	detto	2	—
Melolontha	Sicula Dah 6ſ	detto	2	—
———	Taurica Par	Grim	–	45
———	Oblonga Da	detto	–	45
———	hirticollis. Da	Korsika	1	—
Amphicoma	Vittata Kol	Korfu	1	—
———	Spilotrichius Kol	detto	1	—
———	Vulpes. 6ſ	Grim	1	30
———	Bombiliformis	detto	–	45
Cetonia	Atomaria Da	Sizili	1	—
———	purpurata Da	detto	–	30
———	Argiocalcea Da	Korsika	–	45
———	Albella Par	Korfu	–	30
Pimelia	Fornicata Herb	Spani	1	30
———	Tuberculata F.	detto	1	30
———	Sericella Latr	Korfu	–	45
Akis	Subterranea Da	Sizili	1	—
———	Acuminata	Spanie	–	40
Asida	Grossa Da	Sizilien	1	—
Tentyria	Taurica Steo	Grim	–	30
Sepidium	Hispanicum	Spanien	3	—
———	Variegatum Hoff	Sizili	3	—
Blaps	Cylindrika	Grim	–	36
Phylax	punctulatus Da	Korfu	–	24
Pedinus.	Choarctatus Kol	detto	–	24
———	Meridianus Lenis	Franckr	–	20
———	Harpalinus. D	Sizilien	–	20
———	Monticola Da	detto	–	20
Heliophilus.	planicollis Wald	Spanien	–	24

		Patria	ƒ	x
Heliophilus	punctatus St.	Grim	–	24
Pandarus Dentatus	Gracus Da	Korfu	–	24
———	Coreyricus Kol	detto	–	20
———	lugens. Da	Neapel	–	24
Hegetor	Caraboides. Dej	Korfu	–	30
Aoiba	rotundicollis D	Korsika	–	24
Opatrum	Granigerum Kol	Korfu	–	20
———	punctatum D	Sardini	–	15
———	politum Par	Grim	–	20
———	convexum Da	Neapel	–	20
———	Gibbum Kol	Korfu	–	20
———	tigrinum Da	Neapel	–	20
Phaleria	limbata Da	detto	–	18
Helops.	Reichii Par.	Korfu	1	—
———	tristis. Da	Sizilien	–	24
Mylabris	Florabis Par	Grim	–	24
———	10 punctata Oliv	detto	–	30
———	Heegerii Da	Korsika	–	30
———	Sahlb Dej	Grim	–	30
Lytta	Nobilis. Da	Sizilien	1	—
Dices.	Bilbergi	detto	1	—
Lydas.	4 maculata Fis	Grim	1	—
Oenas.	Agra	Spanien	–	40
Zonitis.	nigripennis Dej	Florenz	–	30
———	Caucasica Steo	Grim	–	45
———	4 punctata	Rusland	–	45
Stenostoma	Heegerii Wald	Spanien	2	—
Brentus	Stabrous.		2	—
Brachycerus	Globosus	Sizilien	–	48
———	Albodignatus Da	Detto	1	30
———	tuberculatus Da	detto	–	30
———	Besseri Steo	Grim	–	48
Cisparus	costatus Zi	Sizilie	1	—
———	Fasciculatus Da	detto	–	40
———	perforatus Kol	Korfu	1	—
———	montijagus Da	Sizili	1	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Patria	ƒ	ß
Mackü Ilig	Spanien	—	30
maculipennis Da	Sizilien	—	30
Kollarü Wald	Spanien	—	30
bicornis K & ƒ	Korfu	+	20
rigellus. Illig	Grim	—	45
Siculus Da	Sizilien	1	—
latus Dej & ƒ	detto	2	—
a Sicula Da & ƒ	detto	2	—
Taurica Par	Grim	—	45
Oblonga Da	detto	—	45
virticollis. Da	Korsika	1	—
Vittata Kol	Korfu	1	—
Spilotrichius Kol	detto	+	—
vulpes. & ƒ	Grim	+	30
Bombiliformis	detto	+	45
Atomaria Da	Sizili	1	—
purpurata Da	detto	—	30
Syrichalcea Da	Korsika	—	45
Abella Par	Korfu	—	30
Fornicata Herb	Spani	+	30
Tuberculata F	detto	+	30
Sericella Latr	Korfu	—	45
Mterranea Da	Sizili	1	—
uminata "	Spanie	—	40
ofsa Da "	Sizilien	1	—
Taurica Stev	Grim	—	30
Hispanicum	Spanien	3	—
Variegatum Hoff	Sizili	3	—
Sibiricorika	Grim	—	36
unctulatus Da	Korfu	—	24
Thoracetatus Kol	detto	—	24
Meridianus Lenis	Francker	—	20
Carpalinus. D	Sizilien	—	20
Conticola Da	detto	—	20
planicollis Wald	Spanien	—	24

			Patria	ƒ	ß
Heliopilus	punctatus Ilig.		Grim	—	24
Pandarus Dentatus	Graecus Da		Korfu	—	24
———	Coreyricus Kol		detto	—	20
———	lugens. Da		Neapel	—	24
Hegeter	Caraboides. Dej		Korfu	—	30
Acisba	rotundicollis D		Korsika	—	24
Opatrum	Granigerum Kol		Korfu	—	20
———	punctatum D		Sardini	—	15
———	politum Par		Grim	—	20
———	convexum Da		Neapel	—	20
———	Gibbum Kol		Korfu	—	20
———	tigrinum Da		Neapel	—	20
Phaleria	limbata Da		detto	—	18
Helops.	Reichü Par.		Korfu	+	—
———	tristis. Da		Sizilien	—	24
Mylabris	Florabis Par		Grim	—	24
———	10 punctata Illig		detto	—	30
———	Heegerii Da		Korsika	—	30
———	Dahlü Dej		Grim	—	30
Lytta	Nobilis. Da		Sizilien	1	—
Vices.	Bilbergi "		detto	+	—
Lydas.	4 maculata Fis		Grim	+	—
Penas.	Agra "		Spanien	—	40
Xonites.	nigripennis Dej		Florenz	—	30
———	Caucasica Stev		Grim	—	45
———	4 punctata "		Rusland	—	45
Stenostoma	Heegerii Wald		Spanien	2	—
Brentus	Italicus.			2	—
Brachycerus	Globosus		Sizilien	—	48
———	Albosignatus Da		detto	1	20
———	tuberculatus Da		detto	—	30
———	Besseri Stev		Grim	—	45
Lisparus	costatus Zi		Sizilie	+	—
———	Fasciicularis Da		detto	—	40
———	perforatus Kol		Korfu	1	—
———	montifagus Da		Sizili	1	—

Summa

		Patria	ƒ	x
Leiosus	Anguinus. Dej	Sizili	—	48
——	Sivaus Par	Grim	1	—
Cleonis	Ornata Da	Sizili	—	45
——	Frontata Stev	Grim	1	—
——	Tartarica Par	detto	—	00
Rhynobatus	Montanus	Sizili	1	—
——	marginecollis Da	detto	—	40
——	Nitidatus Da	detto	—	40
Cossonus	pallidipeñis Par	Grim	—	20
Hamaticherus	Audax Da	Sizili	1	—
Cerambyx	Ambrosiacus	Rusland	1	—
——	Rosarum Da	Sizilien	1	20
Parmena	pilosa Dej	detto	—	40
——	pubescens Dej	Korfu	—	40
——	Fasciata	Sizilie	—	40
Dorcadion	Sericatum Stev	Grim	1	20
——	Abruptum Mén.	Dallm	1	00
Sarperda	irrorata F.	Sizilien	1	—
——	marginecollis Da	detto	—	48
——	malachitica Illg	detto	—	40
——	pratextata Stev	Grim	—	48
——	Silvipes Stev	detto	—	20
Stenopterus	Femoratus St	detto	—	30
Tymarcha	Montana Da	Sizili	—	24
Chrysomela	Carbonaria Da	detto	—	45
——	melanostigma Kol	detto	1	—
——	Schottii Da	detto	—	40
Helodes	Chalybaeus Da	detto	—	20
——	marginecollis Da	detto	—	24
Cumolpus	Asiaticus	Grim	1	—
——	Cylindricus Hoff	Sizili	—	60
Da[illegible]cerus	Subcostatus	Oesterre	—	20

		Patria	f	x
Lixus	Anguinus Dej	Sizili	–	48
———	Sivanus Par	Grim	+	–
Cleonis	Ornata Da	Sizili	–	45
———	Frontata Stev	Grim	+	–
———	Tartarica Par	detto	–	20
Rhynobatus	Montanus Sizili		1	–
———	marginecollis Da	detto	–	40
———	Nitidatus Da	detto	–	40
Cossonus	pallidipeñis Par	Grim	–	20
Hamaticherus	Audax Da	Sizili	+	–
Cerambyx	Ambrosiacus	Rusland	+	–
———	Rosarum Da	Sizilien	1	20
Parmena	pilosa Dej	detto	–	40
———	pubescens Dej	Korfu	–	40
———	Fasciata	Sizilie	–	40
Dorcadion	Sericatum Stev	Grim	+	20
———	Abruptum M.[illegible]	Dallm	+	20
Saperda	irrorata F.	Sizilien	+	–
———	marginecollis Da	detto	–	48
———	malachitica Illg	detto	–	40
———	praetextata Stev	Grim	–	48
———	Gilvipes Stev	detto	–	20
Stenopterus	Femoratus St	detto	–	30
Tymarcha	Montana Da	Sizili	–	24
Chrysomela	Carbonaria Da	detto	–	45
———	melanostigma Kol	detto	1	–
———	Schottii Da	detto	–	40
Helodes	Chalybaeus Da	detto	–	20
———	marginecollis Da	detto	–	24
Camolpus	Asiaticus	Grim	+	–
———	Cylindricus Hoff	Sizili	–	30
Dasycerus	Sulcatus	Oesterr	–	20

		Patria	f	x
			168	
Lucanus	barbatus F.	Korsika	2	–
Carabus	Dejeanii F.	Grim	1	–
———	Campestris F.	detto	4	–
———	Europhosus Rossi F.	Nargul	3	–
———	Alternans Dej. F.	Sizil	3	–
Buprestis	picta Da	Grim	–	40
Melyris	costata Ad	Venet	–	40
Hispa	filiformis Da	Sizil	–	48

Pressburg bei Wien, 21ten May 1830.

Den Wohlgebohrnen

Da ich so frey bin Commandit Gesellschaften anzuzeigen, die sich mit Verlag deutscher Bücher beschäftigen. Seit meiner Reise nach Italien bin ich freundlich und werde mich Ihnen mehr ganz widmen, ich benutze diesen abwechslichen Anlaß meine Verbindungen bekannt zu machen, und Ihnen dort in der Zeitung hier eingeschalteten Verlagsbücher hier an, und bitte Sie höflichst um meine Gefälligkeit verwendet. Sie selbe ist Ihnen versichert zu verhalten, in der Hoffnung Ihre Exemplare mit 33 Stück statt 100 – 25 pro Cabat ablegen Sie.

Können Sie aber meine Verlags Artikel mehr dort absetzen, so bitte Ihnen gefälligst mir es zu melden, damit ich anderweitig mich umsehen kann. Ich bitte um eine Antwort Ihrer

Hochachtung

Ihre Ergebenste

G. Pahl

Wien, 11 May 1830.

Hochgeboren

so frey beikommend Collegsten anzuzeigen, daß ich
[illegible] haben beehre. Seit meiner Rückkehr von Pesth
[illegible] und werde mich Ihnen mehr ganz widmen, ich benutze
[illegible] Augenblick mich meine Wünsche Ihnen gehorsamst zu unterlegen
[illegible] Pesth, und dort in den Zeitpunkt hier einzutreffen
[illegible] hier zu, und die Zeit bis dahin auf meine Gesundheit
[illegible]. Diese allein ist Ursache daß ich nicht dort bin, in der Hoffnung
[illegible] Ihr Ihnen 100 – 25 pro Cabal ablegen Zeit.

[illegible] die Ihnen meine Person Gedicht mehr dort entzogen nicht
[illegible] ich würde umgehend ein Arbeitsheft Ihnen

[illegible] meiner gehorsamsten Ehrfurcht bin ich mit hochachtungsvoller

Zuneigung

Ihro Ergebenster

G. Pahl

176

v. Heyden 178

Hochwohlgeborn Dem Herrn Senator
[illegible] Greifswald d. 26 August 1844. 177

169

Dahlbom, Anders, Gustav.

in

Lund

Dr. u. Prof. d. Entomologie

geb. 3. 3. 1806

† 3. 4. 1859.

Nachlass von Zetterstedt. Seine Sammlung und Bücher gehören der Universität in Lund

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ein Bien Mai Mayo 1830.

Der Polizeybehörde

176 v. Heyden 1-78

An Hochwohlgeboren Dem Herrn Senator von Heyden in Frankfurt am Mein. Greifswald d. 26 August. 1844. 177

94

Hochverehrtesten Herr Senator!

Ihre grosse, sehr interessante und elegante Hymenopteren-Sendung habe ich in diesen Tagen, da ich von meiner Reise zurückkam, vorgefunden, und verwandte sie

(Buchhandlung ey)

92

Afzelius, Adnotae quin.
Billberg, Monogr. Mylabr.
— Enumeratio insect.
Boheman, Caloptromus
— Observationes in Derbiegen.
— de Tinea Linneella.
Bonsdorf, Hist. nat. curcul.
— Differentiae capitis insect.
Dahlbom, Monogr. pompilorum
— Bombi Scandinaviae
— Exercitationes Hymenopt. VI Part.
— Conspectus Tenthred. | Synopsis Hymenopt. Fasc. I.
— Prodromus Hymenopt. | Oxychia.
— Clavis novi Hymenopt.
— Dispositio methodica. Part. I.
— Hymenoptera Europ. Fasc. I.
Dalman, Pimpla atra
— , analecta entomol.
— , prodromus monogr. Cartniae.
— , ephemerides entomol.
— , Diopsis
— , Pteromalini. Stockholm 1820
Fries, Observationes entomol. Part. I. simul.
— Monogr. Tenthredinum
— Insekter från Columbien. Gyllenhal, Insecta suec.
Paykull, Fauna suecicae
— monogr. Staphyl. — Carab. — Curcul. — Hister.
Retius, de studio entomologiae.
Sahlberg, Hist. Notonect.
— Periculi entomogr.
— Insecta fennica.

93 171

und gr. Fühler
Beschaffen weil
gr. Pinsel. das
ist den neun
Flügen gr. Pinsel.
will als gross von
gr. Fühlern.

Hamb. Cour.	℔.	ß.
s.		
ieani, Dorg	12	
lis. T.		8
rninalis F	—	3
llis F.	—	8
s. F	—	4
m F	—	8
ncs.		
D	—	4
F	—	8
ata 0	1	
marae. J		4
ularia F		4
dis ☆	3	
D		
werinus. F		4
inus F		4
s. ♀ D		
ulatus F		6
	1	
s. St	1	
D	1	
F		6
		8
ulatus F		8
D		8
frons. Schü		8
ornes.		
mophtalmus hif		6
ominale F	1	
abbreviatum D		8
aculatum F.		6
ornes.		
r D	1	
sis D	1	
exus W	3	
ntotus D		
catus F	2	
galensis D	2	
calapius F	1	
fastidius D	1	
chtensteinii L		8
hus dentipes D	1	
Hessii J		12
lium Bacchus Emin ♂ mas	1	
onotus cupreus F	1	
nus Olivieri M		12
♀ D		
bas fornicatus Schü	3	
idium ♀ D		
s conon ♀ K. ♀ ♂		12
cornigera Sa	1	
Hamadryas F	3	
Jachus F		
latifrons D		
nemestrinus F.		
Oedipus F		

Schönherr, Synonyma insect. — Curculionid.
Sundevall, oeconomisk Afhandling. — Conspectus Arachnidum
Thunberg, Dis. entom. sist. ~~nova insecta~~ hist. insect.
Suecicae. Part. 3. 4. 5. 7. 8.
— Coleoptrum
Zetterstedt, Diptera Scandinaviae
— , Orthoptera Suecicae.

Fallen, Specimen entomologicum novam Dipt.
— , Diptera suecicae Vol. 1. 2. et suppl. 1. 2.
— Monogr. Tenthred. Part. 1. 2. 3. (pag. 1–48.)
— Monogr. Cantharid.
— Observationes entomol. Part. 1. 2. 3. (pag. 1–42.)
— Specimen novum Hemipt. (pag. 1–26.)
— Hemiptera suecicae. Cicadariae (pag. 1–80.)
— Monographia Cimic. Suec. (pag. 1–123.)
— Supplementum Cimicum (pag. 1–16.)
— Hemiptera suecicae. Cimicas. (pag. 1–186.)
— Genera Araneidum (pag. 1–22.)
Clerck, Svenska Spindlar

A. Dahlbom (May 1844.) gr. Spindl.

176

An Hochwohlgeborn Den Herrn Senator
von Heyden in Frankfurt am Mainz. Greifswald d. 26 August. 1844. 177

94

Hochverehrtesten Herr Senator!

Ihre große, sehr interessante und elegante Hymenopteren-
Sendung habe ich in diesen Tagen, da ich von meiner Afrika
Reise schon im Juni angefangene Norwegische Reise zurückkam
und hier in Greifswald und ein paar Wochen bei meinen Verwandten
zuzubringen eintraf, in der Koch'schen Universitäts Buchhandlung
bekommen. Die Sendung finde ich, wie gesagt wirklich sehr
werthvoll; es kommen Insekten da vor die ich als Nordländer
vorher nicht gesehen habe, die Exemplare sind schön und
vollständig. Nur das muß ich bedauern daß Sie Ihre
Insekten nach der Beyschlag

93

Den 12 May 1844 an Dr. Zachbom in Lund geschrieben
und ihm dort den entomol: Verein 2 Anstalten mit
Pompilius, Bembex und Crabro für Asien geschickt. das
3te hing nur Art kann er behalten. Zugleich sein neues
Liste meiner schwedischen entomol: Abhandlungen geschickt.
Da das für Ihn ist mir angenehm und will ich gern von
ihm gewünschte Abhandlungen wegschicken dagegen senden.
Kosten werde ich gern vergüten.

v. Heyden 178

Hamb. Cour.	℔.	ß.
S.		
ieani, Drej	12	
lis F.		8
ninalis F		8
llis F.		8
s. F		8
m F		8
ucs.		
D		8
F.		8
ata 0	1	4
marae. J		4
ularia F		4
dis ♀	3	
D		4
verinus. F		4
inus F		6
ulatus F		
s. St	1	
D	1	
F		8
latus F		8
D		8
frons Schü		8
ornes.		
nophtalmus hüf		6
minale F.	1	8
abbreviatum D		8
aculatum F.		6
ornes.		
r D	1	
sis D	1	
exus W	3	
ntollus D		
catus F	2	
galensis D	2	
calapius. F	1	
fastiditus D	1	
chtensteinii J		8
hus dentipes D	1	
Hessii J		12
liam Bacchus Emin ♂ mas	1	
conotus cupreus F	1	
nus Oliverii M		12
♀ D		
bas fornicatus Schü	3	
idium ♂ D		
s conon ♀ K ♂ ♂		12
cornigera Sa		1
Hamadryas F		3
Jachus F		
latifrons D		
nemestrinus F.		
Oedipus F.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien Mitte May 1830.

Schönherr, Synonyma insect. — Curculionid. —
Sundevall, oeconomisk Afhandling. — Conspectus tracheatum
Thunberg, Dis. entom. sist. ~~norra insect.~~ hist. insect.
Suecicae. Part. 3.4.5.7.8.
— Oratorum
Zetterstedt, Diptera Scandinaviae
— , Orthoptera Suecicae.

Fallen, Specimen entomologicum novam Dipt.
— , Diptera suecicae Vol. 1.2. et suppl. 1.2.
— Monogr. Tenthred. Part. 1.2.3. (pag. 1–48.)
— Monogr. Cantharid.

H. Wohlgeboren Dem Herrn Senator
von Heyden in Frankfurt am Main.

Greifswald d. 26 August 1844. 177

94

Hochverehrtesten Herr Senator!

Ihre grosse, sehr interessante und elegante Hymenopteren-
Sendung habe ich in diesen Tagen, da ich von meiner Amerika
Reise zurückkam vor
finden im Juni angefangene Norwegische Reise
und hier in Greifswald und ein paar Wochen bei meinen Verwandten
zuzubringen eintraf, in der Koch'schen Universitäts Buchhandlung
bekommen. Die Sendung finde ich, ungesagt wirklich sehr
werthvoll; es kommen Insekten da vor die ich als Nordländer
vorher nicht gesehen habe, die Exemplaren sind schön und
vollständig. Nur dass muss ich bedauern dass Sie Ihre
kleine Zeit verschwendet haben die Insekten nach der Boyes-
methode aufzubewahren. Für so kleine Thierchen als Pte-
rocalinen, Cynipsiden und Cleoniger kann die methode
wohl brauchbar sein, aber für grosse Insekten ist sie meiner
Erfahrung nach, besonders bei Sendungen, unzweckmässig, mit
der grosse Holländermark geht durch die Erschütterung
welche bei grossem Thieren gewaltiger ist von der Nadel lag
so dass es hin und her umher bewegt werden kann und
das insekt wird dadurch nicht allein selbst beschädigt
sondern verursacht vielen Schaden unter den Nachbaren.
So verhält's sich auch mit einigen der grösseren von

225.	Scyphus dentipes	D	1.
226.	" Hessii	J	
227.	Circellium Bacchus	F min & maj	1.
228.	Chalcionotas cupreus	F	1
229.	Epicinus Olivieri	M	12
230.	"	♀ D	
231.	Coprobas fornicatus	Schü	3
232.	Choeridium	♂ D	
233.	Copris conon	♂ K ♀ ♀ β ♂	12
234.	" cornigera	Sa	1
235.	" Hamadryas	F	3
236.	" Jachus	F	
237.	" latifrons	D	
238.	" nemestrinus	F	
239.	" Oedipus	F	

		Amb. Cour.	℔.	ß.
		s.		
		ieani, Drège	12	
		lis F.		8
		ninalis F		3
		llis F.		8
		rs. F		4
		m F		8
		ucs.		
		D		4
		F		8
		ata 0	1	
		marae J		4
		ularia F		4
		dis ♂	3	
		D		
		verinus F		4
		inus F		4
		s. ♂ D		
		ntatus F		6
			1	
		s. St	1	
		D	1	
		F		6
				8
		ctatus F		8
		D		8
		ifrons Schü		8
		rnes.		
		nophtalmus Hüf		6
		ominale F	1	
		abbreviatum D		8
		aculatum F		6
		ornes.		
		r D	1	
		sis D	1	
		exus W	3	
		ntottus D		
		catus F	2	
		galensis D	2	
		calapius F	1	
		fastidius D	1	
		chtensteinii J		8

Ihnen geschickten Sphex-, ammophila und Psammophila arten.
Von N:o 245, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 256 liegen die abgeschlagenen Fühler und Fußglieder am Boden. Die andere aber haben sich ganz gut gehalten. Im 3:te Heft, das ich in nächster herauszugeben werde, kommen die übrigen Genera, gruppirt, welche im Zweiten Heft keinen Platz finden konnten vor, ein kleines Supplementum wird auch beifolgen und für die interessante und wichtige Mittheilungen welche von Ihnen und anderen wissenschaftlichen Freunden eingegangen sind werde ich darin Rechnung halten. Ich nehme Ihre Sphex mit nach Lund, denn hier wo ich meine Bibliothek und das Lundiska Museum entbehre wage ich, aus Furcht vor fehlerhafter Bestimmung, nicht sie nach meinem Gedächtniss zu denominiren und so wieder Zunichte machen. Sobald aber ich sie in Lund genau untersucht habe, werden Sie sie durch den Entomologischen Verein wieder bekommen. Von der Schwedischen Litteratur besitzen Sie schon, wie ich aus Ihrem geehrten Schreiben sehe, eine complette Samlung; wird es mir gelingen etwas

173

Beiträge zu finden, so werde ich mich nicht ver-
saumen Ihnen das mitzutheilen.

Noch einmal muss ich Ihnen mit Ihrer vorzüglich
schönen Sendung haben Sie mir ebenso grosse
Freude als Ehre gemacht; ich werde mir auch alle
Mühe geben um sie genau zu bestimmen und
gut conserviren bis ich das Vergnügen habe Ihnen
sie zurück zu schicken.

Genehmigen Sie gütigst die Versicherung der
ausgezeichnet Hochachtung womit ich die
Ehre habe zu verbleiben

Ihr

ergebenster und gehorsamster Diener

Dr. Dahlbom.

	225	Scyphus dentipes D	1	
—	226	" Hessii J		12
6	227	Circellium Bacchus F min & maj	1	
	228	Chalcionotas cupreus F	1	
4	229	Epicinus Olivieri M		12
6	230	" ♀ D		
4	231	Coprobas fornicatus Schü	3	
	232	Choeridium ♂ D		
	233	Copris conon ♀ K ♂	12	
	234	" cornigera Sa	1	
—	235	" Hamadryas F	3	
	236	" Jachus F		
2	237	" latifrons D		
2	238	" nemestrinus F		
	239	" Oedipus F		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bei Diese Zeit — März 1830.

Der Wohlgeborene

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

176 v. Harold 178

Lund d. 4. Juli 1845. 176

Hoch Verehrtester Herr Senator!

Ich habe endlich die Ehre Ihnen Ihre sehr interessante Sammlung der Pompiliden, Crabroniden wie auch einige Sphegiden durch Vermittelung des entomologischen Vereins zu Stettin zurück zu schicken. Ich muss gestehen dass diese Sendung mir mehr Freude geschenkt als Sie vielleicht glauben wollen, denn, ungeachtet die durch den Überfluss beschädigten, sind die meisten Exemplare gut conservirt und mit Localbestimmungen versehen; ausserdem waren einige sehr selten und einige ganz neu, wie Sie sich von dem, nach meinem Werke geschriebenen Catalog, gefälligst ersehen. Die Umgegend von Frankfurt am Main muss eine sehr [illegible] Flora haben, denn sonst wäre es nicht möglich dass so viele seltene Insekten da vorkommen könnten, wahrscheinlich sind auch Sandfelder in derselben. Mit Ihrer Erlaubniss habe ich einige der Duplicaten behalten als eine Erinnerung von Ihnen und dieselben im Catalog mit einem Asterisk * bezeichnet. Falls dass ich künftig Zweifelhaft über die Zurückgesandte Species Zweifelhaft [illegible] sollte, so sei es mir wohl dann erlaubt Ihnen meine [illegible]

im Süd-Afrika

[illegible] Kaffernl. [illegible]

[illegible] Cap und

[illegible] (nach Thorey)

35. Harpalus fuscipennis. W.	—	12.	130.–131. [illegible] D.			225. Scyphus dentipes. D	1.	
36. " impunctus. W.	—	4.	132. Colophotia capensis [illegible]	1.	—	226. " Hessii J		12.
37.–38. " * D			133. " hygmaea [illegible]	—	6.	227. Circellium Bacchus Emin & mas	1.	
39. Geobaenus lateralis. J.	—	4.	134. Oen: * * [illegible]			228. Chalconotus cupreus F.	1.	
60. Tetragonoderus biguttatus. T	1	—	135. Cantharis variolata [illegible]	—	4.	229. Epicinus Olivieri M.		12.
			136. " capicola D	—	6.	230. " * D		
Hydrocantharos.			137. " viridescens [illegible]	—	4.	231. Coprobas fernicatus Schü	3	
61. Trochalus capensis. D.	—	12.	138.–140. " * D.			232. Choeridium * D		
62. Hydaticus capicola. D.	1.	8.	141.–147. Metacinus * D.			233. Copris conon * K & [illegible]	8	12.
63. " * D.			148.–149. Oen [illegible] * D			234. " cornigera Sa		1.
64. Colymbetes circur. D. F	1.	8.	150. Dasytes viridis L.	2.	—	235. " Hamadryas F		3.
65. Cyclous punctulatus. D.	—	4.	151.–156. " * D			236. " Jachus F.		
66. Gyrinus marginatus. D.	1.	8.	157. Melyris tinctata. F.	—	2.	237. " latifrons D		
			158. " viridis. F.	—	2.	238. " nemestrinus F.		
			159.–160. " * D			239. " Oedipus F.		

Lamb. Cour.	℔.	ß.
s.		
ieani, Drege	12	
lis T.		8
ninalis F		3
llis F.		8
s. F		4
m F		8
ues.		
D		4
F		8
ata 0	1	
marae. J		4
ularia F		4
dis *	3	
D		
verinus. F		4
inus F		4
s. * D		
ulatus F		6
	1	
s. St	1	
D	1	
F		6
		8
ulatus F.		8
D		
frons. Schü		8
ornes.		
nophtalmus Mif		6
ominale F.	1	
abbreviatum D		8
aculatum F.		6
ornes.		
r D	1	
sis D	1	
exus W	3	
ntottus D		
catus F	2	
galensis D	2	
sculapius F	1	
fastidius D	1	
chtensteinii J		8

Bei Wien, [illegible] Mayo 1830.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nova

stehen meiner Landsleuten, und Clerks Fauna Svecica zum Theil
gar nicht mehr zu haben. Rosenschölds Abhandlung ist wohl
zu haben vermuthe ich; er verreiste aber 1841 nach Amerika und packte
dann alle seine Bücher in eine Kiste zusammen worin sie noch bei
den Verwandten hier stehen geblieben sind, niemand aber darff sie zu eröffnen.
Ein sehr unbedeutendes Schrift, das Ihnen fehlet ist meine Mono-
graphia Chrysidum Lund 1829; ich besitze eine einzelne Duplett
das ich Ihnen hierbei sehr gerne überlasse. Dazu erlauben
Sie mir meine neue Aufstellung der Gattung Chrysis, als
ein Prodromus zu künftigen 2ten Bande der Hymenopteren
Europae, freundlichst beizulegen.
Ich schliesse womit ich Ihnen anfing dass
Ihre Sendung hat bei mir ebenso lebhafte Interesse
und Freude erregt als Ihre Correspondence mir viele
Ehre macht und ich wünsche herzlich dass unsere Mit-
theilungen der Lieben Wissenschaft die wir gewiss beide
mit Lieb und Seele umfassen, etwas Früchte bringen mögte.
Sie sehen dass einige Schwierigkeiten ich kommend ohne Namen
und ganz unbestimmt wieder. Ich will sie deshalb jetzt nicht be-
stimmen, weil ich diese Gruppen noch nicht so mit Ihr Theurer
Kritik untersucht, und ich will lieber keine Namen als mangelhafter

im Süd-Afrika

K Kaffraria. &c

m Cap und

n (nach Thorey)

35. Harpalus fuscipennis. W.	—	12.	130.–131. " ♂ D			225. Sisyphus dentipes. D	1.
36. " impunctus. W.	—	4.	132. Colophotia capensis. F.	1.	—	226. " Hessii. J	12.
37.–38. " ♂ D.			133. " physmata. D	—	6.	227. Circellium Bacchus Emin ♂ mas	1.
39. Geobaenus lateralis. J.	—	4.	134. Gen: ♂. ♀ D.			228. Chalconotus cupreus F.	1.
60. Tetragonoderus bigultatus. T.	1	—	135. Cantharis bipustulata F.	—	4.	229. Epicinus Olivieri. M.	12.
Hydrocantharis.			136. " capicola D.	—	6.	230. " ♂ D	
			137. " virescens F.	—	4.	231. Coprobas fernicatus Schü.	3
61. Trochalus capensis. D.	—	12.	138.–140. " ♂ D.			232. Choeridium ♂ D	
62. Hydaticus capicola. D.	1	8.	141.–147. Malachius ♂. D.			233. Copris conon ♂ K ♀	12.
63. " ♀ D.			148.–149. Gen. ♂. ♀ D			234. " cornigera Sa	1.
64. Colymbetes circumdatus. F.	1.	8.	150. Dasytes viridis. L.	2.	—	235. " Hamadryas F	3
65. Cyclous punctulatus. D.	—	4.	151.–156. " ♂ D.			236. " Jachus F.	
66. Gyrinus marginatus. D.	1.	8.	157. Melyris tinctoria F.	—	2.	237. " latifrons D	
			158. " virens F.	—	2.	238. " nemestrinus F.	
			159.–160. " ♂ D.			239. " Oedipus F.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien Mitte May 1830.

Hochgebohrner

[illegible]

weiß falsche Namen geben, diese sind ebenso gemeinlich wie falsche Münze.

Ich bitte Sie, Hochgeehrtester Herr Senator, die Versicherung meiner innigen Hochachtung zu genehmigen, mit der ich verbleibe

Ihre

ergebenster und gehorsamster Diener

Dr Dahlbom.

Eins bitte ich Sie lieber Herr Senator zu bemerken und keineswegs übel aufzunehmen, daß Sie Ihre Insekten Sammlung, die Sie mit so vieler Mühe und Sorgfam Blick zusammengebracht, gar nicht weiter nach der Boyeschen Methode, die ganz unpraktisch ist, präpariren. Darum daß ich so offen gewesen bin meine Meinung ganz aufrichtig gerade aus zu sagen, darf ich wohl hoffen daß Sie mir fortwährend nicht weniger gut bleiben.

Drège C. Fr.

in

Hamburg

Handelt mit Insekten, die er in Süd-Afrika sammelte, worüber er 1840 Verzeichnisse. Er begab sich dann wieder nach dem Cap und wollte 1855 wieder nach Europa (nach Thorey)

†.

55. Harpalus fuscipennis. W.	—	12.	130–131. " " D.			225. Sisyphus dentipes. D	1
56. " impunctus. W.	—	4.	132. Colophotia capensis. F.	1.	—	226. " Hessii	1
57–58. " " D.			133. " pygmaea. D.	—	6.	227. Circellium Bacchus Fmin sf maj	1
59. Geobaenus lateralis. J.	—	4.	134. Gen: " " D.			228. Chalconotes cupreus F.	1
60. Tetragonoderus bigullatus. T.	1	—	135. Cantharis bivittata. F.	—	4.	229. Epicinus Olivieri	12
			136. " capicola. D.	—	6.	230. " " D	
Hydrocantharis.			137. " viridescens. F.	—	4.	231. Coprobas fornicatus Schü	3
61. Prochatus capensis. D.	—	12.	138–140. " " D.			232. Choeridium " D	
62. Hydaticus capicola. D.	1.	8.	141–147. Malachius " D.			233. Copris conor " K	8 8 12
63. " " D.			148–149. Gen " " D.			234. " cornigera Sa	1
64. Colymbetes circur. D. F.	1.	8.	150. Dasytes viridis. L.	2.	—	235. " Hamadryas F	3
65. Cyclous punctulatus. D.	—	4.	151–156. " " D.			236. " Jachus F	
66. Gyrinus marginatus. D.	1.	8.	157. Melyris lineata. F.	—	2.	237. " latifrons D	
			158. " viridis. F.	—	2.	238. " nemestrinus F.	
			159–160. " " D.			239. " Oedipus F	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

97

Preis-Verzeichnis der Insecten,

von C. Fr. Drège in Süd Afrika gesammelt

ab 25% Rabatt und in Hamburg für beigesetzte Preise zu beziehen.

Erste Lieferung July 1834.

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔.	ß.
	COLEOPTERA.		
	Pentamera.		
	Carabicines.		
1	Manticora maxillosa. F.	3.	—
2.	Cicindela chrysographa. K.	—	8.
3.	" clathrata. D.	—	8.
4.	" Drègei. * D.	3.	—
5.	" lurida. F.	—	12.
6.	" marginella. D.	1	—
7.	" rotundicollis D.	1.	—
8	Cymindis. * D.		
9	Calleida angustata. D.	2.	—
10.	Lebia * D		
11.	Brachinus armiger. K.	—	6
12.	" Halteri. * Drège	3.	—
13.	" subcostatus. D.	2.	—
14.	" * D.		
15.	Thyreopterus flavosignatus. D.	1.	8.
16.–18.	" * D.		
19.	Catascopis. * D.		
20.	Graphipterus cicindeloides F.	1.	8
21.	" incanus K.	1	—
22.	" trilineatus F.	—	8.
23.	" vestitus. D.	1	8
24.	Anthia bigultata. B.	3.	—
25.	" cinctipennis. Dup.	3	—
26.	" 10 guttata. F.	—	12.
27.	" gracilis. D.	3.	—
28.	" maculenta. O.	4.	—
29.	" maxillosa F.	3.	—
30.	" sexnotata. S	3.	—
31.	" tabida. F.	—	12.
32.	" thoracica. F.	2.	8.
33.	" villosa. T	4.	—
34.	" * D.		
35.	Scarites capicola D	2.	—
36.	" laevis. D.	2.	—
37.	" rugosus. W.	1.	—
38.	" * D.		
39.	Calosoma rugosum d. G.	—	12.
40.	Omophron suturalis. G.	—	12.
41.	Panagaeus nobilis. K.	3.	—
42.	Chlaenius amictus. J.	—	12.
43.	" cylindricollis. K.	—	12.
44.	" quadricolor. F.	—	12.
45.	" tenuicollis. F.	—	12.
46.	Epomis circumscriptus. Duf.	1.	—
47.	Dinodes rufipes B.	1.	—
48.	Dolichus caffer. J.	—	8.
49.	" * D.		
50.–51.	Anchomenus. * D		
52.	Feronia caffra. D.	—	8.
53.	" lenis J	—	8.
54.	Platymetopus. * D		
55.	Harpalus fuscipennis. W.	—	12.
56.	" impunctus. W.	—	4.
57.–58.	" * D.		
59	Oodaenus lateralis. J.	—	4.
60	Tetragonoderus bigultatus T	1	—
	Hydrocanthares.		
61.	Trochalus capensis. D.	—	12.
62.	Hydaticus capicola. D.	1.	8.
63.	" * D.		
64.	Colymbetes circur. D. F.	1.	8.
65.	Cyclous punctulatus. D.	—	4.
66.	Gyrinus marginatus. D.	1.	8.
	Brachelytres.		
67.	Anthobium flavicorne. v W.	—	6.
68.	" * D.		
69.	Tachinus. * D.		
	Sternoxes.		
70.	Julodis cirrosa. S.	4.	—
71.	" fasciculatis. F.	—	4.
72.	" var. D	1.	8.
73.	" gnaphalon. H.	—	8.
74.	" hirta. F.	—	12.
75.	" tasios. H.	—	8.
76.	" patruelis. D.	2.	—
77.	" versicolor. D.	4.	—
78.	" * D		
79.	Acmaeodera adspersa. F.	2.	—
80.	" bistrigultata K.	3.	—
81.	" gibbosa. F.	3.	—
82.	" gracilis W.	2.	—
83.	" quadrivittata D	6.	—
84.	" xanthotaenia W.	1.	8.
85.–89.	" * D.		
90.	Psiloptera marginipennis. D.	4.	—
91.–94.	" * D		
95.	Dicerca cuprea. F.	—	4.
96.	Strigoptera bivittata. F.	3.	—
97.	Chrysobothris spinimana D	2.	—
98.	Anthaxia contempta. D.	1.	8.
99.	" perplexa. D.	2.	—
100.	" triangularis. * D.	2.	—
101.–103.	" * D.		
104.	Sphenoptera intermedia. D.	3.	—
105.	" * D.		
106.	Agrilus elongatulus. K.	—	8.
107.	" ferrugineoguttatus. H.	2.	—
108.	" falcatus. K.	3.	
109.–113.	" * D.		
114.	Trachys * D		
115.	Tetralobus flabellicornis. F.	8.	—
116.	Agrypnus. * D.		
117.	Cardiotarsus capensis. D.	1.	—
118.	Cardiophorus erythrogaster. D.	1.	—
119.	" Klugii. D.	3.	—
120.	" * D.		
121.	Ampedus gaura. * D	1.	—
122.	Ludius sericeus * D	2.	—
	Malacodermes.		
123.	Prilodactila * D		
124.	Lycus pallidus. F.	—	4.
125.	" rostratus. F.	—	4.
126.	" * D.		
127.–128.	Dyctyopterus * D		
129.	Lampyris sylvatica. Ru.	1.	—
130.–131.	" * D.		
132.	Colopholia capensis. F.	1.	—
133.	" pygmaea. D.	—	6
134.	Geu: * * D.		
135.	Cantharis bivittata. F.	—	4.
136.	" capicola. D.	—	6.
137.	" viridescens. F.	—	4.
138.–140.	" * D.		
141.–147.	Malachius * D.		
148.–149.	Geu. * * D		
150.	Dasytes viridis. L.	2.	—
151.–156.	" * D.		
157.	Melyris linéata. F.	—	2
158.	" viridis. F.	—	2.
159.–160.	" * D.		
	Teredites.		
161.	Trichodes * Dejeani. Drège	12.	
162.	Notostenus viridis. T.		8
163.	Corynetes abdominalis F		8
164.	" ruficollis F.		8
165.	" rufipes. F		8
166.	Rhysodes * D		
167.	Anobium paniceum F		8
168.	Mastigus * D		
	Clavicornes.		
169.	Silpha capensis. D		4
170.	" micans. F.	—	8.
171.	" punctulata O	1	
172.	Nitidula dulcamarae. J		4
173.	" pedicularia F		4
174.–183.	" * D		
184.	Episcapha grandis *	3	
185.	" * D		
186.	Cryptophagus * D		
187.	Dermestes cadaverinus. F		4
188	" vulpinus F		4
189.–191.	Attagenus. * D		
192.	Anthrenus maculatus F		6
193.	Hister affinis P	1	
194.	" africanus. St	1	
195.	" atratus. D	1	
196.	" bicolor. F		6
197.	" caffer D		8
198	" semipunctatus. F.		8
199.–202.	" * D.		
203	Dendrophilus * D		
204	Platysoma cavifrons. Schü		8
205.–207.	" * D.		
208	Hololepta * D		
	Palpicornes.		
209	Hydrobius melanophtalmus Duf		6.
210	Cyclonotum abdominale F.	1	
211.	Sphaeridium abbreviatum D		8.
212	" 5maculatum F.		6.
213	Cercyon * D		
	Lamellicornes.		
214.	Ateuchus caffer D	1.	
215.	" capensis D	1	
216.	" convexus W	3.	
217.	" hottentottus D		
218.	" intricatus F	2	
219.	" senegalensis D	2	
220.–221.	" * D.		
222	Pachy soma Aesculapius. F.	1	
223	Gymnopleurus fastiditus. D	1	
224.	" Lichtensteinii. J		8
225.	Scyphus dentipes D	1	
226.	" Hessii. J		12
227.	Circellium Bacchus Emin & maj	1	
228.	Chalconotus cupreus F.	1	
229	Epicinus Olivieri. M		12
230.	" * D		
231	Coprobas fernicatus Schü	3	
232	Choeridium * D		
233	Copris conon * K ♀ ♂	12	
234	" cornigera Sa	1	
235	" Hamadryas F	3	
236	" Jachus F		
237	" latifrons D		
238	" nemestrinus F.		
239	" Oedipus F.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

240._243. Copris. * D
244. Onthophagus aciculatus. D. — 6.
245. " aulicus. D. 2 —
246. " capreolus. D. — 6
247. " columella. J. 1. 8.
248. " gazella. F. — 6.
249. " giraffa. Ho. 2. —
250. " monoceros. D. 1. —
251. " Urus. J. 1. —
252._257. " * D.
258. Onitis Apellis. F. 1. 8.
259. " Aygulus. F. — 4
260. " Bos. D. — 12.
261. " Horatius. D. 1. 8.
262. " pecuarius. Bu — 12.
263. " * D
264. Onitiicellus ciliatus. D. — 4.
265. " elegans. D. 3 —
266. " militaris. J. — 6.
267. " patiens. O — 6.
268. " planatus. K — 12.
269. " squalidus. D. — 12.
270._271. " * D.
272. Aphodius anachoreta. F. — 2.
273. " carbonarius. St — 8.
274. " emarginatus. J. 1. —
275. " marginicollis. D — 8
276. " retusus. D. 1. —
277._280. " * D.
281. Oxyomus geminatus. K. — 12
282. Trox fasciculatus. W 1. —
283. " horridus. F — 8.
284. " luridus. F. — 4.
285. " * D.
286. Oryctes Boas. F. 2. —
287. Scarabaeus monodon. F 1. —
288._290. " * D
291. Coptorhinus retusus. F. — 6
292. Heteronychis cricetus. Ha — 12.
293. " phocion. D. 1. 8.
294. " syrichtus. F. 1. 8.
295. Anomala nitens. Bu — 8.
296._297. Trigonostoma. * D
298. Popilia bipunctata. F — 6
299. Leocaeta Alopex. F. 6 —
300. Lagosterna flavofasciata. D. 3. —
301. Ablabera fuscata. D. — 8.
302. " suturalis. D. — 10.
303._306. " * D.
307. Leucopholis Sommeri. D. — 12.
308. Schizonycha debilis. Bu — 12.
309. " Globator. F. 1. —
310. " tumida. J. — 6.
311._314. " * D.
315. Gen. * * D.
316._319. Omaloplia. * D.
320. Chasme decora. W. 1. —
321. " * D.
322. Lepisia rupicola. F. — 8.
323. Dichelus dentipes. F. — 4.
324. " interruptus. D. — 4.
325. " luridipennis. D. — 12.
326. " truncatulus. D. — 8.
327._333. " * D.
336. Monochelus arthriticus. F. — 6.
337. " calcaratus. D — 6.
338. " gonagra. F. — 6.
339. " inermis. D. — 8.
340. " pulverosus. D. — 8.
341. " squamulatus. D. 1. —
342. " sulcicollis. W. 1. —
343._400. " * D.
401. Gen. * * D.
402. Microplus nemoralis. Bu 1. —
403._404. Hoplia. * D.
405. Gymnoloma alomarium. F. — 8.
406. " strigosum. D. — 8.
407._408. " * D.
409. Eriesthis vestita. D — 4.
410._412. " * D.
413. Pachycnema crassipes. F. 1. —
414. " flavostriatum. * D. 1. 8.
415. Pachycnema sticlica. D — 6.
416. " striatum. * D. 4. —
417._430. " * D.
431. Anisonyx crinitum. F. — 8.
432. " nasutum. W. 2. —
433. " ursus. F. — 2.
434. " * D.
435. Lepitrix capicola. F — 4
436. " flavostriatum. * D. 1. —
437. " impectus. W — 8.
438. " lineatus. F. — 8.
439. " nigripes. F. — 8.
440._443. " * D.
446. Agenius limbatus. O. 8. 6/2 — 12.
447. " * D.
448. Stripsifer flavipennis. * Oo. 2. —
449. " niger. * K. 2. —
450. " Zebra. K. 2. —
451. Trichius vittatus. F. ♂ 6/2. — 12.
452. Valgus * D.
453. Cremastocheilus capensis. K. 8 —
454. Oeauchus cruentus. F. 2. —
455. Gnathocera flavomaculata. F. 1. 8.
456. " lunia. P.B. 4 —
457. " umbonata. K. — 8.
458. Macroma scutellatum. F. 8. —
459. Diplognatha carnifex. F. 1. —
460. " gagates. F 2. —
461. " hebraea. O 1 —
462. Cetonia adspersa. F. — 6.
463. " aequinoctialis. F — 8.
464. " alboplicta. Oo. 2 8.
465. " aulica. F. 1. —
466. " capensis. F. — 4
467. " " var. hottent. Oo — 8.
468. " carmelita. F. — 8.
469. " cinerascens. F 1 —
470. " cornuta. F. 2 —
471. " discoidea. F. — 12.
472. " equestris. D. — 12.
473. " fasciculatis. F. — 8.
474. " furvata. F. — 10.
475. " haemorrhoidalis. F. — 4
476. " hispida. O 1. —
477. " judaica. D 1. —
478. " pubescens. F. 2. —
479. " Racupeti. * Drège 1. —
480. " semipunctata. F. — 8.
481. " signata. F. — 12.
482. " sinuata. F. 1. 8.
483. " tomentosa. K. — 12.
484._489. * D.

Heteromera.

Metasomes.

490. Xophosis aculata. W. — 6.
491. " testudinaria. J. 1. —
492. " dytiscoides. H. — 8
493. " granu. D. — 4.
494. Epiphysa flavicollis. F. 2. 8.
495. Physosterna ovata. O. 1. 8
496. " * D.
497._500. Adesmia * D. [illegible] F — 2
501. Cryptochyle fallax. D 1. 8.
502. " maculata. F. — 12.
503. " minuta. F. 1. 8.
504. Moluris laevigata. O. 1 —
505. " pilosa. T. 2. —
506. " scabra. F. 2. —
507. " striata. F. — 8.
508. " sulturalis W. 2. —
509. " tomentosa. D 2 —
510._518. " * D.
519. Hipometus acuminatus. S. 2. —
520. " bicolor. W. 3. —
521. " sabulosus. St. 1. —
522. " villatus. F. 1. —
523._524. " * D.
525. Trachynotus aeneus. D. 2. —
526. " elongatus. O. — 6.
527. " lacunosus. J. 3 —
528. " rugosus. F. 2. —
529. Ancylognathus. * Drègei. * D. 16. —
530. Dicrossa connata 3 —
531. " luctuosa. * D. 14. —
532._533. " * D.
534. Eurychora ciliata. F — —
535. " punctata. D 1 —
536. Herpiscius * Sommeri. * D. 12. —
537. Machla villosa. O — —
538. " * D.
539. Asida * D.
540. Heteroscelis testudinarius. D — 1
541._543. " * D.
544. Conopus ventricosus. D. 1 1
545. Psorodes calcarata. F. — 12
546. " tuberculata. D — 12
547. Acanthomera granulata. W. 3 —
548. Oncotus farctus. J. 1 —
549. " tardus. J. 1 —
550. Eurynotus morio. Buq — 12
551. " muricatus. Kir. — 6
552. " tuberculatus. D. 2 —
553._559. " * D.
560. Blaesodes subcarinatus. St — 12
561. " * D.
562. Opatrum crenatum. F. — 2
563. " micans. F. — 1
564. Leichenum variegatum. D. 2 —

Taxicornes.

565. Phaleria laevigata. Schu. 1 —
566. Endophloeus peltoides. K. 1 —
567. Neomida * D.
568. Epilampus * D.
569. Oopiestus. * D.
570. Heterophaga opatroides. D. 1 —
571._572. Hypophloeus * D.

Tenebrionites.

573. Imatismus. * D
574._575. Toxicum. * D.
576. Trogosita caraboides. F. — 4
577. " opaca. K. 3 —
578. " vestita. D. 3 —

Helopiens.

579. Optocheirus tenebrioides. * D. 4 —
580. " upioides * D. 4 —
581. Stenochia caffra. D.C. 3 —
582. " sulcipennis. D.C. 2 —
583. Gistda capensis. * D. 1 —
584. Lagria amethystina * D — 1
585. " columbana. * D. — 1
586. " distincta. * D. 2 —
587. " flavipennis. * D. 2 —
588. " foveicollis. D. 1 —
589. " fuscipennis. K. — 12
590. " juvenca. * D. 1 —
591. " puberula. * D. — 1
592. " vestita. * D. — 12
593. " villosa. F — 4
594. Eutrapela bicolor. * D. 1 4
595. " elongata. D.C. 1 4
596. " erythrodera. D.C 1 4
597. " gracilis. D.C 1 4
598. " lateralis * D. 1 1
599. " porrecta. * D. 1 1
600. " trilineata. * D 1 1
601. " unicolor. * D. 2 —
602. " verticalis. * D 2 —
603. " villata. D.C. 2 —
604. Anthicus albitarsis. * D. — 1
605. " coeruleus. T. 1 8
606. " dorsalis. * D. 1 8
607. " 4 signatus. * D. 2 —
608. " rubricollis. * D. — 1
609. " transversalis * D — 1
610. Monocerus capensis. * D. 1 1
611. " cucullatus. * D. 1 1
612. " litigiosus. * D. 1 1
613. " pilosus. * D. 1 1
614. " scenicus. * D. 2 —
615. Rhipiphorus flabellatus. D.C. — 4

616.	Mordella basalis. ≠ D.	2.	—	679.	Cyrtomon camelus. K.	1.	8.	758.	Cassida maculipennis. D.c.	—	8.
617.	" confusa. ≠ D.	3.	—	680.	Hipporhinus spectrum. F.	2.	8.	759.	" nigronotata. D.c.	—	8.
618.	" diffinis. ≠ D.	1.	—	681.	" granulosus W.	1.	8.	760.	" pallens. var. maj. F.	3	—
619.	Anaspis nigricans. ≠ D.	—	8.	682.	" nivosus. Sp.	4.	—	761.	" senegalensis var. D.	—	10.
620.	Dices decoratus. ≠ D.	2.	—	683.	" notunchus. W.	1.	—	762.	" solani. K.	—	4.
621.	Decatoma africana. ≠ D.	1.	8.	684.	" verrucosus. F.	1.	—	763.–768.	" ≠ D.		
622.	" decipiens. ≠ D.	2.	—	685.	Lixus lividus. F.	2.	—	769.	Galleruca bioculata. F.	1.	—
623.	" fasciolata. ≠ D.	1	8.	686.	Nerthops guttatus. O.	2.	—	770.	" capensis D.	—	6.
624.	" histrio. ≠ D.	1	8.	687.	Phytinus collosus. S.	—	12.	771.	" festiva. Da.	—	8.
625.	" lacta. ≠ D.	4.	—	688.	Platycopes argyrellus. Sp.	—	12.	772.	" linteata d G var.	—	12.
626.	" Cuprea. F.	—	4.	689.	Rhythirhinus inaequalis. F.	1.	—	773.	" 6 pustulata. D	2.	—
627.	" nigricornis D.c.	2.	—	690.	Spermophagus capensis. D.c.	—	8.	774.–811.	" ≠ D		
628.	" 4 guttata. D.c.	1	8.	691.	Tanaos sanguineus. T.	3.	—	812.	Gen. ≠ ≠ D		
629.	" vicina. D. c.	—	12.	692.	Tanymecus praeanus. S.	—	12.	813.	Haltica dilecta. Da	2.	—
630.	" ≠ D.			693.	Thylacites gravis. C.	—	1.	814.	" indica. F.	—	8.
631.	Mylabris binotata. ≠ D.	1.	—					815.	" indigacea. J.	—	6.
632.	" capensis. F.	—	4.		*Xylophages.*			816.	" maculicollis. D	1.	—
633.	" coccigena. ≠ D	2.	—	694.–695.	Bostrichus. ≠ D.			817.–834.	" ≠ D.		
634.	" connexa. D.c.	2.	—	696.	Apate ruficornis. D.c.	2.	—	835.–836.	Paropsis. ≠ D.		
635.	" Dregei. ≠ D.	3.	—	697.	" senegalensis. D.	1.	8.	837.	Chrysomela alternans. F.	1.	—
636.	" Groendali. D.c.	1.	—	698.	" unidentata. F.	1.	8.	838.	" chloroptera. D.	—	8.
637.	" Lavaterae. F.	1.	—	699.–700.	" ≠ D.			839.	" clathrata. D.	—	6.
638.	" lusca. ≠ D.	2.	—	701.–702.	Latridius. ≠ D.			840.	" guttata. F.	—	4.
639.	" maculicollis. ≠ D.	2.	—	703.–704.	Rhyzophagus. ≠ D.			841.	" macularis. D.	—	6.
640.	" myops. ≠ D.	3.	—	705.	Lyctus foveicollis. D.c.	4.	—	842.	" notata. F.	—	6.
641.	" ocultata. F.	—	8.	706.	" ≠ D.			843.	" 14 guttata. F.		
642.	" ophthalmica. ≠ D.	1.	—	707.	Silvanus. ≠ D.			844.	" vidua. D var.	—	4.
643.	" 4 fasciata. ≠ D.	1.	8.	708.	Cucujus. ≠ D.			845.	" vulpina. F.	1.	8.
644.	" 16 guttata. ≠ D.	4.	—					846.–857.	" ≠ D.		
645.	" transversalis. ≠ D.	3.	—		*Capricornes.*			858.	Urodon capense. ≠ D.	—	8.
646.	" 3 punctata. F.	—	12.	709.	Prionus Natala. ≠ D.	8.	—	859.	" dimidiatum. ≠ D.	1	—
647.	" vittata. ≠ D.	3.	—	710.	Macrotoma. ≠ D.			860.	" tomentosum. ≠ D.	1.	—
648.	Synomma amoena. ≠ D.	1.	8.	711.	Litopus ater. F.	1.	—	861.	Colaspis attelaboides. D.	1.	—
649.	" sinuata. ≠ D.	1.	8.	712.	" ≠ D.			862.	" chrysomelina. D.	—	8.
650.	Epicanta brevipennis. D.c.	2.	—	713.	Cerambyx latipes. F.	2.	—	863.	" sericea. S.	—	8.
651.	Lytta flavipennis. D.c.	—	12.	714.	Acanthocinus trichophorus. D.c.	3	—	864.–873.	" ≠ D.		
652.	" lucida. D.c.	1.	—	715.	Lamia aethiops. F.	—	8.	876.	Eumolpus clythroides. D var. maj.	—	8.
653.	" nitidula. D.c.	1.	—	716.	" caffra. D.	1	—	877.	" Degeani. ≠ Dreige	10.	—
654.	Meloe capensis ≠ D.	6	—	717.	" capensis. F.	2.	—	878.	" thoracius. D.	2.	—
653.	Nonitis cribricollis ≠ D.			718.	" Dregei ≠ K.			879.–888.	" ≠ D.		
656.	" flavipennis. ≠ D.	—	12.	719.	" echinator. ≠ K.			889.	Clythra brevipes. D.	1.	—
657.	" morio. ≠ D.	1.	—	720.	" ferrugator. F.	3	—	890.	" capensis. D.	—	6.
658.	" puncticollis. ≠ D.	1.	—	721.	" formosa. O.	1	8.	891.	" lepida. D.		10.
659.	" rotundicollis ≠ D.	1.	—	722.	" hottentotta. F.	—	8.	892.	" maxillosa. F.	2.	—
660.	" rubripennis. ≠ D.	1.	—	723.	" oculator. F.	1.	8.	893.	" rugosa. F.	—	10.
661.	" rufipennis. ≠ D.	1.	—	724.	Dorcadion ~~crispatum~~ ≠ D. F.	2		894.–911.	" ≠ D.		
662.	Nemognatha collaris. ≠ D.	—	12.	725.	Amphidesmus quadridens. Ma.	1.	8.	912.	Gen. ≠ ≠ D.		
663.	" violacea. D.c.	2.	—	726.–728.	Saperda. ≠ D.			913.	Cryptocephalus pustulatus. F.	—	8.
664.	" viridipennis.	—	8.	729.	Promeces davicornis. F.	1.	8.	914.–921.	" ≠ D.		
665.	Rhinosimus pallipes. ≠ D. D.c.	1.	—	730.	" longipes. F.	—	4.	922.	Amarygmus. ≠ D.		
				731.–735.	" ≠ D.			923.	Triplax. ≠ D.		
	Tetramera.			736.	Cosmius sexpunctatus. F.	1.	8.	924.–935.	Phalacrus. ≠ D.		
	Curculionites.			737.	" laetus. K.	2.	—				
666.	Antirrhinus rectirostis. S.	4.	8.	738.	Callidium bimaculatum. F.	3.	—		*Trimeres.*		
667.	" zamiae. F.	1	8.					936.	Coccinella aurita. J.	✕ 3.	
668.	Amorphocerus talpa.	1.	8.		*Chrysomelines.*			937.	" bifasciata. D.c.	—	12.
669.	Arrhenodes piceps. O.	1.	—					938.	" canina F var.	—	8.
670.	" vulsellatus. S.	2.	—	739.	Lema cuprea. ≠ D	3.	—	939.	" 12 verrucata. F.	—	2.
671.	Balaninus luctuosus. C.	2.	—	740.	" rufipennis D.c.	2.	—	940.	" lunata. F.	—	2.
672.	Brachycerus maculatus. F.	—	12.	741.–748.	" ≠ D.			941.	" macularis O.	—	4.
673.	" globosus F.	—	12.	749.	Gen ≠ viridipennis. ≠ D.			942.	" similis. H.	—	8.
674.	" obesus.	—	12.	750.	Hispa bellicosa. D.	3.	—	943.	" striata. F.	—	4.
675.	Bruchus spadiceus. ≠ D.	1.	8.	751.	" militaris. D.	2.	8.	944.–955.	≠ D.		
676.	Camptorhinus capensis. D.	1.	—	752.–754.	" ≠ D.						
677.	Cleonus glacialis. H.	—	10.	755.	Cassida corrugata. Sa.	—	12.		*Dimeres.*		
678.	Clytus vicinus. D.	1.	—	756.	" gibbipennis. D.	—	8.				
				757.	" litigiosa. D.	—	8.	956.	Pselaphus. ≠ D.		

Erklärung der Zeichen.

≠ nov: genus.
≠ nov: species. wird von Dejean beschrieben.
D.c. Dejean catalogue.
B. Bonelli.
Bu. Burchell.
Bug. Buquet.
C. Chevrolat.
D. Dejean.
Da. Dalmann.
Dii. Dufour.
Duf. Duftschmid.
Dup. Dupont.
E. Eschscholtz.
F. Fabricius.
G. Guerin.
Go. Gory.
d.G de Geer.
H. Herbst.
Ha. Hausmann.
Ha. Hoffmannsegg.
J. Illiger.
K. Klug.
Kir. Kirby.
L. Linné.
M. Megerle.
Ma. Mannerheim.
O. Olivier.
P. Paykull.
P.B. Palisot Beauvois.
S. Schönherr.
Sa. Sahlberg.
Schü. Schüppel.
Sp. Sparmann.
St. Sturm.
T. Thunberg.
W. Wiedemann.
v.W. von Winthem.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

99

180

Preis-Verzeichniß der Insecten

von C. Fr. Drège in Süd-Afrika gesammelt

und in Hamburg für beigesetzte Preise zu beziehen.

Zweite Lieferung. August 1835.

Mit diesem Verzeichniß übergebe ich den Freunden der Entomologie einen Theil meiner 12 jährigen Ausbeute in Süd-Afrika. Meine ganze Sammlung wird wohl an 4000 Arten betragen. Die Coleopteren werden nahe an die Hälfte kommen. Die Bearbeitung der Curculioniden ist Herr Com: Rath Schönherr so gefällig übernommen zu haben; das Uebrige wird von dem Grafen Dejean beschrieben. Dieser Catalog wäre vollkommener geworden, wenn der Graf nicht so sehr viele Neue gefunden hätte. Das zweite Preisverzeichniß wird daher um so glänzender werden. Die Hemipteren sind in den Händen des Herrn Prof: Germar. Die Lepidopteren hat Herr Boisduval übernommen. Die Dipteren, Hymenopteren, Orthopteren, Neuropteren, Apteren, Arachniden &c &c sind an den Herrn Geheim. Rath Klug versandt. Für die hier beigesetzten Preise werden gute, vollständige Exemplare geliefert, sollten diese verkauft seyn, dann wird für die Unvollständigen der Preis bis zur Hälfte

92

№	Das Stück in Hamb. Cour.	ℛ	ß
	COLEOPTERA.		
	Heteromera.		
	Melasomes.		
957	*Adesmia porcata* F	—	2
1695	*Sepidium lacunosum* T ...	—	12
	Tenebrionites.		
578	*Gymnocheilis vestita* D....	3	—
	Helopiens.		
958	*Decatoma lugubris* ♀ D...	—	—
	Tetramera.		
	Curculionites.		
959	*Bruchus helvolus* ♀ S.....	—	—
960	" *pyrrhoceras* ♀ S..	—	—
961	" *silaceus* ♀ S	—	—
675	" *spadiceus* ♀ D ...	1	8
962	" *submaculosus* ♀ S	—	—
690	*Spermophagus capensis* D	—	8
963	" ♀ S.....	—	—
858	*Urodon capensis* ♀ D.....	—	—
964	" *capensis* ♀ S.....	1	—
859	" *dimidiatus* ♀ D ..	1	—
860	" *tomentosus* ♀ D ..	—	12
965	" *vermiculatus* ♀ S	—	8
966	*Phloeotragus hottentott.* ♀S	—	—
967	" *varicolor* ♀ S	6	—
968	*Anthribus albicinctus* ♀ S	—	—
969	" *apicalis* ♀ S ...	4	—
970	*Tropideres fasciculosus* ♀ S	—	—
971	" *monoceros* ♀ S .		
972	" *nigellus* Sp.	3	—
973	" *pallidirostris* ♀S	2	—
974	" *sparsus* ♀ S ...		
975	*Blaberus fallax* ♀ S...	3	—
976	*Brachytarsus pauper* ♀ S .		
977	*Xylinades maculipes* ♀ S .	5	—
978	*Apoderus cyaneus* ♀ S....		
979	" *horridus* ♀ S ...		
980	" *submarginalis* ♀S	3	—
981	*Attelabus exaratus* B	2	—
982	*Rhynchites reconditus* ♀ S	1	—
983	" *scalptus* ♀ S ..	3	—
984	*Apion africanum* ♀ S.....	1	8
985	" *angulicolle* ♀ S	—	12
986	" *antiquum* ♀ S.....	—	8
987	" *caffer* ♀ S		
988	" *Herbstii* ♀ S.....		
989	" *russeolum* ♀ S	1	—
990	*Arrhenodes armatus* ♀ S..	1	8
669	" *picipes* O	—	12
670	" *vulsellatus* S ..	1	8
991	*Episus cristatus* ♀ S		
992	" *Drègei* ♀ S	2	—
993	" *horridus* ♀ S.....	2	—
994	" *spinosus* ♀ S		
995	*Brachycerus acorbus* ♀ S..		
996	" *affaber* ♀ S ...		
997	" *albo-margin.* ♀S		
998	" *anaglypticus* ♀S	3	—
999	" *apterus* F.....	2	8
1000	" *asper* ♀ S	4	—
1001	" *biglobatus* Sp. .		
1002	*Bra*		
1003			
1004			
1005			
1006			
1007			
1008			
1009			
1010			
1011			
1012			
1013			
672			
1014			
1015			
1016			
1017			
1018			
1019			
1020			
1021			
1022			
673			
1023			
1024			
1025			
1026			
1027			
1028			
1029			
1030			
1031			
1032			
1033			
1034			
1035			
1036			
1037			
1038			
1039			
1040			
674			
1041			
1042			
1043			
1044			
1045			
1046			
1047			
1048			
1049			
1050			
1051			
1052			
1053			
1054			
1055			
1056			
1057			
1058			
1059			
1060			
1061			
1062			
1063			
1064			
1065	*Protomantis Drègei* ♀ S		
	" *longiusculus* ♀S	2	—
	" *longulus* ♀ S..	1	8
	" *maculatus* F...		
	" *milleporus* W ..		
	" *morio* F.....		
	" *nebulosus* O...		
	" *obesus* F.....	—	12
	" *obicus* ♀ S....		
	" *ochraceus* ♀ S		
	" *pertusus* T	2	—
	" *phrygianus* ♀ S		
	" *pulvereus* ♀ S.		
	" *punctirostris* ♀S		
	" *rudis* ♀ K		
	" *rufo-verruc.* ♀S		
	" *rusticanus* ♀ S		
	" *scabiosus* ♀ S..		
	" *scelestus* ♀ S..		
	" *sparsipes* ♀ S.		
	" *stellaris*	5	—
	" *subcicatric.* ♀ S		
	" *subfasciatus* ♀S	1	8
	" *suspiciosus* ♀ S		
	" *texatus* G		
	" *torquatus* ♀S..	2	—
	" *tuberosus* W ..		
	" *turriferus* ♀ S		
	" *ungulatus* ♀ G	2	—
	" *Uva* F	2	—
	" *verrucicollis* ♀S	1	8
	" *Westermanni* ♀S	3	—
1098	" *rubro-spinos.* ♀S		
1099	" *rugirostris* ♀ S.	4	—
1100	" *seriatus* ♀ S ..		
1101	" *seriepunctat.* ♀S	2	—
1102	" *severus* ♀ S...	2	8
1103	" *sex vittatus* F.		
680	" *spectrum* F ...	1	8
1104	" *subcordatus* ♀S		
1105	" *verrucanus* ♀ S		
684	" *verrucosus.* L..	1	—
1106	*Omosaccantha bidentata.* C		
1107	*Prypnus granicollis* S....	4	—
1108	" *longulus* ♀ S ...		
1109	" *parvulus* ♀ S...	1	8
1110	" *pygmaeus* S	1	4
1111	" *subittatus* ♀ S ..		
1112	" *sublineatus* ♀ S.	4	—
1113	*Thylacites setulosus* ♀ C.		
1114	*Cneorhinus ancorifrons* ♀ S		
1115	" *gonopterus* ♀S		
693	" *gravis* C.....	—	8
1116	" *indoctus* ♀ S..		
1117	" *longulus* ♀ S..	1	8
1118	" *obesus* ♀ S ...		
1119	" *praelongul.* ♀S		
1120	" *scapulatus* ♀ S	2	—
1121	*Platycopes gonopterus* ♀S	4	—
1122	" *pygmaeus* ♀ S		
688	" *squalidus* ♀ S	2	—
1123	" ♀ S.....		
1124	*Polycloeis equestris* ♀S	4	—
1125	*Tanymecus praecanus* S ..	1	8
1157	" *fallax* ♀ S ..		
1158	" *foedus* ♀ S ..		
1159	" *saginatus* ♀S		
1160	*Hypocolobus anaglyptic* ♀S		
1161	" *deceptor* ♀ S.		
1162	" *Drègei* ♀ S ..		
1163	" *fraudulent.* ♀S		
1164	" *impressif.* ♀ S		
1165	" *scoparius* ♀ S		
1166	" *scrobifrons* ♀S		
1167	" *tutulus*.....		
1168	*Trachyphloeus brevis* ♀ S	—	6
1169	" *spathulatus* ♀S	—	8
1170	" *squamifer* ♀ S	—	8
1171	" *subcanalic.* ♀S		
1172	*Pertelus squamulatus* ♀S	—	8
1173	" *subfasciatus* ♀S		
1174	*Ellimenistes bidentat.* ♀S		
1175	" *camelus* ♀ S .	—	6
1176	" *clitellarius* ♀S		
1177	" *glaber* ♀ S ..		
1178	" *inaffectatus* ♀S	—	4
1179	" *plebejus* ♀ S .		
1180	" *pulvinatic.* ♀S		
1181	" *seriehispid.* ♀S		
1182	" *squamifer* ♀S	—	8
1183	" *trivialis* ♀ S.		
1184	*Holcorhinus albiceratus* ♀S		
1185	" *albicinctus* ♀S	3	—
1186	*Phlyctinus albo-mixtus* ♀S	2	—
1187	" *callosus* S.....	1	—
1188	" *egenus* ♀ S ...		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
	COLEOPTERA.		
	Heteromera.		
	Melasomes.		
957	*Adesmia porcata* F	—	2
1695	*Sepidium lacunosum* T ...	—	12
	Tenebrionites.		
578	*Gymnocheilis vestita* D....	3	—
	Helopiens.		
958	*Decatoma lugubris* ♀ D...	—	—
	Tetramera.		
	Curculionites.		
959	*Bruchus helvolus* ♀ S.....	—	—
960	" *pyrrhoceras* ♀ S..	—	—
961	" *silaceus* ♀ S	—	—
575	" *spadiceus* ♀ D ...	1	8
962	" *submaculosus* ♀ S	—	—
590	*Spermophagus capensis* D	—	8
963	" ♀ S.....	—	—
958	*Urodon capensis* ♀ D.....	—	—
964	" *capensis* ♀ S.....	1	—
959	" *dimidiatus* ♀ D ..	1	—
960	" *tomentosus* ♀ D..	—	12
965	" *vermiculatus* ♀ S	—	8
966	*Phloeotragus hottentott.* ♀S	—	—
967	" *varicolor* ♀ S	6	—
968	*Anthribus albicinctus* ♀ S	—	—
969	" *apicalis* ♀ S ...	4	—
970	*Tropideres fasciculosus* ♀S	—	—
971	" *monoceros* ♀ S .		
972	" *nigellus* Sp.	3	—
973	" *pallidirostris* ♀S	2	—
974	" *sparsus* ♀ S ...		
975	*Blaberus fallax* ✥ ♀ S...	3	—
976	*Brachytarsus pauper* ♀ S .		
977	*Xylinades maculipes* ♀ S .	5	—
978	*Apoderus cyaneus* ♀ S....		
979	" *horridus* ♀ S ...		
980	" *submarginalis* ♀S	3	—
981	*Attelabus exaratus* B	2	—
982	*Rhynchites reconditus* ♀ S	1	—
983	" *scalptus* ♀ S ..	3	—
984	*Apion africanum* ♀ S.....	1	8
985	" *angulicolle* ♀ S	—	12
986	" *antiquum* ♀ S.....	—	8
987	" *caffer* ♀ S		
988	" *Herbstii* ♀ S.....		
989	" *russeolum* ♀ S	1	—
990	*Arrhenodes armatus* ♀ S..	1	8
669	" *picipes* O	—	12
670	" *vulsellatus* S ..	1	8
991	*Episus cristatus* ♀ S		
992	" *Drègei* ♀ S	2	—
993	" *horridus* ♀ S.....	2	—
994	" *spinosus* ♀ S		
995	*Brachycerus acorbus* ♀ S..		
996	" *affaber* ♀ S ...		
997	" *albo-margin.* ♀S		
998	" *anaglypticus* ♀S	3	—
999	" *apterus* F	2	8
1000	" *asper* ♀ S	4	—
1001	" *biglobatus* Sp. .		
1002	*Brachycerus cancellatus* S .		
1003	" *cavifrons* I		
1004	" *cinerarius* W ..		
1005	" *comtus* ♀ S ...		
1006	" *cordiger* F	2	—
1007	" *cornutus* L		
1008	" *coronirostris* ♀S		
1009	" *costatus* C		
1010	" *crispisulcans* ♀S		
1011	" *curruca* ♀ S...	1	8
1012	" *deceptor* ♀ S..		
1013	" *discolor* ♀ S ..		
672	" *Drègei* ♀ S ...	2	—
1014	" *duplicatus* ♀ S		
1015	" *facietatus* ♀ S		
1016	" *flavilaceus* ♀ S	—	12
1017	" *formidolosus* ♀S		
1018	" *gemmeus* ♀ S .		
1019	" *Germari* ♀ S..	6	—
1020	" *glabratus*		
1021	" *glandulifer.* ♀S		
1022	" *globiferus* T...	3	—
673	" *globosus* F	—	10
1023	" *globulus* ♀ S .	4	—
1024	" *glomeratus* ♀ S		
1025	" *granicollis* ♀ S		
1026	" *granosus* S	3	8
1027	" *Gyllenhali* ♀ S		
1028	" *imprudens* ♀ S		
1029	" *intutus* ♀ S...		
1030	" *inurbanus* ♀ S .		
1031	" *Koraquanus* ...	2	—
1032	" *labrusca* ♀ S..		
1033	" *lacunosus* C ...		
1034	" *lentus* ♀ S....		
1035	" *longiusculus* ♀S	2	—
1036	" *longulus* ♀ S..	1	8
1037	" *maculatus* F...		
1038	" *milleporus* W ..		
1039	" *morio* F.....		
1040	" *nebulosus* O ...		
674	" *obesus* F.....	—	12
1041	" *obicus* ♀ S....		
1042	" *ochraceus* ♀ S		
1043	" *pertusus* T	2	—
1044	" *phrygianus* ♀ S		
1045	" *pulvereus* ♀ S.		
1046	" *punctirostris* ♀S		
1047	" *rudis* ♀ K		
1048	" *rufo-verruc.* ♀S		
1049	" *rusticanus* ♀ S		
1050	" *scabiosus* ♀ S..		
1051	" *scelestus* ♀ S..		
1052	" *sparsipes* ♀ S..		
1053	" *stellaris*	5	—
1054	" *subcicatric.* ♀ S		
1055	" *subfasciatus* ♀S	1	8
1056	" *suspiciosus* ♀ S		
1057	" *texatus* G		
1058	" *torquatus* ♀S..	2	—
1059	" *tuberosus* W ..		
1060	" *turriferus* ♀ S		
1061	" *ungulatus* ♀ G	2	—
1062	" *Uva* F	2	—
1063	" *verrucicollis* ♀S	1	8
1064	" *Westermanni* ♀S	3	—
1065	*Protomuntis Drègei* ✥ ♀ S		
1066	*Microcerus Drègei* ♀ S...		
1067	" *fatuus* ♀ S ...		
1068	" *grisescens* ♀ S		
1069	" *melancholic.* ♀S		
1070	" *retusus* F		
1071	" *subsignatus* ♀S		
1072	*Hipporhinus albicinctus* ♀S	5	—
1073	" *albo-lineatus* ♀S		
1074	" *appendicul* ♀ S	3	—
1075	" *asper* ♀ S		
1076	" *brevis* ♀ S		
1077	" *callidus* ♀ S ..		
683	" *calvus* H	—	12
1078	" *capicola* ♀ Ho.		
1079	" *clavarius* ♀ S .		
1080	" *contortus* ♀ S .		
1081	" *cornirostris* ♀ S	4	—
1082	" *corpulentus* ♀S		
1083	" *costatus* S.....	2	
1084	" *curtus* ♀ S		
1085	" *Drègei* ♀ S ...		
1086	" *Eckloni* ♀ S...		
1087	" *granulatus* D ..	2	—
681	" *granulosus* W..	1	4
1088	" *interstitialis* ♀S		
1089	" *lacunosus* T ...		
682	" *nivosus.* Sp. ...	2	—
1090	" *nodulosus* F ...		
1091	" *pastillarius* S..	3	8
1092	" *perfunctorius* ♀S		
1093	" *pollinarius* ♀ S		
1094	" *4-lineatus* ♀ S.		
1095	" *recurvus* F.....		
1096	" *rubifer*	3	—
1097	" *rubro-nodos.* ♀S		
1098	" *rubro-spinos.* ♀S		
1099	" *rugirostris* ♀S.	4	—
1100	" *seriatus* ♀ S ..		
1101	" *seriepunctat.* ♀S	2	—
1102	" *severus* ♀ S...	2	8
1103	" *sex vittatus* F.		
680	" *spectrum* F	1	8
1104	" *subcordatus* ♀S		
1105	" *verrucanus* ♀ S		
684	" *verrucosus.* L..	1	—
1106	*Omosaccantha bidentata.* C		
1107	*Prypnus granicollis* S....	4	—
1108	" *longulus* ♀ S ...		
1109	" *parvulus* ♀ S...	1	8
1110	" *pygmaeus* S	1	4
1111	" *subittatus* ♀ S ..		
1112	" *sublineatus* ♀ S.	4	—
1113	*Thylacites setulosus* ♀ C.		
1114	*Cneorhinus ancorifrons* ♀ S		
1115	" *gonopterus* ♀S		
693	" *gravis* C.....	—	8
1116	" *indoctus* ♀ S..		
1117	" *longulus* ♀ S..	1	8
1118	" *obesus* ♀ S ...		
1119	" *praelongul.* ♀S		
1120	" *scapulatus* ♀ S	2	—
1121	*Platycopes gonopterus* ♀S	4	—
1122	" *pygmaeus* ♀ S		
688	" *squalidus* ♀ S	2	—
1123	" ♀ S.....		
1124	*Polycloeis equestris* ✥ ♀S	4	—
1125	*Tanymecus praecanus* S ..	1	8
692	*Tanymecus trivialis* ♀ S .	—	12
1126	*Tanaos bicolor* ♀ S.....		
691	" *fallax* ♀ S.....		
1127	*Cleonus affaber* ♀ S	1	—
1128	" *contextus* ♀ S...	—	8
1129	" *fallax* ♀ S.....	2	—
677	" *glacialis.* H	—	8
1130	" *granulatus* O....		
1131	" *lacrimosus* S.....		
1132	" *limpidus* S	1	—
1133	" *velatus* S.....	1	8
1134	*Pachycerus sparsus* ♀ S..		
1135	*Bothynoderes suillus* I....	—	12
1136	*Gronops costicollis* ♀ S..	—	8
1137	" *punctirostris* ♀S		
1138	" *squalidus* ♀ S ..		
1139	*Aonychius apicalis* ✥ ♀S	3	—
1140	" *cinerarius* ♀S.		
1141	*Byrsops amblexicollis* W..		
1142	" *angustatus* ♀ S..		
1143	" *insincerus* ♀ S..		
1144	" *quadratus* W		
1145	" *Rana.* C.....		
1146	" *sphodrus* ♀ S....		
1147	" *sulcicollis* C.....		
1148	" *truncatus.* C.....		
1149	" *viduatus* ♀ S ...		
1150	" *Westermanni* ♀S		
1151	*Eupages gibbosus* ♀ S ...	3	—
1152	*Cyphonotus signatus* ✥ ♀S	5	—
689	*Rhytirhinus inaequalis* F.		8
1153	" *lutulentus* ♀S		
1154	" *seriespinosus* C		
1155	*Spartecerus angulatus*....	—	12
1156	" *brevis* ♀ S...	—	8
1157	" *fallax* ♀ S ..	—	8
1158	" *foedus* ♀ S ..		
1159	" *saginatus* ♀S		
1160	*Hypocolobus anaglyptic* ♀S		
1161	" *deceptor* ♀ S.		
1162	" *Drègei* ♀ S ..	1	—
1163	" *fraudulent.* ♀S		
1164	" *impressif.* ♀ S		
1165	" *scoparius* ♀ S		
1166	" *scrobifrons* ♀S		
1167	" *tutulus*.....		
1168	*Trachyphloeus brevis* ♀ S	—	6
1169	" *spathulatus* ♀S	—	8
1170	" *squamifer* ♀ S		8
1171	" *subcanalic.* ♀S		
1172	*Perrelus squamulatus* ♀S	—	8
1173	" *subfasciatus* ♀S		
1174	*Ellimenistes bidentat.* ✥ ♀S		
1175	" *camelus* ♀ S .		6
1176	" *clitellarius* ♀S		
1177	" *glaber* ♀ S ..		
1178	" *inaffectatus* ♀S	—	4
1179	" *plebejus* ♀ S .		
1180	" *pulvinatic.* ♀ S		
1181	" *seriehispid.* ♀S		
1182	" *squamifer* ♀ S	—	8
1183	" *trivialis* ♀ S.		
1184	*Holeorhinus albiceratus* ♀S		
1185	" *albicinctus* ♀ S	3	—
1186	*Phlyctinus albo-mixtus* ♀S	2	—
1187	" *callosus* S.....	1	—
1188	" *egenus* ♀ S...		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1189	*Phlyctinus inaequalis* ♀ S		
1190	" *metallescens* ♀S		
1191	" *murinus* ♀ S..	2	—
1192	*Oosomus pauper* ♀ S....		
1193	" *varius* ♀ S.....		
1194	*Sciobius aciculatifrons* ♀S	2	—
1195	" *bi-strigicollis* ♀S	2	—
1196	" *brevis* ♀ S.....		
1197	" *brunipes*. C.....		
1198	" *deplanatus* ♀ S..		
1199	" *dorsalis* ♀ S....	1	8
1200	" *fallax* ♀ S.....	2	—
1201	" *granipennis* ♀ S.	1	—
1202	" *impressicollis* ♀S	—	12
1203	" *lateralis* ♀ S....		
1204	" *muricatus* ♀ S...	2	8
1205	" *rusticus* ♀ S....		
1206	" *squamulans* ♀ S.		
1207	" *squamulosus* ♀ S		
1208	" *suturalis* ♀ S...	1	
1209	" *varius* ♀ S.....		
1210	*Eremnus aciculaticollis* ♀S		
1211	" *adspersus* ♀ S...		
1212	" *canaliculatus* ♀ S		
1213	" *exaratus* S.....	1	—
687	" *gyrosicollis* ♀ S.	—	12
1214	" *gyrosifrons* ♀ S.		
1215	" *passerinus* ♀ S..		
1216	" *pilosus* ♀ S.....		
1217	" *rugicollis* C.....		
1218	" *setifer* ♀ S.....		
1219	" *strigifrons* ♀ S..	2	—
1220	*Cecrastes lineatus* ♀ S		
1221	*Cyclomus simus*. W.....		
1222	*Lyxus adspersus*.....		
1223	" *alboguttatus*.....		
1224	" *canaliculatus* ♀ S.	1	8
1225	" *caffer*. Sp.....	1	—
1226	" *carinirostris* ♀ S..	2	—
1227	" *discolor*.....		
1228	" *Drègei* ♀ S.....		
1229	" *flavicornis* ♀ S....		
1230	" *haereus*.....	—	8
685	" *lividus*. F.....	2	—
1231	" *ragicollis*. K.....	1	—
1232	" *spectabilis*.....		
1233	" *teretiusculus*.....	1	—
1234	*Larinus hirsutus* ♀ S....		
1235	" *pilosellus* ♀ S...		
1236	" *aequalidus*.....	—	12
686	*Nerthops guttatus* O.....	2	—
1237	" *multiguttatus* W		
1238	*Erirhinus inquinatus* ♀ S		
1239	" *tessellatus* ♀ S		
1240	*Catomismus Drègei* ♀ S	3	—
1141	*Derelomus costulis* ♀ S..		
1242	" *longuidus*.....	—	6
1243	" *pallidus* ♀ S..		
1244	*Antliarhinus coriaceus* ♀S	2	—
1245	" *Drègei* ♀ S.	1	8
1246	" *rectirost.* ♀S		
1247	" *signatus* ♀ S	1	—
1248	" *Zamiae*. T..	1	—
1249	*Platymerus Eckloni* ♀ S..	4	—
1250	" *Germari* ♀ S.	1	—
1251	" *Lehmanni* ♀ S	1	—
1252	" *Zeyheri* ♀ S..		
1253	*Balaninus alhovarius* ♀ S		
1254	" *apicalis* ♀ S..	1	8
1255	" *capensis*. C....		
1256	" *hispidus* ♀ S..		
1257	" *inquinatus*.....		
1258	" *murinus* ♀ S..	—	12
1259	" *setulosus* ♀ S.		
1260	" *sparsus* ♀ S...		
1261	" *strigirostris* ♀S		
1262	" *suturalis*.....	1	—
1263	" *suturifer* ♀ S.		
1264	*Megarhinus costalis* ♀ S.		
1265	*Corysomerus lepidus* ♀ S		
1266	*Tychius squalidus*.....	—	8
1267	*Colabus scalptus* ♀ S.	2	—
1268	*Sibynes cervinus* ♀ S....	—	8
1269	" *concinnus* ♀ S...		
1270	" *fulvirostris* ♀ S..		
1271	" *luteicornis*.....	1	8
1272	" *punctirostris*.....		
1273	" *sublineatus* ♀ S.	—	12
1274	" *suturellus* ♀ S..		
1275	*Thamnobius Drègei* ♀ S		
1276	" *Thoreyi* ♀ S.	2	—
1277	*Acallopistus guttatus* ♀ S		
1278	" *tibialis* ♀ S.		
1279	" ♀ S.....		
1280	*Orchestes melancholicus* ♀S		
1281	*Tanyrhynchus affaber* ♀ S		
1282	" *carinatus* ♀ S		
1283	" *inflatus* ♀ S.		
1284	" *pulvinatus* ♀S		
1285	" *pulverulentus*		
1286	" *suturalis* ♀ S		
1287	*Alcides armatus* ♀ S.....	4	—
1288	" *brevirostris* D ...	4	—
1289	" *haemopterus*.....	1	8
1290	" *laniger*.....		
1291	" *rufus*.....	—	12
1292	" *sparsus* ♀ S....		
1293	" *stigmaticus* ♀ S.		
1294	*Baridius ubrupte-lineat.* ♀S		
1295	" *aciculaticollis* ...	—	12
1296	" *atro-coeruleus* ♀S		
1297	" *caffer* ♀ S.....	2	8
1298	" *dorsalis* ♀ S....		
1299	" *impositus* ♀ S...		
1300	" *marginicollis*....	1	8
1301	" *opacus* ♀ S.....		
1302	" *scotinus* ♀ S....	—	8
1303	" *subaignatus* ♀ S.		
1304	" *teter* ♀ S.....		
1305	*Pachyonyx affaber* ♀ S	2	8
1306	*Cryptorhynchus crudus* ♀S		
1307	" *eminente punct.* ♀S		
1308	" *impexus*.....		
1309	*Ithyporus bicornis* ♀ S...		
1310	" *capensis* D	2	—
1311	*Camptorhinus ephippig.* ♀S		
1312	*Ceutorhynchus Celastri* ♀S	1	—
1313	" *echinatus* ♀S	2	—
1314	" *erythrorh* C.		
1315	" *frontalis* ♀ S	3	—
1316	" *Rhusii* ♀ S.		
1317	" *serictub.* ♀ S		
1318	" *setiferus* ♀ S		
1319	" ♀ S.....		
679	*Eccoptus Camelus* K.....	2	—
1320	*Cleogonus cinctus* ♀ S...		
1321	*Oclandius asserculaticollis*.		
1322	" *cinctus* ♀ S.....	2	—
1323	" *costicollis*.....		
1324	" *lacunatus*.....		
1325	" *pertusus*.....		
1326	" *senilis* K.....	2	—
1327	" *subcarinatus*.....		
1328	*Cionus hiatrio* ♀ S.....	1	8
1329	" *meticulosus* Sp...	—	8
1330	" *moestus* ♀ S....	3	—
1331	*Pylarus signatus* ♀ S		
1332	*Gymnaetron capensis*.....		
1333	" *hirsutus* ♀ S..	2	—
1334	" *plebejus* ♀ S..		
1335	*Nanodes armatus* ♀ S....		
1336	*Prionopus serratorius* ♀ S		
1337	*Rhynchophorus Drègei* ♀S		
1338	" *granarius* ...	—	2
1339	" *Oryzae*.....	—	4
1340	" *sculpturat.* ♀S	2	—
1341	*Rhynchophorus Zamiae* ♀S		
1342	*Conoderes albidulus*.....		
1343	*Phoenomerus Schoenherri* ♀ Drège	3	—
668	*Amophocerus rufipes* ♀ S.	2	—
1344	" *Talpa* S.....		
1345	" *Zamiae* ♀ S.		
1346	*Cossonus glabricollis* ♀ S	—	12
1347	" *suturalis* ♀ S ..	1	8
1348	*Rhyncolus trivialis*.....		
1349	*Phagophloeus ebenius* ♀S	—	8
1350	" *ferrugineus* ♀S	2	—
1351	*Campylirhynchus sparsetosus* ♀ S		
1352	*Campyloscelus helovol.* ♀S		
1353	*Catamonus affaber* ♀ S		
1354	" *albo-sparsus* ♀S		
1355	*Cryptorhinus caudex* ♀ S.		
1356	*Blattocerus melanchol.* ♀S		
1357	" *obliquatus* ♀ S		
1358	*Geotragus incequalis* ♀S		
1359	*Hypsomus Lembunculus*...		
1360	*Pedetes vestitus* ♀ S.		
1361	*Peleropus apicalis* ♀ S ..		
1362	*Proscades cinctus* ♀ S		
1363	*Pycnoporus albisignum* ♀S		
1364	*Tetrapopus hottentott.* ♀S		

Xylophages.

694	*Dendrophtorus capensis* ♀ D	—	8
695	*Bostrichus xanthopus* ♀ D	—	12
699	*Apate morbillosa* ♀ D ...	4	—
700	" *uxtulata* ♀ D.....	2	—
701	*Latridius capensis* ♀ D..	2	—
703	*Rhyzophagus capensis* ♀ D	1	—
704	" *rufulus* ♀ D.	—	12
705	*Bothrideres foveicollis* D..	4	—
707	*Silvanus angustatus* ♀ D.	1	—
708	*Laemophloeus lateritus* ♀D	1	8

Capricornes.

709	*Macrotoma Natala* ♀ D..	8	—
710	*Erioderus lanuginosus* ♀D	8	—
712	*Litopus facetus* ♀ D.. ..	6	—
713	*Callichroma latipes* F.. .	2	—
714	*Cloniocerus hystrix* F. ..	4	—
715	*Ceroplesis aethiops* F....	—	8
716	" *caffra* D.....	1	—
717	" *capensis* F	2	—
1365	" *cruentata* ♀ D.	4	—
720	" *ferrugator* F...	3	—
722	" *hottentota* F...	—	8
721	*Tragocephala formosa* O..	1	8
723	*Zographus oculator* F....	1	8
1366	*Phryneta spinator* F	2	—
724	*Phrissoma denticulatum* ♀D	10	—
719	" *echinator* ♀ K.		
726	*Amblesthis alutaceus* ♀ D	4	—
727	*Alphitopola cana* ♀ D ...	2	—
728	*Evethis pusilla* ♀ D.....	10	—
729	*Polyzonus calvicornis* F..	1	8
731	" *scalaris* ♀ D'.	2	—
732	*Closteromerus cyanipenn.* ♀D	4	—
733	" *violaceus* ♀ D.	4	—
736	" *sexpunctatus* F	1	8
737	" *laetus* K.....	2	—
734	*Promeces femoratus* ♀ D.	6	—
735	" *viridis* ♀ D.....	2	—
738	*Hesperophanes bimacultat.* F	3	—
678	*Clytus vicinus* D	1	—

Chrysomelines.

741	*Lema azurea* ♀ D.....	3	—
742	" *cholcoptera* ♀ D ...		
739	" *Drègei* ♀ D	1	
743	" *laterita* ♀ D.....	3	—
744	" *nigropunctata* ♀ D.	3	—
745	" *puncticollis* ♀ D	1	8
740	" *rufipennis* D.....	1	8
746	" *sanguinicollis* ♀ D.		
747	" *viridiaenea* ♀ D ..		

Hemiptera.

1367	*Scutellera Drègei* ♀ Ger..	4	—
1368	*Tetyra acaroides* T.....		4
1369	" *aulica* Ger.....		
1370	" *carinata*. Ger....		
1371	" *impluviata* Ger...		12
1372	" *multipunctata*. T.		12
1373	" 4 *notata*. Ger....		
1374	" *rufibabris*. Ger....		12
1375	" *Schestedtii* F....	1	—
1376	" *silphoides* T....		
1377	" *simplex* Ger.....		
1378	" *tigrina* St.....		6
1379	" *Zonata*. Ger.....		
1380 — 1382	♀ Ger.....		
1383	*Edessa papillosa*.....		4
1384	*Pentatoma aberrans* Ger..		10
1385	" *acinarum*. Ger..		8
1386	" *annulipes*. Ger..		6
1387	" *bicinctum*. Ger..		1
1388	" *cervinum*. Ger..		12
1389	" *conjungens*. Ger.		12
1390	" *costale* Ger.		1
1391	" *debellatur* F....		
1392	" *erythrocer*. Ger.		2
1393	" *fimbriatum*. T..		8
1394	" *frondosum* Ger..		12
1395	" *hastatum* F....		1
1396	" *hebraicum* Ger..		10
1397	" *insulidum*. Ger.		12
1398	" *leprosum* Ger...		1
1399	" *leucograma*. Ger.		12
1400	" *limatum* Ger...		1
1401	" *longulum* Ger..		1
1402	" *loriventre* Ger..		12
1403	" *modestum* F....		
1404	" *moestum* Ger...		12
1405	" *musivum* Ger...		
1406	" *obaipatum* Ger..		10
1407	" *pallescens* Ger..		
1408	" *planum* F.....		
1409	" *plinthacrus* W..		10
1410	" *pugnax* Ger....		12
1411	" *rafiventre* Ger..		12
1412	" *sparsum* ♀ Ger.		1
1413	" *tomentivent.* Ger.		1
1414	" *trisignatum* Ger.		8
1415	" *varicorne* Ger...		10
1416	" *ventrale* Ger...		12
1417	" *viridissim.* Wo..		1
1418 — 1457	♀ Ger.....		
1458	*Cydnus albivittis* Ger. ...		
1459	" *hians* Ger.....		
1460	" *hirtus* T.....		12
1461	" *leucostigma* Ger .		12
1462 — 1464	♀ Ger.....		
1465. 1466	*Aelia* ♀ Ger.....		
1467	*Coreus elevator* F.....		1
1468	" *fasciculatus* F....		1
1469	" *fulcratus* Ger.....		1
1470	" *insubidus* Ger.....		
1471	" *paradoxus* F		8
1472	" *pectoralis* Ger.		6
1473	" *pugnator* F.....		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nr.	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1474	*Coreus punctiventris* W..	—	6
1475	" *remex* Ger.....	1	8
1476	" *valgus* F	—	8
1477—1502	♀ Ger.....		
1503	❖ ♀ Ger.....		
1504	*Lygaeus albicollis* St.....	—	12
1505	" *albostriatus* F...	—	10
1506	" *amictus* Ger.....	1	—
1507	" *annulipes* Ger....	—	12
1508	" *apterus* F		
1509	" *carnifex* F	—	4
1510	" *clavimanus* F....	—	4
1511	" *contaminatus* Ger.	2	—
1512	" *crudelis* F.....	—	4
1513	" *elegans* Wo.....	—	4
1514	" *famelicus* F	—	4
1515	" *Forsteri* F.....	—	4
1516	" *hasticornis* T....		
1517	" *melanurus* Ger....	1	—
1518	" *rivularis* Ger.....	—	8
1519	" *rufiventris* Ger...	1	—
1520	" *septus* Ger.....		
1521—1535	♀ Ger.....		
1536	*Ophthalmicus* ♀ Ger.....		
1537—1541	*Ropalus* ♀ Ger....		
1542	*Heterogaster* ♀ Ger.....		
1543	*Pyrrhocoris tetraspilus* Ger.		
1544—1549	♀ Ger.....		
1550	*Capsus* ♀ Ger.....		
1551	*Alydus cinctiventris* Ger..		
1552	" *dentipes* F	1	—
1553	" *flavilinea* St.....	1	—
1554—1556	♀ Ger.....		
1557—1574	*Miris* ♀ Ger.....		
1575	*Leptocorisa* ♀ Ger.....		
1576	*Hydrometra* ♀ Ger.....		
1577	*Gerris* ♀ Ger.....		
1578	*Velia* ♀ Ger.....		
1579	*Reduvius calviventris* Ger.	1	—
1580	" *capsiformis* Ger.	1	8
1581	" *erythrocn.* Ger..	—	12
1582	" *geniculat.* Ger..		
1583	" *lythrodes* Ger...		
1584	" *musivus* Ger...	—	8
1585	" *pallidivent.* Ger.	—	12
1586	" *segmentar.* Ger.	1	—
1587—1605	♀ Ger.....		
1606	*Nabis armipes* Ger.....	2	—
1607	" *balteatus* Ger.....	1	8
1608	" *bidentula* Ger.....	—	12
1609	" *cruciatus* St.	—	12
1610	" *pallescens* Ger.....	1	—
1611—1614	♀ Ger.....		
1615	*Zelus 5 spinosus* F.....		
1616. 1617	♀ Ger.....		
1618. 1619	*Tingis* ♀ Ger.....		
1620	*Aradus furcatus* Ger.....	—	4
1621	" *hystrix* Ger	1	8
1622	" *lobatus* Ger.....	—	12
1623	" *membranaceus* F..	—	4
1624	" *morio* Ger.	—	6
1625	" ♀ Ger.....		
1626	*Salda* ♀ Ger.....		
1627	*Galgulus grandicollis* Ger.		
1628	*Naucoris* ♀ Ger.....		
1629	*Belostoma* ♀ Ger.....		
1630	*Nepa* ♀ Ger.....		
1631	*Ranatra* ♀ Ger.....		
1632	❖ ♀ Ger.....		

Homoptera.

1633	*Cicada diaphana* Ger....	1	—
1634	" *hirtipennis* Ger...	—	12
1635	" *lutea* O.....	1	—
1636	" *maculipennis* Ger.	2	—
1637	" *nebulosa* O.....	1	—
1638	" *phalerata* Ger....	2	—
1639	" *plumosa* Ger.....	—	12
1640	" *rufipennis* ♀ Ger.	3	—
1641	" *semiclara* Ger....		
1642	" *semicostata* ♀ Ger.	1	—
1643	" *signifera* Ger....	1	8
1644	" *tabaniformis* Ger.	1	—
1645	" *villosa* F.....		
1646—1651	" ♀ Ger.....		
1652	*Fulgora punctata* St.....	5	—
1653	❖ ♀ Ger.....		
1654	*Dictyophara* ♀ Ger.....		
1655—1657	*Flata* ♀ Ger.....		
1658—1660	*Poecilloptera* ♀ Ger.		
1661	*Ricania albizona* Ger.....	1	8
1662	" *cimicoides* Ger...	1	—
1663. 1664	*Tettigometra* ♀ Ger.		
1665	❖ ♀ Ger.....		
1666	*Centrotus brunnipennis* Ger.	2	—
1667	" *furcicornis* Ger.	2	—
1668	" *fuscipennis* Ger.	2	—
1669	" *nodicornis* Ger..	1	—
1670. 1671	" ♀ Ger.....		
1672	*Cercopis anaiis* F	—	8
1673	" *areata* Ger.....	1	—
1674	" *arithmetica* Ger..	—	8
1675	" *phoenicopter.* Ger.	—	12
1676	" *sanguinipes* Ger.	1	—
1677—1680	" ♀ Ger.....		
1681	*Aphrophora albilatera* Ger.	—	8
1682	" *fusca* Ger....	1	—
1683	" *obscura* F...	—	12
1684	" *terrena* Ger..	—	12
1685	*Ledra* ♀ Ger.....		
1686	❖ ♀ Ger		
1687	*Bythoscopus* ♀ Ger.....		
1688—1693	*Jassus* ♀ Ger.....		
1694	*Acucephalus* ♀ Ger.....		


Lepidoptera.

1696	*Papilio Demoleus* L.....	2	—
1697	" *dissimilis* L.....		
1698	" *Nireus* Cr.....	3	—
1699	*Pieris Hellica* Hüb.....	—	8
1700	" *Severina* Cr.		
1701	*Anthocharis Danae* F....		
1702	*Xanthidia pulchella* Bd...		
1703	*Colias Electra* L.....	1	—
1704	*Lycaena Boeticus* L.	1	8
1705	" *lysimon* F	2	—
1706	" *messapus* God...		
1707	" *telicanus* Hüb....	1	8
1708	*Limenitis melicerta* Cr....		
1709	*Nymphalis veranes* Cr....		
1710	*Acraea boschmana* ♀ Bd..	10	—
1711	" *horta* L.....	1	—
1712	" *punctata* Bd.....		
1713	*Danais Chrysippus* L	2	—
1714	*Vanessa archesia* Cr.		
1715	" *Cardui* L.....	—	8
1716	" *Clelia* F.....	2	—
1717	" *Cloantha* Cr.....		
1718	" *Octavia* Cr.....	10	—
1719	*Hypanis auvatara*.....	5	—
1720	" *illithya* F.....	4	—
1721	*Eurytela hiarba* Dr.....		
1722	*Satyrus Cassius* God.	2	—
1723	" *Clytus* L.....	1	—
1724	" *Dregei* ♀ Bd.....		
1725	" *Gambius* Bd.....		
1726	" *hyperbius* God....	4	—
1727	*Loxura alcides* F.....		
1728	*Zerithia palmus* Cr.....	1	8
1729	" *perion* Cr.....	2	—
1730	" *thero* L	2	—
1731	" *thyra* L.....		
1732	" *thysbe* L	1	8
1733	*Hesperia caffra* Lac		
1734	" *Dregei* ♀ Bd		
1735	" *namaqua* Lac.....		
1736	" *vindex* Cr.....		
1737—1740	" ♀ Bd.....		
1741	*Sirychtus malvicola* ♀ Bd.		
1742	" *sidarum* ♀ Bd..		
1743	*Steropes metis* Cr.	1	8
1744	*Thanos aethiopica* Bd. ...		
1745	*Sesia andrenaepennis* Bd..	2	—
1746	" *bibionipennis* ♀ Bd		
1747	*Macroglossa Tityrus* K ..	3	—
1748. 1749	" ♀ Bd.....		
1750	*Pterogon troglodytes* Bd..		
1751	*Spinx convolvuli* L		
1752	*Deilephila capensis* F	1	8
1753	" *Oldenlandiae* F		
1754	*Brachyglossa Atropos* L..	1	—
1755	*Zygena Dregei* ♀ Bd.....	4	—
1756	" ♀ Bd		
1757	*Syntomis Cerbera* L.....	1	—
1758—1761	" ♀ Bd.....		
1762	*Glaucopis formosa* Bd.....	6	—
1763	" *madagascariensis*		
1764	*Procris myodes* ♀ Bd.....		
1765	" *nebulosa* K.....	1	—
1766	*Lithosia fumeola* Bd.....		
1767	" *praeusta* Bd.		
1768	*Chelonia dorsalis* ♀ Bd...		
1769	" *dorsata* Bd.....	2	—
1770. 1771	" ♀ Bd.....		
1772	*Liparis flavipalpis* Bd.....		
1773	*Lasiocampa lineosa*.....		
1774	" *Pitys* Bd.....		
1775	*Bombyx boschmana* Bd....	5	—
1776	" *patens* Bd.....		
1777	" *suasa* Bd.		
1778. 1779	" ♀ Bd.....		
1780	*Zagaris meteus* Cr.	1	—
1781	" *rubrinervis* Bd....	3	—
1782. 1783	*Zagaris* ♀ Bd.....		
1784	*Saturnia appolonica* Cr...	8	—
1785	" *capensis* F.....	2	—
1786	*Saturnia natali* Bd.	10	—
1787. 1788	" ♀ Bd.....		
1789	*Zeuzera scalaris* Don.	3	—
1790	*Hepiolus libania* Cr.....		
1791	*Limacodes* ♀ Bd.....		
1792—1801	*Tortrix* ♀ Bd.....		
1802	*Agrotis latens* Hüb.		
1803	" *radicum* Bd.....	1	—
1804	" *segetum* L.....	—	8
1805	" *suffusa* F.....	—	8
1806	" *valligera*.....		
1807	" *virescens* Bd.....		
1808—1811	" ♀ Bd.....		
1812. 1813	*Apamea* ♀ Bd		
1814	*Caradrina* ♀ Bd.....		
1815. 1816	*Leucania* ♀ Bd.....		
1817	*Nonagria* ♀ Bd.....		
1818	*Xylina putrida* Bd.....		
1819	" ♀ Bd.....		
1820	*Abrostola triplasia* Bd....		
1821	*Plusia chrysodon* Bd.....	1	8
1822	" *Ypsilon* Bd.....	1	—
1823	*Heliothis armigera* Hüb..		
1824	" *peltigera* Hüb..		
1825	*Acontia sabuleti* Bd.		
1826	*Ophiusa algira* F.....		
1827	" *parallelaris* F ...		
1828	" *repanda*.....		
1829	" *rubricans* Bd.....		
1830	" *tirrhaea* F	5	—
1831	" *Zabulon* Bd.....		
1832—1834	" ♀ Bd.....		
1835	*Homoptera* ♀ Bd.....		
1836. 1837	*Anthophila* Bd.....		
1838	*Erastria dimidiata* Bd....	1	—
1839	*Agarista decora* F.....	—	12
1840	" *lectrix* L.....	2	—
1841	*Geometra arvaria* Bd.....		
1842	" *cafraria* Bd.....		
1843	" *chloropennaria* Bd.	1	—
1844	" *elutata* F		
1845	" *goniaria* Bd.....		
1846	" *haemataria* Bd....		
1847	" *murinaria* Hüb. ..	1	—
1848	" *pelargonaria* Bd..		
1849	" *sacraria* Hüb.....	—	8
1850	" *trofonia*		
1851—1870	" ♀ Bd.....		
1871	*Fidonia caparia* Bd.....	1	—
1872	" ♀ Bd.....		
1873	*Ctenica copensis* Bd.....		
1874	*Botys farinalis* L.....	—	8
1875	" *forficalis* Hüb.....	—	12
1876	" *hybridalis*.....		
1877—1906	" ♀ Bd		
1907	*Herminia capalis* ♀ Bd...		
1908	" *rostralis* F. ...		
1909—1925	*Crambus* ♀ Bd....		
1926	*Tinea vitella* Bd.....		
1927	" *xanthella* Bd	1	—
1928—1955	♀ Bd.....		
1956	*Yponomente* ♀ Bd.....		
1957	*Adela Dregella* ♀ Bd.....	8	—
1958—1965	*Ptrophorus* ♀ Bd...		
1966	*Orneodes* ♀ Bd.....		

Erklärung der Zeichen.

❖ *nov. genus.*
♀ *nov. species*
B. Bohemann.
Bd. Boisduval.
C. Chevrolat.
Cr. Cramer.
D. Dejean.
Don. Donovan.
Dr. Drury.
F. Fabricius.
G. Gyllenhal.
Ger. Germar.
God. Godart.
H. Herbst.
Ho. Hope.
Hüb. Hubner.
I. Illiger.
K. Klug.
L. Linnée.
Lac. Lacordaire
O. Olivier.
S. Schoenherr.
Sp. Sparrmann.
St. Stoll.
T. Thunberg.
W. Wiedeman.
Wo. Wolff.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Chinesische Insecten (100)

	Rthlr	Sgr.
Cicindela chinensis	—	8
Duponti	—	6
Trechalus limbatus	—	6
similis	—	6
Chrysochroa vittata	1	—
Gymnopleurus sinuatus	—	6
Copris bucephalus	1	—
molossus	—	8
ursus	—	6
Scarabaeus Promedon ♂	—	12
♀	—	8
Euchlora chrysea	—	6
resplendens	—	8
viridis	—	3
Anomala laevicollis	—	6
subsulcatus	—	10
Tetragona chinensis	2	—
Popilia viridicoerulea	—	8
Mylabris 5 dae	—	12
Calandra longipes	1.	4.
Cerambyx squamosa	—	4
Sagra purpurea	—	8
Lamia punctata	—	12
Pogonia lutea	1	—
Blatta latissima	—	4
Halys tullo	—	6
Coreus tenebrosus	—	3
meleagris	—	6.

Hamburg 24 Aug 35

(101)

Herr !

Hr Hofrath. unsern Zweifel südafrikanischen
Falter die wir diesen Frühl, den Herren
der Naturforscher, Bonn, besuchen werden,
diesen Insekten mit Aufmerksamkeit dort
zu untersuchen. —
zu unserm neuen Geschäfte genauest.
dass ihr mir den Rabatt geben könnt.
oben noch eins zur 9. Conchyl. nehmen.
ich habe die Ehre zu sein

Ihr Hofrath
ergebenster Diener
C. A. Drège.

Drège..			1	8	225	527	"	scenicus D.....	6
D.....					226	528	Anthicus	albitarsis D.....	8
f.....			—	4	227	529	"	coeruleus T.....	8
lis F.....			—	2	228	530	"	dorsalis D.....	2
			—	4	229	531	"	4 signatus D.....	3
			—	2	230	532	"	rubricollis D.....	4
			—	4	231	533	"	transversalis D.....	8
F.....			—	2	232	534	Ripiphorus	flabellatus F.....	4
F.....			—	2	233	535	Mordella	basalis D.....	8
					234	536	"	confusa D.....	8
						537	"	diffinis D.....	1
						538	Anaspis	nigricans D.....	4
									4
								Vesicants.	
						539	Meloe	capensis D.....	2
						540	Synamma	amoena D.....	8
						541	"	sinuata D.....	8
						542	Dices	decoratus D.....	8
						543	Decatoma	africanum O.....	12
						544	"	decipiens D.....	12
						545	"	fasciolatum D.....	12
						546	"	histrio D.....	12
						547	"	lunatum F.....	8
						548	"	nigricorne D.....	3
						549	"	4 guttatum Bilberg	12
						550	"	vicinum D.....	10
						551	Mylabris	bisotata D.....	6
						552	"	capensis F.....	4
						553	"	connexa D.....	2
						554	"	Drègei D.....	1
						555	"	Groendali Bilberg.	1
						556	"	Lavaterae F.....	8
						557	"	lusca D.....	8

633	"		
639	"		
640	Microcera		
641	"		
642	Hipporhin		
643	"		
644	"		
645	"		
646	"		
647	"		
648	"		
649	"		
650	"		
651	"		
652	"		
653	"		
654	"		
655	"		
656	"		
657	"		
658	"		
659	"		
660	"		
661	"		
662	"		
663	"		
664	Prynnus		
665	Stronhuso		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pieris atrata		12
	maculata	10
	philaemata	8
Fulgora candelaria		10
Cerropis victima		10
Papilio Agamemnon	1	—
	Crino	1 —
	pammon	8
	panope	1 —
	polytes	8
	Xuthus	10
Dadama bolina	2	—
Peris porsenna		8
Anthocharis pirene		6
Rhodocera flovella		6
Xanthidia hecabe		4
Limenitis leucothoe		6
Danais genutia		17
	limniace	12
Euploea alcithoe		8
	Chinensis	12
	niavia	1 —
Vanessa Aonis		4
	asteria	4
	Cenone	4
	Crithia	4.
Saturnia Atlas	2	—

Von dieser Zucht sind 2 männliche Exemplare Morgenfrisch und die folgenden nur kleine Raupen gegeben.

Der Coll. Ducaten ein Zuwachs 9. Couleur zusammen

C. T. Drege.

Herrn Senator von Heyden
in Frankfurt a/Main.

Hamburg 24 Aug 35

101

Hochgeehrter Herr!

Eingeschlossen die Übergabe auf Ihr Mscpt. meiner Beiträge zur dasselbigen Fauna-Coleoptera. Da ich selbst bei Ihnen diesen Herbst, den Herrn aufgelegenen Mscpt. Sammlungs Ort der Naturforscher, Bonn, besuchen werde, so werde ich mir gegebene Bitten, diesen Gegenst mit Ihnen durch zu Sprechen der Entomologie zu nutzbringen. —
Auch die Lamiae sind diesjahr unseren neuen Preisliste gemäss.
Die Preise sind so gerechnet dass ich wieder Ihnen Rabatt geben kann.
Den Holl. Decaten werde ich aber wieder wie vor 9. Conto rechnen.
Mit der grössten Hochachtung habe die Ehre zu sein

Ihr Mscpt
ergebenster Diener
C. A. Dr[illegible]ge.

45	"	lenis J.	—	5						225	527	"	secalcus D.	—	6	633	"
46	"		—	5						226	528	Anthicus	albitarsis D.	—	8	639	"
47	Harpalus	Dregei D	—	4			*Teredilites.*			227	529	"	coeruleus T.	—	2	640	Microcera
48	"	suscipennis W	—	8	139	Trichodes	Dejeani Drege.	1	8	228	530	"	dorsalis D.	—	3	641	"
49	"	impunctus W	—	2		"	aulicus D.			229	531	"	4 signatus D.	—	4	642	Hipporhiu
50	"	viaticus D	—	10	140	Notosteuus	viridis T.	—	4	230	532	"	ruficollis D.	—	8	643	"
51	"	minor D	—	10	141	Corynetes	abdominalis F.	—	2	231	533	"	transversalis D.	—	4	644	"
52	Geobaenus	lateralis J	—	3	142	"	ruficollis F.	—	4	232	534	Ripiphorus	flabellatus F.	—	8		
53	Tetragonoderus	biguttatus T.	—	6	143	"	rufipes F	—	2	233	535	Mordella	basalis D.	—	8	645	"
					144	Anobium	paniceum F.	—	2	234	536	"	confusa D.	1		646	"
											537	"	diffinis D.	—	4	647	"
											538	Anaspis	nigricans D.	—	4	648	"
																649	"
													Vesicants.				
											539	Meloe	capensis D.	2	8	650	"
											540	Synamma	amoena D.	—	8	651	"
											541	"	signata D.	—	8	652	"
											542	Dices	decoratus D.	—	12	653	"
											543	Decatoma	africanum O.	—	12	654	"
											544	"	decipiens D.	—	12		
											545	"	fasciolatum D.	—	12	655	"
											546	"	histrio D.	—	8		
											547	"	lunatum F.	—	3	656	"
											548	"	nigricorne D.	—	12	657	"
											549	"	4 guttatum Bilberg	—	10	658	"
											550	"	vicinum D.	—	6	659	"
											551	Mylabris	binotata D.	—	4	660	"
											552	"	capensis F.	—	2	661	"
											553	"	connexa D.	1		662	"
											554	"	Dregei D.	1			
											555	"	Groendali Bilberg.	—	8	663	"
											556	"	Lavaterae F.	—	8	664	Prypnus
											557	"	lusca D.	—	12	665	Strophosom

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

102

Preis-Ve

von C. Fr. Drège

und in Hamburg

Vierte Li

Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
COLEOPTERA.		
Pentamera.		
Carabicines.		
anticera maxillosa F	1	8
cindela chrysographa K	—	12
" clathrata D	—	5
" Drègei D	1	4
" lurida F	1	6
" marginella D	1	—
" rotundicollis D	1	—
chomenus luridicollis D	1	—
lleida angustata D	1	—
bia Drègei D	1	8
capensis D	—	8
achinus armiger K	—	4
" Halteri D	2	—
rreopterus flavosignatus D	1	8
dinoe 4 guttata C	1	8
epdera pestica D	1	8
ascopus affinis Westerman	—	12
phipterus cicindeloides F	—	12
" incanus K	—	8
" trilineatus F	—	6
hia biguttata. Bonelli	1	6
cinctipennis Dupont	2	—
10 guttata F	—	6
" var.	—	6
hia Drègei D	2	—
gracilis D	2	8
macilenta O	1	8
maxillosa F	1	4
sexnotata S	2	—
tabida F	—	6
thoracica F	1	4
villosa T	2	—
ites capicola D	1	—
laevis D	1	—
rugosus W	1	—
Drègei D	1	8
soma rugosum d. G	—	6
aphrou suturalis. Guerin.	—	4
cenius amictus J	—	6
" quadricolor F	—	6
odes rufipes. Bonelli	—	8
ichus caffer J	—	4
cymindoides D	—	6
thamenus femoratus D	—	6
" flavipes D	—	8
nis caffra D	—	4
" lenis J	—	5
Harpalus Drègei D	—	4
" fuscipennis W	—	8
" impunctus W	—	2
" viaticus D	—	10
" minor D	—	10
Geobaenus lateralis J	—	3
Tetragonoderus biguttatus T.	—	6

M	Das Stück in Hamb. Cour	℔	ß
90	Agrilus chalcoventris D	—	1
91	" elongatulus K	—	4
92	" falcatus K	—	4
93	" ferrugineoguttatus H	—	12
94	" impetiginosus D	1	—
95	" metallasceus D	—	12
96	" metallicus D	—	12
97	" " var. D	—	8
98	Trachys capensis D	—	12
99	Agrypnus infacetus D	—	12
100	Cardiotarsus capensis D	1	—
101	Cardiophorus erythrogaster D	—	8
102	" Klugii D	—	8
103	" var D	—	8
104	Ampedus gaura D	—	10
105	" pacificus D	—	8
106	Ludius sericans D	—	12
	Melacodermes.		
107	Lycus palliatus F	—	2
108	" rostratus F	—	2
109	Dyctyopterus Drègei D	—	8
110	" ruficollis F	—	8
111	Lampyris capicola D	—	4
112	" hybrida D	—	10
113	Colophotia pygmaea D	—	3
114	Pygolampis Drègei D	—	12
115	Cantharis bivittata F	—	2
116	" capicola D	—	3
117	" nigritarsis D	—	12
118	" rugipennis D	—	4
119	" viridescens F	—	3
120	Silis Drègei D	—	8
121	Malachius anticus D	—	4
122	" dimidiaticollis D	—	8
123	" Drègei D	—	8
124	" immaculicollis D	—	5
125	" janthinipennis D	—	3
126	" marginiventris D	1	—
127	" transversalis D	—	5
128	nov. Gen. viridipennis D	—	6
129	Dasytes capensis D	—	4
130	" erythropus D	1	—
131	" murinus D	—	4
132	" plebejus D	—	6
133	" sobrinus D	1	—
134	" thalassinus D	—	6
135	Melyris interstitialis D	—	3
136	" linearis F	—	2
137	" rufomarginata D	—	4
138	" viridis F	—	1
	Terediles.		
139	Trichodes Dejeani Drège	1	8
	" aulicus D		
140	Notosteuus viridis T	—	4
141	Corynetes abdominalis F	—	2
142	" ruficollis F	—	4
143	" rufipes F	—	2
144	Anobium paniceum F	—	2

M	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
464	Heteroscelis exasperatus D	—	12
465	" intermedius D	—	8
466	" porcatus D	—	10
467	" testudinarius D	—	8
468	Gonopus ventricosus D	—	12
469	Psorodes calcarata F	—	6
470	" tuberculata D	—	8
471	Acanthomera granulata W	1	8
472	Oocotus farctus J	—	8
473	" tardus J	—	8
474	Platynotus capicola D	—	8
475	Eurynotus brunnicornis D	—	8
476	" hottentottus D	1	8
477	" immundus D	1	8
478	" marginicollis D	—	8
479	" morio Buquet	—	4
480	" muricatus Kirby	—	6
481	" nigerrimus D	—	4
482	" ovalis D	—	6
483	" tenebricosus D	1	4
484	" tuberculatus D	—	10
485	Blacodes brunnipes D	—	12
486	" subcarinatus Sturm	—	8
487	Opatrum crenatum F	—	8
488	" micans Eschscholtz	1	—
489	Leicheanum variegatum D	—	2
	Taxicornes.		
490	Phaleria laevigata Schüppel.	—	8
491	Eudophloeus peltoides K	—	6
492	Neomida capensis D	—	4
493	Epilampus capensis D	—	8
494	Oopiestus capensis D	—	8
495	Heterophaga opatroides D	—	4
496	Hypophloeus capensis D	—	4
	Tenebrionites.		
497	Imatismus patruelis D	—	6
498	Toxicum antilope D. m. f	1	—
499	" bubalus D	1	—
	Helopiens.		
500	Stenochia caffra D	1	—
501	" sulcipennis D	—	12
502	Oplocheirus tenebrioides D	1	—
503	Cistela capensis D	—	8
	Trachelides.		
504	Eutrapela bicolor D	—	8
505	" elongata D	—	6
506	" erythrodera D	—	8
507	" gracilis K	—	4
508	" lateralis D	—	8
509	" porrecta F	—	8
510	" trilineata D	—	6
511	" unicolor D	—	3
512	" verticalis D	—	6
513	" vittata J	—	6
514	Lagria amethystina D	—	6
515	" columbina D	—	6
516	" distincta D	—	6
517	" flavipennis D	—	4
518	" foveicollis D	—	6
519	" fuscipennis K	—	8
520	" pubernla D	—	4
521	" vestita D	—	6
522	" villosa F	—	6
523	Monocerus capensis D	—	2
524	" cucullatus D	1	—
525	" litigiosus D	1	—
526	" pilosus D	—	8
527	" senicus D	—	8
528	Anthicus albitarsis D	—	6
529	" coeruleus T	—	8
530	" dorsalis D	—	2
531	" 4 signatus D	—	3
532	" rubricollis D	—	4
533	" transversalis D	—	8
534	Ripiphorus flabellatus F	—	4
535	Mordella basalis D	—	8
536	" confusa D	1	—
537	" diffinis D	—	4
538	Anaspis nigricans D	—	4
	Vesicants.		
539	Meloe capensis D	2	8
540	Synamma amoena D	—	8
541	" sinuata D	—	8
542	Dices decoratus D	—	12
543	Decatoma africanum O	—	12
544	" decipiens D	—	12
545	" fasciolatum D	—	12
546	" histrio D	—	8
547	" lunatum F	—	3
548	" nigricorne D	—	12
549	" 4 guttatum Bilberg	—	10
550	" vicinum D	—	6
551	Mylabris binotata D	—	4
552	" capensis F	—	2
553	" connexa D	1	—
554	" Drègei D	1	—
555	" Groendali Bilberg	—	8
556	" Lavaterae F	—	8
557	" lusca D	—	12

M	Das Stü	℔	ß
574	Zonitis		
575	"		
576	"		
577	"		
578	"		
579	Nemognat		
580	"		
581	"		
	Tet		
	Cur		
582	Bruchus		
583	"		
584	"		
585	Spermopri		
586	Urodon t		
587	"		
588	Phlocotra		
589	Tropider		
590	"		
591	Anthribu		
592	"		
593	Blaberus		
594	Attelabu		
595	Rhynchit		
596	Apion af		
597	"		
598	" au		
599	" ani		
600	" ru		
601	Tanaus l		
602	Arrhenod		
603	"		
604	Antliarhi		
606	"		
606	"		
607	"		
608	Platymer		
609	"		
610	Episus l		
611	" la		
612	Brachyce		
613	"		
614	"		
615	"		
616	"		
617	"		
618	"		
619	"		
620	"		
621	"		
622	"		
623	"		
624	"		
625	"		
626	"		
627	"		
628	"		
629	"		
630	"		
631	"		
632	"		
633	"		
634	"		
635	"		
636	"		
637	"		
638	"		
639	"		
640	Microceruffr		
641	"		
642	Hipporhinidy		
643	"		
644	"		
645	"		
646	"		
647	"		
648	"		
649	"		
650	"		
651	"		
652	"		
653	"		
654	"		
655	"		
656	"		
657	"		
658	"		
659	"		
660	"		
661	"		
662	"		
663	"		
664	Prypnus		
666	Strophoso		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

102

Preis-Verzeichniß der Insecten

von C. Fr. Drège in Süd-Afrika gesammelt

und in Hamburg für beigesetzte Preise zu beziehen.

Vierte Lieferung. September 1841.

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
	COLEOPTERA.		
	Pentamera.		
	Carabicines.		
	Mauticera maxillosa F.	1	8
	Cicindela chrysographa K.		12
	" clathrata D.		5
	" Drègei D.	1	4
	" lurida F.		6
	" marginella D.	1	
	" rotundicollis D.	1	
	Anchomenus luridicollis D.	1	
	Callida angustata D.	1	
	Cebia Drègei D.	1	8
	" capensis D.		8
	Brachinus armiger K.		4
	" Halteri D.	2	
	Pyrecopterus flavosignatus D	1	8
	Casnoe 4 guttata C.	1	8
	Stapodera pestica D.	1	8
	Catascopus affinis Westerman		12
	Staphipterus cicindeloides F		12
	" incanus K.		8
	" trilineatus F.		6
	Chlaenia biguttata Bonelli.	1	6
	" cinctipennis Dupont.	2	
	" 10 guttata F.		6
	" var.		6
	Chlaenia Drègei D	2	
	" gracilis D.	2	8
	" macilenta O.	1	8
	" maxillosa F.	1	4
	" sexnotata S.	2	
	" tabida F.		6
	" thoracica F.	1	4
	" villosa T.	2	
	Callistes capicola D	1	
	" laevis D	1	
	" rugosus W.	1	
	" Drègei D		8
	Broscoma rugosum d. G.		6
	Sphodron suturalis. Gueria.		4
	Agonum amictus J.		6
	" quadricolor F.		6
	Anchomenus rufipes. Bonelli.		8
	Callida caffer J.		4
	" cymindoides D.		6
	Anchomenus femoratus D.		6
	" flavipes D.		8
	Agonia caffra D.		4
	" laevis J.		5
47	Harpalus Drègei D		4
48	" fuscipennis W.		8
49	" impunctus W.		2
50	" viaticus D.		10
51	" minor D.		10
52	Geobaenus lateralis J.		3
53	Tetragonoderus biguttatus T.		6
	Hydrocanthares.		
54	Trochalus capensis D.		6
55	Hydaticus capicola D.		12
56	" Drègei D.	2	
57	Colymbetes circur D.	1	
58	Cyclous punctulatus D.		3
59	Gyrinus marginatus D.		8
	Sternoxes.		
60	Julodis cirrosa S.	2	
61	" Drègei D.	2	
62	" fascicularis F.		3
63	" " var.	1	
64	" guphalon H.		5
65	" hirta F.		5
66	" lasius H.		5
67	" versicolor D.	1	8
68	Acmaeodera adspersa F.		8
69	" apiata D.	2	
70	" bistrigutttata K.		12
71	" chrysoloma D.	1	
72	" erythroloma D.	2	
73	" gibbosa F.		10
74	" gracilis W.		10
75	" Xanthotaenia W.		6
76	Psilaptera cataphracta D.	1	8
77	" dura D.	2	
78	" loricata D.	3	8
79	" marginipennis D.	3	
80	Dicerca cuprea F.		6
81	Strigoptera bivittata F.	2	
82	Chrysobothris spinimana D.		12
83	Authaxia contempta D.		10
84	" hilaris D.	1	
85	" pauperata D.		8
86	" perplexa D.		6
87	" triangularis D.		10
88	Sphenoptera intermedia D.	1	
89	" urbana D.	1	
90	Agrilus chalcoventris D.	1	
91	" elongatulus K.		4
92	" falcatus K.	1	
93	" ferrugineoguttatus H.		12
94	" impetiginosus D.	1	
95	" metallascens D.		12
96	" metallicus D.		8
97	" " var. D.		12
98	Trachys capensis D.		12
99	Agrypnus infacetus D.	1	
100	Cardiotarsus capensis D.		8
101	Cardiophorus erythrogaster D		8
102	" Klugii D.		8
103	" " var D.		8
104	Ampedus gaura D.		10
105	" pacificus D.		8
106	Ludius sericans D.		12
	Melacodermes.		
107	Lycus palliatus F.		2
108	" rostratus F.		8
109	Dyctyopterus Drègei D.		8
110	" ruficollis F.		8
111	Lampyris capicola D.		4
112	" hybrida D.		10
113	Colophotia pygmaea D.		3
114	Pygolampis Drègei D.		12
115	Cantharis bivittata F.		2
116	" capicola D.		3
117	" nigritarsis D.		12
118	" rugipennis D.		4
119	" viridescens F.		3
120	Sillis Drègei D.		8
121	Malachius anticus D.		4
122	" dimidiaticollis D.		8
123	" Drègei D.		8
124	" immaculicollis D.		5
125	" janthinipennis D.		3
126	" marginiventris D.	1	
127	" transversalis D.		5
128	nov. Gen. viridipennis D.		6
129	Dasytes capensis D.		4
130	" erythropus D.		1
131	" murinus D.		4
132	" plebejus D.		6
133	" sobrinus D.		1
134	" thalassinus D.		6
135	Melyris interstitialis D.		3
136	" lineata F.		2
137	" rufomarginata D.		4
138	" viridis F.		1
	Teredites.		
139	Trichodes Dejeani Drège. aulicus D.		1 8
140	Notostenus viridis T.		4
141	Corynetes abdominalis F.		2
142	" ruficollis F.		4
143	" rulipes F.		2
144	Anobium panicum F.		2
	Clavicornes.		
145	Silpha capensis D.		1
146	" micans F.		4
147	" punctulata O.		8
148	Nitidula aciculata D.		2
149	" capensis D.		8
150	" dulcamarae J.		2
151	" lateritia D.		4
152	" luridipennis D.		2
153	" pedicularia F.		1
154	" viridaenea D.		4
155	Episcapha grandis F.		12
156	Cryptophagus capensis D.		8
157	Dermestes cadaverinus F.		2
158	" vulpinus F.		3
159	Attagenus capensis D.		5
160	" luctuosus D.		3
161	" vestitus D.		4
162	Anthrenus maculatus F.		2
163	Hister affinis Paykull.		4
164	" africanus Sturm.		4
165	" atratus D.		6
166	" bicolor F.		3
167	" caffer D.		3
168	" capensis Paykull.		6
169	" Drègei D.		6
170	" semipunctatus F.		3
171	Dendrophilus plebejus D.		8
172	Platysoma cavifrons Schüppel		8
173	" chalybeum D.		4
174	" micros D.		6
	Palpicornes.		
175	Hydrobius melanophthalmus Dufour		2
176	Cyclonotum abdominale F.		6
177	Sphaeridium abbreviatum D.		4
178	" 5maculatum F.		2
	Lamellicornes.		
179	Ateuchus caffer D.		6
180	" capensis D.		8
181	" cephalotes D.	1	8
182	" convexus W.	1	4
183	" intricatus F.	1	
184	" operosus D.	1	4
185	" proboscideus Reiche	1	8
186	" senegalensis D.	1	4
187	Gymnopleurus fastiditus D.		8
188	" Liechtensteinii J		8
189	Sisyphus dentipes D.		8
190	" Hessii J.		6
191	Circellium Bacchus F.		8
192	Chalconotus cupreus F.		8
193	Epirinus Olivieri Megerle.		4
194	" moerens D.		10
195	Coprobas fornicatus Schüppel	1	8
196	Choeridium geminatum D.		6
197	Copris camillus D.	1	
198	" conou K. fem.	1	4
	" pirmal Fabr.		
199	" cornigera Sahlberg.		12
200	" dardanus D.	1	8
201	" empedocles D. m & f.		12
202	" Hamadrias F. m.	1	8
	f.	1	
203	" Jachus F.		8
204	" latifrons D.		8
205	" nemestrinus F. m.		8
	f.		6
206	" Oedipus F.		8
207	Onthophagus aciculatus D.		3
208	" capreolus D.		3
209	" columella J.		4
210	" Drègei D.		8
211	" gazella F.		3
212	" giraffa Hoffmans.	1	
213	" graniger D.		10
214	" hybridus D.		6
215	" micros D.		12
216	" monoceros D.		6
217	" Urus J. m. f.		6
218	" varipennis D.		8
219	Oniticellus Apelles F.		8
220	" Aygulus F.		2
221	" Bos D.		4
222	" Horatius D.		8
223	" hottentottus D.	1	
224	" pecuarius Burchell.	6	
225	Oniticellus bicristatus D.	1	
226	" ciliatus D.		2
227	" elegans D.	1	
228	" excavatus D.	6	
229	" militaris J.		4
230	" pallens O.	3	
231	" planatus K.	6	
232	" squalidus D.	6	
233	Aphodius anachoreta F.	1	
234	" carbonarius Sturm.	2	
235	" emarginatus J.	4	
236	" marginicollis D.	4	
237	" pallidipennis D.	4	
238	" patruelis D.	4	
239	" refusus D.	8	
240	Oxyomus geminatus K.	6	
241	Trox fascicularis W.	12	
242	" horridus F.	4	
243	" inscultus D.	1	
244	" luridus F.	2	
245	Oryctes Boas F.	1	
246	Scarabaeus monodon F.	4	
247	" ortilochus D.	12	
248	Copturhinus retusus F.	3	
249	Heteronychus cricetus Haussm.	4	
250	" nireus D.	1	
251	" palamedes D.	1	
252	" phocion m. f. D.	1	8
253	" syrichtus F.	12	
254	Anomala nitens Burchell.	4	
255	Trigonostoma capicola D.	8	
256	" ictericum D.	12	
257	" murinum D.	6	
258	Popilia bipunctata F.	3	
259	Leocaeta Alopex F.	2	8
260	Lagosterna flavofasciata D.	1	8
261	Aegosthera ciliata Herbst.	4	
262	Ablabera circumscripta D.	6	
263	" cribrata D.	8	
264	" emarginata D.	10	
265	" fuscata D.	4	
266	" fusciirons D.	4	
267	" suturalis D.	6	
268	Leucopholis Sommeri D.	8	
269	Rhisotrogus Drègei D.	1	8
270	Schizonycha barda D.	6	
271	" capensis D.	8	
272	" debilis Burchell.	6	
273	Schizonycha perforata D.		12
274	" tumida		3
275	Omaloplia aeruginea D.		8
276	" lucidula		6
277	" rufoaenea D.		8
278	Chasme fnornata D.		3
279	Lepisia rupicola F.		6
280	Dichelus aeneicollis D.		6
281	" axillaris D.		3
282	" basalis D.		5
283	" compressitarsis D m f		10
284	" hirticollis		12
285	" hypocrita		8
286	" lanuginosus D.		3
287	" luctuosus		12
288	" melanurus		8
289	" obscurus D.		12
290	" perplexus		6
291	" pollinosus	1	
292	" pulicarius		6
293	" rufipes D.		8
294	" subcostatus D.		12
295	" sulphuripennis D.	1	4
296	" terminatus D.		8
	luridipennis olim.		
297	" tridentatus D.		12
298	" tristis D.		10
299	" truncatulus D.		6
300	" vulpinus D.		10
301	" erythropygus D.		6
302	Scelophysa hoplioides D.		12
303	" ur.		10
304	Monochelus adspersus D.		8
305	" armatus D.		3
306	" arthritius F.		2
307	" bimaculatus D.		3
308	" bivittatus D.		8
309	" calcaratus D.		3
310	" canaliculatus D.		3
311	" citrinus D.		6
312	" dimidiatus D.		5
313	" gonagra F.		3
314	" histrio	m. f.	1
315	" lugens		8
316	" minutus D.		3
317	" nubilus D.		4
318	" ochraceus D.		6
319	" parvulus D.		8
320	" patruelis D.		8
321	" prunosus D.		6
322	" pulverous D.		3
323	" pumilus D.		12
324	" punctipennis D.		10
325	" scutellaris D. m. f.		12
326	" sobrinus D.		4
327	" spretus D.		3
328	" timidus D.		3
329	" vittiferus D.		8
330	" morosus D.		3
331	Hoplosecelis Drègei		3
332	Microdoris aquilus		1
333	Hoplia sordida D.		10
334	Gymnoloma alternans D.		8
335	" atomarium F.		3
336	" femoratum D. m. f.		10
337	Ericesthis lanosa D.		6
338	" minor D.		10
339	" vestita D. & cf.		2
340	Pachycnema aegroti D.	1	8
341	" affinis D.	1	4
342	" cinnabarina B. m. f.	1	8
343	" crassipes F.		10
344	" erythrops D. m f	1	
345	" flavostriata D. mf	1	
346	" fuliginosa D.		8
347	" guttata D.	1	
348	" lateralis D.		12
349	" marginalis B.	1	
350	" morbillosa D.		8
351	" nigromaculata D		8
352	" podibunda D.		12
353	" rufipennis D.		6
354	" signatipennis D.		8
355	" stictica D.		3
356	" striata D.		8
357	Platychelus aeneicollis B.		10
358	" gibbicollis B.		6
359	" micans B.		8
360	" spectabilis B.		12
361	Anisonyx crinitus F.		4
362	" jucundum D.		12
363	" ursus F.		2
364	Lepitrix capicola F.		2
365	" " var.		4
366	" fallax D.		8
367	" impectus W.		4
368	" lineatus F.		6
369	" nigripes F.		3
370	Lepitrix pistrinarius D.		8
371	" porosus D.		4
372	" punctatissimus D.		6
373	" xanthopterus D.		4
374	" fulvipes D.		8
375	Agenius limbatus O.		4
376	Stripsifer flavipennis Gory.	2	
377	" guttatus D.		12
378	" niger K.	2	
379	" Zebra K.	1	
380	Trichius vittatus F.		4
381	Valgus fasciculatus D.		4
382	Crenastocheilus capensis K.	2	
383	Genucus cruentus F.		12
384	Gnathocera flavomaculata F.		10
385	" umbonata K.		4
386	Macroma scutellatum F.	5	
387	Diplognatha carnifex F.		8
388	" gagates F.		12
389	" hebraea O.		8
390	Cetonia adspersa F.		3
391	" aequinoctialis F.		4
392	" antica F.		8
393	" bachapinica Burchell	2	4
394	" capensis F.		2
395	" " var. hottentotta Gory		4
396	" carmelita F.		4
397	" cinerascens F.		6
398	" congener D.		8
399	" cornuta F.		12
400	" discoidea F.		4
401	" equestris D.		6
402	" fascicularis F.		4
403	" furvata F.		4
404	" haemorrhoidalis F.		2
405	" judaica D.		8
406	" pagana D.		12
407	" pubescens F.	2	
408	" Racuperi Drège.	1	8
409	" sanguinipes Gory.	2	
410	" semilineata F.		6
411	" semipunctata F.		4
412	" signata F.		4
413	" sinuata F.		6
414	" tomentosa K.		6
	Heteromera.		
	Melasomes.		
415	Zophosis acuta W.		3
416	" errans D.		3
417	" dytiscoides H.		4
418	" testudinaria J.		8
419	Epiphysa flavicollis F.	2	
420	Physosterna Drègei D.	3	
421	" ovata O.		12
422	Adesmia cavifrons Solier.		12
423	" gibbipennis D.		8
424	" grallator D.	1	
425	" porcata F.		2
426	" vicina D.	1	
427	Cryptochyle maculata F.		4
428	" minuta F.		8
429	Moluris brevicollis D.	1	4
430	" cribricollis D	1	4
431	" globulipennis D.	10	
432	" gravida D	1	8
433	" laevicollis Reiche.	1	
434	" laevigata O.		8
435	" pilosa T.		12
436	" pinguis D.	1	
437	" rugulosa D.	1	4
438	" scabra F.	1	
439	" semiscabra D.	2	
440	" striata F.		4
441	" suturalis W.		12
442	" tomentosa D.	1	
443	" vestita D.		12
444	Hipomelus acuminatus S.		10
445	" bicarinatus D.	1	
446	" bicolor W.	1	
447	" sabulosus Sturm.		8
448	" sordidus D.		8
449	" vittatus F.		6
450	Trachynotus aeneus D.	1	
451	" elongatus O.		3
452	" lacunosus J.	1	
453	" rugosus F.		6
454	Scpidium lacunosum T.		
455	Dicrossa conuata D.	1	
456	" lutulenta D.	1	8
457	" testudinaria D.	1	8
458	Eorychora ciliata F.		12
459	" punctata D.		8
460	Herpiscius Sommeri D.	2	
461	Machla coarctata D.	1	4
462	" villosa O.		4
463	Asida coronata D.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
464	Heteroscelis exasperatus D...		12
465	„ intermedius D..		8
466	„ porcatus D.....		10
467	„ testudinarius D.		8
468	Gonopus ventricosus D.....		12
469	Psorodes calcarata F.....		6
470	„ tuberculata D.....		8
471	Acanthomera granulata W....	1	8
472	Oocotus farctus J.....		8
473	„ tardus J.....		8
474	Platynotus capicola D.		8
475	Eurynotus brunnicornis D....	1	8
476	„ hottentottus D.....	1	8
477	„ immundus D.....		8
478	„ marginicollis D....		4
479	„ morio Buquet		6
480	„ muricatus Kirby ..		4
481	„ nigerrimus D.....		6
482	„ ovalis D.....	1	4
483	„ tenebricosus D....		10
484	„ tuberculatus D.....		12
485	Blacodes brunnipes D.....		8
486	„ subcarinatus Sturm		8
487	Opatrum crenatum F.....		4
488	„ micans Eschscholtz		2
489	Leichenum variegatum D....		8
	Taxicornes.		
490	Phaleria laevigata Schüppel.		
491	Eudophlocus peltoides K.....		
492	Neomida capensis D.....		
493	Epilampus capensis D.....		
494	Oopiestus capensis D.....		
495	Heterophaga opatroides D....		
496	Hypophlocus capensis D.....		
	Tenebrionites.		
497	Imatismus patruelis D.....		
498	Toxicum antilope D. m. f....		
499	„ bubalus D.....		
	Melopiens.		
500	Stenochia caffra D.....		
501	„ sulcipennis D.....		
502	Oplocheirus tenebrioides D...		
503	Cistela capensis D.....		
	Trachelides.		
504	Eutrapela bicolor D.....		
505	„ elongata D..		
506	„ erythrodera D.....		
507	„ gracilis K.....		
508	„ lateralis D.....		
509	„ porrecta F.....		
510	„ trilineata D.....		
511	„ unicolor D.....		
512	„ verticalis D.....		
513	„ vittata J.....		
514	Lagria amethystina D.....		
515	„ columbina D.....		
516	„ distincta D.....		
517	„ flavipennis D.....		
518	„ foveicollis D..... .		
519	„ fuscipennis K.		
520	„ puberula D..... .		
521	„ vestita D.....		
522	„ villosa F.....		
523	Monocerus capensis D.....	1	
524	„ cucullatus D.....	1	
525	„ litigiosus D.....		
526	„ pilosus D.....		
527	„ scenicus D.....		
528	Anthicus albitarsis D.....		
529	„ coeruleus T.....		
530	„ dorsalis D.....		
531	„ 4 signatus D.....		
532	„ rubricollis D.....		
233	„ transversalis D.....		
534	Ripiphorus flabellatus F.....		
535	Mordella basalis D.....		
536	„ confusa D..	1	
537	„ diffinis D.....		
538	Anaspis nigricans D.....		
	Vesicants.		
539	Meloe capensis D.....	2	8
540	Synamma amoena D.....		8
541	„ sinuata D.....		8
542	Dices decoratus D		12
543	Decatoma africanum O		12
544	„ decipiens D.....		12
545	„ fasciolatum D.....		12
546	„ histrio D.....		8
547	„ lunatum F.....		3
548	„ nigricorne D.....		12
549	„ 4 guttatum Bilberg		10
550	„ vicinum D.....		6
551	Mylabris binotata D.....		4
552	„ capensis F.....		2
553	„ connexa D.....	1	
554	„ Drègei D.....	1	
555	„ Groendali Bilberg.		8
556	„ Lavaterae F.....		8
557	„ luscа D		12
558	„ maculicollis D.....		8
559	„ myops D.....		12
560	„ oculata O.....		4
561	„ „ var.....		6
562	„ ophthalmica D.....		8
563	„ 4 fasciata T.....		4
564	„ 15 guttata T.....		12
565	„ transversalis D.....		12
566	„ 3 punctata T.....		4
567	„ vittata D.....	2	
568	Lytta flavipennis D.		4
569	„ lucida D.....		6
570	„ nitidula F.....		5
571	Epicauta brevipennis D.....		8
572	Zonitis eribricollis D.....		8
573	„ flavipennis D.....		5

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
574	Zonitis morio D.....		6
575	„ paucicollis D.....		6
576	„ rotundicollis D.....		8
577	„ rubripennis D.....		6
578	„ rufipennis D.....		4
579	Nemognatha collaris D.....		6
580	„ violacea D.....		4
581	„ viridipennis F..		
	Tetramera.		
	Curculionites.		
582	Bruchus helvolus S.....		8
583	„ silaceus S.....		8
584	„ submaculosus S.. ..		8
585	Spermophagus capensis D.. ..		4
586	Urodon tomentosus D.....		4
587	„ vermiculatus S.....		2
588	Phlocotragus varicolor S....		1
589	Tropideres nigellus Sparman		12
590	„ pallidirostris S..		3
591	Anthribus albociuctus S.....		2
592	„ apicalis S.....		1
593	Blaberus fallax S.....		12
594	Attelabus exaratus S.....		6
595	Rhynchites recoquitus S....		12
596	Apion africanum S.....		4
597	„ aquilicolle S.....		4
598	„ anoquum S.....		4
599	„ ruscolum S.....		3
600	Tanaos bicolor S.....		8
601	Arrhenodes armatus S.....		4
602	„ picipes O		8
603	„ vulsellatus S....		8
604	Anilliarhinus coriaceus S....		4
606	„ Drègei S. m. f..		6
606	„ signatus S.....		8
607	„ Zamiae T. m. f.		8
608	Platymerus Germari S.....		8
609	„ Lehmanni S....		1
610	Episus Drègei S.....		1
611	„ horridus S.....		1
612	Brachycerus anaglypticus S.		2
613	„ apterus L.....		1
614	„ cordiger Sparrm.		2
615	„ cornutus L.....		12
615	„ curruca S.		1
617	„ Drègei S.....		8
618	„ duplicatus S ...		
	„ favillaceus olim		
	„ globiferus T....		8
619	„ globosus F.....		6
620	„ Germari S.....		2
621	„ granosus S.....		4
622	„ Gyllenhali S...		12
623	„ Koroquanus S..		
624	„ var. marcul. F..		
	„ longulus S.....		8
625	„ maculatus F...		8
626	„ obesus F.....		
627	„ ochraceus S....		
628	„ pertusus T.....		
629	„ pulvereus S....		
630	„ stellaris O.....		
631	„ subfasciatus S.		12
632	„ texatus Gyllenh.		
633	„ torquatus S....		
634	„ torvus S.....		
635	„ turriferus S....		
636	„ biglobat. Sparrm.		6
637	„ ungulatus olim.		
	„ verrucicollis S..		
633	„ Westermanni S.		
639	Microcerus griseseens S.....		
641	„ retusus F.....		
642	Hipporhinus albicinctus S...		8
643	„ appendiculatus S		
644	„ caffer T.....		10
	„ calvus olim.....		
	„ cornicostris S...		
645	„ corpulentus S...		
646	„ costatus S.....		12
647	„ Drègei S.....		
648	„ granicollis S....		8
649	„ Prypnus olim ...		
650	„ granulatus D....		
651	„ granulosus W....		12
652	„ Gyllenhali S....		
653	„ nivosus Sparrm..		8
654	„ pilularius F...		
	„ pastillarius olim.		
655	„ pygmaeus S.....		12
	„ Prypnus olim....		
656	„ rubro-spinosus S.		
657	„ rugirostris S....		8
658	„ severus S.....		
659	„ sericnodosus S..		
660	„ seriepunctatus S.		8
661	„ spectrum F.....		
662	„ spiculosus S.....		
	„ rubifer olim.....		
663	„ verrucosus Linné		12
664	Prypnus parvulus S.....		12
665	Strophosomus Cucorhinus olim		
	„ gravis		
	„ longulus S.....		8
667	Calyptos granosus S.....		
	Cucorhinus scapulatus olim..		
668	Platycopes gonopterus S....		8
669	„ prasinatus S....		8
670	„ squalidus S.....		12
671	Polyclaeis equestris S.....		8
672	Tanymecus praecanus S....		
673	„ trivialis S.....		6
674	Cleonus affaber S.....		8
675	„ costextus S.....		4
676	„ fallax S.....		
677	„ glacialis H.....		4
678	„ limpidus S.....		8
679	„ velatus S.....		8

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
680	Bothynoderes sulcus J.....		6
681	Gronops costicollis S.....		6
682	Aonychus apicalis S.....		
683	Byrsops sulcicollis S.....		
684	„ Westermanni S.....		
685	Eupages gibbosus S.....		
686	Cyphonotus signatus S.....		
687	Rhytirhinus inaequalis F....		
688	Sparteccrus angulatus		
689	„ brevis S.....		
690	„ fallax S.....		
691	Hypocolobus Drègei S.....		
692	Trachyphloeus brevis S.....		
693	„ spathulatus S.		
694	„ squamifer S..		
695	Ellimenistes camelus S.....		
695	„ inaffectatus S..		
697	„ squamifer S....		
698	Phlyctinus albo-mixtus S....		
699	„ callosus S.....		
700	Sciobius aciculatifrons S....		
701	„ granipennis S.....		
702	„ impressicollis S.....		
	„ suturalis S.....		
703	„		
704	Eremnus aciculaticollis S...		
705	„ exaratus S.....		
706	„ gyrosicollis S.....		
707	„ pilosus S.		
708	„ strigifrons S.....		
709	Lixus alboguttatus S.....		
710	„ canaliculatus S.....		
711	„ caffer Sparrm		
712	„ carinirostris S.....		
713	„ flavicornis S.....		
714	„ haereus		
715	„ lividus F.....		
716	„ rugicollis K.....		
717	„ teretiusculus		
718	Larinus squalidus		
719	Nerthops guttatus O.....		
720	Catomisimus Drègei S.....		
721	Dercloinus longuidus S.....		
722	Balaninus apicalis S.....		
723	„ muricus S.....		
724	„ suturalis S.....		
725	Tychius squalidus S.....		
726	Sibynes cervinus S.....		
727	„ luteicornis S.....		
728	„ punctirostris S.....		
729	„ sublineatus S.....		
730	„ suturellus S.....		
731	Thamnobius Thoreyi S.....		
732	Alcides brevirostris D.....		
733	„ haemopterus Sturm..		
734	„ rufus K.....		
735	Baridius aciculaticollis S....		
736	„ caffer S.....		
737	„ marginicollis S.....		
738	„ opacus S.....		
739	„ scotinus S.....		
740	„ subsignatus		
741	Pachyonyx affaber S		
742	Ithyporus capensis D.....		
743	Centorhynchus celastri S		
744	„ echinatus S..		
745	„ frontalis S...		
746	„ serietuberculatus S..		
747	Cyrtomon camelus K.....		
748	Ocladius cinctus S.....		
749	„ costicollis S.....		
750	„ scutilis K.....		
751	Cionus histrio S.....		
752	„ meticulosus Sparm ..		
753	Sitophilus granarius L.....		
754	„ oryzae L.....		
755	„ sculpturatus S		
756	Phaenomerus Schoenherri Drège...		
757	Amorphocerus rufipes S.....		
758	„ Zamiae S		
759	Cossonus glabricollis S		
760	„ saturalis S		
761	Phagophloeus cbenius S		
762	„ ferrugineus S..		
	Xylophages.		
763	Bostrichus xanthopus D		
764	Apate morbillosa D.....		
765	„ ruficornis D		
766	„ senegalensis D.....		
767	„ unidentata F		
768	„ ustulata D.....		
769	Deudrophtorus capensis D...		
770	Latridius capensis D.....		
771	Rhyzophagus capensis D		
772	„ rufulus D		
773	Bothrideres foveicollis D....		
774	Lyctus destructor D.....		
775	Silvanus angustatus D		
776	Torgasita caraboides F		
777	„ opaca K.....		
778	Laemophloeus lateritius D...		
	Longicornes.		
779	Macrotoma Natala Drège....		
780	Erioderus lanuginosus D		
781	Amphidesmus quadridens F.		
782	Callichroma latipes F		
783	Litopus ater F		
784	„ facetus D.....		
785	Prometes femoratus D.....		
786	„ longipes F		
787	„ viridis D.....		
788	Polyzonus clavicornis F.....		
789	„ scalaris D.....		
790	Closteromerus cyanipennis D		
791	„ lactus K		
792	„ sexpunctatus F		

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
793	Closteromerus violaceus D ..		
794	Hesperophanes bimaculatus F		
795	Clytus vicinus D		
796	Cloniocerus hystrix F		
797	Amblesthis alutaceus D		
798	Phrymeta spinator F.....		
799	Ceroplesis aethiops F		
800	„ caffra D		
801	„ capensis F		
802	„ cruentata D.....		
803	„ ferrugator F		
804	„ hottentotta F		
805	Tragocephala formosa O		
806	Zographus oculator F		
807	Alphitopola cana D		
	Chrysomelines.		
808	Lema azurea D		
809	„ chalcoptera D.....		
810	„ Drègei D.....		
811	„ erythrodera D		
812	„ lateritia D.....		
813	„ nigropunctata D		
814	„ punctipennis D		
815	„ rufipennis D.....		
816	Ouchocephala humilis D		
817	Hispa bellicosa D		
818	„ Drègei D		
819	„ militaris D.....		
820	„ spinulosa S.....		
821	Imatidium badium D.....		
822	Deloyala 5 fasciata F		
823	Basipta pallens K. var maj.		
824	Cassida consimilis D		
825	„ corrugata Sahlberg..		
826	„ Drègei D.....		
827	„ excavata D.....		
828	„ gibbipennis D.....		
829	„ hybrida D.....		
830	„ litigiosa D.....		
	„ maculipennis D.....		
831	„ nigronotata D.....		
832	„ solani K.....		
833	Gallerucа juvenca D.....		
834	„ linteata d. G.....		
835	„ opima D.....		
836	„ strigosa D.....		
837	Aulacophora scita D		
838	Diacantha caeca C.....		
839	„ Drègei D.....		
840	„ festiva Dalman....		
841	„ fuscitarsis D.....		
842	„ gloriosa D.....		
843	„ 6 pustulata D.....		
844	„ testudinaria D... ..		
845	„ unipunctata C.....		
846	Malacosoma capensis D.....		
847	„ cisteloides D.....		
848	„ consobrina D.....		
849	Apophylla smaragdina D.....		
850	Luperus anceps D.....		
851	„ fuscifrons D.....		
852	„ gentilis D.....		
853	„ pulicarius D.....		
854	Monolepta bioculata F.		
855	„ bizonata C.....		
856	„ capicola D.....		
857	„ congener D.....		
858	„ fastidiosa D.....		
859	„ frontalis C.		
860	„ laterita D.....		
861	Graptodera indigacea J.		
862	„ „ var....		
863	„ nigripennis D....		
864	Disonycha maculicollis D....		
865	Systena velutina D.....		
866	Crepidodera venustula D.....		
867	Aphthona capensis D.....		
868	„ fugrata D...		
869	„ minuta D.....		
870	Teinodactyla capicola D.. ...		
871	„ pedicularia D..		
872	Podagrica anceps D...		
873	„ decora D.....		
874	„ dilecta Dalman....		
875	„ laterita D.....		
876	„ pudibunda D.....		
877	„ rubricollis D.....		
878	„ substriata D.....		
879	Agropus indicus F.....		
880	Blepharida catenulata D.....		
881	„ Drègei D.....		
882	Chrysomela capicola D.....		
883	Lina chloroptera D.....		
884	Entomoscelis elythroides D..		
885	Atechna alternans F.....		
886	„ clathrata D.....		
887	„ figurata D.....		
888	„ fulvipennis D.....		
889	„ generosa D.....		
890	„ guttata F.....		
891	„ „ var.....		
892	„ multifida C.....		
893	„ 14 guttata F.....		
894	„ „ var.....		
895	„ revestita C.....		
896	„ terminalis D.....		
897	„ 20 pustulata D.....		
898	„ 23 maculata C.....		
899	„ vulpina F.....		
900	Centroscelis macularis D....		
901	„ notata F.....		
902	„ vidua D.....		
903	Plagiodera columbina D....		
904	„ hemicycla D....		
905	„ nitidula D.....		
906	„ rufocincta D....		
907	Odontionopa sericea Gyllh...		
908	„ „ var.....		

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
910	Thysbe chrysomelina D.....		
911	„ „ var...		
912	Rathseba transversalis D...		
913	Dia hispidula D.....		
914	„ ovipennis D.....		
915	Platycorynus Dejeanii Drège		
916	Euryope Drègei D.....		
917	„ thoracicus D.....		
918	Heteraspis monosus D.....		
919	„ puberulus D.....		
920	„ viridiaureus D..		
921	Eubrachis attelaboides D...		
922	„ brachialis D.....		
923	„ coeruleus D.....		
924	„ cojecturalis D...		
925	„ declaratus D.....		
926	„ fraternus D.....		
927	„ humerosus D.....		
928	„ altidipennis D...		
929	„ servulus D.....		
930	Nerissus clythroides D.....		
931	„ strigatus D.....		
932	Pachnephorus exilis D.....		
933	Plusiopeplis chrysoloma D..		
934	Babia nana D.....		
935	Clythra brevipes D.....		
936	„ trilineata D.....		
937	Labidostomis aeneicollis D.		
938	Marcrolenes bilineolata D..		
939	„ lugubris D. ..		
940	„ maxillosa F...		
941	„ meadax D.....		
942	„ signatifera D..		
943	Camptolenes nigrofasciata Sturm		
944	„ „ var.		
945	„ Drègei D.....		
946	„ fastuosa K.....		
947	„ rugosa F.....		
948	Melitonoma dorsalis D.....		
949	„ laterita D.....		
950	„ lepida D.....		
951	„ ventralis D...		
952	Damia 4 signata D.....		
953	Cryptocephalus amoenus D.		
954	„ Drègei D...		
955	„ nigrifrons D.		
956	„ pustulatus F.		
957	„ scalaris D...		
958	„ sceuicus D...		
959	„ tantillus D..		
960	Triplax capensis D.....		
961	Phalacrus bibustulatus D..		
962	„ caffer D.....		
963	„ capensis D.....		
964	„ luridipennis D..		
965	„ micros D.....		
966	„ parvulus D.....		
967	„ subaeneus D....		
968	„ viridiaeneus D.		
	Trimeres.		
969	Coccinella anceps D.....		
970	„ conjuata D.....		
971	„ macularis O.....		
972	Cheilomenes lunata F.....		
973	„ propinqua D...		
974	Micraspis sobrina D.....		
975	„ striata F.....		
976	Chilocorus auritus Schneider		
977	„ neglectus D.....		
978	„ versutus D.....		
979	„ xanthocephalus D.		
980	Chaootriba similis H.....		
981	Epilachna bifasciata F.....		
982	„ discors D.....		
983	„ Drègei D.....		
984	„ occulta D.....		
985	„ 12 verrucata F..		
	Orthoptera.		
986	Forficula auricularia L.....		
987	„ axillaris M.B.....		
988	„ corticina M.B.....		
989	„ gigantea F.....		
990	„ lurida M.B.....		
991	„ spadicea M.B.....		
992	Blatta americanad L.....		
993	„ ciliata B.....		
994	„ curta M.B.....		
995	„ dispar M.B.....		
996	„ erythrocephala F...		
997	„ fuliginosa M.B.....		
998	„ germanica F.....		
999	„ gracilis B.....		
1000	„ granicollis B.....		
1001	„ hyalinata M.B.....		
1002	„ limbata B.....		
1003	„ linearis B.....		
1004	„ lutea M.B.....		
1005	„ marginicollis M.B..		
1006	„ micans B.....		
1007	„ miliaria M.B.....		
1008	„ militaris M.B.....		
1009	„ stylifera B.....		
1010	„ versicolor B.....		
1011	„ verticalis B		
1012	„ sp.....		
1013	Empusa fronticornis B.....		
1014	Harpax cornutus Stoll.....		
1015	Schizocephala chalybea B..		
1016	Mantis arida M.B.....		
1017	„ catenata B.....		
1018	„ fenestrata F.....		
1019	„ grisea M.B.....		
1020	„ humilis M.B.....		
1021	„ religiosa F.....		
1022	„ varia J.....		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
	norio D		6
	unctcollis D		6
	otundicollis D		8
	ubripennis D		6
	ulipennis D		4
	tha collaris D		4
	violacea D		6
	viridipennis F		4
	ramera.		
	culionites.		
	helvolus S		8
	silaccus S		8
	submaculosus S		8
	nagus capensis D		4
	omentosus D		4
	ermiculatus S		4
	gus varicolor S		
	es nigellus Sparman	1	
	pallidirostris S		12
	albocinctus S	3	
	apicalis S	2	
	fallax S	1	
	exaratus S		12
	es reconditus S		6
	icanum S		12
	gulicolle S		4
	iquum S		4
	scolum S		6
	icolor S	3	
	es armatus S		8
	picipes O		4
	vulsellatus S		10
	us coriaceus S		12
	Drègei S. m. f.		10
	signatus S		6
	Zamiae T. m. f.		8
	us Germari S		8
	Lehmanni S		
	règei S	1	
	orridus S	1	
	rus anaglypticus S	1	8
	apterus L	2	
	cordigerSparrm	1	
	cornutus L	2	
	curruca S		12
	Drègei S	1	
	duplicatus S		8
	favillaceus olim		
	globiferus T	1	8
	globosus F		6
	Germari S	2	
	granosus S	2	
	Gyllenhali S	4	
	Koroguanus S		12
	var. marcul. F		
	longulus S	1	8
	maculatus F	1	
	obesus F		8
	ochraceus S	3	
	pertusus T	1	
	pulvereus S	4	
	stellaris O	2	
	subfasciatus S		12
	texatus Gyllenh.	2	
	torquatus S	1	
	torvus S	4	
	turriferus S	4	
	biglobat.Sparrm.		6
	ungulatus olim		
	verrucicollis S	1	
	Westermanni S	2	
	grisescens S	2	
	retusus F	1	
	us albicinctus S	3	8
	appendiculatus S	2	
	caffer T		10
	calvus olim		
	cornirostris S	2	
	corpulentus S	3	
	costatus S		12
	Drègei S	3	
	granicollis S	1	8
	Prypnus olim		
	granulatus D	1	
	granulosus W		12
	Gyllenhali S	3	
	nivosus Sparrm	1	8
	pilularius F	1	
	pastillarius olim		
	pygmaeus S		12
	Prypnus olim		
	rubro-spinosus S	3	
	rugirostris S	1	8
	severus S	2	
	sericeodosus S	2	
	seriepunctatus S	1	8
	spectrum F	1	
	spiculosus S	2	
	rubifer olim		
	verrucosus Linné		12
	arvulus S		12
	us Cacorhinus olim		

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
680	Bothynoderes suillus J		6
681	Gronops costicollis S		6
682	Aonychius apicalis S	1	
683	Byrsops sulcicollis S	2	
684	„ Westermanni S	2	
685	Eupages gibbosus S	1	
686	Cyphonotus signatus S	2	
687	Rhytirhinus inaequalis F		4
688	Spartecerus angulatus		6
689	„ brevis S		4
690	„ fallax S		4
691	Hypocolobus Drègei S		12
692	Trachyphlocus brevis S		4
693	„ spathulatus S		4
694	„ squamifer S		6
695	Ellimenistes camelus S		4
696	„ inaffectatus S		2
697	„ squamifer S		4
698	Phlyctinus albo-mixtus S	1	
699	„ callosus S		8
700	Sciobius aciculatifrons S	1	
701	„ granipennis S		8
702	„ impressicollis S		8
703	„ suturalis S		10
704	Eremnus aciculaticollis S	1	
705	„ exaratus S		8
706	„ gyrosicollis S		6
707	„ pilosus S	1	
708	„ strigifrons S	1	
709	Lixus alboguttatus S		12
710	„ canaliculatus S		12
711	„ caffer Sparrm		6
712	„ carinirostris S	1	
713	„ flavicornis S	1	
714	„ haereus		4
715	„ lividus F		12
716	„ rugicollis K		6
717	„ teretiusculus		8
718	Larinus squalidus		8
719	Nerthops guttatus O		12
720	Catomismus Drègei S	1	
721	Derelomus longuidus S		3
722	Balaninus apicalis S		4
723	„ murinus S		4
724	„ suturalis S		6
725	Tychius squalidus S		4
726	Sibynes cervinus S		4
727	„ luteicornis S		8
728	„ punctirostris S		8
729	„ sublineatus S		6
730	„ suturellus S		12
731	Thamnobius Thoreyi S		8
732	Alcides brevirostris D	1	8
733	„ haemopterus Sturm		6
734	„ rufus K		4
735	Baridius aciculaticollis S		8
736	„ caffer S	1	
737	„ margiuicollis S		10
738	„ opacus S	1	
739	„ scotinus S		4
740	„ subsignatus		4
741	Pachyonyx affaber S		12
742	Ithyporus capensis D		12
743	Ceuterhynchus eclastri S		4
744	„ echinatus S		12
745	„ frontalis S		6
746	„ serietuberculatus S		8
747	Cyrtomon camelus K		12
748	Ocladius cinctus S		8
749	„ costicollis S		6
750	„ senilis K		12
751	Cionus hiatrio S		6
752	„ meticulosus Sparm		4
753	Sitophilus granarius L		1
754	„ oryzae L		2
755	„ sculpturatus S		12
756	Phaenomerus Schoenherri Drège		12
757	Amorphocerus rufipes S		10
758	„ Zamiae S	1	
759	Cossonus glabricollis S		4
760	„ saturalis S		6
761	Phagophlocus cbenius S		3
762	„ ferrugineus S		8
	Xylophages.		
763	Bostrichus xanthopus D		4
764	Apate morbillosa D	1	
765	„ ruficornis D		8
766	„ senegalensis D		8
767	„ unidentata F		6
768	„ ustulata D		8
769	Dendrophtorus capensis D		4
770	Latridius capensis D	1	
771	Rhyzophagus capensis D		8
772	„ rufulus D		6
773	Bothrideres foveicollis D	1	
774	Lyctus destructor D		4
775	Silvanus angustatus D		8
776	Torgosita caraboides F		1
777	„ opaca K		12
778	Lasmoblosus [illegible] D		8

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
793	Closteromerus violaceus D	2	
794	Hesperophanes bimaculatus F		12
795	Clytus vicinus D		8
796	Clonioccrus hystrix F	3	
797	Amblesthis alutaceus D	2	
798	Phrynota spinator F	1	8
799	Ceroplesis aethiops F		6
800	„ caffra D		8
801	„ capensis F	1	
802	„ cruentata D	2	8
803	„ ferrugator F	2	
804	„ hottentotta F		6
805	Tragocephala formosa O	1	
806	Zographus oculator F	1	
807	Alphitopola cana D		12
	Chrysomelines.		
808	Lema azurea D	1	8
809	„ chalcoptera D	2	
810	„ Drègei D		8
811	„ erythrodera D		10
812	„ lateritia D		12
813	„ nigropunctata D		6
814	„ punctipennis D		6
815	„ rufipennis D		10
816	Onchocephala humilis D		6
817	Hispa bellicosa D	1	
818	„ Drègei D		6
819	„ militaris D		4
820	„ spinulosa S		6
821	Imatidium badium D		3
822	Deloyala 5 fasciata F		2
823	Basipta pallens K. var maj.	1	
824	Cassida cousimilis D		8
825	„ corrugata Sahlberg		4
826	„ Drègei D		4
827	„ excavata D		8
828	„ gibbipennis D		3
829	„ hybrida D		8
830	„ litigiosa D		3
831	„ maculipennis D		3
832	„ nigronotata D		2
833	„ solani K		2
834	Gallerucа juvenca D	1	
835	„ lineata d. G		4
836	„ optima D		4
837	„ strigosa D		6
838	Aulacophora scita D		12
839	Diacantha caeca C		4
840	„ Drègei D		6
841	„ festiva Dalman		4
842	„ fuscitarsis D		12
843	„ gloriosa D		10
844	„ 6 pustulata D		12
845	„ testudinaria D		12
846	„ unipunctata C		10
847	Malacosoma capensis D		3
848	„ cisteloides D		8
849	„ consobrina D		8
850	Apophylia smaragdina D		4
851	Luperus anceps D		4
852	„ fuscifrons D		4
853	„ gentilis D		4
854	„ pulicarius D		4
855	Monolepta bioculata F		5
856	„ bizonata C		5
857	„ capicola D		4
858	„ cougener D		6
859	„ fastidiosa D		6
860	„ frontalis C		4
861	„ laterita D		6
862	Graptodera indigacea J		3
863	„ „ var		4
864	„ nigripennis D		6
865	Disonycha maculicollis D		6
866	Systena velutina D		8
867	Crepidodera venustula D		6
868	Aphthona capensis D		3
869	„ ingrata D		8
870	„ minuta D		3
871	Teinodactyla capicola D		3
872	„ pedicularia D		6
873	Podagrica anceps D		6
874	„ decora D		8
875	„ difecta Dalman		6
876	„ laterita D		4
877	„ pudibunda D		3
878	„ rubricollis D		8
879	„ substriata D		6
880	Agropus indicus F		4
881	Blepharida catenulata D		4
882	„ Drègei D		12
883	Chrysomela capicola D	2	
884	Lina chloroptera D		4
885	Entomoscelis clythroides D		6
886	Atechna alternans F		4
887	„ clathrata D		3
888	„ figurata D		8
889	„ fulvipennis D		6
890	„ generosa D		6
891	„ guttata F		3
892	„ „ var		4
893	„ multifida C		4

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
910	Thysbe chrysomelina D		4
911	„ „ var		4
912	Bathseba transversalis D	1	8
913	Dia hispidula D		4
914	„ ovipennis D		4
915	Platycorynus Dejeanii Drège	3	6
916	Euryope Drègei D	2	
917	„ thoracicus D		2
918	Heteraspis monosus D		4
919	„ puberulus D		3
920	„ viridiaureus D		4
921	Eubrachis attelaboides D		4
922	„ brachialis D	1	
923	„ coeruleus D		4
924	„ cojecturalis D		4
925	„ declaratus D		4
926	„ fraterans D		6
927	„ humerosus D		6
928	„ nitidipennis D		4
929	„ servulus D		4
930	Nerissus elythroides D		4
931	„ strigatus D		4
932	Pachnephorus exilis D		6
933	Plusiopeplis chrysolema D		6
934	Babia nana D		10
935	Clythra brevipes D		6
936	„ trilineata D		
937	Labidostomis aeneicollis D		6
938	Marcrolenes bilineolata D		4
939	„ lugubris D		6
940	„ maxillosa F		3
941	„ mendax D		2
942	„ signatifera D		
943	Camptolenes nigrofasciata Sturm		8
944	„ „ var		4
945	„ Drègei D		4
946	„ fastuosa K		8
947	„ rugosa F		3
948	Melitonoma dorsalis D		8
949	„ laterita D		3
950	„ lepida D		3
951	„ ventralis D		2
952	Damia 4 signata D		2
953	Cryptocephalus amoenus D		4
954	„ Drègei D		4
955	„ nigrifrons D		6
956	„ pustulatus F		3
957	„ scalaris D		12
958	„ sceuicus D		4
959	„ tantillus D		6
960	Triplax capensis D		4
961	Phalacrus bibustalatus D		12
962	„ caffer D		4
963	„ capensis D		3
964	„ luridipennis D		2
965	„ micros D		3
966	„ parvulus D		8
967	„ subaeneus D		4
968	„ viridiaeneus D		4
	Trimeres.		
969	Coccinella anceps D		6
970	„ cognata D		4
971	„ macularis O		5
972	Cheilomenes lunata F		5
973	„ propinqua D		4
974	Micraspis sobrina D		6
975	„ striata F		2
976	Chilocorus auritus Schneider		5
977	„ neglectus D		4
978	„ versutus D		5
979	„ xanthocephalus D		4
980	Chnootriba similis H		6
981	Epilachna bifasciata F		4
982	„ discors D		8
983	„ Drègei D		4
984	„ occulta D		12
985	„ 12 verrucata F		3
	Orthoptera.		
986	Forficula auricularia L		8
987	„ axillaris M.B		4
988	„ corticina M.B		2
989	„ gigantea F		4
990	„ lurida M.B		4
991	„ spadicea M.B		4
992	Blatta americanad L		4
993	„ ciliata B		3
994	„ carta M.B		4
995	„ dispar M.B		8
996	„ erythrocephala F		6
997	„ fuliginosa M.B		4
998	„ germanica F		2
999	„ gracilis B		8
1000	„ granicollis B		8
1001	„ hyalinata M.B		4
1002	„ limbata B		4
1003	„ linearis B		8
1004	„ lutea M.B		8
1005	„ marginicollis M.B		4
1006	„ micans B		4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1023	Mantis zebrata M.B.	—	12
1024	„ sp.	—	4
1025	Bacillus sp.	—	2
1026	Bacteria cinerea M.B.	—	6
1027	Aplopus ceratophyllus B.	—	12
1028	Acanthoderus capensis M.B.	—	8
1029	Hertrodes pupa L.	—	8
1030	„ radiatus M.B.	—	10
1031	Barbitistes capensis M.B.	—	6
1032	Phyllioptera antica M.B.	—	6
1033	„ bajula M.B.	—	6
1034	„ cristata M.B.	—	10
1035	„ loricata M.B.	—	6
1036	„ varicornis M.B.	—	6
1037	Conocephalus intricatus M.B.	—	10
1038	„ militaris M.B.	—	8
1039	Xiphidium pellucidum M.B.	—	8
1040	„ spec.	—	6
1041	Locusta peltata M.B.	—	6
1042	Saga azurea B.	1	
1043	„ mutilata M.B.	—	8
1044	„ perforata F.	—	8
1045	Stenopelmatus aper M.B.	1	
1046	„ armadillo M.B	1	
1047	„ Drègei B.	1	8
1048	Sphaerium capense M.B.	—	4
1049	Oecanthus livens M.B.	—	6
1050	Acheta capensis F.	—	4
1051	„ costulata M.B.	—	6
1052	„ erythrocephala M.B	—	4
1053	„ grisea M.B.	—	6
1054	Gryllotalpa capensis M.B.	—	8
1055	Paemmora inanis F.	1	
1056	„ maculata T.	—	10
1057	„ marmorata T.	—	8
1058	„ ocellata T.	—	8
1059	„ pupillata T.	—	10
1060	„ scutellaris Latr.	1	8
1061	Truxalis chloris M.B.	—	10
1062	„ frenata M.B.	—	10
1063	„ nasuta F.	—	4
1064	„ picta M.B.	—	10
1065	„ tenuis M.B.	—	8
1066	„ vibex M.B.	—	6
1067	„ xylina M.B.	—	10
1068	Mesops costatus M.B.	—	4
1069	„ gracilis B.	—	5
1070	Gryllus aridus M.B.	—	8
1071	„ atripennis M.B.	—	8
1072	„ aulicus M.B.	—	10
1073	„ bigatus M.B.	—	8
1074	„ bisignatus Charp.	—	6
1075	„ carinatus F. m. L.	1	
1076	„ coarctatus M.B.	—	4
1077	„ coelestina M.B.	—	5
1078	„ comptus M.B.	—	8
1079	„ crocepes M.B.	—	8
1080	„ desertus M.B.	—	8
1081	„ festivus M.B.	—	8
1082	„ flavus L.	—	8
1083	„ fritillarius M.B.	—	8
1084	„ haematopus L.	—	6
1085	„ hypocrita M.B.	—	6
1086	„ lateralis M.B.	—	8
1087	„ leprosus F.	—	8
1088	„ lithoxylon M.B.	—	8
1089	„ luridus M.B.	—	6
1090	„ maculatus M.B.	—	6
1091	„ martidus M.B.	—	8
1092	„ melanostictus M.B.	—	4
1093	„ migratorius L.	—	3
1094	„ mola M.B.	2	
1095	„ morbillosus F.	—	6
1096	„ obesus M.B.	—	6
1097	„ ochropus M.B.	—	6
1098	„ oleaginus M.B.	—	8
1099	„ papulosus M.B.	—	8
1100	„ pardalinus M.B.	—	10
1101	„ porraceus M.B.	—	10
1102	„ rana B.	—	8
1140	Cimex conjungens G.	—	6
1141	„ corticinus G.	—	8
1142	„ cryptorhynchus G.	—	8
1143	„ facetus G.	—	4
1144	„ hastatus F.	—	8
1145	„ hebraicus G.	—	4
1146	„ implaviatus G.	—	8
1147	„ leucogrammus G.	—	6
1148	„ longulus G.	—	6
1149	„ loriventre G.	—	6
1150	„ lythrodes G.	—	6
1151	„ musivus G.	—	8
1152	„ plinthaerus W.	—	4
1153	„ pugnax G.	—	6
1154	„ rufiventris G.	—	5
1155	„ rugiventris G.	—	10
1156	„ sparsus G.	—	6
1157	„ tomentiventris G.	—	8
1158	„ trisignatus G.	—	4
1159	„ ventralis G.	—	5
1160	„ viridissimus Wolff.	—	4
1161	„ spec.	—	8
1162	Asopus annulipes G.	—	3
1163	„ figuratus G.	—	8
1164	„ fucosus G.	—	8
1165	„ leprosus G.	—	8
1166	„ mensor G.	—	10
1167	Cydnus fimbriatus T.	—	4
1168	„ hirtus T.	—	8
1169	„ leucostigma G.	—	8
1170	„ melaleucus T.	—	4
1171	„ sanguinolentus G.	—	8
1172	„ spec.	—	6
1173	Aelia albivittis G.	—	10
1174	„ modesta Wolff.	—	10
1175	Crinocerus fasciculatus F.	—	8
1176	„ spureus G.	—	6
1177	Homocoerus foleratus G.	—	5
1178	„ insubidus G.	—	6
1179	„ maguicornis B.	—	6
1180	„ nigricornis G.	—	8
1181	„ nigripes B.	—	3
1182	„ spec.	—	6
1183	Phyllomorphus paradoxus F.	3	
1184	Cerbus annulicornis G.	—	6
1185	„ apicalis G.	—	6
1186	„ atramentarius G.	—	8
1187	„ crassicluuis G.	—	8
1188	„ nigricornis G.	—	10
1189	„ pectoralis G.	—	4
1190	„ valgus F.	—	4
1191	„ spec.	—	6
1192	Hyselonotus pugnator F.	—	3
1193	Synomaster concolor G.	—	6
1194	„ horridus G.	—	8
1195	„ spec.	—	6
1196	Lygaeus contaminatus G.	—	6
1197	„ crudelis F.	—	4
1198	„ elegans Wolff.	—	3
1199	„ famelicus F.	—	2
1200	„ Forsteri F.	—	2
1201	„ melanurus G.	—	4
1202	„ rivularis G.	—	4
1203	„ spec.	—	6
1204	Pyrrhocoris albicollis Stoll.	—	6
1205	„ caruifex F.	—	2
1206	„ calvimanus F.	—	2
1207	Pachymenus albostriatus F.	—	5
1208	„ brunnipennis G.	—	5
1209	„ moerens G.	—	5
1210	„ spec.	—	6
1211	Leptocoris hoematicus G.	—	6
1212	Stenogaster annulipes G.	—	4
1213	„ rufiventris G.	—	6
1214	„ spec.	—	6
1215	Pachylis hasticornis T.	1	
1216	Heterogaster semipunctatus G	—	6
1217	Cymus binotatus G.	—	4
1218	„ dipus G.	—	8
1219	„ spec.	—	4

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
	Lepidoptera.		
1607	Papilio Domoleus L.	—	8
1608	„ dissimilis L.	—	2
1609	„ Nierus Cr.	—	12
1610	Pieris Hellica Hübner	—	2
1611	„ Severina Cr.	—	6
1612	Anthocharis Danae F.	2	—
1613	Xanthidia pulchella Bd.	1	
1614	Colias Electra L.	—	4
1615	„ Cleodora Hub.	—	6
1616	Lycaena Boeticus L.	—	4
1617	„ lysimon F.	—	6
1618	„ messapus Godart.	—	6
1619	„ telicanus Hub.	—	4
1620	Limenitis melicerta Cr.	—	8
1621	Nymphalis verances Cr.	—	8
1622	Acraea boschmana Bd.	1	—
1623	„ horta L.	—	4
1624	„ punctata Bd.	1	8
1625	Danais Caryaippus L.	—	6
1626	Vanessa Cardui L.	—	2
1627	„ Clelia F.	—	4
1628	„ Cloantha Cr.	—	12
1629	„ Octavia Cr.	1	—
1630	Hypanis anvatara	—	12
1631	„ illithya F.	—	12
1632	Eurytela hiarba. Drury.	—	6
1633	Satyrus Cassius Godart.	—	6
1634	„ Clytus L.	—	4
1635	„ Drègei Bd.	—	8
1636	„ Gambisa Bd.	—	12
1637	„ hyperbius Godart.	—	12
1638	Loxura alcides F.	—	12
1639	Zerithia palmus Cr.	—	6
1640	„ perion Cr.	—	8
1641	„ thero L.	—	8
1642	„ thyra L.	—	8
1643	„ thysbe L.	—	6
1644	Hesperia caffra Lacordaire.	—	6
1645	„ Drègei Bd.	—	10
1646	„ namaqua Lacord.	—	8
1647	„ vindex Cr.	—	8
1648	„ 4 spec.	1	—
1649	Sirychtus malvicola Bd.	—	8
1650	„ sidarum Bd.	—	8
1651	Steropes metis Cr.	—	6
1652	Thasos aethiopica Bd.	—	8
1653	Sesia andrenaepennis Bd.	—	8
1654	„ bibionipennis Bd.	—	12
1655	Macroglossa Tityrus K.	—	10
1656	„ 3 spec.	1	—
1657	Sphinx convolvuli L.	—	12
1658	Deilephila capensis F.	—	6
1659	„ Oldculandiae F.	—	12
1660	„ spec.	—	8
1661	Brachyglossa Atropos L.	—	4
1662	Zugena Drègei Bd.	—	10
1663	„ spec.	—	8
1664	Syntomis Cerbera L.	—	3
1665	„ 4 spec.	—	12
1666	Glaucopis formosa Bd.	1	
1667	„ madagascariensis.	1	
1668	„ spec.	—	8
1669	Procris myodes Bd.	—	6
1670	„ nebulosa K.	—	4
1671	Lithosia fumeola Bd.	—	6
1672	„ praeusta Bd.	—	6
1673	Chelonia dorsalis Bd.	—	6
1674	„ dorsata Bd.	—	6
1675	„ 3 spec.	1	—
1676	Liparis flavipalpis Bd.	—	6
1677	Lasiocampa Pitys Bd.	—	10
1678	Bombyx boschmana Bd.	—	12
1679	„ pateus Bd.	—	8
1680	„ suasa Bd.	—	6
1681	„ 3 spec.	—	12
1682	Zagaris n		
1683	„ r		
1684	„ 3		
1685	Saturina		
1686	„		
1687	„		
1688	„		
1689	Zeuzera		
1690	Hepiolus		
1691	Limacode		
1692	Tortrix		
1693	Agrotis la		
1694	„ r		
1695	„ s		
1696	„ s		
1697	„ v		
1698	„ v		
1699	„ 6		
1700	Apamea		
1701	Caradrina		
1702	Leucania		
1703	Nonagria		
1704	Xylina pa		
1705	„ sp		
1706	Abrostola		
1707	Plusia chr		
1708	„ Yp		
1709	Heliothis		
1710	„		
1711	Acontia s		
1712	Ophiusa		
1713	„		
1714	„		
1715	„		
1716	„		
1717	„		
1718	„ 3		
1719	Homopter		
1720	Anthophila		
1721	Erastria		
1722	Agarista		
1723	„		
1724	Geometra		
1725	„		
1726	„		
1727	„		
1728	„		
1729	„		
1730	„		
1731	„		
1732	„		
1733	„		
1734	„		
1735	Fidonia ca		
1736	„ sp		
1737	Ctenica ca		
1738	„ sp		
1739	Batys faria		
1740	„ forfi		
1741	„ hybr		
1742	„ 30 sp		
1743	Herminia c		
1744	„ r		
1745	Crambus 1		
1746	Tinea vitel		
1747	„ xant		
1748	„ 28 sp		
1749	Yponomeut		
1750	Adela Drèg		
1751	„ spec		
1752	Ptrophorus		
1753	Orneodes s		
	Dip		
1754	Culex caffr		
1755	Tipula gra		
1756	„ fulv		

B. Bur
Bd. Boi
C. Che
Cr. Cra

1 ℔ hat 16 ß. Der Friedrd'or wird zu 13

am 11 Dec 1841 per Pol. franco Gutsch
gr. Fickt.

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
3	Mantis zebrata M.B.	—	12
4	,, sp.	—	4
5	Bacillus sp.	—	2
5	Bacteria cinerea M.B.	—	6
7	Aplopus ceratophyllus B.	—	12
8	Acanthoderus capensis M.B.	—	8
9	Hertrodes pupa L.	—	8
0	,, radiatus M.B.	—	10
1	Barbitistes capensis M.B.	—	6
2	Phyllopteras antica M.B.	—	6
3	,, bajula M.B.	—	6
4	,, cristata M.B.	—	10
5	,, loricata M.B.	—	6
6	,, varicornis M.B.	—	6
7	Conocephalus intricatus M.B.	—	10
8	,, militaris M.B.	—	8
9	Xiphidium pellucidum M.B.	—	8
0	,, spec.	—	6
1	Locusta peltata M.B.	—	6
2	Saga azurea B.	1	—
3	,, mutilata M.B.	—	8
4	,, perforata F.	—	8
5	Steropelmatus aper M.B.	1	—
6	,, armadilloM.B	1	—
7	,, Drégei B.	1	—
8	Sphaerium capense M.B.	—	8
9	Oecanthus livens M.B.	—	6
0	Acheta capensis F.	—	4
1	,, costulata M.B.	—	6
2	,, erythrocephala M.B	—	4
3	,, grisea M.B.	—	6
4	Gryllotalpa capensis M.B.	—	8
5	Paemora juanis F.	1	—
6	,, maculata T.	—	10
7	,, marmorata T.	—	8
8	,, ocellata T.	—	8
9	,, pupillata T.	—	10
0	,, scutellaris Latr.	1	8
1	Truxalis chloris M.B.	—	10
2	,, frondita M.B.	—	10
3	,, nasuta F.	—	4
4	,, picta M.B.	—	10
5	,, tenuis M.B.	—	8
6	,, vibex M.B.	—	6
7	,, xylina M.B.	—	10
8	Mesops costatus M.B.	—	4
9	,, gracilis B.	—	5
0	Gryllus aridus M.B.	—	8
1	,, atripennis M.B.	—	8
2	,, aulicus M.B.	—	10
3	,, bigatus M.B.	—	8
4	,, bisignatus Charp.	—	6
5	,, carinatus F. m. f.	1	—
6	,, coarctatus M.B.	—	4
7	,, coelestina M.B.	—	5
8	,, comptus M.B.	—	8
9	,, crocceipes M.B.	—	8
0	,, desertus M.B.	—	8
1	,, festivus M.B.	—	8
2	,, flavus L.	—	8
3	,, fritillarius M.B.	—	8
4	,, haematopus L.	—	6
5	,, hypocrita M.B.	—	6
6	,, lateralis M.B.	—	8
7	,, leprosus F.	—	8
8	,, lithoxylon M.B.	—	8
9	,, luridus M.B.	—	6
0	,, maculatus M.B.	—	6
1	,, martidus M.B.	—	8
2	,, melanostictus M.B.	—	4
3	,, migratorius L.	—	3
4	,, mola M.B.	2	—
5	,, morbillosus F.	—	6
6	,, obesus M.B.	—	6
7	,, ochropus M.B.	—	6
8	,, oleagineus M.B.	—	8
9	,, papulosus M.B.	—	8
0	,, pardalinus M.B.	—	10
1	,, porraceus M.B.	—	10
2	,, rana B.	—	8
3	,, reticulatus M.B.	—	6
4	,, serropes F. m. f.	—	12
5	,, spumans T. m. f.	—	12
6	,, stellio M.B.	—	8
7	,, tinnunculus M.B.	—	6
8	,, umbraticus M.B.	—	6
9	,, zebratus M.B.	—	8
0	Batrachoteltis crispata M.B.	—	10
1	,, exasperata M.B	—	12
2	,, incrustata M.B.	—	12
3	,, spec.	—	12

Hemiptera.

1114	Callidea Drégei G.	2	—
1115	Thyreocoris acaroides T.	—	2
1116	Pachycoris circumductus G.	1	—
1117	,, falcatur G.	—	12
1118	,, stigma F.	—	6
1119	Sphaerocoris impluviata G.	—	5
1120	,, multipunctata T.	—	4
1121	,, tigrina Stoll.	—	2
1122	Scutellera pinguis G.	—	4
1123	,, Schestedtii F.	—	12
1124	Cyptocoris Landii B.	1	—
1125	Edessa costale G.	—	6
1126	,, moestum G.	—	6
1127	,, ulcerosa G.	—	10
1128	,, urca G.	—	10
1129	Halys froudosa G.	—	4
1130	,, insubida G.	—	5
1131	,, nebulosa B.	—	4
1132	Aspongopus erythrocerus G.	1	—
1133	Atelocerus limatus G.	—	10
1134	,, obsipatus G.	—	6
1135	Amaurus serratus G.	1	8
1136	Cimex aberrans G.	—	4
1137	,, acinorum G.	—	3
1138	,, bicinctus G.	—	6
1139	,, cervinus G.	—	6
1140	Cimex conjungens G.	—	6
1141	,, corticinus G.	—	8
1142	,, cryptorhynchus G.	—	8
1143	,, facetus G.	—	4
1144	,, hastatus F.	—	8
1145	,, hebraicus G.	—	4
1146	,, impluviatus G.	—	8
1147	,, leucogrammus G.	—	6
1148	,, longulus G.	—	6
1149	,, loriventre G.	—	6
1150	,, lythrodes G.	—	6
1151	,, musivus G.	—	8
1152	,, plinthaerus W.	—	4
1153	,, pugnax G.	—	6
1154	,, ruliventris G.	—	5
1155	,, rugiventris G.	—	10
1156	,, sparsus G.	—	6
1157	,, tomentiventris G.	—	8
1158	,, trisignatus G.	—	4
1159	,, ventralis G.	—	5
1160	,, viridissimus Wolff.	—	4
1161	,, spec.	—	8
1162	Asopus annulipes G.	—	3
1163	,, figuratus G.	—	8
1164	,, fucosus G.	—	8
1165	,, leprosus G.	—	8
1166	,, mensor G.	—	10
1167	Cydnus fimbriatus T.	—	4
1168	,, hirtus T.	—	8
1169	,, leucostigma G.	—	8
1170	,, melaleucus T.	—	4
1171	,, sanguinolentus G.	—	8
1172	,, spec.	—	6
1173	Aelia albivittis G.	—	10
1174	,, modesta Wolff.	—	10
1175	Crinocerus fasciculatus F.	—	8
1176	,, sparcus G.	—	6
1177	Homocerus falcatus G.	—	5
1178	,, insubidus G.	—	6
1179	,, magnicornis B.	—	6
1180	,, nigricornis G.	—	8
1181	,, nigripes B.	—	3
1182	,, spec.	—	6
1183	Phyllomorphus paradoxus F.	3	—
1184	Corbus annulicornis G.	—	6
1185	,, apicalis G.	—	6
1186	,, atramentarius G.	—	8
1187	,, crassicornis G.	—	8
1188	,, nigricornis G.	—	10
1189	,, pectoralis G.	—	4
1190	,, valgus F.	—	4
1191	,, spec.	—	6
1192	Hypselonotus pugnator F.	—	3
1193	Synamaster concolor G.	—	6
1194	,, horridus G.	—	8
1195	,, spec.	—	6
1196	Lygaeus contaminatus G.	—	6
1197	,, crudelis F.	—	4
1198	,, elegans Wolff.	—	3
1199	,, famelicus F.	—	2
1200	,, Forsteri F.	—	2
1201	,, melanurus G.	—	4
1202	,, rivularis G.	—	4
1203	,, spec.	—	6
1204	Pyrrhocoris albicollis Stoll.	—	6
1205	,, cruxifex F.	—	2
1206	,, calvimanus F.	—	2
1207	Pachymerus albostriatus F.	—	5
1208	,, brunipennis G.	—	5
1209	,, moerens G.	—	5
1210	,, spec.	—	6
1211	Leptocoris haematicus G.	—	6
1212	Stenogaster annulipes G.	—	4
1213	,, ruliventris G.	—	6
1214	,, spec.	—	6
1215	Pachylis hasticornis T.	1	—
1216	Heterogaster semipunctatus G	—	6
1217	Cymus binotatus G.	—	4
1218	,, dipus G.	—	8
1219	,, spec.	—	4
1220	Ophthalmicus phaeopterus G.	—	4
1221	,, ruficeps G.	—	4
1222	Corizus capensis G.	—	6
1223	Alidus dentipes F.	—	6
1224	,, flavilinea Stoll.	—	6
1225	Miris spec.	—	5
1226	Phytocoris spec.	—	4
1227	Limnobater capensis G.	—	8
1228	,, major G.	—	8
1229	Stenopoda fusca G.	—	8
1230	Harpactor armipes G.	—	6
1231	,, calviventris G.	—	8
1232	,, erythrocnemis G.	—	4
1233	,, geniculatus G.	—	6
1234	,, haematopterus G.	—	6
1235	,, hoematitius G.	—	6
1236	,, pallescens G.	—	6
1237	,, pallidiventris G.	—	6
1238	,, segmentarius G.	—	6
1239	,, violentus G.	—	8
1240	,, vulneratus G.	—	8
1241	Nabis capsiformis G.	—	6
1242	Macrops musivus G.	—	4
1243	Pirates balteatus G.	—	10
1244	Ectrichodes bidentula G.	—	4
1245	,, cruciatus Stoll.	—	6
1246	Hydroessa fusca G.	—	4
1247	Reduvius spec.	—	4
1248	Arilus spec.	—	6
1249	Tingis spec.	—	6
1250	Brachyrrhynchus furcatus G.	—	3
1251	,, lobatus G.	—	5
1252	,, membranaceus F	—	2
1253	,, morio G.	—	4
1254	Aradus hystrix G.	—	6
1255	,, melaenus G.	—	4
1256	Monoxyx grandicollis G.	—	10
1257	Naucoris planus G.	—	10
1258	Nepa rubra F.	—	8

Homoptera.

1259	Cicada brevipennis G.	1	—
1260	,, diaphana G.	—	6
1261	,, hirtipennis G.	—	5
1262	,, limitata G.	1	—
1263	,, lutea O.	—	12
1264	,, maculipennis G.	1	—
1265	,, nebulosa O.	—	12
1266	,, phaleratha G.	1	—
1267	,, pulmosa G.	—	5
1268	,, rufipennis G.	1	—
1269	,, scripta F.	1	—
1270	,, semicostata G.	—	6
1271	,, semipunctata G.	1	—
1272	,, signifera G.	—	12
1273	,, simplex G.	—	8
1274	,, tabaniformis G.	—	6
1275	,, tosta G.	1	—
1276	,, villosa F.	1	—
1277	,, spec.	—	8
1278	Thlasia brunnipennis G.	1	—
1279	Dictyophara punctata Stoll.	2	—
1280	Ricania cimicoides G.	—	5
1281	Centrotus fuscipennis G.	1	—
1282	,, nodicornis G.	—	6
1283	,, spec.	—	8
1284	Cercopis analis F.	—	3
1285	,, ,, var.	—	4
1286	,, areata G.	—	6
1287	,, arithmetica G.	—	3
1288	,, decorata G.	1	—
1289	,, phoenicoptera G.	—	6
1290	,, sanguinipes G.	—	8
1291	,, spec.	—	8
1292	Aphrophora albilatera G.	—	6
1293	,, obscura F.	—	6
1294	,, terrena G.	—	6
1295	Jassus apterus G.	—	8
1296	,, pallens G.	—	8
1297	,, Tela G.	—	8

Hymenoptera.

1298	Hylotoma speciosa K.	—	6
1299	,, mediata K.	—	6
1300	,, stictica K.	—	6
1301	Allanthus annulitarsus K.	—	5
1302	Athalia himantopus K.	—	3
1303	Lissonota signatoria M.B.	—	5
1304	,, scriptoria M.B.	—	6
1305	,, spec.	—	5
1306	Pimpla crocata M.B.	—	5
1307	,, praecusta M.B.	—	6
1308	,, callosa M.B.	—	6
1309	,, divisa M.B.	—	6
1310	,, vitellina M.B.	—	6
1311	Joppa geniculata M.B.	—	6
1312	Ichneumon infuscator M.B.	—	4
1313	,, castaneus M.B.	—	6
1314	,, instructor F.	—	3
1315	,, sobrius M.B.	—	5
1316	Cryptus filator M.B.	—	5
1317	,, sanguinator M.B.	—	5
1318	,, spectator M.B.	—	3
1319	,, spec.	—	6
1320	Ophion leucophthalmus M.B.	—	4
1321	,, dilutus M.B.	—	4
1322	,, guttatus M.B.	—	5
1323	Bracon mercator F.	—	5
1324	,, lugens M.B.	—	6
1325	,, navigator M.B.	—	6
1326	,, thoracicus M.B.	—	6
1327	,, miniatus M.B.	—	4
1328	,, emarginator M.B.	—	6
1329	,, ternator M.B.	—	6
1330	,, ampullator M.B.	—	4
1331	,, sanguinator M.B.	—	3
1332	Rogas spec.	—	4
1333	Microdus melanurus M.B.	—	4
1334	Foenus irrorator K.	—	6
1335	Evania appendigaster F.	—	4
1336	Chalcis hastata M.B.	—	4
1337	,, podagrica F.	—	4
1338	,, annulipes M.B.	—	6
1339	Diplolepis spec.	—	4
1340	Pyrosoma splendens K.	—	2
1341	Chrysis lyncea K.	—	3
1342	,, laeta M.B.	—	6
1343	,, malachitica M.B.	—	6
1344	Poecilochroa bifusciata K.	—	4
1345	Spintharis chrysonota M.B.	—	3
1346	Hedychrum coelestinum M.B.	—	4
1347	,, ianthinum M.B.	—	5
1348	,, spec.	—	6
1349	Tiphia cribrata M.B.	—	5
1350	,, rufipes M.B.	—	6
1351	,, fuscicornis M.B.	—	4
1352	Myzine abdominalis M.B.	—	3
1353	Elis geniculata M.B.	—	6
1354	,, flexuosa M.B.	—	6
1355	petiolaris M.B.	—	4
1356	Meria elegans M.B.	—	6
1357	Scolia aterrima M.B.	—	4
1358	,, cyanipennis M.B.	—	6
1359	,, ruficeps M.B.	—	6
1360	,, erythropyga M.B.	—	4
1361	,, terminalis M.B.	—	6
1362	,, chrysotricha M.B.	—	3
1363	,, fimbriata Holthuysen.	—	6
1364	,, incana M.B.	—	4
1365	,, marginata M.B.	—	4
1366	,, analis M.B.	—	4
1367	Pelopaeus ruficornis M.B.	—	5
1368	,, spirifex F.	—	4
1369	,, tibialis F.	—	4
1370	Ammophila collaris M.B.	—	5
1371	,, lateralis M.B.	—	4
1372	,, incana M.B.	—	3
1373	Spex lanuginosa M.B.	—	6
1374	Pompilus violaceus M.B.	—	8
1375	,, brunnicps M.B.	—	4
1376	,, hottentota M.B.	—	6
1377	,, rufipennis d.G.	—	3
1378	,, flavicornis M.B.	—	8
1379	,, capensis L.	—	3
1380	,, hypogaeicus M.B.	—	6
1381	,, melanocerus M.B.	—	4
1382	,, impiger M.B.	—	6
1383	,, affusus M.B.	—	6
1384	,, fugitivus M.B.	—	6
1385	,, atramentarius M.B	—	4
1386	,, azurescus M.B.	—	5
1387	,, compressus M.B.	—	5
1388	,, crassicornis M.B.	—	6
1389	,, ibex M.B	—	5
1390	,, inanibus M.B.	—	5
1391	Bembex undulata M.B.	—	6
1392	,, olivacea L.	—	3
1393	,, melanopa M.B.	—	5
1394	Larra fulvocincta M.B.	—	6
1395	Palarus taeniolatus M.B.	—	6
1396	Liris apiformis M.B.	—	5
1397	,, sepulchralis M.B.	—	4
1398	,, funerula M.B.	—	4
1399	,, xanthomera M.B.	—	6
1400	Oxybelus furcatus M.B.	—	4
1401	Crabro pedunculatus M.B.	—	6
1402	,, pendulus M.B.	—	6
1403	Philanthus diadema F.	—	3
1404	,, honestus M.B.	—	6
1405	,, tricolor M.B.	—	4
1406	,, fasciatus M.B.	—	4
1407	Cerceris crocata M.B.	—	5
1408	,, luctifera M.B.	—	6
1409	,, cruentata M.B.	—	6
1410	,, relicta M.B.	—	6
1411	Ceramius sinuatus M.B.	—	6
1412	,, cerceriformis M.B.	—	4
1413	,, vespiformis M.B.	—	6
1414	,, cingulatus M.B.	—	4
1415	Synagris fervida M.B.	—	4
1416	,, aestuans M.B.	—	4
1417	,, torrida M.B.	—	5
1418	Rhygchium erythraeum M.B.	—	6
1419	Pterochilus validus M.B.	—	6
1420	Odynerus ferrugineus M.B.	—	5
1421	,, vidnus M.B.	—	5
1422	,, sobrinus M.B.	—	6
1423	,, analis M.B.	—	4
1424	Eumenes vulnerata M.B.	—	4
1425	,, clypeata M.B.	—	3
1426	,, caffra L.	—	3
1427	Polistes distigma M.B.	—	3
1428	,, cinerascens M.B.	—	5
1429	,, lincaris ♀	—	3
1430	,, cinerea ♂	—	3
1431	,, marginalis M.B.	—	3
1432	,, segmentaria M.B.	—	5
1433	,, zonaria M.B.	—	6
1434	Prosopis rubiginosa M.B.	—	5
1435	,, lateralis M.B.	—	5
1436	,, palpetralis M.B.	—	6
1437	Colletes capensis M.B.	—	6
1438	Andrena colona M.B.	—	6
1439	,, fugitiva M.B.	—	5
1440	,, fuliginea M.B.	—	4
1441	Dichroa cribrosa M.B.	—	4
1442	Nomia calceata M.B.	—	6
1443	Hylaeus chalcode M.B.	—	4
1444	,, relictus M.B.	—	5
1445	,, apricaris M.B.	—	5
1446	,, rostrata M.B.	—	5
1447	Xylocopa sulphurea M.B.	—	8
1448	,, grossa M.B.	—	4
1449	,, capensis M.B.	—	6
1450	,, caffra F.	—	3
1451	,, trepida F.	—	4
1452	,, cingulata M.B.	—	6
1453	,, thoracica W.	—	5
1454	,, tibialis M.B.	—	4
1455	,, hottentota M.B.	—	4
1456	Allodape scutellaris M.B.	—	4
1457	,, dichroa M.B.	—	5
1458	,, abdominalis M.B.	—	3
1459	,, tenella M.B.	—	4
1460	Heriades capense M.B.	—	5
1461	Anthrophora Herrleana M.B.	—	5
1462	,, valida M.B.	—	5
1463	,, minor M.B.	—	6
1464	,, ornata M.B.	—	6
1465	,, vicina M.B.	—	6
1466	,, ferina M.B.	—	6
1467	,, ambigua M.B.	—	6
1468	Anthidium aterrimum M.B.	—	6
1469	Coelioxys operta M.B.	—	6
1470	Melecta scutellaris F.	—	3
1471	Megilla plumipes M.B.	—	4
1472	,, ferruginata M.B.	—	3
1473	,, tomentosa M.B.	—	3
1474	,, obliciata M.B.	—	6
1475	Eucera spec.	—	4
1476	Apis mellifera var. capensis	—	2
1477	Dorylus helvolus F.	—	2
1478	Formica capensis M.B.	—	2
1479	,, 4 maculata M.B.	—	3
1480	,, rufiventris F.	—	2
1481	,, ,, var.	—	3
1482	,, tetracantha M.B.	—	4
1483	,, fugax M.B.	—	3
1484	,, aethiops Latr.	—	2
1485	,, gagates Latr.	—	2
1486	,, brunnea Latr.	—	5
1487	Ponera rufidens M.B.	—	5
1488	,, caffra M.B.	—	3
1489	,, variolosa M.B.	—	5
1490	,, attenuata M.B.	—	4
1491	Leptalea picea M.B.	—	2
1492	,, succinea M.B.	—	4
1493	Leptalea albipes M.B.	—	4
1494	Myrmica ucicularis M.B.	—	2
1495	,, agilis M.B.	—	4
1496	,, caffra M.B.	—	4
1497	,, infesta M.B.	—	2
1498	,, rubiginosa M.B.	—	2
1499	Mutilla moneta K.	—	4
1500	,, notata K.	—	4
1501	,, dorsalis K.	—	6
1502	,, lucida M.B.	—	6
1503	,, duplicata M.B.	—	6
1504	,, capitata K.	—	4
1505	,, capensis K.	—	4
1506	,, oblita M.B.	—	3
1507	,, aurifera M.B.	—	5

Pseudoneuroptera.

1508	Agrion conspicuum M.B.	—	12
1509	,, speciosum M.B.	—	4
1510	,, palliatum M.B.	—	4
1511	,, glaucum M.B.	—	4
1512	,, frenulatum M.B.	—	8
1513	,, velitare M.B.	—	8
1514	,, leucostictum M.B.	—	6
1515	,, ingenuum M.B.	—	4
1516	,, iofulatum M.B.	—	4
1517	,, vittatum M.B.	—	12
1518	,, rubens M.B.	—	4
1519	,, liberianum M.B.	—	4
1520	,, spec.	—	4
1521	Petalura picta M.B.	—	8
1522	Aeschna axillaris M.B.	—	12
1523	,, dolabrata M.B.	—	10
1524	,, spec.	—	8
1525	Libellula rubiginosa M.B.	—	4
1526	,, marginata F.	—	4
1527	,, aeruginosa M.B.	—	8
1528	,, distans M.B.	—	5
1529	,, unifasciata O.	—	10
1530	,, taeniata M.B.	—	8
1531	,, vinula M.B.	—	8
1532	,, spec.	—	6
1533	Psocus spec.	—	6
1534	Ephemera spec.	—	6
1535	Nemoptera bacillaris K.	—	10

Neuroptera.

1536	Myrmeleon libelloides L.	—	3
1537	,, leucostigma M.B	—	8
1538	,, erythropus M.B.	—	4
1539	,, leucospilus M.B.	—	6
1540	,, leporinus M.B.	—	10
1541	,, murinus K.	—	10
1542	,, telarius M.B.	—	6
1543	,, reticulatus M.B.	—	6
1544	Ascalaphus capensis Lefebor.	—	12
1545	Hemerobius nigricornis M.B.	—	8
1546	,, chloris M.B.	—	4
1547	Mantispa pusilla Latr.	—	4

Arachnides.

1548	Melophagus spec.	—	6
1549	Mygale hottentotta M.B.	—	8
1550	,, fervida M.B.	—	8
1551	,, incana M.B.	—	8
1552	,, cuementaria Latr.	—	10
1553	,, xanthomera M.B.	—	8
1554	,, caffra M.B.	—	10
1555	Thomisus nobilis F.	—	4
1556	,, validus M.B.	—	4
1557	,, ochrogaster	—	5
1558	,, draco M.B.	—	4
1559	Epeira ferox M.B.	—	3
1560	,, asterias M.B.	—	3
1561	,, 6 tuberculata F.	—	3
1562	,, hirtipes M.B.	—	4
1563	,, sericea F.	—	3
1564	Eresus famosus Koch.	—	4
1565	Aranea 25 spec.	2	—
1566	Scorpio capensis H.	—	4
1567	,, austerus M.B.	—	6
1568	,, stenurus M.B.	—	8
1569	,, craturus M.B.	—	8
1570	,, caffer M.B.	—	6
1571	,, tenuis de Haan.	—	12
1572	,, lineatus M.B.	—	4
1573	,, spec.	—	8
1574	Phrynus capensis M.B.	—	8
1575	Galeodes araneoides F.	—	8
1576	,, jubata M.B.	—	6
1577	,, fusca M.B.	—	8
1578	,, lunata M.B.	—	4
1579	,, lateralis M.B.	—	6
1580	,, spec.	—	4
1581	Chelifer capensis M.B.	—	4
1582	,, cancroides F.	—	4
1583	Ixodes hebraeus M.B.	—	4
1584	,, hispanus F.	—	2
1585	,, aegyptius F.	—	2
1586	,, cruentus M.B.	—	3
1587	,, marmoreus M.B.	—	3
1588	,, rubiginosus M.B.	—	3
1589	,, simus M.B.	—	4
1590	,, coronatus M.B.	—	4
1591	,, spec.	—	4
1592	Trombidium capense M.B.	—	4
1593	Scolopendra 15 spec.	2	—
1594	Lithobius 3 spec.	—	8
1595	Geophilus spec.	—	8
1596	Scutigera spec.	—	8
1597	Polydesmus 3 spec.	—	4
1598	Julus 27 spec.	1	8
1599	Sphaerotherium obtusum M.B	—	8
1600	,, elongatum Brandt	—	6
1601	,, rotundatum Br.	1	—
1602	,, retusum M.B.	1	—
1603	,, 3 spec.	—	8
1604	Oniscus 4 spec.	1	—
1605	Idotea bidens	1	8
1606	,, 2 spec.	—	4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Courr.	℔	ß
	Lepidoptera.		
1607	Papilio Domoleus L.	—	8
1608	„ dissimilis L.	—	2
1609	„ Nierus Cr.	—	12
1610	Pieris Hellica Hübner	—	2
1611	„ Severina Cr.	—	6
1612	Anthocharis Danae F.	2	—
1613	Xanthidia pulchella Bd.	1	—
1614	Colias Electra L.	—	4
1615	„ Cleodora Hüb.	—	6
1616	Lycaena Boeticus L.	—	4
1617	„ lysimon F.	—	6
1618	„ messapus Godart.	—	6
1619	„ telicanus Hüb.	—	4
1620	Limenitis melicerta Cr.	—	8
1621	Nymphalis veranes Cr.	—	8
1622	Acraea boschmana Bd.	1	—
1623	„ horta L.	—	4
1624	„ punctata Bd.	1	8
1625	Danais Chrysippus L.	—	6
1626	Vanessa Cardui L.	—	2
1627	„ Clelia F.	—	4
1628	„ Cloantha Cr.	—	12
1629	„ Octavia Cr.	1	—
1630	Hypanis anvatara	—	12
1631	„ illithya F.	—	12
1632	Eurytela hiarba. Drury	—	6
1633	Satyrus Cassius Godart.	—	6
1634	„ Clytus L.	—	4
1635	„ Drégei Bd.	—	8
1636	„ Gambius Bd.	—	12
1637	„ hyperbius Godart.	—	12
1638	Loxura alcides F.	—	12
1639	Zerithia palmus Cr.	—	6
1640	„ perion Cr.	—	8
1641	„ thero L.	—	8
1642	„ thyra L.	—	8
1643	„ thysbe L.	—	6
1644	Hesperia caffra Lacordaire.	—	6
1645	„ Drégei Bd.	—	10
1646	„ namaqua Lacord.	—	8
1647	„ vindex Cr.	—	8
1648	„ 4 spec.	1	—
1649	Sirychtus malvicola Bd.	—	8
1650	„ sidarum Bd.	—	8
1651	Steropes metis Cr.	—	6
1652	Thanos aethiopica Bd.	—	8
1653	Sesia andrenaeformis Bd.	—	8
1654	„ bibionipennis Bd.	—	12
1655	Macroglossa Tityrus K.	—	10
1656	„ 3 spec.	1	—
1657	Sphinx convolvuli L.	—	12
1658	Deilephila capensis F.	—	6
1659	„ Oldenlandiae F.	—	12
1660	„ spec.	—	8
1661	Brachyglossa Atropos L.	—	4
1662	Zygena Drégei Bd.	—	10
1663	„ spec.	—	8
1664	Syntomis Cerbera L.	—	3
1665	„ 4 spec.	—	12
1666	Glaucopis formosa Bd.	1	
1667	„ madagascariensis.	1	
1668	„ spec.	—	8
1669	Procris myodes Bd.	—	6
1670	„ nebulosa K.	—	4
1671	Lithosia fumeola Bd.	—	6
1672	„ praeusta Bd.	—	6
1673	Chelonia dorsalis Bd.	—	6
1674	„ dorsata Bd.	—	6
1675	„ 3 spec.	1	—
1676	Liparis flavipalpis Bd.	—	6
1677	Lasiocampa Pitys Bd.	—	10
1678	Bombyx boschmana Bd.	—	12
1679	„ patens Bd.	—	8
1680	„ suasa Bd.	—	6
1681	„ 3 spec.	—	12
1682	Zagaris meteus Cr.	—	4
1683	„ rubrinervis Bd.	—	12
1684	„ 3 spec.	—	8
1685	Saturnia appolonica Cr.	2	—
1686	„ capensis F.	—	10
1687	„ natali Bd.	2	8
1688	„ 2 spec.	3	—
1689	Zeuzera scalaris Donovan.	—	12
1690	Hepiolus Ibania Cr.	—	6
1691	Limacodes spec.	—	4
1692	Tortrix 10 spec.	2	—
1693	Agrotis latens Hübner	—	4
1694	„ radicum Bd.	—	4
1695	„ spectum L.	—	3
1696	„ suffusa F.	—	3
1697	„ valigera	—	4
1698	„ virescens Bd.	—	6
1699	„ 6 spec.	1	—
1700	Apamea 2 spec.	—	6
1701	Caradrina spec.	—	4
1702	Leucania 2 spec.	—	6
1703	Nonagria spec.	—	4
1704	Xylina petrida Bd.	—	4
1705	„ spec.	—	3
1706	Abrostola triplasia Bd.	—	3
1707	Plusia chrysodon Bd.	—	4
1708	„ Ypsilon Bd.	—	4
1709	Heliothis armigera Hüba.	—	3
1710	„ peltigera Hüb.	—	4
1711	Acontia sauleti Bd.	—	3
1712	Ophiusa agira F.	—	4
1713	„ parallelaris F.	—	4
1714	„ rotunda	—	3
1715	„ tericans Bd.	—	6
1716	„ tirhaca F.	—	8
1717	„ zabulon Bd.	—	4
1718	„ 3 spec.	—	8
1719	Homoptera Bd.	—	4
1720	Anthophila 2 sp.	—	6
1721	Erastria dinidiata Bd.	—	3
1722	Agarista decora F.	—	3
1723	„ lectrix Bd.	—	6
1724	Geometra ovaria Bd.	—	4
1725	„ ofraria Bd.	—	4
1726	„ oloropennaria Bd.	—	3
1727	„ dotata F.	—	3
1728	„ paniaria Bd.	—	4
1729	„ hemataria Bd.	—	3
1730	„ murinaria Hübn.	—	3
1731	„ pelargonaria Bd.	—	4
1732	„ sacraria Hübn.	—	2
1733	„ tofonia	—	3
1734	„ 2 spec.	—	2
1735	Fidonia caparia Bd.	—	3
1736	„ spec.	—	3
1737	Ctenica capensis Bd.	—	4
1738	„ spec.	—	3
1739	Botys farinalis L.	—	2
1740	„ forficalis Hübn.	—	3
1741	„ hybridalis	—	3
1742	„ 30 spec.	3	—
1743	Herminia capalis Bd.	—	3
1744	„ rostralis F.	—	3
1745	Crambus 17 spec.	1	8
1746	Tinea vitella Bd.	—	3
1747	„ xanthela Bd.	—	3
1748	„ 28 spec.	2	8
1749	Yponomeuta spec.	—	4
1750	Adela Drégella Bd.	—	12
1751	„ spec.	—	8
1752	Ptrophorus 3 spec.	1	—
1753	Orneodes spec.	—	2
	Diptera.		
1754	Culex caffrorum M. B.	—	2
1755	Tipula grammica M. B.	—	3
1756	„ fulvescens M. B.	—	3
1757	Simulia caffra M. B.	—	2
1758	Bibio rostratus M. B.	—	2
1759	Pangonia rufipes M. B.	—	5
1760	„ angulata F.	—	2
1761	„ lateralis F.	—	2
1762	„ atricornis W.	—	2
1763	„ varicolor W.	—	2
1764	„ rostrata L.	—	2
1765	„ plebeia M. B.	—	5
1766	„ caffra M. B.	—	4
1767	„ spiloptera W.	—	3
1768	Tabanus venustus M. B.	—	4
1769	„ socius M. B.	—	4
1770	„ gregarius M. B.	—	3
1771	„ pumilis M. B.	—	2
1772	„ fugax M. B.	—	4
1773	„ pavens M. B.	—	3
1774	„ lugubris M. B.	—	5
1775	„ biguttatus W.	—	4
1776	„ aulicus M. B.	—	4
1777	„ biplagiatus M. B.	—	4
1778	„ spec.	—	2
1779	Haematopota ocellata W.	—	4
1780	„ imbrium W.	—	2
1781	Rhinomyza edentula W.	—	3
1782	Silvius denticornis W.	—	3
1783	Chrysops perfusus M. B.	—	3
1784	Midas callosus W.	—	3
1785	„ arcanus M. B.	—	4
1786	„ spec.	—	2
1787	Nemestrina longirostis W.	—	4
1788	„ fuliginosa M. B.	—	2
1789	„ accincta W.	—	3
1790	„ spec.	—	2
1791	Anthrax apicalis W.	—	4
1792	„ dux W.	—	2
1793	„ gaoma M. B.	—	4
1794	„ procris M. B.	—	4
1795	„ heros W.	—	4
1796	„ circe M. B.	—	4
1797	„ pictipennis W.	—	2
1798	Bombylius analis F.	—	4
1799	„ thoracicus F.	—	4
1800	„ micans F.	—	2
1801	„ hypoleucus W.	—	3
1802	„ lateralis F.	—	2
1803	„ venustus	—	4
1804	„ delicatus W.	—	2
1805	Phthiria capensis W.	—	3
1806	Cyllenia varia M. B.	—	3
1807	Corsomyza pennipes W.	—	3
1808	„ nigripes W.	—	3
1809	„ clavicornis W.	—	3
1810	Dasypogon lacertosus M. B.	—	4
1811	„ stictieus M. B.	—	3
1812	„ fulvipes M. B.	—	2
1813	„ nigritulus M. B.	—	2
1814	„ quadratus W.	—	4
1815	„ andrenoides W.	—	3
1816	„ caliginosus M. B.	—	3
1817	„ capensis F.	—	2
1818	„ lacteipennis W.	—	2
1819	„ afer W.	—	2
1820	„ aulicus W.	—	3
1821	„ faustus M. B.	—	3
1822	„ fustivus M. B.	—	3
1823	„ armatus M. B.	—	3
1824	„ dilutus M. B.	—	3
1825	„ pavidus M. B.	—	3
1826	„ spadiceus M. B.	—	3
1827	„ chalybeus M. B.	—	3
1828	„ spec.	—	2
1829	Damalis abdominalis M. B.	—	3
1830	„ capensis W.	—	2
1831	„ femoralis M. B.	—	3
1832	Sargus posticus W.	—	2
1833	Asilus apricus M. B.	—	4
1834	Asilus angulatus M. B.	—	3
1835	„ infuscatus M. B.	—	3
1836	„ raptor M. B.	—	6
1837	„ mimus W.	—	3
1838	„ nigricans W.	—	3
1839	„ chalcogaster W.	—	3
1840	„ molitor W.	—	3
1841	„ erraticus M. B.	—	3
1842	„ lupinus M. B.	—	3
1843	„ comptus M. B.	—	3
1844	„ sericeus M. B.	—	3
1845	Laphria flavipes W.	—	3
1846	Cyrtus validus W.	—	3
1847	Stratiomys scalaris M. B.	—	2
1848	Microdon dilucens M. B.	—	3
1849	Paragus posticus M. B.	—	2
1850	„ rufipes M. B.	—	3
1851	Eumerus instabilis M. B.	—	2
1852	„ balteatus M. B.	—	3
1853	Xylota tremula M. B.	—	3
1854	Merodon parietum Meigen.	—	3
1855	Syrphus Salvia W.	—	2
1856	„ rostratus W.	—	2
1857	„ connexus M. B.	—	2
1858	„ continuus M. B.	—	2
1859	„ dolabratus M. B.	—	2
1860	„ perfluus M. B.	—	2
1861	„ calycinus M. B.	—	2
1862	Psilopus aulicus M. B.	—	2
1863	Eristalis crassipes F.	—	2
1864	„ modestus W.	—	2
1865	„ taeniops W.	—	2
1866	„ haplops W.	—	2
1867	Empis bivittata W.	—	2
1868	Conops rubiginosa M. B.	—	2
1869	Ocyptera marginalis W.	—	2
1870	Oestrus Ovis L.	—	2
1871	Phasia taeniata W.	—	2
1872	Gonia fasciata M. B.	—	2
1873	„ bimaculata W.	—	2
1874	„ picta W.	—	2
1875	Sarcophaga distincta M. B.	—	3
1876	„ regularis W.	—	3
1877	Tachina difficilis M. B.	—	3
1878	„ scita M. B.	—	3
1879	„ diabolus W.	—	2
1880	„ aestuans M. B.	—	2
1881	„ acrosa M. B.	—	2
1882	„ suavis M. B.	—	2
1883	Dexia murina M. B.	—	3
1884	Idia rostrata W.	—	3
1885	„ abdominalis M. B.	—	3
1886	„ punctulata W.	—	3
1887	Musca costalis W.	—	4
1888	„ chloropyga W.	—	1
1889	„ cyanea F.	—	1
1890	„ caesarion Meigen	—	2
1891	„ lucida M. B.	—	2
1892	„ vomitoria L.	—	1
1893	„ domestica L.	—	1
1894	„ cinereria M. B.	—	2
1895	„ vitripennis Meigen.	—	2
1896	Anthomyia griseescens M. B.	—	2
1897	„ tempestatum W.	—	2
1898	„ aprica M. B.	—	2
1899	Scatophaga soror W.	—	1
1900	Ortalis chalybea W.	—	2
1901	„ cyanea M. B.	—	2
1902	„ scripta M. B.	—	2
1903	„ 4 fasciata M. B.	—	2
1904	Trypeta dolabrata M. B.	—	2
1905	„ inscripta M. B.	—	2
1906	„ confluens W.	—	1
1907	Diopsis terminalis M. B.	—	4
1908	„ obscura M. B.	—	4
1909	„ fasciata M. B.	—	3
1910	„ erythrocephala M. B.	—	4
1911	Platystoma asphaltina W.	—	2
1912	Platycephala varula M. B.	—	2
1913	Dacus armatus W.	—	3
1914	„ fuscatus W.	—	2
1915	Borborus ursinus W.	—	1
1916	Ulidia nigrimana	—	2
1917	Hippobosca rufipes v. Olf.	—	4
1918	„ spec.	—	3
1919	Sapromyza argus M. B.	—	3
1920	Ceria caffra M. B.	—	3
1921	Bittacus capensis M. B.	—	3
1922	Sialis spec.	—	2
1923	Perla spec.	—	2
1924	Ephemera spec.	—	2
1925	Phryganea spec.	—	2
1926	Procus spec.	—	2
1927	Berytus spec.	—	2
1928	Sigara irrorata M. B.	—	2
1929	Cixia spec.	—	2
1930	Notonecta spec.	—	2
	Dipter. var. 100 spes. s. nom.	5	
	Aus CHINA, defect.		
1931	Cicindela chinensis F.	—	4
1932	„ Duponti D.	—	4
1933	Trochalus limbatus F.	—	3
1934	„ similis D.	—	3
1935	„ spec.	—	4
1936	Gymnopleurus sinuatus F.	—	3
1937	Copris molossus F.	—	3
1938	Onthophagus scniculus F.	—	4
1939	Scarabaeus oromedon F. m. f.	—	10
1940	Euchlora chrysea Kollor.	—	4
1941	„ viridis F.	—	3
1942	Anomala subsulcata D.	—	3
1943	„ laevicollis D.	—	3
1944	„ spec.	—	4
1945	Popilia viridicoerulea S.	—	3
1946	Mylabris Sidae F.	—	4
1947	Lytta spec.	—	4
1948	Hypomeces squamosus F.	—	4
1949	Calandra longipes F.	—	10
1950	Sagra purpurea F.	—	4
1951	Blatta latissima H.	—	3
1952	Tesseratoma papillosa	—	3
1953	Halys Fulla T.	—	3
1954	Coreus melagris F.	—	2
1955	„ tenebrosus F.	—	2
1956	Cicada atrata F.	—	4
1957	„ maculata F.	—	4
1958	„ philaemata F.	—	4
1959	Fulgora candelaria F.	—	4
1960	Cercopis victima G.	—	4
1961	Papilio agamemnon L.	—	4
1962	„ erino F.	—	2
1963	„ pammon Cr.	—	4
1964	„ panope L.	—	4
1965	„ polytes L.	—	4
1966	„ xuthus L.	—	3
1967	Pieris glycerie Cr.	—	6
1968	„ porsenna Cr.	—	3
1969	Diadema bolina	—	4
1970	Anthocharis pirene L.	—	4
1971	Xanthidia hecabe L.	—	2
1972	Rhodocera florella Bd.	—	4
1973	Limenitis leucothoe L.	—	3
1974	Danais genutia Cr.	—	4
1975	„ limniace Cr.	—	2
1976	Euploea alcothoe Cr.	—	4
1977	„ chinensis Cr.	—	2
1978	„ ulavia Cr.	—	4
1979	Vanessa aonis Cr.	—	2
1980	„ asterie L.	—	2
1981	„ ocnone L.	—	2
1982	„ orithia Cr.	—	2
1983	Saturnia atlas L.	—	8

Erklärung der Zeichen

B.	Burmeister.	D.	Dejean.	H.	Herbst.
Bd.	Boisduval.	F.	Fabricius.	J.	Illiger.
C.	Cherrolat.	d. G.	de Géer.	K.	Klug.
Cr.	Cramer.	G.	Germar.	L.	Linné.
M. B.	Museum Berolin.				
O.	Olivier.				
S.	Schoenherr.				
T.	Thunberg.				
W.	Wiedemann.				

1 ℔ hat 16 ß. Der Friedrd'or wird zu 13 ℔ 8 ß, der Holländ. Ducaten zu 7 ℔ 12 ß, der Preussische Thaler zu 2 ℔ 8 ß angenommen, und bitte um portofreie Briefe.

Zur Auswahl können weiter keine Insecten versandt werden.

Auf Ihre Rabatt gnigst

C. F. Drège.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Das Stück in Hamb. Courr.	℔	ß
	ceteus Cr.	—	4
	abrinervis Bd.	—	12
	spec.	—	8
	appolonica Cr.	2	—
	apensis F.	—	10
	natali Bd.	2	8
	spec.	3	—
	calaris Donovan.	—	12
	libania Cr.	—	6
	spec.	—	4
	spec.	2	—
	tens Hubner.	—	4
	idium Bd.	—	4
	getum L.	—	3
	ffusa F.	—	3
	lligera.	—	4
	rescens Bd.	—	6
	spec.	1	—
	spec.	—	6
	spec.	—	4
	2 spec.	—	6
	spec.	—	4
	trida Bd.	—	4
	c.	—	3
	triplasia Bd.	—	3
	ysodon Bd.	—	4
	silon Bd.	—	4
	rmigera Hubn.	—	3
	eltigera Hub.	—	4
	buleti Bd.	—	3
	lgira F.	—	4
	arallelaris F.	—	4
	epanda	—	3
	ubricans Bd.	—	6
	rrhaea F.	—	8
	abulon Bd.	—	4
	spec.	—	8
	Bd.	—	4
	2 sp.	—	6
	imidiata Bd.	—	3
	ecora F.	—	3
	ectrix Bd.	—	6
	rvaria Bd.	—	4
	tafraria Bd.	—	4
	chloropennaria Bd.	—	3
	elutata F.	—	3
	roniaria Bd.	—	4
	noemataria Bd.	—	3
	murinaria Hubn.	—	3
	clargonaria Bd.	—	4
	aceraria Hubn.	—	2
	rofonia.	—	3
	0 spec.	2	—
	paria Bd.	—	3
	ee.	—	3
	pensis Bd.	—	4
	es.	—	3
	alis L.	—	2
	alis Hübn.	—	3
	dalis	—	3
	ee.	3	—
	apalis Bd.	—	3
	ostralis F.	—	3
	spec.	1	8
	a Bd.	—	3
	lla Bd.	—	3
	ee.	2	8
	spec.	—	4
	ella Bd.	—	12
		—	8
	8 spec.	1	—
	ee.	—	2
	tera.		
	orum M. B.	—	2
	unica M. B.	—	3
	escens M. B.	—	3

№	Das Stück in Hamb. Courr.	℔	ß
1757	Simulia caffra M. B.	—	2
1758	Bibio rostratus M. B.	—	2
1759	Pangonia rufipes M. B.	—	6
1760	„ angulata F.	—	2
1761	„ lateralis F.	—	2
1762	„ atricornis W.	—	2
1763	„ varicolor W.	—	2
1764	„ rostrata L.	—	2
1765	„ plebeia M. B.	—	6
1766	„ caffra M. B.	—	4
1767	„ spiloptera W.	—	3
1768	Tabanus venustus M. B.	—	4
1769	„ socius M. B.	—	4
1770	„ gregarius M. B.	—	3
1771	„ pumilis M. B.	—	2
1772	„ fugax M. B.	—	4
1773	„ pavens M. B.	—	3
1774	„ lugubris M. B.	—	5
1775	„ biguttatus W.	—	4
1776	„ aulicus M. B.	—	4
1777	„ biplagiatus M. B.	—	4
1778	„ spec.	—	3
1779	Haematopota ocellata W.	—	2
1780	„ imbrium W.	—	4
1781	Rhinomyza edentula W.	—	2
1782	Silvius denticornis W.	—	3
1783	Chrysops perfusus M. B.	—	3
1784	Midas callosus W.	—	3
1785	„ arcanus M. B.	—	4
1786	„ spec.	—	2
1787	Nemestrina longirostis W.	—	3
1788	„ fuliginosa M. B.	—	2
1789	„ accincta W.	—	2
1790	„ spec.	—	2
1791	Anthrax apicalis W.	—	2
1792	„ dux W.	—	2
1793	„ gnoma M. B.	—	2
1794	„ procris M. B.	—	2
1795	„ heros W.	—	4
1796	„ circe M. B.	—	4
1797	„ pictipennis W.	—	2
1798	Bombylius analis F.	—	4
1799	„ thoracicus F.	—	4
1800	„ micans F.	—	2
1801	„ hypoleucus W.	—	3
1802	„ lateralis F.	—	2
1803	„ venustus	—	4
1804	„ delicatus W.	—	2
1805	Phthiria capensis W.	—	2
1806	Cyllenia varia M. B.	—	3
1807	Corsomyza pennipes W.	—	3
1808	„ nigripes W.	—	3
1809	„ clavicornis W.	—	3
1810	Dasypogon lacertosus M. B.	—	4
1811	„ sticticus M. B.	—	3
1812	„ fulvipes M. B.	—	2
1813	„ nigritulus M. B.	—	2
1814	„ quadratus W.	—	4
1815	„ andrenoides W.	—	3
1816	„ caliginosus M. B.	—	3
1817	„ capensis F.	—	2
1818	„ lactipennis W.	—	2
1819	„ afer W.	—	2
1820	„ aulicus W.	—	3
1821	„ faustus M. B.	—	3
1822	„ fustivus M. B.	—	3
1823	„ armatus M. B.	—	3
1824	„ dilutus M. B.	—	3
1825	„ pavidus M. B.	—	3
1826	„ spadiceus M. B.	—	3
1827	„ chalybeus M. B.	—	3
1828	„ spec.	—	2
1829	Damalis abdominalis M. B.	—	3
1830	„ capensis W.	—	2
1831	„ femoralis M. B.	—	3
1832	Sargus posticus W.	—	2
1833	Asilus apricus M. B.	—	4

№	Das Stück in Hamb. Courr.	℔	ß
1834	Asilus angulatus M. B.	—	3
1835	„ infuscatus M. B.	—	3
1836	„ raptor M. B.	—	6
1837	„ mimus W.	—	3
1838	„ nigricans W.	—	3
1839	„ chalcogaster W.	—	3
1840	„ molitor W.	—	3
1841	„ erraticus M. B.	—	5
1842	„ lupinus M. B.	—	3
1843	„ comptus M. B.	—	3
1844	„ sericeus M. B.	—	3
1845	Laphria flavipes W.	—	3
1846	Cyrtus validus W.	—	3
1847	Stratiomys scalaris M. B.	—	2
1848	Microdon dilaceus M. B.	—	2
1849	Paragus posticus M. B.	—	2
1850	„ rufipes M. B.	—	3
1851	Eumerus instabilis M. B.	—	2
1852	„ balteatus M. B.	—	3
1853	Xylota tremula M. B.	—	3
1854	Merodon parietum Meigen.	—	3
1855	Syrphus Salvia W.	—	2
1856	„ rostratus W.	—	2
1857	„ connexus M. B.	—	2
1858	„ continuus M. B.	—	2
1859	„ dolabratus M. B.	—	2
1860	„ perfluus M. B.	—	2
1861	„ calyceinus M. B.	—	2
1862	Psilopus aulicus M. B.	—	2
1863	Eristalis crassipes F.	—	2
1864	„ modestus W.	—	2
1865	„ taeniops W.	—	2
1866	„ haplops W.	—	2
1867	Empis bivittata W.	—	2
1868	Conops rubiginosa M. B.	—	2
1869	Ocyptera marginalis W.	—	2
1870	Oestrus Ovis L.	—	2
1871	Phasia taeniata W.	—	2
1872	Gonia fasciata M. B.	—	4
1873	„ bimaculata W.	—	4
1874	„ picta W.	—	2
1875	Sarcophaga distincta M. B.	—	4
1876	„ regularis W.	—	4
1877	Tachina difficilis M. B.	—	2
1878	„ scita M. B.	—	3
1879	„ diabolus W.	—	2
1880	„ aestuans M. B.	—	4
1881	„ aerosa M. B.	—	2
1882	„ suavis M. B.	—	2
1883	Dexia murina M. B.	—	3
1884	Idia rostrata W.	—	3
1885	„ abdominalis M. B.	—	3
1886	„ punctulata W.	—	3
1887	Musca costalis W.	—	4
1888	„ chloropyga W.	—	3
1889	„ cyanea F.	—	2
1890	„ caesarion Meigen	—	2
1891	„ lucida M. B.	—	2
1892	„ vomitoria L.	—	2
1893	„ domestica L.	—	1
1894	„ cineraria M. B.	—	2
1895	„ vitripennis Meigen.	—	2
1896	Anthomyia grisescens M. B.	—	2
1897	„ tempestatum W.	—	3
1898	„ aprica M. B.	—	2
1899	Scatophaga soror W.	—	3
1900	Ortalis chalybea W.	—	3
1901	„ cyanea M. B.	—	3
1902	„ scripta M. B.	—	3
1903	„ 4 fasciata M. B.	—	3
1904	Trypeta dolabrata M. B.	—	3
1905	„ inscripta M. B.	—	2
1906	„ confluens W.	—	3
1907	Diopsis terminalis M. B.	—	2
1908	„ obscura M. B.	—	3
1909	„ fasciata M. B.	—	2
1910	„ erythrocephala M. B.	—	4

№	Das Stück in Hamb. Courr.	℔	ß
1911	Platystoma asphaltina W.	—	2
1912	Platycephala varula M. B.	—	2
1913	Dacus armatus W.	—	3
1914	„ fuscatus W.	—	2
1915	Borborus ursinus W.	—	1
1916	Ulidia nigrimana	—	2
1917	Hippobosca rufipes v. Oliv.	—	4
1918	„ spec.	—	3
1919	Sapromyza argus M. B.	—	2
1920	Ceria caffra M. B.	—	3
1921	Bittacus capensis M. B.	—	2
1922	Sialis spec.	—	2
1923	Perla spec.	—	2
1924	Ephemera spec.	—	2
1925	Phryganea spec.	—	2
1926	Procus spec.	—	2
1927	Berytus spec.	—	2
1928	Sigara irrorata M. B.	—	2
1929	Cixia spec.	—	2
1930	Notonecta spec.	—	2
	Dipter. var. 100 spes. s. nom.		6

Aus CHINA, defect.

1931	Cicindela chinensis F.	—	4
1932	„ Duponti D.	—	3
1933	Trochalus limbatus F.	—	3
1934	„ similis D.	—	3
1935	„ spec.	—	4
1936	Gymnopleurus sinuatus F.	—	3
1937	Copris molossus F.	—	3
1938	Onthophagus scuiculus F.	—	4
1939	Scarabaeus oromedon F. m. f.	—	10
1940	Euchlora chrysea Koller.	—	4
1941	„ viridis F.	—	2
1942	Anomala subsulcata D.	—	3
1943	„ laevicollis D.	—	3
1944	„ spes.	—	3
1945	Popilia viridicoerulea S.	—	3
1946	Mylabris Sidae F.	—	4
1947	Lytta spec.	—	3
1948	Hypomeces squamosus F.	—	4
1949	Calandra longipes F.	—	10
1950	Sagra purpurea F.	—	4
1951	Blatta latissima H.	—	4
1952	Tesseratoma papillosa	—	3
1953	Halys Fullo T.	—	3
1954	Coreus melagris F.	—	2
1955	„ tenebrosus F.	—	2
1956	Cicada atrata F.	—	2
1957	„ maculata F.	—	2
1958	„ philaemata F.	—	3
1959	Fulgora candelaria F.	—	4
1960	Cercopis victima G.	—	2
1961	Papilio agamemnon L.	—	4
1962	„ erino F.	—	2
1963	„ pammon Cr.	—	4
1964	„ panope L.	—	4
1965	„ polytes L.	—	4
1966	„ xuthus L.	—	3
1967	Pieris glycerie Cr.	—	6
1968	„ porsenna Cr.	—	3
1969	Diadema bolina	—	4
1970	Anthocharis pirene L.	—	4
1971	Xanthidia hecabe L.	—	2
1972	Rhodocera flurella Bd.	—	4
1973	Limenitis leucothoe L.	—	3
1974	Danais genutia Cr.	—	3
1975	„ limniace Cr.	—	4
1976	Euploea alcothoe Cr.	—	2
1977	„ chinensis Cr.	—	4
1978	„ niavia Cr.	—	2
1979	Vanessa aouis Cr.	—	4
1980	„ asterie L.	—	4
1981	„ oenone L.	—	2
1982	„ orithia Cr.	—	2
1983	Saturnia atlas L.	—	8

Erklärung der Zeichen.

				M. B.	Museum Berolin.
meister.	D.	Dejean.	H.	Herbst.	O.	Olivier.
duval.	F.	Fabricius.	J.	Illiger.	S.	Schoenherr.
vrolat.	d. G.	de Géer.	K.	Klug.	T.	Thunberg.
mer.	G.	Germar.	L.	Linné.	W.	Wiedemann.

1 8 ß, der Holländ. Ducaten zu 7 ℔ 12 ß, der Preussische Thaler zu 2 ℔ 8 ß angenommen, und bitte um portofreie Briefe.

Zur Auswahl können weiter keine Insecten versandt werden.

Auf Ihre Rabatt gnigen

C. F. Drège.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

187 213

2.25

186

Herrn Senator
von Heyden
Frankfurt a/Main

Hamburg d. 6 Octb 1841

103

Hochwohlgeboren

[illegible] Lepidopteren. [illegible] [illegible] [illegible]

k in Hamb. Cour.	℔	ß
eteus Cr.	—	4
abrinervis Bd.	—	12

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1757	Simulia caffra M. B.	—	2
1758	Bibio rostratus M. B.	—	2
1759	Pangonia rufipes M. B.	—	8

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1834	Asilus angulatus M. B.	—	3
1835	" infuscatus M. B.	—	6
1836	" raptor M. B.	—	6

№	Das Stück in Hamb. Cour.	℔	ß
1911	Platystoma asphaltina W.	—	2
1912	Platycephala varula M. B.	—	3
1913	Dacus armatus W.	—	3

Dem Herrn Senator
Meyden
Hieby ein klein Kistel
in gras Leinen
gepr:
S.r & Sen.r v.r Heyden
Frankfurt
a
Main.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

187

Droste von Kerkerink. Ernst, Constant. Freih.

in

Stapel

b. Münster, Westphal.

†.

für Lieut. an Heinrich Meyer in Offenbach.

die Güte Sie haben, mir neue Arten anzeigen gefälligst
(für welche Freundschaftlich von den Doubletten) ihren Ausgestopften
Vogel und Thieren zu machen, neben für ihre Bälge oder
Tausch, (oder schöne in duplicate Exemplare) mir über zu lassen
die Güte haben wollten; da mir in dieser Sammlung, so groß
auch die Mannigfaltigkeit ist, noch manche fehlt, und welche
Ihnen Vergnügen machen, so werde ich Künftig, Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

190 213
2.25 2n
191
96

104

192

Wohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Hofrath!

Im April des jetzt 1817 sollte der Herr Hofrath Meijer aus Giessen, (dessen angenehmen Bekanntschaft ich in Frankfurt zu machen das Vergnügen hatte,) die Güte, mir in Hinsicht meiner Naturalien Sammlungen die nöthige Nachricht zu ertheilen, das Ihro Wohlgeboren eine vorzügliche Sammlung besäßen, und wahrscheinlich die Güte haben würden, sich mit Mir, da ich überhaupt eine reichere Sammlung von allerley Naturalien, i.s.w. (als fossilen Vogel, knöchen Thier, Amphibien, Schlangen, Mineralien, Muscheln, und anderen Raritäten w:) die, und wirklich eine recht vollständige Sammlung besitze, in einen Correspondenz einzulassen: Ich schrieb gleich seinem Vorschlage gemäß an ihn, erhielt aber keine Antwort. Es ist hier nicht selten der Fall, das freundliche Briefe nicht gut überkommen, und bemerkte daher, das auch mein freundlicher Brief der nämlich Schicksal gehabt habe; mit dem ersuchen, mir eine Antwort gütigst zu freundlich zu schreiben.

Zugleich erlaube ich, selbst Ihnen eine Fortsetzung meiner Verartigen Correspondenz mit Mir angenehm seyn sollte, die Güte zu haben, mir einen kleinen Anzeige gefälligst (für mich hauptsächlich von den Doubletten) Ihrer angeschafften Vogel und Thieren zu machen, worüber ich Ihnen Tausch, (oder Ihnen in beliebige Exemplare) mir überzulassen die Güte haben wollten; da mir in meiner Sammlung, so gross auch die meinige schon ist, noch manche fehlt, und sollte es Ihnen Vergnügen machen, so werde ich künftig, Ihnen

k in Ha
eteus C
abrinervi

[illegible] Klasse Käfer meine Wenigkeit [illegible]
meine Nebenstunden und die kalten Sommertage sind sehr
ganz beschäftigt mit Europäischen, und ausländische Falter noch mehr
sie sammle daher, und ordne, künstlich Varietäten
von Schmetterlinge und Bastarde; und in dieser Hinsicht
bin ich so frey Ihnen bitten, mir Flügeln von Sph: atropos
Convolvuli und Oenotherae, und Sphinge Celerio, wenn
in Ihrer Gegend sie Gelt welche sie erhalten sind,
gegen gleich baare Zahlung sie überlassen — ich könnten
nicht lange sie halten sie selber sorte, da ich
Ihnen Bastarden sie Ziehen beizwecke, und die Raupen
nicht schonen: sie würden sehr Hochwohlgeboren
mir neue besondere Freundschaft beizeigen, welche sie
mir ein sehr schon verdienen Könnten; da ich sehr
Dass in der Gegenden Frankfurts ebige oft nicht selten
anzutreffen sind.

Kann ich Ihro Wohlgeboren auch mit oder andere Art
wieder zur Vermehrung ihrer Sammlung dienen,
so bereit bin, dass ich diese angenehme Gelegenheit
mich Ihnen zu erfüllen mich bestreben werde, und
bitte mich mit hochzuschätzen Hochschätzung zu nennen

Ihro Wohlgeboren

Stapel den 20 August 18

Adresse
p. Münster

ergebenster Diener
Ernst Constantin Rud. Freiherr
von Droste, gewesener Kirchherr
zu Stapel.

190

213

191

189

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

k in Ha
eteus C
abrinervi

190

Duvernoy. Georg, Louis.

in

Strasburg

geb. 6. 8. 1777 in Mömpelgard

† 1. 3. 1855. – Professor.

Paris
im Jardin du Roi

Ce 4. S. 1838.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mr. le Comte de Gaydon, Sénateur &c &c
à Francfort

105

Monsieur le Comte,

Votre zèle pour la science des insectes que vous cultivez avec tant de succès, vous fera faire, j'en suis certain, avec beaucoup de plaisir, la connoissance de Mr. Audouin, Professeur de cette partie de la Zoologie, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Veuillez l'accueillir avec votre bienveillance accoutumée et permettre que je me rappelle, dans votre belle ouvrage, à votre bon souvenir.

Recevez, Monsieur le Comte, l'assurance de ma haute estime

Votre obéissant serviteur

C. Duvernoy
Mbre

Paris
au Jardin du Roi
Ce 4. S. 1838.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

193

193

192

196

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anonymum

de Comte de Haydn

Senatum Rs Rs

Francfort.

193

Ecklon, C. F.

in

Hamburg

Institutshändler. Bevollmächtigter in Südafrika

4.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

195

196

Hamburg den 16 Januar 1835.

106

Hochwohlgeboren

bin ich so frei hierbei das gewünschte Verzeichniß einzelner auch Ihre Asseita mitgebrachten Instrumente zur gefälligen Rücksendung zu übersenden.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebener Diener.

C. F. Ecklon

Hr. Hofmahlgraben

T. T.
HAMBURG
16. Jan. 35.

dem Herrn Doctor v. Heiden

in

franc.

Frankfurt a/M.

5

Graf Erbach-Erbach

4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zabern am 24. Juli 1821.

(107)

Euer Hochwohlgeboren

Dauern ist mir Ihre gefällige Einladung, mit der Versicherung, daß ich einen Hochzeitsgast Ihres Hauses darin zu sehen gewünscht hätte, nicht zugekommen, hier in Zabern aber nicht nachgeblieben, sondern sie Ihnen nachgesandt worden.

Indeß, und mag langsame etwas Schuld daran haben ich das Fest Ihres Hochzeitstages verfehlte — ob Sie Ihren Hochzeitstag übergangen sind, oder Ihre Einladung nicht bis dahin gekommen, weiß ich nicht.

Ihre Gattin, meine gnädige Frau Schwester, wird es mir verzeihen, daß ich Ihr Fest mit der Versicherung meiner herzlichen Theilnahme begehe,

Euer Hochwohlgeboren,

ganz ergebener Diener,

Ludwig Arnim.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

198

197

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pour Excellence
Son Excellence Monsieur le Lieutenant
Colonel Baron de Gagern.

Ici

Francfort sur le Mein

198

Erichson, Wilhelm, Ferdinand

in

Berlin

geb. 26. 11. 1809 in Stralsund

† 18. 11. 1849 in Berlin

Dr. med. u. Prof.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

701

Hrn. Hofmusikgeber.

109

703

713

708

704

Frankf. d. 3. Jan. 1839 Der Bd. 5 von
Hyphens Brit. Entomology auf 5–6 Wochen
abwesend. Baumhof Das Museum Entomologica
im Taunus gründen / Faber

108

Hochgeehrter Herr



Nachdem ich mich seit einer Reihe von Jahren mit
Insecten angelegentlich beschäftigt habe, mögen mich die für
den meisten Theil der Coleopteren Arten nöthi-
gen in dem hiesigen Museum, besonders auch
die für meinen Brandenburgischen Fauna die Be-
schreibung Monographie der Brachelytren fehlen
Museumskataloge aufgefordert, eine Forschung darüber
daß ich, um keine Lücke bestehen zu lassen, mich
mußte, da in ganz Berlin weder die öffentliche
Bibliothek mir nicht weiter nützig, als es selbst durch
Mittheilung meines Freundes Wissenschaft in Berlin
mit Gefälligkeit beförderlaw Briefe eine selbst Fund
Journal zu Gebote stellte, unterbrochen ich mein am
hin ich damit auf die viel langsamen Briefe
Insecten der Versand warten kann, daß ich den
selben durch reisen, als daß den Frühling der
benutzen wird. Da es mir aber sehr daran gele
bis zur Abreise vollendet zu sehen, da ich ja,
muß auf keine andere Arbeit einlassen darf
unter diesen Umständen mir die Forschung
der Staphylinen Arten, welche die Staphylinen

701 703 704

Hrn. Hofmeister Hansen.

109

Frankfurt a. M. d. 3. Jan. 1839 199

Berlin d. 4ten Januar 1838.

Frankfurt a. M. d. 3. Jan. 1839 Die Bd. 5 von Stephens Brit. Entomology ist 5–6 Wochen abgeschickt. Dr. Arnold hat sich Chemnitz Tuberculose im Taunus gesund gesoffen, aber

108

Hochzuverehrender Herr



Nachdem ich mich seit einer Reihe von Jahren mit besonderem Interesse mit der Familie der Ha. beschäftigt habe, mögen mich die für verfassenden Hülfsmittel, namentlich die Vereinigung der meisten Typen der Hoffmannsegg'schen Arten mit der Gattung Hoffmannsegg'schen und Kraftsen Samm. lung in dem hiesigen Museum, besonders aufforderten müssten, selbst die Bearbeitung dieser Fami. lie für meine Brandenburgische Fauna die Ausführung einer lange gehegten Absicht einer voll. ständigen Monographie der Brachelytren forbei. So ist diese Arbeit also in einem der dichtigsten Museen entstanden, dem Bestimmung derselben bisher nur einmal Aufgabe gewesen, das ist, um keine Lücke besitzen zu lassen, nur die Skydsen'schen Illustrations of Brit. Ent. benützen mußte. Da in ganz Berlin weder die öffentlichen noch die Privatbibliotheken viel Brauchbares besitzen, blieb mir nichts weiter übrig, als es selbst anzuschaffen, wozu ich anfangs die mir sehr empfohlene Uebersiedlung meines Freundes Wissmann in Aussicht nahm, falls es doch zu lange Zeit bleiben sollte mit Gelegenheit beförderlichen Briefes eine solche Zeitverlust entstand, daß ich auf anderen Wege Exemplare genug zu gelangen glaubte, überdies ist mein am Anfange die Besorgung der gedachten Werke leider bin ich damit auf die viel langsameren Wege des Buchhandels gekommen, und obgleich bisher der Eintreffen der Bestellungen manches kaum, daß ich davon jetzt nur wenige fehle, als schon seit mehreren Mo. naten damit rechnen, als daß den Schluß der Arbeit die Vollendung mit Sicherheit gänzlich ein. treffen wird. Da es mir aber zu sehr darum gelegen ist, die meine Monographie der Staphylinen mit die für Afterwerke vollendet zu sehen, da ich ja, um mich in den Staphylinen einiger fremd zu machen, mich auf keine andere Arbeit einlassen darf — werden Sie es vielleicht entschuldigen, wenn ich unter diesen Umständen mir die Freiheit nehme, Sie mit der Bitte anzugehen, mir den Rest der Staphylinen Werke, welche die Staphylinen enthält, auf einige Zeit zur Benützung anzu. vertrauen. Sie sind meines Wissens der einzige Besitzer derselben in Deutschland, auf jeden Fall wende ich mich mit den geringsten Zweifeln an Ihre Liberalität. Bei der Voraussetzung der gütigen Gewährung meiner Bitte erlaube ich mir hinzuzufügen, daß Sie bei Uebersendung der Bücher die Adresse des hiesigen Zool. Museums zu benützen müssten, da diesem alle meine Arbeiten angehören.

Mit den besten Empfehlungen meines verehrten Vorgesetzten, des Herrn Prof. Klug verbleibe ich

Ihr ergebenster

Erichson, Dr. Ph.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hrn. Hofmaßgaberen.

109

701

703

703

704

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hrn. Hofgerichtsadvocaten

109

701

703

713

709

704

700

Herrn

Herrn Bürgermeister von Heyden.

Hochwohlgeboren

Zu


Frankfurt.

a/Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main







Hr. Hochwohlgeboren.

108

701

703

703

n. 25.

708

Hochstr.

706

verfehle ich nicht Ihr Wohlgeboren mit der gütigst anvertrauten Uhr Kapitel des Regenschirm Schlüssel Hochstr. ob Bockenh. Landstr. meinen ergebensten Dank abzustatten, so muß für die große Gefälligkeit, die Uhr mir dem Hemmschuh meiner Bitte angefügt haben, als auch für die Nachsicht bei der eigenmächtigen Verlängerung der mir von Ihnen angebotenen 8 Tage, wofür ich Ihnen Dank sage, mit der Versicherung der größten Aufmerksamkeit Ihnen meiner wärmsten Gefühle Ihnen zu Ihrem Empfang Ihnen gefällig gefallen, mich Ihnen bitten darf.

Ich habe mir sehr viele Mühe gegeben, mit den Regenschirm Bestellungen die Leute zu übernehmen, und trotz dem daß ich in der gegenwärtig traurigen Familie des mir persönlich bekannten Herrn aufgehalten (Herrn) und daß ich noch gerade mehr einige Gewandtheit im Uebernehmen der Personen mit den verschiedenen Bestellungen erlangt haben sollte, habe ich selbst da nicht ins Klare kommen können, wo mir Ihnen Original Zeichnungen vorlagen. Ich habe mich dabei leider der Differenz der Regenschirm Bestellungen aufhalten müssen, indem die sich auf beiden Zeichnungen möglichst berücksichtigt, und die richtige Maßnahme Ihrer Wünsche nimmer aufgefaßt.

Der Bau meines Wohnhauses ist bereits begonnen, und ich hoffe im Laufe dieses Sommers das Vergnügen zu haben, Ihnen dieselbe als ein Zeichen meiner Hochachtung und meiner Gefälligkeit für Sie Ihnen selbst Ihnen, anbieten zu können. Sollte bei dem Bestimmen Ihrer Stockschirm meine Hilfe Ihnen etwas nützen können, bitte ich Sie darum mir das Vergnügen zu machen, Ihnen selbige leisten zu dürfen.

Ihre Hochwohlgeboren klug sich Ihnen mit der größten Hochachtung. Indem ich Sie für den gefälligen Empfang der Uhr und die übrigen Gefälligkeiten Ihnen bestens danke, bleibe ich Ihnen mit der Versicherung der größten Gefälligkeit Ihnen

Ihr ergebenster

Erichson

d. 3. 18t. März 1857.

Erichson.

10.55

98.10.

34.48.

63.22.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

703

n. 25.

703

702

704

ndes. ü. gedankt
14 Sept. 1840.

Berlin d. 8ten Sept. 1840.

702

110

Hochgeehrter Herr!

Endlich habe ich die Freude, Ihnen meine Generatio spec. ovor Staphylinorum gefertigten Zeichnungen, deren Vollendung sich sehr gegen meine Absicht und ohne mein Verschulden verzögert hat, übersenden zu können. Ich habe mich nicht entschließen können, Ihnen die Abschrift der Arbeit, welche ich bereits vor geraumer Zeit beendigt hatte, eher zu übersenden, bis ich mich selbst von der Richtigkeit derselben überzeugt hatte, und ich habe mich selbst noch jetzt einigen Tage bestimmen können, diesen dringenden Wünschen des Herrn Verleger, nach Ihrer Abreise, nachzugeben, weil ich vollen Tage bis in die Nacht gesandet. Nehmen Sie diese Arbeit mit Nachsicht auf; wenn ich künftigen Sommer [illegible] bei besser gebrauchen habe, habe ich dieselben auf jeden Fall noch sehr viel zu schön übrig gelassen.

Den Herrn Geh. Rath Klug habe ich Ihnen ein besten Empfehlungen zu bestellen, sie wünscht mit mir, daß wir einmal Gelegenheit haben, die Aufmerksamkeit, welche Sie der spezifischen Sammlung zuwenden, zu erwidern. In der Hoffnung verbleibe ich

Ihro Hochwohlgeboren

ergebenster

Erichson.

[illegible] 05.
823.
[illegible] " 10.55
" 98.10.
" 34.48.
einen " 63.22.
[illegible] a/m

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

703

713

n. 251

708

704

Escher-Zollikofer

in

Zürich (Belvoir bei)

d. 12. 11. 1853 binnen 78 J. alt.

Eine Sammlung von Käfern (Dr. Osw. Heer's Typen)
und Schmetterlingen besitzt das Zürcher Museum.

Ober 1823.

Zehl 10 p% pr Baarschaft ... " 10. 55

" 98. 10.

Davon auszugehen ... " 34. 48.

Baldsche auf zu beziehen " 63. 22.

An:
Herrn Hofrath v. Cordier Frankfurth a/M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

opris antenor
upresbus irreg. 2 M
luxuriosa 2 M

112

206

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

213

202

208

204

111

Herrn Wohlgeboren

Haben uns unsere 2 letzten Schreiben
mit einer Antwort beehrt. worüber ich, beiher, gestehen
muß daß Sie mich wünsch einer Correspondenz mit
mir fortzusetzen. Ihre Rechnung unserer Rechnung
seha ich aus Ihr abgegeben unter heutigem datum
a 3 Engs Pfd. f 63, 22, pr saldo welche gefälligst
einzuloben bitte.

Mit aller Hochachtung verharren

Ihnen ganz ergebenst

Frankfurt den 21 X. October 1823.

Ihre gefällige Zuschrift erwarten

Ihr

ergebenster Diener

J. Heinrich Hohlhofen

Abrechnung

Laut unserer Rechnung vom 20 X. f 109. 05.
Ab 10 pCt. per Ostermesse 1823 " 10. 55
f 98. 10.
Davon ausgenommen " 34. 48.
Pr. Saldo sich zu begnügen f 63. 22.

An:
Herrn Hofrath v. Cordier Frankfurth a/M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

706

pris antenor

112

707

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

708

713

712

705

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

206

(112)

ypris antenor
ypresthis irreg. 2 ♂♂
——— luxuriosa 2 ♂♂
——— Calliaudi
thia margin. 2 ♂♂
ypris pecuaria
ic. aegypt.
toxia Cynanchi
r. apatroides Dej
Mylab. tigrinipennis
rox squalidus

von Escher zeigen eine
ylnische Anzahl v. Varietäten
vorlegt.

Einen 1 Prionus maculatus
zum Umtausch (Zurück oder
etwa Kauf dagegen)

207

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

208

213

Frankfurt a/M
Naturforschenden Gesellschaft

Zürich den 19ten December
1824

[illegible] Briefen, in Betreff der
Gesellschaft für [illegible] in
Briefwechsel gekommen —
[illegible], auf einen weiten [illegible]
[illegible] wohl beizufügen haben.
[illegible] Herrn Hofrath Dr
[illegible] bitten sie mich mündlich
Beyfall [illegible]
[illegible] recht [illegible]
[illegible] nimmer etwas recht
[illegible] sehr ist nicht [illegible]
[illegible] können genommen [illegible]
Cabinet [illegible] Herr Prof.
Steudel [illegible] ausgezeichneten Botaniker [illegible]
[illegible] 3 W: dasselbe liegt [illegible] Ihnen nicht [illegible] gewöhnliches Doublette [illegible]
[illegible] 3 Mon. [illegible] wollte [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] ein Freund [illegible]

N. 1. Argynnis Thore Thg.
2. Hippa n. s. bei Alcon [illegible] Gmelin Schw. [illegible]
3. — — Clymene Thg

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

114

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

113

Herrn C. A. D. Voelkel — Frankfurth a/M
in Verfolg der Empfehlung Ihres Herrn Vaters
Ew: Wohlgeboren

Elberfeld den 19ten December
1824

Haben meinen Wunsch, in Betreff des Verkaufs der Elberfelder Blaufarben für Ihre Rechnung, Ihnen Gelegenheit zu verschaffen, auf eine recht vorteilhafte Weise erfüllt, ich muß es Ihrer Beurtheilung überlassen, auf eine recht vorteilhafte Weise über meine Forderung zu disponiren und ich bitte mir gefälligst Nachricht darüber aus, ob Sie mit dem Verkauf Ihrer Blaufarben einverstanden sind u: ob Sie noch mehr Vorrath davon haben. Ich wünsche recht sehr mit Ihnen in freundschaftliche Verbindung zu treten und bitte Sie mir gefälligst Nachricht darüber zu geben, ob Sie noch mehr Blaufarben haben und ob Sie solche zu dem Preise von 28 Rthlr. pr. Centner verkaufen wollen. Ich bitte Sie mir gefälligst Nachricht darüber zu geben . . . u: Sie sollen sicher sein daß ich meine Verbindlichkeiten gegen Sie pünktlich erfüllen werde und Sie der Meinige stets genennen können.

Ich muß noch bemerken daß ich meinen Cabinet Zink von der Stolberger Hütte nur ausgesuchte Waare nehme und ich muß Sie bitten mir gefälligst Nachricht darüber zu geben ob Sie mir solche Waare liefern können und wollen.

Mit Achtung
Ihr ergebener Diener
J. P. Bonsack

Nb. Ich bitte Sie mir gefälligst Nachricht darüber zu geben ob Sie mir Ihre Blaufarben in Fässern von 2 Centner oder in Säcken von 1 Centner liefern wollen.

Adresse
An die Herren
Gebrüder Schnitzler
Kupferhammer
bei Aachen

No 4. Hipp.a Roxelana ♂ ♀
" 5. " Stygne Hubr. ♂ ♀
" 6. " n. s. ♂ ♀
" 7. Lycaena Escheri ♂ ♀
" 8. D.o n. s.
" 9. Doritis Rhia. Apollinis ♂ ♀
" 10. Pap.o Alexanor ♂
" 11 " n. s. & nov. Gen.s gynaeph. Zerynthia Pap.o Wimmerianus
" 12. Argynnis Cybele n. s.
" 13. Hipp.a Phegea. Aper ♂ ♀
" 14 " Thryne ♂ ♀
" 15. Cyprepia Civica ♂ ♀
" 16. Lyth.a Hippophaës ♂ ♀
" 17. Noct.a Coenobita
" 18. " Auricularis
" 19. Pap.o Ajax ♂ ♀
" 20. Charaxes. Jasius (Rhea, Undosus) ♂ ♀
" 21. Noct.a Nconympha
" 22 " Nereis.
" 23 Hippa Cordula. var.s
" 24. " Semele ♂ Brunsk. var.s

Ich glaube nicht umhin zu können wenn ich sonst das Vergnügen haben könnte eine solche Menge schöner Thiere zu erhalten, Ihnen doch einige Exemplare meiner Sammlung zum Tausch anzubieten, und Sie zu ersuchen mir dagegen auch einige Ihrer Lieblinge zu überlassen.

Wenn Sie mir einen mehrfachen Beweis Ihrer Gefälligkeit durch Insecten doubletten geben wollen so werde ich gerne

(11A)

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

mit Ihnen für einen Theil von meinem Vorzeichniß
fahlt Cr: ich weiß sicher der Maisch fahlt unumgänglich die Verbin=
=dung zu machen – allein allenfalls müßen Sie mir
mir einen Theil Rechnung wegen den Ihnen alten Saldo zu
stehen Cr: mir Gutschrift bis wenn zu bilden –

Sollte ich binnen 4 Wochen keine Rechnung von Ihnen
empfangen haben ich rechnen den Saldo dann ich zu mir=
=gutschreiben haben mit f. 72.39. auch die Benachrichtigung
Ihrerseits gefälligst erwarten und meinen Correspon=
=denz mit Ihr, der für sehr mühsame und weitläuftige
=keiten werden möchte, gefälligen – Ihr ganz
Schuld.

In der Hoffnung bald Ihr mir entgegen sehenden
Brief mir mitzutheilen Ihren Wer. Ihr ergebenster
Buch der Rechnung gefälligst besorgt? verbleiben
mit Hochachtung

Ihr ergebenster Diener
H. H. Hoffmann Bollenhofen

ZURICH

24 DEC

114

Frankfurt d. 30 Jan. 25.

Durch Herrn Völker habe ich eine Freyheit Einsicht von Ihnen erhalten, mit der Bitte Ihnen darüber Ihre Antwort zu ertheilen; welches ich auch mit Vergnügen erfülle und Ihnen hiermit in Bezug auf Ihre Forderung, die Verhältnisse der hiesigen unterhaltenden Gesellschaft, der Eondita'schen Forderung ganz offen vorlegen werde. — Jedoch Eondita war unläugbar Mitglied unserer Gesellschaft, K. sollte sich unbefugter Weise vor seinem Tode zum Privat-Unterricht zurückgezogener Beschäftigung angelegt und sich dadurch offenbar [illegible] in Beziehungen der Gesellschaft, durch und seinem Tode dennoch seine zurück. Beschäftigung der Gesellschaft auf sein Zimmer sollten. Eondita starb, ohne [illegible] nirgends seiner Stimme gedacht. Da unsere Gesellschaft bis jetzt noch gar keine Beschäftigung besitzt, so war es ihr natürlich sehr verwünscht, von der Wittwe Eondita die von ihrem Manne [illegible] Bücher gekauft zu haben, und sie suchte der [illegible]

die Bindung zum Geschäft zu erhalten, und zwar
oder der Gesellschaft eine Verbindlichkeit aufzuerlegen
als die Lage für
einen jungen Mann zu übernehmen der Lust
und Vermögen gehabt hatte, um dort Gewinn
bringende Geschäfte und Reisen zu machen, von denen jetzt
bald wegen der Nachricht eintraf daß er bald nach
seiner Ankunft in Brasilien gestorben sey.
Indem man bey dieser Stockung die Gesellschaft
durch die Verbindlichkeiten aufgelegt haben, allen
dennoch unbekannt
eingehende Forderungen zu übernehmen, die
Gesellschaft würde sich wohl bedenken haben, sich
einzugehen, und hätten also auf den Besitz der
Bindung verzichtet.

Und alle diesen werden Sie nun sehen, daß
von Zahlungsschuldigkeit von Seiten unserer
Gesellschaft gar keine Rede seyn kann, und wir
sie eigentlich nur von die rechtmäßige Forderung zu
halten hätte. da jedoch von dieser wohl nicht viel
zu erhalten ist und unsere Gesellschaft das
Andenken des seel: Cordiers nachrichtig ehrt
so bin ich überzeugt daß Sie mit Ihrer gewöhnlichen
billigen Denkungsart um die Bindung beybehaltig
und zu bestätigen suchen werd. Das sind
hier nur grose Wege; entweder sie müssen

worden bis die Gesellschaft im Stande ist, Ihnen eine
Vergütung Sendung von Insecten zur Ent-
zifferung zu machen, oder wenn es Ihnen Lust
ist, so werden wir Ihnen der Gesellschaft darauf antworten
die von Ihnen uns übersandten Schmetterlinge
Schmetterlinge und der, soweit sich es thunlich
ausgestellten Sammlung, wieder zurückzusenden
und in ihrer Heimath zurückgesetzt zu werden.
Sind es würde sich sie wohl irgend zu
Naturforscher — der Physik finden, der
etwa nachstehende kleine Lücken — der Sammlung
mit einigen seiner vaterländischen Schmetterlinge
wieder ausfüllen wird.

Wir haben sehr unrecht ab für böses Willen zu
halten, daß Ihnen die Gesellschaft nicht schon längst
eine Sendung gemacht hat; aber wenn sich Ihnen
mit hinlänglich von so ungesunden u. gefährlichen
Insekten-Doublatten abwechselnd vorgestanden, die gar
nicht existiren! Von Schmetterlingen besitzt die Gesellschaft
nur die Cordierischen zweyerlei, u. von zoologischen
nur Forskäl beschriebenen u. theilweise doch
blatten. Die typischen Sammlungen haben fast gar
keine Schmetterlinge aufzuweisen. Und den übrigen
Insektenclassen besitzen wir nur in grösserer
Anzahl Doublatten, besonders aus Brasilien,
Egypten, Nubien. Das sind die auf beyden Reisen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hergenden noch nicht gehörig bestimmt, und werden sie
selbst gestehen ist nicht abzugeben. Es ist dieses eine
Arbeit die sich nicht übereilen läßt. Das Haus ist auf
Herrenbrücken dass es auch andern Ansichten Platz
legen wird, mit Ihnen in Einverstehe zu treten.
Die Zeichnungen werden mir dieselbe vollständig
erhalten Rücker, und dieselbe ist bey Ihnen die
eine so weite Reise und grosse Transportkosten gemacht
haben nicht möglich. Ich stehe mit vielen unserer auf-
gezeichnetsten Architekten in Correspondenz, aber
es kann Ihr versichern, dass mir noch ein einzer über
Zeichnung gekommen ist, weil Risse vielleicht ein wenig
beschädigt waren. Es versteht sich von selbst, dass kein
wesentlicher Verbesserung stehen darf, ist dieses nun
nicht der Fall, so ist eine, selbst eine wenig defecte
Zeichnung, einer verbesserungsfähigen Vorstellung immer
noch sehr vorzuziehen. Auch ist Zeichnung nicht bis ins de-
tail sehr, mit einem minder schönen Zeichnung, indem
selbst ein stark defectes Ge.—— von geübten Händen
brauchbar und Händen einer Vorstellung sehr kann,
Soll jedoch eine Vorstellung nützlich werden die
nur dem Auge Genuß gewähren soll, so bestehen
ich mich gerne, dann sie eine solche gehören vorzüglich
Risse nicht. — Doch bitte ich Sie auch dann gefälligst
nicht zu folgen, als beschäftigt mir eine Vorstellung
von zerbrochenen Facetten, oder doch alle unsere
Vorstellungen sehr defect.

Herrn C. von Heyden. Frankfurth a/M.

116

Zürich den 28 Sept.
1825.

213

Zürich den 16. Merz 1825

217

115

Hochgeachteter Herr!

Ich Erinde den 13ten dss durch den Empfang Ihres w. 30ten Januar erfreuet - obgleich derselbe Ihnen vorzüglich Ursach nicht meine Ordnungsliebe über dem Empfang ungleich mehr als selber nicht gemindert bis d: den Empfang von Herr J. H. Völkel vom 24ten März 1824 stehen bleiben welcher mir Ihnen Ihre Rechnung die Buchhandlung betreffend überschickt die Ordnung gegen den Herr Hofrath von Leonhard Ihnen gemeine Forderung für meine Rechnung selbst zu berichtigen. Ich hätte selbe Ihnen schon mehrere Male zugesendet wenn ich wüßte - allein Ihnen nähre meinen Wunsch nicht gemeint den Ihnen gemeine Rechnung für beyzulegen sind zu seinem Ende bey ich vor den Empfang meiner Rechnung auf Ihre d: die Hofrathschaft selbst in mir dienstbringen Sinn zu bezahlen. Vorerst wünschte ich Ihnen Herr Hofrath ein Europäer - Herr exotische Gegenstände und ist wohl gewiß genehmigen werden wie die löbliche Hofrathschaft deren entomologischen Vorrath mehrere mir sehr angenehm ist - wie Ihnen zu vermehren wünsche.

Europäische Naturalien stehen bey mir auf der höchsten Stufe und mehr Seltenheiten exotische - Ihre Liebhaber sollen die einen sehr großen Vorrath besitzen und Ihnen vorzüglich haben.

Nicht allein bin ich mit meiner Sammlung mit Ihnen Herr Hofrath d: Stifter des Museums einigermaßen gerechtfertigen können so wünsche mich sehr angenehm mit Ihnen löblich Hofrathschaft durch die in meinem angenehmen Briefwechsel zu bleiben sie einen einander gegenseitig durch einen Häufigen Correspondenz, einen lebhaften Verkehr von gegenseitigen d: einen gewissen Liberalitet überhaupt Ursache Ursache haben. Ich besitze wirklich unsern Ihnen einige schöne exotische Naturalien in schönen Exemplaren doublets die ich mit Vergnügen gegen Ihnen d: die Ihnen zugehörigen Stücke mir Ihnen Bezugnehmen will abzutreten wollen. Insbesondere Egyptische, Italienische d. Barbarische Käfer werden mir willkommen sein - welche sehr gut conservirt Brasilianische Schmetterlinge nach Egypten, d. Rubin und Surinam. Insekten Rubin und Surinam. Insekten Kiste ist nichts besonderes - es ist niemand von mir genommen Geschäft bey mir. Der Katalog enthält sehr wenig Merkwürdiges - allein ist Ihnen eine gute authentische Abbildung einiger Insekten Europäer von d. Engerling mit mehreren

Begründen noch nicht gehörig bestimmt, und werden sie
Schluß geschehen ist nicht abzugeben. Ehe dieses eine
Arbeit die Sie nicht übersehen kann. Das Geschäft ist auch

Wenn die Hauptsache wirklich darin nur verschiedene
Doublette besitzt sondern ist gewiß Zeitverlust bis Sie mir solche
zubringen. Die benannten Bon exotisch Pflanzenbestimmung, besitze ich Gesell-
schaft mit einige Samtsäg aus Brasilien und Surinam - von denen diese
mir verschaffen zugenommen sage. Was den übrigen Insecten Classen besitzen
wir in einer großen Anzahl Doublette besonders aus Brasilien, Surinam, Egyp-
ten und Nubien - doch sind sie mir bezüglich Lagerung zu noch nicht ge-
ordnet bestimmt, d. h. werden, als selbige angekommen ist, nicht abgegeben - ehe diese
Arbeit die Sie nicht übersehen kann. Die abgegebenen ist eine solche
bestimmte Insecten für einzelnen so große ist doch wo sie unbestimmt zu-
gesprungen oder gar für einige wenige für mich Sammler - wenn
Doublet ist - ist doublet offen, so wie mit Vorsicht, und ist meist wieder
dem Tauschfluß wieder an die Doublette nicht abzugeben als sie bestimmt sind,
wenn eine genaue und richtige Bestimmung nicht durch Mittheilung zu
ziemlich umfassenden Entomologen wiederholt und bestätigt. ist überhaupt
hiesiger Ihrer vielfachen Überbringung d. Ihrer Lagerung ist es nicht dem
Zweck entsprechend - Endlich ist solange mit Ihrer Insecten Sendungen zu zögern - ich
wünsche Ihnen gesamm einen Papa Rose, Cyrene m. s. schönen Tagfal-
ter, Doritis Apollonius (Ria) und eine andere Art Argynnis nahe
einander verbleiben sehr Hippocrates und wie gesagt ganz ein Hippocrates
(Ihr wahrlich ist über 10 Ducat bezahlt) Ihrer Insecten einzelne ist
ist wenig so wichtig Ihre solange ist nichts wenig wenn ich Ihnen Insecten
Arten so zugleich d. alter obige glaube ich Ihnen allein zu Ihrem ein
Vorrecht die Ihre - ich kenne keinen einzelnen Entomologen der alle
gegen Tauschfluß einen einzeln bezahlt, sondern Ihre Doublette ü. alter
abzugeben Ihrer. Ich übersehe alles obige Ihrer Lagerung und
wünsche mich mit besonderer Hochachtung Ihrer Stammgast und
Gesellschaft die beste Empfehlung meinem
Bruder in besten Gesundheit
in Frankfurt einzutauschen zu

Ihr ergebener Diener
Hübner Zollschreiber

Besitzen Sie Carab. Hispanus. rutilans. und splendens
Melolontha alba und Leucophytum clavicornis. 2 welchen Werth
in denen würden Sie auf Ihren Insecten setzen
Geben Sie Bomb. Fortifica doublet 2

Herrn C. von Heyden. Frankfurth a/M.

116

Bonn den 28 Septbr. 1825.

Ich werde mir ein Vergnügen machen durch Ihre gefällige Zusendung
mich in den Besitz der in Ihrem Verzeichniß bemerkten Insecten zu setzen.
Haben Sie viele Lebensgroße Insecten?

Ihr gründen noch nicht gehörig bestimmt, und werden sie
solche geschehen ist nicht abzugeben. Ehe diese eine
Arbeit die Sie nicht übernehmen können. Dasselbe ist auch



Zürich

Herrn C. von Heyden. Frankfurth a/M.

116

Giessen den 28 Sept. 1825.

Indem ich mich, verehrtester Herr, auf meinen seinem w. vom 10ten März beziehe, habe ich, theils, selbst meine Abreise nach Nürnberg von Ihnen mit Vergnügen zu benutzen, das Nürnbergische Museum - was mich sehr schmerzt ich ge= sehen zu haben abkürzen. Da ich mich aber wünschte meine entomologische Correspondenz mit mir etwas privatim fortsetzen zu können da Sie gefälligst nicht unternommen haben sind in der vorläufigen Voraussetzung dass ich Ihnen den mir schuldigen Saldo des 67, 09* - selbem in einer baldigen Ihrer anderweiten Bestellungen und Sendungen ausgleichen kann Ihnen etwas Neues zu melden was ich unsern Lepidopte= = rologisch interessirt habe ich leider Ihnen nicht von dem Frankfurter Hippocrates, den ich selbst f. 250. kaufte dem Herrn Provost in Hanau vor einigen Jahren bezahlt habe, sind nun mehrere Exem= plare vorhanden und ich könnte Ihnen ein schönes paar für 11/26. anbieten, doch, wer mir Tausch gegen einige Falterarten - auch ist Ihnen mir mein seltenes Lycaena Cichori Hubr. entbehrlich wenn ich auf Ihnen mich gegen ein equivalent anbieten kann, so will mir abhandelte von mir entbehrte mein Hippar. Stygne Hubr. u. Proserpina offerirt, ge= = gegenwärtig schönes Exemplar der mein Hubr.

Neue

*) Mit dem Saldo meiner Rechnung

(= Zyt. forcolatus. Schwäg. (canaliculatus Gyll.)

Ps 25/51 - alle aus Pyrenäen

a. Dytiscus Abilius ♂ 2. b. Hydros. caliginosus ♂ 2. = Hydrophilus piceus. Fab. Virgilius Herbst.

c. Colymbetes obscurus = C. ater F. d. Colymbetes ater 1. 6 Exemplare sind nur Varietäten.
= C. fenestratus F.

[illegible] ist aber nur 2 männliche Exemplaare [illegible]
und nun besitze. Sie aber nicht ganz frisch sind.
In Südfrankreich wurde nun eine neue Lycaena
Gruschaporta entdeckt, Dolus-Hübn., und von ungefähr
unsere neue Nocturn wovon die Optata ist Godard
gefunden. Raupe ist natürlich noch unbekannt
2 a 3 Exemplare und 2 Weibchen Lycaena Sie sind sehr
selten entdeckt worden sind. Raupe Puppe überhaupt
gänzlich unbekannt. Sonst Briefe über [illegible]
= nen sind unsere [illegible] Entdeckungen genannt
worden 1.) eine neue Argynnis eine neue Argy. Niobe
n: diese. Ayene 2.) eine Zwischenform Melitaea Aurinia
bey Meyene. 3.) eine 2. männliche Melitaea Norax bey
Corinna. auch ist unsere neue
Noctuen von dort. In Ungarn will unser eine neue
Apatura Metis entdeckt haben und einige neue Noc-
tuen. Die dalmatischen Novitäten [illegible] Exemplare
wenig. Ich [illegible] Melitaea Varia bey
Clotho Lyssa bey Adrasta. Hesione bey Hermione und Cor-
tia Narcaea. Varia und Narcaea [illegible] sind
= er Art. Lyssa und Hesione kann ich einst [illegible]
Ich Professor [illegible] Zeit 15 Jahren [illegible]
= mann gewesen [illegible] mit der Entomologie [illegible]
= mehrere [illegible] Jetzt [illegible]
[illegible] 12 Meilen von Madrid die Bomb. Luna [illegible]
= kommen und die glaubte Zeit haben sie einige Exemplare
[illegible] selten [illegible] Sie waren Wunderbar [illegible]
= schreiben. Er ist ein ganz vortrefflicher Mann, [illegible]
sagt [illegible] Ihnen sie [illegible]
[illegible]

Ich kaufe Thiere für das Museum, im Tausch gegen mir unbekannte Lepidoptera und Coleoptera, unter folgenden guten Bedingungen:

Argynnis Thore ♂ ♀.
" Cyrene n. s. illustrissima
Vanessa Hygiea Rudb. ♂ ♀ — Lycaena Eschre ♂ ♀ Rudb.
" n. s. Hygiea Rudb. Riesenexpl. ♂ ♀ — " Dolus ♂ ♀
" Cleo ♂ ♀
" Cardui ♀ var.
" Atlita ♀ var.
" Atlas
" Thryne ♂ ♀.
Doritis Thia
Lerymna Cerisi n. s. illustrissima
(Thais) Godart ♂ ♀
Papo. Alexanor einzige Tauschart
Sphx. Hippophaës ♂ ♀ — Sphx. Nicaea abgeraut ♂ ♀ —
" Verbenalis ♂ ♀.
" Celerio
" Nerii ♂ ♀
Bombyx Atlas.
Noctua Pilea m. ♂ ♀. Noct. Amoena ♂ ♀.
" Auricularis. " Communimacula
" Parithea. " Purpurina
" Dilecta.
" Coenobita
" Orichalcea ♂ ♀
" Cymbalariae
" Nonympha
" Aureus.

Sie sind unseren von obigen Raupen die mich bereits das 2 bis 3 fache 5 Ducaten gekostet haben und sie sind uns nur gegen ein Prinzipe oder exotische Tauschgegenstände gleichen Werthes oder gegen baare Zahl.

(= Hyt. foveolatus. Rhs. Jg. (canaliculatus Germ.))

Ps 26/25/51 alle aus Pisa.

a. Dytiscus Abilensis ♂ ♀. b. Hydrop. caliginosus ♂ ♀. = Hydrophilus piceus. Fab. Georgius Herbst.
c. Colymbetes obscurus = C. ater F. d. Colymbetes ater ♂ ♀. = C. fenestratus. F.

6 Stück sind aus Nord England.

Zeichnung unter dem mir gefälligen Beistand der Buchenbergischen Actien-
gesellschaft von Frankfurt a/M.

27ste Novbr 1823. Wir sind mit dem Verlauf unserer bisherigen Geschäfts-
-lung Verbindung beschäftigt u. sind so weit vorgerückt daß wir hoffen dereinstens
4-6 Wochen damit fertig zu werden u. sollte Ihnen alsdann eine genaue Rech-
-nung nebst dem Verhältniß der Actionairen hiesiger oder auswärtiger
Zeichnung sowie dem Verhältniß der Actionairen hiesiger oder auswärtiger
wie bereits viele besitzen - vorgeschrieben werden - wünschen Sie
ich sollte Ihnen nicht baarmöglichst remittiren u. zu bewerkstelligen - es wird übrigens
-te Verfahrungsweise Ihnen vorvollkommen u. zu bewerkstelligen - es wird übrigens
einem Geschäftsfreunde Ihnen Vorgang gewiß sich auch Ihnen in der Folge sehr nützlich
beweisen u. wünschen wir uns Ihnen auch in der Folge sehr nützlich zu beweisen
27ste März 1824. Wir haben eine große Anzahl englischer Louis d'or-
so wie Spanier - wollten Sie uns die gütige haben eine Notirung
Ihrerseits zukommen lassen, würden wir gerne gegen baare Bezahlung
Preise Ihnen - Ihnen einbegriffen Ihnen die billigsten Preise zu machen u. wären

Ihnen

Ihnen

Ihnen

118

216

218

117

215

Wie man Ihnen Ihre Sendung so mitgetheilt, so sind wir Ihnen offenmit den 2 Reichsthaler- wir sollen bald von Ihnen etwas zu verrechnen und freuen uns schon zum Voraus auf Ihren Brief

Leben Sie vorläufig wohl u. gedenken Sie bei Ihrer Reise Ihres, unsers hochgeehrten Herrn und Freund, der gefälligen Zuvorkommenheit Ihres ergebensten Dieners

Gottlieb

Nota nunmehr Ommeny in 2 Reichsthalern

Pionus maculatus Sénégal.

N: 16/4	2	Ex.	Chlaenius festivus. Fab.	732	2 Ex. = Nagoria europaea. Dej.
57.	2	"	= Nebria cur. nov. Nigrita	25	2 " = Calcar elongatus
10/11.	2	"	= Chlaenius agrorum. Gyll.	65	1 " = Cicindela maura. F. aus Syrmien
7/	1	"	= Chlaenius spoliatus. F.	5	1 " = Dytiscus Röselii. Ahrens non Fab.
15.	2	"	= Epomis circumscriptus Duft.	8	1 " = Hydrophilus piceus. F.
1.	2	"	= Carabus constans. Ullr.	9	1 " = Dytiscus sardeus. Dahl Nordinn.
3.	1	"	= Carabus Faminii. Dej.	2605	1 " = Gyrinus cupreo-lineatus. Borelli in lit.
709.	2	"	= Cephalotes politus. Dej.	2537	1 " = Hister semipunctatus. F.
39.	1	"	= Nebria brevicollis. F.	476	1 " = Hister nitidulus. F.
80.	1	"	= Liparus costatus. Z. Nordinn.	587	1 " = Saperda signaticornis. Dahl aus Nordinn.
438.	1	"	= Aphodius fimetarius. F.	990	1 " = Chrysomela mir nov. C. exsculpta. mihi.
113.	1	"	= ? Brachyceris crispatus. F. ?	559	1 " = Cranbyx ambrosiacus. Hes.
260.	1	"	= Gyrinus [illegible] mir nov. Gyrinus cupreo-viridis. Mag. zu Schild.	714	1 " = ? Brachyceris crispatus. F. ?
70.	1	"	= Hypera punctata (F.) Oft allgem. Verb.	373	2 " = Hydroporus . . . . . ?
90.	1	"	= Asida silphoides. Parr. Sicilien	198	1 " = Rhynobatus bilineatus. Dahl aus Nordinn. Die Schiff. Ex. sind abgal. klein.
994.	1	"	= Chrysomela graminis. F.	3475	1 " = Lamia funesta. F.
93.	1	"	= Asida ferruginea. Parr. Sicilien	69	1 " = Coboryncus crenosus. Dahl (Coleoptera)
1011.	1	"	= Timarcha tenebricosa. F.	410	1 " = Staphylinus maxillosus. F.
1003.	1	"	= Chrysomela grossa. F.	950	1 " = Chrysomela graminis. F. = № 994.
	25	Ex.		95	1 " = Opatrum . . . . . ?
				1006	1 " = Chrysomela . . . . . ?
				982	1 " = Gallerucca Tanaceti. F.
				1005	1 " = Chrysomela Banksii. F.
					26
					25

(= Dyt. foveolatus. Schneg. (canaliculatus Germ.))

Ps 51 alle aus Sicilien

a. Dytiscus Abilius ♂ 2. b. Hydrop. caliginosus ♂ 2. = Hydrophilus piceus. Fab. Gyrinus ♂ 2

c. Colymbetes obscurus 1 = C. ater. F.

d. Colymbetes ater 1. 6 Stück 2 sind aus Nordfrankreich.
= C. fenestratus. F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anzeige über den mir gehörigen Brief an die Herren des Buchhandlungs-
hauses Gebrüder Bethmann in Frankfurt a/M.
22sten Novbr 1823. Wird mit dem Datum dieses Briefes beantwortet.

Herrn
Herrn Bethmann
Herrn Senator von Heyden
Herrn Senator Schmidtborn
Herrn
Frankfurt
am

118

216

Am 10ten August 1829 Erh. H. Escher-Zollikofer aus Zürich folgende Vögel im Tausch gegen 17 Stück seltenen Arten von Bengal eingetauscht:

N. Caprimulgus asiaticus
" Buprestis irregul.
" —— luxuriosa
" —— Caillaudi
" Arthia marginalis
" Caprimulgus pecuaria
" Cicind. aegyptiaca
" Cetonia Cynarchi
" Eurych. opatroides
" Mylabris tigrinipennis
" Prosopis squalidus

N.

Davon hat dasselbe zum Vergleiche 1 Stück Prionus maculatus in seltenen Exemplaren mit seinem sp. von Bengal zu vergleichen und zugleich 2 Stück Prionus, oder eigentlich zu bestimmen, ein Arsenikal zu schicken.

Dr. Meyer
v. Zollikofen.

219

Zürich, gedruckt, Ordentlicher Gymnasium. Physik. Archiv. Director.

Am 15ten März 1830.

Bemerkungen.

[illegible] Vögel sind auf beyl. [illegible] Verzeichniß zugesandt und ist schätzen wir einen [illegible] gewünscht zu [illegible] Bengalischen Verzeichniß [illegible] Prionus maculatus [illegible] Bengal gebraucht [illegible] Rappel [illegible] mit. Prion. Rappelii [illegible] maculatus [illegible] [illegible] [illegible]

Einzuziehen über den unter specie abzuurtheilenden Gegenstand von Frankf
27ste Oktober 1823. Wird Rud mit

2 N. Buprestis castanea.
2 N. Bupr. interrupta
1 — ——— brevicornis
1 — Anthia Nimrod.
1 — ——— sulcata
1 — Eporus croesus. Fab. mss
1 — Galerita africana
1 — Calandra senegalensis
1 — Lagria speciosa. Thunb.
1 — Meloe ? n. senegalensis
1 — Laperda senegalensis
1 — Cicindela antica
1 — ——— nitidula
1 — ——— senegalensis
1 — Crypta ruficollis

Fortsetzung 1 Ex. der Sphinx Euphorbiae von Montpellier gegen die Pap. Apollinus und Cardui gegeben, wodurch zugleich die obere Cordirische Schuld von 1 Ex. wieder getilgt ist

Braunschweig d. 27 Aug. 1830. Mittheilungen der hiesigen Naturforsch. Gesellschaft. Herausgegeben von Dr. Ludwig Heinrich Bojanus, Professor der Medicin und Director des zoologischen Museums. Erstes Heft. Mit 4 Kupfertafeln. Preis 1 Rthlr. 16 Gr. Sächs. Leipzig, bei Friedrich Fleischer. 1830.

120

Heinrich
Escher-Zollikofer in Zürich 717

Ihrer gefälligen Mittheilung vom 15 Sept. 1829
verdanke ich, worin Sie mir schreiben,
daß Sie eine Varietät des Picus
Leuconotus Bechst. Picus maculatus
Wils. Picus Rappelii Temm.
Picus Leucopygius Natterer
seyen, und daß Sie
eine Varietät mit
Picus Leuconotus
Picus maculatus
Picus Rappelii
Picus Leucopygius Natterer
vereinigen.

119

Rückzüge wie sie uns gefangenen
[illegible] Gefangenschaft von [illegible]
27/2. 28ber 1823. 2Mo Sud west

2 N. Buprestis castanea.
2 N. Bupr. interrupta.
1 — ——— brevicornis
1 — Anthia Nimrod.
1 — ——— sulcata.
1 — Eposis croesus. Fab. ver.

Frankfurt a. M. 27 Aug. 1830. Mit einer der ersten Antwort entsprechend, gedruckt,
wegen seines Aufsatz: Soll pr. 100 fl. ein Einmal drei viele Exemplare
10 fl. — Rudab wie Seil. Arten pr. 100 — 20 fl. geben. Schattirten Ansichten
Bilder wissen ist Seil. — Mit Freuden will ich Ihnen — Phillia vexator
Meinen Fortsetzung minor, Ihnen wir unverzüglich die Fibeln
Die Bestimmung der Mann fortgesetzten Herr über Ihnen
Ihnen schreibt.

Frankfurt am 15 März 1830

120

Die Unterredung mit der Herz hier ist bey
August in Frankfurth in ihrer Wirth, ihnen sehr zugabenreich
bleibt mir immer sehr angenehm und ist stets mir immer
glücklich ihre persönliche Bekanntschaft gemacht zu haben —
ich bleibe immer dankbar für die Freundschaft die Sie
mir erwiesen und hoffe der Herz wird nicht können
Wahrnehmung in dem Fall sich für Ihnen hier mit ein-
=setzen zu können. wir haben keine Noth aufzuneh-
=men wie die Herz. allein wie Herz sie, wie genau
genommen, vielmehr ihren Gläubigen nicht Gut. ich hoffe
Sie werden bald einmal selbst davon urtheilen —

Der Prinz welchen ich Ihnen immer Gelder ist mir, wie-
=wohl sie sich selbst übergangen werden nicht wenig macu-
=latus. ich habe ihn ersuchen eine neue Auflage von Paris mit Frau
in 2 Exemplar. (nicht schön ungeschickt wie maculatus
Exemplar ist ihn aus dem Innern wenig gebraucht-
und eine Stücke so mich der schönen Rappel Gemälde mit-
=theilt schenken wenn ich billig Prof. Rappelia nennen —

Die erhalten ihre schöne maculatus hier ich Ihnen
verschrieben hatte. wie weit ihnen die Fabrikanten schon ge-
=schickt ihnen nichts. wie ist mir sehr erfreulich Ihnen
Ich wünsche Ihnen auf 57. Arten die ich direct aus Pa-
=ris

Ergebenst

= hier verschaffen wo ich mein neuen Guten und Gefälligen Freund
Herr Bellegin oder Herr Dahl der mir gestern
Visite machte und mir versprochen hat mich
die Gefälligkeit zu erweisen, welcher sich Dahl
nicht einmal erlaubte mehr als 3 Pfund
Pulver auf einmal zu verkaufen. Gestern Abend bin
ich, nicht mit großem Wunsch auf europäische Art
= stag speisen zu können so selten und mir sind d. Gerichten
sonst ich schon lange allzuwiderlich - es sind gewöhnlich
unsern Lebensart der sich nach im südlich Europa
weich unterscheidet - ich bin 2 Monath ungefähr gewesen
und hatte noch nicht Gelegenheit gehabt zu verspeisen
d. Gerichten was sich etwas mehr und seltener der
= Europäer allein ich sage von den Gerichten welche
Gesundheit (wohlgemerkt der Europäer) nicht
zuträglich oder ich so an Abend bin) - oder mehrere
Zeit (einbesch. mir selber geschlossen) als ich den
Gerichten beizubringen wie jeder Türk Gebrauch d.
d. Eng. wie haben die glaubten Türken der correspondirenden
und neue Lette ich die wie sobald die Menschen haben wie
zu begreifen was wie jeder ist - oder wenn die Gemüthsart
haben wie die Türken d. wie wie den die Nota schon
wiedergefunden - ich würde dann so frei sein Ihnen wenn
Gegenbemerkung mitzutheilen - wie Ihr Einfluß wäre
einige zu sein, was ungefähr der Werth von einem jeden
Buch sein möchte? Wenn Zeiger sich so ziemlich erhalten
Bezeichnung von Seiten - allein es scheint es würde sich belohnen
lassen - ich will nicht mehr mich [illegible]

gemeiner sondern alle Mühe, porto Unkosten &c. überwenden
soweit es sonstthun unsern Fleiß mehr einzusenden d: wir so
alle zeitlang) Insect aus allen Erdtheilen bekommen möchten
wir äußerst wünschen - es wären also 2 Exemplare
zu erlangen - Sammlung wie gutes Instrument sich am Besten
zu präpariren - d: den Leibschaden die Insect zu formiren
geben zu können die nicht (wie Bahl) Buchstabenlänge
gleichen - Sammlung - obsolet es auch einerley die Generalia
kommen schon neben wenn nicht 10 Bücher d: das Spezial alle
gewöhnliche Species vorkommen - schon doch
einige Anleitung [illegible] Insect zu geben wo
einige Bücher von denen sich mit mehreren Bücher umsonst auf
O 2. und F 2. 45 Augsburg [illegible] - sie wiederum [illegible]
drucken wenig wenn sie schon Buch umsonst zu wie
ist sie besonders soll - d: mich sonst wenig [illegible]
wenn schon die Zeichnung Preise wünschen sind
Beschäftigung ist wenig Bedürfniß - können sie wenigen
Herrn unsern Herrn Brunnen einige Insecten (ohne zu
viele Mühe) absetzen so wäre es sehr angenehm d:
lieb - Nun wünsche ich immer ein schönes Exemplar
der großen Attelabus welche sie Rüssel gebraucht (venator
Brand ist) mir zu verschaffen (er sind 6 à 8 verschiedene
der Exemplare sorgen wie möglich - d: auch am Scarabeus
longimanus der auch in Kleinen diversen in unsern Sammlungen
[illegible] wenn sie Gelegenheit überlassen ist selbst
schon - ich bitte diese 2 Bücher nur gut in ein Schächtelchen
einzupacken um sie mir zu übergeben gelegentlich soweit es
es sorgfältig aufbewahren bis es mir eine Sendung wieder
verschaffen mit dem porto - damit immer angenehm beschäftigt
sind in einem -

Ihr gehorsamer

Ich muß also von Cayenne in Januar von Senegal (wo ich sehr wohl eingenommen) und Gabon mit großem Vergnügen Abschied nehmen. Der nächste interessante von Lacordaire besuchte Ort ist Madagascar, wohin ich vielleicht von Bourbon gehen werde. Da die Franzosen mit den Hovas stehen. Cabas ist in St Domingo, Carthagena (Columbien) zu spät, und von dort der Januar Insekten entomologisch unsicher zu machen. Von diesen erwarte ich bedeutende Resultate. Wie ob Apellaten Darmstadt zwey Einlaß von Mexico rathe? Ich hatte viele Lust von dort zurückzureisen, und es gehört. Ich habe ihn geschrieben, wollte ihn bey meinem Durchgang in Darmstadt besuchen, er aber nicht, er war nach Bremen gegangen, und hat mir nicht geantwortet. Sie also sehr unfreundlich gegen mich betrogen. (ich schreibe ihm heute) er will ohnehin nächstens mit mir zu sprechen haben. Ich wünsche die Meteorologische Beobachtungen, welche ihnen etwa 50 wünschen, kleinen Zeitaufwand kosten. Deshalb Ich etwa auch sehr zu meinem Zweck Thermometer organisiren. Ich gebe die materiellen Hülfe allein er braucht von mir nichts, es genügt mein Rath. Ich gebe etwa 1000 Thlr Georgien, afrikanisch und Hessischen doublon alle die ein wenig genau und Degen bestimmt. Es wären unter meinen Bekannten welche zu finden, Ich hoffte auf einen mexicanischen doublon gar zu gern. Ich kann meinen Reisen vorläufig nur so hoch und weit und vorsichtig als möglich zu machen, da ich in einem kleinen Fürstenthum noch Besitzungen habe, also sehr unabhängig bin, und Ich hoffe und Ich denke Ihnen willkommen sein.

Traubegortat nach meinem Hochzeitfeste zu Schönburg am 28 Oct. 1830.
Ein Kathia verlator u. 1 Acrocanus Corgimanus minor durch Kinder
verschied.

Zürich den 7 Sept
1830.

Vielgeliebtester Freund!

Ich bin nicht fähig Ihnen auszudrücken wie
innig ich mich über Ihr neuerliches Andenken welches Sie in
Ihrem Einladungsschreiben d. d. Lausanne 1 Oktober mir=
geschrieben haben. Worte sind bey solchen Gefühlen stumm,
ich schweige welche Ihnen ganz Innerstes bezeugen
soll, ich beschreibe, begreifen kann es Ihnen wohl Sie
die innigste Theilnahme Ihnen bezeugen. Worte der
Freude und der Dankbarkeit mögen vielleicht mein
Herz erleichtern, allein wie eine Zeit kann sie Ihnen welche
der Tod uns gestern d. 6 aus der Liebste uns forderte
Verwandten und Freunden wie sie mir sagen
Sie viele Ihnen Trost d. Linderung bringen, über
die schmerzlichen Verlust Ihrer theuren Gattin
sein wie sie Ihnen Ihre Kinder und den Segen Ihrer Lehren
zu verdanken und Sie beglückten wie Ihr nahes Ende
Liebenswürdige Seele Charakter so viele schönen
Pflichten verbindet Ihre trefflichen Anordnungen wie
den Verlust zu ertragen Ihnen zu erleichtern
Ihnen Ihre Kinder Ihre Freunde Ihre Verehrer
besonders Sie selbst zu trösten d. Gelassenheit
Ihnen zu wünschen d. alles das zur Linderung Ihres Schmerzes
beytragen

Freunde aller arten Pflanzen mit Samen oder Ka-

Empfehlungen dies Stück Forben. Sind wir gleichfalls wenig
ist mich freilich wenn ich durch Vermehrung derjenigen
dem einzigen Freunden ihren Wunsch durch Erreichung
wesentlich Vergnügen und was wir ihnen mit meinem Willen
in Erfüllung zu nehmen. Ich kann ihnen nicht
sage für ihre Bemühungen der Flora meiner nächsten
Pflanzen, welche mir eine so wünschenswerthe Bereicherung
ich denken in Verwahrung bringe einige Formen, die ich
genauer kennen zu lernen - nämlich. N.57. Nebria Cyrtus
Fuchs ich Isaiminoides var: N.709. Cephalotes polistus Dej: ich
Corvegatus Dej: ich Pterostichus vulgaris Dej: ich Pterostichus rufipes.
N.113 Brachyaretus crispatus fab. f. ich vindatus N.994 Chryso-
gramines fab. ich mixta var. N.1011 Tomarcha punctata, ich
punctatus Hydrophil. piceus f. glabra n.s. N.9 Helgseus sordens
Dhl, ich circumclenes. N.659 Arambia ambrosiacus. ich O.
moschatus var: mit Dahl's Rosarium 114 Brachyd. crespa-
las fab. ich barbarus. N.373. Hydroporus nec minut. unterschi-
ich depressus. 398 Rhynchaetus bicinctus Dhl ich varius -
169 Anthocomus rufus crenatus Dhl Ruby gaster ornatus Dhl
N.950. Chrys. gramines ich fulgida n. 2 - 95. Opatrum verrucu-
sum. 1006. Chrys. geniculatus -

Ich habe meinem Jäger mit-
meinen für seine erste Bemühung 36 Ducat. zugesichert ich
die gemeinen Arten bezahlen ich. Ich zweifle ob er
eine neue Art finden wird ich ist in Kurzem nochmal
sollen ich. Wenn ihnen obiges Verzeichniß recht ist. Ich bitte
ihnen meine Exemplare der Arten a gemeinen willkürlich
welche mir selber gefehlt oft d. in wahrer Bemerkung ich. einige
andere unterscheiden wünsch. übrigens werde ich alles
was Dahl einbegriffen sich bei ihnen ich. und
damit unsere schon so große Bekanntschaft

beÿ seinem Herrn v. nicht erhalten Herr gesellen beÿ, und
pr manuscr mir seinen mit 4 Bauergallerien Rathshof.
ster in Dornenstadt in meinen Zeugnissen beschrieb und Pi
mir sie beschreiben - ist sehr sinnreiche Person doublirt auch
ist in Paris Emigrirt gewesen sehr viel für 7 a 8000 stück besonders
von Lepricurs Bücher mit sich genommen der mittleren
Africa wieder war, v. Jahrlich über mich schreibt - Wonderful -
- weniger Personen sehr ist unterrichtet.

Wollen Pi. die Güte haben an Riesi der mir
mit Bestimmung einen auf das beste ausgestopften Straußen
vogel, v. Struthio longicaudus - für mich übergeben
wollen Pi. auch einen Scarabaeus elephas von welchem
ich auch 5 a 6 Exemp: vorfinden - Ich bestelle die Pi
mir beschreiben Exemplaren welche so gemacht ist schon
mit schon Gelegenheit von Hamburg sicher
senden zu schon Gelegenheit.

Sie Berlin v. Hamburg kommen Pi gemeinschaftl. Herr.
Lessa acquisitionen manches bey Bekke v. Siegmar
erstaunt ist mir auch mit Saldo de R 12. 13. pf. Gelder
in Druck Schrift allein er entschuldigt mich unter-
stützt schon gewesen für die abgehaltene Pariser
Reisenkarten von Kirchhoff v. Schmidtberg, wenn
Herr Buchhandl. übernehmen zu mich übernehmen
Herrschaften, Pi mir gütigst Herr schmidtberg zu begegnen ohne ich
Herrn etwas mit Buch zurückgeschrieben werde v. die für
mich acquirirte Bücher zu überschicken zu lassen v. weitzu
- bringen ist wenig, H. L. für mir schon Herr Goliath.
Thea bis auf 5 Ducats geben - auch für mir Herr Brunn
gigantens - für mir Pap. Hecubagemälde v. mir 8 Ducat.
Herr mir Metellus 5, mir Sphx Quentens 4, jedoch unsichere
alles

alle diese Exemplare vollkommen gültig und
ganz identisch. Die Autoren der Genera Agra, Orthiter, Pauletus,
welche ich auf ganz augenscheinliche beliebige männliche Exemplare
ich gebe nur wie a 2 Arten von jedem d. Gattung zur Ansicht
für unvollständig an. Der innere Bau[illegible] respective Gerüst
ich besitze aber ebenso 2 Exemplare zu Gebote [illegible] gemeinsam
Zeugung zu können d. mache [illegible] und bitten auf Ano 183.
die Ehre Name ist in meinem [illegible] Sammlung
wohnen werde zu besuchen auf meine Adresse d. Bitte
abzusenden. es würde mir eine [illegible] Freude
gewähren. Leben Sie wohl d. wissen Sie glücklich Freundschaft
sich ganz die Ihrige

[illegible]

122

Tit.

Wir erfüllen eine schmerzliche Pflicht, indem wir Ihnen von dem am 12. November erfolgten Hinschiede unsers geliebten Gatten und Vaters,

Herrn Heinrich Escher-Zollikofer,

Kenntniss geben. Er hatte beinahe sein 78ᵗᵉˢ Lebensjahr vollendet, als eine Herzlähmung seinem segensreichen, uns so theuern Leben ein Ende machte. Wir halten uns Ihrer innigen Theilnahme an dem unersetzlichen Verluste, der uns betroffen, versichert.

Belvoir bei **Zürich**,
den 16. November 1853.

Hochachtungsvoll:

Lydia Escher geb. Zollikofer, *als Wittwe*,
Alfred Escher, *als Sohn*,
Clementine Stockar geb. Escher, *als Tochter*,
Caspar Stockar-Escher, *als Schwiegersohn*.

772 225 730 776

nat am 18/30 Octbr. 1828.

776

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

723

725

730

726

...nd am $\frac{18}{30}$ Octbr. 1828.

...el!

729

...l um

...e.

...Natura-

...ärischen Stan-
...Pflanzen, Ihre
...ein viele dringend
...haben; denn sollte
...wünschte ich wenig-
...stens 1. Exem-
...plar Bibliothek auf ein
...mal Pflanzen und
...ich Bibliothek das
...Hedwigsche Herbar
...bitte ich Sie um ein
...F. O. A. G. Herb.
...Gefälligkeit auf
...Pflanzen von meinem
...erhalten haben,
...bitte ich mir anzuzeigen,
...ob Nordamerikanische
...mitkommen will,
...Aegypten: Capris Isidis,
...ata & sulcata, Fentzia pun-
...Caupactus nilotica, Cleomis
...B. Bus Aucheri;
...Senegalensis, Staphyl. nubica,
...mia cynanchi, Melolon-
...circumflexa, sutoralis
...splendidulus, Rhopr ovata,
...am Sinai: Cyprinus variant,
...Phylabris fasciata &,
...Eradius glabratus,
...sammlungen kommen
...Reimers
...B, Professor.
...den Garten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Nebria nitidula Fab.
2 —— arctica Dej.
3. Elaphrus splendidus —
4, Agonum carbonarium —
5. Amara interstitialis —
6. Apodenus nigricollis —
7. Aphodius ursinus —
8. coccinella nivicola —
9. Phalacria humeralis —

Fam. Cicindelae.

36 Hydrophilus rufipennis Latr.
37. Geotrupes compressa Weber
38. Hamatichirus corpulentus —
39. Buprestis smaragdula F.
40. Agrypnus tomentosus F.
41. Pachyrhynchus moniliferus —
42. Amaryginus cupreus F.
43. —— aereus —
44 Lampyris praeusta —

Mecanicha.

Eschscholtz, Johann Friedr.

in

Dorpat

geb. 1. 11. 1793 in Dorpat

st. 19. 5. 1831. in Dorpat

Professor der Zoologie. Reiste zweimal um die Erde mit Krusenstern u. Kotzebue.

Seine Sammlung gehört der Société des Naturalistes in Moscau

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Nebria nitidula Fab.
2. —— arctica Dej.
3. Elaphrus splendidus —
4. Agonum carbonarium —
5. Amara interstitialis —
6. Apodecrus nigricollis —
7. Aphodius ursinus —
8. Coccinella nivicola —
9. Phalacria humeralis —
10. Cychrus angusticollis —
11. —— marginatus —
12. Nebria metallica —
13. Patrobus atterimus —
14. Elater tumbricola —
15. Necrophor. maritimus —
16. Eleodes quadricollis Dej
17. " scutipes —
18. " cordata Dej —
19. Eulabis bicarinata. —
20. Poecilus californicus —
21. Amara insignis —
22. —— aurata —
23. Calathus ruficollis —
24. Ophonus dilatatus —
25. Agonum maculicolle —
26. Bembidium maritimum —
27. Gallerucа 11 punctata —
28. Anomala smaragdina —
29. —— sulcata —
30. Melolontha fuliginis —
31. Cetonia atomaria F.
32. Sphinx Caiti Sphinx L.
33. Sytiscus lizonicus nn.
34 —— bihamatus —
35 —— griseus F.

Kamtschatka

36 Hydrophilus ruficornis Latr.
37. Geniatis compressa Weber
38. Hamatichirus corpulentus —
39. Buprestis smaragdula F.
40. Agrypnus tomentosus F.
41. Pachyrhynchus moniliferus —
42. Amanygmus cupreus F.
43. —— aereus —
44 Lampyris praecusta —
45. Apomecyna 4fasciata —
46. Coccinella versicolor F.

Sibirien.

47. Scotodes annulatus — Livland.
48. Prop cadaverinus

Kirgisen Steppe

Mexicanische.

Den 6ten Aug. 1829 sonn
Prof. E. Schmidt aus Dorpat
[redacted]
gekommen.

123

nad am 18/30 Octbr. 1828.

...d!

...Hyaena im Libanesischen Gebirge, Hyaena brunea Afghanistan, Hyaena Hindostan, allein viele Singvögel immer nicht Schönbrunn; denn selbst ... Zuerst wünschte ich meine, gebiss nicht genau ... meinem Bibliothek auf eine Lastthiere und Pferden und ... ich jetzt viel Bibliothek, das ... hier an Insecten Beispiele ... selbst, so bitte ich Sie um ... Sendung an H. v. A. H. Hofrath ... dieser guten Gelegenheit auf ... Costen. Erstens Sie von meinen ... lagen solchen verfallene Farben, ... sagen Sie, bitte ich mir anzuzeigen, ... ich auf einige Nordafrikaner, ... Sie mir mittheilen will, ... a, Insect Aegypten: Copris Isidis, ... reflexa, Blaps cetosa ♀ sulcata, Tentyria pu... ...gonela regalis, Scarabeus nilolicus, Cleonis ... eroglyphica, Aphodius serripennis, Cicindela nilotica, Gymnidis subcostalis, ... Oxytes impressus, Buprestis irregularis – pallidosa – speciosa – squamosa – ... Scarites procerus, Anthia marginata, Gyrinus pallidus – subpinosus, Berisus ... tha flavicornis, Limolycus 4maculatus, Eradius carinatus, Cistela aenea, ... Lytta angusticollis, Brachinus maculatus. Ex Insect Syrien: Buprestis carissa – ... Scarites algiricus, Mylabris maculata, Carinus syriacus, Clytra ruficrus, Melolontha ... Sytiscus memoratus, Colymbetes bigottatus, Hydroporus fasciatus, ... – siciata, – asperus, Pinalia reticulata, – variabilis K, Lepidium tuberculatum, ... Typhaeus sulcata, – carinata. Ich sende, dass Sie die unsere ... werden, somit dann Ihnen freilich Insect Herzegowina ... mit der vollkommensten Hochachtung ... Hoffmannsegg, Graf v.

den Gaben

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

730

776

Dorpat am 18/30 Octbr. 1848.

Hochgeehrtester Herr Oberhäutmeister!

124

Schon lange hegte ich selbst den Wunsch, mit Ihnen in literarischen Verkehr zu treten, wurde aber von einem Jeden von Ihnen durch Bescheidenheit, Ihre Stellung der Generalin v. Madenstein sogar aufgefordert, allein viele dringende Geschäfte und gerade besondere Umstände mich abhielten; nun fasste ich Muth, mit Ihnen Bekanntschaft zu machen. Zuerst wünschte ich mein von der letzten Reise aus die Artikel des Hrg. v. Petzholdt nachzutragen; Letzterer gegen Nordafrikanische vertauschen; ich besitze von meinem Bruder eine Sammlung, auf welche ich fortwährend Zusendungen aus Sibirien und von Archangel bekomme. Von letzterem Orte habe ich jetzt viel Käfer bekommen, die seltenere von Pallas beschriebene Arten, die er am Jenisseisk gefunden. Wenn Sie zu diesem Behufe gewiss sehr gefällig wollten, so bitte ich Sie um gefällige Antwort; da ich auf einige Monate eine Reise an d. Ural-Gebirge thun werde, so kann ich bis dahin gute Gelegenheit auf gleiche Weise über Berlin senden, wenn Sie mir nicht eine andere für Sie bequemere vorschlagen sollten. Ich habe auf einige Nordafrikanische Käfer von H. Hr. Krug erhalten, deren Namen ich Ihnen mittheilen will, damit Sie sehen mögen, ob Sie mir auf viele finden können: A. Aus Aegypten: Copris Isidis, Oxyomus scaber, Graphipterus variegatus, Cephalotes bispinus, Scoliris hispida, Akis reflexa, Blaps costata & sulcata, Pentyria punctata & palmarum, Pimelia corrugata, cervica, - antiqua, Cetonia scripta, Cryptocephala regalis, Lamprotes nilotica, Cleonis hieroglyphica, Aphodius bicuspidatus, Cicindela nilotica, Cymindis setosa, Omophron stellatum, B. Aus Nubien: Oryctes imperator, Buprestis irregularis - politissima, - speciosa, - squamosa - bispinosa, Elater senegalensis, Staphylinus rubricus, Scarites procerus, Anthia marginata, Pyrinus pallidus, - subpinosus, Paris eriophora, Cetonia cyanochi, Melolontha flavicornis, Cimolpus 4 maculatus, Erodius carinatus, Cassida aurea, Coccinella ornata, - circumsepta, - sutoralis, Lytta angusticollis, Brachinus maculatus. C. Aus Syrien: Buprestis carinata - carbonaria, Pyrinus splendidulus, Blaps ovata, Tagenus algiricus, Mylabris maculata, Carinus syriacus, Clythra rufithorax, Melyris bicolor. D. Vom Sinai: Pyrinus variabilis, Tyrtaeus marmoratus, Colymbetes bigottatus, Hydroporus fasciatus, - varius. E. Aus Arabien: Mylabris fasciata & bicincta, - asperata, Pimelia reticulata, - variabilis &, Lepidium tuberculatum, Trox verrucosus, Erodius glabratus, Typhaeus sulcatus, - carinatus. Ich hoffe, dass Sie die meisten der klugsten Benennungen kennen werden, sonst kann Ihnen freilich Dr. Herrich-Schäffer nicht verständlich sagen, was das nachbenannten Forschungen Ihre ganz ergebenste. Adieu

Dr. Hoffmannsegg, Professor.

[illegible] Garten

Herrn Christian Freiherrn von Heydorf
Hochwohlgeboren

Frankfurt.

von Eversmann, Friedr. Eduard

in

Kasan

Kaiserl. russ. Dr. u. Prof. d. Naturgeschichte

geb. 23. 1. 1794 zu Hagen (Westphalen)

† 14. 4. 1860 in Kasan.

Kam 1838 in Frankfurt. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

27

N°1.	Pimelia Cephalotes. Pall	—	2.
2.	— neglecta. Fisch.	—	2
3.	— pubescens. Pall.	—	1.
4.	— costata. Fabr.	—	2.
5.	— subglobosa. Fisch	—	3.
6.	Tentyria rugulosa. Bon.	—	2
7.	— postica. Mannerh.		2.
8.	— dorsalis. Fisch.	—	2
9.	— subquadrata Tausch. (quadrulata Fisch angustata Gebl.)	—	1
10	— convexa. Tausch. (nana. Mannh.)	—	2
11	— macrocephala. Tausch.		2.
12	— pygmaea. Mannh.	—	2.
13	— (tetragramma) minuta. Tausch. (pusilla. Mannh.)	—	2
14	— thoracica Fisch.	—	1
15.	Lethrus longimanus. Fisch. (Eversmanni Fald.)		2.
16.	Blaps pruinosa. Eversman		2.
17	— confluens d. f. Fisch	—	2.
18	— vicina. Mannh. ? Var. von parvicollis Gebl.		1
19	— halophila et elongata. Fisch	—	1
20.	Platyscelis Gages. Dej.		2
21.	Dermestes bimaculatus. Ahrb.	—	1
22.	— fibricus Münch	—	1
23.	Trox fulcatus. Oliv.	—	2
24.	— Morticinii. Pall.	—	1

[illegible] v. Fald. [illegible]

[illegible] Bienen

v. Faldermann

[illegible] Botanischen Garten

St. Petersburg.

№ 25. Hololepta plana. — 1
26. Hister inaequalis. F. — 1
27 — biguttatus. Steo. — 2
28. Clythra atrophaxidis. F. — 1
29. Chrysomela adonidis. F. — 1
30. Melolontha Eversmanni. Mann. 1
31. Clythra longimana. Erhh. 2
(axillaris. Dahl.)
32. Cicindela elegans. Fisch. — 1
33. Cymindis cruciata Fisch — 2.
(picta. Pall)
34 — lateralis. Fisch — 2
35. — anchorifera. Manerh. 2
(Coralis Fisch)
36. Scarites Buccida. Pall. — 1
37 Carabus aurolimbatus. Mörh 1
38 — adonas. Hev. — 2
39 — perforatus. Fisch — 1
40 Amphicoma oxyptera. Pall — 1
41. Melolontha altaica. Mörh. — 1
42. — vulpina. Schh. — 1
43. — deserta. Fisch. — 1
44. Geotrupes Anemon. Pall. — 1
45. Amphicoma Vulpes. F. — 1
46. Omaloplia hirta. Gebl. — 2
47. Leptura bipunctata. F. — 3
48 Calosoma Panderi Fisch (Callist.) — 1
Diese Arten sind im März 1838
von Prof. [illegible] Eversmann
aus Kasan erhalten. Die Arten
sind von Orenburg, der calmückischen
u. kirgisischen Steppe. Eine die Altgasch

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

27

126 278

Ehrenann aus Kasan
hat ~~März 1838~~ erhalten:

1. Cocc. M nigrum. 2 M. Zfl.
2. Pterost. Heydenii Hunger.
3. Trich. 8punctatus . . Gall.m.
4. Ophonus pubescens. Pz . . Cachesen
5. Hebria erythrocephala . . Corsica
6 Triplax nigripennis . . Zfl.
7 Clerus mutillarius . . id.
8 Callid. alni . . . id
9 Bolet. interruptus . . Silesien
10. Cilon. affinis . . . Zfl.
11 Helodes violacea . . . id.
12 Hexolobsh. melanocephal. Zl. . id.
13. Clypeaster lateralis. Gyl. . id.
14. Dromius melanocephalus. Zj. . id.
15. Procadion Borisiae Zl. . id.
16 Bostr. bidens. Zfg . . id.
17. Rhopalopus picipes. Pz. . . id.
18. Rammacerus 2punct. (Z.) . . id
19 Clairger testaceus. Pz. . . id.
20 Rhyncites coeruleocephalus . . id
21 Melus caliginosus . . . id.
22. Coccin. 11notata . . . id.
23 Rhizomacer lepturoides . . id
24 Byrrhus ornatus . . . id.
25 Gastrodes pedemontanus . . Piedm.

Diese Arten u. andere
wollte ich (nebst 1 Ex. von
Xanthopus Rossii) dem Prof.
Ehrenann aus Kasan
als Tauschgeschenk geben,
er war aber schon
von hier abgereist.

Verehrte Grüße
Ihr Feldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
zu Petersburg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ 25. [illegible]
26. [illegible]
27 —
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]
31 [illegible]
32. [illegible]
33. Cym[illegible]
34 —
35. —
36. Scar[illegible]
37 Car[illegible]
38 —
39 —
40 Amph[illegible]
41. Melo[illegible]
42. —
43. —
44. Geot[illegible]
45. Amph[illegible]
46. Omat[illegible]
47. Lop[illegible]
48 Calo[illegible]
Din[illegible] Ar[illegible]
[illegible]
[illegible]

230

231

27

Faber, Fr.

in

Horsens. [Dänemark]

Fr.

Fr: Faldermann.

Fr. Faldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

46. Omar
47. Leptu
48 Caloso
Diese Ar

Forsmannsdorf 2te November 1827

127

Hochgeehrtester Herr

Seit Ihrem sehr werthen Schreiben v. d. 15. September v. J. habe ich gehalt der Diplom als correspondirender Mitglied der Brandenburgischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurth zu erhalten. Es hat mich sehr erfreut einen so schmeichelhaften Ruf der Ehrenvollen neuen Gesellschaft zu empfangen, deren aufgezeichnete nutzbringende Wirksamkeit die Literarische Welt schon lange rühmlich bekannt ist, und es erfreut der Mitglied der Gesellschaft die Verpflichtung meinen innigsten Dank und Thätigkeit abzustatten. Ebenso bitte ich gefälligst den Herrn Director Dr Mediciand Ehrenbrechmar, dessen Güte die vorzüglich von einem Ruf über die hiesige Flora übergenommen zu haben, auf meinen gütigen Dank, von mir zu grüßen, und denselben zu versichern, daß es mir im Monat künftigen die gewünschten Wallroth mittheilen zu

[illegible] 1827.

J: Feldermann.

Herrn
J. Feldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

Lieber, geschehen ist, daß ich mich mit geschriebener Gabe.
Inzwischen mich Ihnen gefälligst empfehle, erlaube ich mich Ihnen
meine wahre Hochachtung zu bezeugen.

Ihr ergebenster
Fr. Faber.

LVK LEHRBIBLIOTHEK
GYMNASIUM

732

302

Fr: Faldermann.

Fr. Faldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

DANEMARCK
PAR HAMBOURG

233

Faldermann, Franz.

in

St. Petersburg

Director des botanischen Gartens.

geb. 28. 2. 1799 in Heidelberg

† 30. 11. 1838 in St. Petersburg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

235

St. Petersburg d. 12/24 D. März 1827.

129

Hochgeschätzter Herr Baron.

236

128

Hochgeehrtester Herr.

Ihr alles Gute beschützt
ich die mir durch Ihren gütigen Brief
dargebotene Gelegenheit, Ihnen einige
Pflanzen Chinas zu senden, die Zeit genug
war so kurz daß mir nicht möglich
gut zu Ihrer Liste zu kommen übrig
blieb, sie soll aber mit nächster Post
folgen, nebst den dazu nöthigen
Anweisungen.

Ich bitte gütigst daß meine Liste
mit der Liste, die Sie durch Chinas erhalten
werden.

Ihr Hochachtungsvoller

St. Petersburg
d. 11/23 März 1827.

ergebenster Diener
F: Baldermann.

künftig ging ich mit dem Vorsatze
hinaus, um mich zu dem Fräulein
zu gesellen der Traum wurde wahr
Herr Graf und Mannheim, einen
und Thomas zu Tisch bekam.
natürlich der Wunsch entstehen, gesellig
bald sprachlich vor Thomas einen Platz
meinen Bekleidung sind, zum
in Herr Mannheim verliebt, dass er
ein Augenblick, in der Gesellschaft
Vorsatz aufgeben sollte; bis endlich
einem bösen Liste bekannte.
A bei dem Herrn Baron von Alopeus
wesen, der Frau Generalin von Manteuffel
Gatten, Herrn und Chirurg par renommé
Gespräch bald auf die Entomologie fiel,
unterrichten Freundlichkeit einige Zeit
und gütig über den Empfang
Sie sprechen mich auf meinen

ergebenster Diener
F. Baldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

St. Petersburg d. 12/24 D. März 1824.

129

Hochgeschätzter Herr Baron.

Schon längst ging ich mit dem Vorsatze um, Ihnen allen meinen Dienst anzubieten, um mich zu Ihrem schätzbaren Correspondenten bilden zu können; mehrere der Umstand vermehrte, daß ich bei meinem geehrten Freunde Herr Fischer von Waldheim, einen äußerst interessanten Tausch Käfer von Ihnen zu sehen bekam.

Der hiesige botanische Entomolog, mußte natürlich der Mensch nachstehen, alles Neue zu besitzen, wenn mir deßfalls sogleich von Ihnen einen Verein Falscher Käfer, welche doubletten in meiner Sammlung sind, zum Tausche zu senden. Allein da ich durch den Herr von Waldheim erfahre, daß er Ihnen einen Tausch, schon längst gesandt habe, und noch immer keine Antwort sich zu erfreuen hatte, so war es ungewiß, in der Voraussetzung, Ihnen lästig zu sein, ob ich meinen Vorsatz ausführen sollte; bis endlich ein glücklicher Zufall, die Sache mit einem hohen Lichte beleuchtete.

Ich hatte die Ehre, in Gesellschaft bei dem Herrn baron von Adelung die Bekanntschaft Ihres Hochgeschätzten Bruders, des Herr Generalin von Manderstern zu machen, die mir bereits durch Ihren Namen Gönner, Herrn und Freund sehr renommirt wurde; es konnte nicht fehlen daß das Gespräch bald auf die Entomology fiel, wobei ich dem durch erfahre, daß die Manderstern'schen Insecten eine Zeit bei Ihr liegen geblieben wären, und folglich über dem Tausche keine Antwort zurück sein konnte. Ich sprach mich auf meinem

mit der ich stets zu Ihren Diensten bereit bin.

Ihr Hochwohlgeb.

ergebenster Diener
J. Feldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...ida lateralis Sibiria.
Nicleus Sibiria.
tricolor Sib.
Procerus taurinus Caucas.
Carabus perforatus Sib.
scabriusculus Caucas.
mingens Caucas.
Dejeani Caucas.
elevatus Caucas.
Schonherri Sibir.
Bocberi Sibir.
cuprinus Sib.
Jenisonii Sib.
cyanicollis Sib.
campestris Tauria
Cychrus debilis, Eschscholtz e America occidentali.
Platynus longicornis Sib.
...gonum inaratum Sib.
Cicindela gracilis Sib.
Daptus blondinus Sib.
Omaseus adstrictus Esch. America occident. Sitcha.
Poecilus californicus Esch. California.
Buprestis Dahlmanni Esch. maxillar
maculatus nov. Hollandiae.
Elater Barbieri Sib.
Hydaticus lugonicus Esch. Insula Luzonia
Necrophorus mentitus Esch. Amer. occ. Sitcha
Anoplognatus analis
porosus
Rhipicerus manicatus

31. Euchlora holosericea Sib. anomala.
32. Atonia atomaria Jak. maxillar.
33. aeruminata Esch. maxillar.
34. Melolontha salicipennis Esch. maxillar.
36. Lethrus cephaloter F. hor. mer.
36. Oxythyreus marginalis Gebler. Sibiria.
37. Nyctelium atrimanus Esch. Chili.
38. Thoracius Esch. Chili.
39. Platycerus gagates Sibiria.
40. Tentyria sibirica Sib.
41. Pimelia subglobosa hor. mer.
42. Heliophilus punctatus Caucasus.
43. Blaps reflexicollis Caucas.
44. cylindrica Caucas.
45. spinimana Caucas.
46. Lytta sibirica Sibir.
47. megacephala Sib.
48. syriaca Sibir.
49. erythrocephala Sib.
50. Mylabris sibirica Sibir.
51. minuta Sibir.
52. Brachus Faldermanni Hummel in seminibus nucum Indicarum.
53. Chrysolopus spectabilissimus.
54. Monoxy... Pallas.
55. Parhyta variabilis Sibir. gebler.
56. Leptura bipunctata Sibir.
57. vincolor Esch. maxillar.
58. 3-fasciata F. Kamtschatka
59. Clytus capra Sibir.
60. Calidium clavipes Sibir.

61. Dorcadion carinatum Sibiria.
62. Anyomela lapponica Sibir.
63. musiva Sibir.
64. Coccinella niviicola Sitcha. Eschscholtz.
65. Gallerucas absinthii Sibir.
66. Argopus nigritarsis Sibir.
67. Bytiscus lapponicus Suecia.
68. Bozemanni Suecia.
69. Ulpis ceramboides Petropol. rarissima.
70. Gyrinus bicolor Suecia. Dieser Käfer ist ganz gemein von den Exemplaren weichen mein paar Stücken aus Spanien ab, und ist gleich der ganzen Art, eine in sich abgeschlossene Varietät, welche ich G. hispanus n. minutus Suecia.
71. Coccinella M. nigrum Suecia
72. Diaperis haemorrhoidalis Suecia
74. Elater rufipes circ. Petrop. rarissimus
75. Brachodes elevatus Petrop rarissimus
76. Bostrichus 8. dentatus Suecia
77. Gallerucas nymphaeae Suecia
78. Pytho depressus circ. Petropol rarissimus
79. Cucujus dermestoides Suecia
80. Rhagium Gebleri M. Sibiria.
81. Parhygaster augurus Hummel. circ. Petropol. 16.
82. Leptura interrogationis Petropolitana.

N. B. Ich sende dieses auch an Dich, weil ich Dich bitten muß, mir dasselbe zurück zu senden, und zwar auch deshalb, weil ich es mir noch vervielfältigen muß, und da ich nur wenige Exemplare besitze, so bitte ich Dich, mir es gefälligst recht bald zurück zu senden. Ich habe noch eine Menge Insecten, ganz besonders Käfer, die mir noch fehlen, und da ich Dir gerne dienen möchte, so bitte ich Dich, mir Deine Desiderata zu schicken. Ich hoffe, dass Du mir recht viele Käfer aus Persien und Klein Asien zu verschaffen wissen wirst, wofür Du mich recht dankbar finden wirst. Ich bin mit Vergnügen an Dich und Deine Familie Dienst bereit.

F. F.

mit der ich stets zu Ihren Diensten bereit stehe.

Ihr Hochachtungsvoller

ergebenster Diener
J. Faldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

138

A.

Monsieur

Le Baron de Fleydorf

Secrétaire savant auprès
du Musée d'Histoire naturel

à

Francfort a. m.

R.
MEMEL

53½

St. Petersburg d. 17 Juny / 1 Juli 1829.

Breslau d: 1 Jun. 1829.

St. Petersburg d 6/18 März 1829.

Hochwohlgeborner Herr Baron.

Ich hatte das Vergnügen durch Ihre Frau Schwester (Generalin von Manderstern) zu erfahren, daß Sie Entomolog sind, und würde mir gewiß Entomologen in Constantinopel zu kennen, ist vorjetzt noch die Gelegenheit, um Ihnen meine Dienste anzutragen, und sage Ihnen zu meinem Schreiben, zugleich ein Kästchen Käfer, welche Sie auf schönen Nadeln wünschen; da mir noch Ihnen den Empfang der Sendung nicht notirte, die in demselben Kasten, mit den Ihrigen zusammen lagen; der Kasten ging von St. Petersburg d 12 März 1829. ab. Sollte mir Ihre Frau Schwester etwas in ihrem Auftrage gesagt haben, und Sie vielleicht andere Gegenstände der Zoology wünschen? — Auch sage Ihnen wundert mich nicht, aber Ihr Stillschweigen; wenigstens ist es Ursache, warum ich weiter keine Sendung an Ihnen mehr expedirt habe; da ich Ihnen doch aus dem russischen Reich, so schöne Arten liefern könnte, besonders jetzt, wo ich durch unsern Naturalisten, der auf Kaiserlich Kosten in Persien sammelt, so schöne Sachen von dort selbst habe, die fast sämmtlich neu sind; vorzüglich schöne Buprestis Arten und Pimeliden S. a. m. Ich war so frei diesen Schreiben an Sie zu adressiren, um wenigstens zu der Gewißheit zu gelangen, ob etwas, und was, Ihnen angenehm sein könnte; würden Sie mich sehr gefälligst mir Nachricht geben, so würde ich meine Maßregeln darnach nehmen können. Sollten Sie etwa geschrieben haben, und der Brief verloren gegangen sein? —

Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung und Ergebenheit mit der ich stets zu Ihro Dienste bereit stehe.

Ihro Hochwohlgeb.

ergebenster Diener
J. Feldermann
im Kaiserlich Botanischen Garten
St. Petersburg.

138

238 241

St. Petersburg d. 17 Juny / 1 July 1829.

190

191

237a

UB Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

S. Hochwohlgeboren

Herrn Baron von Heydwe

Senator - & . &

in

Frankfurt a/m.

FRANKFURT 23 MAI 18

DFG

238 241

St. Petersburg d. 17. Juny / 1. July 1829.

290

131

Hochwohlgeborner Herr.

Recht angenehm hat mich Ihr gefälliges Schreiben vom 6. Juny überrascht, besonders da ich daraus vernommen habe, daß Sie meine Sendung erhalten haben, und so Ihnen angenehm war. Gestehen muß ich, daß wohl fast Raumer da wie ich, nicht wußten den Mittelsmann uns zu erklären; da ich durch Ihre Verwandten in St. Petersburg mehrmalen erfahren hatte, daß Sie sich fortwährend in Frankfurt wohl befinden; wir besorgten schon, daß Sie sich etwa von der schönen Entwicklung zurück gezogen hätten, und betrauerten schon beide und beide den Verlust, den die Wissenschaft dadurch erleiden hätte. Es freut mich recht sehr daß Sie mit meiner Sendung zufrieden seyen, auch weiß ich gerade nicht etwas gelehrtes Neues von meinem schönen Persien zu sagen, da ich von Neuem viele Denkblätter besitze, und größtentheils neue seyen sind. —

Prof. Raumer ist gegenwärtig nicht in Petersburg, sondern befindet sich in seinem Landgute in Finnland, von wo er jedoch bald zurück erwartet wird, alsdann werde ich ihm von Ihrem Andenken viele Denkblätter bringen, und ihm die Freude Ihres Schweigens erklären.

Vergeben Sie die Länge meines Schreibens, da mich aus meinen vielen Amtsgeschäften, gegenwärtig mehrere Vorbereitungen für England, Nordamerika und Frankreich beschäftigen, die ich mit offenem Herzen expedirt wünsch, ich bekam von ihm ganz Tagen einen ausführlichen Brief, aus dem Innern von Nordamerika

prächtiges für die hiesige Entomologen neue Arten
und wo von jeder Art in mehreren Exemplaren.

Ich habe ebenfalls lange vom besten Erfolg
erfahren, und bei mir auch nicht auf mein Befragen
geantwortet, deßhalb wende ich diese Zeilen zum ersten Male
Persiens an.

Mit ganz vorzüglicher Hochachtung und Ergebenheit

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

F. Faldermann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 AUG 1861

75

Du Jardin Botanique Imperial a St. Petersburg

E. WEMEL
12 AUG

a'

Monsieur

Monsieur le Senateur

C. de Heyden

R

a Francfort

a/m

53/2

241

Göttingen 22 Juni 1838

Hr. Professor Gabler

132

240

Fehler, C.A.

in

Göttingen

gest. 1843.

53./.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Göttingen, Juni 1828

An Wiedeburg

132

Ew. Wohlgeboren

Ihre gütige Zuschrift vom 18ten d. M. habe ich mit dem innigsten Vergnügen gelesen. Ich bin es Ihnen, mein Freund, das Vaterland, Ihre Familie und mich selbst schuldig, Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre Freundschaft und Liebe zu bezeugen, und ich thue es mit der innigsten Rührung. Ich bin Ihnen, mein Freund, für alles, was Sie mir sagen, unendlich dankbar, und ich bin es Ihnen, mein Freund, für alles, was Sie mir sagen, unendlich dankbar.

Von Einführung der Neuen gesetzlichen Maaße in Preußen

Das Publikum wird hiermit benachrichtigt, daß vom 1ten Januar 1817 an, in allen Preußischen Landen, nur folgende Maaße gesetzlich sein werden, und daß alle andere, bisher gebräuchlich gewesene, Maaße, von diesem Tage an, aufhören, gesetzlich zu sein.

Als Längenmaaß: Ein Rheinländischer Fuß, welcher in 12 Zoll, jeder Zoll in 12 Linien, und jede Linie in 12 Punkte getheilt wird.

Als Flächenmaaß: Ein Quadratfuß, welcher in 144 Quadratzoll, jeder Quadratzoll in 144 Quadratlinien, und jede Quadratlinie in 144 Quadratpunkte getheilt wird.

Als Körpermaaß: Ein Kubikfuß, welcher in 1728 Kubikzoll, jeder Kubikzoll in 1728 Kubiklinien, und jede Kubiklinie in 1728 Kubikpunkte getheilt wird.

Als Hohlmaaß: Ein Scheffel, welcher in 16 Metzen, jeder Metzen in 4 Quart, und jedes Quart in 2 Kannen getheilt wird.

Als Gewichtmaaß: Ein Pfund, welches in 30 Loth, jedes Loth in 4 Quentchen, und jedes Quentchen in 4 Pfennige getheilt wird.

Als Münzmaaß: Ein Thaler, welcher in 30 Silbergroschen, jeder Silbergroschen in 12 Pfennige getheilt wird.

Diese Maaße sind in einer Verordnung vom 16ten Mai 1816 festgesetzt, und in einer Instruktion vom 16ten Dezember 1816 näher erläutert worden. Beide sind in Berlin bei der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei gedruckt, und in Buchhandlungen für 4 Groschen zu haben.

Die Instruktion enthält eine Anweisung, wie die neuen Maaße und Gewichte, aus den bisherigen, berechnet werden können. Sie ist mit den nöthigen Tabellen versehen, und wird, wie die Verordnung, jedem Eigenthümer, welcher Maaße oder Gewichte zu verfertigen oder zu verkaufen gesonnen ist, zu empfehlen sein.

Die Verordnung vom 16ten Mai 1816 ist in Berlin bei der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei, und in Breslau bei Grassmann, Sohn, und Comp. gedruckt, und kostet 4 Groschen.

Die Instruktion vom 16ten Dezember 1816 ist in Berlin bei der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei, und in Breslau bei Grassmann, Sohn, und Comp. gedruckt, und kostet 4 Groschen.

Paris Ce 9 avril, 1827.

133

243

B^rn Férussac d'Audebard

André, Etienne, Juste, Paschal, Joseph, François.

in

Paris

geb. 1786

T. 21. 1. 1836.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris Ce 9 avril, 1827.

133

Monsieur!

Ce n'est qu'en janvier de cette année que j'ai reçu le paquet contenant votre diplôme et l'obligeante lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire pour me donner connaissance de l'honorable marque d'estime que la Société de Francfort pour les sciences naturelles a bien voulu me accorder.

Veuillez, Monsieur, excuser mon retard à vous remettre la reception de cet envoi, et m'excuser auprès de votre savante société pour n'avoir point encore acquitté la dette de ma reconnoissance; une maladie inflammatoire m'a pendant trois mois empêché de travailler et ce n'est qu'avec beaucoup de peine que j'ai pu vaincre ces soins les plus impérieux qui exige la direction du Bulletin.

Veuillez faire agreer mes excuses à votre société et être près d'elle l'interprète de tous mes sentimens de gratitude et de dévouement. Veuillez l'assurer de tout mon empressement à seconder ses travaux en ceux de ses Membres en particuliers, comme aussi à les faire valoir par le moyen de mon Bulletin

Toutes les fois que l'occasion s'en présentera, je serai d'ailleurs heureux de leur prouver mon dévouement ainsi qu'à mes Honorables Collègues et fort empressé de leur être utile en agréable dans cette Capitale en toute occasion. Veuillez Monsieur recevoir en particulier pour vous même de semblables assurances et croire à tous les sentimens de la Considération la plus distinguée et de l'Estime particulière avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Monsieur

Votre très humble
et très obéissant serviteur

Paris Ce 9 avril 1827.

Jean de Fernand

rue de l'abbaye
N° 3.

Folgende Arten von Rösler d. R. sind in von Riese gekauft Nov. 1832.

No.	Name	x	No.	Name	x	No.	Name	x
2	signaria	12	51	prunalis	6	121	scutulana	12
6	furvata	18	52	olivalis	12	122	corticana	12
7	obscurata	12	58	politalis	24	123	ophthalmicana	18
8	cebraria	12	60	flavalis	12	124	seminaculana	12
15	rufaria	12	62	pandalis	8	125	parmatana	12
16	crabraria		63	trinalis	12	129	siliceana	9
			73	alternalis	6			

134

245

Fischer, Edler v. Röslerstamm.

in

Wien

F.

Prima Lepidopteren-Sammlung des Herrich-Schäffer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Arten von Rösler d. R. [illegible] ist von Riese gekauft Nov. 1832.

No.	Name	x	No.	Name	x	No.	Name	x
2	signaria	12	51	prunalis	6	121	scutulana	12
6	furvata	18	52	olivalis	12	122	corticana	12
7	obscurata	12	59	politalis	24	123	ophthalmicana	18
8	cebraria	12	60	flavalis	12	124	seminaculana	12
15	rufaria	12	62	pandalis	8	125	parmatana	12
16	scabraria	8	63	trinalis	12	129	siliceana	9
18	osseata	12	73	alternalis	6	133	angustana	12
19	sericeata	18	76	cicatrisalis	18	136	alpinana	12
20	vetulata	12	78	cingulalis	18	139	ramana	9
22	debilitata	9	80	caprana	4	141	unguicana	12
24	sobrinata	9	83	variegana	4	143	Myrtillana. 2 N.	12
27	hospitata	12	88	mixorana	12	144	caudana	8
28	strobilata	9	86	xylosteana	12	145	scabrana 2 N.	24
29	propugnaria	12	88	laevigana. 3 N.	24	146	ferrugana	6
30	ferrugaria	4	89	cinctana	8	147	mixtana	24
31	olivaria	8	90	gnomana	8	149	Kindermanniana	18
32	pyraliata	9	91	strigana	8	153	angustana	12
33	silaceata	12	92	Grotiana	8	152	dubitana	12
36	remutata	12	93	ochreana	12	155	betulinella	8
39	decorata	18	96	rosetana	12	158	Tapezella	12
42	cribralis	24	98	Gouana	8	160	Ulicella	12
43	emortualis	18	99	Rolandriana	18	162	cerella	12
44	derivalis	24	100	Baumannniana	8	163	palpellus	12
45	griscalis	18	101	sanguinana	12	164	atripalpellus	24
46	tarsicrinalis	18	103	resinana	9	168	hortuellus	6
47	barbalis	24	104	Hereyniana	12	169	cerusellus	12
48	crassalis. 3 N.	36	106	nygmaeana. 2 N.	12	172	conchellus	12
49	pinguinalis	18	107	Zinckenana	12	176	aquilellus. 3 N.	24
		6/50	110	micana	18			6/10
			112	cespitana	9			
			113	Charpentierana	8			
			117	frutetana	4			
			119	musculana	8			
					6/6			

134

252

256

№	Name	x
177	selasellus	24
178	inquinatellus	8
179	lutellus	12
181	silacellus	12
182	chrysellus	12
183	mercurellus	6
185	decorella. 2 N.	16
186	ahenella	8
187	Antiopella	12
188	vinetella	8
192	grossulariella	12
193	abietella	18
194	consociella	12
195	legatella	18
203	populella. 2 N.	24
204	cicutella	8
205	Angelicella	12
206	characterella	12
208	proximella	6
209	Monfetella	12
210	striatella	12
212	porrectella	8
213	Illigerella	8
214	Daphnella	12
215	Labiosella	12
216	Bicostella	6
217	Rostrella	8
218	Bitrabicella	18
219	semicostella	8
222	Denisella	12
224	Gallinella	8
225	Lisimilella	12
		6 / 16

№	Name	x
	conterbefella	
228	fulvella	18
230	caesiella	9
232	Coronillella	12
234	Artemisella	8
241	pilella. 2 N.	18
243	Panzerella. 2 N.	12
245	caesiella	12
247	pygmaeella	8
248	Cornella	12
251	Roesella	12
259	Upupaenella	9
260	rufiperella	9
267	Christiernella	12
268	albifrontella	9
269	flavifrontella	12
270	variella	9
271	cuspidella	12
		3 / 13

№	Name	x
	Nouvelle	
30	ferrugaria var. 2 N	8
1	Hexamaria	12
17	elutata. 2 N.	18
34	aversata. 2 N.	18
159	fagella	8
138	siculana	8
111	olivana	9
121	scutulana	12
		1 / 33

6 / 50
6 „ 6
6 „ 10
6 „ 16
3 „ 13
1 „ 33
30 / 8

G: 22 Nov. 1852
von Kiesenwetter

Doubletten von J.E. Fischer E.s.R. in Nixdorf. Juny. 1802. (Von Ss. Nixdorf mitgetheilt)

136.

	x		x		x		x
Ennomos		Acidalia		Achatinata		Botys	
Flexularia	12	Ochreata	8	Moeniaria	12	Sambucalis	9
Notataria	9	Rufaria	12	Pyralitata	9	Rubiginalis	18
Signaria	12	Albulata	8	Rufata	12	Verbascalis	18
Alternaria	9	Luteata	8	Prunata	9	Ophialis	24
Emataria	9	Scabraria	8	Silaceata	12	Fuscalis	9
Emarginaria	8	Elutata	9	Ruptata	9	Flavalis	12
Crataegata	9	Impluviata	12	Montanaria	12	Hyalinalis	8
Aceraria	9	Brumata	8	Alchemilata	8	Verticalis	9
Geometra		Dilutata	9	Rivata	9	Pandalis	8
Papilionaria	12	Ossea	12	Zerene		Trinalis	12
Aeruginaria	9	Pallidaria	18	Procellata	36	Urticalis	6
Putataria	8	Byssinata	18	Fluctuata	4	Hybridalis	18
Cythisaria	18	Sericeata	18	Rubiginata	12	Polygonalis	36
		Rivulata	9	Sinuata	18	Palealis	12
						Nymphula	
							4
							9

135

	x		x		x
Ennomos		Herminia		Tortrix	
Signaria	12	16 tarsicrinalis	18	97 rusticana	8
Geometra		Hypena		99 Rolandriana	18
Turpata	18	48 crassalis	12	101 sanguinana	12
obscurata	12	Scopula		Coccyx	
Fidonia		51 prunalis	6	104 Hercyniana	12
Cebraria	12	Botys		106 pygmaeana	6
Hepialus	9	60 flavalis	12	108 Resinana	9
Chesias		62 pardalis	8	Sericoris	
variata	9	63 trinalis	12	107 Zinckenana	24
impugnata	30	55 politalis	24	110 Micana	12
Acidalia		Nymphula		111 olivana	12
Ochreata	8	64 Stramentalis	9	112 Charpentieriana	9
rufaria	12	67 litoralis	4	Carpocapsa	
scabraria	8	Pyrausta		116 arcuana	6
Ossata	12	70 cingulalis	18	Sciaphila	
Sericeata	18	71 ostrinalis	6	117 Fruticetana	4
Vetulata	12	Ennychia		118 Wahlbomiana	4
Larentia		Herminia		119 Musculana	8
Zebilitata	9	43 emortualis	18	Paedisca	
Valeriana	12	44 derivalis	24	122 corticana	18
Sobrinata	9	45 grisealis	18	123 ophthalmicana	12
Hospitata	12	42 vibratilis	24	124 seminaculana	12
Strobilata	9	47 Barbalis	18	Graphiolita	
Cidaria		Hercyn		129 Idiana	9
Propugnaria	12	76 cicatricalis Hübn.	18	130 Cinnabarinana	6
Fortunugaria	4	Ennychia		131 Mediterranea	6
Olivaria	8	78 cingulalis	18	Phoxopteris	
Pyralitata	9	Perthis		137 Lancealana	8
Silaceata	12	capreana	4	138 Siculana	8
Idaea		cynosbana	12	143 Myrtillana	6
Subsericata	24	85 Nexorana	12	Teras	
Semitata	12	Tortrix		144 cuneana	8
Serpentata	12	91 strigana	8	145 scabrana	12
Secretata	18	92 Grotiana	8	146 ferrugana	6
Ventilata	18	93 Ochreana	12	147 Mixtana	24
		96 Rosetana	12	Cochylis	
				149 Kindermanniana	18
				152 Schreibersiana	12
				155 Augustana	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Name	x
177	selasellus	24
178	inquinatellus	8
179	lutellus	12
181	silacellus	12
182	chrysellus	12
183	mercurellus	6
185	decorella. 2N.	16
186	ahenella	8
187	Antiopella	12
188	vinetella	8
192	grossulariella	12
193	abietella	
194	consociella	12
195	legatella	18

Hapsyl

202	Zephyrella	8
203	populella	12
204	cicutella	8
206	Characterella	12

Tinea

207	Asperella	12
208	Proximella	6
209	Monetella	12
210	striatella	12

№	Name	x
228	~~tubicella~~ contarbitella	18
230	caesiella	9
232	Coronillella	12
234	Artemisella	8
241	pilella — 2N	18
243	Panzerella. 2N.	12
245	caesiella	12
247	pygmaeella	8
248	Cornella	12
251	Roesella	12
252	Illum[illegible]	8

№	Name	x
	Nonsberg	
30	ferrugaria var. 2N	8
1	flexuaria	12
17	elutata. 2N.	18
34	aversata. 2N.	18
159	fagella	8
138	siculana	8
111	olivana	9
121	scutulana	12
		1/33

Tinea

213	Illigerella	8
214	Daphnella	12
215	Labiosella	12
221	~~subpurpurella~~	8
222	Denisella	12
224	Gallinella	8
225	Diospiniella	12
227	ferrugimella	6
228	contarbitella	18
230	Caesiella	9
231	tinctella	12
232	Coronillella	12
234	Artemisella	8
236	~~Podevinella~~	8
237	~~Leucocrella~~	8
240	~~viridella~~	9
243	Panzerella	6
244	~~Metaxella~~	8
245	Caesiella	12
247	pygmaeella	8
248	cornella	12
249	~~Goedartella~~	8
251	Roesella	12
252	~~Herrmannella~~	9
253	~~Festaliella~~	9
254	~~Blancardella~~	8
255	~~Humiferlella~~	8
256	labdaciella	9
257	~~Rhamnifoliella~~	8
258	~~Mastellella~~	8
259	Upupaeella	9

Tinea

260	rufipenella	9
261	tyriopenella	8
262	~~passeripenella~~	8
267	Christierella	12
269	Maxifrontella	12
270	varicella	9
271	Cuspidella	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Doubletten von J. E. Fischer E. d. R. in Nixdorf. Juny. 1832. (Von H. Reisse mitgetheilt)

136.

Ennomos
Flexularia — 12
Notataria — 9
Signaria — 12
Alternaria — 9
Amataria — 9
Emarginaria — 8
Crataegata — 9
Aescularia — 9

Geometra
Papilionaria — 12
Aeruginaria — 9
Putataria — 8
Cythisaria — 18

Acidalia
Ochreata — 8
Rufaria — 12
Albulata — 8
Luteata — 8
Scabraria — 8
Elutata — 9
Impluviata — 12
Brumata — 8
Dilutata — 9
Ossea — 12
Pallidaria — 18
Byssinata — 18
Fricata — 18
Rivulata — 9
Blandiata — 6
Rusticata — 12
Frustata — 18
Vetulata — 12
Bilineata — 4

Larentia
Cervinaria — 12
Mensuraria — 8
Flagitata — 12
Cassiata — 12
Bipunctaria — 9
Cucullata — 18
Psittacata — 12
Rectangulata — 9
Debiliata Hb. 162. 163. — 9
Valerianata — 12
Sobrinata — 9
Pimpinellata — 9
Pusillata — 8
Denticulata — 18
Hospitata — 12
Strobilata — 9

Cidaria
Propugnaria — 12
Graphata — 18
Quadrifasciaria — 12
Ferrugaria — 4
Ligustraria — 12
Ocellaria — 8
Galiata — 12
Olivaria — 8
Ziaria — 8
Populata — 8

Rubricata — 8
Moeniaria — 12
Pyraliata — 9
Rufata — 12
Prunata — 9
Silaceata — 12
Ruptata — 9
Montanaria — 12
Alchemilata — 8
Rivata — 9

Zerene
Procellata — 36
Fluctuata — 4
Rubiginata — 12
Sinuata — 18
Albicillata — 18
Marginata — 6
Grossulariata — 8

Minoa
Euphorbiata — 6

Idaea
Calabraria — 24
Vibicaria — 8
Aureolaria — 18
Aversata — 9
Suffusata — 24
Remutata — 12
Immutata — 18
Incanata — 12
Ornata — 9
Decorata — 18
Bisetata — 8
Scutulata — 18
Moniliata — 18

Herminia
Barbicrinalis — 18

Hypaena
Proboscidalis — 8
Crassalis — 12

Pyralis
Angustalis — 12
Honestalis — 24

Scopula
Dentalis — 18
Prunalis — 6
Frumentalis — 18
Ericeticalis — 6
Olivalis — 12
Suffusalis (Aerealis) Hb. 44. — 18

Botys
Sambucalis — 9
Rubiginalis — 18
Verbascalis — 18
Ophialis — 24
Fuscalis — 9
Flavalis — 12
Hyalinalis — 8
Urticalis — 9
Pandalis — 8
Prinalis — 12
Urticalis — 6
Hybridalis — 18
Polygonalis — 36
Palealis — 72

Nymphula
Literalis — 4
Potamogalis — 9

Asopia
Farinalis — 12
Fimbrialis — 24
Flammealis — 12
Alternalis — 6

Pyrausta
Sanguinalis — 12
Purpuralis — 4
Cespitalis — 8

Ennychia
Albofascialis — 24
Fascialis — 24
Cingularis — 18
Anguinalis — 12
Polinalis — 12

Penthina
Salicana — 9
Capreana — 4
Roborana — 8
Pruniana — 4
Variegana — 4

Tortrix
Adjunctana Hb. — 18
Xylosteana — 12
Hepatana — 12
Laevigana — 8
Consimilana — 12
Cinctana — 8
Gnomana — 8
Strigana — 8
Grotiana — 8

MICRO

als Supplement zu *Treitschke's* und *Hübner's* europäischen Schmetterlingen

mit erläuterndem Text,

erscheinen wird, soll in treuester Abbildung liefern: 1) ganz neue Arten; 2) zwar bereits abgebildete, aber nicht kenntlich dargestellte Kleinschmetterlinge; 3) solche Arten, welche auffallend abändern, und deren Varietäten seither für wirkliche Arten gehalten wurden; 4) die noch unbekannten ersten Stände mit der Nahrungspflanze; 5) die vorzüglichsten Theile der Raupe und Puppe, auch ausgezeichnete Glieder des Schmetterlings in der Vergrösserung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Nomen	ℳ
177	selasellus	24
178	inquinatellus	8
179	lutellus	12
181	silacellus	12
182	chrysellus	12
183	mercurellus	6
185	decorella. 2N.	16
186	ahenella	8
187	Antiopella	12
188	vinetella	8
192	grossulariella	12
193	Abietella	18
194	consociella	12
195	legatella	18
196	Zenkyrella	8
198	populella	12
201	cicutella	8
206	Characterella	12
207	Asperella	12
208	Proximella	6
209	Monstrella	12
210	Striatella	12

№	Nomen	ℳ
	contarbutella	
228	~~subrella~~	18
230	caesiella	9
232	Coronillella	12
234	Artemisella	8
241	pilella — 2N —	18
243	Panzerella. 2N.	12
245	caesiella	12
247	pygmaeella	8
248	Cornella	12
251	Roesella	12
252	Herrmannella	9
253	Festaliella	9
254	Blancardella	6
255	Ulmifoliella	8
256	Sabaudiella	9
257	Rhamnifoliella	8
258	Mustellella	8
259	Upupaenella	9

№	Nomen	ℳ
	Nonstrorg	
30	ferrugaria var. 2N	8
1	flexuaria	12
17	elutata. 2N.	18
34	aversata. 2N.	18
159	fagella	8
138	siculana	8
111	olivana	9
121	scutulana	12
		1/33

Scardia

153 Betulinella — 8

Tinea

154 Tapezella — 12

Lemathorp

160 Alienella — 12

Gallesia

162 carella — 12

Chilo

165 palpellus — 12
166 adippellus — 24
178 inquinatellus — 8
179 lutellus — 12
181 silacellus — 12
182 chrysellus — 12
183 Mercurellus — 6

Phyc.

185 decorella — 8
186 ahenella — 8
187 antiopella — 12
188 vinetella — 8
192 grossulariella — 12
193 Abietella — 18
194 consociella — 12
195 legatella — 18

Haemyl

~~196 Zenkyrella — 8~~
198 populella — 12
201 cicutella — 8
206 Characterella — 12

Tinea

207 Asperella — 12
208 Proximella — 6
209 Monstrella — 12
210 Striatella — 12

Tinea

213 Ulmifoliella — 8
214 Bajokella — 12
215 Labiatella — 12
~~221 subpurpurella — 8~~
222 Denisella — 12
224 Gallinella — 8
225 Fistulella — 12
~~227 ferruginella — 6~~
~~228 contarbutella — 18~~
230 Caesiella — 9
~~231 tunetella — 12~~
232 Coronillella — 12
234 Artemisella — 8
~~236 Rhodocrinella — 8~~
~~237 Decorella — 8~~
~~240 viridella — 9~~
243 Panzerella — 6
~~244 Metaxella — 8~~
245 Caesiella — 12
247 pygmaeella — 8
248 Cornella — 12
~~249 Goedartella — 8~~
251 Roesella — 12
~~252 Herrmannella — 9~~
~~253 Festaliella — 9~~
~~254 Blancardella — 6~~
~~255 Ulmifoliella — 8~~
256 Sabaudiella — 9
~~257 Rhamnifoliella — 8~~
~~258 Mustellella — 8~~
259 Upupaenella — 9

260 ruf.
~~261 cygn.~~
~~262 pusil.~~
267 Chra
269 flavo
270 vari
271 Cusp

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Doubletten von J. E. Fischer E. v. R. in Nixdorf. Juny. 1832. (Von H. Reise mitgebracht)

136.

№	Ypsipetes	×	Acidalia	×	Acidalia	×	Botys	×
		pr. Stück						
	Enomos		Ochreata	8	Moeniaria	12	Lambacalis	9
1.	Flexularia	12	Rufaria	12	Pyraliata	9	Rubiginalis	18
	Notataria	9	Albulata	8	Rufata	12	Verbascalis	18
2.	Signaria	12	Luteata	8	Irrinata	9	Ophialis	24
	Alternaria	9	Scabraria	8	Silaceata	12	Fuscalis	9
	Amataria	9	Flutata	9	Rufata	9	Flavalis	12
	Emarginaria	8	Impluviata	12	Montanaria	12	Hyalinalis	8
	Crataegata	9	Brumata	8	Alchemilata	8	Urticalis	9
3.	Aceraria	9	Silutata	9	Rivata	9	Farinalis	8
	Geometra		Osseata	12	Zerene		Prinalis	12
	Papilionaria	12	Pallidaria	18	Procellata	36	Ulticalis	6
4.	Aeruginaria	9	Byssinata	18	Fluctuata	4	Hybridalis	18
	Putataria	8	Sericeata	18	Rubriginata	12	Polygonalis	36
	Cythisaria	18	Rivulata	9	Tinuata	18	Palealis	12
	Aspilates		Blandiata	8	Albicillata	18	Nymphula	
5.	Vespertaria	12	Rusticata	12	Marginata	6	Literalis	4
	Palumbaria	12	Frustata	18	Grossulariata	8	Potamogalis	9
	Gnophos		Vetulata	12	Minoa		Asopia	
6.	Furvata	18	Bilineata	4	Euphorbiata	6	Farinalis	12
7.	Obscurata	12	Larentia		Idaea		Fimbrialis	24
	Boarmia		Cervinaria	12	Calabraria	24	Flammealis	12
	Crepuscularia	8	Mersuraria	8	Vibicaria	8	Alternalis	6
	Consortaria	18	Plagiata	12	Aureolaria	18	Pyrausta	
	Repandaria	9	Cassiata	12	Aversata	9	Sanguinalis	12
	Cinctaria	8	Bipunctaria	9	Suffusata	24	Purpuralis	4
	Amphidasis		Cacciata	18	Remutata	12	Cespitalis	8
	Betularia	9	Psittacata	12	Immutata	18	Ennychia	
	Prodromaria	18	Rectangulata	9	Incanata	12	Albofascialis	24
	Fidonia		Debiliata Hb. 462. 466.	9	Ornata	9	Fascialis	24
8.	Cebraria	12	Valerianata	12	Decorata	18	Cingularis	18
9.	Hepararia	9	Sobrinata	9	Bisetata	8	Anguinalis	12
	Piniaria	9	Pimpinellata	9	Scutulata	18	Polinalis	12
	Atomaria	4	Pusillata	8	Moniliata	18	Penthina	
	Glarearia	12	Denticulata	18	Herminia		Salicana	9
	Clathrata	8	Hospitata	12	Barbierinalis	18	Capreana	4
	Navaria	9	Strobilata	9	Hypaena		Roborana	8
10.	Plumaria	18	Cidaria		Proboscidalis	8	Pruniana	4
	Chesias		Propugnaria	12	Crassalis	12	Variegana	4
11.	Variata	9	Graphata	18	Pyralis		Tortrix	
	Juniperata	9	Quadrifasciaria	12	Angustalis	12	Adjunctana Tr.	18
	Cabera		Ferrugaria	4	Honestalis	24	Xylosteana	12
	Pusaria	4	Ligustraria	12	Scopula		Heparana	12
	Exanthemaria	8	Ocellaria	8	Dentalis	18	Laevigana	8
	Punctata	12	Galiata	12	Prunalis	6	Consimilana	12
12.	Sylvestrata	9	Olivaria	8	Frumentalis	18	Cinctana	8
	Pendularia	9	Ziaria	8	Urticalis	6	Gnomana	8
			Populata	8	Olivalis	12	Strigana	8
					Suffusalis. (Hercalis) Hb. 44.	18	Grotiana	8

MICRO

als Supplement zu *Treitschke's* und *Hübner's* europäischen Schmetterlingen

mit erläuterndem Text,

erscheinen wird, soll in treuester Abbildung liefern: 1) ganz neue Arten; 2) zwar bereits abgebildete, aber nicht kenntlich dargestellte Kleinschmetterlinge; 3) solche Arten, welche auffallend abändern, und deren Varietäten seither für wirkliche Arten gehalten wurden; 4) die noch unbekannten ersten Stände mit der Nahrungspflanze; 5) die vorzüglichsten Theile der Raupe und Puppe, auch ausgezeichnete Glieder manches Schmetterlings in der Vergrösserung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tortrix	x	Phoxopteris	x		x		x
Pilleriana	12	Lanceolana	8	Inquinatellus (Hb. 54.)	8	Notadella. Hb. 344.	12
Ochreana	12	Siculana	8	Crychellus. Fr. nov. Sp.	12	Tenebrella. 434.	12
Hamana	12	Ramana	9	Silacellus (Hb. 232. Ochrealis. Hb. 47.)	12	Hesperidella. 169. Crotch	8
Loeflingiana	12	Cuspidana	18	Mercurellus (Crataegella Hb. 251.)	6	Xylostella. 119.	16
Ministrana	8	Uncana	9	Dubitellus (Hb. 49. Pyraledella Hb. 167. Dubitalis. Fr.)	12	Affigerella. 353.	8
Rosetana	12	Unguicana	12	Phycis. Zinck.		Pontificella. 181.	12
Rusticana	6	Derasana	9	Vinetella. Hb. 42.	8	Persicella. 100.	12
Viridana	12	Myrtillana	6	Argyrella. Hb. 64.	18	Cicatella. 79. 419.	12
Viburnana	18	Teras		Proerasmella. Hb. 254.	12	Signella. 80.	12
Gouana	8	Caudana	8	Dilutella. Hb. 69. (Canella Zk.)	12	Albipunctella. 149.	12
Margaritana	12	Scabrana	12	Ornatella (Cryptella Hb. 77.)	9	Bella. 60.	18
Lathoniana	12	Ferrugana	6	Grossulariella (Convolutella. Hb. 34.)	12	Loricatella. Tischer. (Fischella. Hb.)	36
Rolandriana	18	Comparana	12	Legatella. Fr.	18	Aillyella. 431. Scopella. 223.	16
Baumanniana	8	Schalleriana	12	Rhenella. Zk.	18	Majorella. 120. Sircella. 117.	8
Amiantana	12	Mixtana. Hb. 215.	24	Carnella. Hb. 65. (Sanguinella Hb. 66.)	12	Carmelitella. 78.	12
Sanguinana	12	Cochylis		Ahenella. Hb. 58. (Aenella Hb. 41.)	8	Christiernella. 452.	12
Plumbana	12	Citrana	12	Decorella. Hb. 301.	8	Labiosella. 294.	12
Bergmanniana	8	Smeathmanniana	12	Galleria. Zinck.		Bicostella. 115.	6
Coccyx		Fischerana	18	Cerella. Hb. 25.	12	Semicostella. 396.	8
Comitana	4	Kindermannana	18	Colonella. Hb. 23. (Tribunella Hb. 22.)	12	Rostrella. 113.	8
Pygmaeana	6	Rubellana	6	Dio. Tineen		Bitrabicella. Germar.	18
Resinana	9	Dubitana	12	Cribrella. Hb. 67.	18	Pyropella. 114.	12
Turionana	12	Roserana	12	Tapetzella. 91.	12	Ornatipennella. 199.	12
Sericoris.		Tineen		Pellionella. 15.	8	Struthionipennella. 209.	8
Zinckenana	12	Chilo und Zinken		Rusticella. 39.	8	Otidipennella. 433.	8
Urticana	4	Palpellus. (Hb. 32.)	12	Ferruginella. 348.	6	Upupaepennella. 203.	8
Conchana	6	Adipellus (Sylvella. Hb. 369. 370.)	24	Fagella. 12.	8	Conturbatella. 450.	9
Micana	12	Pascuellus (Hb. 31.)	4	Plumbella. 86.	9	Albifrontella. 432.	8
Olivana	12	Dumetellus (Hb. 389. 390.)	4	Padella. 87.	8	Phasianipennella. 321.	9
Cespitana	9	Fratellus (Hb. 29. 401.)	4	Cronymella. 88.	8	Syringella. Fab.	8
Charpentierana	8	Hortuellus. (Hb. 46.)	6	Granella. 165.	8	Parasitipennella. Tischer.	9
Aspis		Cerusellus. (Auriferella Hb. 62. Barbella. Hb. 61.)	12	Betulinella. 448.	8	Pruniella. 175.	12
Solandriana	8	Chrysonuchellus. (Campella. Hb. 44.)	12	Cygnipennella. 207.	6	Pygmaeella. 353.	8
Carpocapsa		Culmellus (Straminella Hb. 49.)	8	Oppositella. 141.	8	Sorbiella. Tischer.	12
Arcuana	6	Pinetellus (Conchella Hb. 38.)	12	Masculella. 125. Cinerella Zk.	8	Goedartella. 133.	8
Sciaphila		Margaritellus (Hb. 39.)	12	Ardeticella. 437.	8	Micella. 210.	12
Frutetana	4	Falsellus (Hb. 30.)	6	Populella Zn. (Blatariella. Hb. 148.)	12	Herrmanella. Fab. (Finkcella. Hb. 401.)	9
Musculana	8	Aquilellus. (Hb. 52. Paleella Hb. 51. Culmella Hb. 50. 404.)	8	Zephyrella. Hb. 414. 415.	8	Complanella. 428.	8
Striana	9	Selasellus (Hb. 405. 406.)	24	Gallinella. Tischer.	8	Salaciella. Tischer.	9
Padisca.		Deliellus (Hb. 402. 403.)	24	Dissimilella. Tischer.	18	Rhamnifoliella. Tischer.	8
Scutulana	12	Perlellus (Hb. 40.)	8	Derasella. Tischer.	8	Blancardella. Fab.	8
Seminaculana	12	Lithargyrellus (Hb. 227.)	18	Artemisiella. Tischer.	8	Ulmifoliella. 444.	8
Parmatana	12	Luteellus. W.V. (Ochrellus Zk. Ochrella. Hb. 55. Exoletella. Hb. 48.)	12	Juniperella. Hb. 216.	9	Sulphurella. 150.	8
Grapholita		Fascelinellus (Hb. 368.)	12	Proximella. 228.	6	Asperella. 101. 329.	12
Hohenwartiana	9					Adela. Latr.	
Hypericana	8					Podevinella. Hb. 342.	8
Campoliliana	6					Latthella. Zin. (Rusiella. 341.)	9
Mitterbacheriana	6					Frischella. Hb. 425.	9
Zachana	9					Mollella. 423. 424.	12
Angustana	12						
Ephippana	24						
Petiverana	9						
Nebritana	12						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

W.V. Cabiosella
Reaumurella Clerck. (Viridella. Hb. 128.) — 8
Degeerella Hb. 130. 446. — 8
Sulzella. 121. — — 8
Schwammerdamella. 410. — 6
Panzerella. 412. — 6
Pilella. 235. Pillulella 409 — 9
Metaxella. 413. — 8

Alucita.
Ochrodactyla. Hb. 12. 13. — 9
Megadactyla. 6. — — 12
Rhododactyla. 8. — — 12
Xerodactyla. 4. — — 9
Hilodactyla. 16. 25. — 9
Mictodactyla. 3. — 9
Didactyla Lin. (Trichodactyla. 9. 18.) — 8
Tetradactyla Lin. (Leucodactyla. 5.) — — 8
Cephradactyla. 17. — — 9
Carphodactyla. 19. 20. — 12
Pentadactyla. 1. — — 12

Einige Arten von mir unter verschiedenen Synonymen und mit verschiedenen Namen bezeichnet, sind von Treitschke noch nicht gehörig gesondert worden.

Bei der Bestimmung welche Herr Professor Treitschke im Juni 1832 mir zu Liebe vornahm, sind folgende Arten, die im Verzeichniss fehlen, bestimmt worden.

Chesias
Impugnata Tisch. sp. nov. 30

Herminia
Emorturalis — — 18
Derivalis — (Cat.) 12
Grisealis — — 18
Gibralis — — 24
Barbalis — (Cat.) 12

Pyralis
Pinguinalis — (Cat.) 9

Botys
Politalis — — — 24
Fulvalis — — — 18
Sinuatalis — — 18
Sericealis — — 12

Nymphula
Lapponalis — — 12
Literalis — — —

Hercyn.
Cicatrisalis Kuhlw. n. sp. — 18

Penthina
Cynosbana — — 12
Minorana — — 12

Coccyx
Hercyniana — — 12

Carpocapsa
Pomonana — — 8

Sciaphila
Wahlbomiana — 8

Paedisca
Corticana — — 12
Ophthalmicana — 18

Grapholita.
Siliceana — — 9
alpinana — — 12

Cochylis
Anguttana — — 12

Scardia
Anthracinella — — 18
Scutulinella — — 8

Lemathos.
Alienella — — — 12

Phycis
Aethiopella — — 12
Abietella — — 18
Consociella — — — 12

Synonym.
Echiella — — 12
Cognatella — — 8
Lithargyrella — —

Haemyl.
Angelicella. Hb. — 12
Characterella — — 12

Dis. Tinea &c
Asperella. H. 101. 329 12
Monetella. 245. — 12
Striatella. 288. — 12
Lapidella. 81. — 12
Sulphurella. 150 & Pigrella 336 8
Cruciella
Gallinella Tischer. n. sp. 8
Vorticella Hep. Aguilella. 161
Cinctella. 142 — 9
Caesiella. 172 Corasiella 332 9
Tinctella. 214 — — 12
Coroniella Tisch. Atrella. 278 12
Viridella. 129 — — 9
Caesiella. 360 — — 12
Cornella Tisch. n. sp. — 12
Roesella. 135. 399. 400 — 12
Festaliella. 449 — — 9
Mustelella Tisch. n. sp. 8
Rufifrontella. 204. — 9
Flavifrontella. 126 — 12
Variella. Fab. — — 9
Cuspidella. 282 & Bisaniella 386 12

252
250

MICRO…

als Supplement zu *Treitschke's* und *Hübner's* europäischen Schmetterlingen

mit erläuterndem Text,

erscheinen wird, soll in treuester Abbildung liefern: 1) ganz neue Arten; 2) zwar bereits abgebildete, aber nicht kenntlich dargestellte Kleinschmetterlinge; 3) solche Arten, welche auffallend abändern und deren Varietäten seither für wirkliche Arten gehalten wurden; 4) die noch unbekannten ersten Stände mit der Nahrungspflanze; 5) die vorzüglichsten Theile der Raupe und Puppe, auch ausgezeichnete Glieder manches Schmetterlings in der Vergrösserung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

203 Zephyrella	8	253 Festalirella	9
204 populella	12	254 Polancaidella	6
205 Cicutella	8	255 Ulmifoliella	8
206 Characterella	12	256 Sabaciella	9
Pinea		257 Rhamnifoliella	8
207 Asperella	12	258 Mastichella	8
208 Proximella	6	259 Upupaenella	9
209 Monfortella	12		
210 Striatella	12		

ANKÜNDIGUNG

FÜR FREUNDE DER NATURGESCHICHTE.

Da in neuerer Zeit auch
schenkt wird, und durch die alljähl
schichte dieser, in ihren ersten Stä
tert, so dürfte ein Werk, welches
wählet, nicht überflüssig seyn.

Ich hoffe daher den Wüns
durch einige Freunde — von
Treitschke nennen will — und
einem solchen Unternehmen unterz

Weil dieses Werk vorzüg
trefflichen Abbildungen des verew
Freyer's neue Beiträge, ohne be

Dass kein Gewinn dabei b
wird Jeder wissen, welcher dergle
mich dazu ermuthigen.

Dieses Werk, welches un

A

der S

MICRO

als Supplement zu *Treitschke's* und *Hübner's* europäischen Schmetterlingen

mit erläuterndem Text,

erscheinen wird, soll in treuester Abbildung liefern: 1) ganz neue Arten; 2) zwar bereits abgebildete, aber nicht kenntlich dargestellte Kleinschmetterlinge; 3) solche Arten, welche auffallend abändern, und deren Varietäten seither für wirkliche Arten gehalten wurden; 4) die noch unbekannten ersten Stände mit der Nahrungspflanze; 5) die vorzüglichsten Theile der Raupe und Puppe, auch ausgezeichnete Glieder manches Schmetterlings in der Vergrösserung.

Graus 12. Jun. 1834.

Hochgeehrtester Herr

AN

FÜR FREUN

Da in neuerer Zeit auch den Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, und durch die alljährige Entdeckung neuer Arten, so wie durch die Enthüllung der Naturgeschichte dieser, in ihren ersten Ständen so merkwürdigen Geschöpfe, dieses Feld sich immer mehr erweitert, so dürfte ein Werk, welches fast ganz allein nur diese lieblichen kleinen Thiere zum Gegenstande wählet, nicht überflüssig seyn.

Ich hoffe daher den Wünschen der Schmetterlingsfreunde zu entsprechen, wenn ich, unterstützt durch einige Freunde — von denen ich nur die Herren *Carl von Tischer* und *Friedrich Treitschke* nennen will — und durch einen ausgezeichneten Künstler, der zugleich Entomolog ist, mich einem solchen Unternehmen unterziehe.

Weil dieses Werk vorzüglich der Microlepidopterologie gewidmet ist, so wird es sich an die trefflichen Abbildungen des verewigten *Hübner* — fortgesetzt von Herrn *Geyer*, — und an Herrn *Freyer's* neue Beiträge, ohne beide Werke zu beeinträchtigen, anschliessen.

Dass kein Gewinn dabei beabsichtigt werden kann, sondern vielmehr noch Opfer zu bringen sind, wird Jeder wissen, welcher dergleichen Unternehmungen kennt. Blos die Liebe zur Wissenschaft kann mich dazu ermuthigen.

Dieses Werk, welches unter dem Titel:

ABBILDUNGEN

zur Berichtigung und Ergänzung

der Schmetterlingskunde

besonders der

MICROLEPIDOPTEROLOGIE

als Supplement zu *Treitschke's* und *Hübner's* europäischen Schmetterlingen

mit erläuterndem Text,

erscheinen wird, soll in treuester Abbildung liefern: 1) ganz neue Arten; 2) zwar bereits abgebildete, aber nicht kenntlich dargestellte Kleinschmetterlinge; 3) solche Arten, welche auffallend abändern, und deren Varietäten seither für wirkliche Arten gehalten wurden; 4) die noch unbekannten ersten Stände mit der Nahrungspflanze; 5) die vorzüglichsten Theile der Raupe und Puppe, auch ausgezeichnete Glieder manches Schmetterlings in der Vergrösserung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Da ich Stoff genug habe, nur interessante Gegenstände zu liefern, so werde ich alles minder Wichtige, wodurch das Werk unnöthigerweise ausgedehnt würde, weglassen. Nur bei besonderer unumgänglicher Nothwendigkeit kann ich mich nicht an Kürze oder Einschränkung in den Abbildungen binden, sondern werde dann den betreffenden Gegenstand so ausführlich als möglich behandeln; aus dieser Ursache sind auch im ersten Heft einer Species vier Tafeln gewidmet, welches jedoch selten wieder der Fall seyn wird; so z. B. enthält der zweite Heft zehn verschiedene Species.

Das Werk wird in zwanglosen Heften — ungefähr jährlich vier — in Quart erscheinen, und jeder Heft fünf fein illuminirte Kupfertafeln auf starkem Velin-Papier, nebst erläuterndem Text in unbestimmter Bogenzahl enthalten. Zwanzig Hefte bilden eine geschlossene Abtheilung oder Centurie, wozu ein Titelblatt und ein systematisches Inhaltsverzeichniss gegeben wird.

Obgleich ähnliche Werke aus Mangel an Absatz und dem damit verbundenen Verluste für die Unternehmer oft kaum angefangen, schon wieder aufhörten oder lange Zeit unterbrochen wurden, so gebe ich die Versicherung, dass mich auch ansehnliche Opfer aus Liebe zur Wissenschaft zu einem ähnlichen Verfahren nicht bewegen sollen.

Es sind nur 150 Exemplare aufgelegt worden, um die Illumination der Kupfertafeln nur durch eine Hand besorgen zu lassen, da bekanntlich mehrere Hände auch Verschiedenheiten in der Darstellung geben. Daher ist es zu wünschen, dass die Freunde der Microlepidopterologie sich bald mit ihren Bestellungen melden möchten, um die Ausfertigung der Exemplare genauer bestimmen zu können, und nicht genöthigt zu werden, spätere Bestellungen in einer mindern Vollkommenheit liefern zu müssen.

Der Preis eines Heftes wird auf 1 Thlr. 12 gGr. oder 2 Fl. 15 Kr. in 20 Fuss oder 2 Fl. 42 Kr. rheinisch festgesetzt. Das erste Heft wird zu Ostern d. J. ausgegeben werden, das zweite aber bald nachfolgen, und es sind dieselben sowohl bei mir, als auch durch die J. C. Hinrichssche Buchhandlung in Leipzig in allen Buchhandlungen Oesterreich's und Deutschland's zu haben.

Nixdorf in Böhmen, Februar 1834.

J. E. Fischer Edler von Röslerstamm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bonn 12. Jun. 1854.

752

Hochgeschätzter Herr!

Durch Hr. Riese habe ich bereits
den vom 25. v. M. erst den 22. d.
allein Ostersonntag keine Übersendung
Ihrer Schrift erhalten. Selbe ist b
meiner Zurückkunft hierher zu warten,
ganz vergessen und mir neben an
Niendorf — Sebnitz in Sachsen, ge
und ich erhalte sie daher nächstens
Ich bin Ihnen dankbar, alle Ihre
meiner Arbeit durch Absendung
da ich das Absenden in Hasenc, w
leider stets Mangel spürt, und ich
nehmen bestimmend von hinnen ma
stand, und den ein ganz meinem
abbildung des Originals, dürfen
schon ich keinen Irrthum.

Du in bis jetzt fertigen Bogen
meiner Vorlagen, die Hinrichs'sch
lungen Druckstandes vorfindet w
fertig abzingen, so habe ich meine
die Frankf. Buchhandlung (vorher
Hr. Hoffmann den 1. Fasc. über
Lahmann sofort mit Ausschluss
ist die Hinrichs'sche Buchhandlung
Fasc. Ihnen und Hr. Hoffmann d
zu bemühen zu Ostern. Ich
erhalte die Fasc. direct von mir
allein Vorschüsse haben mich bela
schränkt ist, kann auf den Weg
Buchhandel meine Absicht nicht
Absendung vermeidlichst vor
gen meine, mir aber Liebe w
zu fassen übrig, sondern die
meinen unverkauften Bogen d
Fasc. ermöglicht Ihr Einbringen
in diesem Unternehmen sie bitte
vorgeschlagen sollte, ist die Vorr
kommen. Einen absolut zuverlässi

[illegible] mir
Urtheil über
und wenn mir
fassen zu wo
sen ist mir
Ihnen gewiss
Übersicht ist Deutsch geschrieben
und Colorirung meine wünschen,
glaube ich Ihnen oft missinnigen
meine Absicht zu, weil diese Ihnen
einigen erhalten. Sie aber in allen
schaften und die Desideraten
man aber in mich Ihnen nach
Manche, und wo ich einen Ihnen
einigen einige
ein Blatt, w
haben) schon Ihnen Blatt
täler nun in [illegible]. Ist es mög
Ihnen giebt, Ihnen
behändigen, ersuchen, und dem
zu stellen; wo ich einige schaffe
Gewicht, werde ich gewiss
Ihnen die Mittel zweimal
meinem Gast ist selbigen
war. Ich [illegible] Ihnen Ihnen
Verschiedenen
Ihnen; sage ich
über Ihre Schriften mit
und Gattungsbestimmung als
Gattung sich
Ten. Syringella
die Ornix L.
im Verzeichniss [illegible] Ihnen
Ornix nicht
Gattung haben
haben, und Ihnen
in 3 Gattungen
gleich im Ge
den Ihnen
Ihnen gene

Leipz. 12 Jun. 1834.

Neudorf am 27 b. May 1834.

251

139

Hochgeschätzter Herr!

Durch Hr Riese habe ich bereits erfahren, wie ich Ihre verschiedene Offerten vom 25 v. M. und den 22 d. M. aufzufassen habe. Es ist also zu bedauern, dass blos allein Oesterreich keine Übereinkunft mit den Herrn Verleger getroffen hat, und dadurch unser Absatz verliert. Hätte ich künftig wieder das Vergnügen haben, von Ihnen mit einer Zusendung beehrt zu werden, so wollen Sie auf die Adresse das Land Böhmen ganz weglassen und mir nahe an Dresden schreiben; denn was bereits, Land Neudorf — Schmitz in Russen, an Dresden zu setzen, so ist keine Frankatur nöthig, und ich erhalte die Briefe sicherer.

Ich bin Ihnen verpflichtet, als dem Herrn Hoffmann für die gütige Uebersendung seiner Werke, durch Abnehmen grosser Exemplare stets verbunden; um so mehr da ich den Absatz in Basel, wie fast in jedem mittelmässigen Orte selbe sehr wenig hielt, und es ist mir zu gewiss, dass ich bey besserer Abnahme bedeutend verlieren werde. Da ich aber nun auf Ihre Güte von der Bayerland, und ihm ein genaues meinen entomologe über seine neuen Fortsetzungen, Abbildung der Originale, sorgfältig & Colorisirung zu übersenden, ersuche ich keine Kosten.

Da ich bis jetzt sorgfältige Exemplare der 4te Lieferung meiner Abbildungen durch meinen Verleger, die Heinrichs'sche Buchhandlung bereits an die meisten Buchhandlungen Deutschlands versendet wurden, folglich auch meine Hefte nach Frankfurth abgingen, so habe ich meinen Verleger beauftragt, dass er sogleich durch die Frankf. Buchhandlung (deshalb Name mir jedoch unbekannt ist) an Ihnen und Hr Hoffmann den 4te Heft übersenden lassen; und da selber die Güte haben, den Betrag dafür mit derselben Handlung zu berechnen. Zugleich benachrichtige ich die Heinrichs'sche Buchhandlung, dass sie Notiz davon nehmen möge, die künftig Hefte Ihnen und Hr Hoffmann durch die sorgfältige Schmerber'sche Buchhandlung zu senden zu lassen. Somit genug mein Willen, denjenigen Hr Abnehmern, welche die Hefte direct von mir beziehen, künftighin à 2 fl in 20 fl fl abzulassen, allein Erfahrung haben mich belehrt, dass der Verdienst bey dieser Lieferung gering ist, denn auf den Verlag des Heft werden die 15 x, welche das Heft in Buchhandel muss bestehen müssen, und auf Buchhändlerweg würde die Versendung verursachen, so der Hr Buchhändler den Gewinn mitzugehen haben, wie also dieser nicht nun die 6 Tage für Einsendung der Bestellzettel zu zusetzen übrig, sondern die an die Buchhandlungen bereits versendeten Hefte wieder zurück bleiben, indem ich sie für die Ankündigung fürchten Hefte ansehnliche Geld auslagen hätte. Zudem sind die Heinrichs'sche Buchhandlung in diesen Verhältnissen zu billig und überaus gefällig gesinnt, dass ich mich verpflichtet finde, sie die Versendungen an seinen Abnehmer allein zu übertragen. Einen Abzug zu machen gegen den Gewinn gegen der Sortiments Buchhandlungen.

[illegible] mir sehr angenehm seyn, wenn Zeit [illegible] und Herr Hoffmann's offene Mittheil über meine Hefte zu vernehmen, dann wir [illegible] hin ich in Kenntniß, und werde mir es [illegible] angelegen seyn lassen, die abweichende Resultate zu verbessern, oder die Ursachen der Abweichungen zu beseitigen, da sie mir nicht bekannt sind.

Ehe ich glaube der Aufforderung des Publikums in Hinsicht der Darstellung und Colorirung der 1te Heftes genügen gekommen zu seyn, da glaube ich [illegible] zu können, dass dieses in der folgenden Heften noch mehr [illegible] werden wird, indem mein Colorist sich bis dahin nicht nur mehr [illegible] finden wird, sondern auch die Abtheilung und Eingangszeige meiner [illegible] werden; sowohl auch die Abtheilung und Abweichungen mir zu mancher Verbesserung Anlass geben. Wie man aber in allen Dingen nicht allen Menschen Recht thun kann, so muss sie Manche, und wirklich bemühende Entomologen wollen die mühsamen Vergleichungen einzelner Theile nicht, sondern wünschen nur recht viele Arten auf ein Blatt, wieder andere (namentlich ich muss Ihnen zu gestehen die Vergleichungen haben) lassen die Nützlichkeit der Vergleichung ein; Manche wollen die Varietäten nur in einem einzelnen Exemplare, dann aber auch so viele, als es [illegible] gibt, dargestellt. Andere finden diese Darstellungsweise für [illegible] bedeutend, und wollen ganze, aber wenigere Exemplare und Varietäten [illegible] Manche wollen die Pflanze recht gross und ausführlich mit Blüthe und Frucht; Manche wollen es zum Blättern, und so weiter. Es ist schwer [illegible] für die Mittelstrasse zu finden, und dieser muss ich recht viele Aufgaben meinen Hefte wünschen, um das meinstens Gewünschte beizubringen zu können. Ich werde einzelne Theile, die ein wesentliches Erkennungszeichen der Gattungen bilden, oder [illegible] Vergrößerungen beifügen, und [illegible] Arten darstellen; dazu müssten vorzüglich die verschiedenen Gestaltungen des Kelches oder der Früchte-Basis, so wie das Lager [illegible] gezeichnet werden, wenigen und selbst nur dieses bey der Ansicht des ganzen Heftes [illegible] Gattung sich stets immer mit wenigen Abweichungen gleich bleiben. Z. B. [illegible] Tin. Syringella Fab. (welche ich verwünsche, und verwünschen [illegible] die Gattung Ornix Hedeapennella Treits. verschaffen werden) genau übereinstimmend [illegible] im Vergleich mit der Arten anderen Gattungen; sie sind aber in der Gattung Ornix nicht ungewöhnlich. Wichtigen sind in Ornix die Füsse, welche Theils [illegible] Theils behaart und wenige Glieder sind, Theils nur 2, zuweilen aber auch 4 Glieder haben, weshalb auch dieses Genus bey einer neuen Reform in 2, vielleicht in 3 Gattungen zerfallen wird. Nebst meinen Abbildungen arbeite ich zu gleich an Verein einiger Freunde an einer neuen systematischen Reihenfolge der kleinen Arten, gestützt auf die bis jetzt wenig oder gar nicht benutzten generischen Kennzeichen, wodurch das jetzige Gebäude ganz [illegible]

Wich
gängl
sonde
sind a
wird;
Heft
ter B
Titell
Unter
ich di
Verfa
eine I
geben
lunge
nöthig
rheini
folgen
Leip

einzel. Die microscopischen Verbesserungen zu diesem Zweck können jedoch nur in spätere Supplemente und in das Manuscript aufgenommen werden, nicht müssen erst einzelne Monographien ausgearbeitet, und dann das ganze gestaltet werden; das bleibt viel Zeit erfordernde ist noch einzuschalten.

Erfahrungen von Autoren, welche die hiesige Gegend nicht besitzt, und verbesserungen müssten mir daher sehr angenehm sein, und sind die genaigt, durch mich der Wissenschaft Vorschub zu thun, so werden sie freundlich und bestens angenommen. Ich müsste bestens um so mehr ersuchen, da man nicht durch die gegenwärtige Insektenfauna Deutschlands, für eben nicht minimigen Theile viel Geld hinausgeworfen, selben aber den Zweck verfehlt, weil diese Herrn sich mit der Nomenclatur gar zu wenig befassen. Ich bin so eben im Stich, Vorzeichnisse Lithographien zu lassen, wozu mich beinahe 1000 Desideraten vollständig bekannt zu machen, und wünschte Sie, so schicke ich Ihnen auch ein Exemplar Vorzeichniss mit. Wünschenswerth wären es, wenn Herr Hoffmann sich an Ihnen anschlösse.

Curtis British Entomology kenne ich nicht, scheint auch nie Lieferung Mark zu sein, und meistens mangelhaften Bedingungen zu umfassen. Es ist es auch mit der Stettinerischen Annalen. Ich würde wie beide Werke empfehlen, wenn sie für die Lepidopterologie nicht ungenau wären zu sorgfältig, und zu billigen Preise, wenn auch zu haben wären. Ich habe mir für meine nicht unbedeutende Bibliothek schon manches Lieferung Mark angeschafft, weniger die Abhandlungen die vielfachen Bücher zweimal kaufen, da ich mich aber blos allein diesen, und auch möglichst die Micro. Lepidopterologie nehme, und vermeide, dass ich mir die Anschaffung das Kaufes mager muss besonders jemand sich einen andern Inhalten und nicht wieder wende, so haben viele dieses Lieferungen unbenutzt da.

Mit meiner Achtung bleibe ich Ihnen künftigen gütigen Zuschriften und gegen, und indem ich mich der vollkommensten Hochachtung ich

Ihnen

ganz ergebenster Diener,

J. C. Fischer Edl. v Röslerstamm

Frankfurth
a/main.

Hochwohlgeboren
Herrn Senator C. v. Heyden

D: 23 Apr. 1834. an Fischer v. Röslerstamm geschrieben

u. 1 Ex. für mich u. 1 Ex. für Schmarda von seinem angekündigten Werke behufs die Sache stets an Schmarda zu schicken.
Hoffnung weiter Mittheilungen zu machen.
Tafelreiche Abbildungen b. Hübner u. unvollst. Beschreibungen b. Treitschke
Falter die beim angegeben. Speculis Abbildung der Phal. syringella
nebst Schilderung, bei Curtis.

140

Acroniella. Goze. = ? Venebrella Tr.
Achatacepennella. Hyd.
Scribacella. Hyd. 2 N.
Centifoliella. Hyd. 2 N.
Aurella. Fab.
Torquillacepennella. Hyd.

Farben Angaben
in Salaciella Tr.
vorzüglich das alte
Gesicht.

Ordnung: Ypon. flavianella. Tr. (Fischer 166.) = T. nigrella. Fab.
und diesel ältere Nomen als nigrella. Hüb.
auf diesem Grund hat sie noch Hüb. selbst
im Verz. Freyerella genannt.
Elach. Rhamnifoliella Tr. = Frangulella. Goze.
bei Degeer gute Verwandlung beschrieben.

141

Argyrella. Staceuthinella Z. (Isis. Staceuthina Z. Isis, 1835)
Lebensart (noch genauer zu suchen).
Nest. Zeller sah sie, konnte bei der Hitze nicht verweilen,
war mit einigen Zweifel, gefallen. Die jetzige wurde
so benannt, weil Zeller in der Beschreibung Reaumurs (Isis
gewiss Alnimaculella Z. oder vielmehr Schreberella Tr.

Strigilicella Hyd. Dieses ist Gel. Naeviferella Z. — Hier ist Fischer Recht (meine Sammlung N. 29) nannte
ich Naevulella, fürchtend aber nun nicht Stigella W. 138 und Naeviferella ausschließlich darauf sich beziehen:
Diese hat sie Zell. (Isis 1838. 212) als Gel. Stigella W. anerkannt. aber Stigmatella ist ab nicht. Habe von Fischer

Hochwohlgeborner
Herrn Senator

Wien am 22ten Oktober 1840.

Brauns d. 27 Nov. 1840
der Bedauern d. Krankh.
freigen Endigungen alla
der Raupen von Eutom
Ueber Bücher habe ich mich
selbst soll sich mich
Aufsatz mündlich
Meine Bemerkungen
Ihr

Hohe verehrte Gesellschaft!

143

142

255

Lepidopterologische Sammlungen.

Tort. Fagiglandana Hyd. Ich besitze von Splendana Hr. [illegible] Varietäten, welche Raupen von Fagiglandana ergeben: [illegible] Splendana. Die Falter welche ich in diesem Jahre [illegible] Splendana. Noch erwarte ich bis jetzt nicht, [illegible] Raupen nicht [illegible] zu ziehen. Die Eyer überwintern sämmtlich, [illegible] erst jetzt die [illegible] Raupe [illegible] Fagiglandana [illegible] Splendana [illegible]

und da 25 Stück Falter ist 27 Dec. 1839 an Fischer v. R. weil meine Sammlungen gesichtet werden die Raupen gebeten. Zugleich aber auch das Verbreiten der schädlichen Gattungen, Raupenzucht & Belehrung der Arten.

254

Fagiglandana. Hyd. 2 N. Tr.
Ephippana. Hüb. ? Fischer hat sie auch einer andern Tortrix ungezogen
Brahmella Hyd. Lagerstroemella Hübn. Ders. Merianella. Hüb. Gilvella Hüb. Widenmanni Hyd. d. ma Vit.
Longidentella. Hyd.
Ratzeburgella. Hyd.
Albicollella. Hyd.
Schreberella. Fab. 2 N.
Atriplicella. Hyd.
Fastuosella. Hyd. 2 N.
Emberizaepennella. Bouché.
Fulicella. Hyd. 2 N.
Borkhausenella. Hyd. 2 N.
Axomalella. Göze. = ? Tenebrella Tr.
Schalaepennella. Hyd.
Scribaella. Hyd. 2 N. } Haben Anspruch den
Certifoliella. Hyd. 2 N. } Namen Salaciella Tr.
Aurella. Fab. } vorzuziehen. Das nähere
Torquillaepennella. Hyd. } Text.

Anmerkung: Ypon. flavianella. Tr. (Fischer 166.) = T. nigrella. Fab.
und Hübn. älterer Name als nigrella. Hüb.
Scribaella auf diesen Grund hat sie mehr Hüb. selbst im Verz. Freyerella genannt.
Elach. Rhamnifoliella Tr. = Franguletta Göze.
Bei Degeer gute Vergleichung [illegible]

141

Wien am 22ten Oktober 1840.

Hohe verehrte Gesellschaft!

143

Lepidopterologische Sammlungen.

Tort. Fagiglandana Hyd. Ich besitze von Splendana Hr. [illegible] Varietäten, welche Raupen von Fagiglandana ergeben: [illegible] Splendana. Die Falter welche ich in diesem Jahre [illegible] Splendana. Noch erwarte ich bis jetzt nicht, [illegible] Raupen nicht [illegible] zu ziehen. Die Eyer überwintern sämmtlich, [illegible] erst jetzt die [illegible] Raupe [illegible] Fagiglandana [illegible] Splendana [illegible]

und da 25 Stück Falter ist 27 Dec. 1839 an Fischer v. R. weil meine Sammlungen gesichtet werden die Raupen gebeten. Zugleich aber auch das Verbreiten der schädlichen Gattungen, Raupenzucht & Belehrung der Arten.

254

Fagiglandana. Hyd. 2 N. Tr.
Ephippana. Hüb. ? Fischer hat sie auch einer andern Tortrix ungezogen
Brahmella Hyd. Lagerstroemella Hübn. Ders. Merianella. Hüb. Gilvella Hüb. Widenmanni Hyd. d. ma Vit.
Longidentella. Hyd.
Ratzeburgella. Hyd.
Albicollella. Hyd.
Schreberella. Fab. 2 N.
Atriplicella. Hyd.
Fastuosella. Hyd. 2 N.
Emberizaepennella. Bouché.
Fulicella. Hyd. 2 N.
Borkhausenella. Hyd. 2 N.
Axomalella. Göze. = ? Tenebrella Tr.
Schalaepennella. Hyd.
Scribaella. Hyd. 2 N. } Haben Anspruch den
Certifoliella. Hyd. 2 N. } Namen Salaciella Tr.
Aurella. Fab. } vorzuziehen. Das nähere
Torquillaepennella. Hyd. } Text.

Anmerkung: Ypon. flavianella. Tr. (Fischer 166.) = T. nigrella. Fab.
und Hübn. älterer Name als nigrella. Hüb.
Scribaella auf diesen Grund hat sie mehr Hüb. selbst im Verz. Freyerella genannt.
Elach. Rhamnifoliella Tr. = Franguletta Göze.
Bei Degeer gute Vergleichung [illegible]

141

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlg
Herrn Senator

Wien am 22ten Oktober 1840.

Brandes d. 27 Nov. 1840
257

Liebe werthe Zeller!

143

142

255

Bemerkungen zu Herrn Snellens Sendung.

Tort. Tegiglandana Hyd. Wir besitzen von Spuldaro Mr. Dimble Varietäten, welche denen von Herrn Tegiglend. gänzlich gleichen. Die Zeichnung welche ich in abrauh Rheinaun &c. und Mecklenburg bekommen, stehen der wie Tegliglich nahen Spuldaro. Nach genauerer Ansicht bin ich jetzt nicht, ihren Artunterschied mit Wahrscheinlichkeit zu behaupten. Herr Herrn Schmetterlingen genommen, habe ich erst jetzt bei einem nicht gänzlich gemeinen Raupe, welche Hindarsk. sehr ähnlich sind, den selben Stock am Hinterleib mit den Hinterfüssen, (Afterfüsse abwesend, den Afterfüssen, Stock aber nicht den Rücken) und dieser zeichnet die Raupe auch den Hinterleib. Hinterleib ist auch der Hinterleib der Vorderfüsse. Dimble, und sind dann die Afterfüsse schwarz angelegt. Hinterleib. Endlich: Lepidana müssen ab kommen sein, dessen Kleid Herr Mauch dieser Art. Lässt nämlich mir seiner gibt auch die Raupenbeschreibung, Lebensweise, Verpuppung & Flugzeit zu erfahren. Die an Spuldaro ist mir noch nicht bekannt.

Tort. Ephippana Fb. Herr Fr. sind gewiss viele Aehnlichkeit mit Ephippana Fb., allein diese ist ~~weniger~~ kleiner, und die Vorderflügel Mittelfeld ist dunkelbraun, welche Zeichnungsfleck ist dreieckig, die Ränder deselben dann gebogen, hinten zu Rücken auch breit gezahnt. Ich glaube auch einen gewissen, den Ephippana Herr Herrn Fr. nicht. Sie ist auch kleiner und der viel kleinen Zeichnungsfleck anders gestaltet. Die Raupe hat auch Herrn Fr. Herr Herrn Art sehr ähnlich 2 Rücken, nicht wie Hinterleib, einen, abrauh gröber mit Hinterleib, und sehr deutlich sieht sich einen kleinen Hinterleib den französischen Dimblen Pad. Soutellana gefallend, welche in meinem 13 Jahrb. T. 64. Fig. 6 abgebildet ist. Wenden die Raupen der grossen Fr. im Herbstmonate haben, Hinterleib und jedoch in Galläpfeln, so müssen sie noch einen ziemlich Art sein, besonders wenn sie gemeiniglich sein, und bei Herrn in Eichenwälder (wie die grossen immer möglich) gelbgelb bleibt. Einige Raupen sind z. B. gesellschaftlich beisammen.

= gallicolana Hyd.

Tin. Brahmella Hyd. Von den Raupen dieser Art sind Fr., nach v. Heydens Mittheilung, bei Decopt. Scriptella Hübner gefunden, den Schmetterling gezogen aber nicht dazu, dass Hübner ist die Argentosella nicht (Isis 1839. III. 212 Elach. Scriptella Fr.) Die Raupe ist nicht selten auf Apfelbäumen zu finden, wie sie selbst bemerken. Die Scriptella L. scheint wahrscheinlich die Ann. Lusticiacpennella Fr. ist, sie gab Zeller das jetzige Art den Namen Gallicolella (Isis 1839 III 210) und schickte sie mit Melagripennella Hb. in einer gallicolen, die Zeller Zeller dann an Hübner einigen und stand gleiche Lebensweise und Gallbildungsmonate haben. Nach den Beschreibungen und nach Zeller's gefälligen mündlichen Hinterleib diese Art Gallicola Hrn. Heydens.

Tin. Longiventrella Hyd. Ist Argyresthia Argentella L. (Isis v. ab. 208). Die Art ist, nicht immer, kleiner und weisser. Der lange Leib bei ♂ ist auffallend.

" Ratzeburgella Hyd. Es thut mir Leid, den Namen einer so wunderschönen Raupe einziehen zu müssen, denn diese Art ist bereits in der Isis, v. ab. 205, als Argyresthia Illuminatella mihi beschrieben. Auf Beide fand die Raupe in Hildesheim Anfangs, und ist ausnehmend, sie lebt nicht in den Knospen der Lärchenbäume, denen sie Schmetterling häufig in Gesellschaft Weibchen, wo beide Fälle stand.

" Albicolella Hyd. Alle diese sind fast einer Namen, Argyresth. Arceuthinella Z. (Argyr. Arceuthina Z. Isis, 205) und abermals ist mir Zeller, Hofrath Hagen, in Mecklenburg und anderen Orten häufig im Mai Juni zu finden.

" Schreberella Fab. Sie haben Recht, es ist Endlich Fall. Zeller hat sich, schon lange diese nicht verkannt, und eine der Ulmifoliella genannte Art dafür, obschon mit einigen Zweifel, gehalten. Die jetzige nannte er Lithocolletis Ulmiella (Isis v. ab. 218). Reaumur's Art, welche Zeller in der Lepidopterologie Reaumur (Isis 1838 IX, X, 705) für Tilocemanella Fb. hält, ist ganz gewiss Ulmiella Z. oder vielmehr Schreberella Fb. Es scheint, Zeller's Exemplar, waren nicht deutlich genug, obwohl Fühlerne gewiss der Richtige gebrochen.

" Strigipicella Hyd. Diese ist Gel. Naeviferella Z. — Dem ist es deutlich Art (meine Sendung N. 29) nannte ich Naevulella, sie scheint aber eine nicht Stigella Fb. 238 und Naeviferella wahrscheinlich dennoch Eigen zu sein. Diese soll die Art. (Isis 1838. 202) mit Gel. Stigella Fb. vereinigt. aber Stigella L. ist ab. nicht. Nach Herrn Friedh

abgebildete und beschriebene Art scheint gefehlt, müsste auch nicht ganz scheue sein; die Beschreibung der Schmetterlinge wie nicht auch passen. Ich habe viele Raupen dieser Striplica Chappeau erzogen, aber noch nicht Nigrella daraus erhalten. Ganz wahrscheinlich, da Striplica Nausalina mir sehr regelmässig, sie ist sind viel gemeiner als Nausalina, dass Bull. wie fällt Nausalina für Nigrella Hbn. Ich habe eine andere Art, deren Raupenschiffer in meinem 16 Fuss Land, und deren Raupe auf Striplica lebt, Striplicella genannt. (Nr. 27)

Tin. Fastuosella Hyd. allerdings nur Einsiedler. Ich fand sie schon in einem einzelnen Rinde bei Z Meyer, wahrscheinlich für Eine Raupe. Sie soll ~~sind~~ mit Limicella Clerk nah. (Schmetterl. Nr. 264) eine Aehnlichkeit. Der Name Fastuosella ist nur Zeller bezieht einen andern Art (Nr. 36 meiner Sammlung) gegeben, und in der Isis 1839 III. 188 veröffentlicht. Ich schlage einstehen, diese schöne Art den Namen Hegoniella zu geben, und, statt sie zwischen Limicella Cl. und Roeselia L. — Linn. einzureihen, in Raupe Natürgeschichte zu verfassen, um sie in meinem Werke bekannt machen zu können.

Elachista

" Emberizaepennella Bouché. Häufig; kann sein und in vielen andern gegenden vor.

" Fuliginella Hyd. Wie fallen sie für sie, nicht ganz gut abgebildete Cinerella Nr. 187 d. Fr. — Ihre Raupe: sind abrad Minirer, als meine abgebildeten.

" Borkhausenella Hyd. (Klim.) Mann. Scheint verwandt mit Nigrella Hb., Albifrontella Hb. etc. gezogen. Ein einzelnes Rind für Mann schon gefangen. Zeller soll in der gelehrten Beschr. eine andere Art Borkhausenii (in der Isis Borkhausenii) genannt. Habe meinen Namen beibehalten.

= Pomiferella Hyd. Herrichella Hyd.

" Anomalella Goze. Ist mir unbekannt. Tenebrella Tr. ist grösser, sah andere Zeichnung, gesehen in Gelechia L. und Immundella Z ist es nicht, welche Zeller in der Isis 1839 IV. V. 339 ganz richtig für Degeer sec. 20 Taf. 30 hält. Alle 2 Beschreibungen Degeer's auf den Platten 31 fig. 13—17, wiederholt auf Taf. 21, gehören gewiss Einem Schmetterling an, die Raupen sollen 18 Füsse; die Schmetterlinge sehen schwärzlich wie K. den einzigen Schmetterling, den Degeer besitzt, hat, ist zu unbestimmt und zu wenig Merkmale gegeben, als ihn einen bestimmten Art angehören zu können. Ihre Raupe kann nicht mit Pissodes Notatus Degeer oder Goze sein, dessen die meine Name sich zu Lastre sein müsste. Verlässig scheint ist der Tinea Goze: Z. sey. Sie wird nun in keine der Zeller'schen Gattungen passen. Merkwürdig sind an ihr die gespaltenen Füsse. Teste wurde sie in Elachista stehen. Ich werde mich mit Zeller über die Gattung besprechen, und ihren N. Z. melden.

= Lugella Hb. (oder) = Vermiculatella Hyd.

" Achataepennella Hyd. Häufig ähnlich meiner Acerifoliella (Nr. 40. m. Beob.) weiss mit Aschgrau, auf Acer campestre lebende Raupe. Ich fand ihren Art doch für Varietät, fand aber in Mainz Anfangs über 40 Rinde, alle gleich, die im Mai an bis Anfang Juli, und wieder in August und September bis Mitte Oktober gefangen, so dass Acerifoliella gefallen, und wie dasse nicht mehr Stand fällt. Acerifoliella ist also eine nicht, sondern in Nassau und Pfalzland. Hier kann ich, dass Sie Hübner und Treitschke Art die Endung pennella beilegen, da in Nassau genau doch foliella gebräuchlich wurde

" Torquillaepennella Hyd. Mai und Juni. Gefunden in der Gesellschaft von Degeriella Fr., Fritillanella Tr., Cinerella Cl. und Nigrella Hbn. etc.

" Scribaella Hyd. Ist Argentipedella Zell. (Isis 1839 III. 215.). Meine wenigen Exemplare wurden abends auf Birken gefangen. Die ganz Raupe der Art, aber Ihren Centifoliella hat Hübn. als Macidella Nr. 435, aber ziemlich schlecht beschrieben. Da Zeller sie 18 abgebildet hat Scribaella als auf Centifoliella sein Raum, so ist sie nun genügend angeführt.

" Centifoliella Hyd. Auch ich an Degeer's Raupen selbst, zweifle ich schon bei Atomella. Der Verfasser Raum ist nicht genügend. Diese art ist mir unbekannt, und ich würde sie für Semicostella Zell. (die ich nicht besitze) halten, wenn sie nicht in der Isis 1839 III. 215, absent anders beschrieben wäre. Zeller vermutet in der Semicostella die Stipella S.V. v. Bab. — Aber Stipella S.V. ist nach dem Mus. Schiff. eine Varietät von

Wien am 22ten Oktober 1840.

Braunschweig 27 Nov. 1840 —
der bedauernd krank ist. —
freigen Einsendungen alle
der Namen von Lehmann
Liebe Freund habe mich
Gestern soll mir
Freund
Mayer
Mayer

Lieber Freund!

143

257

302

756

Tibullella S. V. d. Feld. — Aurella Fr., die weisse mit der W. F. nicht aber der Mat. Ben. Schlüssel mit, gegangen ist Euer auf unserer Reise in Krain daher ungeändert wurde.

Zeller betreffend seine Limnisella pl.: Mehr oben gränzen als Hübnerella); die Vdfl. zugerundet, gleichgranlich, mehr finden violettgrau; finden die Mitte am Hinterrande Finde; die Taster unten gelb; die Füsse auch mit gelblichen Augenringen. Die Vorderbeine der Hfl. unbehaart dem Innen der Zehnerella). Im Mai an Ulmenstämmen.

Ich werde mich nicht freuen mit Zeller beisammen, und Ihnen den Rest mitbringen.

Die sehr verschiedene, kleinere, einfärbige Art (Micros. pygmaeella Haw.) müsste vielleicht Semicostella Zell. (Isis 215) sein. " Mehr kleiner als Limnisella Z., Vdfl. zugerundet, gelbgrünlich weniger glänzend mit violettem Schein; Taster schwarz ohne weisslich. Die Augenringel gelblich weiss. Im Mai auf Eichenstämmen im Sonnenschein schnell umherlaufend. "

Tin. Aurella Fab. Ich würde für die Hübnerella W. 236 (Atrophelipennella Hüb. Verz., Micros. posticella Steph.) halten, wenn mir Zeller, welcher sie für die meinige, nicht ganz gelungene, Hübnerella hielt, nicht bestimmt wäre. Mein Ex. weicht auch von der Beschreibung Zeller's der seiner Hübnerella (Isis 215) ab. Dort heisst es: " Mehr kleiner als Semicostella, die Vdfl. grauschwarz, gelbgrünlich weniger glänzend, mit einem silberweissen, auf gewissen Lichtern goldfarbenen Rande von der violetten Augenfarbe. die Taster schwarz, die Augenringel weiss. Die Vorderbeine der Hinterfüsse ist mit langen, buschigen, schwarzen Haaren besetzt. Im Juni auf Ulmenstämmen. "

Mein Ex. ist dadurch verschieden, dass der feine Rand der silberweissen Flecke, welche auf oder hochschwarzen Grunde liegen, wie bei den übrigen Flecken, in der violetten Farbe, auch schwarz, buschigen Schuppen sitzt, die sich bis in die Franzen verbreiten, und dort eine buschigen Spitze bilden. Die Fühler sind nicht dünner und länger, sondern wie bei der Costella mit langen, breiten Kammzähnen, buschigen Schuppen besetzt, die fast bis in die Augenringel reichen, die übrigen Schuppen der Flecke sind spärlicher und kleiner. Die Taster und die Augenringel sind weiss.

Ihr Ex. weicht wieder von beiden ab. Die Fühler haben zwar auf ihren Vorderbeine über und über lange Schuppen, sie sind aber spärlicher und dünkelbraun; die silberne Linie der Vdfl. ist etwas schmäler, nicht so ganz dünklich, die Schuppen derselben aber so, wie bei der Costella bis zu ihr, der Raum dazwischen ist nur etwas lichtbraun, und die Franzen dünkelgrau.

Welche verschiedene Thiere ist nun Hübnerella, und welche Aurella Fb.? — Eigentlich könnte die Hübnersche Abbildung auf beide mit voller Sicherheit anwenden.

Ob Nigrella Fab. die Flavicomella Tr. 2 wäre ist, müsste nicht ganz sicher angenommen sein; denn von dem dunklen Schwarzen Punkten ist in der Beschreibung der Fab. keine Rede.

Elach. Rhamnifoliella Tr. 2 Fr. ist allerdings Franzenella Götz, und von Dyger nicht deutlich gegeben. Zeller hat sie gewiss in der Isis 1839 III & IV, verwechselt.

Diejenigen Arten, welche mir in unserem Gebiete, wo sie heimisch, für mich und meinen Freund Zeller verwechselt waren, habe ich mit einem * zu bezeichnen. Die Diagnosen allenfalls noch ungefähr sein.

März 1840.

Fischer v. Röslerstamm

Ich schreibe jetzt, dass Sie gar viele schöne Bemerkungen beibringen, es ist mir sehr um so mehr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 22ten Oktober 1840.

143

Lieber werther Freund!

Schon fast 8 Tage verweile ich in Wien, um mit Hr. Mann die für Ihnen bestimmten Insekten wegen Tausch durchzusehen. Dieses allein würde nicht halb so lange Zeit gekostet haben, wenn ich nicht auch Ihre Sendung noch genau hätte durchsehen müssen, und zu diesem Behufe mir fast sämmtliche Exemplare von 30 Species herausgesucht, und zum Theil neu präparirt werden mußten. Die Sendung für Hr. Mann wurde heute an Hr. Schmerber (welche ich gütigst abzugeben zu bestens bitte) wird Ihnen mit meinem Briefe Ihnen zukommen. Was nun Hr. Schmerber anbetrifft, werde ich mich über ihn noch aussprechen. Ich bin Ihnen für die gütige Anempfehlung desselben sehr verbunden, doch der Absatz meiner Waaren durch Vergleich einer Tausch, um 100 Fr. vermehrt, dieses würde dann die ganzen Kosten decken, würde aber dann um 50 oder 100 Fr. gesteigert, so würde ich mich Hr. Schmerber einer gewinnenden Person unterbreiten, da ich auf einen Absatz von 200 Fr. mit ganz Engl. Kosten kaum zu hoffen wage. Dieses Verfahren sollte Hr. Schmerber nach gelegentlich mündlich vorschlagen, da ich ab [illegible] weil mich selbst einen Tausch-Auftrag von 200 Fr. Herrn Schmerber nicht Mühe kosten, sein ich, daß das Geschäft, weil ein Fremder Kenntniß bleiben wird. Ich werde indessen [illegible] an Einsendungen Keine mehr abschicken können, bis ich Hr. Schmerbers Entschluß weiß, so Einem von den nächsten 10 Postag gefälligst abkommen, und diese adressirt die Einsendungen darauf unmittelbar die Ihnen.

Daß Sie, durch mich veranlaßt, die Reise machen, die projectirt. Entschluß Ihnen [illegible] Bekanntschaft mit Ihnen aufrichtig übereinstimmend, sondern, sich mir ganz besonders aber ich bedauere mich, daß Sie unsere Insekten in Hinsicht der Bestimmung so [illegible] Linné, der mir zu vielseitig Naturforscher, als daß er [illegible] Lepidopteren seine [illegible] Ordnung beschreiben; dann ist sehr nach Linné gefunden, welche die bisherige Anordnung der Linnéer nicht zusammenfassen, sondern Lepidopteren und Coleopteren p.p. [illegible] und Bombyliden. *) Ich die genaue Kenntniß mehr Lepidopteren da Handbuch [illegible] Kenntniß nicht zu fassen sind, als sie nicht vollständig zu [illegible] sind 1) Bibliothek gegen Linné, den Entdecker [illegible] Linné noch keine Naturforscher gelebt, als ich und Hübner ist [illegible] Bücher, die älter als Linnés wichtig [illegible], welche die gegebene Ordnung auf Gleich wie Fabricius Bestimmungen [illegible] Fabricius gebraucht, so wurde nach meinem [illegible] Bezeichnungen eingeführt haben. Ich [illegible] ich mir folgendes Mittel. Kenn Linné eine genügende Anzahl von Arten [illegible] würde es für in meinen Abhandlungen [illegible], und jeden Exemplaren eine andere gefunden, fortan eingeführt. Dadurch hätte man, das wir jetzt neuen zu folgen [illegible] die Linnés Reihenfolge nicht bleiben könnte, so würden vielleicht in einem [illegible] gen sich alle Linnéischen Ordnungen [illegible] können. Gewiß aber Bücher wie aber in Bezug auf [illegible] Linné überall [illegible] 2) das [illegible] Hübner allgemein Gebrauch. Ich anbegann aber, daß [illegible] alle Gelehrten, welche nicht allein Lepidopterologen sind, gegen [illegible] Ordnung alle; um zu wissen, daß Stoll [illegible], wenn man [illegible], eine Linné ist? Ausfallen, wenn ich Linné Linné sage, und Linnéer, wenn ich Fr. Linné schreibe; und viel Anderes,

*) Ich setze hier aber, daß Sie gute viele [illegible] Bestimmungen besitzen, es ist nur [illegible]

Wien am 22ten Oktober 1840.

143

Liebe werthe Freund!

Ich sind fast 8 Tage verflossen, ehe mir Ihr Mann die für Ihnen bestimmten Lepidopteren wegen Zeitmangel absenden konnte. Dieses allein wäre noch nicht hinlänglich gewesen, aber ich wollte über manche Art dieser Ordnung noch einige Tage, und zwar einige Zeit mit Ihnen mir selbst gemachte Exemplare zum Vergleichen beisammen haben, und dazu war noch Zeit nöthig. Meine Bemerkungen zu Ihres Mannes Ordnung finden Sie in der gegenwärtigen Zeilen. Die beiliegende offene Adresse an Ihr Schwerdtner (welche ich gütigst abzugeben zu bitten bitte) wird Ihnen mit meinem Entschlusse auf Ihren Antrag bekannt machen. Was an Ihr Schwerdtner entschlossen wird, werde ich erst auf Ihr Verlangen von Ihnen erfahren. Ich bin Ihnen für die gütige Verwendung sehr verbunden, und wünsche, dass der Absatz meiner Arbeit durch Beigabe einer französ. Tabelle sich vermehren möge. Um 100 Fr. verwechselt, dass wäre dann die ganze Tafel theuer, wenn aber diese angesetzt auf 50 ohne 100 Fr. gestochen, so würde ich auch Ihr Schwerdtner einen geringeren Preis nehmen können. Dass Salzburg selbst Ihr Schwerdtner auf gelegentliche mündliche Anfragen, die ich auf einen Absatz von 200 Fr. mit ganz Tafel kaum zu schreiben wage. Ueberdies kann ich, dass das Projekt nicht zu Stande kommen wird, so standhaft nur Beispiellosen Einen nicht absichtlich Tafeln, bis ich Ihr Schwerdtner Entschluss weiß. Ist diese günstig, so können wir die noch 10 Tafeln sogleich absenden, und diese colorirt machen, weil die Beispiellosen darselben noch ungebraucht sind.

Dass Sie, durch mich veranlasst, die Fris Larven, die Lepidopt. Abstände Falter willig, und die Verarbeitung Ihrer Manuscripte übernommen haben, hat mich ganz besonders angenehm überrascht. Aber ich bedauere auch sehr, dass Sie unsere Ansichten in Hinsicht der Eintheilung der Insecten, als auch Ihre Methode, die Lepidopteren Ihrer ordnen Zeichen-Ordnung beizubehalten; denn ich habe noch keinen Entomologen gefunden, welcher die bisherige Anglassung der Ordnungen nicht gänzlich hätte, obschon mehre Lepidopteren auf Coleopteren p.e. Formicaria und Cantharides.*) Ich bin gewohnt, unter Lepidopterologen, allein die Hauptsache zum Verständnis bringen zu können, als sie nicht verschiedene zu sollen. Ihre Gründe, Brahmen Linné's und alten alten Naturforscher gelten, als ich und Andere sie sind? Ihre unsere Schüler kennen, die alten der Namen wissen, verwechseln, welche die gegebene Ordnung auf bleiben müssen; diese wie Hauptsächliche Verbindungen Verschiedene für Unrecht halten. Sie sagen Sie Linné einen gänzlich Mangel ist mir Schwerdtner Muster. Wenn Linné eine gänzliche Anzahl von Arten oder Gattungen gekannt hätte, so würde er sie in mehrere Ordnungen eingetheilt, und jetzt Verfasser eine andere Ordnung gegeben haben. Er hätte also die Gattungsnamen, die wir jetzt genau zu folgen sind, nicht gekannt, sondern, sondern eingesetzt. Endlich das hilft auf eine Frage? Es muss gut, dass es nicht ganz, denn die Linné's Reihenfolge nicht bleiben konnte, sie würden vielleicht in einen unseren jetzigen Gattungen. Von sich alle Linnéischen Ordnungen haben verwirren können. Tineella oder Tinea (beispielsweise) können wir aber in Beschreibungen der Tinea überall sie verwechseln.

Der Herr Graudenz ist 2) das freilassige Fehl allgemeine Gebräuch. Ich anbegann aber, dass schon längst, und fast auf alle Lehrbücher, welche nicht allein Lepidopterologien sind, gegen diesen Gebrauch sind. Deshalb kann das Ordnung alle, um zu wissen, dass das Insekt, wovon man nicht eine beschreibt, eine Tinea ist? Ist es nicht besser, wenn ich Tinea Tinei sage, und Linnaei, wenn ich Tin. Tinei schreibe, und viel Arbeit, als wenn ich,

*) Der Einwurf sagen aber, dass Sie gute Insekten-Ordnungen beizubehalten, ist eine Ursache um so auffallender.

wie es üblich ist Tinea Pencillella sogar oder schreibt? Und wenn wir auch vorläufig, bis zur Feststellung der Gattungen, die Zugehörigkeit Tinea ?? beibehalten, so scheint das Wahrscheinlichste die Bildung einer Gattung Tinea ?? Haller wie auch in die viel weiter gefaßten Gattungen Coleophoralagen, welche innerhalb der Namen einer oder anderen Gattung beigefügt, wie meistens noch den Namen der Autoren oder schreiben, also Tinea Gattungen Haller beifügen, wie meistens noch den Namen der Autoren dazu setzen. Man müßte freilich wo man das jedesmal hinzustellen, und in welchem Grade man es nöthig finden soll. Auch eine Tinea, auch eine Forst. oder ein Byral. ist, das müßte jedes mal, mit vorigen Autoren, jedes Mungen, oder das man erst durch die Findungen der Namen darauf sind, genauer wissen darf. Ich glaube, wie die Findungen, dieses bequemen Grundlagen, neuen Schwierigkeiten, daß die Feststellung einer Gattungen Findungen, genau geschaffen wurde. Das Haben Gattungen genau selbstständig sind, und zwar solche mit einzelnen Namensnamen, welche beim Feststellen, und genau Findungen nirgend selbst niemand. Sind diese gebildet, dann ist die vollendete Findung einmal abgeschlossen, und schließlich nur Namen zu finden, dann man auch ist, wie sie zu setzen haben, wenn man mit den neuen Gattungen nur Namen wissig, daß

Fall finden, wo das jüngere nicht benutzt werden, da es nicht wandelt. Also in den Fällen ist, [illegible]
gut müssen, müssen wir voraus ein Verzeichniß aller existirenden Namen haben; um sich dabei [illegible]
müssen wir alle bezügliche Werke besitzen, oder es muß jedesmal alles dieses Werke durchgesehen
werden! Wenn soll ein jüngerer Namen nicht nützen, wo seine Art nur so selbst, aber [illegible]
nicht bekannt sind, und vielleicht niemals bekannt werden, wie viele Linné'sche Fabrikate, denn
noch niemals bekannt werden. Einzig, dieser Zwang geht über alle Grenzen. Daher wird
das Neuergeben nicht nur hindert, es können selbst die geschicktesten gemüßigt werden, und da
sie den Namen wieder wenigen Fall finden, dann soll jemand z. B. einen Hamster oder
gegeben, der ist einen Beutelrat gab, so brauche ich ihn nicht einzuziehen, sondern könnte ihn
über nicht neue Arten verschicken, kennt oft in den Fall, (ich spreche über eigenen Erfahrung
2—3—4mal die in den Zwischenzeit veränderten Namen nachsehen zu müssen. Oder man
Sammlung in verschiedenen Zustand wie und darstellen Zustand einen mehreren Namen,
außerordentlich soll, sich die richtigen Namen zu nehmen, wie ist es gewöhnlich nicht [illegible]
oder sehr dasse, einen Namen wie keinen, und stellt in einen sehr entfernten Gattung
den Namen einer Verschmelzung zu einer Gattung — unmöglich ist, wiederholen zu können,
und Namen entweder, zu verschweren aufzufinden weiß. Ich gebe mich zu, daß viel
Arbeitsamkeit noch dem in Wirksamkeit zu bringen sein, sobald Gattungen mit sehr
Benennungen gebildet sein werden. Dann mögen mich die Findungen stören.
noch in beiden Fällen bei den alten Regeln; selbst bei den Linné, obgleich sie Zeit die
sich. Zeller's System in den Heft ist nun ein Versuch, es will es nun als einen solchen ans
so genügt ihm selbst noch nicht, und wenn es, was es mich die Absicht hat, seinen Zweck
bringen, so wird es wesentlich sehr verschieden von dem jetzigen sein, an welchem wir
gearbeitet, gebaut, gestaltet und wieder gebaut haben, ohne zufrieden gestellt gewesen
Seitdem sind wir nun einige Jahre weiter gewandert, und haben manche Erfahrung
Benennungen gemacht.

Ein gutes System kann nun dann gebildet werden, wenn
gut gearbeitete Monographien einzelner Gattungen, wie Fischer's Chilenen, Hyperiden
aber nicht das Werk einer Person und nicht das Werk einer Monographie sein! Die Lepidopt
alles. Jeder glaubte sein Recht seine Ansichten zu wahren, es wollte, dass man seine Meinung
studirte, wenn es richtig wäre, bestimmen es die Alten selbst, wie es fasst, Irrung absolut
bisher, das Studium ist nicht möglich, wo ein Grund [illegible] ist. Aber es ist
vernünftig, es scheint, als sehen es zu Niemanden, nun zu sich selbst geschaffen. Ich be
verbessern, dass man eine andere sichtbare Ordnung (das System) übergehen, wo es nur
ist, aber leider nicht Rücksicht das Organ der Tiere, sondern in einen grossen Gelenk. Schlussfolge
fand. Sammlungsarbeit sich so sich die Lepidopt. nicht entschieden, sondern es sich so
langsamen sind, die Finden Monographien-Werke zu bearbeiten, wird aber gewiss
der Klassen (dann Rücksicht es sich sich lange Zeit fest angelegen sein lassen) in das Tier
das gemeinsame zu diesem Zwecke Materialien, wenigstens Naturgegenstände. Jedenfalls Grund
ist so selbst, dass Raum darnach zu bestimmen ist. Also so ist es mit Zweifelhaft das
Schiffermüdigkeit Sammlung sich nie sicher wenig Aufschluss geben können, so entfällt Gattung
andere, theils sind die verschiedenen schwarzen gezeichnet, aber nicht die verschiedenen.
4 andere, die bilden alle sind Didactyla L. gelben. Als Megadactyla W.V. & Hb. bezeichnet 3 A
bestimmt verschieden sind und aber so wenig ist es aufgemacht, ob sie in der W.V. oder Hb.'s
ta L. ist. Die Mictadactyla sehe ich nach 2—3 selbst deutlich, standhaft verschieden andere, welche
die Zahnreihe. Treitschke sich in seiner Bearbeitung unter Mictadact. auch Variation von Pteradactyla.
Calo-Nocuelle-Cosmo- und mehr Typhae- und Pteradactyla. Leider Irrungen, über welche man sich
und noch wenigen in Treitschke's Bearbeitung einen Rath holen kann, dem Treitschke wenig selbst so
nicht anzuerkennen, da er in den Beschreibungen zu lang dem Bilde, und dem Originale, und so dass
folgte, und genau oft genug verschiedene Dinge vereinigt. Selbst Pteradactyla L. haben

Noth findet, wie dasjenige muß benutzt werden, was es uns verleiht. Aber in der That ist, ist Namenmangel zu müssen, muß entweder ein Vorzeichnis alles existierenden Namen haben; um sich dessen muß man alle bezüglich Werke besitzen, oder es muß jedesmal alle diese Werke studiert haben! Man soll auch diejenigen Namen nicht nennen, an denen und wo sie selbst, aber die Synonymie nicht bekannt sind, und vielleicht niemals bekannt werden, wie viele Linnéische Fabrikisse, denn sie können doch das Namengeben nicht wie leicht, es können alle Genera und Species gemißt werden, und das künftige Eingegebene, so kann es doch nicht eingeschaltet, beide können nebeneinander stehen. Aber nicht auch Arten verschieden, kann oft in der That, (ich spreche aber eigenen Erfahrung) der sorgfältigen Synonymie in verschiedenen Jahren in und derselbe Individuum andere Namen, wenn man nicht die aufmerksamkeit hat, sich die früheren Namen zu notieren, wie ich es gewöhnlich nicht unterlassen. Ich kann aber sehr dafür, einen Namen nie stehen, und stelle in einer sehr entfernten Stellung eine bey Arten, 2—3—4mal die in der Zwischenzeit veränderten Namen nehmen zu müssen. Oder man schickt seinen an Kenntnis in einer Insekten Individuum andere unbekannte Namen, wenn man nicht die an Kenntnis hat, sich die früheren Namen zu notieren, wie ich es gewöhnlich nicht unterlassen. Ich kann aber sehr dafür, einen Namen nie stehen, und stelle in einer sehr entfernten Stellung eine bey Arten, an Kenntnis eine Vergrößerung zu einer Gattung — unmöglich ist, wünschenswerth zu sagen, wenn man Kenntnis auch einen Arten vergrößert, zu verbessern aufzufinden weiß. Ich habe mich gut, daß das Wiederherstellen der Arten-Kenntnis zu Kenntnis gebildet sein werden. Dann mögen auch die Ordnungen abgetrennt in beiden Fällen bis den alten Regel; selbst bey den Fixen, obgleich sie Zeit die Lage gebraucht hat. Zeit's Systeme in den Köpfen ist nur ein Versuch, es will es nur als einen schlechten angesehen wissen. Es genügt ihm selbst noch nicht, und wünscht es, was es auch die Absicht hat, seinen Theil ein wenig verbessern, so wird es wahrscheinlich sehr verschieden von dem jetzigen sein, an welchem wir schon lange gearbeitet, gelernt, gezeichnet und wieder gelernt haben, ohne zufrieden gestellt gewesen zu sein. Zeitdem sind wir in einige Kenntnis der Arten gekommen, und haben manche Entdeckungen durch die Vergrößerung gemacht.

Ein gutes System kann nur dann gebildet werden, wenn man wenige gut gezeichnete Monographien einzelnen Gattungen, wie Linné's Chiloon x Phycidae sat. Das kann aber nicht das Werk eines Einzelnen sein nicht das Werk eines Menschen sein! Die Lepidopterologen schaffen alles. Zeder glaubt sich dazu seine Aufgabe zu machen, es wollte, dass man seine Meinungen begründete, bestätigte, noch zu bestätigen suchte, bestrebt war die Natur selbst, wie es faßt, kurz ästhetisch, bestrebt sein; das Festhalten ist auch sehr möglich, wo ein Grund [illegible] da ist. aber es kränkt sich seine Meinung verunsichert, es scheint, als habe man zu Misstrauen, nun zu sich selbst gekommen. Ich kann es also nicht verbieten, dass man einen anderen Individuen Ordnung (den Typus) übergeben, wo es auch das Vermögen: der, aber leider nicht dass das Organ der Idee, sondern in einem gemischten gelernt. Gelehrsamkeit ohne Talent fand. Sammlungsmethode sei es sich die Lepidopterologie nicht entfernt, sondern es scheint so wie ich, eine langsamere sein, die Fixen Monographien-Weise zu benachbaren, wird aber gewöhnlich eine Verarbeitung der Literatur (denn auch es sich seit langer Zeit feste angelegen sein lassen) in den Text bekannt machen. Die sammeln zu diesem Zwecke Materialien, wenigstens Naturgegenstände. Zahlreiche Gattungen sind bekannt. Ich so selbst, dass Kenntnis Fortschritt zu bestimmen ist. Aber so ist es mit Vielseitigkeit Verschiedenheit. Schwierigkeit Einteilung sei nur seinen wenig Aufmerksamkeit geben können, so enthält Ihnen zu wenige Arten, Theile sind die verschiedenen abgetrennt, aber nicht die verschiedenen. Ich besitze Arten 4 Arten, die bisher alle für Didactyla L. galten. Als Megadactyla W.V. x Pt. besitzen 3 Arten, wovon 2 bestimmt verschieden sind und aber so wenig ist es auf gemacht, ob sie in der W.V. oder Pt.'s oder Tetradactyla L. ist. Die Mictodactyla habe ich nach 2—3 Stück erhalten, standhaft verschiedene Arten, welche ist aber die Gebrauchte? Vielleicht sei in seiner Einteilung unter Mictodact. auch Kreatula von Pteradactyla. Mal ist Polo-Nocaithe — Cosmo — und mal ist Typhla — und Pteradactyla? Leider Fragen, über welche man sich in Gattungen und noch weniger in Familien Einteilung einen Rath holen kann, denn Familien macht selbst die Richtigkeit nicht angegeben, die es in den Gattungen zufällig dem Bilde, und dem Originale, und es dasselbe selbst folgte, und genau oft genug verschiedene Dinge umschreiben. Selbst Pteradactyla L. bedarf noch der

Anerkennung. Ohne Zweifel sind Sie in vielen Arten der Alcyonien einstimmend Ansicht als wir, vielleicht
[illegible] galvanischen Ströme, sich durch die Reizgarbe einzelne Arten zu Abtheilung zu verfassen, und dasse wir
Ihnen über Ihre Mittheilungen, welche Familie mit Vigiel-Stamm bestätigt sein müssten (so wie gegen
gänzlich stellen wollen) sicher angenehm sein, wenn ab Ihre Lust und Zeit erlaubt, sich über zu
geben. Nun ein vermehrtes Studium und vielfältige Mittheilungen der gemachten Erfahrungen können
neues Resultate geben. Die Einzelnen ist nicht im Wunder, selbst vermehren zu beobachten, und stellt sich
als gut, wenn die Entfernung der Thiere, auch durch gleiche Behandlung einer Gruppe und Vielheit
wird.

Nun wie und wie die Mühe dieser vorbereitenden Arbeiten, an den Abmessungen und Zeichnungen zu be-
die Thiere ist verschieden Theil, und wenigen die Flügel und ihre Formen und Zeichnungen zu be-
stellen, so werden wir bald einige feste Anzeichen zur Bildung von Gattungen erfinden. Es
wäre sehr möglich sein, die Tiere Klasse auf ihren festen verschieden gestalteten und besonderen Fal-
ten einfallen zu können. Nach einem Anzeichen soll man aber nicht gehen. Wie mannigfaltig sind
jedoch nicht nur die Füsse, vorzüglich ihr Krongelenk. Eben so ist nun glatte Thiere mit einem Theil
oder in ganz nackten oder ganz glatten Leib, oder verwandt gezeichnete Thiere, die andere mit
mehr gesunde auf dem Rücken zeigen, Merkmale zu Gattungen abzugeben. Wie verschieden sind
nicht die Form und ihre Bedeckung. Auf die Metamorphosen sind zu berücksichtigen. Nachdem wie nun mehr
die zerschlitzten oder flügelnden Vorderflügel- und die mannigfaltigen Hinterflügel zerstellt, dann
der innere Flügelrand mancher Arten, die Länge oder Größe, Dicke oder Dün-
nere Bedeckung und die verschiedene Formen der Flügel an, so giebt es eine Menge Merk-
male zur Bildung von Gattungen, die wenn sie vorsichtig und richtig gewählt sind, einen gram-
matischen Ausdruck veranlassen können. Complanella Hr. war die einzige Art von 5 Füssen bekannte Art,
welche gebürtete männliche Füsse mit einem und Haaren bestehenden Anhängsel des Krongelenkes
sah, und sich dadurch von allen Arten der ganzen Thiere sehr unterscheidet. Zu dieser Gattung
gehört auch die Gattung Tesithria. Seit dem ist diese Gattung bis 6 Arten gestiegen. Sehen die Flügelform,
wie auch die Gattung Tesithria. Seit dem ist diese Gattung bis 6 Arten gestiegen. Sehen die Flügelform,
die dritte Bedeckung und manches andere, obschon dieses vielen anderen auch, aber doch nicht ganz
gleich, zeigte mir gleich, dass die Füsse einen Fuss haben und gebildet sein müssten, ehe ich noch zu
Untersuchung schritt. Nimt man zur näheren Arten und verschiedenen Gattungen über-
das Microscop, oder noch besser, wenn man die kleinen Thiere unter einem, und alle Theile einzeln
microscopisch betrachtet, so erlangt man bald eine schöne Übung in den dazu verwendeten Arten,
dass man sie schnell schon richtig blos mit den einfachen Lupe zu ordnen vermag.
Es ist aber sicher sich nur zu wenig gleichviel wendet, dass noch noch einige Fasern sinzu-
gen werden, ehe man vollkommen schönen Durchsichtigen Untersuchungen Manches ergänzen und richtig
in System verfallen werden, mit welchen man dann allgemein zufrieden sein könnte.
Für den Kenner Arten, z.B. Flora Antipathies, Sertella H., Hibernica H. ist aber noch das beste Hülfsmittel Micros-
cop nicht [illegible] sind, diese von unsern Verwandten richtig zu unterscheiden, da Lichtbrechungen Viel
finden. Ich hoffe, dass der sein verehrende H. Prof. Schultz sein Hydrostatisches Microscop ehe mit vervollkommnet
wird (was er beabsichtigt) zum öfteren Gebrauch zu verschaffen. Es wäre dieses auch Hr. Schultz diese Wunder über
das Hr. Hagen verschiedene Arten gemacht werden.

Mit dem Wunsche, dass Sie sich recht wohl befinden mögen, und mich, sobald ab Ihre Zeit erlaubt,
wieder mit einem recht langen Briefe erfreuen mögen, empfehle ich Ihnen mich zu fernerer
Zuneigung

Ihr

ganz ergebenster Diener

Fischer Edl. v. Rösler stamm

Anzeichnung. Ihre Zweifel sind die in vielen Arten der Arbeiten einfliegenden Artikel alle wie, vielleicht
galang 6 Jahre, für Sach die Raupenzucht einigen Arten Aufklärung zu verschaffen, und dafür wie
da über Ihre Mittheilungen, welche Ihnen mit Original-Exemplare begleitet sein müssten (die wir gern
gänzlich verstellen wollen) sehr angenehm sein, wenn es Ihre Lust und Zeit erlaubt, sie uns zu
geben. Wir sind verschiedene Arten und vielfältige Mittheilungen der gemachten Erfahrungen kommen
unsere Repetitoria geben. Die Einzelnen ist nicht im Handel, allein wöchentlich zu bekommen, und stellt sich
es gar, wenn die Erfahrung des Einen, auf Sach glaube Behandlung einer Gattung bestätigt
wird.

Nun wie und wie die Mühe dient verdienstlich besteht, an den Abmeldungen und den Tage wenn
die Raupen oft verschieden Zeit, und manigen die Flügel und ihre Farben und Zeichnungen zu be-
kommen, so wurde wir bald überzeugt diese Kenntnisse zur Bildung von Gattungen anfinden. Es
wurde sehr möglich sein, die Farben Klasse und ihren sehr verschieden gestalteten und bekannten Fal-
ter sehr einfachen zu können. Nach einem Kennzeichen stellt man aber nicht gegen. Die mannigfaltig sind
jedoch nicht auf die Füsse, verzüglich ihr Schwanzglied. Eben so ist ein glatter Kopf mit wenigen Haaren, die andern und
oder ein ganz rauher oder ganz glatter Leib, oder verschieden gefärbte Haare, die andern und
mehr gesunde auf dem Leibe zeigen, Merkmale zu Gattungen abzugeben. Die verschiedenen sind
nicht die Beine und ihre Bekleidung. Auf die Verwandlungen sind zu beachten. Nehmen wir nun nach
die zugespitzten oder stumpfen Vorderflügel und die mannigfaltig Hinterflügel gestalt, dann
den ausgeschnittenen Rand manchen Falter art, die länger oder Bogen, dicker oder dün-
ner Leibesbildung und die verschiedene Form der Flügel an, so giebt es eine Menge Merk-
male zur Bildung von Gattungen, die wenn sie verständig und richtig gewählt sind, kein Zweifel
gar veranlassen können. Complanella Hb. war die einzige die wir 3 Jahren bekannte art,
welche gebildete männliche Füsse mit einem mit Haaren besetzenden Anhange des Schwanzgliedes
hat, und sich dadurch von allen Arten des ganzen Linnean Geschlechts unterscheidet. Zeller bildete hierüber
eine art die Gattung Tischeria. Seit dem ist diese Gattung auf 6 Arten gestiegen. Sehe die Flügelform,
die dichte Befiederung und manches andere, obschon dieses vielen anderen Arten mag, aber doch nicht genug
gleich, zeigte uns gleich, dass die Füsse einen Busch haben und entdeckt sein müssten, also ist uns zur
Unterscheidung gefallen. Nimmt man nun mehrere Arten und verschiedene Gattungen über-
das Microscop, oder noch besser, wenn man die kleinen Thierchen anatomisch, und alle Theile einzeln
microscopisch betrachtet, so erlangt man bald eine solche Übung im Erkennen verwandten Arten,
dass man sie gleich sehr richtig bloss mit den unbewaffneten Auge zu ordnen vermag.
Es ist aber freilich dieses noch zu wenig gekannt worden, dass man noch einige Jahre hinge-
hen werden, ehe wir mit Hilfe solcher Durchsuchungen Manches ordnen und richtig
im System aufstellen werden, mit welchen man dann allgemein zufrieden sein könnte.
Die kleinsten Arten, z.B. Ihnen Cretschmarella, Sterrella Hb., Hübnerella Hbn. ist aber auch das beste Objekt für das Microscop nicht finanziell, diese wie andere müssen Verwandten richtig zu unterscheiden, da Lichtbrechungen Kunst
finden, die besser, dass das sehr unvergleichliche Hr. Prof. Schacht sein Hydrogengas Microscop so mit vervollkommnet
wird (und es beabsichtigt) dem Laien Brauch zu verkaufen. Es wurde deshalb dass Hr. Schacht bisher Kinder über
haupt Hr. Meyer verschiedene Versuche gemacht werden.

Mit dem Wunsche, dass Sie sich recht wohl befinden ~~mögen~~, und nicht, sobald als Ihre Zeit erlaubt,
wieder mit einem recht langen Briefe verschonen mögen, empfehle ich Ihnen mich zu gütiger
Fortsetzung

Ihre

ganz ergebenste Dr

Fischer Edl. v. Röslerstamm

Nach einige Anmerkungen zu unseren nachstehenden Bestimmungen: (144)

Jeder, der die Ypsonomeuten Evergreella &c in ihren Verwandlungsgeschichten beobachtet hat, wird mit Herrn Kaum, die Verwandlung vollkommen gefunden haben, und die nämliche sein auch thun, indem sie in der Eile behauptet zu machen, damit die Raupe einmal öffentlich in Ordnung kommt, und man sich das Verfahren nicht einmal denken kann. Ja meine Erfahrung ist über diese Verwandlung bereits angenommen. Vielleicht kommt mehr Thun, daß die Evergreella ihre Mus. Schiffern. die Padella Hb. 87 x Cognatella Hb. ist, und ihre Raupe von Tortrix. innerhalb zu Evergreella &c Hb. gezogen wurde. Padella Mus. Schiff. ist Decemguttella Hb. und ist gleichen Mus. Schiff. für [illegible] Padella L. halt, indem sie 20 Punkte auf beiden Flügeln anmerkt, Linné aber nur 18 Punkte einer Flügel meinte. Quadrifasciella Bkhaus. (Padella Hb.?) könnte dann Linnéische Cognatella Hb.

Bei der abändern die ich Ihnen sind die Anzeige, daß meine Colleyd.-Tetradella bereits von Stephens Catpil. arrogantella Hübn. beschrieben ist. Glücklicher Weise hatte der Pfarrer Kaum den Namen nicht Tetradella, welcher diese nur für meinen 18 Fabr. entfällt, muß nicht geschehen. Der Namen Linné wird diese bald in einen anderen ändern und verbessert werden.

Den Namen Gallicolana schreibe ich für die den Epilepreon Hb. ähnliche und angenommen, und werde seiner Zeit durch 3 verwandten Arten (Epilepr. Spiniana & Gallicolana) in meinen Heften näher gehen.

Merianella Hbn. 134 ist nicht Gallicerella Zinc., sondern eine mit Lemniscatella St. & Hb. 261. Der hinten Figuren ist 134 zu beschaffen. Quadrifida gab ich den Namen Schmidtella, die Lemniscatella L. eine andere Art ist. Merianella N. v. Mus. Schiff. ist Ornatella Hb. 358. — Merianella L. kenne ich nicht.

Tactuosella Zinc, welche ich mit allen Abzeichnungen übereinstimmend beschrieben habe, die Lepidopteren, die wir schon mehrmals untersucht werden, und seiner Zeit nicht fehlen wird.

Ich halte nun, nach nochmaliger genauer Durchsicht, die in Fabr. III. H. VI. Tab. V. abgebildete Art, ebenfalls für Gel. Malvicerella Zinc.

Ihre dankbare bin ich für die Mittheilung der Naturgeschichte der schönen Blatt. Heydenella Fr., welche ich seiner in meinen 18 Heften abbilden lassen werde.

Meine Microlepidopteren sind genau mit Treitschke Sammlung verglichen, und alle abweichungen genau notirt worden. Diese kann ich Ihnen fast versichern, daß meine Blatt. Langiella St. nicht die dem Treitschke. Ihre Sammlung und folglich auch Ihre Falcella ist. Treitschke Beschreibung passt freilich nicht gut, gleichwohl Linnéan aber doch viel von. So viel ist aber richtig, daß Langiella oft sehr klein vorkommt, und dann weniger Punkte oben zeigt.

C. Bilbauerella die sonst nun auch bei mir Borrichella Heyde.

Tetramaculella habe ich mit Ihnen gleichfärmig in Angustiorella Hyde umgeändert, und sie in die Gattung Tischeria Zinc gesetzt, wo besonders complanella Hb. und auch 4 neue Arten stehen, die sich alle durch gekämmte Fühler hinlänglich kennen, und durch einen auf Zweigen gebildeten Sack an Größe und Gestalt unterscheiden. Sehr möglich daß diese Raupen alle, wie die der Angustiorella, schwarz sind, wie Ihnen sie beschrieben haben, indem ich bei Ihnen auch die von Ihnen angegebene Fütterung Eichenlaub Esche, so wie der Nepticula für die andere Argentipedella Z. & Quinquefasciella Hyde. &c.

Die mit Schatzpennella in Vermiculatella umgenannten Namen wird umgeändert müssen, da, nach eingezogener Erkundigung, diese auch nicht Zweige minirt mit Decemfoliella sind, welche Falle in der Fabr. Sammlung steckt. Die andere ist sehr ähnlich auch, die ich Ihnen unter den Namen Decemfoliella Hb. (480) fand, die jetzt nun Decemella Zinc.

Ihre Fragen im Verlaufe dieses Jahres sind sämmtlich meine Meinung, Ihnen Laterella St. sehr ähnliche Art, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Damit die Lage beschrieben, schienen mir alle nun Art zu sein, und ich nannte sie Gyaticella. Ihr Name wird Ihnen seinen einzigen Rücken festhalten. Gyaticella habe ich schwarz dicht, alle auch Ihre Laterella St., meine Hübnerella Hb., Ihre Cultifoliella, und die zur genauen Untersuchung von Zeller nachgesandte Hübnerella (Hb.) und Lemniscella Zinc. mit H. Auger [illegible]

Langiella die Flecke [illegible]

einem gelben Flöschelfleck Micraltes genau untersucht, und ist weit an Form und Lebensweise. Einige: sein Gelegenheit fanden, dass die Füsse-Fühler eine sogenannte Augenbrau, der andere der Gattung Lyonetia Zell (Solacicella), der die Zell (Nepticula Hyde) sehr verschieden von jener einigen Arten der Gattung Opostega Zell (Salaciella), Cre- pusculella) ist. auf Lyonet. Nigrocomella, Hippocastani, Oldenella rc. haben mehrere Augenbrau, das Fühl- das Wurzelglied ist breit, niedergedrückt, auf der obern Seite mit mehreren Reihen von kleinen Schuppen besetzt und die Geissel genau auf das Auge. Jene Arten aber, die zu Opostega gehören, haben nur schmale Augenbrau, der Fühler ist am Ende und (nicht gesehen), an meist oben über dem Wurzelglied von breiten, weissen oder gelblichen Schuppen bedeckt, die auf dem Kopfe Roman, und welche oft die ganze Fühlerwurzel umgeben.

Lyonetia Zell.

a) gefangen im April & Mai an Pflaumen & Weiden. Kopfhaare strohgelb, Fühler dunkelbraun, über dem Wurzelglied liegen breite und lange gelblich weisse Schuppen, einige lange fast an den Scheitel- und Rückenhaaren. Vorderflügel glänzend, bis zur weissen Binde goldbraun, hinter ihr violett. Die Franzen an der Flügelspitze dicht, strohgelb, und im Hinterwinkel lang, weissgrau; der übrige Innenrand lang, dunkelbraun. Hinterflügel braun, die Franzen weisslichgrau. Diese sind gerade am besten auf Habanella Hb. 236. (Wahrscheinlich jene Hübnersche Figur)

b) gefangen im Juni in einem Garten. Kopfhaare in der Mitte rostgelb, an den Seiten einzelne strohgelbe Haare. Fühler dunkelbraun. Das Wurzelglied dicht mit breiten weissgelblichen glänzenden Schuppen bedeckt, glänzend, überall braun, die Ecken der Schuppen strohgelb. Vorderflügel glänzend dunkelbraun, mit einer weissen Binde ziemlich breit, fast in der Mitte stehend. Die äusserste Flügelspitze fast einer schmalen Zuspitzung lang, Franzen hellgrau. Hinterflügel einfarbig dunkelbraun und strohgelb gemischt. Die Franzen hellgrau. Fühler und Taster hellgrau.

c) gefangen im Juli & August an Bäumen und andern Gesträuch. Kopfhaare dunkelbraun und zwischen den strohgelben Fühlern weisse Haare, wie die einzelnen Kopfhaare, vor langen, dichten, weissen und glänzenden Schuppen dicht kammförmig umgeben sind; auch das Fühler-Wurzelglied ist von glänzenden weissen Schuppen dicht kammförmig umgeben, wie die Palpen über den Augen ist braun. Fühler unten dunkelbraun, oben weissgrau. Vorderflügel glänzend braun mit strohgelben Schuppen violett bis zur weissen Binde; diese den Innenrand violett. In der braunen Franzen ist ein Büschel weisser Schuppen und die Flügelspitze hellgrau. Zur Hinterwinkel lang und braun, wie der Innenrand sehr lang. Hinterflügel einfach hellgrau. Franzen hellgrau.

d) im Juli an Pflaumen gefangen. Kopfhaare strohgelb, gemischt mit dunkelgrau, das Wurzelglied von breiten weissen Schuppen fast ganz umgeben. Vorder- und Hinterflügel ganz so wie bei c.

e) bei St. Boie und Kiel auf Weiden, 1 Stück. Kopfhaare weiss, Fühler graugelb; das Wurzelglied breit, weiss, glänzende Schuppen bedeckt. Palpen weiss. Vorderflügel an der Wurzel bis zur ersten Binde, welche fast in der Mitte steht, goldbraun, glänzend, hinter der Binde haben die Schuppen strohgelbe Spitzen. Eine feine strohgelbe Binde stehen eine lange Flügelspitze umgeben von langen weissgrauen Franzen. Die Fühlerwinkel sind auch weissgrau, ganz der Innenrand lang und dunkelbraun. Hinterflügel hellgrau, an der Wurzel breit, steht ein Büschel langer, schmaler schwarzbrauner Schuppen, welche einfarbig bis fast in die Flügelmitte reichen. Einige Exemplare haben ist noch an einem Vorderflügel. Diese hat stimmt ist genau für Habanella Hb.

Das sind nun 5 Arten, die durch die Lage bekannt sind, nun eine zu dem schwer. Ich habe mich noch nicht entschliessen können, jeder einen Namen zu geben, sondern will erst Lepidopterologen sehr mehreren gesammelt und sie mit einander verglichen untersuchen.

Habanella Hb. (nach Zeller, mit seiner Deutung)

Kopfhaare strohgelb, Fühler gelbgrau, das Wurzel mit weissen breiten Schuppen umgeben, ein Scheitelbusch, der bis an den Scheitel- und Rückenhaaren an. Die Schuppen der Vorderflügel sind überall glänzend, bis zur Binde glänzend goldbraun, hinter derselben einmal violett. Die Binde ist nicht deutlich, schmal und weiss. Die Franzen sind überall, auch am Innenrand sehr lang und dunkelbraun. Die Hinterflügel sind einmal dunkelgrau, und mit sehr langen, schmalen dunkelbraunen Schuppen strohgelb bedeckt, die Franzen dunkelbraun.

Zeller hat noch ein zweites Exemplar, welches an mir nicht gestellt, in der Meinung, als sei ganz so, wie das gesandte. Ich vermute aber es ist Lindeck, denn in der Beschreibung, dass die goldbraune Binde auch grauen Schuppen besteht, und der Raum bis zur Binde goldgrünlich, glänzend sei.

Lemniscella Z. (mit Zeller's Beschreibung) Kopf rostgelb, Fühler gelbbraun, einige Glieder vor der Spitze fahlgrau; Taster gelbbraun, innen fahlgrau, das Endglied weiß. Das Mittelglied ist an Länge mit fahlgrauen, braun gemischten Schuppen bedeckt. Vorderflügel bis zur Flügelmitte, meistens dunkelbraun glänzend, fuchsrothgelb angeflogen mit violettem Schimmer. Franzen braun. Hinterflügel fahlgrau, fahlgrau, die langen Franzen fahlgrau.

Die grünlich Bild fällt Hr. Zeller auf genau für Lemniscella. Kopf rostgelb, Fühler dunkelbraun, Mittelglied rostgelblich, innen braun Schuppen bedeckt. Vorderflügel von der Wurzel auf 1/3 der Länge glänzend goldbraun, dann bis zur Mitte und finden die meisten kleine Lichtpunkte mit violettem Schimmer. Franzen braun, am Innenrande fast lang. Hinterflügel und Franzen fahlgrau.

Die Lemniscella in der Fris T. 215 weicht von der obigen etwas ab.

Aurella Fab. (nach Heyden) Ist mir gesandtes Bild weicht aber nach der Beschreibung, beim Abgleichen mit Microscop fast beschädigt wurde, fast schwarz Kopf rostgelb, Fühler, Mittelglied rostgelb, Taster, und gelblich weiße breite Schuppen Spitze auf der Scheitelwurzel, Stirn an die Basis der Scheitel gelb. Der Thorax ist gelbgrau. Vorderflügel bis zur silberweißen Binde goldgelb, mattes dunkelbraun, Einfassung. Auf der Vorderflügelspitze stehen zwischen den Schuppen lange Haare. Die braunen Franzen am Innenrande fast lang. Hinterflügel (wie bei Hübnerella Zell) dunkel mit langen, schmalen dunkelbraunen Schuppen bedeckt; die fast langen Franzen dunkelbraun.

Centifoliella Heyde. Ist mir gesandte Bild. Das mir fast rostgelbe Kopf, Taster und Fühler gemischt. An Beine sind die Schienen gelb, die Tarsen sind gelb, die Vorderbeine, braun, glänzenden Schuppen bedeckt, einige Haare liegen an der Spitze der Scheitel. Vorderflügel sind bis zur weißen Binde braungrau mit einigem Goldglanze, die Spitze der Schuppen dunkelbraun, sodass der Grund ist matt dunkelbraun. Die Franzen lang und dunkelbraun. Die Hinterflügel sind schwarzbraun mit langen schmalen dunkelbraunen Schuppen bedeckt, ihre Franzen lang und gelb.

Zu H. Mann's Bearbeitung bemerke ich noch:

№ 4. Aurea Strana Fr. hat sehr viel Aehnlichkeit mit Verticana und einige Var. von Pinana; ist aber nothwendig eigene Art, wie mir ihre Raupe sehr in Böhmen und auf Sarepta wieder übergangen.

- 5 Cuphana Tr. Länge stellt man das Weib für Quadrana Hb. und das ♂ für eine eigene Art. Die Raupen der Quadrana sind aber am Zusammenhalt viel dunkler und lebhafter gezeichneten Thiere.
- 6 Ulmana Hb. 278. Das Weib ist als Arcuana Hb. 279 abgebildet.
- 7. 8. 10. 11. H. Mann hat Ihnen seine Arbeit eine Kurze Anzeige der Raupen bemerkt, wie diese aber wirklich verschieden sind. Goldegg hatte sie schon gefunden, und seine sorgfältig aufgefassten Angaben (die in Hr. Heyden's Händen sind mit der Beschreibung der Raupen bekannt). Vergleichung Bild schwarz und Kleine Exemplare von der Wallbom. zu unterscheiden, wenn immer sie nicht zu zieht!
- 12 Obscurana Hb. hat sehr große Aehnlichkeit mit Graphana Tr.
- 13 Modestana Hb. scheint ein Kleines, zusammengezogenes Tr. um Hohenwartiana zu sein. Die Raupe aber in Nebenzweig auf anderen Blätter und zu anderer Zeit rot, so dass sie sich als eigene Art verschieden.
- 17 Diffusana Hb. Ist ganz wie Dorsana, und in der Raupenzeit stets unter Nidus gemischt zu finden. Die Unterschiede sind genau, doch schwierig: Unter anderen sind die weißen Vorderrandflecken an der Spitze deutlicher Dunkelbraun; bei Dorsana alle nahe beisammen stehen, bei Diffusana ist der erste Fleck weiter von der folgenden weiter entfernt; die Flecken immer zusammenhängen.
- 19 Hegeriana Nov. hat große Aehnlichkeit mit Alpicana, aber doch auch deutlich und bleibend verschiedene Art.
- 29. Sequella Das dunkle Bild ist in Übergang zur Leucophaea Zell (Fris. 188); die Raupen sind gemischt unter Sequella gefangen und ist nun Varietät von ihr.
- 37 Desideratella Hb. Zeller nannte sie Fischeriella (Fris 249). Da aber schon eine alte Nisella Mann in Litt. St. besteht, und die ich bis zu meinem 28. Hefte unzugänglich, dem alten System getreu bleiben will, so habe ich in meinem 17. Hefte, welches alle Arten der Gattungen Glyphipteryx & Ypsolophus Zell enthalten wird, die von mir gegebenen Namen beibehalten. Dort werde ich auch noch mehrere Bemerkungen, als Zeller in der Fris angeführt, anmachen, welche Desideratella von Fischeriella Hb. unterscheiden.

Langiella. Die Flecke [illegible] gebogen [illegible]

41 Terrella Hb. Passt hier nicht in Terrella W.V. u. Mus. Schiff. u. Lypygella Tr. ist, wird Ihm mein 16te Fall offen gesagt haben. Über Treitschke seine Lypygella Hb. citiren Lienig, ist unbegreiflich.

42 Oxyacanthella Ma. Man würde sie sehr leicht für Borella Hb. 172 oder noch mehr für Crataegella Hb. 332 halten können, wären nicht die Raupen von den Raupen jener beyden sehr verschieden

43 Polaeella Tr.) Sie haben jetzt 4 Arten, wo das Weib abweichende sehr gestrichelte Vorder- und sehr verdunkelte, breite
44 Binotella Tr. (2 Arten mit federförmigen, bei einer Art kaum fühlbaren langgrünlichen und bei einer andern sehr deutlichen Vorderflügel sind, und wo die Vorderflügel bei Mannch sehr schmal sind, so dass die Falter
schmale Vorderflügel sind. Es ist noch kein Gattungsname für sie vorhanden. Zeller, Stett. Polaeellen (an Binotella
sphorea) äußerst glücklich. Er ist noch kein Gattungsname für sie vorhanden. Zeller, Stett. Polaeellen (an Binotella
nun diese Art adhin) In seiner Gattung Hypsolophus mit Scirtella Hb. 208 in eine eigene Familie. In der
Fuge 4 Arten sehr nahe verwandter Falter, Füsse und männliche Fühlerbildung gestalt ein Steinchen
Tellus, bey welchen aber das 3 und 4 nicht verschieden ist. Die Weiber müssen sehr mühsam zu bestimmen
seyn, wenn sie gefangen und aufgefunden werden, ist sehr nur einmal im Flug.

48. Biguttella Tr. Ähnlich der Crataegella Tr. & Hombrosella Z., so gross wie letztgenannte aber dünkt mir sie verschieden.
52. Seliniella Z. Lässt sich Pradacteella Z., Fagella Tr. und Laminella Hb. zu vereinigen, aber Tab. 3 v. Seliniella sah
ich einen schwarzweissen Fleck am Innenrande; das von Pradacteella sah ich grünlich und gelblich.

56 Tombaciella Tr. Scheint mir die Violella Tr. mehr als gleichstimmend mit Violella W.V. und Treitschke, wie
dem Mus. Schiff. viel grösser und übrigens zweifelhaft Cypriacella Hb. Ich möchte sagen einen neuen Namen.
57 Latreillella Tr. H. — Paddella Hb. Tr. ist wie mir Latreillella.

62. Disparatella Tr. Abgesehen von Biguttella Tab. ähnelt sie der Treitschke'schen Hermann.
63 Saltatricella Tr. Gehört nebst noch einer neuen Art in die Gattung Lathronia oder Metalicella Z. Einander in
meinem 17te Falle muss.

66. Tenella Zell. 67 Crameriella Tr. 3 Beide Arten sitzen Tenella, scheinen fand Zeller, dass sie Crameriella Tr. sey. Nachgehends fand ich dass
wie 2 Arten unter sich Männer vereinigen, und so gehört sie in die Tabelle nicht hergehören, wo alle
Männer wichen. Sie sind standhaft verschieden.

69 Tremulella Tr. 70 Salicifoliella Z. (Sahlgna Z.) 3 Gleich nun 6 dunkelen Fall. Alle fallen in ganz weissen Gy. für Lavinbäume aber sind abgeflogen.
Es zeigte sich aber, dass die eine Art schon meist Blatt, die andere (Saligna) schon einen grünen Fleck
von der Flügel Mitte in die mitte sah, so verschieden Falter und zu verschiedenen Zeit flogen.

75 Binotella L. (nach Zell.) Über Binotella L., Cinctella W., Ligulella W. & Fortisella Scop. herrscht noch viel Unsicherheit. Zeller gab
in Charpent. p. 192 Anmerk. 208 die erste aufklärende Angabe. Es scheidet 2 Arten, die Binotella L. (Mus. Sch. N. 390. Fn. Se. 1388)
sind, von der Art Fortisella Scop. ziemlich sicher sind und eben so bey Fabricius. Beim 2te Art ist Fortisella Scop., mögte die Cinc-
tella, Ligulella W. & Binotella Hbn. 192 zieht. Die erstere stellt (nach Linné & Fabric.) schon schmalen, linienförmigen
Hinterflügel, grenzt über den Mittelst. einen mehr breiten und schwarzen Fleck, und der Rand nicht ganz in den Mittelst. sind,
sondern ganz schmale und gespitzte Hinterflügel, und der Rand nicht ganz in den Mittelst. sind, sich auch in Fabric. Sammlung.
Treitschke, welcher überall, wo nur möglich, Linnéan aufzählen folgte, ist auch hier gefolgt, aber eigentlich zu wissen, was Linnéan für eine Art meinte; denn
schon 1833 seine Vermutung mit der meinigen so ähnlich, fand ich doch an einer Fortisella & Cinctella
Exemplar eine gemischte Art, die grösseren wären Fortisella, die Kleineren Cinctella, die Mittlere war
die jüngere Tenuiella Tr. u. Tr. — Seine Beschreibung der Cinctella passt nicht in ganz eigenen auf die gemeine
seiner Sammlung. — Wie beschrieben, wie schon bekannt sein wird, 3 Arten, die Füsse auf der Aussenseite
ganz glänzend, und 2 Arten sind wirklich schwer zu unterscheiden. Die eine Art ist in der Grösse mittlere,
und gewöhnlich die grösste, aber meine Exemplare mässiger abwechselnd. Sie fliegt mit im Grase und hängt
die Flügel dachförmig. Zuweilen sah ich grünen Fleck stets als gemeint, denn es nennt sie "Cayennischen
die 2te Art ist in der Regel etwas kleiner, manchmal unbedeutend in der Grösse, den Rand ist fast immer
gerade. Sie fliegt mit auf hohen Baumstamm, setzt sich auf Baumblätter und sucht selbst in Flügel sammen.
Die dritte die Flügel senkrechtal. Die 3te ist der 2te ganz gleich, hat aber meist auf der Aussenseite
einen mehr oder kleinen dreieckigen Fleck, und sie manchmal noch 1835 von
Treitschke der Name Tenuiella und Zeller der Grösse in der Isis p. 201. — Es können also nur die
meisten beiden in Betracht. Ich will sie nicht die Hauptschwierigkeit, die 2te der Beschreibungen.
Cinctella Fig 192 stellt meinen Ansicht nach den Falter vor, in Farbe aber gewiss an von den Fabricius.
Fortisella Scop. ist ganz sicher, wie der Name schon sagt, der Falter. Ligulella Mus. Schiff. ist nach
Scopoli Exemplar. Der Falter. Zinken, Treitschke & Zeller's Cinct. Tab. N. ist also unsicher, und Hübner
wenigstens nicht ganz sicher. Nun frage es sich noch, was ist Cinctella L.? Zeller nimmt (Isis p. 203)

*) Alle 3 Arten haben langzeichnige Hinterflügel.

Alncitha, Nov. 1840 an Fischer v. R.
Für Archiv pr. Fischl.
147

Wien am 22ª März 1840.

361

761

145

die gegenwärtige Art, welche Herr Fr. Mann unter No 95 schickt, als Cinctella L. an. Linné hat sie schwarz, die Antennen weißgeringelt, die Fühlerspitze braunkämmig, gefangen. Zetterst's Cinctella L. ist nicht schwarz, die Beine nicht, auch nicht, auch gelblich, die Flügel Raum gestreift, der Kopf weiß, und nur allein die Fühlerspitze braunkämmig. Sie kann demnach Cinctella L. seine. Ich glaube, Linné hat mit einfach den Weibchen, Verticella Scop. gemeint, das schwarz, aber, welches an beiden, nur gänzlich gefleckte Hinterflügel gehabt haben. Für sich kann Linné kämmig gehabt. Verticella hat auch wirklich schwarze, jedoch kurzgezähnte Fühlerspitze, die Flügel gefleckt sind, und ist sicher beim Linné gänzlich gestreift angegeben, so daß sie braunkämmig Linné, nämlich nicht ganz zufällig und gebraucht wurden. Sehr wenig hat Linné nachgeschrieben. Hat aber Fischer für eine Art als Cinctella L. meinte, so ist schwarz zu bezeichnen; Zetterst's meinte es schwarz nicht, denn er schreibt von Beinen und den Hinterrand etwas den Bauch nicht ganz Linné, sie sagen sich ungemein ähnlich, denn Zetterst's Cinctella ist auch so ganz Linné von den anderen verschieden. Ganz müssen ich wieder, und die Linné sagen, was die Linné Cinctella L. und Linné Cinctella Fbr. verschieden.

Die Selenophoren sind im Ganzen Einfach, schwarz zu bestimmen, manche, die ihre gestreiften oder gelb Linie ganz nicht. Ich habe sie alle, mit Fr. Hagen, unter dem Microscop ~~studirt~~ untersucht, und sie nach ihren Flügeln, aber genau studirt, und die Hinterflügel jeder Art ist durch Fr. Hagen stark vergrößert abgebildet worden, um hiesen einmal eine Monographie darüber zu geben. Endlich ist die Gattung eine wirklich gute, und sie würde noch vermehrt sein, sollten wir noch einzelne Arten kennen lernen. Allein wir haben nun jene Arten beisammen, von denen wir wenigstens 3 gleiche Arten hatten.

78. Cricetella Fr. ist standhaft verschieden von Gallipennella H.

79 Serenella Tr. galt lange Zeit für Arten Fr. von Gallipennella, allein Fr. Tischer hat seine Meinung nicht bei, und sie überzeugten mir mit Recht die Raupen, Fr. Tischer Recht hatte. aber auch die Raupen geringe Verschiedenheiten von Gallipennella, z. B. an der Falzarte Fühlerbürstchen.

82 Saxicolella, 85 Troglodytella 86 Trochilella 87 Murinipennella wurden alle bisher unter Pteidipennella H. oder Gallicipennella Fr. gezogen, aber mit Hinterzähnen bemerkt, und doch sind sie, selbst schon durch die Raupen, standhaft verschieden und aber; das Microscop zeigt es aber unterscheidend, denn sie zeigen sich die Fühler-Büschel und aber den Flügel als ganz verschieden an.

93 Petricella Fr. ist unfehlbar verschieden von Osterella Z. (Vulnerariat Z.).

94 Semidactylella Fr. ist genau stimmend mit dem Hamz. in Mus. Schiff. — Fabricius Abbildung ist absurd verfehlt.

95 Testacella Fr. variirt sehr wenig, wie Sie an den beiden Hamz. sehen.

99 Litho- & Leptodactyle Tr. sind eine Art, die eine mehr Manier.

100 Micro- & Carphodactyle Tr. ist ebenfalls eine Art, die eine mehr gestreift.

Im Oktober 840.

Fischer v. Röslerstamm

Langiella die Flügel sind ganz [illegible] gebogen [illegible] Fr. Tischer

1439 Terrella Ht. Dass diese unter die Terrellae W.V. & Mes. Schiff. & Zygogrellae K. gehört, wird Ihnen mein Herr [illegible] sagen

Isabel. oder Dreifleckte seine Zygogrellae Ht. ciliaris Lamb., ist unbegreiflich.

1442 Oxyacanthella Ma. Man würde sie sehr leicht für Cerasella Ht. 172 oder auch wohl für Cerasiella Ht. 332 halten

Pr. Wohlgeboren

Herrn Senator C. von Heyden

in

Frankfurth s/main.

Wien am 22ª May 1840.

Almeitae, Nov. 1840 an Fischer v. R.
gr. Artikel gr. Gibt.

147

№ 1 (adactyla) Frankfurt
2. (rhodactyla) ♂ > 6 < 7. Rosa (bei fy. nicht Füssly am Pfaffberg)
3 (ochrodactyla) ♂ = 7. (bei fy. Riesy ~~Lefebure~~)
4. (xanthodactyla Hb.?) ♂
5. ——— ♂ = 7 Hr. Winkler, Günstadt
6 (pentadactyla) — ♂ > 6 < 7
7. ♀
8. ♂ ——— Ähnlich alya.
9. ♀
10. ♂ (Microdactyla) Fribl — < 6
— = 5
11. ——— ♂ = 7 6. (f. d. Tannhain)
12. ——— ♂ = 7

Bemerkungen 1840 (Nov.) an Fischer von Röslerstamm.

Heidella Hav. Erwarmt schon Mitte Lyrie sämtlich um Rubus sträucher.

Obliterana Hydr. Erscheint nur an einem Orte Mitte Juny an Ligustrum Gesträuch gefunden, das nur 2 mal gegrast kommen. Zeigt auffallend Klugel a. nur die dunklern Fransen am Hinterrand d. Vf. sind rauchgrau.

Goezella Hydr. Im 5ª Bd. d. Naturforschers hat Goeze von dieser Art Abbild. u. Naturgeschichte geliefert. Fliegt Mitte May Die Raupe auf Erlenblättern.
= ? scitella Zell. (Zell. Isis)

Heracleella Hb. Fand meine 3 Fy die ich früher für diese Art gehalten habe Mitte May an Eiche.

Scribaella Hydr. (obscurella) Argentipedella Zell. Ich habe diese Art bis jetzt nicht erzogen, daher ich nur einige Worte darüber sagen kann.

Die Aurella (cataleucella) Fand die Begattung des Weibchens gestern, unterscheidet sich zu einer Aurella Fand ich in Paarung und hatte das ♀ hatte Eyer, das ♂ gelbe Flügel Paare.

Langiella Die Raupe nicht mehr [illegible]

764

Ist ohne Zweifel die Raupe von Malinellus. Mihi
Malella Schrank ist Pomonella Pomariella
in seiner Historia insectorum
wäre interessant erzogen auf
genauer bestimmt würden.
für die damalige Zeit ganz
meine Pomariella stimmt von Malinellus. Mihi
fast ein Grund zu sagen. Den grauen Flecken
sah ich nicht wahrgenommen in meiner Raupe
sind nicht gelb, sondern grau
nella. Habn. 134. und noch sonderlich
ist auffallend, dass Stephens
ogy bei guttea als Synonym
oder wenig Lärm, nachdem er
ingezogen hatte. Stephens bildet
3 Arten die Gall. Callisto, der
Flügellänge gibt, was mit
stimmt, da sie bei dieser von
. die Beschreibung der
so bleibt es allerdings
ist bei den alten Schriftstellern
e in der Fauna suecica ach
ist nicht klar. Dass Synonym
zur Goedartella zu gehören.
tea aus was zum guttatea
Ueberzug unterzogen u. die Raupen u. Puppen beschrieben
um sie zu Falter zu machen nahmen
von. Evonymella die Cognatella. Hb.
von. Padella die Evonymella Hüb.
das Lin. gehört) als auf P. Padus
ella Hüb. 390–95. auf Pflanzen lebend. –
l, 2 Jahren auf nach ihrem Futter.
sie zweymal fällt die erste
Falter wie für die gehörige Art
osa und Padus an. Letztere lieferlich auf den
in 2 Jahren getrennt, wovon wir eine
wenden.

Wissenschaft und ersten Systematik zum

1439 Terrella Hb. Passt hier auch die Terrella W.V. v. Mes. Schiff. v. Lyonetella Z. ist, wird Ihnen mein 16te 744 schon gesagt
haben. Die Vaterländische Form Lyonetella Hb. citirean Lambda, ist unbezweifelt.
442 Oxyacanthella Mn. Man würde sie sehr häufig für Porrella Hb. 172 etwa auch manche für Crassiella Hb. 332 halten

Pr. Wohlgeboren

Herrn Senator C.

angusticollella Hübn
Laricella Hb. Mitte Juny an d. Stämmen
von P. Larix erzogen
Tortr. rutilana Hb. Juny u. July
von Juniperus erzogen
Pastorella Hübn. (von Frutillella u. Popnifol.
wohl zu trennen) entwickelt sich in
Dol. aus glatten
weiden Blättern.
Torquillaperonella Hübn Nov. & M.
Tort. turgana Hübn Juni Juny aus Mayn.
eine Varietät
Dep. Emeritella Hübn (Habe ich dieses Jahr benannt,
die mir von albipunctella durchaus
keine Spur zeigen. Raupe d. Falter
Juli u. Julius Juny u. andere Raupe.
den August. Raupe an Tanacetum vulg.

Wien am 28ª May 1840.

Alnicitae, Nov. 1840 an Fischer v. R.
362
Zur Ansicht gesendet.
147

№ 1 (adactyla) Frankfurt
2. (rhodactyla) ♂ >6<7. Rosa (bei Fy. alb. Prigya am Hyalbaeum)
3 (ochrodactyla) ♂ >7. (bei Fy. [illegible])
4. (caryophodactyla Hb.?) ♂
5. ——— ♂ >9 (Thüringen, Günstha)
6 (pentadactyla) —— ♂ >6<7
7.
8 ——— Pyrenäen Alpen.
9.
10. (Microdactyla) Fribl — <6
—— =5
11. ——— ♂ >6. (f. d. Tannenw.)
12. ——— ♂ <7. (———)
13 ——— ♂ <7. (Dürkheim)
14 ——— ♂
15 ——— ♂ >8 (f. Oppenh.)
16
17 ——— Pyrenäen Alpen.
18
19 Fribl >6<7 v. Hieracium
20 ——— ♂ >6 gängig
21 ——— ♂
22 ——— ♂ =?

764 Malella
Ad abdallidem Nannia ~~Malinella~~
Malella Schrank in Tomomeffa
Pomariella
in seiner Historia insectorum
[illegible] inhaerentium exp. auf
genaue bestimmt wurden.
für die Decemlign Zeit, gegen
meine Pomariella spricht von Malinellus. Es
fast gar nichts zu sagen. Den grauen Flecke
habe ich nicht wahrgenommen in meiner Raupe
sind nicht gelb, sondern grau
ella. Habn. 134. und wohl sämmtlich
er auffallend, daß Heyden
gy bei guttea als Pyronya
der vorgelassen, nachdem er
gezogen selbst. Heydens Bildet
Arten die Gall. Callisto, der
Flügellänge gibt, was mit
stimmt, da sie bei dieser von
die Beschreibung der
so bleibt es allerdings
ist bei den obwaltenden Schwierigkeiten
e in der Fauna suecica ach
ist nicht klar. Die Pyronya
zur Goedartella zu gehören.

Pyronya hat unsere gemeine guttea und nicht eine guttulosa
Ob sehr diese Arten einer genauen Beobachtung unterzogen u. die Raupen u. Puppen beschrieben
Um der bestehenden Verwirrung ein Ende zu machen nehmen
ist unbekannt — Pyron. Evonymella die Cognatella. Hb.
als auf Evonymus lebend, — Pyron. Padella die Evonymella Hb.
(gegen die Diagnose der Evonymella das Lin. gehört) als auf P. Padus
lebend. — Pyron. Agnatella die Padella Hb. 390–95. auf Pflaumen lebend. —
Linne hat diese 3 Arten gekannt, 2 davon auf nur ihren Futter-
pflanzen benannt jedoch [illegible] Linne die zweifelhafte der ersten
(in Gabr. seiner Fauna [illegible] Art
und Hyl. der Futterpflanze Ery
Sammlungen hat er die [illegible]
[illegible] Pyronya [illegible] Pyronya
[illegible] Pyronya [illegible] Pyronya
[illegible] Pyronya [illegible] Pyronya

41 Ferrella Hb. Dass diese nächste Ferrella Wk. v. Mus. Schiff. [illegible]
Isabel. oder Knittelfeld [illegible] Lepigonella Hb. ciliana
42 Oxyacanthella Hb. Man würde sie sehr leicht für Ferrella [illegible]

Wohlgeboren

Herrn Senator [illegible]

23. ——— ♂ 5 (Yaken f. d. Nollenhof)
24 ——— ♂ 6 (Grabstelle f. d. Forsthaus)
25 ——— ♂ 6 Heidenplatz
26 ——— ♂ 6. Kaiserstuhl
27 ——— ♂ >6. Grabstellen f. d. Forsthaus
28 ——— ♂ <7. Ericetis f. d. Forsthaus
29 ——— ♂ 7. f. d. Yakhof
30 ——— ♂ <7. Grain Waldstelle
31 ——— ♂ <8. Wiesen f. d. Hambach
32 ——— ♂ >8<9 Grainplatz f. d. Forsthaus
33 ———
34 ———
35 ——— } ♂ <10.11.12 unter diesen Tab. übersichtl.
36. ———
37 (hexad.) ♂ 4 im Gebäude
38 ——— ♂ 5 im Gebäude
39 ——— ♂ 6 Yaken b. d. Orda
40 ——— ♂ >8.9 im Gebäude
41 ———
42 ———
43 ———
44 ———
45 ——— ♂ (defect.) alte Darstellung

Vet. aus Glatthaferblatten.

Tortillaepennella Hyda Nr. 2 N.

Tort. Jurgensiana Hyda [illegible] Fundgrube aus Mayence
[illegible] v. Jurgens

Dep. Emeritella Hyda (Habe ich diesen Abend benannt, die mir von albipunctella Hw. nicht [illegible] Hamb. der selbe Kopf u. Halsschild d. andere Länge. Im August. Länge auf Tanacetum vulg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 22ª März 1840.

Nov. 1840 an Fischer v. Röslerstamm geschickt: (als Geschenk 763)

4 N. Carp. amplana Hb.
4 " Carp. fagiglandana Hyda } Ist wenden Sie Raupen Gäste nachstehend bekannt machen
2 " Tort. obliterana Hyda ♂ (2 mir 2 mal)
4 " Paed. gallicolana Hyda.
1 " Cochyl. rutilana Hb. (Bitte von Dorig. gezog.)
4 " Badra pauperana Haw. Heyl. (Scirpus Hyda. olim lacustris aus Mayen
2 " Depress. emeritella Hyda. Raupe Juli Ende Juli
1 " Coleoph. gallipennella Hb. ? Colutella Fab. Fab. citirt
4 " —— laricella Hb. Reaumur, zieht aber Colutea als Futterpflanze auf Rose an (Wie die art vom Reaumur)
4 " Elach. Heydeniella Fisch. ♂♀.
4 " Elach. Langiella Hb. (Bürgnalen wo sie Flach sind)
4 " Elach. Herrichella Hyda.
1 " Aechm. politella Hyda (Mucidella. Hb. ?) Nur 2 mal an diesen
4 " Opost. Goezeella. Hyda. (Scitella Zett. Fis ?) Raupen auf Fichten vid. Kaltenbach pp. 5. —
4 " Neptic. Argentipedella. Zell. Nur grosse gezogene Exemplare.
6 " Neptic. centifoliella Hyda. 2 Reg. dorsch 4 gall. 16 Aurella Exemplare) Raupen alten Rosen, wachsen nie als Gespinste bei mir
2 " Lithoc. Torquillaepennella Hyda. Nicht Jahr nur 2 mal.
4 " Lithoc. pastorella. Hyda (Rheini v. Frölichella u. Oppositell. gezog.
4 " Ectrix angusticollella. Hyda. Ectrix muss noch wieder eingesehen, da die Raupen von Hyda. complanella total verschieden sind
1 " Chrysocorys scissella. Haw. Hyda. Raupe Striata alter, dessen jetzt Schreckensteinia Festaliella. Hyda zugezogen Gattung. Ist selbe sie zu Micrita. Hyda. Ypsiotes dactyla etwa zu Micrita, wie Schreckensteinia zu Oncodes.

764 Malella

Für Art aber Gallicolen Raupen Malella gegen Malella schwarz in Pomonella Pomariella

ejus in seiner Historia insectorum
ch wäre interessant exp. genau bestimmt würden.
und für die Decemlineen nicht gerade
Raupen Pomariella Heint von Malinellus. Es
fast angenommen zu sagen. Den grauen Flecken
haben wir nicht wahrgenommen in meiner Raupe
sind nicht gelb, sondern grau
canella. Hahn. 134. und recht scheinlich
mir auffallend, dass Stephens
ology bei guttea als synonym
wieder ganz Cäst, nach dem er
zugezogen selbe. Stephens bildet
Arten die Gall. Callisto, der
ber Flügellänge gibt, was mit
ung stimmt, da sie bei diesen so
sind die Beschreibung der
diese Art so schwierig an
t, so bleibt es allerdings
muss bei den alten Schriftstellern
inne in der Fauna suecica ach
l mir nicht klar. Dem Synonym
l zur Goedartella zu gehören.
uttea auf nur eine guttatera

Ich habe diese Arten einer genauen Beobachtung unterzogen u. die Raupen u. Puppen beschrieben
Um der besonderen Verwirrung ein Ende zu machen nenne
ist — Ypon. Evonymella die Cognatella. Hb.
als auf Evonymus lebend, — Ypon. Padella die Evonymella Hüb.
Synonym die Diagnose der Evonymella (auch Lin. gehört) als auf P. Padus
Linné hat diese 3 Arten gar Padella Hüb. 990–95. auf Pflaumen lebend. —
Pflanzen benannt, jeder Synon. auf nur ihren Futter-
(Angabe seiner Fauna suecica (
und Titel der Futterpflanze Evonymus,
Sammlungen hat er die in sog. Linn.
seinen naturgeschichtlichen, [illegible] Handschaft und wissen Bezeichnungen

1139 Terrella Hb. Dass diese mit der Terrella W.V. & Mus. Schiff. identisch sei, habe ich Ende Juli 1886 durch Vergleichung der Hb. Exemplare selbst constatirt.

1142 Oxyacanthella Mo. Man würde sie sehr leicht für Dentella halten

Ihr Wohlgeboren

Herrn Senator

Tetquillaperonella Hyda Nov. sp.

Dep. Emeritella Hyda (Habe ich direkt benannt, die mir von albipunctella durchaus verschieden scheint. Der selbe Name ist bei Schläger bereits anderweitig vergeben.)

Wien am 22ª März 1840.

150

Hochgeschätzter Herr!

Fisch Reaumur sah in Gesellschaft das sie
u. Cognatella durch Copulation
trennten, sondern verfolgten, was
sie nicht für eigentliche Kopulation
gehalten hätte.

Herr

1139 Terrella Hb. Dass diese auch in Terrella W.V. u. Mus. Schiff. u. Gabel. als Vorkommen kann Dyspyrella Hb. citiren 1143 Paracenthella Mo. Man würde sie selbst für Parvella halten

als
Evonymella nennt, mit Flügel 50 Punkten und auf Evonymus lebend; beschreibt; die andere aber als Padella, und auf Padus lebend, beschreibt. Ein völliger Irrthum dass diese nicht beibehalten werden und ist meine Namen-änderung (die man kaum als eine solche betrachten kann) gewiss im Sinne Linne's. Er wollte ursprünglich die auf Evonymus lebende Art Evonymella und die Padus lebende Padella nennen. In der Botanik hatte Linne eine ähnliche Verwechselung begangen, indem er die Weisstanne als Pinus Picea, die Fichte aber als P. Abies beschrieb. Darin erkannte diesen Irrthum und verwechselte beide Namen, die in dieser Weise jetzt auch von allen Botanikern angenommen sind.

Coleoph. Zellerella. Fis. diese gracilaria Art hat Stephens in seinen Illustrations of British Entomology. (Haustellata) Vol IV (1834.) pag. 362. beschrieben und bildet auch sie in einer eigenen Haltung. Es ist seine Euspilopteryx aurogutella. — Curtis hat sie in seinem systematic Catalogue ist sie Genus 338. — Curtis hat sie in seinem British Entomology Vol tab.
Es ist daher zu bedauern, dass diesem scharfen Beobachter der Name des verdienstvollen Herrn Zeller nicht wird bleiben können

Micropt. Fasciosella. Zell. Ohne Vermuthung, dass diese Art nächst einiger anderen nicht zu den Gracilarien, sondern zu den Hyponomeuten gehören möge, hat allerdings einige Aehnlichkeit mit Fis, aber man könnte ebenso wohl eine Anzahl Lithocolletis auf zu den Gracilarien rechnen. Bei vielen Hyponomeuten fehlen die Oberlippe und eine Anzahl Motten fehlt der Saugrüssel. Indem kommen Hyponomeuten vor, wo die Haarbildung auf den Flügeln, wollig in Fransen übergeht.

Es scheint kein Unterschied bekannt zu sein, wodurch sich beide genau von einander unterscheiden.

Wien am 22ª März 1840.

150

Hochgeschätzter Freund!

die bisher zu den Schmetterlingen gezählten Arten, würde ich ab
doch gewiss in Ihre Stellung lassen, da sie allgemein bekannt
sind doch wäre auch diese Art zu nigra Haw. Curtis zog
Melo aus zweifelhaft obige die Tin. cathella. Heyden
Cicada gehört bei die Cayidophora lich und eine besondere Gattung
Eriocephala auf sie bildete. In der British Entomology
Vol. XVI. tab. 751 ist sie mit ihren gegliederten Mundtheilen
sehr schön abgebildet.

carpoc.
Fagiglandana Hydr. Obgleich diese Art mit der splendana
nahe verwandt ist, so bietet sie doch selbst bei Vergleichen
so bestimmte Kennzeichen dar, dass eine Verwechselung
nicht leicht statt finden kann. Lepidana Frol. ist eben
falls nur eine macula communi ferruginea bei ihr wie
vorkommt: sie selbst wurde nur hinsichtlich der speciellen
Naturgeschichte der Fagiglandana, splendana und Amplana
zu publiciren, weshalb B nicht einwilligen, unsere Resul-
tate schädlich werden.
Graph. Gallicolana Hydr. habe ich die als zweifelhaft
Ihnen übersendete Art genannt. Ihre Raupe ist von der, von
Ihnen bei Treitschke beschriebenen verschieden u. sind
lebt selbe stets in Gallä Salicis caprea. Obige ist wahrscheinlich Ephippana
Gel. Naeviferella Z. (Atriplicella Hydr olim) Treitschke dessen nicht das
Fisch III. ≠ Nº XVI. tab. V. hierher gehört, da nicht die gegebene
Hydr gegebene Beschreibung der verschiedenen Raupe gut
passt, sondern auf die Abbildung erkennbar ist.
Elach. Heydeniella. Fisch. (Fastuosella Hydr) Meinen Dank wegen
dem Namen. Mittheilung Ihrer Naturgeschichte
wäre sehr erwünscht.

365

367

1439 Terrella Hb. Passt hier nicht. Terrella W.V. wahrsch. Schiff.'
sabul. wie Treitschke seine Hyperythrella Hb. citiren
42 Argyracanthella Mo. Man würde sie hier suchen, wenn Dorsella
auch

Elach.
Tin. Fulicella. Hydr. Ob diese die Cinerella Hb. ist kann wohl möglich sein
Erklärung fehlt
aber die Cinerella Treitschke scheint sie doch nicht zu sein.
Diese soll noch kleiner als Hermannella sein, weiss mit schwarz
grüngelben Fühlern, dunkelen Flügelwurz u. einem weissen
Querstrich auf den Innenrand stehend haben. Meine Art
ist selbst etwas grösser, die Fühler sind nicht weiss geringelt
die Flügelwurz ist nicht dunkler und der weisse Punct
auf den Flügeln ist meist zu einem fast halbmondförmigen Gestalt an, wird aber nie zu einem Querstrich
der den Innenrand berührt. Kann die Nennung
von Treitschke keinen Aufschluss geben
Elach. gegen Borkhausenella Zell
Tin. Borkhausenella. Hydr. Ich nenne diese Art zum Herrichella.
Tin. Aromatella. Göze. Ich glaube diesen Namen wieder unterdrücken zu
sollen, da Degeer die Motte welche Degeer abbildet
vielleicht sicher gehören mag, nicht aber die Raupe
samt ihrer Verwandlungsgeschichte. diese gehört zu
meiner centifoliella. Ich nenne jene Art nun
hyparticollella und gebe ihr zur richtigen Gattung (Ectrix)
die sich auf die ihr eigenthümliche Körperbildung, auch
von einer völlig fußlosen Raupe anbezieht.
Lithoc.
Tin. Schatzeyerella. da mir der Name nicht gefällt, so habe ich sie in Vernu
culatella umgenannt.
Nepl.
Tin. Argentipedella. Zell. (Scribaella Hydr, olim). — Maculella. Tr. wie Göze sie nicht
zu deuten, aber Maculella. Hüb. scheint mir eine der Argenti-
pedella und Centifoliella verschiedene Art mit silbergrauen
Nepl. Grundfarbe zu sein, die ich einigemal an Eichen fing.
Tin. Centifoliella Hydr. Habe ich in Menge aus der Raupe erzogen, die sich
in Rosenblättern lebt. Mir scheint keine Beschreibung von
Zeller, auf sie zu passen. Degeer und von Göze ihr Naturell ist
allerdings die Raupe dieser Art abgebildet u. beschrieben. Sie hat
bestimmt 12 Paar Bauchfüsse und 2 Afterfüsse, welche 2 Paar Vorderfüsse
repräsentiren. Diese Art ist der Typus meiner Gattung Nepticula
die ich aus Zweifel ob sie begründet bestehen wird. Adscella, Hübnerella,
Argyropeltella Schmidtella ꝛc gehören zu ihr.

150

Wien am 22ª März 1840.

Hochgeschätzter Freund!

Sie würden selbst urtheilen, wenn Sie auf meinem langen Stillschweigen glaubten, mein Herz wendete sich von Ihnen ab, wenn ich keine günstige Gelegenheit nicht ergriffe, Ihnen im Gegentheil meine Liebe und Freundschaft zu beweisen, wenn ich keine günstige Gelegenheit vorübergehen ließe, Ihnen Beweise meiner Theilnahme für die Microlepidopteren zu geben. Ich nehme also diese Gelegenheit, die sich mir darbietet, um Ihnen einige Nachrichten über diese Thiere mitzutheilen, die ich in meinen Excursionen gesammelt habe, und die mir theils neu, theils selbst beobachtet scheinen. Mit Freuden ergreife ich die Gelegenheit, mit Ihnen eine Correspondenz, wo möglich wissenschaftlichen Inhalts, anzuknüpfen, und bitte Sie, mir Ihre Ansichten über viele Gegenstände mitzutheilen, die mir seit meinem Hiersein dunkel geblieben sind. Ich habe bis jetzt mein ganzes Augenmerk auf die Naturgeschichte der Kleinschmetterlinge gerichtet, und habe mich bemüht, mir eine vollständige Sammlung anzulegen, um mich mit den Arten bekannt zu machen, und mich in den Stand zu setzen, eine weitläufigere Correspondenz anknüpfen zu können, und auch meine Sammlung, die mir auch in Microlepidopteren dem Museum in Dresden verkaufen. Jetzt arbeite ich mich gegenwärtig aus allen Kräften, um die Arten meiner Sammlung zu bestimmen. Ich habe jetzt mich nach einem, mir wissenschaftlichen Freunde, H. Zeller in Glogau, umgesehen, da ich meine Zeit nicht gerne mit Correspondiren verlieren will, und habe mich auch mit ihm in Correspondenz gesetzt, und ihm meine Sammlung zur Bestimmung übergeben. Ich habe jetzt noch einen, mir wissenschaftlichen Freund, H. Zeller in Glogau, gefunden, der sich meine Zeit gerne mit Mittheilungen und Correspondiren, und mir se

Wien am 28ª März 1840.

150

Hochgeschätzter Herr!

Sie würden selbst urtheilen, wenn Sie mein langes Stillschweigen glauben wollten, als sey mir Ihr werthes Schreiben vom 27 Jenner v. J. und die damit verbundene Sendung nicht angenehm gewesen. Ich kann im Gegentheil versichern, daß mir beides gleichen Antheil verursachte, um so mehr da ich die Microlepidopteren so sehr angenommen, und sie gründlich, wenigstens in ihren ersten Ständen (nicht der farbigen Natur-stellung nach Meydas Systematisiren, oder Bilder-Bücherey) beobachtet finde. Solche Forscher sind jetzt so selten, daß Ihr Brief, statt der farbigen Natur-stellung mit Meydas Systematisiren, oder Bilder-Bücherey, fast alle Correspondenz aufgegeben habe, und mit mehrere nun mit den Lepidopteln, wie ich selbst beobachte. Mit Staudinger wegen alte, der Sache einer Correspondenz, wo mehrere wissenschaftliche Belehrung und Mittheilung entstehen. Mein Freund H. v. Fischer nimmt sich viele Mühe jetzt mein ganzes Gefühlte im Museum der Naturkunde; allein oft wie: derholte Bemühungen kommen so spät, daß es, um sich Einigen nicht gefällig und so den nächsten Frühjahrs Correspondenz entbehren müßte, und auch seine Sammlung, die nun auch in Microlepid. bestand, an das Museum in Dresden verkaufte. Jetzt endlich ist mir gelegentlich von ihm Einige Briefe mit Verschiedenen über: geben, so daß Einiges Licht etwas zu Ihnen zu verschaffen. Ich habe jetzt nun noch einen, sehr wissenschaftlichen Freund, H. Zeller in Glogau, mit dem ich lebhafte viel correspondire, aber ein Ihnen Dienst verschaffende Verständlichung Ihnen anbieten. Auch selber in Gebiete der Microlepid. unendlich wichtigen in der Isis wie Entwurf der Tineen, und sonstige Aufsätze über Bremmüller Degeers Werke in derselben Zeitschrift. Zeller, der seine andern Zeit so genau schätzte, und schonte Arbeiten darselben verwendete, so sehr lange nicht zu Verständlichung derselben zu bewegen. Nun es aber steht, daß Ohen sehr schätzt günstig aufnimmt, und sich seine Arbeiten dagegen schätzt (wenn, wie der jetzt Entwurf, selbst Briefe mit Hrn. Hofrath Herrich-Schäffer in Ihnen Fauna) Ihnen sein viel von ihm verwenden. In der Isis nicht bekannt, als Brief selbst manigfach seine Anstrengung; deshalb möchte ich die Bitten, sie nicht zu versäumen, die Jahrgang 1838 u. 1839 der Isis zu lesen, wo die meisten der Lepidopteren, mehr meist gedrungene Aufsätze von Dr Speyer über Lepidopteren finden werden.

Da ich in Nürnberg ganz isolirt lebte, und weit und breit keine verwandte Seele fand, so lag in der Absendung mein Wunsch zugleich mit der Grund, für eine Menge Lepidopterenlagen zu finden, mit denen ich mich zu vergnügen anfangen wollte, und wo denen ich Unterhaltung für mein Werk hoffte. Ich finge nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß sich seine in den ganzen Rhein mehr nicht eine einzigen wissenschaftlichen Lepidopterenlage befindet; seine, wo abwechselt Schriftsteller, Denis, Mazzola, Padenin, Gradisch, Goldegg, und noch viele Andere, Namen meiner Freunde nennen. Wie, werden Sie fragen, ist Freitschke möglich? Nein, diese Namen müssen sein Werk begleiten nun und Verwandten Ostindischen und portugiesischen Notizen; die es sich vielfältig Einzigen, sonst wenig, daß ganze Werk zu unternehmen. Ich selbst gesinde unter seinen Anhaben, einen gewissen Zeit über Zeit mit Mittheilungen und Entdeckungen, und glaubte meine Sammlung, um und sonst nie selbst zu erhalten, wäre aber in der Hoffnung sehr getäuscht, denn meine Forschungen und mit meinen Kosten meine Freiheit alle, wenigstens meistens, nach seinen Schriften, und Stand sind gewiß sehr Honorar für ist selbstlosen Lagen, wie es ob mich jetzt wieder und den naturhist. Bildersaale, (seinen Übersetzungen Fabricius) steht, selbst sind. Goldegg wenn und ist noch die Freitschke seinen naturgeschichtlichen, den meinen Wissenschaft und selben Physikalik ganz anbefreundet Werke.

Nimt man jedoch an, daß ab in damaligen Zeit keine Menschen gab, welche es wagte, die Lepidopteren in ein geordnetes System zu bringen, so kann man auch annehmen, daß es das Wissenschaft einen Dienst leistete, und ist klüger dazu, daß es auch seinen Landsmänner viel leistete. Es fällt aber immerhin noch leichter keinen weder es für jenen mit den Systemen anderer Classificateurs bekannt gemacht, die einzelnen Theile seines zu classificirenden Thieres kennen gelernt, und da sind auch klüger geworden, wie man nach seinem Tode nicht allein nach Raum und Ansehen, ein System bilden müßte. Ich weiß wieder classisch genug, daß es gewiß, wenn man ein Gebäude beschreibt, was nicht übrig bleiben wird, aufgeräumt, als ganz überein das in Augenschein genommen. Aber jetzt Wissen ist ihm fast noch fremd. Daher, und weil es lange Zeit in diesen Sache nicht mehr Bekannschaft unbrauchbar, kennt es nicht, daß es nicht anders, die es selbst beschreiben soll, jetzt mit mehr Raum, und wie jetzige Gewalten manches Genaue von Microlepid. für Augen mir nicht allzu Unbekanntschaft, Ekel und Augenmüdigkeit. Es ist übrigens sehr unglaublich, wie gut bei so Belehrung verschaffen wollen. Es werden Augenfleiß finden, daß es mir genug nicht das geringe über Mitzen bringen kann, und es mehr, denn das Abhandlungen über Microlepid. ganz schwierig, schwer aufgefaßt wie weil es dazu gänzlich geblieben ist, und es fehlt für mir, daß es Augen, die ich in meinem Stube zu geben ist gewöhnlich hin, in einem müßigen Raum versteckt sind. Viele Augen müssen sich aber besonders dazu die von mir Unternommene mein Augenlicht der alten Schriftsteller Microlepidopteren, gleich verwenden, da es genug sein Augenzeichen Licht geschrieben soll, und es kann nicht mehr bleiben, daß es wenigstens im Kinder, mein Feind wird. Ich will aber, so lange es mir, möglichst das Wissenschaft möglich ist, sein Freund bleiben, und dazu bitte ich sie, daß sie ihre Augen, als andere mein Augen gesagt, zu behandeln.

Walker, Zuzgeber der Abtheilung der Insekten im B.M. Museum (welchen meine Ansichten über Linnéische ganz richtig findet, und dem es, sehr gezwungen, die meisten Diagnosen seiner Werke) gestalt selbst, zu wenig Lepidopterologe zu sein, als mir möglich wären zu Linnaeus, da es mir sehr selten Lepidopterologe etwas ist. Es giebt mir genau in Facsimile alles zu geben, allein gerade die Lepidopteren, und hinderlich nach meiner die Microlepidopt. sind nach der sichtbar Anordnung, und so verschieden, daß ihren Familien gleich mit Thieren möglichst verbinden ist. Nun die Schriftsteller, Microlepid. sind unmöglich geblieben, weil man sie, als ganz klein, und diese nicht mehr mögend, in eine Linnéische Familie gesetzt hatte, wo sie seit vielen Jahren Niemand mehr beachtete. Ich habe sie mit vielem Fleiß herausgezogen, es hält die Entschließung, sich Linnéen in mein Feld zu nehmen, wo ich sie mit der genauesten Augenmöglichkeit, dieser Wissenschaft über, mit Hübner, Fabricius, Charpentier, Linken, Treitschke etc. ganz sorgfältig möglich, ungefähren Farben entdeckte, und meine Aufsicht der damaligen genau niederschrieb. Ich bin es aber an der Abtheilung dieser Natur bekannt, und wünsche sie selbst bekannt machen, wenn mich nach eine genaue Beschreibung mit Linné, Fabricius, Ochsenheimer, Hübner, Treitschke etc. nöthig wäre. Einige gefährlich aber, daß man der Entdeckungen Sprache vollkommen möglich ist, ist aber darin nur die Übungen hier, und daß man Zeit seiner Zeit sich. Ich kann meine Notizen in keine besseren Hände, als sie, meinen Freund Zeller ~~[illegible]~~ geben, und sollte es mir nicht für der Veröffentlichung nicht entziehen.

Prof. Reininger, ein Gefährte Schiffermüllers, Mazzolati, Haldegg's etc., mich am Gefangenen, sah damit an allen von 76 Jahren, sein Gedächtniß ist schwach geworden, und dazu ist es wenig zu benützen. Alle übrigen sind meine Leiter Lehrer und wenigstens mit der Namen Lepidopterologen, es war mir jedoch zum Theil meinen Malern, Mann, erkennen, welches in der Wissenschaft viel weiter vorgerückt sein würde, wenn es nicht, die Leben zu kennen, seine Zeit mit der Malerei meinen Charakter, und mit dem Fange von Micro Lepidopteren, womit es Handel treibt, zu bringen.

Jetzt bleibt mir noch einer meiner Freunde, Ernst v. Heyden in Mödling, 2 Stunden von Wien, zu besuchen übrig. Ein noch rüstiger Jüngling von circa 56 Jahren, und so viel, daß es wenigstens ein Jungen leben kann. Zwar fünfzig sind, aber seit 10 Jahren wenig und selten, weil es sich ganz der Malerei gewidmet. Sein Fach, seine Einnahme, sein Quartier, Tag seine ganze Umgebung ist mir für Entomologen wie gemacht. Es stimmt selbst Insekten auf alten Sammlungen, und sah einen solchen Fleiß, daß Einzelne über die nöthige finden. Alles bringt es ein, und erzieht es bis zum Vollkommenheit, bildet jeden Raum ab, und beschreibt, leidet nie zu klein, daß Mühsige. Bei der Masse von Insekten in allen Räumen, da es unübersehbar ist es ganz natürlich, daß viel verwandt, manches falsch untergebracht bleibt und auch manches Falsche sich eingeschlichen. Heyden ist Empiriker im vollsten Sinne des Wortes, aber zugleich auch ein abgesagter Feind des Systems.

Mühl man jedoch an, daß es damaligen Zeit keine Maschine gab, welche es mögl. die Lepidopteren in möglichst kleinen zu bringen, so kann man auch annehmen, daß an das Präparat meinen Preis [illegible] und ist klein Wunder, daß es nach seinem Tode nicht viel kosten. Es hätte aber immerhin noch keine Kosten Raum, wenn es sich darum mit den Präparaten anderen Sammlungen bekannt gemacht, die einzelnen Theile seiner zu klassifizierenden Thiere kennen gelernt, und so das Auf Weise förderlich hätte, wie man nach seinen Sammlungen, die nicht nur allein nach Form und Farben, sondern Bilder mußte. Sein Werk würde klassisch geworden sein, wenigstens es geworden, wenn nicht ein Schicksal dazwischen, was nicht vorherzusehen war, ganz unbekannt, das es Vorgesetzten ganzen. Aber jenes Schicksal ist ihm sehr nah gewesen. Dieser, und weil es lange Zeit in seinem Leben nicht mehr Lebensmittel verbreitet, kam es nicht, daß es sehr arbeiten, die es selbst dazu beitragen sollen, jetzt nicht mehr kannt, und was sagen gewissen manches Gemeine von Microlepid. zur Kenntnis gehörig, selbst nicht vorhanden, selbst auf Lager verbreitet. Es ist überzeugt sehr zufällig gegen selbst, die sich bei so Belehrung verschaffen wollen. Es wurde begreiflich finden, daß es nicht genug mit der ganzen Masse seiner Bücher kennen, um es mehr, denn die Entdeckungen über Microlepid. ganz schwierig, schwierig anfangend, wie weit es darin gekommen ist, und es scheint sich mir, daß es Recht, sie ist in meinem Werke zu geben sehr geneigt bin, in einem wichtigen Theil vorhanden sind. Viele Recht müssen sich aber, besonders daß sie von mir Entdeckungen neue Gesichtspunkte der alten Schriftsammlungen Microlepidopteren, selbst verschwinden, da es gerade seine Entdeckungen selbst gefunden sein, und es kann nicht nicht bleiben, daß es, wenigstens im Recht, mein Feind wird. Ich will aber, so lange es mir, Entdeckungen sind das Möglichste möglich ist, sein Freund bleiben, und daran bitte ich sie, daß man sich Entdeckungen, als Entdeckungen meine Augen gesetzt, zu bekennen.

Keller, Inspektor der Abtheilung der Insekten im k. k. Museum (welchen meine Ansichten über Entdeckungen ganz richtig finden, und dem es, falls gezwungen, die wichtigen Diagnosen seiner Neuheit vorgeschlagen) gestalt selbst, zu meiner Lepidopterologie zu sein, als mir möglich werden zu können, da es wichtigen selbst Lepidopterologie selbst ist. Es stellt mir gnaden in Aussicht, allein gerade die Lepidoptera, und sämmtlichen nach meine die Microlepidopteren sind nach in den höchsten Anordnung, und so vorzüglich, daß ihren Sammlungen selbst mit Hymenopteren verbunden ist. Nun die Schriftsammlung Microlepid. sind Entdeckungen selbst gebildet, weil man sich, als gerade, und daran müßt meine Entdeckungen, in seine Bücher gestellt sollte, wenn sich selbst vielen Fachmann Niemand meine bedeutete. Ich habe sie mit Hilfe Entdeckungen, es selbst die Entdeckungen, diese Entdeckungen in mein Recht zu nehmen, wo ich sie mit der größten Sorgfältigkeit, dieser Winken über, mit Hübner, Illiger, Charpentier, Zinken, Treitschke etc. glaubhaft vorgelegt, Entdeckungen, Entdeckungen entdeckte, und meine Ansichten darüber genau niedergeschrieben. Ich bin es aber an der Entdeckungen dieser Notizen bestätigt, und würde sie selbst bekannt machen, wenn nicht auf eine genaue Vergleichung mit Linné, Fabricius, Illiger, Latreille, Hoffmannsegg etc. nöthig wären. Einige gefunden aber, daß einen der Entdeckungen Synonyme vollkommen möglich ist, ist aber darin nicht zu Entdeckungen bin, und daß man Zweifel seiner Entdeckungen ist. Ich kann meine Notizen in keine bessere Hände, als die, meinen [illegible] Entdeckungen gehören, und hoffe, es wird sie der Veröffentlichung nicht entziehen.

Prof. Reininger, ein Entdeckungen Schriftsammler, Mazzolati, Goldegg's etc., mich an Entdeckungen, sind beinahe an allen von 76 Jahren, sein Entdeckungen ist schwarz geworden, und daher ist es wenig zu benützen. Alle übrigen sind meine Leiden. Schmidt und verschiedene nicht der Namen Lepidopterologen, es war ich gerade zum Theil meinen Notizen, Mann, anbetreffend, welchen in den Wissenschaft viel weiden verzeichnete sein würde, möchte es nicht, um leben zu können, sein Zeit mit den Notizen meiner abzeichnen, und mit dem Fange von Micro Lepidoptera, womit es Handel treibt, zu bringen.

Zuletzt bleibt mir noch einen meinen Freund, Ernst v. Heyden in Mödling, 2 Stunden von Wien, zu besuchen, der übrig. Es war ein trüber Junggeselle von circa 36 Jahren, und so nicht, daß es wenigstens den Augen leben kann. Seine Augen schwach, aber seit 10 Jahren einzig und allein, wodurch es sich ganz den Notizen, geschildert. Sein Zweck, seine Hinneigung, sein Streben, Ehrgeiz seiner strenge Anordnung zu einen seiner Entdeckungen eine: gewinnt. Es sammelt Insekten mit allen Bedingungen, und hat einen seltenen Fleiß, das Entdeckungen über sie aufzufinden. Alles bezieht es ein, und verzieht es bis zur Vollkommenheit, bittet jeden Freund ab, und beschreibt, bildet sie zu Ehre, das Möglichste. Bei den Menge von Insekten in allen Ordnungen, die es anbetrachtet ist es ganz natürlich, daß viel verwandt, manchmal falsch untergebracht bleibt und auch manches Insekt nicht erkannt. Heyden ist Empiriker im vollsten Sinne des Wortes, aber zugleich auch ein abgesagter Feind der Systeme.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Reaumur, Leyer, Rösel, Frisch etc. sind seine Männer, es will, man soll nun Naturgeschichte
seine Lieblings Lust bekannt sein wird, fällt es ihr Verfassung einen Bestand für zeitgemäß
Leute Naturalien, Bäume und ganze Reisen sind ihm selbst gewiesen. Er hat dafür
eine ausserordentliche Neigung, aber auch ein sehr gutes Gedächtniß. Der seinen Abbildungen
gegen 1000 verschiedene Insekten-arten Lieferungsweise und in Kästen stehen, nicht zum Theil
noch liegt in seinem großen Saale und Nebenzimmer, wie die Schränken beweisen; sie nur
die Milbe Farbe giebt. Niemand findet sich, der zu diesen, absolutely vollständigen und
der Text verfasst, wozu Zeuge selbst nicht genügend ist; denn Niemand mag um diesen oft
Menschen, stille sein. Ich selbst bin oft froh, wenn ich ihn wieder verlassen kann, und bedaure
nicht Lepidopterische Unterhaltungen vorgenommen, aber von ihm über ingend eine Naturgeschichte
oder a Goldfuß Jahrbuch und besser Sammlung (denn Goldfuß ist nicht) einmal nach Bücken
aber Niemand ist.

Somit habe ich Ihnen den ganz kleinen Kreis meines Freunde geschildert, und da kann
Ihnen, wenn wir die Gewinnung einmal machen, glaub gesinnten, mit Liebe in bewegten Kreise
Freiheit willkommen sein muß, um gewiß, da ich meine Lage, da seit meinem Übersiedeln
gewonnen war, seit Jänner einmal verbessert sei, und Hoffnung giebt, mich noch
langsame befriedigen zu können.

Ich lebe mit einem Gehalte, welcher einen Kompagnie nicht voll haben hört, kann
meinen Anteil mit in Langjährigen Reisen sparen. Durch den Tod einer Tochter seiner
einer gewerblichen Fabrik mit Baumwollen, war mein disponibles Vermögen gestiegen
Thaler, da wegen der Baumwollen nicht vermindert werden konnte, stand mich im Stande
glaub gewonnenen Abstieg beizutreten, und ist nun gewöhnlich, die Fabrication mit bedeutend
stellen. Der nicht ganz unglücklich zu sein, übernahm ich eine andere kleine Fabrik, aber
meinem ältesten, wegen schlechten Lohn mit genug Beschäftigung, und Mittel, meine übrigen
lieben jüngeren Kinder (ich habe deren neun, wovon eine Tochter verheirathet ist) zu erziehen
einigel Jahre, kaufte ich noch eine kleine Fabrik, welche einen größeren Absatz
verschiedenen mit seinem Zeit, die jetzt wirklich blühende Dampfmaschine wurden in der
wurden Männer. Bei diesen Anlagen ging mir in den Jahren 1837, 38 und zum Theil
Excursionen und anderen entomologischen Arbeiten. Eigentlich bedauerte ich den Excursionen
Mann brauche Geld so viel Anregungen, daß ich mich mit den Beschäftigungen und Arbeiten
oft ganzen unterhalte, als ob meine Lage günstig. Ich vermisste aber ungern die eigen
zu den Käferjagen im Zelter und Fischer, und zu Arbeiten für mein Museum, nun ist
mir übrige Zeit, gezogen wurden, und ich bezweifle nicht, mir ich damals so gesund,
Preußen nun, dabei geblieben bin. Da ich bereits 53 Jahre zähle, so muß ich
Mann nicht mehr Liebe zu mir mit Freuden gezogen, aber sollte es einen mehr
um sich und seine Familie zu erhalten, so hätte ich nicht die Verbindung meiner Abteilung
die Auslagen für Insekt Arbeit übersteigen meine Kräfte. Ich kaufe gegen meinen Willen
neben Anderen 200 Fr. monatlich. In dem neuen Lehrjahr mir 104 wöchentlich abgezahlt. Ich
gab und berechnete den Theil nach 150 Fr. da ich mit der Zeit abgezahlen sollte. Nach
mir 33⅓ percent, stellt der übrigen 50, allein stellt den wenigstens jährl. abschlüsse wa
als ich zu meinem Gelde gelangen, das übersteigt noch in Gold, zu seiner Course bezahlt wa
Thaler, wo ich eine Tasse kaufte, zahle ich 1200 Fr. Thaler mehr. Einkommen genug, um die
Freyer sind mir damit gebrochen, dass es ihm aber so gut, und dass er mir einige 80 Thaler
Jahr. Um seinen so genauen Verlusten vorzubeugen habe ich seit dem 12ten Juli
will lieber den ersten Verlust von 70 Fr. jeden Tages erleiden, als spekulieren so viel
dann es müsste nach den jetzigen Einrichtungen, schwerlich der Fall sein, dass bei meinem
abgezahlt würde, und was weniger nach meinem Tode, wo der Absatz stärker nicht fortgesetzt
der Arbeiten haben müsste, so hoffe ich, wenn 125 Fr. abgezahlt
Leben andere Verluste erleiden, als die Interessen für die Auslagen und meine Arbeit
diese Ostern musste aufgegeben, und zum 16ten verfasste ich schon den Tagl.

Beaumar, Boyer, Rösel, Tieck etc. sind seine Männer; er will, man soll nur Naturgeschichten studiren, und erst dann, wenn diese alle bekannt sein wird, soll an die Verfassung einer Physiomie für zweckmäßig. Er ist sehr fest in seinen Urtheilen und so gleichgültig, daß wenn sie schon Jahrfalle nicht bestimmen. Er sei dann wenig, aber gar nie unterrichtlich. Räume und Lage sind ihm selbst gewissen. Im naturhistorischen Verhältnisse sei er nie ausschweifend, aber auch nie sehr genau. Von seinen Abbildungen sei es bereits gegen 1000 verschiedene Individuen verfertigt und in Büchse stehen, meist zum Theil colorirt, aber alle liegt in seinem großen Saale durcheinander, wie die Individuen kommen, die es übernommen hatte, und so Mühe Jahre braucht. Niemand findet sich, der zu sehen, allerdings vielleicht und wenig selten Gelehrte besucht, wenn Fremde, selbst sein. Ich selbst bin oft sehr wenig Raum, und bestimme ihn nun, wenn ich mich Lieferungen übernehmen, aber sonst über irgend eine Naturgeschichte Auskunft zu haben, oder in Baldinger Journalen und besser Sammlung (seinen Besitzen er ist) einmal nachzusehen habe, nicht gestimmt oft. Immer oft.

Somit habe ich Ihnen den ganz kleinen Kreis meiner Freunde geschildert, und Sie können nach Ihrem Herz, wenn sie Ihre Neigung einmal nahen, gleich gestimmten, mit Liebe in Ihrer Nähe anbrechenden Freunde suchen willkommen sein muß, um Ihnen, so viel meine Lage, so viel meine Übersiedlung mich Ihnen Freiheit gestatten mag, viel Vergnügen einmal verschafft sei, und Hoffnung giebt, mich nun noch mit meinem Hinscheiden beschäftigen zu können.

Ich trat mit einem Geschäfte, welches einen Compagnon nicht nach Leben hielt, Kunde aber oben deshalb einen Antheil mit in Langjährigen Kontrakt standen. Dieses war eine Handlung seiner Fabrik mit Baumwollenwaaren, war mein Vorgänger gestorben. Die Fabrikation Waaren, die vorgedachte Baumwollenwaaren mußte vermindert werden konnte, stand nicht im Verhältnisse zu dem ehemaligen Plan gegen einen Absatz bestanden, und es war gewöhnlich, die Fabrication mit der bedeutenden Verlusten einzuschränken. Ich mußte ganz entschieden zu sein, übernahm ich eine mittlere kleine Fabrik, aber nicht diese gab mir meinem Alleinigen, vorzüglichen Fonds mich ganz beschäftigen, und Mittel, meine übrigen noch im Hause befindlichen jüdischen Kinder (ich habe deren neun, wovon einen Knaben verheirathet ist) zu ernähren. Ein Schicksal, wenigst Fonds, kaufte ich nun eine kleine Fabrik, welche einen geschickten Arbeiterstamm fertigte, und vorbei vorzüglich viel seiner Zeit, die jetzt wirklich gekaufte Dampfmaschine wurden in Anwendung wird gebracht werden können. Bei diesen Umgang ging mir in den Jahren 1837, 38 und zum Theil noch 39 alle Lust zu Excursionen und anderen entomologischen Arbeiten. Eigentlich schädlich ist dem Excursiren nicht, denn mein Metier kann manche Stelle so viel Mannigfaltigkeit, daß ich mich bei den Bestimmungen und Vergleichungen abzuhalten selbst genug entschädigt, als ob meine Lage günstiger. Ich vermisste aber einigen die eigenen Beobachtungen. Zu den Insecten an Teller und Tischen, und zu arbeiten für mein Werk umgeben nun ist genug Materie, die einzige mir übrige Zeit, vorgefaßt werden, und ich bezweifle nicht, wie ich immer so gesund, und gesunden, als ich es heute war, dabei gedenken bin. Ich bin bereits 53 Jahre zählt, so war ich diese Anstrengung sehr genug. Wenn Gott mich mit Liebe zu mir mit seinen ganzen, aber falls es eine andere Beschäftigung finden könnte für sich und seine Familie zu verlassen, so hätte ich mich die Realisirung meiner Abbildungen aufgegeben, denn die Auslagen für Papier, Druck übersteigen meine Kräfte. Es kostet ganz meinen Willen, und nun auf das Jahr werden Andeutungen 200 Fr. auflagen, davon werden die jetzt mir 104 wirklich abgezahlt. Ich habe die Arbeiten gut, und brauchte den Plan nach 150 Fr. da ich mir die Zeit abzuschätzen suchte. Mein Einkommen Lüngstzeit mir 33⅓ percent, statt den üblichen 30, allein statt den vorgedachten jährlich Abschlüsse wurden statt 12 Jahren, also ich zu meinem Gelde gelangen, das übrigens noch in Gold, zu seinem Course bezahlt wird. In vorgenommenen Jahren, wo ich eine Tafel liefere, legte ich 1200 Fr. Auf mich. Manchmal genug, um die Tafel anzufertigen. Fr. Teyger sah mir damit gebräuchet, daß ich sie aber so gut, und daß mir mir einige 80 Abnehmer mich stark haben. Um seinen so genauen Verlust vorzubeugen legte ich seit den 12½ Tafeln nun 130 Fr. auflagen, und will lieber den ersten Verlust von 70 Fr. jeden Tafel erleiden, als fortwährend so viel Übrigbleib für zu legen. Dann ist nämlich, nach den jetzigen Einrichtungen, schwierig der Fall sein, daß bei meinen Lebzeiten alle 130 Fr. abgezahlt würden, und nach wenigen nach meinem Tode, wo das Werk selber nicht fortgesetzt werden wird. Ein Rabatten haben mich etwas am Preise verlassen, so daß ich, wenn 126 Fr. abgezahlt würden, jetzt keinen weiteren Verlust erleide, all die Interessen für die Auslagen und meine Mühe. Das 13te Heft wird mich Ostern wieder vorgeben, und zum 16ten verspreche ich so haben den Tafel.

Diese gütige Sendung, die zugleich auch ein schönes Andenken für mich ist, hat mir viel Freude gemacht. Die beiliegenden Bemerkungen werden Ihnen zeigen, daß ich alles sorgfältig durchgesehen habe. Ich benutze die Gelegenheit, wo der Herr Graf Stolberg dorthin geht, daß selbe bey Ihnen ankommen, weil sonst leicht Anstand entstehen könnte, wenn selbe durch die Post gehen sollten. Es thut mir sehr leid, daß ich nur die von Ihnen gewünschten Arten nur wenige abzählen kann; denn seit 1836 ist diese einzige mir bekannte Sammlung in Frankfurt abgegangen, aber nicht viel wieder hier angekauft worden. Nur von Microlepidopteren einige Tabellen gab es, die ich alle Tausch vorhabe hinzufüge, so Manches ich in meinem Handel brauche verwendet hatte. Es wäre mir, wie Ihnen wie Ihnen beizulegen, mit der Bemerkung, daß sie aber nicht alle vorräthig ist, jedoch in Verlauf der Sammlung gebracht werden könne. Meine Namen ist rein und gut geschrieben, gleich der Etiquettenmanuskripten, die beifügen sind wichtig, da ich jede Sendung von Abgang genau führe. Selbige Bücher ganz nicht finden, von Ihnen abermal zu bestellen, so wende ich mich nun allein die Namen hinzufügen genau, sondern auch Ihnen auf meine Bemerkungen über Übrigen und Art, über die Namen und Synonymie der Art, Lücke allen Mängeln, wie ich in meiner fertigen Sendung geschrieben, beifügen.

Wenn mir Lieb, in meiner Bearbeitung sich einiges zu finden, und ich für die benützten gleichfalls, wenigstens in den Namen und sonstigen Bemerkungen wegen. Da ich in diesem, Lepidopteren Namen wieder zu pflanzen und zu ziehen selbst darf, so wird mich sehr manches, vielleicht auch von den gewünschten Arten finden, und ich Ihnen mittheilen kann. Wenn könnte ich mehr Ihnen solche Arten mittheilen, da ich von Ihnen die gewünschten Tabellen erwarten darf? Da mir bis zu Zeller's Tinea Lederer, in den Text, kein vollständiges Werk über Tabellen Microlepidopteren besitzen, so ist es ganz unthunlich, daß viele Arten finden vielleicht Namen bestehen, wie bisher auch Ihre Sendung so viele bezeichnet. Einzelne bisher wenige mögen die neuesten sind auf eine große Anzahl mit anderen Namen, als wie sie finden, bezeichnet. Es ist daher sehr Zeit, daß in Kürze zu Namen kommt, möglich, alle Tabellen Arten aufzählt, aber auch Abgrenzung ist, daß man Gattungen und Arten leicht und nach Thatsachen Übersicht gefunden werden. Für den Fang Abraham besitze ich Mehr Hoffnung, aber ob auch nicht nach nicht so daß aber genommen Aufgabe bringen. Nach Zeller's Tinea in der Text wenig mehr sehr viel Leichten zu bestimmen, ist es aber nicht wie nach der Lederer, dann hoffentlich eine vollständige genaue Bearbeitung, so wie eine Abhilfe von den Mühlbauer, folgen wird. Die sehr gelungene Bearbeitung der Pyraliden in 1834 Heft und einige Abtheil der Tineen in 1835 Hefte des Fauna Jaegers (Herrich-Schäffer) zeigt von seinem, in der Systematik viel bewanderten Manne, welches überall Gutes bringen könnte, wenn seine Hefte nicht das Gepräge einer Fabrikarbeit, mit ungünstigen Farben, hätte. Ich hoffe, wie es mir selbst geschieht, daß Manche die angefangene vollenden, an denen sie nur Lust Ruhe nehmen. Aber gerade bei der Systematik einzig muß die Natur zu Hilfe genommen werden, sie muß mit den künstlichen Schemen Hand in Hand gehen. Herrich-Schäffer vorzüglich, diesen Mühlen die Synonyma zu vollenden, wenn sie die Abbildung hätten, die an bei der Lepidopteren fand, übersichtigen haben würde. Es scheint aber, es ist noch nicht überall der Fang gekommen. Die Mühlen und Tineen sind welche selbstens an ein bestimmtes System als Zeller zu bringen gewesen, gleichen diese Einfassungen; da ihm aber nun sehr viele und sonst die minsten selbenen Arten fehlen, so hat er nicht für ihn zugeschriebenen über dem neuen Heft 3 oder 3½ Bogen (Band) abzuschließen, und ihre übersandt bei der Bearbeitung derselben dasselbst zu sein. Ich konnte Ihnen von allem beweisen, und selbst ihn mir Lieb noch die sie selbenen Arten zur Benützung und Einsichtnahme geschickt, wenn mir nicht Lebensmittel von ihm gemachten selbe, ja die Bestimmten gänzlich zu behalten, da überall die Übersicht der Arten mit Lupe und Microscop Lücke Abgabe entstehen, und bei der Tinea, mit welchen Flor- Ab. mittel kaum beides, nicht Übersicht hinzugefügt und gegen Realität entstehen können. Es ist also unthunlich, ohne ein ganzen Sachverstand diesen Bestimmen entgegen sehen, und vielleicht nur mehr sie Ihnen gehalten werden. Sie selben genügt einen ganzen Theil Verwandt in der Bestimmtheit abzugeben.

Meine Sammlung grösser Natur, die Noctua, habe ich von einigen Reisen in einer billigen Zeit, wie das gewöhnlich ist, vermehrt. Es thut mir Leid, sie selbst unbenützt und unangesehen abgeben zu lassen. Seit vielen Jahren waren mir stets Gattungen ganz fremd geworden. Ganz neue, von der Gegend, wo sie abstammt, gaben ich jetzt mich einen kleinen Theil sie; denn ich glaube, eine Lieblichkeit Lage zu Lämmer, daß meine Microlepidopteren Sammlung (die Tineen abgegangen), an Arten und Exemplaren, die jetzt bekannte Existenz ist, absolut ich sie mich in Jahren 1825 anlegte, da die mit den Linnäen selben stammende, ganz geschlossen war, indem mich Tausch-Exemplare abfinden, sie zu erlangen. Sie ist auch Zeitschrift genau und, dessen Namen gütigen Eigenthümer haben, die nicht dort verbrannten haben meine Zettel. Sie können nicht denken, daß jetzt mir

Ihre gütige Sendung, die zugleich auch ein schönes und angenehmes Geschenk für mich ist, hat mir viel Freude
verursacht. Ihre beifügenden Bemerkungen werden Ihnen zeigen, daß ich alles sorgfältig durchgesehen
und mir Ihre Anmerkungen bei jeder Art über Raupen, Puppen etc., daß selbe bey Verpackungen nicht
ab zu bleiben, gefürchtet aber schlecht gethan. Es dient mir auch sehr lieb, daß Sie mir die von Ihnen gewünschten
den alle wenige abzulassen falle; denn seit 1836 ist sehr vieles auf meiner Sammlung in Lemmingen abgegan-
gen, aber muß viel wieder sein ergänzt werden. Auch von Hübner mitgebrachten wenigen Doubletten gab ich,
ich allen Tausch vorbehalten wünschte, an Mann, da sie auch in gleichem Handel damit verwendet hatte. Es angenehm
ist, mir Ihren Verzeichniß seiner Doubletten beizulegen, mit der Bemerkung, daß sie aber nicht allzu wenig
ist, indem in Verlaufe der Sammlung gelegentlich manches kömmt. Seine Namen ist mir und gut genannt, ebenso die
Lokalnamen, die Bestimmungen sind richtig, da ich jede Sendung von Ihnen ganz genau. Selbst Ihre Bücher genügt finden,
um Ihre Namen überall zu bestätigen, so wende ich mich nicht nur allein die Namen hervorsuchen genau, sondern sehe Ihnen
auch auf Bemerkungen über Flugzeit und Art, über die Raupe und Verpuppung der Art, Lage alles Nöthige, mir gü-
tigen sendung geschieht, beifügen.

Wenn mir lieb, in meiner Sendung doch einiges zu finden, und ich sehe die bemerkten gleichfalls, wenigstens dem
Namen und sonstigen Bemerkungen wegen. Da ich in diesem Sommer wieder zu fangen und zu
ziehen hoffen darf, so wird sich noch manches, wünschte auch von den gewünschten Arten finden, und ich Ihnen
mittheilen kann. Wenn könnte ich mehr über Ihre Lebensart Ihnen Einiges über die gewünschten
Falter einiges mittheilen darf? Da mir bis zu Zeller's Raupe Lebensart, in der Isis, kein vollständiges
Werk über die Lebensart Microlepidopteren bekannt, so ist es ganz natürlich, daß viele Arten über ihre Lebensart
Namen bezeichnet, wie selbe mich Ihre Sendung so mich begnügt. Einige dieser Raupen mögen die mehrgenannte
auch eine ganze Anzahl mit anderen Namen, als wie sie sie finden, bezeichnen. Es ist daher sehr gut, daß ein Werk
zu Rande kömmt, welches, so möglich, alle bekannten Arten enthält, aber auch ebenso nöthig ist, daß man Gattungen
und Arten leicht und auch schnell Raupen aufzufinden vermag. Über die Puppe: Wenden beifügen ist sehr
schwierig, aber ob einige nicht auch nicht die so oder genauesten Aufmerksamkeiten. Nach Zeller's Raupe in der Isis war
es mir schon viel Leichter zu bestimmen, es ist aber nöthig mir auch die Lebensart, dann selbständig einen vollständi-
gen Raupenbeschreibung, so wie eine ähnliche von den Wicklern, folgen wird. Die schmetterlinge Raupenbeschreibung der
Pyraliden in 1831 Heft und einen Theil der Spanner im 1832 Hefte der Fauna Insecta (Herrich-Schäffer) zeigt von
einigen, in der Systematik viel verwandten Raupen, welche einen Gewinn leichten könnte, wenn seine Hefte nicht
bei sehr wenig einen schwierig-Arbeit, mit ungünstigen Aussichten, stünden. Ihre gabt, wie es mir selbst geschieht, die Rau-
penbeschreibungen möglichst, so können sie auch ganz leicht aufnehmen. Aber gerade bei den Systematik einigen müßte
die Natur zu Hilfe genommen werden, sie müßte mit den künstlichen Systemen Hand in Hand gehen.
Herrich-Schäffer versprach, diesen Mängel die Raupen zu vollenden, wenn er die Schmetterlinge beisammen, die zu bei
den Larven fand, übersehen haben würde. Es scheint aber, es ist noch nicht daran der Sorg gedacht. Die Wickler und Zünsler
Raupen selbst bekannt zu sein beschreibt Hübner alle Zeller zu diesen gedacht, selbst diese
Beschreibungen; da ihm aber eine sehr viele und sehr die meisten selbst Arten fehlten, so hat er nicht,
zu ihm zu gelangen über eine billigen Preis von seiner 3 oder 3½ Zoll zu Buch von) abzubrechen, und ihm
überhaupt bei der Beschreibung Raupen behilflich zu sein. Ich konnte Bücher von allem Interessen, und selbst
ihr an Bücher noch über ihr Falter Arten zur Vergleichung und Gründbestimmung gefallen, wenn mir nicht ein
Lokalnamen von ihr genauer fällt, ja die Bücher genau zu bestellen, so bald die Verschiedenheit Verhältnis
mit Lage und Microscopen Einst Rücken anbringen, und bis zu Ende, und selbst Flor- St. alles Neue beibehalten,
auch Neuerungen und Ihnen Resultate anbringen können. Es ist also sehr schwierig, allseits es mit einem
großen Sachverstand diesen Systemen anlegen sein, und vielleicht nun recht genau gefunden werden. Es fällt
genau einen großen Theil Neuheit in der Wissenschaft abzugeben.

Meine Sammlung großen Arten, die Noctua, habe ich von einigen Reisen um einen billigen Preis, wie sich
gemeinschaftlich ist, vermehrt. Es sind mir Duplo, die selbst unbenützt und unangerührt den Verkäufern mitgegeben
zu sehen. Seit vielen Jahren waren mir diese Gattungen ganz fremd geworden. Denn aber, von der Gegen-
wart an abwärts, habe ich jetzt mich um Einen Preis für; denn ich glaube ihre Vielheit sagen zu können,
daß meine Microlepidopteren Sammlung (die Spanner abgerechnet), an Arten und Exemplaren, die jetzt bekannte
Reichste ist, obsehen ich sie mich in Jahren 1825 anlegte, da die auf den Linnéischen Arten stammende, ganz geschlossen
war war, indem mich damals vorhandene abfüllten, sie zu ersetzen. Sicht nach Vorhandene genau das, dessen Namen
genau übereinstimmen haben, die nicht sind neu benannten haben meine Zettel. Sie können mich denken, daß jetzt mir

sie und wieder eine genaue Vignette geliefert hat, kann schon gezeigt haben ist es nicht gelungen
Seit 3 Jahren ist aber die Kraft der Letzteren so stark angewachsen, dass eine Einzelaufnahme
gegen das vorher einen Gattungen und Verbindlichkeit aber allen kann genügen
werden muss. Somit ist meine Sammlung so gut wie nicht ganz und
Arabis (ihm nächsten über Microlepidopt.) zu ordnen. Allein, Hoch befolgt ist die Tiere nach
ist auch Papendel, das in Hoch befolgt kann war, (bildern gestanden) Hoch hat mir die Tiere
ganz nicht gefallen, so hat sich ganz vielen, vielleicht das meiste, andere nachher müssen. Einzel
all das Vanillefalter, fast Imaginäre Arten, und ist sehr oft mit Copie auf Vanillefalter. Darin
die Pyraliden nach Pongés Tenea, 163 Hft; die Tenea nach Zeller's Lederarbeit über die Tiere, und nach
mit ihm gemachten Abänderungen; die Wicklen aber, wenn Zeller nicht das Lederarbeit legt
meinen eigenen Ansichten ordnen.

Über die Reihe der älteren Namen bin ich ganz mit Ihnen einverstanden; wo der
älteste entscheidet; soll der nächste älteste eingeführt werden. Ich notierte mir auch Verbesserungen
z. B. auf Linnaea, Linnella zu machen, wenn es wirklich eine Pflanze ist, finde aber Grund
gegen setzen, das Linnaea schreibt, mit dem Zusatze "ex errore". — Damit will mein Freund Z
sein, dann man meint, es sei der Namengeber an Linnella. Doch will er nicht abermals auf
finden anzusetzen, diese Arbeit darf es nicht, sondern weiter, so für Billig fällt. Aber
aber Damit, dass die gebräuchlichen Endungen, also, ella, ana zu beibehalten seien, da
endlich nicht Abänderungen auf auch an Infektionsendungen beschränkt, nicht mit
Gattungen Insekt gebräuchlich (der Hyblaeiden ist Vanillefalter) ein verschiedenes, ja ein ganz ge
Lepra einer Art derselben Namens, wie nicht in einem Genus, für nothwendig zu finden.
aufzulegen, unnöthigen Zwang, welches auch so lange gültig und nothwendig wenn, a
sondern Gattungen und Arten schon Namengeber für sie fallen. Jetzt aber, wo man
von einer Gattung spricht, dass wir sehr bald und sicher wissen, was eine Art gemeint, und wo
einzugehen, sicherstand gefällt, aber wie einer anderen verwechselt werden kann, ist es unnöthig
der Gattung aber so wie sie der Art, dem Gattungsnamen eingeordnet werden muss, so kann man
über den Gattungsnamen wird wohl nicht kommen (wie es Hyblaeiden anderen Insekten
gegeben Sprachgebrauch der Fall ist), und kann kann es ganz gleichgültig sein, wenn der Art
wiederkehrt, so wird sogar das Gattungsnamen und das Aufführen erleichtern, wenn es gerade
so wie ist, genügend ist, viele andere Namen müssen zu müssen (welche Arbeit und Essen ist ganz
kann, andern überlassen) wird die Schwierigkeit verkommen, passende Namen aufzufinden.
der Laie, wichtig klingende, mittelsprachliche und sprachwidrige Namen sind nicht schon zu
so der Zug zu kommen z. B. Tinipennella (Tinea oder Tinea-Tinea-Arten) ꝛc. Ich kann
machung des Namens Tortilla in Tortipennella tadeln, und doch Tin die Endung pennella nicht
Gattung Orais anwenden, und ist sehr dafür, sie wenden sich nicht mit Classenrecht
Verstehenden Namen beschäftigen. Hat ja schon Linné und Fabricius bei einigen, sprachlich
Leichtsinn gegeben, dass die Endung weglassen kann. Zeller hat über diesen ganzen
Fall einen recht schönen Aufsatz, ich glaube in einer Anmerkung der Beamer, gelesen
habe ich Nicht genügend, noch nicht ungenommen, weil ich in meiner Bande (bis 204 Seite)
Tortrices gelesen bleiben will. Auf diesen werden sich auf mehr meinen Namen
Hoffe, in den Lepidopterologie nicht, gerade in den schon alten Weltseite, aufgenommen wird.
den Namen folgen.

Ich will für diesmal enden, denke meine Ihnen mein Gesagtes
ein Bruchstück sein, wie es ist mich mit Ihnen unterhalten, und wie sehr ich wünsche
mit einem angenehmen Schreiben von Ihnen beehrt zu werden. Meine Augen
mir häufig mit Bleiben, und mache die Schriftstücke allein, ist Violet, wenn
über mich und meine Augen zu sagen nötig war, kann über klagbar ist. Mit Ihnen

sie und wieder eine genaue Diagnose festgestellt ist, kann schon gewiss sehr viel als vorläufig gestattet eingeschaltet. Seit 3 Jahren ist aber die Kraft der Linnéer so stark angewachsen, dass eine Einschaltung nicht mehr möglich, sondern sogar die vielen neuen Gattungen und Unbenennbarkeit aber allen einen grossen Besorgnisse vorgenommen werden muss. Sonach ist meine Forderung so gut wie nicht geschehen. Ich nenne Wallenst. [illegible] nach Pyrenäen (Schott) ist auch Pyrenäen, die im Harze schon kennt man, schlechter gestanden) Wallr. hat mir die Beschreibung beschrieben und gar nicht gefallen, so dass ich gar viele, vielleicht sehr weise, andere nennen würde. Reichenbach, nicht viel besser, die Synonyme nach Pauzer's Fauna, 163 Heft; die Tiere nach Zeller's Entwurf in den Isis, und nach denen in der Breslauer mit ihm gemachten Abänderungen, die Wirbler aber, wenn Zeller nicht den Entwurf sogar bis Jahr einzig meinen eigenen Ansichten nahmen.

Über die Rechte der ältesten Namen bin ich ganz mit Ihnen einverstanden; wo der einzelne Fall der älteste entscheidet; sei der nächste älteste einzubehalten. Ich erlaube mir nur Verbesserungen der alten Namen, z. B. auf Linnaeana, Linnella zu machen, wenn es wirklich eine Pflanze ist, sondern Gründe, den Namen bei Seite zu setzen, der Linnaeana schreibt, mit dem Zusatze "ex errore". — Damit will mein Freund Zeller nicht einverstanden sein; denn er meint, es sei der Namengeber an Linnella. Dieses thut es nicht allemann und Sinn, sondern Namen ist festzusetzen, diese Deutlichkeit besitzt es nicht, sondern will es für Einfluss stellt. Was meinen Sie dazu? aber Damit, dass die gebräuchlichen Endungen, als, ella, ana &c beibehalten werden sollen, bin ich und mit einander, welches nebst Abmilderungen auch auch so Substantivendungen beim Beibehalt, nicht mit Ihnen und allen Verfassern einen Sinn gebrauchen (der gegenwärtige ist Verschiedene) ein verstanden, ja mein ganzer Zweck so weit, dass Abweichungen beibehalten Namen, nicht in einem Genus, für nothwendig zu finden. Es ist beides ein dass unbedingter, unnöthiger Zwang, welches nach so lange gültig und nothwendig war, als wir keine nicht bestehende Gattungen und keine strengen Namengesetze für sie hatten. Jetzt aber, wo man sich so deutliche Begriffe von einer Gattung bildet, dass wir sehr bald auf einen Blick gewahr, und wo die Gattung niemals mehr einzuziehen; [illegible] gattet, aber mit einem anderen verwechselt werden kann, ist es unnöthig Zwang, dass nach den Namen der Gattung eben so, wie das der Art, dem Gattungsnamen eingeprägt werden muss, so sind wenn die Autoren nimmer über den Gattungsnamen wird wohl nahen können (wie es bei sehr vielen anderen Pflanzen-Benennungen schon lange und mit gewissen Regelmässigkeit der Fall ist), und dann kann es ganz gleichgültig sein, wenn der Autorname in jeden Gattungsnamen wieder [illegible] das Geschlecht und das Aufführen verändern, wenn es verstand genügt ist. Was so wie ist, genöthigt ist, viele andere Namen umsetzen zu müssen (welche Arbeit und Ihnen ist sorglich genau, wird mir kein Dank, anderen Übersetzer) wird die Schwierigkeit verkennen, verstand Namen aufzufinden. Und wie viele sonderbare, widersinnige, missklingende und schwerfällige Namen sind nicht schon zu Folge dieses Zwanges in den Tag gekommen z. B. Pimpinella (Sicilien oder Südeuropäische Arten) &c. Ich finde nicht, dass die Umänderung des Namens Petitta in Octopinnella tadeln, und dass die Endung pinnella nicht auch für Gattung Brauchen anwenden, und ist selbe dasselbe, so wenden sich mich auch mit Haworths und anderen Engländer und Schottländer Namen beschäftigen. Hat ja schon Linné und Fabricius bei einigen, sonderlich nicht vielen Arten, ein Beispiel gegeben, dass die Endung weglassen kann. Zeller hat über diesen ganzen Punkt in gedruckten Isis einen recht schönen Aufsatz, ich glaube in einer Anmerkung bei Braunia, geschrieben. Sein ganzer Werk habe ich noch nicht gesehen, noch nicht angeschafft, weil ich in meiner Bande (bis 204 Heft) dem mittelalterlichen Systeme getreu bleiben will. Auf diesen werden sich wohl mehrere Männer vereinigen können, wie einmal hoffe, in der Lepidopterologie wird, sonst schon alle Mehrheit, aufgenommen wird. Wenn müssen sonderlich den Raum schonen.

Ich will für diesmal enden, sonst müsste Ihnen mein Geplauder lästig fallen. Übrigens Ihnen ein Vergnügen sein, wie gerne ich mich mit Ihnen unterhalte, und wie sehr ich wünsche, recht bald wieder mit einem angenehmen Schreiben von Ihnen beehrt zu werden. Meine Adresse bleibt dieselbe solange wie bisher unverändert, und meine Gesundheitsverhältnisse erlauben, so Viele, wenigstens sonstigen Obsorgen über mich und meine Lage zu fassen völlig ruhig, dann über glücklich ist. Auf dasjenige muss viele man

[illegible] gemacht werden, da die Tauzeit bald beginnt, und in den Rüben-Zucht-Fabriken [illegible] Schmetterlinge unterrichten. So [illegible] sind in einem meiner Arbeitszimmer am Hemiptl. Pimpinellae L., die ich [illegible] einheimisch wünschte.

Mit Ihnen auf Bestand angestellt verbleibe ich mit der größten Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Fischer Edl. v Röslerstamm

N.S.

Ich vergaß, über die Art, wie die Ihre Schmetterlinge aufspießen, zu sprechen. Sie ist wie bekannt, dem ich selbst so Viele und einigen Andern sehr zu gebrauchende Kleinschmetterlinge. Die Methode ist ganz wasserklar, wenig [illegible] ist dann, weil man das Insekt mit der Lupe bequemer untersuchen kann. Ich stelle sie nicht [illegible] Sammlung eingestellt, nur ist sie nicht [illegible] auf die gewöhnliche Weise aufgespießt stellen, und dann wie [illegible] Methode nicht zu viele Zeit, mit der ich weitzer umgehen, vergeuden. Hauptsache, wie z.B. die Micro [illegible] besonders auf [illegible] Räumen, theils weil sie die meisten Sammler nicht so zu erhalten wünschen, theils weil es beim Fange nicht so viel Zeit verschwendet kann; dann wo mehrere Hundert Schmett. in einem Nachmittag gefangen werden, da ist die Methode auf nicht anwendbar. Ich würde mir aber dennoch bitten zu erfahren, wie die Ihre Fangmethode sehen, um die Schmetterl. so, wie die erhaltenen [illegible] Klima, ausgestreckt Flügeln mit etwas gespreizten meistens Seidenfäden [illegible] ziehen.

d. Verf.

Brandenb. d: 30 Sept. 1840.

Mittheilung einer Briefs von Schneider worin er vorschlägt, Fischer v. R. solle ihm einige Exemplare seiner Werke gratis geben, wofür dann versuchen wolle Exemplare mit französischen Text in Frankreich, England, Italien etc abzusetzen. F. möge ihm angeben welches der billigste Preis ist, wie er die color. Tafeln [illegible] abverlangen könne. Bailliere liefert übrigens das Heft billiger, als es in Deutschland kostet, für 4 fr. 50 c. Zuletzt Anfrage in der Isis war mir entgangen, da dies Heft seinen Original-Aufsatz enthielt. — Auf ich habe Reaumurs Beobachtungen seit unseren Jahren verfolgt, u. stimme fast immer Zeller bei; nächstens gebe ich einen kleinen Nachtrag, auch in der Isis. — Frager hat Reaumurs beschreib. richtig zu tadeln. Ich bin nicht einverstanden, mit Zeller die Endigungen ana, ella, [illegible] anzugeben. (Indessen Schutz, Endsilbe gegen Linné; [illegible] allgem. Gebrauch; Haworth u. Hübn. kommen kaum in Betracht, da namentlich der neueren Arten fast alle nur Varietäten sind.) Wünschte daß Haworth, ältere Namen zu verlassen. Einzelne nöthige Aenderungen (z.B. Linnella und Linneana) mögen immer geschehen, wenn es nöthig ist. — Von Zeller weiter in die Namen mit ella (u lit.) an. — Mit Endigung dat Autor-Namen bedenklich ist den Gebrauch der Franzosen, der mir der richtige scheint. Zum Theil in Parenthese. (Reg. Pruniella (Clerck) ebenso bei Hübnerianen z.B. Wien (Germar). — Gleiche Namen verschiedener Gattungen, da die Gattungen derselben noch nicht [illegible] sind. — pennella u. foliella in bestimmten Gattungen wenden ist nicht anzurathen, foliella nicht auffindbar. — Namen von [illegible] analoge [illegible] genommen, keine zweideutige Namen gegeben. — Linnes Barchelli. — Meiner Fortsetzung durch Klemens Synonyme werden [illegible] nachstens bekannt machen. Mehrere seiner gewöhnlichsten Arten sollen nächstens folgen.

Einlage an Hr. Mann, Bestellung von Microlepidopteren. Übersendung von Bemerkungen über die beiden wechselseitigen Sendungen ist erfolgt.

[illegible] Besorgungen genauer werden, da die Tauzeit bald beginnt, und in den Rüben-Zucht-Fabriken Schmetterlinge [illegible] Tinea antennella. So fing ich fast in einer meiner Arbeitsstuben am Hennfl. Pergamillac 2., die ich sie nicht unterscheiden wußte.

Übrigens Ihnen noch bestens empfohlen verbleibe ich mit der größten Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Fischer Edl. v Röslerstamm

N.S.

Ich vergaß, über die Art, wie die Ihrer Schmetterlinge aufgesteckt, zu sprechen. Sie ist wie bekannt, dem ich selbst u. Zeit einigen Andern ihre so zeitraubende Klebmethode. Die Methode ist ganz mechanisch, wenig ist dazu, weil man das Insekt mit den Füßen beginnend untersuchen kann. Ich stelle sie auf ihren in meinem Sammlung eingestellt, wenn ich nicht etwa zu viele auf die gewöhnliche Weise vorgefunden stellte, und wenn wie ihre [illegible] nicht zu viele Zeit, mit der ich geizen muß, vergeuden. Händler, wie z. B. St. Mars werden sich wenig [illegible] Liebhaber Räumen, theils weil sie die meisten Arten nicht so zu erhalten wünschen wünschen, theils weil es keine Länge nicht so viel Zeit verschwenden kann; dann wo mehrere Hundert Schmett. in einem Marsch [illegible] tun gefangen werden, da ist die Methode auf nicht anzuwendbar. Es würde mir aber dennoch lieb sein zu erfahren, wie Sie Ihre Fangmethode haben, um die Schmetterl. so, wie die in ausgebreiteten zu bekommen Klima, ausgestirbenden Arten mit einem geschickten gewandten weichem Seidenzeuge abstreifen zu können.

d. Verf.

Wien d: 30 Sept. 1840.

Mittheilung eines Briefs von Heyneker worin er vorschlägt, Fischer v. R. solle sich einige Exemplare seines Werkes gratis geben, wo er dann versuchen wolle Exemplare mit französischen Text in Frankreich England, Italien etc abzusetzen. F. möge ihm angeben welches der billigste Preis ist, wie er die color. Tafeln [illegible] überlassen kann. Bailliere liefert übrigens das Heft billiger, als es in Deutschland kommt, zu 4 fr. 50 c. Zeller Aufsatz in der Isis war mir entgangen, da die Isis selten Originalaufsätze enthält. — Auf ist sehr Reaumurs Beobachtungen seit unserem Hefte verfolgt, u. stimme fast immer Zeller bei; völlig geht sie einen kleinen Nachtrag, auf in der Isis. — Frager hat Übersetzt Reaumurs beschreib. wichtig zu haben. Ich bin nicht einverstanden, mit Zeller die Benennungen ana, ella etc. etc. anzugeben. (Jedes Princip, Einseitigkeit gegen Linné, selbst der allgem. Gebrauch; Haworth in Hepk. kommen kann in Betracht, da namentlich der neueren Arten fast alle nur Varietäten sind.) Willkühr bei Haworth, alte Namen zu verlassen, einzelnen nöthige Aenderungen (z.B. Linnella aus Linnaeana) mögen immer geschehen wenn es nöthig ist. — Von Zeller weiter in die Namen wie ella (in lit.) an. — Mit Genehmigung des Herausgebers folge ich den Gebrauch der Franzosen, der mir der richtige scheint. Zum Theil in Parallele. (Berg. Praviella Linn. ebenso bei Hübner etc. z.B. Wien (Germar). — Selten Namen verwerfe ich auf die bei verschiedenen Lepidopt. Gattungen, da die Gattungen durchaus noch nicht feststehen. — pennella u. foliella in bestimmten Gattungen wende ich nicht an bis foliella nicht aufgefunden. — Namen von Autoren zugenommen, keine zweideutige Namen gegeben. — Linnes Barchelli. — Meine Fortsetzung des Textes [illegible] ist nächstens bekannt machen. Mehrere seiner gravirtesten Arten — sollen nächstens folgen. Einlage an Hr. Mann, Bestellung von Microlepidopteren. Übersendung von Bemerkungen über die beiden verschiedenen Bindungen; ist erfolgt.

Meine Anmerkungen zu den Alucitoni. Hallen d. 26 Dec. 1840.

769

№

2. Adrodactyla Hb. ist auch in der Mus. Schiff. und auch bei Heinemann- geschieden bei S.V.

3. Adrodactyla Hb. 11. 12. Ich bin gewiß, sind nie nur eine Species zu sein. In Mus. Schiff. steht jetzt unter diesem Namen Stigmipennella Hb. 196 (Ilerdella L.) – Adrodactyla Fab. ist gewiß nicht Adrodactyla Hb. – bei dem Gattel Megadactyla steckt jetzt in der Mus. Schiff. eine sehr unkenntliche Reihe von Adrodactyla Hb. und Fab. Exemplare und kann auf sie gar nicht gedeutet werden. Fabricii Megadactyla steht auch bei Mus. Schiff. und die Beschreibung ist nicht übergangen. Megadactyla Mus. Schiff bei S.V. und Adrodactyla Hb. sind also nicht, wegen Megadactyles Fab. gestrichen.

4. Tetradactyla L. Mus. Serres Beschreibung, wenigstens nach der Beschreibung. Die Form ist von Linné, seine Worte haben keinen Zweifel und seine Figur hat am Vorderrande und in Falten. Auf die Zeichnungen Fabricii Adrodactyla Hb. 11. 12 ähnlichen, sich nicht genau zu gründen. Tetradactyla L. scheint mir eine sehr markirte Species zu sein. Tetradactyla zu sein. Bürgers Beschreibung passt auf Spondactyla. Im Mus. Schiff. Exemplare, die nicht vorhanden.

5. ? Ich besitze eine Art mit Hohen Federn Pentadactyla mit Hexadactyla Linné ist durch Vergleichung, die Exemplare sind sehr zu unterscheiden. Pentadactyla L. ist es nicht, sehr gut abgebildet bei Hübner Fabricii, mit Fühlern, die jedoch bei der Beschreibung nicht genau angegeben sind. Ich habe sie als Pentadactyla in meiner Sammlung, stehen in 2 Exemplaren in den Mus. Schiffern. als Odontodactyla und Calodactyla. Letzteres ist ein Männl. Exemplar, ein sehr schönes, etwas dunkles Exemplar.

6. 7. Microdactyla L. H. 26. 3. sehr verschieden. Fühler nicht gepaart an beiden Seiten. Fühlerglied Thoracal, mehr Vorder- und Hinterflügel, gehört nicht hierher; sondern zu einer Pterodactyla. Microdact. ist bei Hübner nicht selten; selten sind die Exemplare in den Sammlungen der Handlungen granulatet. Es gibt noch 2 sehr sehr ähnliche und leicht zu verwechselnde Arten, die auf Inhalt sind.

9. 10. Carphodactyla – Microdactyla H. 26. 27. – 19–20. Carphod. unterscheidet sich durch Größe; Größe ist keinen Unterschied. Farbe gibt es, dass es eine Art ist, obwohl die Carphod. in Exemplaren 3. als eigene Art beschrieben.

11–18 Tetradactyla L. H. (Leucodactyla H. 26. 5.) scheint mir wenig verschieden. Die Größe ist nicht sehr verschieden.

19–22 Diese sind auch einer Meinung nach Exemplare alter als Pterodactyla L. verwandt. Die Exemplare 6 Arten, die sich unterscheiden, sind sehr schwer zu bestimmen, weniger die anderen Arten; sie sind in der Größe und in der Farbe sehr verschieden. Ich habe in der Sammlung eben genug Exemplare, um sie zu bestimmen, aber sie sind nicht vorhanden, so dass die Zeit für mich nicht reicht, um sie genau zu bestimmen. Ich habe die Arten gezeichnet. Ich habe die Arten gezeichnet. Ich habe die Arten gezeichnet. Ich habe die Arten gezeichnet. Ich habe die Arten gezeichnet.

771

Nr. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

155

302

56. 1

57. 2

58. 1

59. 1

60. 1

N 3

42 Ch[ar]f[ar]bungen genauer werden, da die Langzeit bald
lings unbrauchbar. So ging ich fand in einer meiner a
nicht wünschenswerthe.

Einig Thiere nach Lebend aufgestellt

N. 6.

Ch[ar]ar[ar]ter, über die Art, wie die Flügelbildung aufg
ne Basis und einigen Autoren stehe ich gänzlich
ist genau, weil man das Gesetz mit der Länge [illegible]
Eintheilung eingeführt), wenn ich nicht stehe genau für viele auf
vollständig nicht zu viele Zeit, mit der ich zeitlang arbeite, mag
herausst am besten Raum, theils weil sie die meisten
weil es beim Fange nicht so viel Zeit verschwendet
lar gefangen werden, da ist die Methode nicht nicht
erfassen, wie die Thiere Fangmethoden haben, über die
lichen Thiere, ausgestürzenden Thieren mit etwas Gesch
zogen.

N. 6.

Ch[ar]ar[ar]ter, über die Art, wie die Flügelbildung aufg
ne Basis und einigen Autoren stehe ich gänzlich
ist genau, weil man das Gesetz mit der Länge [illegible]
Eintheilung eingeführt), wenn ich nicht stehe genau für viele auf
vollständig nicht zu viele Zeit, mit der ich zeitlang arbeite, mag
herausst am besten Raum, theils weil sie die meisten
weil es beim Fange nicht so viel Zeit verschwendet
lar gefangen werden, da ist die Methode nicht nicht
erfassen, wie die Thiere Fangmethoden haben, über die
lichen Thiere, ausgestürzenden Thieren mit etwas Gesch
zogen.

Lauf nicht über, wenn die Rippen
nur etwa 2 gerade Linien. Die Rippen
ist 1) Tricladactyla M. Schiff. Hier die Rippen, gerade
Spitz auf die Dreiblatt, das Grund ist auf Fuß an, sind
einander so Kastanien – über rothbraun wie die folgende.
Thier N 24 u. 22 ist [illegible] abzubrechen, Thier ist so lieben
ist N 2 genau wissen. 2) Didactyla u. Oligodactyla M.
Schiff. mehr Thier 19 u 20 gefunden. Ich weiß nicht, wie die
müller eine auf Schalen Zeit [illegible] grün Namen aufgefunden
Kunde; wahrscheinlich war Didact. abroad gemeint, dem
Oligosad. fällt Kunde sein, und ist es nicht. Die erste muß
verdunkelt sein, und so stehe ich an eine andere Art der
matt sein, als an die Farbung [illegible] Cabinett entweder, mal
aber so, wie Oligosad. gefunden ist. Nun auf diese ge-
gangen sind Lupen sich Gebrauch nützlich zu
9 u 13 anwenden. Auf Linie für eine mittel, Lupe
ist nicht unbrauchbar. Ist nach genauer, in der natürlichen
Farbe Linien auf gelbe Platte war, und das Haar-
Entfernen der Fühler Kunstflügelfedern ist auf genauer
genauer. Ich besitze davon 2 Platte mit Markierung.
Ist sonderbar, wie sehr man Thier bis in Einzelheit
trockenen Lagen genügt 1 und 2 gefangen, in Thier
aber selbst; in Lösung machen die Thiere genau,
die genauen sehr schlaff. Die Thiere (1) genügen in
den Zustand nicht, und sind dann und wegen ihrer Farbe
sehr brüchig, wenn die genauen zu trocknen, welche in
genauen ziemlich [illegible].

23. 26. 29. 31. 34. 36. 86. Ist nicht eine Art, und Pterodactyla L. S. T. N. 9.
Fr. die Zahl-Variabel, welche die nächste bei Micradactyla
verdunkelt, gefunden sind. Ich verweise auf die Iris,
1838 S. 640 u. 1839 S. 277. — N 23 ist eine sehr abgeflo-
gene und wenig [illegible] den N 36 gleichen, welche 35 zu
nächst steht und den Übergang zu 33 oder 31 macht.

32. 25. Diese Art kann nicht von Thier an bis in den Zustand und Thier
24? für zusammen sein Genus v. Pteradactyla Fr. (Thier 27. 28. 30). Ich sind
aber, daß sie eine eigene Art ist. Sie ist auf Nebennamen. Ich [illegible] sind
sie nicht sehr schwarz sein, und ist Thier Thier Schädel. Die Namen sind
32 vereinigt werden.

27. 28. 30. Pteradactyla N. 16. 25. — N. 24 kann vielleicht nicht genau genug
nur, mit der Lupen Thier N. Hinterflügel Lappen [illegible] und 25
32 vereinigt werden.

37. 42. 45. Hexadactyla u. Polydactyla sind oft sehr schwer zu unterscheiden.
Die Zahlen sind genau in den Iris 1838 S. 641 Anhang Thier angegeben, auf
welchen man genügend richtig bestimmen kann. Ich habe über sehr oft
Thier, vorzüglich Thier abgeflogen oder [illegible] gefunden, wo ein
gesucht, wo Hand Lupen nicht ausreichten. Dann ging ich einen
Thier, wenn ich die Hinterflügel zum Vergleich nahm. Thier Thier

Linn. Z.: 30 Sept. 1840.

Mittheilung einer Briefe von Heyden wegen [illegible] vorgeschlagen, Fischer v. R. sollte [illegible]
seinen Werken gratis geben, wo er dann [illegible] sollen
England, Italien etc abzuschicken. F. möge ihm angeben
den abzulassen kann. Bailliere liefert übrigens das [illegible] billiger, als es in Deutschland kommt, zu 4 fr. 50 c.
Zahlen Aufsatz in der Isis war mir entgangen, da [illegible] selben Originalaufsatz zu Stande.
auf ich habe Reaumurs Beobachtungen seit unseren [illegible] wodurch, u. seine fast immer Zahlen bei; völlig
gab ich einen kleinen Nachtrag, auf in der Isis. — Frage [illegible] Reaumurs beschrieb. u. fig. zu tadeln
Ich bin nicht einverstanden, mit Zeller die [illegible] anzuführen, sondern abzugeben. (Indem nicht sicher
sind sicher gegen Linné, seiner allgem. Gebrauch) Haworth in Lepid. kommen kann in Betracht, da namentlich
der neueren Arten das alle wo Varietäten sind) vielleicht bei Haworth, alten Namen zu verlassen!
einzelnen nöthige Aufzeichnungen (z. B. Linnella und [illegible]) mögen immer geschehen, wenn es nöthig ist. —
Von Zeller weiter in die Namen mit ella (nicht) an. — Mit Zufügung der Autorennamen bedarf es
den Gebrauch der Franzosen, der mir der richtige scheint. Zum Theil in Varie-Sets. (Berg. Praviella (Lin.)
ebenso bei Heinecken z. B. Wien (Germar). [illegible] Namen abweichend in der [illegible] Lepidopt.
Gattungen, da die Gattungen dann [illegible] sehen. — pennella u. foliella in bestimmten Gattungen
wenden ist nicht anzubringen foliella nicht aufgeführt. — Namen von [illegible] analoge Insecten, keine zweifel-
deutige Namen gegeben. — Aciurus Buscheli — Meine Zubereitungsart Thiere Insecten werden
ist nützlich bekannt machen. — Mehrere [illegible] Arten sollen nachstehend folgen.
Einlage an H. Mann, Bestellung von Microlepidopteren. Übersendung von Bemerkungen
über die beiden wechselseitigen Beziehungen ist erfolgt.

Pentadactyla, Füll 4 Zähnliche, zusammen Haarlinien sollen, und Zahn Raum, zwischen den zweiten und dritten Linie nicht so breit, als postgeschlossen. Füll Füsse der Vorderflügel ist: a. Polydactyla, sind die Füsse nicht. Sein die Haarlinien, Füsse augen beschreibman, so sind sie Haar messen, und nicht gut zählbar zu sein. Die Haare sind nicht so abreiben sind. Die Vorderflügel gefärben zu Füsse sind gelblichen Farbe ganz der Polydactyla an, die Hinterflügel augen die 4 Zähnlichen Haarlinien der Füsse aber der Pentadactyla. Da aber auf der Hinterflügel der Haare abrauh verwaschen ist und die gelbe Farbe abrauh verschieden ist, so glaube ich Nr 11 eher für eine Varietät von Polydactyla halten zu müssen. Die Zeichnung zeigt an augenf. Orte an, dass der Haare der Mittelmittel der Polydactyla übrigens als die Pentadactyla sind, und dass Zahnlinien nur mit Schwarz und in Schwarz sind in Füssen zu finden sind. Ich finde aber, wie auch Herr Hofmeist. zeigen, dass Polydactyla Füsse ist mit Schwarzen Linien, Punkten als bei Pentadact. von Latten, und dass Zahnlinien nicht in Füssen steigt, denn sah sie in 2 Zellen schwach, selbst übergezeichnet, da sie nicht am Exemplar sind.

Zu Pentadactyla Fig. 10 u 11 ist eine eigene, Raimar Tab, die ist bei H. Zellen sah, aber nicht selbst besitze. Von der sehr verschiedenen Pentadactyla St. besitze ich 2 Paar.

Ich glaube nicht dass Pentad., Polyd., Indicad. & Fuscidactyla Stephens Varietäten einer Art sind. Ich kenn Steph. nicht vergleichen, denn sein Illustrat. besitze ich nicht, und seine Cataloge sehr ist so oberflächlich.

Raimar Bürger zu H. Mann's Ordnung.

19. Die Scirrhosella Zeller, sehe ich auch Raimar für Klaby finden können, so scheint mir die Gattung Cataphracta, Hübn. E. mir am besten zu passen.
12 Fabric. Senectella Fr. scheint mir Raimar Terrella Hb. Fr. (Pyrgodactyla Tr.) zu sein, so bleibt aber Fabr so klein, und mir andern Unterschiede zeigen die Augen an.
13 Abscissitella Zell. (Albicaps Zell. Frfl.)
14 Fagacella & Fagiticella Zell. sind sehr nahe mit, die Schuppen und Fühler Zahnlinien sind einander verschieden Raimar. Das mikroskop. Schiff, Fabr Unterschied Fagacella, die bisher andere Fagiticella Zell. Die Mikr. Schiff, Fabr Unterschied Fagacella, die Fabr. Unterschied Fagiticella Zell. sind die Flügelfalte Corticella, welche mir Fabr Art zu sein scheint.
15. Inauratella Fr. Raimar war sehr kurz die Mollella Fr. selten. Farbe: Alle sah aber Fabr. war der Mittelleib weißlich gelb, glänzend; an: seinen Flügeln, und war der Spitze gegen die Spitze weiß am Vorderrande Spitzen Spitzen.
16 Tenebricella Fr. Dieser ist Violella Tr. — Vorliegt die gegen die Mollella Fr. Mehr Raimar Art glaub mit der Violella Mik. Lit. & St. zu sollen, welche mit gegeben ist, und obrigst gestrichelt, dass auf einer gelben Grundfarbe Fühler

1840.

Erfolge. Wird an Haarstrauch an einer Unterseite, Raimar gemeinde Stand anhaltet, und war Zellen auf so wurden sich auf seine parasitischen Raupen zu wird Zeugenschaften mit grösserer Lebe: der dritten Raimar, und sein Leben Raupen gefressen. 1840 1. Hft einer auffallig über Pyrtera. Sehr [illegible] mit Pyrtera allein dahin Hesperia-Gegend, und zeigt an sehr dieser Gegend Zellerschen Hefte auffallend, welcher Lese auf gelesen hatte, bei, so sehr zu Zellen Gegenden scheint und für Rosen und sind die Raimar ist auf einem Raupenlager, welches Zellen Raimar Lebens. Durch seine Raupen arbeiten miteinander bekannt und in Raupen zu Zellen Raimar. Zellen zufuhr die Raimar Lese sah durch H. Mann alle sichtigen Pyrtera, beobachtet, so jetzt Art 4–6 Hft. H. Mann sammelte an viele Raupen Arten gefunden sah. Pyrtera, um in der Folge nun die beschaffen Arten

N. 19. 2 55. 1 302

155

und grünschwarz. Meine Abbildung 20.

auf die Abänderungen der Oberflügel

gemeinden. Die Exemplare abbildet 21.

Raimar verschieden. Die Raupe

und war.

Raimar übrig

Raimar

Raupen Raimar

Raimar

Raimar

Flügel und einer nebenständigen Lanz mit Lupen und Pinzetten sah, und selbst eine solche besitze, doch aber eine Epipactis Helleborine Cr. sehr ähnlich wie 2 wenigen Blüthen am Mosenberger Hügel. Epipactis cella selbst, kann sich zu erinnern nie Blüthen war.

21. Pyramidalis ist gewiß Marg. ericetella Mus. Schiff. und gewiß Bombyx Dom. Fabricius sagt "Alarum Cubus" und Fabricius "fuscis" — Linné sagt "nebulosis, cinereis" und Fabricius "Margaritella" sind die Abbildungen so schlecht, daß sie Fab. gut sein können, die Fabricische Linné'sche Beschreibung aber nicht gut passen, die Fabricische kann in der Gegend von Wien gar nicht vorkommen.

22. Maritella Tr. ist unläugbar die nämliche Phalaena, ist sie doch gewöhnlich an Ort, wo Tr. sie fing, häufig.

23. Sordidella Hb. ist, daß H. Mann sie an Ort, wenn sie Raupe auf Ulmen lebt, als Ulmariella M. von jener, Cratægifoliella (Crataegi) Zell., welche Raupe auf Weißdorn lebt, aber auch an Ulmen gefunden wird, kommt. Daß sie Fabricius auch nicht gekannt, ist aber sehr zu bedauern, da seine Beschreibung gut ist. Der Name Ulmariella ist offenbar zu verwerfen, besser wäre wohl Ulmicella.

34 Badiipennella Tr. gleicht sehr viel der Satzipennella Z. und auf einige Exemplare der Luceonipennella Tr.

37 Albariella Tr. ist leicht — namentlich an den 3 Binden der Vorderflügel, wo die Einschnitte fast in der Mitte stehen.

39 ult. Bahdactyla hat einige Aehnlichkeit mit Hexadactyla Tr.

40 ist auf das genaueste Pedidactyla Mus. Schiff. und die Abbildung ist selbe ist ebenfalls. Die Linnéische mit Didactyla verwirrt.

41 Insolella wie Ihre Exemplare. N. 24. 25. 32.

42 Bot. Senectariella M., verschieden von der Aehnlichen Sarcitalis. alles Exemplare. Binden sind gleich.

45 wird. Arborescentella M. ist sehr der Pinetella ähnlich.

49 ~~Dim~~. Semicostipic. Strigulana M. Fab. (Tortrix Hb. 13. Tr.). Zwar sind die Zeichnungen der Deutsch. Phryg. & Linné etwas Fuscia & Vitana Linné's hier genommen werden. Und genug in Mus. Schiff. passt sehr gut auf Strigulana Hb. 13. Das Braun soll ganz Flügel wie der Mann.

50. Bechst. Pauperana Kuhlw. Dem nicht gut neben Betulæ Pauperana Hamm. Hopf. beschrieben.

Fischer v. Röslerstamm

Ulm. d. 30 Sept. 1840.

Mittheilung eines Briefs von Heinrich, worin er vorschlägt, Fischer v. R. solle sich einige Exemplare seiner Werke gratis geben, wo er dann versuchen wolle Exemplar mit französischer Text in Frankreich, England, Italien etc abzusetzen. F. möge ihm angeben, welches der billigste Preis ist, wie er die color. Tafeln den Abnehmern berechnen könne. Bailliere liefert übrigens das Stück billiger, als es in Deutschland kommt, zu 4 fr. 50 c. Zeller's Aufsatz in der Isis war mir entgangen, da die Isis selten Original-Aufsätze enthält. — Auch ist sehr Reaumurs Beobachtungen seit unseren Tagen vielfach gefolgt, u. stimmen fast immer Zeller bei; völlig gehe ich einem kleinen Nachtrag, auf in die Isis — sorgen soll Ehrenf. Reaumurs Beschreibungen zu tadeln. Ich bin nicht einverstanden, mit Zeller die früheren — a, ella zu diesen anzugeben. (Irdaeus Schaff. Linné hat gegen Linné; seither allgem. Gebrauch Haworth in Hepk. kommen kann in Betracht, da namentlich der neueren Arten das alle nur Variationen — Villers das Haworth, alten Namen zu verlassen. einzelnen nöthige Anregungen (z. B. Linnella — Straccana) mögen immer geschehen, wenn es nöthig ist. — von Zeller weisen in die Namen mit ella (u. lat.) an. — Mit Zufügung der Autorennamen bedarf es den Gebrauch der Franzosen, die mit der — lige Theil. Zum Theil in Varietäten. (Arg. Pruriella Lin.) — ebenso bei Wunderten z. B. Wien (Germar — Gleiche Namen verwende ich doch bei verschiedenen Gattungen, da die Gattungen durchaus nicht — penella u. foliella in bestimmten Gattungen wende ich nicht auf die foliella nicht anschließen. — Namen von Linné analoge Fragezeichen, keine zweifelhaften Namen begründe. — Meine Bestimmungen als Meinen Irrthümern sind in wissenschaftlichen Arbeiten — sollen nachstehende Folgen. Meine Exemplare — Meine Bestimmungen als Meinen Irrthümern sind in wissenschaftlichen Arbeiten — sollen nachstehende Folgen. Einlage an H. Mann, Bestellung von Microlepidopteren. Übersendung von Bemerkungen über die beiden wechselseitigen Bemerkungen ist gefolgt.

154 TB

Meeten von mir um Frankfurt gefunden, sowie einige aus der Hymnie. Ich schicke selbst die gewünschte von Pentadactylaz mit, damit Sie alle haben, die mir bisher vorgekommen sind. Auf viele Varietäten werden Sie finden. Ich bitte mir alle zurück.

(d. 27 Nov. 1840 an Fischer v. Rösserstamm geschickt. Am 26 Dec. 1840 zurück erhalten)

1. Adactyla Hb. 32–34	Von einigen Faltern einzelne Flügel, das Fehlende ist durch Papier ersetzt. Pentadactyla Bonnetia Curtis kommt zwar nicht, doch ist sie sicher von Adactyla Hb. (Ad. Hübneri Curt.) verschieden.
2. Rhododactyla Hb. 8.	Linda Juli, Aufs. Juli an Rosenhain.
3. Rhododactyl. Hb.	Linda Juli, Haida Hallen in Böhmen.

155

N. 19. 2 — 55. 1 362

und grünschattet. Meine Abbildung 20. 2

daß die Übereinstimmungen der Ober

gemacht. Die Hauptpflanze abbildet 21. 2 v. M.

a damach verschieden. Sie kommt

und vor.

22.

Variana), Mona

23.

56. 1

24.

25

26

57. 2

58. 1.

27.

28.

59 1

60 1 Lö

29.

30

31

32.

33.

34

35

36

Wien am 17ten December 1840. 771

153

Hochgeschätzter Herr!

Herr Mayr sitzt, da nun Ihre bezeichnete Schmetterlings-Sendung zu Ende gehet, gar sehr in Verlegenheit mit einem Dankgrusse Ihnen zu nahen, da er sich so ganz überflüssige Zeit zur Bestimmung Ihrer Falter und zum Durchsehen der gütigst gesandten, wundervollen Blumschmetterlinge verschwendete.

Auf Ihr Schmetterlings-Verzeichniß, mein theurer Gönner, wende ich, ob ich vermöchte es mit einem Commentar zu begleiten, und das jetzt angenommene Ihre Zustimmung erhalten. Mein Abwesen wurde, da die meisten wissen, daß ich Halt gebiete, mich wohl entschuldigen, wenn die Hefte immer schnell aufeinander folgen; ich werde sie aber nicht ganz unpünktlich beschicken, einmahl, wenn sich meine Mußestunden häufen, wie ich hoffe, haben, ohne Unterbrechung fortsetzen.

Der Gedanke, die Sendungen des Herrn zu bearbeiten, lockte mich unbezweifelt, und überraschte es mich Ihrer Güte, allgemein wünschte man über die Ungleichheiten aufgefangen, um Falter schulgerechter Methode nicht so bald wandern, vielleicht verloren wie sie nicht. Ich wende deßhalb mich bei der alten Meinung. Es viel dem ich Ihnen aber versichere, daß ich schon viele Hilfsmittel, die gewandte Ihrer Falter sind, sich mühsam und sauber entfernt fanden.

Ich übernehme nicht, Ihr Falter stets zu zergliedern, seine unterscheidenden Merkmale durch die Lupe kennend zu machen. Es ist mir Pflicht zu bekennen, daß der Reiz der Arbeit schnell und sehr, oft schon in kaum 10 Tagen alle ist, sich zumahl ein Falter allen zu nahen wird. Wegen einer Kunstübung reizet es jedesmahl in Liebe, über, wie es scheint, mit Liebe gelohnt. Wird in Hauptsache an einen Universalist, wenn Ihre Sache Freund Herrn anbietet, und mit Falter auch zu werden verdient, so werden sich mir seine gediegenen Verhältnisse in Ihrer Nähe erschließen, und wir mich Ihnen mit gewöhnlicher Liebe in der Natur wissenschaftlichen Leben Lehmann, und sein Leben Ihnen zeigen. Falter schreibt in den Jahren 1840 1ste Hft einen Aufsatz über Pyrales. Herr Professor Löw in Posen hat sich mit Pyrales allein beschäftigt, schreibt ein ziemlich dickes Heft über die Pyralen der Hessen-Gegend, und fügt an sich diesen Theil eine Zahl von Arten der Falter'schen Ihrer Aufsatz, welchen Löw auch nach Entdeckung seinen Theil gehörig stellt, bei, die sehr zu Falter's Ehre ist. Diese Arten Theil scheint nun für Posen und für die Sammlung von Löw bestimmt zu sein, wie schon ein Brief von Herrn Heyer schildert, ist mir einem Tauschplatz, welcher Falter Hand mir zu Ihnen Heyer schildert, unterhalten Verbindung. Durch jene Leiden verhindert wurden die Tauschsachen mitunter bekannt und in Stand zu Reinung bringen zu sein, was: schließt Ihnen. Falter wünscht die Sammlung des Herrn Löw ausschließlich. Löw hat durch Herrn alle seltenen Pyralen, die sie vorkommen, einsenden Herrn Mayr alle Pyralen, die sie vorkommen, einsenden Herrn Mayr alle seltenen Pyralen, die sie vorkommen, einsenden Löw hat durch Herrn alle seltenen

[illegible] fassungen gemacht werden, da die Länge der [illegible]
[illegible] einige anzuführen. So fing ich jüngst in einem meinem a
[illegible] nicht einheimisch wäre.

Ihnen Ihnen noch das[illegible] zugeschickt

[illegible] Ihre Adressen gütigst mitzutheilen.

M. d.

Ich erwarte, über die Art, wie Sie [illegible]
u Baier und einigen andern Ihnen so g
ich [illegible], weil man das Insekt mit
Tödtung eingeschickt, wenn ich nicht Ihne
vielleicht nicht zu viele Zeit, mit der ich
herrlich am [illegible] Bäumen, Abends
weil es beim Fange nicht so viel Zeit
tag gefangen werden, da ist die M
aufsuchen, wie die Ihnen [illegible]
[illegible] Blume, angeschlossenes Ihnen
zeigen.

Ulm, d. 30 Sept. 1840.

Mittheilung einer Briefe von [illegible]
[illegible] Verkehr gratis geben, wo
England, Italien [illegible] abzusetzen. F
den abverlangen kann. Bailliere
Gallen Anstalt in der Schweiz
Auf ich habe Reaumurs Probeb
gabe in einem kleinen Nachtrag
Ich bin nicht einverstanden, mit Ih
Linné's Eifer gegen Linné; seitdem alle
der neueren Arten, das alle wo
einzelnen wichtige Andeutungen (z.
Von Gallen nehme ich die Namen
den Gebrüder de Fraissac, d
ebenso bei Hundorfer z. B. W
Gallmücken, da die Gallmücken
wendung ist nicht anbei foliella
dringe Nebenbezeichn.
ich nachstens bekannt machen
Einlage an Hr. Mann, Br
über die beiden [illegible]

Ihre Adressen sind auf meinem besten Wissen basirt. Das beiliegende Verzeichniß zeigt Ihnen bei Mäßen daneben. Ich glaube, daß Sie in Zukunft die Bezeichnung ziemlich gleich gefaßt machen. Herrn Gallen werde ich zum Behufe seiner Bearbeitung der Adressen das Nöthige mittheilen. Wie ich sehe, mangelt Ihnen noch manches an Arten, und es soll meine angelegentliche Sorge sein, Ihnen mit der Lieferung, so weit als nur möglich, Ihnen zu Dienen. Meine Sammlung enthält gegen 35 Arten.

Den Inhalt des zweiten Packetes muß mir selbst will Ihnen, und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Die Motazeichnungen [illegible] calandra wird mich, und wie sehr ich Ihnen, mehrere Arten in Holz und meinem lieben Gallen allmählig zu Dienen, so [illegible] das verfallenen Falter. Aber auch in einer gewissen Uebereinstimmung sind mit Ihnen meine Bemühungen gestaltet, indem ich schon diesen Augenblick nichts Dagegen zu haben vermag, da ich die Adressen ganz entbehren kann. Ich suche aber nicht gar zu lange im Felde zu bleiben. Wünsche ich, nach [illegible] Mikrolepidopteren beschäftigen, so müssen es mir möglich, sogar auf meiner Sammlung manches Ihnen fehlende ablassen, [illegible] Ihnen dagegen zu Dienen. Zu den Gattungen Gracilaria & Coleophora &c. haben wir sehr viele neue Arten; es könnte Ihnen nicht viel Mühe kosten, mir Ihre beschriebenen Arten zu verzeichnen, und ich würde Ihnen manches Fehlende mittheilen können. Rechnen Sie mir fester darauf, daß ich, selbst es mir möglich ist, zuverlässig sein werde.

Nun die gesandten Arten habe ich folgendes zu bemerken.

Carp. Templana W. (im Frühjahr sehr [illegible] in Pedicea gestellt). Ich habe 2 Ex an Hübnermann erhalten mit der Bemerkung, die Raupe lebe auf Eichen. Die Angaben der Zünder sind mitunter, oft geflissentlich, falsch.

Tort. ofbiterana Hbg. Diese vorzugsweise, dann aber [illegible] Spiraeana sehr [illegible]

Coch. Rutelana (Hbn.) Stelle für mich einfügen [illegible] Tessarana, Dreimal [illegible] Falter [illegible] mag sehr selten sein; ich besitze nur 2 Stück aus Ungarn, wovon auch [illegible] ist.

Dictyo Pauperana (Haw.) Sept. Einige Tage war an einem schwülen Tage abends [illegible] auf Gesträuch [illegible] Da ich Laufgang [illegible] ist selten. Ein Langrasbezug bei mir. Ich [illegible] Gefangenschaft und 1 Stück mit, selbst ist mittelst einer Blumen Kescherung, da der Fang, der folgenden Abend viele zu fangen. Ich ging nachher alle Abende hin, und in diesem [illegible] alle Abende bei Mondschein Tage, sehr schön, günstiger kam genug, und mir nur ein einziges Stück mehr gefangen. Den Grund mag fällt Mehr Lust [illegible] Raupe; und neben an ist ein Lieferungsartikel. Vom Scirpus lacustris kann [illegible] nicht sein. Ich kann mich [illegible] gelegentlich und so häufige Lasiocampa und Crassipennis einst nach ganz [illegible] da und sind [illegible] nach irgends gefundenen Abnormitäten nicht erhalten.

154 TB

Meuten von mir um Frankfurt gefunden, sowie einige aus der Hymnig. Ich schicke selbst die gewünschte mir Pentadactyla mit, damit Sie alle sehen, die mir bisher vorgekommen sind. Auf viele Varietäten werden Sie finden. Ich bitte mir alle zurück.

(d. 27. Nov. 1840 an Fischer v. Röslerstamm geschickt. Am 26 Dec. 1840 zurück erhalten)

1. Pdactyla Hbn. 32–34	Vor einigen Jahren sind ganzen drei Jahre ist die Zahl der Exemplare nicht gestört. Pdactyla Bennetti Curtis kommt [illegible] vor. M. Pdactyla Hb. (Ad. Hübneri Curt.) verschiedene Stücke sind, Anf. Juli an Rosenstöcken.
2. Rhododactylat. Hbn. 8.	
3. Rhododactyl. Hbn. – v	sind Juli, Haide Hallen im Walde.

171

Lymnas. Semicitella Hyda. – Ist nun und stehen. Man wie sehr ausgenommen. Wie sehr nun 5, der Albigenicella sehr ähnlich sind.

Colleph. Gallipennella Hb. ? Ich bin ist nicht diese, sondern Serenella Tischer. Diese sind die Raupen nun, so viel ich mich erinnere, auf Astragalus sind gefunden, und ich sah glaube Raupen von Gallipennella. Beide sind glaube sehr ähnlich, so dass man leicht Serenella für eine kleine Gallipennella hält. Der Unterschied liegt aber darin, dass Serenella eine einzige, Gallipennella einige Linien hat, und Letztere ~~[illegible]~~ gestreift ist. Reaumur's und ist sicher Serenella. Galle sind die diese (Isis. 1838. 715) einig für Colitella Tab. Ver. gehalten. Diese Colitella ist eine Gallipennella mehr, aber vorzüglich durch sehr schwarze, weiß gelbe Fühler unterschieden).

Colleph. Laricella Hb. (Staggropennella Tr.) ~~[illegible]~~ dem Namen Laricinella Bkm. in Sylvan um 1816, ist vielleicht älter. Ist überall wo Pinus laric wächst gefunden. In Lithauen nun sie sehr häufig.

Aechm. Politella Hyda. ist Aechm. Metallicella Dup. Das Skelet der Innenrandes ist nicht sehr auffallend. Mein 1st Heft bringt alle die jetzt bekannten Arten der Gattungen Glyphipteryx & Aechmia Dup. in Abbildungen.

Oecost. Fuscella Hyda. ist richtig, wie Sie vermuthen, Scitella Mtz (Zell. Isis). Wenn ich Fuscella Linnaei Nomen gab, so bleibt Scitella.

Lithoc. Pastorella Hyda. – Populifoliella sind vollkommen selbständig, Tritillella gelbgrauen Zeichnungen auf weissem Grunde. Pastorella sind einen weiß grauen dunkelbraunen Grund und das Braun der Zeichnung ist dunkler. Da Tritillella aber bei vielen Exemplaren Übergänge bildet, so halte ich alle drei für verschiedene Arten. Zeller zeigte mir Tritillella und für eine Varietät von Populifoliella halten. Letzteres ganz ist Abbildung mit Raupen, die in den Blättern der Popul. tremula minieren, Tritillella sind ist Gast nun in Popul. italica, und niemals ist mir in einer jener drei Tritillella, oder einer Populifoliella vorgekommen. Ich bin begierig ob Pastorella, die der Tritillella sehr nahe steht, auch für Gast [illegible] anerkannt wird.

Chrysoc. Scitella (Haw) Curt. – Statt Festaliella (Hb.) ist sicher auch Scissella Hb. 270. Die Abbildung ist zwar etwas verfehlt, aber so wie die der Festaliella. Zeller hat Scissella ist seinem Prax. Lab. Hyn. nicht aufgenommen. Ich kenne ganz gut, dass sie eine eigene Gattung bildet, und der Gleichen sehr nahe steht, wie besonders die Raupe zeigt. In Lithauen habe ich diese gut häufig gefangen.

Beim Abschluss angelangt ist Ihnen auch, die wenigstens 2 Exp. von Renos Rossii dass 4 Mann und 4 Weiber sogleich zugeschickt zu haben, habe aber seitdem noch keine Antwort empfangen.

Mit Ihren gütigen Antworten angelegentlichst empfehlend, bin ich mit der grössten Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster Diener

Fischer v. Röslerstamm

155

N. 19. 2 — 55. 1 302

20. 2

21. 2

22. 2

23. 2

56. 1

24. 2

25

26

57. 2

58. 1

59. 1

60. 1

27. 2

28. 2

29. 2

30

31

32

33. 2

34. 2

35

36

Braubrs. d: 28 Dec. 1840.

Graph. Plumbetana Zell. = Stibinana Hydr. Ayrl. und Gelb. q. l. q. tes. Alnc. № 5. Falth. ist anisodactyla Braun, dann aber für calodactyla H. gehalten. — Hymenobr. ist gestorben. —

N. S.

Braubrs. d: 30 Sept. 1840.

Alucitten von mir um Frankfurt gefunden so wie
einige aus der Wetterau. Ich schicke selbst die gemeinsten
mit Pentadactyla mit, damit sie alle passen, die mir
bisjetzt vorgekommen sind. Auch viele Variatäten
werden sie finden. Ich bitte mir alle zurück.

(d. 27. Nov. 1840 an Fischer v. Röslerstamm geschickt. Am 26 Dec. 1840 zurück erhalten)

Nr		
1.	Adactyla Hb. 32–34	Vor einigen Jahren sing ich ganz dort[selbst] die Zeit der Falter nicht notirt. Pentadactyla Bennetta Curtis kann ich zwar nicht, da sie fehlt von M. Adactyla Hb. (Ad. Hübneri Curt.) verschieden
2.	Rhodactyla W. Mus. 8.	Ende Juni, Anf. Juli an Rosenstöcken.
3.	Othodactyla Hb. 32 Mus.	Ende Juli, Haidepflanzen im Wäldchen.
4.	Tephradactyla Tr.	Ich habe die Zeit des Fanges nicht notirt.
5.	Aniodactyla Hyon.	Ende Septembr. nur 2 mal auf einer nassen Wiese.
6.	Pentadactyla Lee.	Juni, Juli.
7. 8.	Microdactyla W. Mus. 3.	Verschiedene Alpen.
9.	Amphidactyla Tr.	Anf. Juni
10.	Microdactyla Tr.	Mitte Mai.
11.		Ende Juni, Grasplätze in Wäldern
12.		Anf. Juli, ——
13.		Anf. Juli, ——
14.		——
15.	Lucidactyla W. Mus. 5. (Pleradactyla Tr.)	~~Anf~~ Ende August, Haideplätze.
16. 17. 18.		Verschiedene Alpen. Mehr oder weniger Respect.
19. 20.	Pedactyla & Chrysodactyla Mus. Schiff.	Ende Juni, Anf. Juli, auf der Höhe von Hieracium sylvaticum [illegible] Kann die Nahrungspflanze Ihnen bringen.
21. 22.	Ochrodactyla & Trichodactyla Mus. Schiff.	Ende Juni. Gebirge Mitte Juli, Haideplätze. Die Flugzeit nicht notirt. Respect.

und grünschattirt. Meine Abbildung 20. 2

auf die Abweichungen von Ode

gezeichnet. Die Hauptfigur abbildet 21. 2 d. M.

a danach verfasst. Sie kommt im Juli

und vor.

unter ~~Linden~~ gepflanzten Linden übrig

fast niemals männliche Puppen

Tundella & Trapezinella beschreibt 22.

al, sie winkt an meinem Fenster

ff mit Simplana, Manniana, Moran

lla, kommt hier nicht selten, ist spät 23.

Tolosana & Flavicomella nicht s

Semarniana, Adolphella nicht sehr

fallana in Ungarn gefangen. 24. 56. 1 Mitte, Juni

Von Ceratoniella habe ich alle

Raupen.

25

der angenommen sein wünscht.

nur gefangen.

26

gen angeben. Insubsecana scheint

57. 2 Juli

58. 1. Juli

Ropandalis S.

27.

Trimaculalis L. & Trigrapha

in Raupenform in der Gefangenschaft

28.

ist, und wird nach Fabricius genau

1

gemacht.

60 1 Juli

Verte[illegible] anderen, nach sehr selten vor

nach viel zu dreieckigen; einen Trapezinella kann nie an Prunus padus, Padi

Tella nie an Crataegus oxyac. sah, für besser von der Alten Anzeigerin

dreieckigen Falter, der [illegible] in der Isis 1838 IX. X. 637 verständig nie an

13. 1 . Malinellus Zell. Eine ganz[illegible] eigene [illegible] Raupe [illegible] hat, dass Raupe nicht

gesehen, aber variant sehr in den Flügeln, sind stets eine schwarzweisse Marmirung

nicht schwarzweiss. Malinellus ist kleiner, variirt nicht in der Grösse, und sind

in Mittelzahnen der Vorderflügel, bei aber nach einigen Mancalen vorgek

sehr selbständig gewiss. [illegible] Raupe sind abrad, die rad bei geschwärzt

seine wünschenswerthe Darstellung [illegible] der Isis 1838 IX. X. 641. am Zaun.

14. 1 Hamyl. Pastinacinella Zell. (Heracleana Degeer II. 1. 29[illegible] Linn. ?, Pancella Borkh.) Die Raupe in

Dolden von Pastinaca sativa und Heracleum sphondylium.

15. 2 . Chaerophyllinella Zell. (Cyprese. Chaerophylli Zell. Isis 1839. III. 196) Raupe auf Chaerop

16. 2 . Pimpinellae Zell. (Cypress. — Zell. [illegible] auf Glycyrd, Raupe auf Pimpinella sa

17. 2 Serie. Euphorbiana Zell. Einzel bei Glogau [illegible] auf Euphorbien in Ungarn aber ziemlich selten vor

18. 1 Grapt. Amygdalana Schmidt. (Kollar schickte sie [illegible] Schmidt fand sie in seinem Garten an

Kollar erhielt sie mit [illegible] Mandelblüthen, einen Sommer

[illegible] Juni & Juli in [illegible] bis Mai. Ich vermuthe, dass die Ra

ist sie gefangen worden [illegible] Mandel [illegible] haben einen Fettgalle machen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№

23	Pterodactyla Mk. 4. vom 26. 29. 31. 32. 34. 35. 36.	Mitte Mai, im Garten.
24		Mitte Juni, Grabstellen im Wald
25	auf Zimmer und vom Pflaster u. Philodactyla. 24 Exemplare.	Mitte Juni, Heidepflanze.
26	Pterodactyla Mk. 4.	Mitte Juni, Feldraine.
27		Ende Juni, Grabstellen im Wald
28	Philodactyla Mk. 16. 25. mit 28.	Anf. Juli, Heidepflanzen.
29	Pterodactyla Mk. 4.	Mitte Juli, Feldraine.
30	Philodactyla Mk. 16. 25.	Anf. Juli, Grabstellen im Wald
31	Pterodactyla Mk. 4.	Anf. August, Wiesen
32	Kopf gleich mit 28.	Ende August, Anf. Septembre, Heidepflanze im Wald
33	Pterodactyla Mk. 4 mit 23. 26. 29. 31.	Anf. Oktober, Novembre und den ganzen Winter durch im Pfälderwald, unter dürrem Laub. Legt die Flügel dicht zusammen, die beine an den Körper angelegt. Ist dann unbeweglich wie tot die Form einer Acht.
34		
35		
36		
37	Polydactyla Mk. 28.	Mitte April im Gebäuden
38		Mitte Mai, im Gebüsch
39	Pterodactyla Mk. 30. 31.	Mitte Juni, im Garten.
40	Schlecht.	Ende August, Septembre Oct. in Gebäuden
41	Mittl. gemein mit Pterodactyla Ca. Mak. Stiff.	dsgl
42	Polydactyla Mk. 28.	dsgl
43		dsgl
44	Polydactyla zwar Pterodact. Var. ?	dsgl:
45	Polydactyla Mk. 28.	Vorstehende Exemplare eines alten Tabulars.

Pterodactyla, Philodactyla, Polydactyla, Brachydactyla, Platydactyla, Megadactyla, Lithodactyla, Microdactyla nach Herr oder Herrn Mann's Bestimmungen; Xanthodactyla (von Mann) Dunkl. H. Bruch in Pfalzbaden; Tetradactyla, Brachydactyla, Didactyla, Rhodactyla von Kindermann in Bpen.

Außer dieser Beschreibung sind noch Leptodactyla, Megadactyla, Lithodactyla, Microdactyla nach Herr oder Herrn Mann's Bestimmungen; Xanthodactyla (von Mann) Dunkl. H. Bruch in Pfalzbaden; Tetradactyla, Brachydactyla, Didactyla, Rhodactyla von Kindermann in Bpen.

Graubrg. d: Graph. Plan Mus. № 5. gehalten.

N. A.

Es vorgekommen, über die Art, wie die Flügel an Baier und einigen Autoren stehen, so ist es nämlich, weil man die Flügel mit Nadeln eingesteckt, manchmal nicht stehen wollten nicht so viele Zeit, mit der ist brauch am besten Räumen, Thiele wa weil es beim Lange nicht so viel Zeit dazu genommen werden, so ist die N. aufgefasst, wie die Flügel Lange wollte Lieber Klaine, ausgeschiedene Arten zugesandt.

Landsb. d: 30 Sept. 1840.

Mittheilung einen Brief von P. [illegible] gratis geben, wo [illegible] England, Italien etc abzusetzen. F. [illegible] überlassen kann. Bailliere [illegible] Ballade Aufsatz in der Isis war [illegible] auch ist sehr Reaumurs Probast [illegible] gehe in einen kleinen Nachtrag [illegible] Ich bin nicht einverstanden, mit Be[illegible] durchaus gegen Linné, sonst es al[illegible] der meisten Arten das alle wo[illegible] einzelnen nöthige Aenderungen (z. [illegible] Von Fallen weisen in die Name[illegible] den Fabraum der Franzosen, d[illegible] ebenso bei Linnéischen z. B. wo [illegible] Gattungen, da die Gattungen [illegible] wendet ist nicht auf bifoliella [illegible] dreißige Nahrungsgrößen. [illegible] ist nachstens bekannt machen. [illegible] Einlage an H. Mann, Bestel[illegible] über die beiden verschiedenen

Von den gewünschten Arten fehlt:

N. 1. 3 Rück. Tortr. Sylvana Fr. Raupen fehr in den Früchten und grünfressend. Meine Abbildung Hagenow'schen nicht gelungen.

2. 1 " Ruhlweiniana Fr. aus Asturien. Ist doch auch die Übereinstimmung der Art

3. 1 Corhyl. Richteriana Zell. aus Asturien. Auch selten gezogen. Die Hagenow'sche Abbildung fremde Exemplare, gemacht, aber damals unbekannt. Sie kommt mit Ruhl, am nächsten stehend vor.

4. 1 Tortric. Hepaticana Fr. aus Asturien.

5. 2 " Solitana Fr.

6. 2 Oecoph. Sorbiella Fr. Ich habe nun nach 2 ungezogenen Räupchen gefangene Raupe übergeben

7. 1 Phyc. Rubrotibiella Mann (Tumidella H.-S.)

8. 1 " Faecella Fr. aus Asturien. Sucht Raupe nicht wieder aufgefunden, an anderen selbstständig Exemplaren.

Cinnamomeana, Abietana, Fischeriella, Granitella, Fundella & Trapezinella besonders Bitte ohne Raupe, in der Hoffnung sie wieder zu erlangen, sie wieder an meinem Freunde nun nochmals damit versehen hier. Sucht auch mit Simplana, Manniana, Manni übergangen und nun sehr gewünscht zu erlangen. Ottomella, Humeli sehr nicht selten, ist viel viel bemerkt. Fuligeriana ist nach Hellen, noch mehr Pomariana, Adolphella wieder sehr abgeschlossen Ich Tischer gezogen, und nach Hellen in Raupen gefangen. auch Columbiana gezogen ist, müsste wieder gezogen werden. Von Cerostomella habe ich alle Exemplare, selten, und seltsam keine mehr zu erhalten kommen.

Ich glaube, dass Ihnen die folgenden Arten angenehm sein werden.

N. 9. 2 Bomb. Detrita ♂♀ gezogen. Raupe selten nun gefangen.

10. 2 Zygaen. Minos Var. Von Zell. als fehlgen Minos Raupen angezogen. Insekten sind

11. 2 Bär. Pallidalis Hbn. 115. Nicht selten angegeben. Meine Exemplare nicht abgeschlossen Tritt. Ungarn und Asturien angefällt. Ist Repandalis H.-S. Repandalis Hbn. Verz. bek. Schm. N. 2402. Die Trimaculalis L. ist Trigutt (Repandalis Hbn. 69.) — Ich ist also bei Raupe in der Hagenow'schen Art Hbn. Repandalis Hb. H.-S. nicht ähnlich, das wird auch Fabricius genau

12. 1 Hyps. Evonymella L. Var. mit schwarz angeflogenen Vorderflügeln, und schon selten noch viel zu bemerken; denn Evonymella kommt nun an Prunus padus, Padi Cella nun an Evonymus europ. vor. Ich lasse von den Alten Angaben Bemerkungen Schäfer, der Zeller in der Isis 1838 IX. X. 637 veröffentlicht nun

13. 1 " Malinellus Zell. Eine gewisse eigene der Cognatellus verschiedene Art, denn Raupe nicht grösser, eben variirt sehr in den Früchten, sind stets eine schwarzbraune Varietät nicht schwarzbraun. Malinellus ist kleiner, variirt nicht in den Früchten, und sehr in Mittelraume der Vorderflügel, die aber auch einige Variation zeigen stets unterschieden genug. Die Raupen sind etwas, die auf der Hagenow'schen Beschreibung stützt in der Isis 1838 IX. X. 671. von Zeller.

14. 1 Hamyl. Pastinacinella Zell. (Heracleana Dgnr. II. 1. 294. — Lien.?, Fuscella Bouché.) Die Raupe in Dolden von Pastinaca sativa und Heracleum sphondylium.

15. 2 " Chaerophyllinella Zell (Depress. Chaerophylli Zell. — Isis 1839. III. 196) Raupe auf Chaerophyllum

16. 2 " Pimpinellae Zell. (Depress. — Zell. Isis, wie oben), auch Hagen, Raupe auf Pimpinella

17. 2 Scrie. Euphorbiana Zell. Einzel bei Hagenau im Juli; kommt auch in Ungarn oder südlich selten vor

18. 1 Yps. Amygdalana Schmidt. (Hübner stellt sie in Carpocapsa) Schmidt fand sie in seinem Garten M. Heller entdeckt sie mit Hagen, die in mandelförmigen Hülsenblättern, einem Lieb Hagen sie in Linz selten in Hülsenwäldchen bei Wien. Ich vermutlich, dass die ist sie gefangen worden. Manche Arten haben einen seltsamen

N. 19. 2 Yps. 1

20. 2 "

21. 2 Tor. 1

22. 2 (Anars.

23. 1 Corhyl.

24. 1 "

25 2 Lita

26 1 " α

27. 2 " Ch

28. 2 " Ri

29. 2 " Nae

30 2 " Pau

31 2 Elach.

32. 2 Adela

33. 2 Tinea

34. 2 Adela

35 2 Ornix

36 3 Gracil

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von der gewünschten Anzahl fehlt:

Nr. 1. 3 Rick Tortr. Sylvana Fr. Varirt sehr in der Größe und Grundfarbe. Meine Abbildung ist, wie viele der früheren Zeichnungen, nicht gelungen.

2. 1 " Kuhlweiniana Fr. mit Asclepias. Ist doch häufig die Übergangsform von Oder sehr selten gewesen.

3. 1 Orthol. Richteriana Zell. mit Asclepias. Auch selten gewesen. Die Zeichnung ist zwar auf einen sehr frischen Exemplar gemacht, aber dennoch verfehlt. Sie kommt mir doch so, wie die gegenwärtige Art, am wirksten scheinend vor.

4. 1 Tachise. Hepaticana Fr. mit Asclepias.

5. 2 " Delitana Fr.

6. 2 Oecoph. Sorbiella Tr. Ich habe nun auf 2 ungespannte ~~Blätter~~ gefangene Raupen übrig.

7. 1 Depr. Aubertibiella Mann (Tumidella S.V.)

8. 1 " Fascella Fr mit Asclepias. Sucht lange nicht wieder so schönes und so scharf gezeichnetes Exemplar.

Cinnamomeana, Abietana, Fischeriella, Granitella, Fundella & Trapezinella besitze ich in schönen Stücken häufig, habe aber dasselbe, in der Hoffnung sie wieder zu erlangen, es wird an meinem Freunde verschrieben, daß ich jetzt selbst nun selbst häufig damit versehen bin. Sodann auch mit Simplana, Maculana, Monachana, Obtusella & Impurella, die übrigens hier nun sehr schwierig zu erlangen. Obtusella, damit sie nicht fehlen, ist seit 2 Jahren nicht wieder gefunden worden, war auch in Asclepias mit Tolosericella das Feld räumt. Tetrana & Flavicinctella erhielt ich jetzt aus Rheinhessen, und sehr viele Exemplare. Fuligeriana ist auch selten, auch meine Pomariana, Adelphella wurde damit von dem jetzt für die Entomologie abgestorbenen Dr. Fischer schwerlich angezogen, und auch selten in Ungarn gefangen. Moritziella ist nun, seitdem Dr. Moritz nach Columbien gereist ist, nicht wieder gezogen worden. Von Ceratoniella habe ich alle an H. Schmidt erhaltenen überflüssigen Exemplare, auch selbst, und besitzen keine mehr keinen.

Ich glaube, daß Ihnen die folgenden Arten angenehm sein werden:

Nr. 9. 2 Bomb. Detrita ♂♀, gezogen. Man erhält Falter nun gefangen.

10. 2 Zygae. Minos Var. Von Falter mit schwarzen Minos Flecken gezogen. Interessant wäre es, wenn diese var. N. Amerikanisch wären.

11. 2 Bot. Fallidalis Hw. 115. Raupe Falter gezogen. Meinen Wissens noch kaum hier und immer nur bei den südlichen Rheinpfalz, selten Trift. Ungarn und Dalmatien angiebt. Ist Repandalis S.V. & Mus. Schiffern. (Repandata Fab.) und Repandalis Hw. Verz. beitr. Schm. N. 3402. Die Trigonalis L. ist Trigonalis S.V. & Hw. Verz. beitr. Schm. N. 3384 (Repandalis Hw. 64). — Ich sie also bei Hamburg in der Gegend beider, aber ganz selten. Ob die Ungarische bei S.V. nicht auch nicht, das wird durch Fabricius genaue Beschreibung entschieden.

12. 1 Ypon. Evonymella L. Var. mit schwarz angeflogenen Hinterflügeln, mehr als selten vorkommt. Hier ist in der Raupenzeit nach viel zu häufig; denn Evonymella kommt nun an Prunus padus, Padella nun an Prunus spinosa und Cognatella nun an Evonymus europ. vor. Die Falter von der Alten Begattungen sind noch von hiesigen gefangenen Exemplaren, der Falter in der Isis 1838 IX. X. 637 vollständig nun aufgeklärt.

13. 1 " Malinellus Zell. Hier gewiß eigentlich nur Cognatellas aufgefunden hat, denn Raupe auf Cognatellas lebt. Cognatellas ist größer, aber variirt sehr in der Größe, sind stets einen schwarzen Vorderfleck und die Franzen sind auf beiden Flügeln schwarzweiß. Malinellus ist kleiner, variirt nicht in der Größe, und deutliche Exemplare im Mittelraume der Vorderflügel, die aber auch einige Männchen zeigen, die Franzen sind auf den Hinterflügeln ganz. Die Raupen sind etwas, die auf der Futterpflanze nach meiner von Cognatellas verschieden. Eine ausführliche Beschreibung steht in der Isis 1838 IX. X. 671 von Zeller.

14. 1 Hamyl. Pastinacinella Zell. (Heracleana Sepp. II. 1. 299. — Lim.?, Pauella Bechst.) Die Raupe in Frankenberg und Offenbach häufig in den Dolden von Pastinaca sativa und Heracleum sphondylium.

15. 2 " Chaerophyllinella Zell (Depress. Chaerophylli Zell. — Isis 1839. III. 196) Raupe auf Chaerophyllum bulbosum, bei Glogau.

16. 2 " Pimpinellae Zell. (Depress. — Zell. Isis, wie oben), auf Glogau, Raupe auf Pimpinella saxifraga. Falter der Depressella Hw. 407.

17. 2 Serie. Euphorbiana Zell. Raupe bei Glogau im Juli; kommt auch in Ungarn aber selten vor. Die Raupe auf Euphorb. palustr. & lucida.

18. 1 Graph. Amygdalana Schmidt. (Hübner selbst in Caryocapsa) Schmidt fand sie in seinem Garten Magazine an Mandelschalen Glogau.
2 Falter aufgefunden sie auf Flügeln, die in mancherlei Schmetterlingen, einen Einfall bildend, sich befanden, und H. Mann 2 Falter aufgefunden sie auf Flügeln, die in mancherlei Schmetterlingen, einen Einfall bildend, sich befanden, und H. Mann
hier in Linz & Falter in Schmetterlingen bei Wien. Ich vermisse, daß die Raupen in Ungarn selten sind. Bei Berlin
ist sie gefangen worden. Mamsa Raupe haben eine schwarze mondförmige Zeichnung auf dem Rücken wie Maculana &c.

N. 19. 2 Syph. Coronillana Zw. (Zelleriana Kuhlw.) Von der Sorbana T. und der Dissoluana nicht, aber auf mehr einer anderen Eichenart; äußerlich arg, die alle äußerst gern untereinanderfinden sind. Die gegenwärtige fliegt in Böhmen und Sachsen im April & Mai im ganzen.

20. 2 " Spiniana Fis. Lag Wien und Glogau; die Raupe bald auf Ostfachen. Äußerlich der Epilobiana, die am Gebirge sehr dunkel gezogen ist. Ich bedauere, an dem kleinen Exemplar der Epilobiana meiner Sammlung nicht mehr abgegeben zu können. Die Fühlerart gibt wenig ich sie nicht schlecht.

21. 2 Tin. Sparsana S.V. Diese und ihre 3 nächsten ähnlichen Abänderungen, wenden die gewiß, wenigstens zum Theil [illegible] sitzen. Ich schicke diese Gruppe bloß um den folgenden Bemerkungen willen.
Sparsana und Scabrana S.V. sind nach dem Mus. Schiff. und nach der Diagnose in S.V. eine Art, nur die Eleven Tab. sicher gesagt. Scabrana Mus. Schiff. gehört das Original von Scabrana Hb. 169 gewesen zu sein, sie äußerlich sind sie sich. Sparsana (Spurcana) Tab. ist gewiß Sparsana Mus. Schiff. — Sparsana kommt in den Sand- wie die gegenwärtigen Bücher sind, wie auch bei Glogau war, die übrigen Varietäten wenden sich nicht. Ich habe erhalten aus meinen Raupen in Böhmen viel Exemplare der Varietät der Buringeriana, Buringeriana, Radiana, Cambustana, Goldmana Aquilana, und wenige Exemplare der Scabrana Hb. und die gewöhnlichen Abänderungen. Man sieht aus den gegenwärtigen Figuren, die Exemplare für Scabrana Hb. 169 und die Exemplare für Scabrana Hb. 58 gehalten, aber in der Fig. 58 gehalt nicht genau, sondern ist eine helle Varietät von Albicistana; Bühners erhielt das Original von Kuhlw., welches sich noch in dessen Sammlung (jetzt bei Kaden in Dresden) befindet.

22. 2 (Anarsia) Spartiella Schrk. (Zw. Isis. 1839. III. 198) fliegt im Juni in verschiedenen Ländern. Die Raupen auf Genista tinctoria. Die Falter der beiden Geschlechter sind verschieden, [illegible] ist das Lebensbild verstellt.

23. 1 Cochyl. Epilinana Zw. In Böhmen und Schlesien im Mai und Juni mit an den Leinstaude, und wie auch Zimmermann angiebt zu finden. Sehr ähnlich der Rubellana, Richteriana und den folgenden, doch ist wie die Lebensart auch sicher eigene Art.

24. 1 " Dipsaceana Mann. bei Wien im Juli & August wie auf Dipsacus sylvestris. Cirsiana Hb. ist ab gewiß nicht, die aber so gewiß nicht zu Rubellana gehört.

25 2 Lita Scabidella Zw. (Gelechia — Zw. Isis. 1839. III. 199) auf Dissimilella Tr. welcher Raupe aber nicht beschrieben wurde, da Treitschke sie auf Velaucella Fr. gemischt und diesen Irrthum berichtigen soll, dessen ich für Ihnen zur Kenntniß setzte. Übrigens in Böhmen auf Knautia fliegen.

26 1 " Lentiginosella Fis. (Gelechia — Zw. Isis. wie oben) Ich halte sie für die Obscurella Hb. 438, die Linnéische die Obscurella S.V. 4 Tr. ist, denn diese ist die Subsequella Hb. 161. Fliegt im August in verschiedenen Ländern, und die Raupe bald auf Genista tinct.

27. 2 " Striplicella Fis. Bei Wien häufig im Juli. Die Raupe auf Atriplex.

28. 2 " Obsoletella Fis. auch häufig bei Wien im Mai wie bei in den August; die Raupe bald in den Blättern der Pappeln Atriplex und Chenopodium arten.

Mein 16te Heft wird die Vaterlandsgeschichten von Populella L., Striplicella Fis., Obsoletella Fis., dann die Abänderungen von Subsequella Hb., Scintillella Fis, Velocella Fr., Terrella Hb., (Lepidotella Tr.), Distinctella Z. & Lentiginosella Fr. — alles sehr verwandte und schwierige Arten — enthalten.

29. 2 " Naevulella Fis. (Gelech. Stipella Hb. 138. Zw. Isis 1839 III. 202, vereinigt mit Naviferella Zw.) Dieses ist jene Art, von Heinemann, woraus ich schon lange Ihnen Striplicella geschrieben habe.

30 2 " Paucipunctella Metzner. (Gel. — Zell. Isis 1839. III. 202.) auf Schlesien, Bautzen auf Linde, in Ungarn und in der Schweiz von, dessen ich vermuthe, daß die diese Art, oder wenn einen anderen Namen beizulegen wandern.

31 2 Elach. Albifrontella Hb. 432. (Zw. wie oben 212) in Mecklenburg & Schlesien, in Juni & Juli in schattigen Wäldern. Man sieht diese, doch jene schlesische Art für Hübners 432 gehalten, wie glaube ich, diese wird die wahre sein.

32. 2 Adela Associatella Tr. (Zeller wie oben 156) in Schlesien häufig, in Böhmen selten. Ich kenne kein anderes Vaterland, und möchte fast vermuthen, daß die diese Art auch nicht beizulegen, dessen ich 2 übrige, ungepaarte beisitzende. Sie wurden in meinem 14te Hefte diese Art schon kennen gelernt haben, die Raupen sind viel schlanker.

33. 2 Tinea Misella Z. (Zw. wie oben 189) Nahe mit Pellionella und anderen verwandt, aber selbstständige eigene Art. Ohne Zweifel kennen Sie sie schon, und ich werde bloß bei, um Sie mit ihrem Namen bekannt zu machen.

34. 2 Adela Bimaculella Fis. (Conformella Z. Var. Isis. 186) In meinem 14 Heft bekannt gemacht.

35 2 Ornix Anglicipennella Hb. 321. (Zw. 209 Gracilaria —) gezogen. Ihnen wahrscheinlich schon bekannt.

36 3 Gracilaria Cuculella Z. (Cuculidis Zw., Isis 209) auf Schlesien und Böhmen. Im Juni & Juli nach Zimmermann auf Cucubalus spinosa.

Cerusillana Zw. (Zelleriana Rebel.) Von der Inscana T. und der Dissecana nicht, aber auch mehr einer anderen Eichenart, ähnlich sind, die Falter durchaus ganz unterschieden sind. Die gegenwärtige fliegt in Oesterreich und Ungarn in April e. mai in grosse.

Spiniana Fr. Lag Wien und Glogau; die Raupe lebt auf Ostfachen. Ähnlich der Ephippiana, die am Zäunen festgetrocknet gegeben ist. Ich bedauere, mit dem Kleinen Vergleich der Ephippiana meiner Sammlung nicht mehr abgeben zu können. Die Früchte Zeit noch ist sie nicht selten.

Sparsana S.V. Diese und ihre ähnlichen ähnlichen Abänderungen, wenden die grauen, wenigstens zum Theil bei folgen. Ich füge diese Gruppe blos um der folgenden Bemerkung willen.
Sparsana und Scabrana S.V. sind nach dem Mus. Schiff. und nach den Originalen in S.V. eine Art, wenn Eleorana Tab. fulva gehört. Scabrana Mus. Schiff. gehört das Original von Scabrana Hb. 169 gewesen zu sein, ist ähnlich sind die Fab. Sparsana (Spurcana) Fab. ist gewiß Sparsana Mus. Schiff. — Sparsana kömmt in den Gärten wie die gegenwärtigen Gärten sind, mischend bei Dresden und bei Glogau vor, die übrigen Varietäten wenden selten vorgezogen. Ich habe vorhalt aus meinen Raupen in Oesterreich viel häufiger die Varietät der Buringeriana, Byringeriana, Radiana, Cambustana, fuliginea Agnilana, und wenige häufig die Scabrana Hb. und die ganz dunklen Abänderungen. Man sah nun die gegenwärtigen Arten die gallischen für Scabrana Hb. 169 und die ungarischen für Scabrana Hb. 58 gehalten, allein die Fig. 58 gehört nicht hierher, sondern ist eine helle Varietät von Abietana, Hübner vorhält das Original von Kuhlw., welches sich noch in dessen Sammlung (jetzt bei Kieder in Dresden) befindet.

W. Ca) Spartiella Schrk. t.2 (Zeller Isis. 1839 III. 199) fliegt im Juni in verschiedenen Ländern. Die Raupen auf Genista tinctoria. Die Falter der beiden Geschlechter sind verschieden, [redacted] ist bei Ludyland verstäubt.

Epilinana Zw. Im Oesterreich und Ungarn im Mai und Juni mit an den Leinfeld, und nur durch Zusammenhaltung zu finden. Sehr ähnlich der Rubellana, Richteriana und der folgenden, doch ist ein die Falter auch finden eigene Art.

Dipsaceana Mann. bei Wien im Juli e. August nur auf Dipsacus sylvestris. Exemplare Hb. ist es gewiß nicht, die nächsten so gewiß nicht zu Rubellana gehört.

Scabidella Zw. (Gelechia — Zell. Isis. 1839 III. 199) auf Dissimilella Fr. welche Raupe aber nicht beisammen wurde, da Falter diese Art und Velocella Fr. gemischt und dieser Raupe ist für Ochsenheimer Sammlung bestimmt. Räupchen in Februar auf Jungen Pflanzen.

Contiginosella Fr. (Gelechia — Zell. Isis. wie oben) Ich halte sie für die Obscurella Hb. 438, die Beschreibung die Obscurella S.V. u. Fr. ist, dann diese ist die Subsequella Hb. 161. Fliegt in August in verschiedenen Ländern, und die Raupe lebt auf Genista tinct.

triplicella Fr. bei Wien häufig im July. Die Raupe auf Astragalus.

soletella Fr. auch häufig bei Wien von Mai an bis in den August; die Raupe lebt in dem Mauer der Raupen von Astragalus und Onobrychis arten.

Mein 16te Heft wird die Naturgeschichten von Populella L., Astragalella Fr., Soleletella Fr., dann die Schmetterlinge von Subsequella Hb., Semitella Fr., Velocella Fr., Terrella Hb., (Ephippella Fr.), Distinctella Z. & Contiginosella Fr. — alles sehr verwandte und ähnliche Arten — enthalten.

Nebenst. d. Mittheilungen Englischen Zeitschrift Auszug Ihre Entdeckung Von denselben Gattungen

ulella Fr. (Gelech. Stipella Hb. 138. Zell. Isis 1839 III. 202, vereinigt mit Nivisella Zw.) Dieser ist jene Art, eine Varietät, welchen ich schon bey Ochsenheimer Astragalella gefunden habe.

Alchipunctella Metzner. (Gel. — Zell. Isis 1839. III. 202.) auf Ostfachen, kommt auch hier, in Ungarn und in der Schweiz vor, dieses ist wahrscheinlich, dass die beide Art, oder wenigstens nur eine andere Varietät darstellen mögen.

Albifrontella Hb. 432. (Zell. wie oben 212) in Mittelungen in Ostfachen, in Juni e. July an schattigen Orten. Man sah bald diese, bald jene ähnliche Art für Hübners 432 gehalten, wie glaube allen, diese wird die wahre sein.

Associatella Fr. (Zeller wie oben 186) in Ostfachen häufig, in Oesterreich selten. Ich kenne kein anderes Vaterland, und möchte fast vermuthen, dass die diese Art auch nicht dazugehört, dieses ist 2 übrige, ungesammelte Exemplare. Die Raupen in mehreren 14 Tagen diese Art schon kennen gelernt haben. Die Puppen sind vielfarbig.

Misella Z. (Zell. wie oben 184) Nahe mit Tetricella und anderen verwandt, aber mehrfarbig einzige Art. Ohne Zweifel kennen die Raupen, und ich habe blos bis, um sie mit ihren Namen bekannt zu machen.

Bimaculella Fr. (Conformella Z. Zell. Isis. 186) Die mehrere 14 Tage bekannt gemacht.

Thasianipennella Hb. 321. (Zell. 209 Jesiella —) gezogen. Ihren merkwürdigen Raupen bekannt.

Cnoniella Z. (Cnonidis Zell., Isis 209) auf Ostfachen und Oesterreich. Die Juni e. Juli nach Kennen Umfang auf Cnonis spinosa.

N. 37. 2 Coleophora Fetterella Zw. (Coleph. Vulnerariae H., Stt. 207.) Hyères und in Oesterreich im Juni
vulnerariae.

Von den Coleophoren besitzen wir eine grosse Anzahl männ Arten, die
nöthig, dass man mit dem Microscope die Kolbenspitze unt

38. 2 Coleph. Zellerella Fr. Von der folgenden Coleophora, die ich kenne. Die Zeit sah ich nur einz
a männ Weibe, und stimmt mit niemand, in Ungarn am Schilfgras a Chenopodium
und gezogen wollen. Junge Säcke wie angegeben die Raupe, finden sich
Ende Juli Falter, breit, langsäumig, an den kleinen Blattminen gebaut,
Pflanze fliegen. Im Gebirge scheint sie den Buch horizontal an den Zweig
Buche spannt, breitet sich dann den Rumpf [illegible], und in das Mark [illegible]
die Raupe der Cibella die beiläufig gerade, nicht wie Mark, sondern
labil) übereinander. Auch mit ihr waren gerathene wirklich nicht,
Pflanze liegen. Man findet an manchen Rumpf 30–40 kleine Löcher
schmutzbraun röthlich. Schuldig über allen Raupen bin, wenn ich sie
Land machen. Ich setze diese Art der Raupe Laricornella [illegible]
nicht befriedigt gefühlt, wie schwarz der aufgelegte Firniss beim Raupen
ist fast ohne ganz verschwindet. Ist mir diese Raupe aber nicht gefällig
färben kann, und nicht der Fall ist, so werde ich sie bey den Coleophoren
beilegen, da sich die Falter wirklich begattet hat, und so diese Raupe
sicher gehören, schliesse auch nicht sie benennt zu wissen.

39. 1. Gracilaria Rollariella Fr. (Stt. 209) bey Wien im Mai im Gebirge. Es scheint, dass sie in Raupe verändert

40. 1 Blach. Acerifoliella Fr. (Lithocolletis —— Stt. 217) Zum Vergleich mit Ihnen sehr ähnlichen Arten
a Oesterreich war, sind sonders mir sie noch nicht. Die Raupen auf Acer

41. 1 " Kuhlweiniella Zw. (Lithocolletis —— Stt. 217.) Kuhlwein fällt sie für Hortella Fab. ab
Flügelspitze fast ein schwarzes Schwänzchen. Klingt schon im Mai.
und gezogen in Eichengebüsch. Nach sehr selten, dass man sie schlecht

42. 1 " Müllerella Zw. (Lithocolletis —— Stt. 217) In Mai a Juny in Eichengebüsch, bey Gloga

43. 1 " Albedinella Zw. (Lyonetia —— Stt. 216) Der Clerkella ähnlich. Fast a bei Hyères in

44. 2 " Fritillella Fr. (Zwei wenigstens in der Stt. 218 mit Populifoliella Tr.) Populifoli, die ich
Zweig, oben ganz hellbraun, und die Raupe bald, viel heller, wie auf
dem. Fritillella, nur Tischer häufig angegeben kommt häufig vor und
so bald wie auf Popul. italic.

45 2 " Abrasella Fr. In Eichengebüsch bei Wien im Juni sehr gemein.

46 2 " Fröhlichiella Zell (Lithocolletis —— Stt. 218.) Der lembergiana ganz Bank, Klemannella
aber bestimmt verschieden sind. Im Mai im Salon; Juny, in Mecklenburg

47. 2 " Alnifoliella Hb. 193. Bei Wien im Juli im Gebirge. Eine weiße Art Blatt in andern
Diese ist die Raupe. Sie variirt in Grün und Braungelb.

48. 1 " Rajella Linn (Alniella Fisch. —— Zell. Stt. 217.) Es ist sehr, dass Linnés Beschreibung
Beschreibung deutlich wird. Diese stellt man bisher für Alnif
auf Salix a Oesterreich.

49. 1 " Semifoliella Fr. (Myrtilella Hb. 272?) Im April a Mai in Gebirgen.

50 1 " Salicifoliella Fr. Im Juli an Weiden; verschieden von allen ähnlichen.

51 1 " Blancardella Fab. a Tr. (Stt. 218) Wien habe diese Art für Blancardella Fr. erzogen
weiß mehreren andern aber auf verwandten Bäumen.

52 1 " Quercifoliella Fr. (Stt. 217.) Gewiß verschieden von der andern. Im Gebirge a
Ich mache Ihnen meine Zeit auf 6 bis 8 Wochen gefärbige Arten Schilfen Bäumen,

53 2. " Freitschkiella Mann. Wien im Juny a July in Gebirgen.

54 2 Elach. Septadactyla Tr. Im August bey Wien und in Oesterreich nicht selten. Ich schicke sie blas
Bemerkung, dass Lithodactyla Tr., nicht dem Vaterland ist.

55. 1

56. 1 Müll, dem
dung gab
die Abweichung

57. 2 Gebirge an
wie Stettin

58. 1. Ich Stelle als Ihnen
jetzt Bemerkungen
nicht, die

59 1 [illegible]

60 1 Zell

März

37. 2 Coleophora Fetterella Zw. (Coleph. Vulnerariae L., Stt. 207.) Hier und in Nassau im Juni & July auf Statice vulneraria.

Von den Coleophoren besitzen wir eine große Anzahl Arten, sie sind sich aber oft so ähnlich, daß man nur mit dem Microscope die Verschiedenheit wahrnehmen kann.

38. 2 Coleph. Zelleriella Tr. Eine der schönsten Coleophoren, in ihr Genus. Die Zeit der Falter mir nur einzig in einer Generation in Mitte Juny, sonst auch nicht häufig, in Augusto um Aldringen in Lothringen gefangen, und zwar nicht selten. Die Raupe lebt in der Samenkapsel der Statice armeria, frißt sich durch den Rand ein, und macht dasselbst einen, wenn sie, wie die Raupe der Cibiella sie beinahe verlassen will, neuen Sack, sondern gräbt in den Blüthenboden (Kelch) über einander. Sack mit ihr weiter verfertigt, wächst sie, da sie so oft auf im Winter stillstehen liegen. Man findet an manchen Pflanzen 30–40 solcher spiralförmiger Säcke, und selten abgefressene Köpfe. Schwierig über alles Lob hin, macht sie ganz Raupenfreunde die Lust machen. Ich hatte diese Art den Namen Statricomella "Goldfransig" gegeben, und damit recht lächerlich gefunden, wie ebenso die nächstfolgende Gruppe seinen Namen gleichfalls hat, dann sah ich sie selbst ganz verworfen. Da mir dieser Name aber nicht gefällt, weil er auf Goldfransig passen kann, und nicht das Thier, so wende ich ihn lieber die Beibehaltung des Namen Zelleriella bei, da sich Hr. Zeller selbst dagegen soll, und es diesen Herrn nicht wollen, mir nicht so sehr gefallen, schließe ich mich ihm lieber an.

39. 1. Gracilaria Vollariella Tr. (Stt. 209) bey Wien im Mai im Eichen. Gesellig, daß sie in Minen unter einander gegen Regen sammeln.

40. 1 Blach. Acerifoliella Tr. (Lithocolletis — Stt. 218) Zum Vergleich mit ihren sehr ähnlichen Acharparcella. Lebt in Ahorn- & Eschenblätter, sind sonderbar minirt, sie nach nicht. Die Raupen nicht stets comp. —

41. 1 " Kuhlweiniella Zw. (Lithocolletis — Stt. 217.) Kuhlweinii fällt sie für Ulmifoliella Hb. aber nicht mit Unrecht. Die Flügelspitze hat ein pfauenaugenähnliches Schwänzchen. Fliegt schon in Juli. Mehr Falter in Mai beisammen als später in Sommergebüsch. Nach Hrn. Heller, dessen mir ein schönes Stück zur Bestimmung schickt.

42. 1 " Müllerella Zw. (Lithocolletis — Stt. 217) Im Mai & Juny in Eichengebüsch, bey Hagen ziemlich gemein, Hrn. Heller.

43. 1 " Albedinella Zw. (Lyonetia — Stt. 216) der Clerkella ähnlich. Hier & bei Hagen in Mai & Juni an Pflaum.

44. 2 " Fritillella Tr. (Zwei zweifelhafte in der Stt. 218 mit Populifoliella Tr.) Populifol., die ist ganz, sehr gemein, aber sehr selten, und die Raupe bald, viel schöner, mit weiß gelben Linien von Popul. tremula. Fritillella, nur Tischer häufig angegeben Linné häufig hier und fast überall nur, und die Raupe bald nicht auf Popul. tremula.

45 2 " Abrasella Tr. In Eichengebüschen bei Wien im Juni sehr gemein.

46 2 " Frölichiella Zell (Lithocolletis — Stt. 218.) Die Lonicerae ähnliche Mine, & Klemannella & Schreberella Tr. sehr ähnlich aber bestimmt verschieden sind. Im Mai um Salzburg; Linz, in Niederösterreich, Ofen, Hr. Frölich.

47. 2 " Alnifoliella Hb. 193.[sic] bei Wien im Juli um Salzburg. Hier mollella sehr selten in andern Arten suchen, ist schön aber diese ist die häufigste. Sie variirt in Grau und Lehmgelb.

48. 1 " Rajella Linn (Alnifolia Tischr. — Zell. Stt. 217.) Zu sagt, daß Linnés Beschreibung nicht mit Degeers Abbildung & Beschreibung deutlich wird. Diese stellt man bisher für Alnifoliella Hb. — Azaila & Mai auf Salix & Populus.

49. 1 " Semifoliella Tr. (Nepticula Hb. 272.?) Im Aprill & Mai in Gartenhäusern.

50 1 " Alicifoliella Tr. Im Juli an Eichen; manchmal auch Buchen.

51 1 " Blancardella Fab. & Tr. (Stt. 218) Wien habe diese Art für Blancardella Tr. angenommen, allein man muß mehrere andere Arten auf unsere Bäume.

52 1 " Quercifoliella Tr. (Stt. 217.) ganz sicher verschieden von der andern. Im Herbste & Frühl. an Eichen.

Ich mache Ihnen meinen Zeit auf 6 bis 8 sehr gefällige Arten Falter Bäumen, die ich jetzt nicht schmetterlinge finden.

53 2. " Treitschkeiella Mann. Hier im Juny & July in Gartenhäusern.

54 2 Micr. Septadactyla Tr. Im August bei Wien und in Ofen nicht selten. Ich finde sie blaß dem Thier nahestehend zu Bemerkung, daß Lithadactyla Tr., nur ein Varietät ist.

55. 1 Alec. Megadactyla Tr. b mit Pfl[ege], wo sie anfangs Juny häufig an grossen Pflanzen in Himbeerg., Brämb. gefunden wird. Ich fallen ist für Hübner's Cat., und für Megadactylus Tab. (Isis. Leon, 1838 H. X, 727). — Tesseradactyla L. ist mir nicht sicher, obschon die Zeich. passen könnte und Text. unbedingt fehlt. Sie ist auch nicht Megadactyla W. denn sie ist als gelbe in Madeira Schiff. stehende Exemplare ist nicht anders, als eine helle fast abgeflogene Orthodactyla Tr. 12.13. eine weitere Bestätigung der Beschreibung der S.V. muss ich zweifeln. am besten passt mir Hübner's schlecht colorirte Megadactyla Tr. b. Tab. in Mus. Schiff. — unter dem Namen Pentadactyla stehende Exemplare mir auch die Beschreibung der S.V. zweifelhaft. Das Exemplar ist deutlich verblichen, aber doch deutlich genug zu erkennen, dass es weder eine Orthop. noch für eine verwandte Caladactyla S.V. halten konnte, welche die Cosmodactyla Tr. ist. Caradactyla des Fabricius ist einmal gewiss als ächter Megadactyla Tr. mit Asplenii und diese ganz Bäumliche und sehr in Exemplare sind in Juni mit Blatten gefangen, jedoch nie in wenigen Raupen, dass es noch nicht aufgeklärt will, ob es Varietäten oder eine eigene Art ist. Die Abbildung bei ist für uns nicht massgebend, wohl aber scheint sie für die grossen Exemplare mit Unguicularis und Cynoglossi, wie sie in Gallien der gewöhnliche Variation fliegen soll.

Didactyla L. wurden mir mehrere oder weniger, weniger aber ich selbst noch nicht in Klarheit bin, da die Abbildungen Hübner's gaben keinen Aufschluss. Zeller hat in der Isis 1839 H. V. viel Neues gesprochen. Die Exemplare hat sie Mus. Schiff. den Namen Trichodactyla; sie ähnelt grösseren Stücken, ganz genau übereinstimmend, aber gewöhnlich kleinen Exemplare, als Didactyla L. und als Chrysodactyla. Nun gibt es noch eine viel grössere Art, die grossen Flügel, den mittleren ganz gleich Raum, aber der Schuppenbusch der hinteren Hinterflügelfedern ist grösser, aber auch breiter Schwanz Ausschnitt. Sie kommt nur auf Madeleine vor, und hat noch keinen Namen. Sein der mittleren Form verwandte, aber grössere Art, so kann Hinterfl.-Federn das Schuppenbusch muss in der Mitte stehen, hat Zeller Pterophl. Tristis genannt, und nun ganz klein, mit ähnliche aber auf Vaterland verbreitende, aber kleine Art, die kein Schuppenbusch an den dritten Rückenfedern hat, heisst Pterophl. Hexadactyla Ent.; in der Isis VI. V. 277. nennt sie sie Pterophl. paludum.

56. 1 Micropteryx Fastuosella Zr. Ich Ihnen gewiss bekannt, stehe hier aber deshalb bei, um Ihnen zu zeigen, wie unsere Fastuosella ist, indem ich die Synonyme ganz in Hydroecilla und Zebrinella wünschte. (Isis. 1839 III. 185) — Sie ist sehr verwandt mit Spermannella Fb. n. W. 298. — Ich bin sehr geneigt, Spermannella F., Fastuosella Zr., Staudingerella Mus. 382 und Spermannella Fb. n. W. 298, gleich zu setzen, als diese sehr natürliche selbst (Hübner ist zweifelhaft mit Mariaella S.V., Albimanella Tab. [illegible] v. Dryadella Fb. [illegible]) für Raum dieser Synonymie, sonder es für zweckmässig an die Synonymie gewünschte Abgrenzung zu setzen, dieser ist für uns nicht wünschenswerth und erwünscht sein, wenn aber bald geschehen soll, oder sogar Sie sie gut?

57. 2 Gelechia Superbella Tr. (Isis. 202.) Sehr häufig im Juni auf dem hiesigen Beifuss-wall, an Artemisia vulgaris und andern Pflanzen.

58. 1. Hyponomeuta Humerellus (Humerella S.V. W. 292) mit Chilonellus Tr. u. Sicariellus Z. sehr verwandt. (Isis 189) — Ich sehe sie [illegible] habe, dass Hübn. diese, seine Arten bis jetzt in einem Gespinnst und nicht aufgenommen hat. Im Juny July auf Raupen Nahrung von Euphorb. cyparissias [illegible].

59 1 " Sicariellus Zr (Isis 189) Nicht so gemein wie die Vorige. Fliegt in July u. Aug. auf andern Nahrung.

60 1 Lithocoll. Kilmannella Tab. (Isis, 218) W. 294 (sehr selten) im Mai in Sammlungen auf Sambucus nig. Zur Vergleichung Schreberella Tr.

März 1840.

Fischer v. Röslerstamm

Aler. Megadactyla Zk. 6 mit Pfl[ügen], wo sie dasselbe Feld fünfzig neunzigen Pflügen in Hinsicht gefunden wird. Ich halte sie für Hübner's Art, und sie Megadactylus Tr. (Isis. Lem. 1838 IV. X. 727). — Pterodactyla L. ist mir nicht klar, obschon sie Zinck. besser nennt und Treit. unbedingt folgt. Sie ist auch nicht Megadactyla L.V., denn die als solche im Museum Schiff. stehende Exemplar ist nicht anders, als eine sehr fette abgeflogene Orthodactyla Zk. 12.13. auf welche die Diagnose bei S.V. nicht gut passt. An besten passt auf Hübner's Megadactyla fig. 6 bei Tr. Schiff. — unter dem Namen Pentadactyla stehende Exemplar auch die Diagnose bei S.V. passt. Bei Tr. ist sie freilich verschrieben, aber doch deutlich genug kenntlich, ich bin [illegible] nicht, wie Ochs. diese für eine verschiedene Caladactyla S.V. halten konnte, welche die Cosmodactyla Tr. ist. Pentadactyla der Sammlung ist etwas grösser als unsere Megadactyla Zk. und diese ganz Hübner und sehr in Bezug auf Grösse gut, ganz wie in meinen Händen, sehr ich noch nicht entscheiden will, ob Local-Varietät oder eine eigene Art ist. Den Pflanzen Art ist mir hier noch nicht vorgekommen, wohl aber erhielt ich sie in großer Zahl aus Ungarn und Pyrenäen, wo sie in Gesellschaft der grossen Mastax-Maler fliegen soll.

Didactyla L. werden mehrere Arten vermischt, worüber ich aber selbst noch nicht im Klaren bin, da mehrere Abbildungen Hübner's gleichen Anspruch haben. Zeller hat in der Isis 1839 IV. V. die Synonyme geschieden. Er nennt sie in Mus. Schiff. den Namen Trichodactyla, die allerdings grösser, stahl, ganz genau übereinstimmend, aber meinetes Wissens Tafelbild, als Didactyla L. und als Chrysodactyla. Mir scheint sie noch eine viel grössere Art, die grossen Hörner, den mittleren ganz gleich kennt, aber der Schuppenbesatz der dritten Hinterflügelfeder ist grösser, der Rand [illegible] Schwanz [illegible]. Sie kommt mir als Madeburg, und sie nach Bremen Museum. Eine, der mittleren sehr verwandte, aber grössere Art, wo dann Hinterrand. — Leben der Pflanze, wo sie in den Mittelstadt, sehr selten Pterophr. Tristis gemein, und eine ganz kleine, mehr ähnliche und mehr Tentaculum verbreitende, aber sehr schöne Art, die beim Schmetterling an der dritten Rückenfeder sehr, heißt Pterophr. Pentadactyla Zell., in der Isis IV. V. 277. nennt sie sie Pterophr. paladum.

Fastuosella Zk. Ich [illegible] gemischt bekannt, [illegible] aber deshalb bei, um Ihnen zu zeigen, was unsere Fastuosella ist, indem ich die Ansicht ganz in Hydraciella in [illegible] wünschte. (Isis. 1839 III. 185) — Sie ist sehr verwandt mit Spurcatella Tr. u. W. 298. — Ich bin sehr geneigt, Spurcatella Tr., Fastuosella Zk., Stadenschella Hw. 352 und Germanella Hw. 388, [illegible] [illegible] (Hübner ist zugleich auch Mariaella S.V., Albinella Tr. [illegible] v. Diphtherella Tr. [illegible]) für keine [illegible] Schmetterlinge, sondern sie für zufällig an die Schmetterlinge gewachsene Phrygianen zu halten, [illegible] ich sie noch nicht mikroscopisch untersucht habe, was aber bald geschehen soll. [illegible] [illegible] Sie [illegible] zu.

Lethia Superbella Tr. (Isis. 202.) Sehr [illegible] im Juni auf den [illegible] Linnaeella, an Lotus [illegible] Pflanzen.

Scolopax Humerellus (Humerella S.V. W. 292) mit Chilonellus Tr. & Sicariellus Z. sehr verwandt. (Isis 189.) — Ich [illegible] [illegible], dass Tr. Sicariellus [illegible] ganz [illegible] Art [illegible] [illegible] [illegible] Falle auf Linnaeus Halle [illegible] Hospital. arenarium [illegible].

" Sicariellus Zk (Isis 189) Nicht so gemein wie die [illegible]. Fliegt im Juli & Aug. [illegible] auf [illegible] Halle.

Scell. Vilesmannella Tab. (Isis, 218) Hw. 284 (sehr selten) im Mai in Sammlungen auf Sambuc. sig. Zum Vergleich mit Schreberella Tr.

Mr. Var. Lud. [illegible] Z. [illegible] 1840.

Lüscher v. Röslerstamm

277

157

58 Elachista adjectella Hydr. Aug. Mai.
59 — bifasciella Tr.? Mai
60 — blandella Hydr. Mai
61 — congenerella Hydr. Juny
62 — mistella Hydr. Mitte Juny
63 — modestella Hydr. Aug. Augst. auf einer nassen Wiese
64 — praecicella Hydr. Ende Mai auf Trifolium montanum. Megerlella Hb.
65 — 8-guttella Hydr. Ende Mai auf Trifolium montanum)
— argentiferella Hydr.

Nov.

276

156

Nro. Namen
1. Myelois Fuliginatella Hydr. Ende Juny von Birken geklopft
2 — tumidella. Mitte Juny von Eiche. Ende Juny Nessus von
3 — ? im July. Wird wohl von Rubrotibiella verschieden
4 Pempelia vomicella Hydr. Von Wiesbaden. Juny
5. — lororiella? Aug. July auf Pinsapo
6 — ornatella? Aug. July
7. — adornatella? — — —
8 — subornatella? — — —
9 Talaeporia Ephemerella Hydr. Mit Ayrit 1 mal gefangen
10. Tinea Hurnella Hydr. = Hellerella var. major?
11 — flavicentrella Hydr. Auf July im Tannwald um Mat Larella Hb. und
12 — vetustella Hydr. Ende Juny in Anzahl 1 mal.
13 — fulvifrontella Hydr. = ? angusticostella Hb. Mitte July auf einer Eiche
— cana? mulvella Hb. Juny Aug.
14 — corticella Curt. — — —
— fasciapunctella Haw. Anfang Juli. Mai bis Sept. in Häusern
15 Oehsenheimeria vivella Hydr. Juny im Wald im Haus. Juli im Wald
16 — — — vom July bis Aug. Juli im Wald
17 — — — — — — — —
18. Adela? auricilacella Hydr. Aug. July an Waldgras
19 Adela senicuprella Hydr. Mitte July auf niedrigen Blumen.
20 — Mollella? Aug. Augst. auf Pflanzen
21 — variegatellaHydr. Mitte July an Birkenstämmen (Mollella Hb. 164.)
22 Platella? incomtella Hydr. Juni vorzugsweise Von Vitella verschieden durch dunkle Flügel mit unterbrochen. Nadeln Aug. Juli
23 Cahantica sericeogenella Hydr. Aug. u. Mitte July auf Eichen einzeln.
24 Oecophora tetypella Hydr. Mitte Juni u. Aug. Juli an Eichenstämmen
— Angustella Hb. Wald
25 Oecoph. Stroemella Fab. Juni Juli. Mitte Juny selten Eichen. Wald

302

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Alucita Megadactyla Hb. 6 mit Pterophorus, wo sie anfangs selbst sämtliche ungeringen Pflügen in Himbeergesträuch gefunden wurde. Als sollen sie für Gibneri Hb. und für Megadactyla Hb. (Isis. Leon, 1838 H. X, 777). — Megadactyla L. ist es nicht sicher, obschon sie Zeller. Pterophorus annimmt und Treit. unbedingt folgt. Sie ist auch nicht Megadactyla W. denn Hb. als gelbe in Museum Schiff. stehende Exemplare ist nicht und auch, als eine gelbe selten abgeflogene Abredactyla Hb. 12.13. auf welches die Diagnose des S.V. nicht gut passt. am besten passt noch Zubmedactyla Hb. Megadactyla für. 6 Hb. in Mus. Schiff. — indem sie unter dem Namen Gonodactyla Stainton 4. verzeichnet wird die Diagnose des S.V. passt. Das Exemplar ist freilich verblichen, aber doch deutlich zu erkennen. Es hat keine weiße, wie Herrp. sagt für eine verblichene Caledactyla S.V. halten könnte, weiße die Cosmodactyla H. ist. Gonodactyla der Sammlung ist einmal genannt als unsere Megadactyla Hb. mit Abzeichen und diese ganz Sammlung und habe ich Standfuß sie in Juni auf Blättern gefangen, daraus nun in wenigen Minuten besser ich noch nicht entscheiden will, ob ob Varietät oder eine eigene Art ist. Die Abbildung der ist mir für mich nicht maßgebend, weil aber auffällt ist sie in gezogen Exemplaren und Eigenschaften der ganzen Raupe - Mulden fliegen soll).

Didactyla L.
Tasteten Abbildungen
Stämme und Fuß
Raupe Gänge, aber
Haar und andern Pflanzen
Zeller Pterophorus
Isis 1838 H. V. 777.
Pterophorus Fastuosus
ist, über
und Spreu
Annonella
Pagetulell
Phyllonorycter
Lithocletis Superbell.
Nemoxalophus Nemoxa
Sicariell
Tischeria Kleemannella
1840.

26. Oecophora Productella Zell. ? Frankfurt
27. —— Laminella ? Frankf
28 —— Fasperella ? id.
29 —— Albojattella Hydr. im July b. Ems
30 Depressaria miserella Hydr. Ende Juny, Anfang
31 —— murcidella Hydr. Mitte Juny, gezogen
32 Gelechia macidella. Hydr. Ende Juny Waldgebüsch.
33. —— aulicella Hydr. (subsequella Hb. 162) Mitte July gezogen
Mein Name muß wohl wegfallen — maculatella Hb. fehlt
Nach Gelechia velocella, Gallinella, Zebrella, Solutella, Terrella
bin ich nicht im Reine, doch würden sie zu viel zu
lange.
34. —— axillarella Hydr. gezog. Ende Juny
35. —— floricolella Hydr. Von Juny bis August auf blühen =? Senectella Zell.
36 —— molinella Hydr. Ende August an einer Fichte.
37. —— divisella Hydr. Ende Juny an einem Fichtenstamm.
38 —— signiferella Hydr. Ende July u. Aug. Aug. an einer Brettwand.
39 —— pavidella Hydr. Ende July gezogen.
40 Argyresthia simplicella Hydr.
41 Coleophora Spatulella Hydr. August auf Eichen
42 —— ornatipennella var. minor. July, August, grasige Waldplätze
43
44 —— Mergipennella Hydr. July August, grasige Waldplätze.
45. —— Tantalipennella Hydr. Mitte July auf einer Haide, wo in der Nähe keine Genista wächst.
46. —— excelsipennella Tisch.? Von Vibicella auch durch längere Palpen verschieden u. die Farbe.
47. —— gallipennella Hb. Ende Juny.
48 —— Colymbipennella Hydr. Ende Juny, Anfang gezogen
49 Gracilaria aceriferella Hydr. Mitte May auf Rubus gebüsch.
50 Ornix Jucundella Hydr. Auf August 1mal.
51 Elachista ochraceella Curt.? Auf July mit Epilobiella von Epilobium gezogen
52. —— Loribactta Charpentierella Hydr. Auf Juny
53. —— Egenella Hydr. Überwintert in Zimmer.
54 —— cornicella Hydr.
55 —— funebrella Hydr. Juny auf Rubus.
56 —— despectella Hydr. July an Hilf.
57. —— gracilella Hydr. Auf July an Echium.

67 - 1/2
6 1/2
43 / 3/4

//

157

Elachista adjectella Hydr Aug. Mai
— bifasciella Tr.? Mai
— blandella Hydr Mai
— congenerella Hydr Ende Juny
— nistella Hydr Mitte Juny
— modestella Hydr. Ende Aug Anf Sept an einer wasserr Pflanze
— praecicella Hydr. Ende Mai an Trifolium montanum. Zu Megerlella 776
— 8-guttella Hydr. Ende Mai an Trifolium montanum)
— argentiferella Hydr
— disjunctella? Anfang Sept. an einer wasserr Pflanze.
— olorinella Hydr Mitte Mai
— pigerella Hydr Ende
— susinella Hydr Ende Mai, Anf Juny im Wald.
Nepticula Myrtillella Hydr. Mitte Juny
— nigricomella Z.? Mai, Eichen.
— auroriella Hydr.
Lithocolletis cuella Hydr. Aug. Mai
— Blancardella Hydr.
— Hoffmannella Hydr. Ende Mai an Eichenzweig. Eichenblättern
— secutella Hydr. Anf. August
— Lautella Hydr. Dornb. Ende Mai u. Ende July an Eichblättern
— abditella Hydr. Dryobambus an Ulmenblättern.
Tinea? Reticulella 776. Mitte Mai einmal im Wald.
Gecophora? Tinea? relatella Hydr. Mitte Juny an einer Hecke

rigerella Hydr — — — — — — 1

Jan 1842 geschickt.
Ochsenheimeria Vaccalella Hydr 3 N.
Col. Vibicella nahe Park.

Aer. Megadactyla Fb. 6

Didactyla L.

Fastuosa

Sicaniella

Kleemann

1790.

26. Occop

27. —

28 —

29 —

30 Dep

31 —

32 Gel

33. —

Mit Gele

34. —

35. —

36 —

37. —

38 —

39 —

40 Argy

41 Coleop

42 —

43 —

44 —

45. —

46. —

47. — Gallipennella Hb. [illegible] Jung.

48 — Olymbopennella Hyon. Aug. Jung, Gebirg gegraben

49 Gracilaria auriferella Hyon. Mitte May auf Rubus gabelig.

50 Ornix Juvandella Hyon. Auf Eugen 1mal.

51 Elachista obscurella. Curt.? Aug. July mit Epilobiella von Epilobium erzogen

52. — ~~Lobatella~~ Charpentierella Hyon. Auf Jung

53. — Egenella Hyon. Überwintert in Zimmern.

54 — cornicella Hyon.

55 — fuscorella Hyon. Jung auf Rubus.

56 — [illegible]actella Hyon. July an Hilf.

57. — gracilella. Hyon. Auf July an Echium.

47 — 4/4
6 — 4/4
40 / 3/4

##

Antrag a. Fischer. Oct. 1841.

v. Kindermann bestätigt Phycis matricella Tr. wie
stellen Sie diese Motte fin? (Anerastia Lotella)
mit dem Namen von Fiume
v. Kindermann P. signella Hb. in mehr Stücken zu sein
stellen diese Figur sah aber mehr gestreckte Flügel
auf Gall die in einer dunklen Querlinien vor
der Flügelspitze. Ob die Art v. Kindermann
eine Pseudia?

gelbe Raupen

No

Doubleday an Fischer geschickt. Nov. 1841.

1 Phtheochroa rugosana Hb. (syllepta)
2 Carpocapsa amplana Hb. Im May die Raupe auf Porgonia Viburna Hb
3 abc leiaphila. fuliginana Hb
4 Abietella
5 Terebrella
6 Fuscomaculella Haw.
7 Cynosbatella Haw.
8 Ignorantella Hübn
9 Brizella
10 Heydenella
11 Herrichella
12 Saligna Z.
13 Scitella Mz
14 Lamprotornella Hübn
15 Centifoliella
16 Septicentella cursoriella Hübn
17 Rajella
18 Mespilella Hb
19 Lantella Hübn
20 Pastorella Hübn
21 Abietella Hübn
22 Angustiorellella Hübn
23 Rigorella Hübn

158

53

Jan 1842 geschickt.
Ochsenheimeria Vaccalella Hübn 3 N.
Col. Vibicella nebst Raupe.

Aleo. Megadactyla Fb. 6

Didactyla

Fastuosa

Sicarius

1840.

Antrag an Fischer. Oct. 1841

739

Von Kindermann b. Sitzg. d. Phycis mediterranea Fr. wie
stellen Sie diese Motten hin? (Acerentia Bl.)
mit dem Kauw von Fiume
Von Kindermann P. signella Hb. die noch Hübn. zu fein
stellen. Diese Figur hat aber mehr gebrochene Binden
auf Fall die nicht zu den Glauben von
der Flügelspitze. Ist die Art von Kindermann
eine Psecadia?

159

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acc. Megadactyla Tb. 6

Bis hellen ist
ob noch nicht,
hat als gültig
Tb. 12.13. auf
Bilder Mega
mit den Dia
gnose nicht
ist. Cara
ganz Räum
dasse ist neu
ist und sind
neu für die

Didactyla L. [illegible]
Kopf- Abbildung
Flügeln und Fü
männlich Raum
Thorax Hinter
Beine und linken Fü
Beine fehlen
Zelle Pterostph.
Fühler fehlen und
Zeit IV. V. 27.

Eingeteilt Tastuos.
ist, linken
mit Spitzen
Kommunella
Prothorax
Flügel
etwa 6 Fü

Lichia Superbell.
Isolophus Humer.

Sicariel
Acell. Klösmann.

Mai
Jahr. 1840.
Land
Ort
Zeit
Art
Geschlecht
Tiefe
Fundort
Bemerkungen

160

160

Wien am 9ten December 1841.

740

Theure [illegible]

[illegible] wie auch Ihr geehrtes Schreiben vom 28 Oct. l. J., so wie die beigelegte Handlung, Ihnen verunglückte, aber doch glücklich Ihre ganzliche Gute & Seelengroßmuth, [illegible] Ihr Schreiben, abermalen [illegible] wieder [illegible] Mitbürger [illegible]. Es wäre unschicklich, wie ich selbst Ihre Schulden wieder [illegible] Ihnen [illegible] zu [illegible], [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Die Zufriedenheit, mit welcher Sie meinen 18ten Heft aufnehmen, macht mir viel Vergnügen. Nach dem, was Sie mir bereits über Stephens Thurgattella schrieben, mußte ich nicht ganz zweifeln, daß jene Art auf Ihrem angegebenen Fundsindanfort Land bey genauerer Examinirung nicht fehlen wird. Auffallend ist die Angabe, daß diese Art in Halgers und anderen Büchern fehlen soll. Aber man sieht leicht ein, daß diese Art bei der, die oft vorkommt, und einige, wenn auch übrigen, Localfänger Jahre nothwendig an jenen Maxillar-Palpen. Da aber die allen Coleopteren Lüne Antennalorgane zu sehen sind, und Sie selbst auf den Gedanken kamen, daß jene Maxillar-Palpen auf solche Lüne Maxillar-Palpen gefallen haben: Stephens sah wenig Coleopteren genau, und so mußte übersehen nicht verwundern; denn überhaupt kennt man die Insecten bey weitem noch nicht genau genug, einmal Fabricius für in Ignoranz, und einmal Linné in Theorien.

Coryph. Limacella ist uns seine nicht wieder vorgekommen. Ich besitze nur 1 Stück, und von diesem ist der Mund nicht ganz von Flügen sichtbar (da ist die Zunge gar nicht sichtbar) zu Grunde gegangen. Gut wäre es, daß es schon abgebildet wäre.

Für die Addresse des H. Silbermann bin ich Ihnen sehr verbunden, und werde, wenn es auch Noth thut, gebrauch davon machen. Es sollen Briefe, an mich die Briefe für ihn franco übergeben werden. Allein, so sehr ich mich über Ihre, und der vielseitigen Thätigkeit, mein Werk, ganz als auf in einer mir vor Lebzeiten Gestalt, fortgesetzten Beifall freue, und mich Ihnen so sehr verbunden halte, so wird es doch in dem jetzigen Gestalt und Anordnung mit dem 20ten Hefte geschlossen werden. Ich versuche bereits wieder, daß H. Hartig die ganze Verlagshandlung Zubereitung Werkes von H. Jäger käuflich an sich gebracht, und mit H. Jäger Schluß (also nach Verabredung geht) schon verschiedene Heft mit illuminirten und den Schlußheft gefangen hat, dieses so lange durch, gelangen Werk nicht einen macht (wie wir die Herr-Sch. genannt sind) fortsetzen, sondern für das schon bestehenden einen nicht ganzlichen Titel, und zu den neuen Verlage mit Tafeln mit genauesten Illuminirungen und einen vollständigen systematischen Titel dazu zu geben. Mein Werk wird also überflüssig, und wenn sich mit die Abnehmer meines Werkes vielleicht nicht vermindern sollten, so werden sie sich sicher nicht vermehren. Voll die Tafeln einen und dieselben Käfer zweimal Käfer? Dieses Heft ist selbst nicht genau. Jetzt Werk wird dadurch abgefallt und vielleicht noch mehr als das meinige leiden und ich müßte über meine Freiheit, sich an Herr-Schäff. anzuschließen, mir sehr zu Herr-Sch. Willen sein. Herr-Schäff. wünscht mit unseren innerlichen Verhältnissen (wenn im Sommer sein) das Bild Leben stellen, aufzufassen, und so bildet er mir jetzt an, mit der Microskopie Schärfe, mit ihm zu arbeiten, und mich genau mit ihm Titel meinen zu können, wenn ich jedoch nicht zugebe, weil ich nicht sehe allein, und gelehrsam werden wird sehen mag, sein, daß Zubereitete Werk fortgesetzt werden soll, mit den Titel im Verhältnis stehen und im Halsa: stätigung, daß seinige Gesandungen von Insekten Arten usw., daß Herr-Sch. in einen lithographirten Skizze alles bestimmenden Lepidopt. zusammenfindet, und wird alles auch Ihnen bekannt sein. Ich habe seine Hefte Briefe verbrieft und mit allen seinigen Lepidopt. mündlich darüber gesprochen. Alle Hauptsache meine Meinung, nämlich das was Herr-Sch. nicht Gebot verwandt, mit Schwierigkeit, daß verschiedene Individuen und Stand in Hefte Titel verbrieft und um sich Verdienst willen. Es wird mir die Herr mit meinen Tafeln Schwierigkeit überschreiben und kann nicht sehen, daß Jäger Gebot anfangen (die Namen sind von Fabricius Manier Illig) genau wenig dem Fabricius, selbst genau sind, genau Arten nach Exemplaren zu stellen, nicht über Arten, die sich nicht von Exemplaren unterscheiden, damit ich für sein Buch H. Mann Copien liefern mögen. Mein Hauptgrund bei der Sache ist also nun, H. Mann fortgesetzte Thätigkeit zu geben. Gegen meinen Lieferanten habe ich keine Verbindlichkeit. Diesen allen habe ich einen wunden Herr-Sch. gemacht. Ich verschicke Exemplare, daß Sie ganz die Fabricius Manier leicht überblicken und finden, Exemplare zu vergleichen, keine vergleichen aber die Fabricius Manier, daß Sie sich bei der Umarbeitung der Fauna Entwurf haben, vergleichen und überzeugt wollen sie mit Mühe Liebe und Fleiß an dem Werke arbeiten. Es ist Hauptsache, daß H. Mann jene Arten (Exemplare und Klein) Fabricius in den sichtigen Namen kennen und die er nicht besitzt copieren mögen, und gleichsam ihre Individuen hinlänglich beschäftigt zu sehen. Hauptsache ist die Bestimmung der Fabricius Original-Exemplare, und wie viel bereits hier Gelehrte mitgetheilt hat, so vermehrt sich doch nur H. Mann die größte möglichste Vollständigkeit. Ich muß Ihnen sagen, daß ich mich Ihr Dank und die Selbstverleugnung Ihnen Herr-Sch. wünsche, da er doch einmal in seinem Kopfe sehr und vorgefangen wünsche. H. Mann soll zur Kenntnis bereits einige Insekte vorgenommen, allein er soll aber sehr wenig Exemplare wünschen, daß sie seine Lust und Mühe, alles H. Mann sehr billig verbindet, vollkommen bezahlt werden wird, dann will Herr-Schäff. genauesten Weise viel vorstehen, sie darf es nicht den eigentlichen Werth der Sache bezahlen. Auch habe ich bezweifelt, daß die Originale so stehen, wie sie H. Mann gebraucht ist zu verbinden, auf die Etiketten vor den übergetragen werden. Jetzt braucht das ganze die Sache, wo ich wissen werden, ob H. Mann bestehen kann und Aufsicht auf Thätigkeit sich

Acc.

und welches Sie meinen 18ten Hefte überschicken, macht mir viel Vergnügen. Nach dem, was Sie mir Thurogültella schreiben, möchte ich fast fast zweifeln, daß jene Art Lepidopteren darin vorkommen dürfte. Dann kann bey gefälligerer Gelegenheit mehr gesagt werden. Wichtiger ist die Angabe, daß diese Art Schlacken haben soll. Aber auch dieß bedarf der Bestätigung. Die Lepidopteren waren übergebunden, wie dieses ist, und einige, die man noch übrigen, spannfängende Zeuge nehmen, um sie für die Maxillarpalpen. Da aber die allen zu setzen sind, und sie selbst auf der Spitze die Kopfschuppen auf für einen zottigen Schein geben sollen. Flügeln sind wenig schuppenlos, gekräuselt, und so muß überhaupt nicht mehr sein. Ich kann es nicht für Schlacken ansprechen, da meine Lepidopteren Antennen und Palpen in Ordnung, und einmal unter den Tineiden.

ist und seine nicht wieder vorgekommen. Ich begleite nun 1 Flora, und vor Januar ist das Manuscript fertig. Diese Zeilen zum Antritt [illegible] zu Grunde gegangen. Gut war es, daß es schon abgeschickt

Thüringen bei H. G. Siebmacher, um Ihnen selbe anzubieten, und wende, wenn es auch Ihnen Gut, gebrauch meine Adresse, so würde die Post für eine Sendung [illegible] machen. Allein, so sehr Ihnen Pflanzen und der vielfältigen Arbeit, mein Werk, sey es auch in einer minder kostspieligen Gestalt, [illegible] stünde, und meine mich Mängeln sagen sehen, so würde ich doch in der jetzigen Gestalt und Ausdehnung [illegible] Zeiten wagen. Bemerke beiläufig dieses, daß H. Hauck Schaffer Herzogen H. Herzog Bernhard zu sich gebeten, und auf H. Herzog selbst (der noch Regierung hat) sich [illegible] Seite 11 f. und übernommen und den Kostenpunkt gefragt hat, dürfte so lange noch gelegentlich Werk nicht [illegible] der Herr-Sch. genommen sind) fortzusetzen, sondern für das schon bestehende einen noch zugleich [illegible] zu den neuen Tafeln auf Tafeln mit genauesten Abmessungen und einer vollständigen systematischen [illegible] geben. Mein Werk wird also überflüssig, und wenn sich mich die Abnehmer meines Werkes vielleicht selbst, so werden sie sich schon nicht nennen. Will das Fürstlichen eine und dieselbe Auflage zweifach [illegible] ich selbst nicht gern. Fragen Werk wird dadurch abgefallen und vielleicht noch mehr als und ich möchte ihre liebe Freundin, sich an Herr-Schaff. [illegible], wie sich zu dem Willen wünschte mit unseren [illegible] (es muss im Sommer sein) das Bild Lepidopteren, welches [illegible] zu nicht zahlt ist, und die Microlepidos betreffe, mit ihm zu verbinden, und mich gleich mit [illegible] Kal, nehme ich jedoch nicht zugrabe, weil es nicht für alle, und gelingen werden wird. Sollten mir Hübnerische Werk fortgesetzt werden soll, mit der Bitte um Benachrichtigung desselben und um Mehrere: Zusendungen der [illegible] Arten u.s.w., sei Herr-Sch. in einer lithographirten Abschrift Lepidopt. zugeschickt, und wird nicht mehr nöthig sein. Ich habe seine Liste Arten: der sämtlichen Lepidopt. mündlich darüber gesprochen. Alle Hauptsache meine Meinung, nämlich das Buch verwandelt, wird Sie bekannt ist, daß verschiedene [illegible] und [illegible] Hübnerische Tafeln [illegible] und Figuren Gute verlangen (die Namen [illegible] Maria Linn) [illegible] Tafeln, neue Arten nach Exemplaren zu stechen, weil über verbessern, die sich in seinem Besitz H. Mann Exemplare [illegible] Mein Hauptzweck bei der Sache ist also [illegible] Beschäftigung zu haben. Gegen meinen Lieferungsplan habe ich keine Abänderung [illegible] Herr-Sch. genehmigt. Es beziehen sich dagegen, daß Sie ganz die Hübnerische Farben und Figuren wollen, Gegen zu verabreichen, keine Anzahl aber die beiden Namen, [illegible] Abänderungen der Tafeln beliebt haben, zu genehmigen und übernommen wollen sie mit Mühe [illegible] Werke verbinden. Es ist sämtlich vorausgesetzt, daß H. Mann seine neuen Arten (Typen und sämtlichen Sammlungen beschreiben und die er nicht besitzt copiren mögen, und gleichfalls ihre Farben [illegible] zu setzen. Überhaupt wo die Bestimmung der Typen die Original-Exemplare [illegible] und wie nicht bereits seine Arten mitgetheilt hat, so verspricht er sich nur H. Mann die gütige [illegible]. Das Ihnen Gegen Bedingungen, so wie auch das Dank und die Colorirung Ihnen seine Arbeiten [illegible] es hätte nimmt in seinem Hause sehr und verpflegen müssen. H. Mann hat zur Farbe [illegible] vorgenommen, allein es hat aber so wenig Zeichnung wie ich, daß diese seine Zeit und Mühe, alles [illegible] verbindet, vollkommen bezahlt werden wird, dem will Herr-Schaff. gewiß [illegible] nicht den eigentlichen Werth der Sache bezahlen. Auf das bezweifle mich, daß die Originale [illegible] übergetragen werden. Jetzt bemerke [illegible]

1840.

ob die neue Zahlung den alten gleicht. Wird diese Bestimmung nicht entsprechend, so bin ich entschlossen, [illegible] abzutragen. Alle Mängel seiner Angabe im Manne zu beseitigen und den Patienten dabei nicht zu stören. Falten, und ob es wirklich nöthig sei. Aber es muß mit meinem jetzigen und mit Gebrauch Stoffe nicht gemein haben, damit man nicht an und derselben zweimal kämpft. Zum Tränken muß Manna und die Zeit zum Essen meinen Platz einschließlich vorgehen und Du um Essen verschmähenden Rath zu bitten. Es soll aber in nächsten Briefe geschehen, dann gerade sind wieder ich das Rathen aufsuchenen Männer am nöthigsten haben.

Ich schließe diesen für heute mit der Versicherung meiner vollsten Hochachtung und Freundschaft

Ihr

ergebenster

Fischer v. Röslerstamm

Erlangen d. 16. Jan. 1841.

Dank für die Bestimmung der Arten u. die Benennung.
über Hallers Fortsetzungen der Linné. Flugschriften zu bemerkstelligen.
Ich übersende ihm an die Stephens Brit. Ent. (Haustellata) Vol. IV.
Es soll ihnen Alles 3 Monate zur Benutzung senden u. dann unfrankirt, gegen Ihnen, meine Ansichten. Bemerkungen über die Brauchbarkeit dieses Werkes. über Herrich Schäffers Lieferungen. Auch Briefe (nicht Betrag) an Mann.
Nachricht soll er mir geben über Hammerschmid, Hellers u. Priedeaux Abhandlungen.
Ich übersende ihm 3 Ex. Ochsenh. Vaccinella nebst u. Col. Vibicella nebst Tafel.
Bemerkungen über die Benennung vid Ψ.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ob die neue Zeichnung dem alten gleicht. Wird diese Sa
Lagerstätten. Abbildungen herauszugeben, die Herrn zu
halten, und ob er wirklich nützig sind. Aber es muß
genau sein, damit nur nicht ein und dasselbe zweimal
Herrn meinen Herr mitzutheilen vorzubereiten und
fall aber in möglichst kurzer Zeit geschehen, denn gerade
nützig sind.

Ich schließe diese Zeilen mit den Versicherungen

Ihr

Bradford, d: 16ten Jan. 1841.

Dank für die Besorgung der Acten u. die Sendung.—
über Gallerte Fremdkörper in den Lungen. Flügeladern zu berücksichtigen.—
Ich übersende Ihnen auch die Stephens Brit. Ent. (Haustellata) Vol. IV.—
2 Volumen Heller auf 3 Monate zur Benutzung. Senden u. diese
ihm dann unfrankirt, gegen Rein, mein Schicken. Bemerkungen
über die Brauchbarkeit dieses Werkes. Über Herrn Westwood Abhandlungen
künftig das Porto (nicht bedeutend) an Mann.—
Nächstens soll er mir geben über Hammerschmid, Kollar u. Friedrichs Abhandlungen
über die 3 Gen. Odontus, Vaccinella nicht u. Col. Vibicella nicht Taf.
Bemerkungen über die Bindung vid Ψ.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tin. Suffusana Zell. Einige wollen diese Art mit Sinuosana, andere mit Roborana vereinigen. Zeller sagt, die Raupe von Suffusana lebe auf Weißbuchen und sey verschieden von der Roborana-Raupe. Ich finde aber Suffusana nirgends in wilden Hecken fliegen. ganz Deutschland ist die Raupe auf Hasel.

Tin. Syringiana Hübn. gehört mit Pratana, Ferrugana, Latemiana, Margaritana zu einigen andern in eine Gruppe, welche ich Mann selbst, bevor ich jetzt aus mehr aufgefunden. Parreyssiana hat dasselbe eintönigen, langen, rund fahl, in Fett u. Fahl rein, aber mehr Flecken, die nicht Linien mehr andeutet Raupe, gaben, die aufgefunden. Sie wird Ende Juni an Flieder, Weide, Birke, Hasel, Eiche und auf wilden Rosen.

Cnet. Bugnionana Fr. Die erste Puppe erhielt ich aus der Raupe, die ich Prof. Bugnion aus Lausanne aus Montrose gezogen und erhielt hatte, dieses ist die zu Ehren genannte. Ich Mann fand sie nun auch bei 7000 Fuß hohen Gipfel des Pfannenstocks gefunden, Ende Juni in wenigen Stücken. Ich Fischer fing sie auf einer Wiese alpen.

Teric. Lacunana Dup. Wurde lange Zeit für Var. von Viticana gehalten, ist aber gewiß eigene Art. Die Raupe in Pfirsichen und Pflaumen unter diesem Namen.

Teric. Umbrosana Zell. Auch diese ist bestimmt verschieden von Viticana. Ich Zeller fand sie in einigen Exemplaren von Hyeres, wo sie mit Ferrugana, Cadra, Pumicana, Pallidana und Viticana fliegt.

Grapt. Inquinatana Hb. 93. Man soll die Hübnersche fig. 93 auf verschiedene andere Falter deuten, ist schwer, aber auf diese, welche wir schon recht gut gekannt bekommen, am besten zutreffend.

Eudor. Mercurella, Forbigella & Pyralella. Wunder Thier sehr bekannt sind. Mercurella & Forbigella verschiedene in der Größe und in Fall und Flügel. Ich Mann hat Thier eine sehr kleine Forbigella gefunden, dieses ist schon ganz und dieses für dem sehr die Größe verschiedene Pyralella Fr. Die Raupen Lindenmann verschieden haben werden. Von Mercurella gemäß ist Sudetica (Sudeticella) Zell. die Flügel sind dabei an den Hinterrand zusammen. Zeller begegnet sie alt in Blumen Eudora, selbst nie haben sie Thier auf Rinde von der ganzen einen großen Mercurella gefangen.

Von Eudora Octogella Z. (Hb 177) schreibt Thier Mann an Rainer Fr., sie kommt auch einmal gemischt vor, sind verschieden in Fall und Flügel. Ich verschreibe diese mit gemischt mit der Raupe und nannte sie Vallesiacella. In Dupondels Werke ist sie als Valesialis abgebildet.

Pyralella Hb. bleibt immer in der Größe & Farbe gleich. Auf eine sehr abweichende ist Albatella Fr.

Tin. Ochsenheimerella Fr. Dieses ist die Ochsenheimerella Hb. Mus. Treits., seine Beschreibung ist schlecht und passt auf Fabricii Abbildung gegeben. Ochsenh. Hb. 184 kann dieselbe nicht beschrieben sind sein.

Tin. Maculella Hb. und Fischeria Zell (nicht Hb.) in Treits Lebewerk ist zu bezweifeln, dass die Eichbaum (Quercus, mit gelbbraunem Kopfe) die wahre Maculella Hb. & Mus. Schiff. ist. Die wahren aber ist die Maculella Hb. 125 und nach Boie's Ansicht auch die Maculella Fab. & Mus. Fab. Diese müsste also den Namen Fischeria Zell annehmen, da sie die erste war, die auf 2 Arten aufmerksam machte. Diese hat schwarz in der Flügelspitze ganz die Ochsenheimerella Fr. [illegible], der Name soll aber die Maculella Hb. gehören Schiff., hat 2 einfache, und dicke einen gelben Punkt. Ihr fehlt der Punkt am Vorderrande, welcher aber manchmal bei der Ochsenh. nur fehlt und dann ist Colyphea Hübn. von Gleiche der Maculella zu unterscheiden. Es gibt aber einige andere Merkmale.

Hypnat. Pilellus Hb. und Mus. Schiff. Das 2 ist schief gelb und hat ganze Aehnlichkeit mit dem 2 von Metaxellus

a Metaxellus Hb. den Namen hat dadurch bezeichnet Flügel als Pil. 2.

Lyonet. Fasciapellus (Stathmopodella) verändert sehr. Ich habe Ex. mit pomeranzen gelben, gelben und gelbgrauen Körper, mit schwarzen Fühler und schwarz gemischter Vorderfarbe, mit wenigen und mit vielen weißen, auch mit gelben Flecken, und ausfärbigen und mit nicht gefleckten Hinterfl. oder auch mit Flecken mit Vorderfl. Manche Stücke kommen dem Staarmella manch nahe.

Hypol. Consanguinellus Fr. Der Vorderfl. von Philarella wurden Ihr auch sehr fein sein.

Es zählt auch noch andere Nachschlagen, die ich hier übergehe. Aber das Alter gehört auf die Figuren 188 und 376. – Zufällig fand ich in Hübners Tafel, dass die fig. 188 einen Mann vorstellen soll, der seine [illegible] Fühler und meistens theilig Raumy und ganz [illegible] Vorderflügel hat, und diese Tabella stellte auch die Art S. V. sein. Die, welche schon Schiff. Mus. Schiff. ist vielleicht die von Hübner beschriebene und von Mann gefangene Art; aber die genaue Figur auf die Abbildung und einfachen Fühlern und Dunklen Vorderflügeln? – Ich fand auch in Hübners Tafel, und wenn sie die Abbildung sehr verschieden. Die Farbe ist auch von Babella, auch in Hübners Tafel, und wenn sie, die Abbildung sehr verschieden.

Ypsol Silaceltus H.117 Fr. (Latella H. Text) Essen Raupe diese auf nässt. Ist selten für Eberäsch aut.
Das Fr. im Namen ist wenig gegründet, Rauk gegründ. für diese selten.

Separatellus H. Diese, dem Dolosella, Binotella & Pomarella müssten eine eigene Gattung bilden, da ihre Arten
(die selbst selten sind) ganz andere gestreckte Flügel haben, die vorderen ungefähr wie bey Herzogia.
Fazilla etc, die sämtlich spindelförmig, so schmal wie die Seite des Vorderflügels mit einem ganz kleinen
Lappen (Separatellus).

Gl. Diffusella H. nach Hein selten, Falter in Juli/Aug nicht mehr.

Man sollte sich wirklich schämen, die vielen, einander oft ganz ähnlichen Schmetterlinge zu
vergleichen, da nur ausserordentlich geübte Augen dazu gehört um ihre Verschiedenheiten zu erkennen,
wenn man bedenkt, wie wir Hr. zum Vergleich sind. Ich kann es manchen Entomologen nicht verdenken,
wenn sie sich nur die Mühe, viele Arten zu bilden, beschäftigt. Und doch ist dabei ganz gewissenhafte
Forschung vonnöthen! alles ist nicht so leicht, wie es scheint, und dennoch wie selten Arten fehlt man:
ganz gute Abbildungen vorhanden. Hilft man diesen, dann schwindet allen Zweifel. Müssen ab diesen
Kommen, sein bald dem Publicum bekannt machen zu können.

Über die Tinaceltia etc. ist nichts zu sagen, denn ich vermisse das 3 Stück jenes Fabr. Falt mit Lemnis
Tinaceltia jetzt schon gänzlich rein wird, wenn es das Wenige schon waren. Wie selbst sind die
Falt. Mann's Bestimmungen sind nur Vermuthungen. Das ist viel. N. 173 Fabr. ist die Pentadactyla
Mus. Schiff. — Zeller sein in Hübners Abbildung eine ja ganz deutliche, aber gelbere Art. — Fabr. sah
ein ebenfalls sehr deutliches aber viel grösseres Thier angegeben. Zeller vereinigt sie alle als Megadactyla
H. wird aber wieder ausser müssen. Dem Fabr's grosse Art (Macrodactyla Fabr.) fehlt als Raupe
Juli/Aug in der Hälfte Raupe die Senecio nemorensis, die Raupe ausgefressen Fuß im Stengel und macht dann
Gespinst. Dem Raupe von der kleinere Art (Fabricad.) fehlt Anfangs April in den Blüthenköpfen
des Thussilago farfara, und ausgefressen in Gespinsten zwischen den Blüthen oder Blüthenstengeln
der Pflanze, aufgefunden Ende Anfangs bis Mitte Mai. — Calodactyla F. soll Zeller, weil sie
mehr Zähnen hat Fischeri genannt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(162)

795

307

Bei der Bestimmung wird man oft sehr confus, und ob ich Ihnen zu wenig Bilder über Arten, oder Ihnen zu viel Arten über Bilder gebe, kann ich nicht sagen. Gewöhnlich finde man Dann nach der Rückfrage. Es ging ab wie mit Ihnen No 44 & 48 — aber dennoch war ich Ihnen Meine Hilfe und Ihre Freundschaft Ihnen Bestimmung nicht ins Reine gekommen. Denn hat sich Tabakblatt von Commella und Barbatella, die meinen Bestimmung festhalten, nur bei Ihnen mit dunklen Linien, wie ab Ihnen für ungefähr sind. Bei dieser galanten Gelegenheit kann ich nur, gnaue in unsere Abbildungen Ihnen angegeben, aber in Gedächtniß Ihnen oft Ihnen Ihnen Unterschied Ihnen Ihnen Ihnen Commella Ihnen, welches wir nun zu bestimmen

Pinder v. Rosenthal

293 1.

Anmerkungen zu Ihnen wie im Oct 841 zur Ansicht gesandten Mikrolepid.

(162)

No 1. Tin. Flaviventrella Hyde.

Linné's Phalaena Tinea Verbascella Faun. Suec. und Stoll genau mit 2 männlichen Arten meiner Sammlung, die jedoch etwas Abweichendes haben, Tagen haben zu Ihnen gelten auch mit Ihnen Ihnen Ihnen

Ypsol Silacellas Hb. 117. Fa. (Lutzella Hb. Text) Zellen kannte diese Art nicht. Es sollte sie für Ebneál sein.
Das Fa. am Rand ist wenig zugeschärft, Rand zugeschl. fürs Fase stellen.

" Separatellas Hb. Text. Dem Solosella, Binotella & Fasparella müssen eine eigene Gattung bilden, da ihre Arten
(Die Gattung selbst hat) ganz andere gestellte Flügel haben. Die Raupen sind wie bei Ypsigenes.
Fazilla etc. die Futter- Fühlerwurzeln 4 Mal wie an Index der Beschreibung eine ganz kleine
Lagena (Separatellas).

Gel Discorella Hb. nach Hb. Fallen, Text in Gelethia nicht nennt.

Transfella sich wirklich schwer, die vielen, einander) fast wie ein Genus dem andern zu einander schleppen zu
[illegible] [illegible] [illegible] [

Anmerkung zu No 14.

Bei der Bestimmung wird man oft sehr confus, und ob ich Recht habe, scheinen die Bücher nicht immer zu entscheiden, sondern es muß manchmal Gott walten. Gewöhnlich wird man dann nach der Richtig. Es ging ab mir mit Hyan. No 44 & 48 — aber dennoch kann ich Ihnen Mancherley Hülfe und Ihre Arbeit scheint Ihre Sammlung nicht ins Reine gebracht, denn ich habe noch Tab. 5 Fig. 1 Tab. 6 Fig. 1 Tab. 7 Fig. 1 Tab. 8 Fig. 1 Tab. 9 Fig. 1 Tab. 10 Fig. 1 Tab. 11 Fig. 1 Tab. 12 Fig. 1 Tab. 13 Fig. 1 Tab. 14 Fig. 1 Tab.

Ypsol Silacellas Hb. 117. Fr. (Lutrella Hb. Text) Fehlt bei mir. Ich halte sie für Pyrausta sol.

Lab. fr. am Main ist wenig gepriesen, Rauh gezeichn. Fünf Farbe stellen.

Separatellas Hb. Fehlt, kenn Solasella, Binotella & Pomarella müssen eine eigene Gattung bilden, da ihre Raupen (die selbst Falten sind) ganz andere gestaltete Flügel haben, die vorderen ungefähr wie bei Hyponomeuta, die Fühler stehen, die Taster stehen gleichmäßig vor, Stirne und Scheitel wie bei Hyponomeuta, Fühler etc. die Fühler

Anschlag zu № 14.

Bei der Restauration wird man oft erst entdeckt, und ob sich's lohne zu restaurieren, kann nur Kenner und Liebhaber entscheiden. Gewöhnlich wird dann nach der Restauration, die Sache noch schlimmer. Ob eine Restauration gelungen oder nicht, kann man oft erst nach Jahren sagen. Ich habe mich mit Herrn № 44 & 48 — aber dann auch Herr Mauro Pilla und Herr Franchetti seiner Sammlung nicht ins Reine gekannt, denn das sind sehr schöne Exemplare von Crosmella und Barbatella, die meinen Sammlung fehlten, man sieht sie nur, genau in unsere Abbildungen stehe eingegeben, aber in Gedächtniß kann man alle Bestimmung dieser drei Arten wird. Es ist nun wahrscheinlich, daß Herr № 44 eine Variété von Crosmella und № 48 eine aber schöne Variété von Barbatella ist. Der Vergleich mit Mauro Pilla bringt aber (wo aber die Linien klarer sind, wie die so nun fünfzigfache Vergrößerung) wird Herr dazu übergehen. Da Herr № 44 ist der Unterschied sehr wichtig. — Crosmella hat also einen ganz kleinen Einschnitt und Barbatella einen ziemlich langen Einschnitt. In den Linien der Charaktere gleicht sie fast ganz der Barbatella mit kaum bemerkbaren Unterschiede, der aber unten folgenden Figuren sich bestätigt. — Barbatella hat einen ziemlich langen Einschnitt und bekannt. Einschnitt. — Serratulella (die ich Herrn Heuten wenn sie fehlen können) hat einen ziemlich langen Einschnitt, aber ist Dunkler in den Linien, so auch die Einschnitt selbst, die Einschnitt sind gleichfalls bekannt. Vorder- und Hinterflügel sind Dunkler, die Adern sind so viel Dunkleren Linien, wenn die am Vorderrande von der Spitze entfernt ist, bei Barbatella aber gleichmäßig bis in die Spitze geht.

163

N. 13. Col. Squalidella Hyd.

Obsen. Der Scheitel Fleck in der Mitte unter dem Vorderrande ist vorhanden, sonst Exemplare wie Hyd. für eine verblasste Binotapennella FR. halten, welche aber selbst in Ital. und Ungarn selten, an Chenopodium wächst, auf welchem die Raupe lebt. Farben ein jedes viele übereinstimmende Tiere ist ab nasse eine eigene Art.

N 14. Col. Merzipennella Hyda.

Ich stelle hierher Fleck Aufangs für Anas mella Zeller. Später für eine verblasste Serratulella FR. Allein bei genauer Betrachtung ergiebt sich, dass sie Flecke nicht haben, dass die Fühlerwurzel hell und einen Ring und die Fühler des Fühlerbeines fand dick und fein sind. Ich habe zwar auch Serratulella Raupen 2 Männer mit Flecken Fühlerbasal erhalten, allein die übrigen der erschienenen Männer und einige Weibchen besaßen, dass die auf einen ziemlich langen Fühlerbasal und stark behaarten Fühlerschaft hat (vide N 48 Polymitipennella). Ich stehe nun auch die Zeichnung des Vorderrandes und andrerseits der Serratulella bleibt, so muss ich dem Gesagten zu Folge die Flecken Fühler und Fühlerbasal hierher nicht abgebildet sind, wie man sonst glauben könnte. Eben als für nun nachholen.

Anas mella Zeller, die keinen Fühlerbasal hat, und die ich hier einschließe, aber gebunden Barbatella FR. und die dazu gehörigen Raupenfutter finden Sie in Mann's Ordnung. Pennella ab Mus. Schiff. ist Anas mella Zeller (Strathionipennella HS.) und nicht, wie Linnéus will, Ornatipennella Hbn. Diese Sie nun die folgende Anmerkung zu N. 14. finden.

N 15. Sel. Fantaliipennella Hyda.

Hierher ist conspicuella FR. — Diese, die Vibiciipennella, Cælebipennella, Astragalella, Vicinella und eine Var. von Vibicella sind sich alle so ähnlich, dass über eine genaue Kenntniß ihrer Unterscheidungsmerkmale, aber das Geschlecht ihrer Raupenfutter die Kenntnung höchst wünscht. Ihre Kenntnung, diese erst auf einen Punkt, wo Einer gerade wünscht, gefangen zu haben, kann ich wie nicht finden. Soll vielleicht eine Anas mella nicht gemein haben? Ich kenne keine.

N 16. Selen. Cælebipennella FR.?

Ich Vicinella FR. Keine ihrer Verwandten sind so deutlich gezeichnet als diese, ihr die andern Vorderflügel zu unterscheiden zu sein. Bei Cælebipennella ist der Vorderrand blass und braunfleckig wie die Flügelbasis.

N 17. Elach. Charpentierella Hyda.

Ich Elach. Serratella FR. (Isis 22) jedoch exclusive der Raupe, welche zu Ornix Guttiferella gehört. Sonst, und jetzt auch in meiner Sammlung finde diese auch Argentosella FR., mit der die Serratella L. auch übereinkommt. Die Mienen von Fleckfalter in Ferris Fleckfalter in den Isis sind nicht recht gezeichnet worden. Dazu gehört auch die Erziehung der Raupen Argentosella und die Bemerkung zu Isis Elach: exclus. Larv. bei Serratella, denn bei Guttiferella zu Bemerkung: Serratella Fr. Larv. — Diese auch weiß das Ferris in den Isis.

N 18. Litt. Hoffmannella Hyda.

Ich Fr. sah zuerst die Zeichnung der Kleemannella Fab. von welcher ich neun Männer besitze, welche einen gesprenkelten Vorderflügel und einen gelblichen Kopf haben. Ihr Brustschildchen, der Hinterrand und der Vorderrand ist braun gerandet. Es ist aber ein Weib, und ich kann daher nun vermuthen, dass Vorderrand von Kleemannella FR müsse nun geschlechtlich unterschieden sein.

Aurea Dom, dass Ihr Fr. einen braunen Rücken hat, unterscheidet sie von Hyperi cellen Hbn. Zeller als Einen Vorderflügel, allein ein Fr. meiner Sammlung, welche auch einen braunen Rücken hat, unterscheidet sich nur durch Hyperi cellen sonst durch gar nichts, und ich kann als Farben nun, wie das Ihrige, für eine Var. von Hyperi cella halten.

N 12. Gelech.? Macidella Hyda.

Hierher ist Gel. Serronella Zell. in lit. Ich besitze ein Weib aus Ungarn. Basilella FR., wovon ich auch eins aus Ungarn habe, hat einen ganz ähnliche Flügelgestalt, aber andere Farben & Zeichnung. Der Fühlerbasal hat eine Zeller, stand Serronella eben Dimidiella FR. — Ihr kann es sein in den Isis nicht herausfinden, weil sie nicht. — Leider haben Raupen in den Gelechien einen schwierigen.

Veite.

Wien am 27ten September 1841.

Hochgeschätzter Herr!

Ihr werthes beehrtes Schreiben vom 26 Decemb. 840. nämlich muß ein altes Faß ist Billschweigen unter uns vergessen, so beeile ich, Ihnen schreiben will, die Ihnen Gelegenheit, um Ihnen von mir Einzelheiten. Es scheint, als hätten wir Beide nicht viel über unsere entomologischen Thun in Jahren 1841 zu berichten! Diese eigenen Sorgen habe ich meine Sammlung sehr wenig vermehrt, da ich wenig Zeit Gelegenheit hatte, und selbst dann Geschäfte, beschäftigt aber meinen Finger verschmerzt wäre; das ist wie Dank Mamé Agni: selbst abend so müden Arbeit zugeschlossen, und ein Paar dem Schaden wieder auch meine Erfahrungen in den Bestimmungsschriften gemacht. Wenn ist nun: wo Vergleich, da Viele Leute nun ja so nicht Dasa Einen), wenn man nicht die Hauptschriften oder sich sie vergönnen muß.

Vergebens habe ich diesen Aufsätzen von Ihnen in den Isis verwendet. Ich verschaffen ja, in den Synonymia - andern die Synonymia zu festsetzen), und Fujis sah Ihnen ja manchen Tadel gegeben. Fujis Abhandlungen sind, nach einem nur einigen Zahl von sie aufgefundenen Spezies Rosella M. 1346 sein, die mich Linderum nun über Abhandlungen vergessen sah. Die Range von Ihnen Malicellus Zw. fällt ich Ihnen zu Ansprüche sehr Linnaeus auf die andern Arten nennen sehr genügen. — Auch Zeller's Abhandlungen sind bis jetzt mir nicht in den Isis, so ist gerade sehr Schade, anschienen, müssen aber bald kommen.

Diese Tage endlich ist die Lust von Depressaria Tineen, denen auch die Blacitta angefangen sind, welche sehr dunkelig sind, da nun 20 Arten abgebildet sind. Ich habe sie noch nicht gehörig vergleichen, und kann noch nicht Neues sagen. Zeller's Lust Arbeit, so nun an mich ist, wird Braunschweigern anfallen müssten; denn es ganz wenige Arten gekommen, von denen ich sehr schönen vorrätig sah, das Beste nicht Gesellschaft zu Frankf. Ich habe Hoffnung, dass nun bald auch die Schlüsse beendigen sind.

Von meinem Werke ist das 18te Heft in August ausgegeben worden. Es ist mir lieb, dass das 19te auf in diesen Jahren nachfolgt. Das 20te und Schlußheft des Bandes wird erst 1842 ausgegeben werden. Ich habe schon Lust, damit zu schließen, denn das Vergnügen wird mir in der Länge der Zeit doch zu schlecht. Hätte nun mir einen Absatz von wenigstens 100 Ex. mit Farbig. Tafeln, dann gab ich dir einen Verleger zu verschaffen und Bogen, so würde ich die Tafeln fortsetzen, so dann die Farben gestellt sind. aber gegen Dinge Farben ist Vergl. die Sache weiter diese Aufgabe nicht mit der gewöhnlichen Darstellungsweise und fordern für Vergnügungsfarben, Prospekte x. Farbentafeln einige wünschenswerthe Preise, so müßte aber wenigstens Einhundert sein, sie ist Einmal Abgestellte sind, das Zeichnen Colorieren ist, und es doch sein muß, ob gerade genau Farben einige in einem, allein Diese sind nicht mit Geld zu bezahlen. Wenn ist aber Einmal der wahre Gesichtspunkt die Wahl festzuhalten, Genauigkeit bleibt, so kann es nun wieder die Sache einigermaßen gefördert werden, das ist die nächste Absicht, damit meine Auflagen verschwinden. Die diesen Falle müßte die Herausgabe eine Verbindung schließen. Aber ich Colorieren Genauigkeit nicht genügend haben, haben mehrere Hefte der Abbildungen in den Isis selten nicht zufriedend werden. Das ist nun eine Schwierigkeit, und Fujis sah Ihnen ja manchen Tadel gegeben. Fujis Abhandlungen sind, nach einem nur einigen Zahl von sie aufgefundenen Spezies Rosella M. 1346 sein, die mich Linderum nun über Abhandlungen vergessen sah. Die Range von Ihnen Malicellus Zw. fällt ich Ihnen zu Ansprüche sehr Linnaeus auf die andern Arten nennen sehr genügen. — Auch Zeller's Abhandlungen sind bis jetzt mir nicht in den Isis, so ist gerade sehr Schade, anschienen, müssen aber bald kommen.

Diese Tage endlich ist die Lust von Depressaria Tineen, denen auch die Blacitta angefangen sind, welche sehr dunkelig sind, da nun 20 Arten abgebildet sind. Ich habe sie noch nicht gehörig vergleichen, und kann noch nicht Neues sagen. Zeller's Lust Arbeit, so nun an mich ist, wird Braunschweigern anfallen müssten; denn es ganz wenige Arten gekommen, von denen ich sehr schönen vorrätig sah, das Beste nicht Gesellschaft zu Frankf. Ich habe Hoffnung, dass nun bald auch die Schlüsse beendigen sind.

Von meinem Werke ist das 18te Heft in August ausgegeben worden. Es ist mir lieb, dass das 19te auf in diesen Jahren nachfolgt. Das 20te und Schlußheft des Bandes wird erst 1842 ausgegeben werden. Ich habe schon Lust, damit zu schließen, denn das Vergnügen wird mir in der Länge der Zeit doch zu schlecht. Hätte nun mir einen Absatz von wenigstens 100 Ex. mit Farbig. Tafeln, dann gab ich dir einen Verleger zu verschaffen und Bogen, so würde ich die Tafeln fortsetzen, so dann die Farben gestellt sind. aber gegen Dinge Farben ist Vergl. die Sache weiter diese Aufgabe nicht mit der gewöhnlichen Darstellungsweise und fordern für Vergnügungsfarben, Prospekte x. Farbentafeln einige wünschenswerthe Preise, so müßte aber wenigstens Einhundert sein, sie ist Einmal Abgestellte sind, das Zeichnen Colorieren ist, und es doch sein muß, ob gerade genau Farben einige in einem, allein Diese sind nicht mit Geld zu bezahlen. Wenn ist aber Einmal der wahre Gesichtspunkt die Wahl festzuhalten, Genauigkeit bleibt, so kann es nun wieder die Sache einigermaßen gefördert werden, das ist die nächste Absicht, damit meine Auflagen verschwinden. Die diesen Falle müßte die Herausgabe eine Verbindung schließen. Aber ich Colorieren Genauigkeit nicht genügend haben, haben mehrere Hefte der Abbildungen in den Isis selten nicht zufriedend werden. Das ist nun eine Schwierigkeit, und

163

N. 13. Col. Squalidella Hydr.

Diese die dunkle Stark in der mitte unter dem Hinterrande sich entgegen, sonst Körnchen Flecken. für eine graublaufle Binotapennella FR. selber, welche ebenfalls in Juli und August an Eichen fliegt, wo Chrysopidium wächst, auf welchem die Raupe lebt. Finden sie jedoch viele übereinstimmende Merkmale, so ist es mehr eine eigene Art.

N 14. Col. Mergipennella Hydr.

Ich stelle hierher Rink Beschreibung Linn Museum Adam Linnaei eine graublaufle Serratulella FR.

[illegible] bei genauer Vergleichung hat mir einen Unterschied gezeigt, der mich veranlasst, sie als eine eigene Art anzusehen. Die Serratulella hat nämlich die Fühlerglieder weiß und stark behaart, auch die Taster weiß behaart, und die Flügel sind [illegible] Mergipennella Adam, die FR. und die dazu gehörige Mergipennella Adam Strutbian Tafel 8 nun die folgende Unterschiede:

Diese ist Conspicuella und nicht Vicinella, Vicinella FR. ist eine Varietät, [illegible] Beschreibung; diese ist wie nicht Linnaei. Sie

N 1

Ist Vicinella FR. eine der [illegible] Varietäten [illegible] Linnaei [illegible]

N

Ist Elach. Serratella FR. Linnaei, und jetzt [illegible] die Serratella L. [illegible] Larve bei Serratella [illegible] Tafel 8 [illegible]

N 1

Ich für. sie [illegible] Vaterland [illegible] Pfälzischen und der [illegible] und ich kann sie nun [illegible]

Diese Art, Conspicuella Hb. [illegible] braunen Binden [illegible] gar nicht, und ist [illegible]

Diese ist Gel. Serratella [illegible] Linnaei [illegible]

Brandenburg, den 29 Oct. 1841.

Ich habe die Ehre, Ihnen [illegible] 77 Arten [illegible] Ich habe [illegible] Ihnen [illegible] Ich habe [illegible] Ihnen [illegible] Ich habe [illegible] Ihnen

von Fischer v. Röslerstamm
165
287

Pillot. Ruyosana W. Kommt hier selten vor, dasse wie die schöne gelbgraue Var. hier nicht vorkommt. Raupe ist jetzt noch allein in Saxifraga crassifolia, welche Pflanze dieser Gegend fehlt, daher sie nicht häufig.

Cypr. Stimpleana W. Hübner scheint die Art auch Cypella gefunden haben, was recht gut sein könnte, aber selbe sehr wahrscheinlich auch in Saxifragen lebt.

Sciaph. Foliigana W.? Diese ist eine Art die schon lange Jahre und in einem Ex. und Varietät steckt. Sie ist sehr verschieden, obschon der Typ Foliigana sehr ähnlich. Sie ist Ignalidana Z., kommt hier selten und Raupe selten. Diese Ignalidana hat Zwischenstufe als Foliigana W. Sie wird aber eine andere, auch Linnéan. Art (aus Mannheim) bestehen, die auch hier gefunden wurde, so haben wir diese für Foliigana W. angenommen, obschon die Abbildung auch nicht recht passen will. Verschieden von Ignalidana. Hübner's Figur ist Remigana Hall, und ist glaube gewiss, Remigana möge eine Var. von Foliigana sein, aber nicht eine Ignalidana. Diese glaube gefunden bei Sextana Hbn. 307, allein es fehlt zu viel, um sie dafür zu halten und so bedarf diese erst einer neuen Untersuchung, wofür ich aber nur die Raupe (Compatiens) vorschlage, die ich aber nicht zu Cultivation erhalten. Ich selbe Ehre an unsere Foliigana und Remigana einige Exx. beizubringen.

Nyph. Abietella S.V. Ist Bosmae gemein, hier selten. Raupe auf Fichte in den Gärten.

Mg. Terebrella Zk. Hier selten, dasse wie viel Exx. hier sind neue.

Dyp. Emeritella Hbn. Kann bis jetzt nicht hier, noch so viel ich weiß, anderswo vor.

Ac. Fuscipunctella Haw. Diese wie schon lange bekannte Art, gab wie Anlass Pallidella mit ihren Varietäten und die ihr fast noch verwandte Misella Z. genau zu untersuchen. Misella ist bei Fuscipunct. nur als Varietät, hat aber ganz verschiedene Gewohnheit. Die Raupe der Fuscip. lebt in Vogelbeere und Weißdorn, ist gelblich und schwarzbraun gefleckt. Puppe ganz verschieden von Pallidella, schwarzbraun, ohne Glanz, aber sie zu bekommen. Pallidella findet wie Misella in Häusern und Zimmern, und die Raupe lebt in Hecken, Gärten, Feld und Wald. Fuscip. fliegen wie immer um den Baum, wo sie einmal mit Mannheim- und anderem Torfe, Misella und Wald. Raupe bekannter Art. Fuscip. erzieht in den Gärten, und, wie ich sehe, auch in den Hecken bei Langenhain; ihre Exx. sind etwas dunkler als bei Pallidella. Mehr Flecken finden sich nicht nur einzig, mitunter verschwommen, wie Pallidella. Die Raupen haben stets gemeinschaftliche Farbe, sie sind rosa dunkelbraun, schwarzen gelbgrau. Die Zimbeere haben einen gelblichen Glanz. — Pallidella erzieht zahlreich in den Gärten und Hecken, und ist bei Langenhain. Die Raupen sind stets einfarbig und auf den Vorderflügel ist nur ein dunkelgrauer Punkt. Ein Pallidella und so dunkelgrauer Punkt und 2 kleinere Längsstreifchen wie ihn, wie sie Zeller in Fig. 15 giebt, fand noch nicht. Es müssen Pallidella Längsstreifchen verwischt sein. — In der Abbildung Linné Pallidella nun in der Entgegenstellung und ihre Manier war. Chrysanthemella und Terrella der Schiff. Ausgabe sind Pallidella, allein diese Terrella ist (wie ich sehen in meinem Exemplare sah) wirklich Terrella Hb. 170. (Leptogrammella Z.) und diese kann schwerlich verwechselt werden, wie Zeller sagt. — Die Falter

2	34 35	Gel. Atripicistrigella Fr.	Auf in Mannh. Umgebung.
2	36 37	Hyl. Nanella Sv. Hb.	Blos zum Vergleich der Art mit mehr gemein.
2	38 39	Anac. Lineatella Fr. Hz.	In mehreren Naturzustand erhalten ein 19 Exx. Hier selten.
2	40 41	Ypon. Vicariellus Z.	Selten hier gefunden.
2	42 43	Oec. Resticerella Mtz.	Juni, Juli an Gebirgsbächen nicht selten.
2	44 45	Elach. Dispilella Z.	Selten in Mannh. Umgebung.
2	46 47	Elach. Cerusella Hb. (Delibutella Z. ab.)	Diese Exx. sind etwas dunkler als Exx. No 67. — auf Hecken.

vorfliegend bei Fuscip. Haw., an welchem man nun den feinen Punkt auf dem Fühler fehlt, Fabr. Coll. Sarcitella L., und ein gemeldet, gewiss sehr deutlich gezeichnet Stück von Fuscip. Haw. Fabr. als Spretella in der Schiff. Sammlung. Was Sarcitella Röm. u. L. ist, weiss ich nicht, Kennzeichen sind genug, diese Namen ist kaum zu errathen, dass es wohl meine Linne a Römer Bemerkung, Grünberg zu sehen scheint. Coll. nun Spretella S. V. oder Fuscipunctella Haw. für unsere Art gelten? Missella L. gleicht mehr sehr der Rusticella Hb. 339, welche als Laevigella in der Schiffern. Sammlung fehlt, und mit Rusticella nicht gut übereinzustimmen, obschon sie Zinken u. Zeitlosen nicht zugehören wollen.

Fr. Caprimulgella Hybn. Ist mir neu und dieses fehlt bei. aber wie passt der Name auf das gezeichnete

Gel. Briggella Tr. Kann sie einzeln nur. Lieb nun ist mir zu entfassen, warum die Raupe hatt.

Oporr. Saligna Zw. Ich Zeller hat mehrfach 2 oder vor sie gefasst. Dem, wenn die Raupe auf Weiden hält, soll sie der Raupe der Tr. Gattung Gonoptericus eine bekannte Gattung, die in Jamaica gelb und gefällt ist. Diese soll in meiner Sammlung den Namen Saligna (Salicifoliella) Zw. — Dem aber, wenn die Raupe auf Populeln (Pappeln) hält, sind sie unbekannt, vielmehr ähnlich, und zwar gelblich auf Popul. trem.) hält, sind sie unbekannt vielmehr ähnlich, und zwar gelblich auf Populeln (Pappeln) hält, sind sie unbekannt

gefärbten. Halsfl. ark. Fischer und Zeller fehr Semifalcella fallax, weißlich nun
nicht. Flgr. ark. kann man für Mespilella Hb. ansehen, allfehr die Abbildung
nicht genau getroffen, doch gegen die schwarze Raute in der Mitte viel spricht.
Fl. Linie, daß Semifalcella dem fallax ähnlich, aber schmalere weißere Flügel
und weniger Schwarz in der Mitte hat, und überhaupt mehr einem Gemitte
als einem Raupe gleicht. Blancardella Linné von Mespilella nicht mehr, als
von Semifalcella verschieden. — Mehl mag Cydoniella Hw. sein? Fl. weiß
kann auch diesen Namen angenommen. — Cydoniella Fl. Mus. Schiff. ist ge-
wiß nicht Mespilella, und dazu kann auch durch Cydoniella Fab. gezogen
werden. Der Namen Cydoniella ist älter als Mespilella, daß müßte Cyd.
ziella Hw. Benennung beibehalten.

Fl. Lantella Hyd. ist ein Faselchen, wie ganz rund Hübner.

Fl. Abditella Hyd. Fl. wie abgefaßt sah. Es ist die nächste Verwandte von Fritillella Tr.,
welche Zeller mit Populifolielle, aber gewiß mit Unrecht vereinigt.

Fl. Tigerella Hyd. Fällt ist eine wahre Abbildung für Finaga Dentella Z., allein als Fabell ist
sie sah Gemeinwesen Mißfall und die Falgen etc. eadem sie in Elachista. Es ist wie man.

Depressella Elachistin sah ist bei den obigen Untersuchungen nicht beobachtet. Die Abbil-
dungen sind so passend. Daß man wie sah den Beschreibungen, und die sah nicht immer,
übereinstimmen fallen. Daß man wie jetzt so beurtheilig. Fl. wenn nun doch oben
einmal in die Beschreibungen der Schmetterlinge Depressella da gaben, wahr-
scheinlich aber nicht vielmal Zeller saman.

Fl. Mann schreibt die Raupe von Nemora Mouffetella L. eine Art, die wie, und wahrscheinlich auch
die Pedisequella H. 95 fallen, dem die Mouffetella Hw. 245 wird Ihnen wohl bekannt sein. Sie beschrei-
ben sie für die Linnéische und Fabricische, weshalb ich mich wundern, warum die Pedisequella für Mouffetella
L. fallen. Bei der Untersuchung der Schiffermüllerschen Sammlung notirte ich folgendes.

57. Mouffetella L. Rothlichgraues Oval mit 8 schwarzen Punkten. Auf der Raupe sah an einem Rothen Ho-
ny K. auf ganz gemein Art, aber übrigen fest. Sie ist zu Folge der Scala der Raupen der Punkten Pedi-
sequella Hw. 95 und ganz eine Varietät mit 4 Punkten auf jedem Ringel, wenn der Unterschied der Mouffetella Hw. 245
sehr klein ist. Die Puppe war 3 Punkte sah; so fand Haag. auf der Raupen besser mit Mouffetella Hw. 245
als mit Pedis

welche weder bei Schrader noch bei Dahlen vorkommt, sondern stets Pedisequella zu heißen, so wie schon früher für Mansfeltella Hbn. 245 stellt, weil die gezogenen Exp. alle 4 Punkte haben. Auch scheint das ab Dahl nicht die wahre Mansfeltella Hbn. Linnaei. — Zu Linné Mansfeltella Bergs gehört ganz gewiß, wie schon Fabricius Pedisequella nennt, und die er vermuthet, Insect. Hübners, wenn die auch über welche F. v. Fischer Pedisequella nennt, und die er vermuthet, Insect. Hübners, wenn die auch Linnaei Bergs und 4 Punktige Varietäten anführt, dadurch vermehrte Gnade, für seine Mansfeltella zu halten. Eben so scheint die Hübner Angabe im Text bei Pedisequella, auch welche diese Linnéische wohl Lavendelpflanzen und Wasserdost zu kommen soll, auf eine Verwechslung mit Terrella Fig. 170 zu beruhen, denn diese Letztere, wenn sie gar 3 Punkte hat, nur sehr ausnahmsweise mit der 3 punktigen Pedisequella.

Bei Linnéischer Mansfeltella, Pedisequella zu folgen und alle Linnéischen Pedisequella Hb. 93 und Mansfeltella L. N. zu zitiren, alle übrigen und die Diagnose aber zu streichen. Mansfeltella L. u Fab. bleiben mit Mansfeltella Hb. 245 vereint. Zu Pedisequella Zeller (s. das Foie) gehört nach Mansfeltella L. N. zu zitiren. "

Dass Linné u Fabricius unsere Mansfeltella Hbn. 245 meinten, beweisen die gleichlautenden Diagnosen, worin Punkte bestimmt genannt werden, was sie bei Pedisequella nicht sind. Und die Benennung des Fabricius. Dass die Flügel gefleckt sind. Die Beziehung Linné's: habitat in Pomerania und jene des Fabricius: habitat in Europa boreali gehört deutlich nur auf Pedisequella Hb., die auch in Gärten, selten wo anders (als einzig sie einmal in einem Kiefernwäldchen vorkommt. Zum Mansfeltella Hbn. gehören wie nun in Waldungen und in Nässen häufig im Januar. Eine haben wir Mansfeltella noch nicht gefunden.

Von Pedisequella L. N. (Blattgelbgrünender Raupe) war schon zu Oberpreuß. Zeit nicht mehr in der Pfeffermünz. Varietät vorhanden. Dagegen Linné Pfeffermünz unmöglich die 3 oder 4 punktige Pedisequella Hb. vorhanden haben.

Heydenreich
Frankfurt a/M.

Verzeichniss der Arten zur Aufsicht folgenden, mit rothen Nummern versehenen Microlep. Doubletten.
Octob. 1841 an Fischer v. Röslerstamm gesandt.

1. Myel. Fuliginatella Hyda	Euder Jung von Birken erzogen.	
2. Myel. Tumidella Z.	Euder Jung von Eichen erzogen	Ziemlich Tumidella Z. aber nicht Tumidana Hb.
3. Myel. ulvaestella Hb. ♀	♀ ♂	

Sendung an H. v. Heyden im December 1841. an Fischer v. Röslerstamm.

1 1	Tort. Cinnamomeana Tr.	Viele auf Eichen. Die Farbe ist sehr veränderlich, einmal fast ganz hell wie Cinnamomeana Tr., ein andermal als Fuscana Fuss. an manchen Exx. ist die Binde, die Flecken & die Spitze verschieden.
1 2	Tort. Rublevinciana Tr. (Triangulana Tr.)	auf Eichen.
2 3 4	Steph. Fuliginana Hb. 109	Selten.
1 5	Steph. Remyana Hübn.	Selten. Auch fliegen in Zeit & Selten an Eichen, aber nicht häufig.
1 6	Teich. Umbrosana Z.	Eichen in Mann's Sendung beigemischt.
1 7	Pol. Paematana (Var. Fridiana Hb.)	Die Exx. dieser Var. sahl und festlicher auf Eichen, wächst und unterscheidet sich genauer dieser Var. Hauptsächl. erst in Septbr & Octob. vorkommt. Mann sagt, sie kommt schon im April vor, habe aber so viele und frische Exemplare, daß sie nur Var. ist. Je dunkler gefunden ist Var. Fridiana häufiger, die andern Var. — selten. Die Raupe und in andern Orten ist den Sack Eingesponnen.
1 8	Nem. Festivacciella Z. (Fraxinella Beg.)	auf Eichen und Eichen Sträuchen gefunden & beigesetzt.
2 9 10	Nem. Chaerophylli Z.	
2 11 12	Nem. Pempinella Z.	
1 13	Teich. Euphorbiana Z.	Eichen.
2 14 15	Tin. Misella Z.	bei Tussilaginella beigesetzt.
3 16 17 18	Crambus Pascuellus L.	Eine in Mai & Juni unter den gemeinsten Crambis ab., an andern Orten soll sie selten sein. Wenigstens Räume & in Räumen mit andern Pflanzen.
2 19 20	Myel. Suavella Z.	Die Exx. war schon ziemlich auf Eichen und Haselbaum.
1 21	Endr. Arabidactella Fr.	Eichen. Bei Mann beigesetzt.
2 22 23	Aeg. Nimbella Z.	auf Eichen
2 24 25	Gryph. Bicolorana Z.	beigeflogen auf Haran Eichen.
2 26 27	Gel. Turdella Hbn. St.	Eichen. Einfach, nur zum Vergleich.
1 28	Gel. Distinctella Z.	Selten.
1 29	Gel. Solutella Fr.	Mai & Juni auf kahlen Bergen. variirt ziemlich = fast ganz Dunkel.
1 30	Gel. Distimilella Tr.	in vielen Exemplaren. Variirt.
1 31	Gel. Velocella Tr.	auf Flogau. auf Steinen viel Exemplare. wie meine Eichen.
1 32	Gel. Zebrella Tr.	in Böhmen gemein auf Heidekräutern, sonst nicht. Variirt, ist auf Eichen weiß gezeichnet.
1 33	Gel. Manniella Fr.	beigesetzt beigesetzt bei Exx. No 36.
2 34 35	Gel. Dimidiella Fr.	auf in Mann's Sendung.
2 36 37	Gel. Nanella St. Hb.	Eichen zum Vergleich der Art auf mich genommen sah.
2 38 39	Anac. Lineatella Fr. Tg.	In mehreren Exemplaren enthält mein 19 Exx. Die Eichen sehr ähnlich.
2 40 41	Ypon. Vicariellus Z.	Eichen sonst gefunden.
2 42 43	Oec. Resticella Hbn.	Juni, Juli an Zäunen & Hecken nicht selten.
2 44 45	Elach. Dispilella Z.	Eichen in Mann Sendung.
2 46 47	Elach. Cerusella Hbn. (Obliquella Zell.)	Eichen Exx. sind etwas dunkler als Eichen No 67. — auf Flogau.

166

783

362

125

welche weder bei Schaden noch bei Dahlen vorkommt, sondern stets Pediscapella vorfallen, so war schon früher für Monstella Hb. 245 fällt, weil die gezogenen Ex. alle 4 Punkte fallen. Auch [illegible] kann auch nicht die andere Monstella Hbn. kommen. — Während Monstella Rangs gleich ganz ganz, so kommt nicht selten Pediscapella vorfallen, und sie verwechselt, so Bruno Lübner, wenn sie nicht alle 4 Punkte Pediscapella vorfallen, und sie verwechselt, so Bruno Lübner, wenn sie nicht seinen Rangs und 4 Punkte Exemplaren vorfallen, da sich verschiedene Länder, für seine Monstella zu halten. Eben so kommt eine Lübner Angabe im Text bei Pediscapella, auch welche Fenzella Fig. 170 zu beziehen, dem sich [illegible] wenn ihre 3 Punkte [illegible] sind, sind [illegible] bei den 3 punktirten Pediscapella.

1	48 49	Elach. Bifasciella Tr.	mit einem [illegible] Rangs im April auf Festuca ovina L. Der Schmetterling im Mai. Die Raupe dürfte [illegible] sein. Ich kenne bis jetzt nur Exemplare als Art Verbreitung [illegible]
1	50	Oecost. Salicifoliella Zell. (Saligna Zell.)	Ich zog sie [illegible] Exemplare bei Phragmites Saligna Z.
1	51	Litt. Fritillella Tr.	Zum Vergleich wegen Spatifoliella Hb.
2	52 53	Col. Otitae Zell. (Galbanipennella Tr.)	Eben in Mehrzahl [illegible]
2	54 55	Col. Trochilipennella Tr.	im Juni, Juli in Gärten, Scheunen und vielen anderen Orten. Leider will sich hier eine große Oldipennella fallen, aber der ganze Habitus ist verschieden, und wo diese fliegt, finden wir Otitae selten oder gar nicht.
1	56	Col. Onobrychiella Tr. et Dale.	Die Raupe soll im Mai auf Astrag. onobrych. wie Schmalt. vorkommen im Juni & Juli. Ich von Albenella Tr. schon oft vergeblich.

Ich wünsche die kleine Lücke der Pfahlfalt auch selbst [illegible] können, was aber nicht Mangel, und selbst [illegible] Mann nicht [illegible] mir [illegible] Bestimmung dieser Arbeit gemacht, um sie [illegible] einfach [illegible] bringen.

Verzeichniß der Arten zur Ansicht folgenden, mit rogosen Räupchen versehenen Microlep. Hydrocera.
Octob 1841 an Fischer v. Röslerstamm gesandt.

von Heyden

Nr.				
1.	Myel. Fuliginatella Hyd.	Linde Jung von Birken erzogen.	1m.	Die Raup. Perlmutterfarbig, Rückenlinie dunkel, Seitenlinien weiß, Nackenschild schwarz, Afterklappe braun, Kopf braun, Füße braun.
2.	Myel. Tumidella Z.?	Linde Jung von Birken erzogen		Stimmt Tumidella Z. aber nicht Tumidana Hb.
3.	Myel. ulceratella Hyd. Kann Hyd. v. Rubrotibiella sein?	Julÿ		Ist verschieden von Tumidella und Rubrotibiella. Die Puppe auch. mir auch unbekannt.
4.	Pemp. Vomicella Hyd.	Kann nicht von Hyd. gefangen sein.	1mal	Eine Raupe mit hellen Flecken wie an Rubrotibiella, aber ohne Rückenlinie, Afterklappe und Füße rothbraun wie Rubrotibiella und Kopf.
5.	Pemp. Sororiella FR.?	Anf. Julÿ auf Viehstriften.		Raup. Schwarzbraun. Seitenstreif gelb. Sororiella ist sehr selten, und viel verschieden davon.
6.	Pemp. Ornatella Z.?	dasgl.		Stimmt Ornatella Z.
7.	Pemp. Adornatella Tr.?	dasgl.		Stimmt Adornatella. Ist selbst da nicht ganz sicher, da Tengstr. selbst Adornatella und Subornatella verwechselt hat.
8.	Pemp. Subornatella Zell.?	dasgl.		Stimmt Subornatella, selbst hier nicht genau. Aber den Raupen nach, gefressen oder gesponnen.
9.	Talaep. Ephemerella Hyd.	Mitte April im Wald.	1m.	Raupe Fleischfarben. Kopf schwarz. Rückenlinie roth. Seitenlinien weiß. Afterklappe und Füße wie der Körper. Ist sehr verschieden von Ephemerella Hyd.
10	Tinea Sturnella Hyd. Stelliferella var. major.?			Kann Stelliferella sein, da in Gesellschaft der angegebenen Raupe. Raupe fehlt noch.
11.	Tin. Flaviventrella Hyd.	Anf. Julÿ im Laubholzgebirge im Walde	1m.	Ähnelt Cort. Advers. Zell. wahrsch. Anmerk. N. 1.
12.	Tin. Veteranella Hyd.	Linde Jung unter Gebüsch.	1m.	Tin. Robigella FR. Raupe fehlt. Gespinnst in den Früchten. Ist Linde. 3 Mahl. Zeit ungewiß, Herbst u. Winter.
13.	Tin. Fulvifrontella Hyd. Angusticostella FR.?	Mitte Julÿ auf einer Heide.		Angusticostella FR. Anmerk. N. 2.
14	Tin. Corticella. Curt.	ab Picarella von Hannover		Raup. 2 Jahr. Lebt in einem Gespinnst an Baumrinde. Emortuella Zell.
15	Oecoph. Urella Hyd.	Im Juny im Wald im Julÿ. 1mahl.		Ist Vacciniella Hyd. Ist da in Linde. Raupe nicht gefunden. Lepidocera Bibionella Curt. ist eine verwandte Art, wenn sie bei Bonn gefangen.
16.	Micropt. Deflorella Hyd.	Mitte May. 1mal.		Stimmt die bei Linde gefundene Raupe, die ich für Deflorella halte, nicht. Ist aber eine Tinea.
17.	Micropt. Aurichalcella Hyd.	Anf. Julÿ im Wald an einem Grabe.	1m.	Raupe ist eine gemeine Art. Stimmt für Aurichalcella. Ist Aschfarbig. Calthella L. Var. Mod. Phil.
18.	Adela? Honoriella Hyd.	Mitte Julÿ auf einer Blume.	1m.	Ähnelt Swederella Z. (Swederella Tr. Chrysitella Fr.)
19.	Adela Semicuprella Hyd.	Mitte Julÿ	1m.	Cuprella Tr. Hübn.? Cuprella Hb. 445.) anmerk. N. 4.
20.	Adela Mollella Hb.?	Anf. August auf Nadelholz		Nimmt. Minimellus N. anmerk N. 5.
21.	Plutella Variegatella Hyd. Vitella Hb. 169.	Mitte Julÿ an Birkenstämmen.		anmerk. N. 6.

Myel. Ulceratella

Pemp. Vomicella.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№			
			Gelech. Gibbosella Z. – Anal verdickt.
22	Platella? Incomtella Hyd.	1 mal	Fl. nicht in Gelechia gefunden.
23.	Calantica p. g. / Albella Hyden.	Im July bei Elisen.	Fl. wie ganz im Sommer. Auf gelben Sandhaiden Ostpreuß. wahrscheinlich eine eigene Gattung.
	Fal. in Form die dicken Vorderbeine vorgestreckt und viele Aehnlichkeit mit einem kleinen Hymenia.		
24	Oecoph. Ectypella Hyden.	Juny u. July an Eichstämmen.	Gelbl. Electella Fl. 2 Lin. Flügel in der Ruhe in Form eines Daches aufgelegt. Fühler a Glied fein gekämmt. Palpen sehr kurz. Gelechia.
25	Oecoph. Strömella Fab.	Mitte Juny in Forsten Elisen.	anmerk No 7.
	Diese genau von Fab. beschrieben. Die Strömella weicht einigermaßen von H. Mann verfertigten ab Argentella Hb.		
26.	Oecoph. Productella Zell.?		anmerk. No. 8.
27.	Oecoph. Lamicrella H.?	Confinella. Hyden.	
28	Oecoph. Inspersella Hb.?	Dimidiella Hyden.	anmerk No 9.
29.	Oecoph. Albogutella Hb.	Im July bei Lyck	Oec. Fuigutella Fisp. 2 viele minor 15 Lin.
	nach Hyden.		
30	Depres. Miserella Hyden.	Ende Juny an Birkenwänden	anmerk. No. 10.
31.	Depres. Murcidella Hyden.	Mitte Juny. Erzogen im.	anmerk No. 11.
32	Gelech.? Macidella Hyden.	Ende Juny in Moorgebüsch	anmerk No. 12.
33.	Gelech. Maculatella Hb.	Mitte July. Erzogen.	Wilkella Maculatella Hb. Fl. sehr scheu, fliegt im Fall weit und im Sonnenschein.
	(Subsequella Hb. 162.) Rufescella Hyden. dim. in litt.		
34.	Gelech. Axillarella Hyden.	Anf. Juny. Erzogen	Fl. Gl. Rhombella. Wb. Bd. Mac. Wilk. d. K. Fühler 2 Glieder lang, 277 Fühlerglieder, wird bei allgemeiner Ruhe erzogen.
35.	Gelech. Floricolella Hyden.	Ende Juny bis August	Fl. Basaltinella Zell. 3 Lin. Flügel, die auf dem Rücken aufgelegt, 3 Fühler bei Männchen Fühler 2 viel kleiner. Fühler 2 gemein.
	Senectella H.?	auf Blumen.	
36.	Gelech. Molinella Hyden.	Anf. August an trocknen Fichten	Fl. Lepidella Fl. Fühler 2 Lin. Flügel, die auf dem Rücken aufgelegt, sind gelben Sandfarbig. Fühler fein gekämmt, beim Männchen stärker gekämmt, als beim Weibchen.
37.	Gelech. Clivosella Hyden.	Ende Juny an trocknen Fichtstämmen	Fl. sehr rein, gehört aber nicht in Gelechia, sondern in Elachista Zell. Fühler 2 Lin.
38.	Gelech. Signiferella Hyden.	Ende July u. Anf. August an trocknen Birkenstämmen.	Gelech. Mannicella Fl. Fühler 2 Lin. Flügel, die auf dem Rücken gemein, feine Fühler.
39.	Gelech. Pavidella Hyden.	Ende July. Erzogen.	Fl. Incognella Zell. mit einzigen bis fast auf einander stehenden Flügeln. Fühler 2 Lin.
40.	Argyr. Simplicella Hyden.	Anf. July.	Argyr. Tenuatella Fl. 2 Lin. Flügel, die auf dem Rücken fast in Form eines Daches aufgelegt.
41.	Col. Squalidella Hyden.	August auf Aeckern.	anmerk No 13.
42. 43.	Col. Ornatipennella Hb.? var. minor.?	July, August, auf Grasplätzen im Wald	Ende fast Ornatipennella Hb. Fl. meist heller in Farbe, Flecken und Zeichnung, Fühler schwarz, aber nicht gekämmt, sondern einfach, wenigstens beim Weibchen. Fühler 2 Lin. Flügel 5 Lin.
44.	Col. Mergipennella Hyden.	Anf. July.	anmerk No 14.
45.	Col. Tantalipennella Hyden.	Mitte July auf einer Heide, wo in der Nähe keine Genista wächst.	anmerk. No. 15.
46	Col. Coelebipennella Tisch.?	Ende Juny	anmerk No 16.
47.	Col. Gallipennella Hb.?	Ende Juny	Fl. wilkella Gallipennella Hb. gewiß Fühler 2 Lin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№			
48. Col. Colymbipenella Hyd.	Auf. Juny. Taunusgebirge		
49. Gracil. Aeriforella Hyd.	Mitte May auf Rubusgebüsch		
50. Ornix Jucundella Hyd.	Auf. August.	1mal.	
51. Elach. Ochraceella Curt.	Auf. July mit Epilobiella von Epilobium erzogen.		
52. Elach. Charpentierella Hyd.	Auf. Juny		
53. Elach. Egenella Hyd.	Im Nassauer in Häusern.		
54. Elach. Cornicella Hyd.			
55. Elach. Funebrella Hyd.	Juny auf Rubus		
56. Elach. Despectella Hyd.	July an Disteln		
57. Elach. Gracilella Hyd.	Auf. July an Echium.		
58. Elach. Adjectella Hyd.	Auf. May in Gärten.		
59. Elach. Bifasciella Fr.?	May.		
60. Elach. Blandella Hyd.	May.		
61. Elach. Congenerella Hyd.	Ende Juny		
62. Elach. Mistella Hyd.	Mitte Juny		
63. Elach. Modestella Hyd.	Auf. August an Grasern nasser Orte.		
64. Elach. Praeficella Hyd. Magerlella Hüb.?	Im Taunusgebirge Ende May auf Trifolium montanum.		
65. Elach. Octoguttella Hyd.	Im Taunusgebirge Ende May auf Trifolium montanum.		
66. Elach. Argentiferella Hyd.			
67. Elach. Dispilella Z.?	Auf Brachen und Grasern nasser Orte.		
68. Elach. Olorinella Hyd.	Mitte May.		
69. Elach. Susinella Hyd. Mit partifoliella nahe verwandt, aber	Ende May, Auf. Juny, Orte.		
70. Nepticula Myindella Hyd.			
71. Nept. Nigricomella Zell.?	May auf Disteln.		
72. Nept. Auronitella Hyd.			
73. Lith. Duella Hyd.	Auf. May im Wald.		
74. Lith. Hoffmannella Hyd.	May. auf Eichenblättern erzogen.		
75. Lith. Secatella Hyd.	Auf. August.		

Hoffm. Ulmicolella

Hoffm. Vomicella.

1	48 3/4 49	Elach. Bifasciella Tr.		
1	50	Oporl. Salicifoliella Zw. (Saligna Zw.)		
1	51	Lith. ~~Pap~~ Fritillella Tr.		
2	52 3/4 53	Col. Olivac Zw. (Galbu Elpenella Hb.)		
2	54 3/4 55	Col. Trochilipennella		
1	56	Col. Onobrychiella i. l. Rud.		

Ich wünsche die Klein- [illegible] Falter Nr. Mann- [illegible] Ordnung einfüg[illegible]

Nr

76. Tinea? Reticulella Hb. Mitte May im Wald. — ist Roesl. Curiosella Z. (Reticulella Tr.) (Curiosella Tr.) = Reticulella Hb. 179 kann allerdings hieher, aber auch zu Var. von Dalacella gehören.

77. Tinea? Velatella Hyden. Mitte September an einer Eiche? — ist Roesl. Holoniella Hübn. auffallend, meine 3 Exemplare kommen sehr gut mit Velatella überein.

Über die Arten mit gelben Nummern, worüber ich Ihnen hier zum letztenmal schreibe, bitte ich mir ebenfalls Ihre Meinung aus.

Mit Gelechia Velocella, Gallinella, Zebrella, Solutella, Terrella und allen diesen Arten bin ich auch noch nicht im Reinen, doch würde es für jetzt zu weit geführt haben, solche zu überschicken.

Phycis Matricella Tr. besitze ich von Kindermann. Ihr vorläufig neuen Gattung stellen Sie dieselbe. (Passt bei Zeller-Crambus als Matricellus.) Fr.

Unter dem Namen T. signella Hüb. besitze ich von Fiume von Kindermann eine Art die Sie vielleicht auch von ihm erhalten haben und die wohl Hübn. 211 vorgen soll. Diese Figur hat aber mehr gestreckte Flügel und keine dunklere Querlinie vor der Flügelspitze. Ist die Art von Kindermann eine Decadia?

Nach einem sehr dunklen Stück aus Laibach, wegen aber die hellen Fiumer Stücke ganz nicht übereinstimmt, ist Hübners Abbildung, bis auf die dunklere Flügelfarbe richtig. Ich halte für diese Art auch ein zweites Jahr stehen können. Die Beschreibung stimmt ganz, aber die Decadia nicht überein, denn sie hat einen weißen Punkt, am Ende beschreibt gemischt Fußgänger, und keine Spitze auf der Ader a[illegible] der Mitte.

Fr.

19 Oct. 794 302

175

An Fischer v. R. 1842 als Geschenk übersendet, durch H. Mann.

M. N. 1. Myelois Conditella Hyda (Im Mag. als überzählige Puppe von Riesa)
M. 2. Alveariella Fab. aus England
M. 3. Tinea Pagenstecherella Hb. von Paul
M. 4. Depr. Muscidella Hyda (Schon Fischer zur Ansicht geschickt, d. Riesa v. Hyperiella nennen. Die Raupe lebt auf Weiden. Puppe u. Falter stets einfarbig dunkel rothbraun, die Flügel)

168 787

Ψ Vorläufige flüchtige Bemerkungen zu Fischer v. R. Bemerkungen über unsere Sendung an ihn, im Jahr 1841. (9 Kl. 4. Dec. 1842.)

Monostella. Von Motta erhielt ich als Monostella an H. Mann Schicke, falsch ist [illegible] Die Monostella Hübn. 245. die Lage der Flecken [illegible] (obgleich nicht alle Flecken deutlich) vorhanden sind) [illegible] Punkt völlig und ebenso die Raupe Tab. VIII. v. Rb. [illegible] von Motta stets [illegible] Linneana nennen. Dass Linné eine andere Phalaena als Monostella beschreibt, ist mir ebenfalls sehr wahrscheinlich und [illegible] Linné [illegible] Hübn. 245 [illegible] Zirkel ganz die Rhombella Hübn. [illegible] die mir [illegible] eben[illegible] in natura nicht bekannt ist zu beschreiben glaube. Fast jede Gegend ist darauf eine Bestimmung dass unsere Maxillariella die Rhombella ist, wo dann freilich unsere ungeheure Raupe nicht so gut zu der Linnéischen Beschreibung passt. — Schon im Jahr 1832 erhielt ich von H. Riese dasselbe Thier, welches ich damals als Monostella geschickt haben sollte, die ich später in unserer Sammlung als Arundinella Hb. 247 finden hatte, die als solche Hübn. Monostella Hb. 245 anzunehmen, besitze ich wahrscheinlich gar nicht.

Mycl. Ulceratella. Habe ich nun die mit Tumidella zu Rubrotibiella verwandte Art benannt, die ich hier in einigen Exemplaren in hiesiger Gegend gefunden habe.

Pempe. Vernicella. Ich glaube nun auch diese Art auf 2 Exemplare hier gefunden zu haben. Sie erhielt sie unter von H. Blum in Wiesbaden unter nicht weiter genauer Benennung. Er selbst hat die Fabrication seiner nicht [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

№

76. Tinea? Reticulella Hb. Mitte May im Wald. 1 Ex. — ♂ Boucht. Cariosella Z. (Reticulella Tr.) (Cariosella Z.) – Reticulella Hb. 171 kann allenfalls dieses, aufgespießt, aber nicht von Cariosella sein.

77. Tinea? Velatella Hyon. Mitte September an einer Eiche. ♂ Boucht. Holoviella Hbn. aufgeklebt, nicht aufgespießt, 3 Fühlerglieder fehlen, ♀ Fühler.

Über die Arten mit gelben Nummern, worüber ich Ihnen eine Erinnerung machen, bitte ich mir abermals Ihre Meinung aus.

Mit Gelechia Velocella, Gallinella, Zebrella, Solutella, Terrella und allen diesen Arten bin ich auch noch nicht im Reinen, doch würde ich für jetzt zu weit gehen, solche zu überschicken.

Och. Ursella Hyon. Alle meine Hoffnung war es, mir von Ihnen Herr Mann die wahre, mir bisjetzt unbekannte Tinea zu erhalten. Auch ich hatte schon vermuthet, daß Hbn. einen andern Art bey Groden als abgebildet hat, und daß die Art, die abgebildet, mit einigen Fühler und Ester von mir für gehaltenen den Namen Vacciella gegeben. Ursella scheint ich abermals als eigene Art besonders wegen die Färbung der Vorderflügel mit der Hübnerschen Abbildung übereinstimmt. Birdella Curt. scheint mir abermals von Tinea verschieden zu sein, doch wäre auch möglich, daß sie als Abart dieser gefärbten ♀ zu gehört. Das ♂ welches ein schöner junger Tinea in der Größe von beyden Art und das sie als Birdella bestimmt, kann ich jetzt nicht vergleichen, da dasselbe jetzt von mir abgegeben ist. Babaletta Hb. besitze ich zwar nicht, habe sie aber in einiger Zeichnung aus Frankreich gesehen. Die Hbn. in Halle farbenrichtig abgebildet und mit den vorgenannten Arten nicht zu verwechseln. Beim ersten Anblick glaubt man sie eine andere Gattung vor sich zu haben und war als mir stets unbegreiflich wie man der einen Geschlechter Fühler so darauf machen wollte. – Wie übrigens Stephens die

19 Oct.

794

302

175

An Fischers v. K. 1842 als Geschenk übersendet, durch H. Mann.

M. 1. Myelois Conditella Hyda (Im Mag. als übergangenes Exemplar von Fischer)
M. 2. Alvearia Fab. aus England
M. 3 Tinea Pagenstecherella Hb. Im Park
M. 4. Depr. Muscidella Hyda (Von Fischer als Ancylis Hyperici bestimmt. Die Raupe lebt auf Hypericella werden. Puppe u. Falter stets einfarbig dunkel rothbraun)

793

Tin. Chenopodiella Hb. wird der vorgenannten Art in eine Gattung bringen kann, ist mir unbekannt und überhaupt ist fast, dass die Tinea den Schriftsteller Art beschreibt.

Ad. senicupsella Hyda. Ich halte diese Art deshalb nicht als cypriacella bekannt, weil sie grau schwärzlicher aber grösser und lebhafter gefärbt ist. Ly. von Tinea (v. Heydenam) wie Pfeffermatesella eine dunklere Binde auf den Vorderflügeln zeigt als 5 Stücke, die mir die Ly. von Scabiosella 5 nicht verschieden scheint.

Col. Tantalipennella Hyda wie Conspicuella FR. Meine Bemerkung dass in der Gegend wo ich sie fand keine Genista in der Nähe wächst, gründete sich auf die grosse Aehnlichkeit mit Vibicella deren Raupe auf Genista lebt, wie auch bei Treitschke ganz richtig angegeben ist.

Etach. Chrysanthemiella Hyda. Die Insectella Tr. würde ich nur in sehr bekannt sein, daher ich Ihnen für diese Bestimmung sehr dankbar bin. Die Raupe muss auf anderen Pflanzen, vielleicht der Serratula tinctoria leben, da I. mollis in der hiesigen Flora fehlt.

Lith. Hoffmannella Hyda ist wahrscheinlich von Klemannella verschieden. Im geschont sich von jener [illegible]

Nº

76. Tinea? Reticulella Hb. Mitte May im Wald. — ?s Roesl. Cariosella Z. (Reticulella Tr.) (Cariosella Tr.) – Reticulella Hb. 179 kann ebenfalls diese, wahrscheinl. aber eine Var. von Dataxella sein.

77. Tinea? Velatella Hyon. Mitte September an einer Eiche. — ?s Roesl. Holeniella Hbn. auf Schilf, einen 3 Zoll. [illegible] Schilf.

Über die Arten mit gelben Nummern, worüber ich Ihnen sine zum nochmal schreiben, bitte ich mir abermals Ihre Meinung aus.

Mit Gelechia Velocella, Gallinella, Zebrella, Solutella, Terrella und allen Arten bin ich auch noch nicht im Reinen, doch würde es mir jetzt zu weit gehen, solche zu überschicken.

Physis [illegible]

1 483 Klath. Bifasciella Tr. 49

1 50 Oporl. Salicifoliella Zell. (Saligna Zell.)

1 51

2 52 53

2 54 55

1 56

durch dunklere Färbung der Vorderflügel und Spiegel in 2 Binden gespitzt. Spitzflecken auf den Blättern der Eiche auf den Raupen sind Stigmatella Hb. Ebd. Hoffmannella in den Blättern der Eichen Kleemannella in [illegible] Gallen

~~Über die Benennung von RC. Hoffmann, [illegible]~~

Tin. Caprimulgella Hyon. [illegible] gegebenen Namen ausgefallen. Da viele Namen von Vögeln beider Welten in Gebrauch sind, so wählte ich auch diesen, von Caprimulgus der Nachtschwalbe (schon von Plinius gebraucht) weil [illegible] fast alle Abendfalter eine graue u. braune Farbe haben. Diese einfachen Vogelnamen entstanden, da sie [illegible] lich nicht berücksichtigt und würden in vielen Fällen auch z. B. Caelebs, Arcuatus, Troglodytes, Upupa [illegible] passen. Übrigens existirt auch eine Motte Caprimulgus Fab u. ein Käfer: Rhynchaenus Caprimulgus Oliv.

Lipsl. Lamprotornella Hyon. Diesen Namen habe ich von der Vogelgattung Lamprotornis entnommen, deren [illegible] Arten [illegible] Gefieder mit Metallglanz haben.

Tinea? Fuliginea Hb. Ueber die gelbgefleckten [illegible] Exemplare und die unsere Bestimmung betrauert, das einzige noch, [illegible] Varietät von Rusticana Tr. sind

19 Oct.

794

362

175

An Fischer v. R. 1842 als Geschenk übergeben, durch H. Mann.

M. 1 Myelois Consociella Hyda (Im Mai auf überwinterten Pflanzen
M 2 Alveariella Fab. auf Eichen
M 3 Tinea Pagenstecherella HB. [illegible]
M. 4. Depr. Muscidella Hyda (Von Fischer für Ancylis gehalten, ist Fischer v. Hypericella verschieden. Die Länge 6 bis 7 Millim. Fühler u. Palpen fast einfarbig dunkelrothlich oder bräunlich. Die Farbe der Flügelfläche stärker u. schwarz bestäubt.
M. 5. — Farrella. August von Bistram aus gezogen
M 6 Calantica Albella Hyda Juli aus Eisen
M 7. Oporstega Lustratella Hyda Mai Fehr selten. Auf Minierraupen von Hypericum.
M. 8 Lyonetia Imitatella Hyda. Juli, Mai, Raupe selten in Gebirgen Hypericum. (an der Antenne Augel deutet)
Diese so lang als die Vorige.
M. 9. Oecoph. Vicarella Zell. Im Juni im Raupengespinnst auf der Blüthe von Senecio
M 10 Grapt. Gallicolana Hyda Mai auf Galle von Cynips quercus-folii
M 11. Phth. Rugosana HB.
M 12 Coce. Strobilana
M 13 Carpoc. Fagiglandana Hyda
M 14 Carpoc. Hauptana HB.

15 Nube.

169

27 — Ciniflonella Hyda. Mai, Wald grasplatz
28 — Pallastrella Hyda Juli
29 Nepticula Speratella Hyda Mai
30 — Perpusillella Hyda Mai auf Eichenblätter
31 — Unicolorella Hyda Mai auf Ulmenblätter
32 — Basalella Hyda sehr ausgefärbt im Wald.
33 ? — Im Juni an einer Tannenstelle. in Nr. 13
34 Geometra? Frankfurt, Linien auf der Lunge

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 10 Novemb. 1842

796

171

Hochgeschätzter Herr!

Endlich ist beschaffelt, und ich war nun bis zur Ringelbüsa vorgedrungen Wandrascalina Herr Lieber Heinrich vom 6 Januar d.J. mit Ihrer Liste und gelehrtschaft bekannt gemacht haben wurde, finde ich mich Ihr ehrlich freundschaftlichst Pfarrer vom 19 Oktober auf das angenehmste. Liebes Lange entschuldigen. Aber mir ist nun, dass Sie gastfreundlich meine Hand ergreifen, so überschätzen Sie mir wieder mit meiner Gutmüthigkeit in Tantung einiges Lobes von Klümpchenmeldungen für meine Bemühung. Es angenehm ins auf alle Fälle Ihnen nennen, und Ihnen bekannt, so fest gewiss ist Ihnen Ihr Andenken in Dankbarkeit, wie ich Ihre Schuld mit

Ihrer Bestätigung

(1908)

An Fräulein v. L. 1842 für Ausflug zu Birkel, durch H. Mann. 795

170

11
1 Chilo Montanellus Hyd. (Tyrol)
2 —— Profugellus Hydr (id) ? der vorige?
3 Mycleis Parolatella Hydr (von Ragusa, von Kindern als Nimbella)
4 Anerastia Flaccidella Hydr (Tyrol)
5 —— ? Matricella Fr. ? (Unter diesen Namen von Kindern. auf dem Canal.)
6 —— ? (all Tin. Canella von Kindern.) Abschnitt 8.
7 —— ? (all Tin. Grittella von Krain, in Laibach) Abschnitt 9
8 —— ? (all Tin. Albicerella Fr. von Ragusa von Kidrm.) Abschnitt 9
9 —— ? (all Tin. Carbonariella von Ofen, von Kidrm.) Abschnitt 10
10 Tinea conspurcatella Hydr. Im May in Waldgebüsch. Ist selbe Tri. von Pastricella
11 —— Mollicella Hydr Im Juny auf baumstämmen für sich
12 —— Infimella Hydr (Juny) auf Baumstämmen
12 — Panctella Hydr. Ganz wie als Capitella
13 Oecoph. Lividella Hydr (Tyrol.) in № 20
14 Gelech. Vanella Hydr (Fünfkirchen, Kindern.) in № 26.
15 — Cinerotella Hydr (als Sororculella erhalten) № 27
16 — Pizigrella Hydr (Wiesbaden) in № 29
17 — Monffetella Fr. ? Mitte August in № 30
18 — Asindella Hb. ? (Von Ofen als Monffetella erhalten) in № 30
19 — Submissella Hydr (Ofen, Krain.) in № 30
20 — Aegerella Hydr Juny im Grab. in № 32
21 —— ? Von Kidrm als punctipunctella (Hübn. von Neuroptera Hydr) in № 32
22 Aechmia Stabilella Hydr.
23 —— Megerlella Hb ?
24 Col. Arthipennella Hydr (Tyrol) in № 36
25 ? —— ? Frankfurt (Hübn. Ornix gattifferella) in № 37
26 Elach. Mitratella Hydr (Tyrol)
27 —— Ciniflonella Hydr. May, Wald grasplatz
28 — Pullastrella Hydr Juli
29 Nepticula Spiratella Hydr May
30 —— Perpusillella Hydr May auf Tilia platyphyllos
31 —— Unicolorella Hydr May auf Ulmus-blätter
32 — Basalella Hydr Juny Aug in Wald.
33 ? — Juny an einer Trauerweide in № 43
34 Geometra ? Frankfurt, Hübn auf der Lauge

361

1843.

362

175

Tethy. Bostrichamm 798

Ende Juli

Ende Juli

Ende Juli

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 10 November 1842

796

171

Hochgeschätzter Herr!

Endlich ist beschaffte, daß ich wo mir bis zum Ausgehen verschobene Brandverletzung Ihres lieben Briefes vom 6 Januar d.J. mit Ihrer Liste und Bemerkungen darauf selber wieder finde, um mich Ihr letztes freundschaftliches Schreiben vom 19 Oktober auf das angemessene Letzte Lage aufzubauen. Aber nicht nur, daß Ihr Letztschreiben meine Hand vergessen, so übersehen Sie mich wieder mit neuen Gaben, daß die Sendung einiger Arten von Blumenfreunden, die angenehm wie auch alle Ihre Arten waren, und Ihnen Bedenken, so sehr gewiß ist Bedauern in Kenntnisse, wie ich Ihre Schuld mit Ihnen, abzutragen in Stande sein werde. Mein Vermögen ist sehr unbedeutend, und allzusehr ich auch mit Ihnen in die Freigebigkeit gemachten Kasse einverstanden gute Kasse sein, so verlange ich auf Ihnen in dem Überschusse, wie es recht zu wünschen wäre. Ich bin dem Samen zu sehr entwöhnt, und pflanze sehr sehr das Aufbewahren und Bewahren, dem alten Lob will jetzt selbe nicht mehr so recht gehen, und daher bin ich selbst auch nie gut zu sehen, als ich für meine Sammlung gebrauche, und bleibt absolut übrig, so erhalte es Ihnen. Ihnen wenig ist die schönste gesammelte Kinder Blumen zu schicken. Ich habe indessen Ihnen einige Dosis: es soll gemischt, um Ihnen viel meinen Blumen Theil meinen Beschäftigen zu können. Ich sind Ihnen die Namen noch bezahlten Beiträge.

Ihre mir zur Bearbeitung gesandten Kinder habe ich theilweise gepflanzt und meine Bemerkungen Ihnen beigefügt. Was ich zur Namensichen Sendung noch beizufügen und zu sagen hatte, finden Sie oben gesagt, und bitte nun in der Folge damit fortfahren, mir Ihre Empfindungen und meinen darin zu schreiben, es soll selbst fest zu meinen, und da ich selbst schriftlich mittheilen, mich zu besser Belehrung.

Stephens Brit. Ent. Vol. IV. sehen Sie, wie ich meyne, von H. Zeller längst gänzlich aufgeben, und wahrscheinlich sind Ihnen deshalb auch gesagt haben, selbe Individuen mich in der vorletzten Monaten Dezember, Januar & Februar beobachten sollen. Ich war wirklich im December selbst in meinen besten Lagen Lust, und Lust nicht von der Kälte. Zu gleicher Zeit entdeckte meine Observatorium, bald darauf (im meinen älteren) und wusste nur so genau Kälte, und schätze, als ich Lust genug war auf mein älteres Lose, das Leben meine schönen Beobachtungen, alle am Tage der Lebhaften sich nun in Stunden gestellt. Es lang einige Monate Lust allen auf mich. In dieser Zeit sind auch Ihre meinen älteren Lust, gebildeten Landes, und ich empfehle Ihnen auch die Länder wieder. Zum Beobachten dieses Lebens, den auch auf die Lust der Ihnen meinen jüngeren Landes. Diese Zeit wird mir wenig Lust Ihnen meinen jüngeren Landes. Diese Zeit wird mir wenig Lust in Beobachtung bleiben. Mit Mühe habe ich alles besorgt, und Lust Ihnen Ihnen und meinen Familien nicht Mühe und Lust belassen.

361

1843.

362

125

Tinella)

Lieb. v. f. und gelbe von St. & M.

4; f. stella; alba a. stella mit Lamark

Lust

an mosse alle Lamark

Tischer v. Röslerstamm 798

sind die Lepidopteren

sind nicht Lieg finden

Lust, Lust Lust an

Lust selten, und Lust

Lust) Lust auf Lust

Lust selten, und

Lust alba nicht Lust,

Lust Lust, Lust

Lust, Lust Lust

Lust Lust Lust

Lust Lust Lust

Lust

Gern hätte ich da Band von Stephens gemacht gehabt; und vielen Lobgeschenkt, aber das war unter der damaligen Zeitungen nicht möglich, und ich war froh ihn nur gelesen zu haben, um ihn Gabelentz befindend zu können. Aber haben, um ihn Gabelentz befindend zu können. Aber Sie müssen das Lesen und Reisen nun wie sehr lieb, dass ich Ihnen für die Zusendung dieses Artikels herzlich danke.

Schwierig ist es möglich mancher Dinge, anzukündigen ich mich über die Geistlichen, die Sie von Keller, Hammerschmid & Trivaldsky zu haben wünschten, und, Sie werden es kaum glauben, dass ich zu Keller noch nicht damit in Reimann bin. Keller war ganz mit der Leitung z. Industr. Ausst. 1 zu beschäftigen. Hammerschmid, welcher in einer ganz entgegengesetzten Verfassung (Sie kennen mich) erfahl, war immer nicht anzutreffen. Ich schrieb an ihn; er erfolgte keine Antwort; ich liess ihn durch meinen Bruder einmahnen, und er versprach, eine der gewünschten Geschichten zu liefern, das andere habe er nicht übrig. Aber Reiman verliess sich auf Ihn. Als ich ihn in Leipzig besuchte, war er gerade im Begriffe nach Pesth zu reisen, und bat, bis zu seiner Rückkehr die Geschichte nicht zu machen. Vor 8 Tagen versprach er mich wieder, die Geschichte, nebst einem Beitrage von Ihnen in mein Taschenbuch zu bringen, aber bis heut ist noch nichts zu erhalten. Da nun Keller die Sendung gern abgethan haben will, so wende ich mich noch einige Tage zu gedulden, und kann nicht, ohne unsere Freundschaft Gefahr laufen müssen. — Von Keller habe ich von einigen Musen, nach verschiedenen Masken und die mitfolgenden 4 Bände erhalten und so bitte mir die beiden Empfehlungen an Sie nebst den Bemerken auf, das Sie sehen das Sie mit dieser Sendung einen Reimann etwas angenehmes zu bereiten nicht. Trivaldsky anbelangt, Abschreibungen sind schon, so viel ich auf mündlichen, mündlich zu haben, man soll sie mir in 14 Tagen bringen.

Mit meinen 20 Heften will es gar nicht vorwärts gehen, es ist, als wären alle Lust daran abgeschnitten. Mit vielen Arbeiten genug habe ich endlich die Tafel fertig, dass ich sie gleich [illegible] fest in einer 8 Tagen an Keller schicken kann. An das Tagebuch wird es noch nicht zum Leipziger Jubilate Messe kommen. Ich glaube es ist beschlossen, dass Sie damit den Abschluss machen. Ich glaube jährlich im Januar fest ein Colophonium in einem einzigen Octavbande herausgeben.

Von Heinrich-Schäffer's neuen Werken sind und sieht man nichts. Ich habe sie zwar einige Blätter Original Abbildungen gesehen, aber gelinde, wenn aber schrecklich mehr hässlich als Herr Schäff. mit Arbeit und Fleiss gefunden war. Diese

Arbeit macht mir viele Zeit und ich habe keinen Menschen hier. Mist mit den Steinen ist ganz fleißig, aber nicht reinlich sein, denn eine gute Arbeit wird nicht gelingend werden. Ich Feige hat noch wenige Tage Dienst, dieses Appartil, da wünsche sein Abschied fortbringen und stelle es auf nun 20 Monathen gehabt. Ich kann mich unsere, so freundlich ich auch gegen Alpiben muß), die Stellung unter Zahlung Ich Feige abnah gleich einen Monathen über die Lemmerung zu fragen, welche es sich in seinen 64 Gliedern bei dieser Compagnie erwandt. Ich sey mir alter Glück, dass Spandau, vielleicht über sich in Kleinen 3 in Gefangenen, sei gesund in der andern Welt der Gesicht, Gnaden zu wollen, wenn ich oftern Zucker und schönen Tabakpfeife wollen. Dass der Lehrer am 4 Juni J.C. in Welt nach einer Lungen oder Herzen gewesen Krankheit (der Herzbeutelentzündung) war: liest, und schon Tausch bekannten. Auf meinen Cantor Fuhr ist der Lindhofer, ist er jetzt nicht. Man glaubte, und es war auch Wahrscheinlich, dass der Cantor seine Stellung für das Fabrik Lehrer wieder, die Wittenfabrik 5000 Thl. da Fabrik Lehrer wieder Wittenfabrik 5000 Thl. da Stelle Schreiber und Cantor, vorzüglich auf den Rath Schreiber und ab. einer Fabrik besitzt natürlich viel auf wenige Bemerkungen, alles nach die Stellung entfällt). Jetzt sind Tanzschuhe in die Welt gestellt worden. Ich jetzt ist der Fußsteg Gebäck 2500 Thl. gewesen. Im Vierteljahr zu machen Schuhe ist die Entstehung nicht. In den Kleinen Schuhe ist für jetzt in neuerer Zeit durch Pferden natürlich, angenäht und gewandelt werden, wofür ich für diese Anfertigung nicht mehr mit seinem Preise stimmt.

Vor einigen Tagen starb nun das 82 jährige Pensionirte Cantor bei 26. Fabrikarbeiter H. Franz Ziegler in Altenburg.

Ich umfasse mich Ihnen bestens und verbleibe mit allen Hochachtung und Freundschaft Ihr

ergebenster

Löther v. Bösenstamm

Da ich heute (16 Novemb.) H. Hammerschmidt die vorgenannten Briefe nicht gelesen hat, und H. Mann auf die Absendung dringt, so warte ich nicht länger, und schicke Ihnen jene Briefe in anderer Mal mit, wenn sie sie noch Lemmen schreibt.

Ihr alter Freund H. Hammerschmidt sagen, es wäre schon alt in guter weltlichkeit wie Dr. Hammerschmidt sagen, es wäre wie mehrere die Zeile schreiben, und auch einen Dienst sagen wir Ihnen, die Bezahlung wäre also vorgehoben. heute heute (den 18.) um:

1/25

Vorbestamm 797

12 2. Scap. Totalis Zoll. Jede Art fliegt in der Entgegengesetzten Richtung in die Niederungen, als auf Hohen ganz sinnreich. Es wird allgemein für Nebelatis M. gehalten, und auch Raubfische [illegible] Das Ort aber, wird es bestätigt, Hohen Namen in seinem Tausch ist die gegenwärtig Art. das Ihnen Hundel, und nun die Fallenen Hunden muß andere entgegensetzen haben. Zuhause Abbildung [illegible] Totalis. Art fallen Sie dagegen? Hohen Namen Hohen muß. Zoll Namen dessen sich Art Totalis.

Schwarz ist der beifolgenden Fassung des Gutachtens für Landwirthe pp. und die Meldung, es werde Ihnen, da es Ihnen viel gefallen habe, eigens zugesandt.

Heute erhielt ich auf von Heyden-Rossitten einen Brief, worin er mir meldet, Ihnen sey 7 Becher der Pflanzen übersandt worden, die ich ihm gefällig zu senden. Die Briefe dürfen als Fundstoff gelten, da sich auf keinem gewöhnlichen Felde einzelne in den nöthigen Anzahl gefundene Pflanzen, auch selbst der Fall sehr viele Mittheilungen zum abbilden, der Bau wesentlich in kurzer Zeit in Raum sein wird, immer mehrere Arten einer Gattung auf einem Tafel haben zu können, dasselbe es Ihnen Vergnügen machen will. Wesentlich wird es auf dem Umstand ankommen, was ist der Hauptgesichtspunkt zuerst für sie sollte. Es pflegt mir zu ansetzt ein Tafel mit 3 Colias antaeus, wesentlich Boothi ♂, Heidendi ♂, Pelidne ♂, in ganzen 6 Figuren. Die sind ganz im Habitus Bild ganz Caitat und ziemlich gut illuminiert.

Leben Sie recht wohl recht

Ihr

H.B.

Braunschweig d: 25 Dec. 1842.

Dank für seine Bestimmungen, Gedanken, Notizen und Besorgungen bei Hammerschmidt u. Dollar. — Was mir Mann als T. Quercicolella schickt, ist Zeller Abart von T. granella, und nicht meiner Mollicella, das charakteristische Merkmal bei T. granella und ihren Gattungsgenossen, was noch nicht bekannt ist. über Freyers Bemerkung über mein bei Ypon. Helicella. Es ist gut, dass er nicht viele Kleinigkeiten anführt. Bönda an Mann, Dollar u. Hammerschmidt bei gr. Schaden. Letzterer empfiehlt meine Bücher. —

Über folgende Arten, die ich nur zurück erbitte, wünschte ich Ihre Ansicht zu erhalten. v. Z.

173

9 Oktbr. 1842.

Nr.			
1	Cicla Montanellus Hydr.	Tyrol.	
2	— Profugellus Hydr.	id. — Vielleicht d. Vorigen.	
3	Mydris Orsotatella Hydr.	Ragusa — Von Kindermann als Nimbella	
4	Crambus Flaccidella Hydr.	Tyrol	
5	— ? Metricella Tr. ?	Banat — Von Kindern unter diesem Namen	
6	?	als Canella von Kindermann	Epicn. Canella S.V.

Zu mir Zuhalt. Fischer rät, und N. 2 jedenfalls das 2 Jahr, in Italien, Hübn. Fig. 38 — Flang will einen eigenen Gen. errichten.

vide Anstand N. 3.

Zu mir Zuhalt auch.

Crambus Metricellus Tr. ist wenigstens nicht Hübn. Metricella. Hübn. scheint Canella S.V. Epicn. Canella S.V.

Meine Bemerkungen zu der heutigen Ordnung (November 1842) Fischer v. Röslerstamm 192

zu den Wenigen von mir, mit rothen Zettelchen. 172

No. 1. 1 Ex. Eudor. Centuriella S.V. (Galleria Centuriella Tr.) als wir auf unserer Reise in die Steyermark gelangt, da fing auch Fili (Fischer mit Recht vorfliegen) in Waldschlägen auf einer Höhe von circa 3000' bereits, wenn wir uns gerade ganz ausgetrocknet, denn wir kamen bis jetzt heuer nur wie, aber nasse Gegenden (Sümpfe in der Ebene). Raupe (bei Brig. in Tannenschwämmen, so selbst beschrieben) Fischer fallen wir keine kamen mit und ohne. Diese ist der schnell und sehr fliegende, blasse Fal. hat wieder gelbgraue Schmetterling zu fangen. Zu den angeführten Tannschwämmen, wo man gewöhnlich Raupen kamen müßte und bei Regnischen gewachsen, vermissen Gattung der Nadelholzer. Die Weibchen sahen wir nicht 2 Ex., welche wegen ihres grünlichen Kopfes Fischer sind.

2. 2 Ex. Eudor. Sudeticella Zell. Lange Zeit beobachten wir nur einzelne Raupe, die Ex. Zeller in Riesengebirge gefangen hatte, und wir nie schien in Laubholz Gebirge. Jetzt beachten wir das gebirge nun schon gefangen hatte, und wir nie schien in Laubholz Gebirge, sind ziemlich scheu, in Laubholz Gebirge. Sind nicht gar selten in den Riesengebirge Gebirgen, sind ziemlich scheu, in Laubholz Gebirge.

3. 3 Ex. Cramb. Stoechellus Hbn. (Conchellus S.V. — Mus. Schiff.) Die in Ungarn nur 2 Stück angeben, scheinen Conchellus Zk. o Tr. nicht zu sein S.V. sein. Vielleicht hatte sie frische Raupen, wenn es Fliegen in Schiffe. Raupe Raupe benutzt und nicht immer auf so ganz der Eingrenzlichkeit, Pinien nachgebaut hatte. Diese auf Fliegt in den Riesengebirge Gebirgen in jungen Nadelholz, in Holz, an Tannen Rollen nicht selten.

4. 1 Ex. Cramb. Pyramidellus Tr. (Margaritella S.V. — Mus. Schiff.) Fliegt in Gesellschaft des Stoechellus, aber viel seltener. Eine Zeitlang Vielleicht wieder von einer sein zeitlangen Verwechslung in der Schiffen. Raupe Raupe, Klopf Raupe, weil das Kind an einer langen Nadel steckt. Die wissen aber, das Schiffen. wäre sie von anderen, mit langen Nadeln versehen, und unsere Raupe dann über Winter gesetzt in Riesengebirge ganz gut. Charakter Raupe des seltenen Pyramidellus nicht, dasjenige Margaritella Hb. einhält.

5. 4 Ex. Crocoph. Idaeella Zell. Auch von Fischer beschrieben wie Schiffer mit wenigen von Zeller in Riesengebirge gefangenen Stücken, jetzt fanden wir sie in Riesengebirge auf mit Himbeerstauden, Epilobium Zeller, Raupe, wachsenen Gebirgspflanzen nicht zu fallen. Die Raupe soll wunderschön auf Epilobium (das hohe rothblühende) leben, wo Verwandlung jetzt sich stets auf dieser Pflanze, und zum Ueberwintern auf Himbeerstauden, wo dergleichen oder Epilobium wachsen, das ist den Verwandlung nicht Weibchen fallen.

6. 3 Ex. Tort. Decimana S.V. z. Tr. Von hier an sah ich auch ein 1 Ex. gutes Pärk in der Riesengebirge, und ein geschätztes Vorkommen Raupe, obwohl wenigstens diesen Raupe und die Belauschung dieser Art jetzt angenehm, wenigstens, um der Belauschung Beckers eingeschlossen, wahrscheinlich gesetzt gewiß sie von Tortrix als Decimana verkauft, und ein, als ich diese Arten Raupen verwandt, sie waren manchmal unterschieden, als sie ihn nicht war, und wie in Wien für eine Decimana fallen, ist Raupe als Rhenana als Rostiga. Decimana ist schwer zu fangen, sie fliegt auf hohen Gebirgen (in den Höhe, wo Cacalia wächst) in Gesellschaft zwischen niedern Fichten & Tannen in Gut. Die sahen viele, ohne jemals Gefangen wurden zu können, da sie sich in Gesellschaft verfallen. In Wiesengegenden kamen sie nicht vor.

7. 2 Ex. Grapholi. Montanana Tr. Von hier als selbigen Jahr Standort verschieden. Ein Flug am Fuße des Rax, sehr schon über 2000' hoch, an Fichten Bäumen in Gesellschaft.

8. 2 Ex. Depress. Pimpinellae Zell.

9. 2 — Steger. Sorbiella Tr. Ungefangen.

10. 2 — Cathyl. Richteriana Zell. ohne Leiden, sind den Flügel eigen.

11. 4 — Pterophr. Osteodactylus Zell. Man findet in Gut in den Gebirgen Gebirgen

12. 2 — Scop. Fatalis Zell. Diese Art fliegt in den Gebirgen gemeinschaft in den Riesengebirgen, mit auch schon Gesellschaft fünfzig. Es wird allgemein für Nebulalis Hb. 81 gehalten, und mein Vorschlag ist schon Raupe in seiner Verwandlung sich ist die gegenwärtige Art. Das Buch über, und es hat Bücher mit Fatalis Hb. einhält. Zeller Abbildung ist sehr schön, und wie die fallenen Bücher müßte endlich vorgeschlagen haben. Zeller Abbildung ist sehr schön, und wie die fallenen Bücher Raupe Raupe. Zeller nennt diese sich auf Fatalis. Das fallen Sie dennoch Raupe Raupe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich fange ich die beifolgenden Fortsetzung des Tagebuchs für Landwirthe pp und die Meldung, wo meine Thiere, die an Raum gut gehalten haben, eigner Schnitzer.

Heute nachmittag ist mir von Herrich-Schäffer einen Brief, worin er mir meldet, Ihnen Herr Dr Becker den Falter übersandt zu haben. Bedauere gehindert zu haben. In Beziehung dieses die Fortsetzung. Bedauere sehr, da sich mehr Raum gewinnen ließe

Zu Mann's Sendung.

N3. Xyst. Sellana Hb. wurde bisher für eine Varietät von Gentianana gehalten, kann Raupe in Canada lebt Fall und 29 in Juni & July fliegt. Sellana fliegt in Mai und die Raupe lebt in Dänemark).

6 Lac. Rhediana FR ist der Pygmaeana sehr verwandt, aber bestimmt nigana ab).

7. Semic. —— da in Fall mit Zaschmann bei Frankf. M. vorkommende Turfosana Zell. ist eine andere ab). Gegenwärtig in Mai & Juni sehr selten fliegende ist wohl die Rurestrana FR. — Die mit andern vorkommende Rhediana Fischer Röslr, vorkommen Mann, die sehr verschiedene Thiere sind, die Fallen, allein ist sehr kleine schwärzliche gemeine, die seltenere kleine Röslr N7 & N8 des von Hrn Pfaffl sind gewiß Rurestrana und das dunkle, kleine Falle ist wie für Var. Semic.

8. Graph. Monticolana Mann, sehr verwandt mit Augustana Hb., fliegt in August, abends, unter dem Gipfel des 6500' hohen Schneeberges in Tirol Raum Salz-Regions, und wo bis jetzt noch unbekannt

10 Loch. Purpuratana Mann. die Schmal, noch sehr schönen Thiere; vorkommend).

17 Tetra. Elathrella FR. die Verschiedenheit der männlichen & weiblichen Palpen ist auffallend.

18 " Lichenella L. Ob sehr wohl die Trigonetrella des Linnéschen ist, ist noch unentschieden. Sicher ist aber, dass diese N18, verschieden von N19 ist, obschon Hrn Mann von Lichenella noch nicht sein Thier sah für von dem Namen N18 unterschieden. Zeller schreibt in der Isis bei Recension Dupont's Lepidoptera Lichenella wird Trigonetrella, Falle aber damals noch mit Trigonetrella gesehen. Lichenella ist noch Schäffer unbekannt.

20 Tin. Capitella L. die Fliegen in Falle wieder diese auch, die sich Falle von der Linnéschen Tinea den Gattung von Cocal folgt, dass man sie Linnéschen nicht so künstig wie von 2 Jahren, Engagen aber anfüllen wie von ihr ein madenartiges ganz gelbes Larvenkleid in meinen Röhren, als wie für nächsten Tod gefallen sehen wieder, während mit nicht auf Übergänge in die Puppe gekommen, wo die Larven Gespinnst für den nun, und die gelbe Farbe unterschied.

21. Nemat. Rhodellus Hbn. Zeichnung Abbildung ist zu fall. der Sicilianer Lateralellus ist bestimmt anderes von dem hiesigen Rhodellus. Hübner soll schon einige Unterschiede angegeben. Ob wenden die Sicilianer auch noch dasselbe.

25 Separatellus FR. Die einst Mailand in Ypsol. gefangen wurde, bildet mit Binotella, Dolosella & Imparella eine eigene Gattung, die Hr Zeller noch bilden, und das Wichtige darüber in meinen 20 Heften sagen wird, wo alle diese Arten abgebildet sind. Von allen sind die Weibchen unbekannt, selbst, die ich mir Imparella Flügel haben, und Larven mussten in Gespinnst aufgefunden werden mussten; aber auch die Männchen von Imparella & Separatella sind noch selten.

28. Steph. Rostrella Hb. Zeitvorstand müsste ab sein, das bestimmen einst Jahre zu sehen, das zum andern male das Weib hinter, in Manne schon so gemeinen sind, sind! Ich gewollte fasse, das Männchen Fundort Raupen, finden sie Weib finden wieder, dann Lust ab ja finden zu Gesicht, so fällt es ab, wie ab mit rund ging, für einen Gast sorgen. Nun ist schwärzliche Raupen und um die Mittagszeit Lust das Weib an den Gespinnstrand hinauf, sonst fällt ab sich Stabl an den Blumenstengel und ganz Dunkel, einen Gespinnstrand, das sonst auf Pflanzen Raupen einen Rock bildenden Rock, bildenden Gespinnst, das sonst auf Pflanzen Raupen wechselt, nicht. Man muss Stundenlang auf den Blumen aufsehen, finden Rock und Raupen, also man so glücklich ist, 1 Rock zu finden, indessen die Männchen zu Tausenden fliegen; fliegen. Hoffen sich zu Fall in Weib anzugehen, indem an Tisch Gast von Fallen zu Fliegen Fliegen dort einlang, besonders sich die Raupe der Rostrella befand. Es sind aber auch die Raupen schwer zu finden.

36. Oecoph. Noricella FR. ist eine neue, erst vorgekommene Falle & ausser N, von 3 Mann dagewesenden Arten entdeckt dort, wovon wir bis jetzt nur 2 Weiber besitzen. Von Saxonsella Hb. ist sie sicherlich verschieden.

44 Tel. Ligatella L. Nach der Schiff. Zeichnung sind Ligatella & Vorticella Syn. Linné, ausserlich der Farben, welche mir auf Abbildungen vorkommt. Falle ist Linné No 44. Ich nehme, um Irrthümer zu vermeiden, für die Raupen der Namen Vorticella, die in den Gespinnsten auf den niedern Circelle Hb. an. den Blättern den Namen Vorticella Ligatella für die Raupe vorkommende auf den niedern Blättern von Cacal hinter einen wasserklaren Vorhang sitzend, ausser den, auch nicht schwärzlich bleibenden grünen, habe ich mit den Lupe weissliche schwarze Punkte, aber auch nicht so deutlich sichtbare, wie ich dann noch besitzen Raupen zu finden suche.

über folgende Arten, die ich nur zurück erbitte, wenigstens ich Ihre Ansicht zu erhalten. v. H.

19 Octbr. 1872.

No				
1	Cicl. Montanellus Hydr.	Tyrol.		
2	— Profugellus Hydr.	id. — Vielleicht 2 der vorigen.		
3	Mydaris Insolatella Hydr.	Ragusa.	von Kindermann als Nimbella	
4	Laverd. Flaccidella Hydr.	Tyrol		
5	— ? Matricella Tr. ?	Banat.	von Kindermann unter diesem Namen	
6	?		als Canella	von Kindermann

Ist mir unbekannt, scheint neu, und N. 2 jedenfalls sehr gut. Taster, die Palpen, Fühler, Kopf, Thorax, Flügel, Farbe, Zeichnung, alles ist eigenthümlich.

vide Anmerkung N. 3.

Ist mir unbekannt.

Cambr. Matricellus Tr. ist wenigstens als Typ. Matricella Hübn. sehr kenntlich.

Epicn. Canella S.V.

53 Col. Vicinella FR. ist eine so charakteristische von den übrigen äußerlichen Arten verschiedene, eine

54 " Rectilineella FR. als von der ihr sehr ähnlichen N. Fringillella FR. ist.

Zu der ganzen Menge schlecht äußerlich colorirter, die sich absolut nur schwer, wenn überhaupt, scheiden lassen, sind bald mehr mögliche kommen, welche nur entweder sehr viele Arten und diese in Masse recht gut beschrieben, oder gute Abbildungen aller bis jetzt bekannten vor sich hat. Die letzteren wird man noch eine Aufgabe für mich machen, ehe ich meine Classification definitiv abschließe. Ich glaube nicht, daß irgend eine Sammlung so viel Exemplare Arten (mit ~~Ausnahme~~ mit Ausnahme seiner) aufzuweisen haben wird, als die meinige und jene des Hr. Mann.

59 Gel. Senectella FR. Mann hat sie gezogen, und diese Art für Pulverulella gehalten. Diese letztere hat einen glatten Kopfschopf und ist Dunkelbraunfarbig; ihre Raupe muß die Flechten.

57 fel. Falonella FR. sehr ähnlich der Terrella FR., unterscheidet aber stets die Spaltlinie von der Wurzel, und hat auch andere Vorderflügelform.

64. Glad. Serratella Tr. Die am Vorderrande bei dieser Art befindlichen Runzeln gehören zu Gottiferella Zell. — Serratella Lien. ist mir noch unbekannt. Die alte Benennung zu benutzen, habe ich für diese Art in meiner Sammlung den passenden Namen Argentosella FR. beibehalten.

65 " Canifolicella Tr. Z. ~~Frölich~~ Mann sind der, daß die fraglichen Raupen der Canifolicella Tr. (Hbn.?), auf die als Vorderflügelform, eine Art zum bestimmen gestützte N. 27. Toscanella FR. sey. Ich finde nach Färbung Raupe, eine Art zum bestimmen gestützte N. 27. Toscanella FR. sey. Ich finde aber, daß diese Art in Farbe & Zeichnung variirt. Es ist aber möglich, daß zwei Arten vorhanden sind. Beide haben eine Menge schöne Gespinnste, sich stets abwechselnd Arten, worunter ein auch nicht ganz klug gewordene sind, und müssen ich Räupchen auch auf mikroskopischen Untersuchungen.

69 " Cinctella Zell. Zeller hält diese Art (in der Mehrzahl) für die wahren Canifolicella und Canifoliellopsis. aber die Vorderflügelform ist es nicht; denn diese hat mehr den Namen Cinctella verdient, welche Lizzella Stt. & Vortitella Schrk. & Cinctella Hb. vereint gehalten, und seine Beschreibungen haben Einen Ausschluß, da nur selbst nicht im Klaren war. Ich habe meine neben Cinctella vorhandenen Arten nicht gekannt, sonst würde ich Zeller's Cinctella nicht Lien. sondern Zell. Herr Staudinger hat diese Art sehr richtig erhalten.

76 Aechm. Lynitella Var. Majorella Mann Hr. Mann will die größeren Ex. getrennt wissen und gab ihr den Namen Majorella. Ich kann, so viel ich mich erinnere, mir ganz keinen Unterschied finden.

77 Coc. Bugnionana FR. Dr. Bugnion in Lausanne entdeckte diese Art zuerst auf dem Montrose. Sie fanden sie in wenigen Raupen im August auf dem Gipfel des Chasseron.

78 Stroe. Megadactyla Hb. Zell. diese selten Art kam in Hofgastungen vor. Die Thiere fliegt ziemlich häufig an Bäumen eine Stunde gegangen, flieht aber in der Gefangenschaft nicht, weshalb die Megadactyla des Mod. Schriftsm. & Tesseradactyla Tr. ist, und ihre Raupe bald in der Stengelspitze der Hopfenstöcke. Nämlich sind die selten Thiere, wie die gemeinen fliegt, sind sie ungetrennt. Es müssen diese also doch 2 Arten sein. Macrodactyla Fabr. endlich Zeller als eine gute Art mit Megadactyla vereinigt, ist, obgleich mir selbst Zeller als eine gute Art mit Megadactyla vereinigt, ist, obgleich mir selbst das Ganze auf keine besondere Zeichnen die Verschiedenheit fassen, dennoch eigentlich an Art, da die Raupe & Puppe verschieden ist, und auf Senecio nemor. lebt. Ohne haben in unseren Sammlungen einstweilen die selten Art mit Megadactyla Hbn. die gelbe Art mit Tesseradactyla Tr. bezeichnet und Macrodactyla Fabr. als eigene Art angenommen.

82 " Oreodactyla Mann ist Zeller's Fuscus Var. C. Ich sah Zeller schreiben, als ich sie viele Exemplare dieser schönen Art fing. Oreodactyla, und gezogen Raupe & Puppe selbst bekannt. Das eigene Art sein wird. Wo

Ehrenberg ist der beifolgenden Fassung des Zeitschrift für Landwirthe pp und die Meldung, wo meine Thiere, die an Einem Tage gefangen sind, eigentl. Typhus.

Ich vermisse ich nur von Herrich-Schäffer einen Beitrag, wenn er mir mitbeh. Thiere über die Alpen über die Tauernkette gefolgt zu haben. Zu Ehrenfels [illegible] Kundschaft will ich [illegible]

81. Pterophr. Hieracii Zell. Ist wirklich die Zellersche Art. Ich habe bis jetzt noch nicht Zeit gehabt, die von Zeller aufgestellten, sämtl. alle für Didactyla L. gehaltenen Arten genau zu untersuchen, allein ich vermuthe in meiner Sammlung noch Zeller gottfindet sind. Verglichen habe ich von Pterophoriden bis jetzt eine einzelne Art, gezogen, und gefunden, daß Zeller's Art [illegible] Beschreibung [illegible] Düsseldorf nahen, die zu vergleichen nun aber beendet ist, [illegible] Zeller's Beschreibung [illegible] einzeln haben. Die Pterophoriden genau abzählen und die Arten [illegible] genau anzugeben, wenn auch noch eine [illegible] Arbeit).

89 Pterophr. — ? Nach [illegible] Namen, da der Text [illegible] ob sie wirklich die Var. b von Zeller's Microdactyla ist, mir nicht gewandt [illegible]. Ich bin aber fast überzeugt, daß sie eigene Art ist. Zeller's Microdactylus Var. b. ist auf die bei S. P. v. d. Mus. Schiff. [illegible] Thiere massenweise beobachtet. Diese fliegt bei Wien im Mai und Anfang Juni die Var. b (No 89) kommt erst in Juni & Juli vor bei Wien [illegible], in Galizien [illegible] fliegen, wo Var. a gar nicht zu finden ist. auch in Böhmen war Var. b. nicht selten, aber a kommt dort gar nicht vor. Da beide Arten so fest vorkommen sind, kann aber fast darauf [illegible], als [illegible] Varietäten, sie müssen die wenigen Rücken, die an [illegible] vorkommen nicht deutlich genug sein, aber die, die an einer und [illegible] Falter der Var. b. stets [illegible] vorhanden vor den Unterflügeln sein. Von Var. a konnte, habe ich [illegible] mehreren [illegible] Falter der [illegible] Var. b gefangen [illegible] und ich habe keinen Zweifel [illegible], daß Var. b für Var. a irgend [illegible] und [illegible] einen Namen geben wird. Die Raupen der Pterophoriden habe ich selbst Zeller [illegible], da ich mich mit den [illegible] nicht befasse.

über die, gütigst mir überlassenen [illegible] Tortricinen.

Myel. Cardinellus, Opost. Lastratella & Lyon. Dimitatella sind mir unbekannt und daher [illegible] angenehm.

Tortrix Alvearia Fb. mir neu. Die Raupen [illegible] ist bis auf Heinrich Fb. richtig, [illegible] Bomb. Cinereola Hb. [illegible] Mai [illegible] Juni [illegible] Raupe [illegible] Pterophorus [illegible] Zeller [illegible] Raupen [illegible] (Isis 1838 S. 720 [illegible]) diese Alvearia ist. Heinrich Fb. bei seiner Alvearia auf seine Heinrich [illegible] Polychtrika ist Dies mit Zeller, diese beide nicht [illegible] Linn. Stephens, und [illegible] anderen zu vereinigen, da die Raupen zu sehr abweichen.

Tin. Pagenstecherella Hb. Bt. [illegible] Hb. 265) kenne ich auch nicht. Es wird wie dieses Thier, seine Zeit, wenn [illegible] die Gruppe gründlich, endlich zu [illegible].

Depress. Marcidella Hyd. ist, wie ich nun [illegible], ultradingt eigene Art.

" Turbella nov. mir [illegible] Art, da ich lange [illegible] nun 1 Ex. besitze.

Calcar. Albella Hyd. [illegible] meiner [illegible] Art.

Pterophr. Cicadella Z. [illegible] genau mit Zeller's [illegible].

Coccyx. Strobilana. Seit Errichtung meiner Sammlung ist der Falter bei der Ctiga. Strobilana [illegible] gefunden), die ungemein selten Thier ist, ist auch nicht [illegible], ja nicht einmal in Mähren [illegible] Raupe, die für alle Entdeckungen, [illegible], [illegible]. Mac in Pedewin's Samml. (im B. Mus.) unter diesem Namen [illegible], ist mir unbekannt, und das [illegible] Thier der Raupe [illegible]. Meine Freunde, die [illegible] einmal zu [illegible] mehrere [illegible], und so wird es auch Zeller's sein, dem ich, da [illegible] unbekannt ist, auch den Namen lassen will. Auffallend ist die [illegible] Vorkommen [illegible] der Raupe ab! Ratzeburg ist ziemlich [illegible]. Eine, wo wir am [illegible] wird Strobilana [illegible] Linden [illegible] gefunden werden. Wenn ich selber [illegible], so werde ich mich auch in [illegible] Zeit [illegible].

175

Übrr Folgende Arten, die ich mir zurück erbitte, wünschte ich Ihre Ansicht zu erhalten. v. H.

19 Octb. 1842.

Nr.			
1	Chilo Montanellus Hydn	Tyrol.	
2	— Profugellus Hydn.	id. — Vielleicht 2 der vorigen.	
3	Mydaris Insolatella Hydn	Ragusa — von Kindermann als Nimbella	
4	Crambus Raccidella Hydn	Tyrol	
5	— ? Matricella Tr. ?	Banat. — von Kindern. unter diesem Namen	
6	?	als T. Canella von Kindermann	
7	?	als T. Cristella von Gauorf (Kbm.)	
8	?	als T. Albicerella v. Regensb. Kindern.	
9	?	als T. Carbonariella v. Oken, Kindern.	
10	Tin. Conspurcatella Hydn.	Im Mai in Waldhäuschen bei Frankfurt.	
11	Tin. Mollicella Hydn	Juny auf Bäumen (Frühmorgens)	
12	Tin. Punctella Hydn.	Gauorf. als Capitella (Kbm.)	
13	Decoph. Liviella Hydn	Tyrol.	
14	Gel. Vanella Hydn.	Fünfkirchen. Kindermann	
15	— Cineritella Hydn	als Arcuella erhalten.	
16	— Bidignella Hydn.	Wiesbaden.	
17	— Mouffetella Tr. ?	August. Frankfurt	
18	— Asinatella Hb. ?	Ist 16 — Juny Apl 1832 als Mouffetella von Riese als von seinem Conuenant erhalten.	
19	— Submissella Hydn	Gauorf. (Kbm.) — Dr Dimidiella esp.	
20	— Negerella Hydn.	July, im Grs. Frankfurt	
21	— ?	von Kindermann als Punctigerella. Kommt von Neuroptera Hydn.	
22	Ancha. Stabilella Hydn	Frankfurt.	
23	— Megerella Hb. ?	Frankfurt.	
24	Col. Rothipennella Hydn	Tyrol.	
25	— ?	Frankfurt.	
26	Elach. Mitratella Hydn	Tyrol	
27	— Cinctonella Hydn	May. Grafen Waldgl. Frankfurt.	
28	— Pallastrella Hydn	Frankfurt.	
29	Nephopt. Speratella Hydn.	May. Frankfurt.	
30	— Perpusillella Hydn	May. auf Pflaumenblättern. Frankfurt.	
31	— Unicolorella Hydn.	May. auf Ulmenblättern. Frankfurt.	
32	— Basalella Hydn.	Exemplare aus Frankfurt. Vorderflügel ausgezeichnet.	
33	?	Juny. Nunnyhella. Frankfurt.	
34	Genista. ?	Frankfurt. Von Riese auf der Rauge gezogen.	

Ich mir unbekannt, sehen neu, und N. 2 jedenfalls viel z. sagen, so Halten, Schaft, Hügeln, glanz nette, genau abzu- einstimmen.

vide Einschaltung N 3.

Ist mir Zubek mund.

Crambus Matricellus Tr. Ist wenigst. als Hyp. Matricella Hydn. beschrieben.

Epicn. Canella S.V.

Pempel. Carbonariella Tr. wie mir N. 511 Tf. 60.

Hyleden Albicerella Tr. wie N. 8, ist richtig

Nephopt. Xanthicrella Hb. ist N. 9.

vide N. 10.

Tin. Guercicolella Tr. a. dem Frey sch in Zeit. bei Wien an seinen Eichen?

Tin. Fulvimitrella Sod. Tr.

Decophor. Hyleidella Tr., Zll.

Gel. Basilella Tr.

Gel. Depressella Tr. vide N. 15

Gel. Blandella Tr. Zunächst Elutella Hb. u. Zll.

Gelech. Galbanella Tr. Zll. } vide 17 & 18.

Decoph. Mouffetella L. N. 215 }

Ist auf Baumen zu mir selten in Nähe von Dimidiella vorkommen.

Ist in Klugs Lit. der folgenden analog ist sie mir unbekannt

Gel. Testerella Klug, Zll., wieder eben Verwechslung v. Tinea.

} Vid. 22 & 23.

vide 24.

Gregail. Convolvuliella Nom. Die Raupe auf Convolvulus, Hyssop. in Ingelheim.

Ist mir Gelechia Ericetella Hb. Lutosomella, Tinea Rufimitrella, Tinea Cinctella Zll. (Ist die Raupe auf Ericeten, Hyssop. in Ingelheim.

Elach. Inscriptella Tr. (Cinctonella Tr. wohl die Raupe)

Lyonet Tinea Pallidella Zll., die Art mir unbekannt

Ist mir Nephopt. Speratella Hydn. Tr. Ist wenigst. als Hyp. Matricella Hydn. beschrieben.

vide 29–32.

Ephem. eine Art von blassen Ochsenf. Tischbeinia Ist kein wenigstens fast die Dick ganz die Gestalt besitzen.

Tin. Subnotata Hb. 158 nach Treitschke Beschreibung. Nubilella Hübn. Schall. Monotata Hb. 455 = Fuscana Haworth. Linn. sind wohl kaum eine Art.

Ein Tisch und für Gesellschaft muß bestimmt an 3 Pf. Col. Albella Ericet. Tamaricis ganz ist mir die beste Art. Die übrigen 3 für 4 Tinea bestimmten Arten wären ist Tafelbau nach Schmetterlingen. Einen Schmetterlingen übergeben, welche sie abgezeichnet haben und der Sendung in ihren Kästchen wird. Ihre Bemerkungen über die Raupen von Col. Albella und Ericet. Tamaricis waren mir sehr angenehm, und habe sie in meine Notiz-Bücher aufgenommen. Tamaricis ist ganz neu, und doppelt angenehm, weil

N. 3. Ist Myl. Insolatella ist bereits von mir Ravella benannt, und da diese Melina Bereits à Manis Verzeich (Species Insectorum) steht, so wurde wie ist wohl lassen müssen. Als Kindermann sein ist diese art sehr oft als Ravella bestimmt, Nimbella darauf muss Cam. die er schon mitgenommen von mir erhalten, ist übrigens richtig. Es ist übrigens sehr häufig und schädlich, dass diese Raupe so sehr in Gärten, Laubwäldern lebt, und übrigens das Zerstörungswerk eine weitere Folge von Frost und Ungeziefer unbedeutend ist, dass sie sich Rubidalis H.S. für Lucidalis H. verwandt hat. Schiffermüllerella ist ihr stets Mollellus gewesen u.s.w.

N. 8 ist [illegible] ist in Lichen Falter Kindermann, dass er die Raupe oft [illegible] beschrieben, obschon es ihr dazu [illegible] beschrieben. Die Raupe Albicostella soll, nach Zeller, [illegible] gebildet sein. Es steht aber [illegible] à Manis Verzeichn.

N. 9. Nicht eine Raupenbeschreibung von Kindermann. Ihr Falter ist sehr dürftig. Es müssen 6. Exemplare Fig. 28 sind beiden alle [illegible] Raupe das von Ganzen zu Einem gemacht.

81. Pteroph. Hieracii N. 10. Ich kann Zeller [illegible] sein, wie sie in der Gegend sehr verbreitet, Rustricella Hb. 339 fallen, den gelben Flecken der Vorderf. so klein, [illegible] gelblich [illegible] Einfarbig sind ganz wie an die graden Fg. – Rustricella fliegt meistens im Sommer. Ehrlich [illegible] kann mit Sicherheit [illegible] abreden. Fr. Heyden, Entomologie, stellt diese art als Lactigiella, und meint dass [illegible] Raupe der Rustricella aber [illegible] verschieden. Davon ist Microdactyla Zell. (Raupe ist 1 Pfl. beigelegt.) [illegible] Fühler [illegible] Gärten an Gärten zu finden und [illegible] Rustric. [illegible] Fühler.

N. 13. Die Zeller bei Hyl. Continuella zweifel. Bei Sororculella ist der [illegible] Fühler [illegible] Zeller nicht [illegible] Ringe.

17 u. 18. Mentzelella Fr. (Acull. x Ratzeb.) x bei S.V. ist Pediasgonella Fig. 95 [illegible] ganz [illegible], dass Fr. einmal [illegible] Mentzelella L. [illegible] Zeller [illegible] Ordnung [illegible] Art [illegible] Fühler [illegible] 4 Fühlern, [illegible] 3). Ferner N. 18, wenn ich [illegible] Fühler [illegible] Mentzelella Linn. x Hbn. 245 Zell. Isabellella ist nicht [illegible] Fig. 95 [illegible] zu unserer Mentzelella [illegible] Pediasgonella [illegible] Fühlern, [illegible] 245. – Pediasg. hat [illegible] 4 Fühlern, [illegible] 3. Mentz. hat [illegible] 4 Fühlern [illegible] 5, kann ich [illegible] Pediasg. [illegible] Fühlern [illegible] Pediasg. [illegible] Pediasg. [illegible] 6 Fühlern, [illegible] Fühlern [illegible] Mentzelella [illegible] Fig. 245 [illegible] Fühlern [illegible] Mentzelella [illegible] Fühlern [illegible] Pediasg.

Durchmann

an Fischer v. R. für Ausflug zu Hirschl. 1845

174

Tinea Infimella Heyd. Frankf. am Ysopäum
var. minor? (auch Jahres z. Kriesmann als T. Betulinella)
Oecia Taeniella Heyd. Ende Juny auf dem Altkönig im Taunusgebirge
Leptosaria Stratella Heyd. Ende August bis Ende
Coleophora Palliatella Z. Ende Juny. Bockenheim
— Currucipennella H.S. Ende Juny, Anf. July. Bockenheim Corylus
Ornix Betulae Vigeliella Heyd. Anfang Juny im Taunusgebirge
Lyonetia Prunifoliella Hb.
Opostega Salaciella Z. von Bockenheim
Elachista Herrichiella H.S. von Bockenheim
Gracilaria Hexadactylus

} Sämmtlich sehr gemein

als Geschenk:

2 N. Calantica Albella Hb.
1 N. Acroclita Tamaricis Heyd. (ein Fühlerglied defect)

Feuer mit die Bitte an Zeller zu besorgen
als Geschenk:

2 N. Calantica Albella Heyden
1 N. Acroclita Tamaricis Heyden (vorzüglich aber etwas klein)

d. 5 Oct. 1845. an H. v. Heyden als Geschenk
& dank sich von der Sendung an Mann zurück zu
wissen

175

Sämmtliche Exemplare sind in Bockenheim gefangen. Von Tinea Infimella sind die Exemplare etwas kleiner als die Frankfurter, und die Flügel etwas schmäler, aber sonst ganz gleich. Die Oecia Taeniella ist nicht selten, aber nur in Gebirgen, wo Betula wächst, zu finden. Leptosaria Stratella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Coleophora Palliatella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Coleophora Currucipennella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Ornix Betulae Vigeliella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Lyonetia Prunifoliella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Opostega Salaciella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Elachista Herrichiella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Gracilaria Hexadactylus ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst.

Sämmtliche Exemplare sind in Bockenheim gefangen. Von Tinea Infimella sind die Exemplare etwas kleiner als die Frankfurter, und die Flügel etwas schmäler, aber sonst ganz gleich. Die Oecia Taeniella ist nicht selten, aber nur in Gebirgen, wo Betula wächst, zu finden. Leptosaria Stratella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Coleophora Palliatella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Coleophora Currucipennella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Ornix Betulae Vigeliella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Lyonetia Prunifoliella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Opostega Salaciella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Elachista Herrichiella ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst. Gracilaria Hexadactylus ist ziemlich selten, und fliegt nur in Gebirgen, wo Betula wächst.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

81. Peroph.

89 Peroph.

Zu) nicht auszufinden zu seyn, alsdann sie abmal Dütten gefüllt sie.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 21 Oktober 1873.

175

Ich habe 2 Ihrer lieben Schreiben vor mir, ein sehr verspätetes vom 25 Febr. u. J. und jenes vom 5ten d. M. gerade in Eile, und überhaupt werde ich jenem Briefe nicht viel antworten.

Ihre letzte Sendung war für H. Mann und mir eine Unmasse Schmetterlinge, die sollen Ihr verwandeln, und ich über die größte Mehrheit der Mittheilungen (bekanntlich sind die interessantesten Sachen, so ging es so weit, daß Manche sie sogar mit Hintansetzung Ihrer Briefe studirten. Da H. Mann sich auch nicht genau fand, H. Mann genöthigt, so ist vollkommen Adoptirtes, das Gestell beigelegten Briefe zugefügt sollen, und dieß in diesem Briefe über die Mittheilungen enthalten, und zu Folge der Verpflichtung geöffnet werden) sich mit in zu erwarten andern Sendungen finden, dieß jedes vollkommen abgethan sind, so muß den Brief gesondert aufgegeben werden müßte, einen Brief und die Gestell beigelegt, und dieß zu Folge Anordnung des Gestells der Briefe Manns, beigelegt werden, dann also werden eine Adresse und ein Siegel langem Zeit dem Inhalt, und Zeitaus dieß Briefe über Gestellübersendung und Zurückgeben zu Herrn & Schlatter H. Mann, wie Ihnen die beiliegende Verschachtelte zeigt, 2 Fl 20 x Ctr. an Porto kamen, wenn es die Sendung nicht annehmen. In diesen Fällen wird der Brief an den Absender zurückgestellt, der Gestell, gewöhnlich verbraucht, und der Absender den Absender zugestellt. Wenn nun der Empfänger die Sendung und bezahlt an die Kosten, so können sie die Gestelle der Empfänger an den Absender zu.

Da mir der H. Mann, der nicht wußte, wo er Ihnen schreibt, diese 2 Fl 20 x nicht senden zu lassen zu lang und Ihnen ganz gefällt hatte, habe ich sie diese Zeilen vorgestellt und glaube es auch so für Sie, da Ihre Güte mich stark mit Gefangenen oben versehen, die ich zu vermehren nicht in Stande bin.

Sie bitten Ihnen dafür, in der Folge keine, einer Sendung beigelegte Schriften, Einschlüsse zu senden, noch weniger zu adressiren oder gar zu verpflichten, sondern alles offen zu lassen, und selbst bei Briefen an mich zu Ihrer Kenntniß zu bringen, und Ihnen mir zu bringen, und Ihnen mir zu bringen, und Ihnen mir

wie wo nun Art seiner Stellung kannte, und alter Synonymie wird es ein genaues Urtheil sein, wenn
sie die

Zeller nützel wenigstens nach Indikation der Pflanzen und wenigstens Gesellen zu sammeln. Hasse. Oben ziemlich zu Ihrer Reise 300 fl, jedoch ohne Diskretionirung, wenn es noch bedürfen sollte. Löwe à Rosa ziemlich 200 fl und Metzger 250 fl. Von Cabinet Museum hoffe ich durch Klug und Erichson noch bedeutend andere Belege zu erhalten. Es will mindestens 1 Jahr in Italien bleiben. Ich erwarte ihn Anfangs Dezember in Rom, wo er sich bei mir wenigstens 14 Tage aufhalten wird. Dann Sie können weiß Gutes, dass wir viel zu plaudern und zu ordnen haben werden. Mit Freuden von Ihrer Reise die günstigsten Nachrichten anzunehmen. Schade übrig, dass ich nicht mit Ihnen, und ich so ganz Ohr, besonders in Gesellschaft dieser mir so lieben Freunde.

Ich werde einstweilen Ihr Manuscript und Anzeigen meiner Sammlung, was schon zu lange unterblieb, fortsetzen, und für Herrich-Schäffer arbeiten. Es ist schon da, dass Sie von seiner Unternehmung so wenig wissen, da Heft bereits 2 Hefte mit 20 Tafeln in Folio ausgegeben und auch 6 Lager Text fertig sind. Die Abbildungen sind meine Anmerkungen übertroffen, sie sind nicht nur aber so gut wie die der französischen Zeichner, sondern übertroffen zu nennen. Die 6 Lager Text enthalten nebst der Einleitung, worüber System übersichtlich gearbeitet wird, die Eintheilung der Lepidopteren und die Charakteristiken einer Anzahl von Papilionen, alles kritisch bearbeitet, und selbstständig jeden befriedigend. Die Flügelarten sind sämmtlich durchgangen, wo es schon Farben à Deutschland Gesellen (Papier d'Europe) gegeben hat, doch jetzt weit besser bearbeitet. Kurz, ist ein gründliches und selbst alles Gute für die Microlepidopteren. Von Ihrer Lieferung habe ich bereits 18 Tafeln mit Farben, die Herrich-Schäffer noch eigenen Aufwand stechen lässt, von der Weichselfläche Ihre gefallt, und über die Richtigkeit der Namen mir Aufschluss zu geben, und übergangen einen Nomenclator, Verbindungsstriche und endlich Mehrere meine Anmerkungen machen zu können. Endlich wende ich schon die Farben selbst bestimmen, und was manche Farben einer Gattung zusammen stellen lassen. Ich wende unseren Sciurus Farben zu erst vorstellen, z. B. Vulgaris, Hudsonius, Alpinus, Minor, Europaeus, Palustris, Americanus (), die ungefähr die Spezies darstellen zu beurtheilen. Selbst haben mir die Chinesen Lepidopteren in der Arbeit gefallen, und alle mir von Herr-Sch. bekannten Farben sind bereits und zwar recht gut, abgebildet. Auf den Text bezogen ist schon im Manuscript fertig, und ist selbst ein Paar Anmerkungen noch dazu zu geben, ehe es auf Reise gehen wird. Die Farben also doch ist nicht unthätig dem.

Zu einem meiner Briefe an Herr-Schäff. habe ich, ist meist nicht mehr auf welchen Charakter, über geschwänzten zu mögen sich Rücksicht an Ihnen zu wenden, da ich von Ihrer Gefälligkeit gegen Jedem, welchen der Wissenschaft wahre Freude macht, überzeugt sage. Ich möchte ein Weibchen Männchen aber einen Paarung aufgefunden, glaube ich Ihnen Sie wörtlich mittheilen zu müssen, was mir Herrich-Schäffer über obigen Brief zu erwarten. Ich glaube: Ich z. Fürsorge, Sie ist ganz freilich Ihnen, kann nicht gern schreiben. Es sei mir einmal eine Gefälligkeit (Zuschrift einer Briefe) durch Nichtbeantwortung meiner Briefe abgeschlagen, ich scheue mich Ihnen, sie würden um abermal zu bitten. Wie aber, wenn Sie diesen Brief gar nicht erhalten hätten? Es ist bei Ch. S. Manier, oft sich gefälligen Gelegenheiten zu bedienen, bisst möglich.

Was soll ich Ihnen noch Ihre Bemerkungen über Text sagen? Ich könnte eine Menge Anekdoten auf seine langen Briefen zu mir zu zählen. Es ist und bleibt ein sehr gutmüthiger Mann und den mir anzufangen ist. Ich seinen lobenden Briefe schenken, dass Sie, ungeachtet meiner Entschuldigungen über Caspius & Lividus dennoch beide Arten mir zu übersenden wissen, und dass Sie in meinen Abbildungen zur Bienen Unterschied finden können. Ich habe Ihnen über gesandt zu gewahrsamen, dass Sie, welches so bleibt, zur Bienen Zeichnung meine bedarf. Auf Herr-Sch. ist es sehr verdrießlich, dass bisst es auch öffentlich spüren; sagegen schmeichelt mir H. S. in seinem Briefe, wo er dann: Ich habe Ihnen lobenden zählen, bisst mir sehr freudig schreiben zu müssen lassen, und mir zu Ihnen Ihre Zeichnungen meine Text sein eigenes Selbstlob sei, nicht helfen, die sich Hören und mir zu Ihnen sagen: Selbst wird es verdrießlich. Herr-Sch. erzeugnisst mir, mir wissig sein zu wollen.

Offenen ist Ihnen auf manchfaltig mittheilen Künsten, so muss ich Ihnen für Bestand schreiben, weil mich nicht abschneiden müssen. Und wieder einmal abend zu Ihnen zu können wünschend empfehle ich Ihnen mit der vollen Versicherung meiner freundschaftl. Ehre

ganz ergebenst
Fischer Edl. v. Röslerstamm

Herr Sch. Capitel, Land Capitel K. in seinem Sammlung wirklich verwechselt, was es Ihnen als Capitel L. sandte ist Capitel N.'s N. 288 (Capitel K.) Tagfalter & Tagpfeile Zeit sind in meiner Sammlung wirklich geschieden, ersteren ist bedeutend kleiner. Nicht L. v. Nürnberg N. K. schreibe mir nicht mehr verwechselt zu werden zählen, ersteren ist bedeutend gesandt & Dublet.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

an Fischer v. R. 176

366

auf sein Absenden vom 21 Okt. 1843. — die Falterzeit. — die Zwischenfalter 10 Art. — Mag. Infimella. — Quercicolella. — Mag. Zachana Tr. — *) Mag. Herrich-Schäffers Werk. Mehrere Raupen — Mag. Herrich Sch. Europ. Lienar-Adarty Tamaricis falter ist das nur für A. Bennetia Curt.

*) Ist kein bei Curtis (Brit. Ent.) kaum Tort. Ulicetana finden, auch nicht bei Stephens. — Nur in Curtis Guide to an arrangement of british Insects. Editio II. finde ich pag. 199 in der Gattung Roxana Steph. nicht Ulicetana Haw. zwischen Hypericana Hüb.? und atroperpurana Haw. genannt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 30 Sept. 1844 durch Mann an Fischer v. R.
64 N. Microlog. (Langhaarige Feldmäuse) gr. Glück,
die mir zweifelhaft sind, und die Bitte um
Auskunft. —

Als Geschenk 3 Sp. Laburnella Hydr, 3 Sp. Lustratella Hydr
3 Lith. Vigeliella Hydr.

177

311 73 77

...raphie de la Russie,
...Mémoires, Tom. VIII. —
...hte d. Völker und d.
...d. d. Russ. Reiches
...d. in St. Petersburg.
...neue Liste von 1842
...Mitglieder d. Gesellsch.
...neuen Bestandes

Hydr.

317

t. 1843
Heyden

...Mann fing einen
...Sapyga quinquepunctata
...Fing'ss in der
...d. (Fuß 1.3000' ü. M.)

...Apfel v. Radolfzell, Beg.

...nächste Fest-Sitzung
...d. der Gesellschaft
...eigliche Bericht wird
...wird sogl. Statt finden.

...ch der Seite.

...Stelle kommt, so

...ben wird diese Art

...(heim), so ist jedoch
...Fund d. Art, da
...nicht so selbstständ.
...die Verbreitung

...ng glaubhaften
...seinem Gebiete

...ller
...ung
...langen
...Hoyd
...n wie
...nds
...Kompen

...Mann fing einen
...Sapyga quinquepunctata
...Fing'ss in der
...d. (Fuß 1.3000' ü. M.)

...Apfel v. Radolfzell, Beg.

...nächste Fest-Sitzung
...d. der Gesellschaft
...eigliche Bericht wird
...wird sogl. Statt finden.

...ch der Seite.

...Stelle kommt, so

...ben wird diese Art

...(heim), so ist jedoch
...Fund d. Art, da
...nicht so selbstständ.
...die Verbreitung

...ng glaubhaften
...seinem Gebiete

...ller
...ung
...langen
...Hoyd
...n wie
...nds
...Kompen

...hen. Ich [illegible] mein Elternhaus [illegible], das bis dahin meine
...geschützt [illegible], eine Weinsteinfabrik, [illegible] ich wurde genöthigt, die Geschäfte
...meinen beiden Söhnen selbst zu führen. Ich stellte mich mit Muthe [illegible] an
...und sah, daß ich seit vielen Jahr wohl gesunden als meine [illegible] und dennoch
...einen wunderbaren Geist) genommen hin. Ich versuchte mich mit meinen Lieblingen
...allzulange meine Lieblingsstudien und Arbeiten mich [illegible] mir [illegible] meine
...Familien [illegible] Noth [illegible]) mit vollen Fleiße meinen Geschäften obzuliegen. t. 1843
...Ich arbeitete nun früh des Morgens bis [illegible] Nacht und suchte dann abwechselnd [illegible] Heyden
...Tal Ball, Stall und Feld [illegible] Tal Thiere [illegible] Insekten zu beobachten.
...Ich stellte [illegible] fing [illegible] Thiere [illegible] Insekten [illegible] Ich [illegible] Lebensgewohnheiten
...während [illegible] Zeit [illegible] Lebensweise [illegible] Studium [illegible] Insekt
...Insekt viele Studien [illegible] Entwicklung [illegible] [illegible] Manche [illegible] einige Male [illegible] mich [illegible] [illegible] Manche [illegible] [illegible] Jahre [illegible] Ich [illegible] Ich [illegible] Ich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien am 2 Oktbr 1845

180

307

Vielgeliebte Frau und Freund!

Als Ihren lieben Brief an H. Mann sah ich mich Ihrer gütigen Antwort an mich überhoben, als Ihnen selbst schriftlich zu danken. Ich hoffe Ihnen, daß mir Sie, wie wir uns Ihnen, durch Herausgabe an die Mittheilung Ihrer Lieblings-Wissenschaften verpflichtet wissen, und wenigstens bey Ihrem Freund Schmidt in Leibach ihr Lob ist, der mit einer Menge gelehrter Abhandlungen fast überschüttet wird. Auch ist Ihnen, obwohl über die Klagenfurter Maßstäbe als Armenvater eine Lobschrift zu machen unbillig, doch Ihnen mein Gefühl, daß ich selbst mich genöthigt sehe, von allen Lob-

Wien am 27 Oktober 1844 306

178

Sehr geschätzte Frau und Freund!

Erst heute 8 Uhr, da mir H. Mann Ihr liebes Schreiben vom 31 Sept. nebst der Abschrift zum Bestätigen überbrachte, und die ganze Abfassung dieses Briefes durch mich vielmehr andere Dinge, in welche ich jetzt begriffen bin, verspätet hat. Ich H. Mann diese ganze Arbeit so schätzen mir Ihnen viel vorgearbeitet, allein ich bin genöthigt auch vorzüglich bei, mich Ihnen gefällig zu erweisen. Also ich in Ihnen an Zeit Ihnen mit meiner Zeit sehr sparsam, da ich täglich mich dem April zu einem solchen Grade, daß ich fast die Entschlagen fast schon, wie abgestorben bin. Für meine Zeit habe ich mir Ihre Abschrift diese, da ich sie nicht meine Gesellschaft besucht, eine Schmerzfabrik, und ich wurde genöthigt, die Gesellschaft meine beiden Lehrstücke selbst zu schreiben. Ich schicke mich auf Samstag genug dazu und finde, daß ich seit dieser Zeit wird gesunden als meines (und Ihnen) eine wandelnden Gift) gewandelt bin. Ich verspreche mich auf einen Lehrsatz abfolgen meine Lehrsätze, und Ihnen zusammenlegt mich (da ich auf mehr meine Abschrift Ihnen Mst. Hrn.) mit vollen Eifer meine Geschäfte abzuthun. Ich arbeite von früh um 6 Uhr Morgen bis spät Nachts und finde zu Ihnen abwendet gern Zeit halb, so halb mich Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen zu Ihnen abzugeben. Ich will mir Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen zu Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen

auf Leben ging diese Art in Sumi, in Südbrasilien Cayenne und selbst
Cuba gemein bei Spatt. Rosp. Bei Dresden fanden ich und Pastor
bei Rügen sowohl auf Spatt. Rosp. als auf Spatt. granat.
Cemben, aber keine Puppe gefunden. Eine
Puppe von diese Art in Sünden, war weiß und Cytisus Laburnum
war Futt, aber weder Spatt. noch Spatt. zu finden ist. Ich habe
indess die Raupe noch nicht aufgefunden. Es scheint also das
Vorkommen sich von mehreren Pflanzen nähren und das Thier
sich in verschiedenen Gegenden anpassen zu können.

2) Spatt. Lusitanella Hyde. Nun die Raupe sich Mitte
Juni das Lusitanella und Sertella Mitte Mitte (Gozella Hyd.)
beschäftigt, so für 2 Arten zu halten, die Puppen
zeigt aber weder an Gestalt noch Verschiedenheit.
Selbst für die verschiedene Nahrung, und das Überwintern
der auf Hypericum wachsenden Art Respekt sein?

3) Vegelitella Hyde. — Was sehen diese Art für Ulmifoliella
Hb. 444 eingenommen, obschon diese Figur meine zeitgenau und
in der Größe wenig (nicht aber im Verhältnis) zu gering ist.
Von der hiesigen Art, mit schwarzen goldenen Colonit,
und einen almost reinigen, dass immer rötlichen, rosten Kinde,
und einen bestimmten schwarzen Streif vor der Spitze
fast Zeller in den Reis als Schreberella Fab. beschrieben. Es
fand sich jedoch schon, dass Zeller's Ulmivorella die wahre
Schreberella Fab. ist, und so ist jene nun ohne Namen.

Endlich, dass ich mit dem Abschlagen für die Freiheit
sein, dann so aber wende ich mich wieder durch Geschäfte
und Besuche genöthigt, Ihnen Briefe zu schreiben, damit
die Versendung von Ihnen nicht auf 8 Tage verschoben
werden darf.

Sollten Sie sich, aller Umstände ungeachtet verpflichtet,
dass Ihre werthen Briefe und Sendungen stets
verspätet sind, und wenn ich sie auch nicht so schnell um
sich wünschte zu haben kann, so ist Ihnen doch
stets mit Vergnügen und vielem Interesse.

Gefallen Sie immer Ihr Ihnen Sie stets wie
aufrichtig ergebener Freund
Gaedner v. Röslerstamm

Wien am 2 Oktober 1805

307

180

Verehrter Herr und Freund!

Auf Ihren lieben Brief von 27 Aug. habe ich mich Ihnen gütigen Andenkens zu mich erinnert, als Ihnen Schriften und Briefe zu Ihrer Unterhaltung der Lieblings-Wissenschaften vorzüglich wurden, und vorzüglich das Journal Chemie à Leipzig das Sie mit einer Menge gelehrter Abhandlungen stets bereichert wird. Auch ist Ihnen, obwohl durch die Blumenbach Magistrate als Commandeur eine Epistel bei Ihrer Nutzgarten-Liebhaberei Ihnen Ihren Beifall nicht versagen, sich selbst meisterlich zu fassen genöthigt sind, von allen Lieblingsideen ab, und es sind immer neue auf die Pflanz- und Zeugungsorgane, die ihr Staubfäden nennen kann. Dass nun die neue Benennungen in Mengen Gebrauch sich finden, so wie durch Linnaeus ganz und gar nicht mehr angenommene veraltete Namen. Es liegt mir übrigens wenig an Namen, als an der vollkommenen Beschreibung der Theile, und es würde mir mit Ihnen auch Ihrer lang dahingegangenen Einsamkeit, wenn ich Zeit hätte. Jetzt ist diese, aber weil mir nun wenig Zeit übrig gegönnet ist, einmal schleunig machen müssen, um so mehr, da H. v. Jacquin bald alles vergänglich, wenigstens in der Reihe Abbildungen sterblich machen will, den Ruhm Ihr Leben mit Ihnen zu theilen, sein so beredtes Leben mit 2000 und gleichem Gemälden begleitet hat. Bilder und Beschreibung andere neuere Manier dahinten, Linnäus, Willdenow u.s.w. selbst im eigenen Hause? verwünschen eine enorme Auflage, die an Ende sich selbst ungefähr hält wird, besonders da der Absatz ist Wahrheit gar nicht im Verhältniss steht. Auch steht viel fest, und es sei für vergnügsam, so viel zu haben, als ihm nöthig bringen möglich ist. Es existirt viel und mehr, als bisher von irgend jemand verstanden hat, es unbenutzt genannt, und Schätze seiner Jahren Ende gesehen Jemand. Man muss ihm den Vorwurf, dass er gar zu viel zusammenträgt, kann ihn aber nicht anders möglich sein? Nachgenau ist allerdings, aber nicht überflüssig, vielmehr nothwendig. Fehler sind überall unvermeidlich und sind bei der Masse und Material verzeihlich, wenn man auf sogt die Hauptsache Acht zu geben und selbst in Absicht bringt. Das Folgende bestimmt möglichst viel, sagen wir uns nur die Darstellung der Arten und ihrer Fortpflanzungsorgane beschränken müsste, eine so nothwendige Bereicherung der einzelnen Arten und Vielheit Schwierigkeiten, wie sie sich in mehrern Werken gab, eine nicht selbst Kürze, abgelas ab; und unmöglich vor Kalb in der Welt, gebracht wird. Kürze, abgelas ab; und unmöglich vor Kalb in der Welt, gebracht wird. Linné selbst gefasst, so müsste in Hannöl gabe ab, wobei auf lange Zeiten Schaf

Lebzeiten einige 30 Exemplare [illegible], aber die Classification [illegible] nicht so schnell gemacht. Suche mir Rath, so müsste man die Abbildungen alleine machen, denn alles andere scheint ihn auf Übergänge zu sein, man soll alles höchstens beim alten Systeme [illegible] Ostrandeimer-Text. Für einen Botaniker ist es seiner Meinung nach Verschwendung, sich noch weiter zu bilden! Lasst man nun die Insecten Leuten wird, soll ein System verfasst werden, die Europäer allein genug zu thun wird. Welche Generation wird das machen? — Man [illegible] in Fabricius Werken, hat ein Theil, d. i. Classification fol.) die von 1816 ist weiter vollständig, noch vermehrt. Was wollte H.S. thun, um sein Genüge zu leisten? Ich fragte: was Ihr Zweck zum Grunde zu legen? Soll [illegible] System eine solche Grundlage, worauf weiter gebaut, und die neuen andere schon eingetragen werden können? Ist Imperatelle dazu, und ist Boisduval genügend? Ist in Schlesien die Zeitschrift nicht, und ist schon alles Grund hingeschrieben? Es mündet übrigens mit der Examen. Ich bin fest überzeugt, H.S. fühle sich in seinen bisherigen System zum Grunde gelegt, als sich der unsterblichen Mühe einst neuen zu unterziehen. allen Recht zu thun, ist wem jetzt unmöglich gemacht. Ich sollte aber H.S. für den geeignetsten Mann, ein System auf seinen Sammlungen aufzubauen, zu bilden, und benutzen seine Abhandlungen und die Tafeln und Abbildungen einzelne Theile, und stets wandte, mag auch sein System nicht ausgenommen werden, als Grundlage gebrauchen, denn [illegible] Sammlungen zu dem ausländischen Systeme stimmen, so wie sich, obgleich ganz unvollkommen System Thunbergs sich Grundlage zu Lepidopteren und Boisduval gebildet hat. Es müsste zu Stande kommen, aber nur in Monographien und von verschiedenen Gebrüdern, aufgefasst, [illegible] zu einem Welt-Handel. Aber wer sind die Menschen, die sich dazu werden, aber einmal? Zeller soll auf [illegible] gefallen, und würde mehr thun, wenn er [illegible] wäre. Genug [illegible], verwandter wie vor der Zeit sei Lepid.

Jetzt ein paar Worten Lieber Bruder, [illegible] Zeller [illegible] wie viel [illegible] Tabak macht gefährlich. Ist eine [illegible] Sammlung [illegible] Zeit, und ist meine [illegible] Wunsch sie [illegible] zu kaufen. Aber leider ist Thier [illegible] in den Microlepidopteralia [illegible], mich und [illegible] Mann [illegible], und aber [illegible] einem Preise [illegible].

P. Lubricatella habe ich schon für wirklich von Acetella verschieden gefunden, und möchte sie von ihnen angegebenen Exemplaren in der Classe der Glyphipteryx [illegible].

Ich will nun weiter zu meinen Geschäften, [illegible], mich wieder einen Brief mit Ihnen [illegible] zu haben; [illegible] Ihnen [illegible] Unterhaltung [illegible] Zeit wünsche.

Befehlen Sie immer recht [illegible] Ihnen Sie stets verpflichtet

Freund

Fischer Ev. Röslerstamm

Wien am 2 Oktbr 1845

307

180

Verehrter Herr und Freund!

Auf Ihren lieben Brief an Hr Stand habe ich mich Ihnen gütigen
Andenkens wieder gefreut, als Ihnen Schmetterlinge zu
der Ausübung der Lieblings-Wissenschaft verschiedene male wurden,
und vorzüglich dass Freund Schmidt in Laibach das Seine thut, um mir
einige Hoffnung zu machen, dass meine Sammlung bald vervollständigt wird. Auch ist Herr,
obwohl nur in Kleinigkeiten Mangelhaft als Lepidopterologe einst Liebhaber
zu werden, mir lieb; doch fällt mir meine Ge-
schäfte, dass ich selbst manchmal zu Fuß gehen genöthigt bin, von allen Lieb-
habereien ab, und es sind immer nur noch die Käfer- und Schmetterlinge,
die ich standhaft wieder kaufe. Dass mir sie mit Leidenschaft in Menge
zu erhalten, beweist mir Ihnen, so wie durch Lepidopteren ganz und gar
nicht mehr zu imponiren vermöge. Es liegt mir übrigens weniger
am Thiere, als an der vollkommen Bearbeitung der Arten, und ich wende
mich mit Freuden noch jeder lang dahingegangenen Sammlung, wenn ich Zeit übrig
hätte. Gegenwärtig habe ich meine ganze Muße-Stunden wirklich
einzig an die Ausarbeitung der Fauna Austriaca verwendet, und
es ist mir lieb, aber weil mir nun wenig Zeit übrig vergönnt ist,
einmal fertig werden muß, um es mache, so Ihr. Sie gern Antheil daran
nehmen, wenigstens in den Hauptsachen Ihnen Gelegenheit geben will,
dem Ihnen Ihr Leben vollkommen zu Genuß, so war bereits 3 Bogen mit
600 und einigen Gattungen Angefüllt sind. Bilder und die Anzahl
Arten vermehren Manche Arbeiten, Bemerkungen, Synonymien u.s.w. sollen im
eigenen Hefte? vermöge eine enorme Auflage, die am Ende doch sehr
empfindlich wird, dass unmöglich die Arbeit ist Absatz zu finden muß im
Verhältniß stehen. Auch Papier ist sehr, und es soll sich vergrößern,
und ist nahe als [illegible]

Oct. 1845 301

Herrn Fischer von Röslerstamm Hof Rath.

v. Heyden

Lepidoptera

1. Tinea Infimella Heyden.	Frankfurt a/M Bockenheim	1) Sind im ganzen Habitus mit Tinea granella, Haimm sing einander, die nur Größe zu sein scheint, sehr nahe stehen, und gehören wie ich glaube in eine Gattung und Abtheilung. Man fing sie in den ersten Tagen des Monat Juni auf den sogenannten Adel (Gras 3000' hoch) am Rande eines Waldes in Mehrzahl.
2. id. var. minor?	Saarow (Krösmann) unter dem Namen T. Betulinella.	
3. Adela Taurica Heyden.	Auf Jung. Tag. dem Alleköig im Taurischgebirge.	2) ganz unsere Ochsenheimerella Hbn. v. F.
4. Depressaria Atratella Heyd.	Ende August bei Giessen.	4) sind nicht Aehnlichkeit mit Elachista, ganz Habitus Depr. v. Radiatella Hb. scheint sie mir zu sein.
5. Coleoph. Palliatella Zinc.?	Ende Juny. Anfang Aug. Giessen.	5) Die Beschreibung ist wenigen genauen, nähere Aufklärung Palliatella Zk., als die Sind. Die Art der Palliatella sind über die Hypogaea Hälfte auf einem ganzen weißlichen Grund, wie es an einem Stück noch ganz deutlich zu sehen ist, gelb. Ist sollte die auch sein. = Hirsutella Heyden.
6. + Curruscipennella FR.?	Juny, July. Anfang Aug. Corylus	6) Ist wirklich Curruscipennella mihi, auch auf dem Leiter.
7. Lithoc. Vigeliella Heyden	Auf Jung im Taurischgebirge.	7) ist nicht unsere Ulmifoliella, die ist am nächsten Stück, ich wird noch sein.
8. Pemp. Obtusella Hb.?	Anfang Aug Rosen (Hirschhofen)	8) Ist ganz unsere Obtusella Hb. 215. Sind mir diese auch von Ochsenheimer gesangen.
9. + Holosericella FR.?	Anfang Aug Bisten (id.)	9) wirklich unsere Holosericella m.
10. Orenodes Hexadactylus?	. . . . . (id.)	10) scheint mir Grammodactylus L. zu sein, da ist jedoch in der Natur nicht besitzt. Übrigens sind die Finger da ist am Ende als Hexadactylus ungefähr nicht so lebhaft. Im dritten Fühlergliede sind in den Reihen die Sinnesorgane sichtbar ist Linne ein Vergrößerungsglas.

Mit meinem Hund sei da ist a ganz glatt geschrieb. da Herr Dey besitzt wollte und unsere Gebirge stimmen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Auf Leuw sing diese Art in Sand, in Schönbrunn Caspar mit Ferd
Ende April in Spatt. stop. Bei Dresden fanden ich mit Pöthe
die Raupen sowohl auf Spart. scop. als auf Genist. germanic.
Lambert haben Raupen Verschiedenheit in der Raupe gefunden. Diese
Raupen wie diese auch in Sänder, nur muß viel Cytisus Laburnum
verbraucht, aber weder Genista noch Spart. zu fressen geb. Ich habe
indeß die Raupe auch mit Cytisus aufgefüttert. Es scheint also daß
Distelle sich von mehreren Pflanzen nähren und die Raupe
sich in verschiedenen Gärten anwenden läßt.

2) Spart. Lustratella Hyde. Nun die Beschreibung Linnaeus
gründet die Lustratella und Scitella Hübn. Mitt. (Gozzella Hüb.)
scheint mir, sie für 2 Arten zu halten, die Schmetterlinge
zeigt aber weder in der Größe noch in der Verschiedenheit.
Selbst die verschiedene Nahrung, und das Vaterland
der auf Hyperikum erzogenen Art scheint sein.

Frankf. d. 14 Okt. 1845 – Liebe Henriette Ich. Lebwohl. Liebe Juanze
Eversmann, nun glücklig durchgesetzt, zum wissen den Anfang
der Tortrices. –

309

311

73

27

317

28 Anfang Juli, Frankfurt Pod. Graphana Hb. Affiniana Zeller

26. Ende Juni, Frankfurt von Chor. Narana, Eine mit lang gestreckten schmalen Flügeln und
Silbertrauen gezogen. sehr spitz so breit a Dunkel die Vorderflügel Zeichnung.

27 Mitte Juni, Frankfurt von Pod. Ocellana Mill. Hasse Dunkel.
Cöln gezogen.

28 Anfang Mai, Frankfurt. Pod. Formidana wie 12.13.14.

29 Mitte Juni, Frankfurt von Chor. Narana, die Raupe lebt sich an verschiedenen Pflanzen
Sandelbaum gezogen. sehr auf einander an Lindenblättern.

30. Frankfurt. Cno. Vaccciniana Zk. Ege auf Heidelbeeren.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Fischer R. am 19 Oct. 1847 geschrieben. (Mit Manuscript Sendung)

Ueber meinen am Grundsatze Rücksichten unterworfenen Ausgangspunkt meiner Arbeiten — Portia Heeriana Hyda u. Depressaria Aquestrella Hyd. Zeller. — Bruzonion — Bremi. —

Dem Geschenk überschickt:

2 Verkout. Aa a. Ho 11. Zll

Herrn R.

Ihre beigelegten mir sehr unbekannte, sehr zweifelhafte Arten erbitte ich mir das Urtheil des Herrn Fischer von Rosenstamm Frankfurt Sept. 1846.

E. von Heyden

1.	Fischer Frau b. Frankfurt	Tortr. Umbrosana Tr. in Anzahl Ex, wie sie auch bei Hayden vorkommen.
2.	Hyponizer Alyss	Tortr. Metallicana Hb.
3.	Hyponiz	Tortr. Mygindana Hb. 181. a. Mus. Schiff. (Flavana Hb. 324)
4.	id.	Tortr. Arbutana Hb. (Arbutella Lien. (Rhododendronana Schmidt. Ent. Zeit. Arbutana Hb. 372)
5.	id	Gnoph. Mastichana Mann.
6.	Hyponizer von Krösmann	Tortr. Ferrugana Tr. var. v. Sch. Olivana Tr. —
7.	Hyponizer Alyss	Tortr. Oppressana
8.	Mitte Juli, Frankfurt	Tortr. Capitana Z. gemischt mit der F.
9.	Mitte Juli, Darmstadt	Tortr. Fimbriana Haller. (Fischer Klugiana Haller)
10.	Mitte Mai, Bergstrasse	Gnoph. Strigideana Z.
11.	Hyponizer von Krösmann als Tortr. Fuscodana n. sp.	Tortr. Notana Hb. 361 — Die Grundfarbe, Schaude Dorsivittana Zell. ist dunkler und fast einfarbig, basilarstrich fehlt
12.	Hyponizer von Krösmann als T. Fuscodana n. sp.	3 Varietät. v. Tortr. Fimmundana Fb. (Accordana Haller. Autor. Dana Mus. Schiff.) — Fimmundana Hb. wird hier nicht als Art variirt stark.
13.	Hyponizer von Krösmann als T. Fimmundana Hb.	
14.	Hyponizer von Krösmann als T. Fimmundana Hb.	
15.	Hyponizer von Krösmann als T. Fimmundana Hb.	Eine kleine Var. v. Tortr. Corticana Hb. 209, 210. Variirt sehr. Fimmundana Hb. ist viel größer und hat stets den weißen Mittelpunkt.
16.	Hyponizer Alyss Famulana Hyden.	Tortr. Steineriana Mus. Schiff. (von Hb.) kommt nicht mit dieser Abbildung sehr selten vor. Hyponizer ist eine Abart
17.	Hyponizer Alyss Lasana Heyden.	Kann sogar, als hier in einer abgelegenen Flavana Fb. Art tritt hier nicht Flavana) vielmehr wie ganz isolirt.
18.	Hyponizer Mendicana Heyden	Hyponizer Rosetana ist eine selbstständige Art die nicht in engen Beziehungen zu Rosetana steht, kommt nicht in Nassau vor.
19.	Juni. Darmstadt	Tortr. Fimbriana Haller. Herrn Bäsen wird sie nicht Tab. 3 seiner Abbildungen Tortr. Fimbriana Haller. bezeichnen.
20.	Frankfurt	Gnoph. Hollariana Mann.
21.	Hyponizer von Krösmann als T. siliceana Hb.	Gnoph. Siliceana Hb. sehr helle Var. wie N. 58. 59.
22.	Juni, Frankfurt	Tortr. Simplana Fb.
23.	Ende Juni, Frankfurt. von Aepfeln gezogen	Falter sind eine ausgezeichnete Var. von Notana Hb. — Sie sehr Eppressana sehr ähnlich, aber nicht Rosana, und von Notana nicht zu trennen sind. Hb. Scitana Hyden.
24.	Anfang Mai, Frankfurt. von Birke gezogen.	Tortr. Demidiana Hb. (Domestricana Haller)
25.	Anfang Juli, Frankfurt	Tortr. Graphana Tr. (Affiniana Haller)
26.	Ende Juni, Frankfurt von Weiden gezogen.	Tortr. Notana Hb. Einer mit sehr großen schwarzen Flügeln und sehr dunkler Zeichnung, der andere sehr hell und ohne Dorsivittana Zell.
27.	Mitte Juni, Frankfurt von Erlen gezogen.	Tortr. Corylana Hb. sehr dunkel.
28.	Anfang Mai, Frankfurt.	Tortr. Fimmundana wie 12. 13. 14.
29.	Mitte Juni, Frankfurt. von Faulbaum gezogen.	Tortr. Notana, die Raupe nährt sich von verschiedenen Pflanzen ist sehr wandelbar in Färbung.
30.	Frankfurt.	Tortr. Vacciniana Tr. Raupe auf Faulbaum.

№		
31.	Frankfurt.	Graph. Rotundana Fr. [nov. spec.] mit dreifarbig schattirten Fl. und Mittelbinde. ist auch hier.
32.	Mitte Mai, Frankfurt, auf [illegible] Jagdblumen.	Gt. Vigeliana Hydn. Graph. Germarana Tr. [illegible] Germana Fr. 47 a Fröl. ist nicht diese, sondern eine andere nigana aut.
33	Ende Mai, Frankfurt	Tortrix alni F.
34	Ende Juni, Frankfurt. von Eichen.	Hybride mit Var. v. Tr. [illegible] Ratzeburgiana Ratz. (Ruficana Hb. 137, Torquana Mus. Schiff.) zu sein.
35	Frankfurt	[illegible] Pod. Forsterana Fr.
36	Tyrol	Venustana Hydn. [illegible] Forsterana Hydn. [illegible]
37	Ende Juni, Frankfurt.	Pod. Squalidana Fr. wahrscheinlich auch mit Remigana Koll. sein wird.
38	Saalburg von Kronsaaen, als Graph. Regiana.	Graph. Regiana H. (non Tr.) mit einem Strich.
39.	id.	Mehl entfernt von Ephippana H.
40.	id.	Unterscheidet sich nur durch Ephippana H. Nicht Grösse in Messungen ausgedr.
41.	Ende Juni, in meinem Holzstall	Graph. Motacillana Tr. Falter 2 ziemlich stehende Eier [illegible]
42.	id.	Graph. Nimbana Fr.
43.	Ende Juli, Frankfurt. auf Grossen Gallen der Cynips quercus.	Fast wie Nimbana aber mit weissen Tupfen, also abermal anders. Imbutana Hydn.
44.	Anfang April ausgr. Frankfurt. Die Raupe unter Linden.	Pr. Ticoticana Tirol. Handschrift. Nahe Verwandtschaft mit Nr. 37.
45.	Ende Mai, Frankfurt.	[illegible] Nahe Verwandtschaft mit Nr. 37.
46.	Mitte Juli, Frankfurt.	Hybride mit Tortrix Heydeniana Hb. Tr. 4 zu sein.
47.	Ende Mai, Frankfurt. auf Weidenblättern.	Hybride unbekannt und muss neu. Pudicana Hydn.
48.	Anfang Juli, Frankfurt. an Weidenblättern.	Graph. Incisana Fr.
49.	Aug. Juni, Frankfurt. an Ulmen.	Sciaph. Nubilana, Clem. sehr [illegible] Dunkle Tr.
50.	Aus. Mai, Frankfurt. von Eichen gezogen.	Graph. Rotundana Fr. wie Nr. 31, Mittelbinde [illegible]
51.	Aus. Juni, Darmstadt.	Gel. Consonella Hydn. Gel. Manniella Fr. variirt ziemlich
52.	Frankfurt. Raupe an Byssus	Ornix? Fuscedella Hydn. Von Zeller ein Exemplar als Fuscedella Hübn. zu mir bekannt.
53	Mitte August, Frankfurt. An Blättern von Rubus fruticos.	Tortr. Fimbriatella Hydn. Tortr. Rubicinella Schiffer. auf sie in den Blättern von Rubus minirend.
54	Frankfurt	Phal. Pterodactylus, ein sehr weibch. Ex.
55.	Mitte Juli, Frankfurt	Schmetterlings Raupe. als Scarodactylus H. beschrieben. Diese ist aber nach Hübners Exemplar von anderer, Falter Flügel 55 Lin., Flügel lange an Bäumen gezogenen Raupen Spilodactyla Zell.
56.	Anfangs Mayen.	Coss. Bugnionana Fr. nach Mr. Bugnion in Lausanne, der sie häufig auf den Montagnes fand. Falter Ende April aus Gespinnst. Die Raupe lebt in Stämmen von Populus tremula.
57.	Ende August, Frankfurt. Von Heide gezogen.	Tort. Mitterana Hb. variirt sehr.
58.	Anfangs Mayen	T. Boeberana Tr. } Varietäten v. Graph. Siliceana Hb. 196
59.	Anfangs Mayen	T. Rubiana Haw. } sowie auch Pilleriana Fr. 210 gehört. Variirt mit Zeichnung sehr stark.
60.	Aus. Mai, Frankfurt	Kann ich nicht für Zschana Tr. (nicht Hb. welche unsere Gattung Schmidtiana Fr. 248) halten noch Juncta für Hübn. und Alticolana Curt. sein.
61.	Aus. Mai, Frankfurt.	Graph. Plumbagana Fr.
62.	Anfangs Mayen	T. alpicolana Fr. — Rifflig.
63.	Mitte Juli, Frankfurt. von Erysimum ovig. gezogen.	Von Niedermeyen als T. Zephyrana Fr. erhalten. Zephyrana Tr. fallen, obschon sie niemals gelbe Binde [illegible] Tr. gelben Anfall ist nicht Normal, kann aber selten bei Farben Variationen [illegible]
64.	id.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Fischer v. K. am 19 Oct. 1847 geschrieben. (Mit Manuscr. Sendung)

Über meinen Aufenthalt in Gesundheits-Rücksichten unterbrochenen Beobachtungen
meinen Aufenthalt. — Tortrix Heeriana Hyda u. Depressaria Aquitella Hyda.
Zeller. — Bugnion — Bremi. —

Dem Geschenk überschickt:

2 Nephopt. Angustella Hb.
2 Tinea Verhuellella Hyda
1 Gelechia Pictella Zell. (Obrissig bestimmt?)
2 Adactyla Zelleri Hyda, aus Cyanin.

182

ich nicht. An Lust mag's fehlen, ich möchte wohl, und ich sehe auch gar manches in die Ferne und Nähe, was ich gern thun möchte, wenn ich nur die nöthige Zeit hätte. Ich habe stets die Hoffnung gehegt, einmal recht zu kommen, doch muß mich mehr ganz den Lieblingen hingeben können, allein es scheint nicht dazu zu kommen. Die Lage für meine zahlreiche Familie drückt mich sehr in der Beziehung, daß jetzt keine ganz sorgenfreie Zeit kommt, und große Thätigkeit erforderlich, um nur anständig durchzukommen. Ich wünsche viel reisen müssen, wollte ich mich dann mehr anhaltend beschäftigen, um ferneres haben zu können, und öffentliche Vorträge meinen Kindern nicht aufzudrängen. Gottlob! ich bin sehr gesund, weiß gesündere als ich kaum, besser Personen und in Kenntniß, insgesammt meinen Geschäften muß ich leichter, allmählig gehört nun der jüngere Theil gelehrtheit anheim. Endlich nähert ich mich so gesund, wenn ich in entomologischen Arbeiten durch Unterbrechungen und eine mehr sitzende Lebensart mich fühle. Dafür bin ich auch mit meiner Lage zufrieden, ja mitunter ich mich der Lieblingsstudien aufopfere. Es kommt mir, daß mein Sammlung nicht möglichst bearbeitet wird, nicht dass man Fehler vermeidet werden kann, ich müßte für ganz gewinnen, wenn ich aber so fleißig bearbeitet würde, wie ich gerne mir gefallen. Aber gehörige Thätigkeit fehlen immer mangeln, der Künstler aber immer mehr zu machen.

Der größte Theil meiner Sammlung ist bei Herrich-Schäffer. Ich muß mich in Kenntniß der Sendungen in anhaltenderer Arbeit zu machen, mich viel weniger, Notizen Mehr zu geben, und so selbstlos ich mich, ihm alle Freuden meiner Thätigkeit zu stellen. So wird sie ein so reichliches Arbeit (die viele Notizen dabei stehen) und das Ich dasselbe mehr Genuß mir sah so sehr um besten als mich angeborne Neigung bekannt Arbeiten jungen Männer über Kunst zu thun zu haben glaubt. Ich will sie zu zum Nutzen der Wissenschaft selbst sehen, habe ich mich in der übrigen Lebzeiten mich genug zu thun, wenn ich Lust + Zeit habe abends zu studiren.

Für die mir gütigst gesandten Thiere bitte meinen herzlichsten Dank, gern habe ich Ihnen Arbeit, wenn ich es hätte. Argentella W. habe ich aus Hessen mich der Baron v. Erlangen. mitg. gezogen. Pictella Zell. möchte. als beiden andern Arten sein.

Hiezeiten Sie, doch sich sehr andere mich B. Man trifft mich wieder zu andern Geschäften und gehören mich Ihnen Lieben zu geben.
Mein bester Gruß noch und die Versicherung, daß stets
Achtung bleibe — wenden Sie ganz zugehörigen Freund

Fischer v. Röslerstamm

42. id. — Graph. Molaccana Vr. Falter 2 ziemlich Stück [illegible] 1825.

43. Ende Juli, Frankfurt. Am Dreiherrenstein. Die Raupe quere. Beom. — Graph. Nimbana Hb. Stück zur Nimbana, aber mit weißen Tupfen Falter etwas abweichend. Tubulana Hyda.

44. Anfang April und v. Frankfurt. Die Raupe in den Linden. — Pl. Bicuticana Tr. Der Stück. Falter Gemein, wie mit No. 37.

45. Ende Mai, Frankfurt. — ~~Der Stück. Falter Gemein, wie mit No. 37.~~ Stück wie Fuligana Hb. a. Fr. 2 zu klein.

46. Mitte Juli, Frankfurt. — Stücke eingetragen und noch nicht. Pudicana Hyda.

47. Ende Mai, Frankfurt. Auf Schlehdornsträuchern. — Graph. Incisana Fr.

48. Anfang Juli, Frankfurt. An Schlehdornsträuchern. } — Scirpa Nubilana, kleine Exemplare.
49. Anf. Juni, Frankfurt. An Ulmen. }

50. Anf. Mai, Frankfurt. Von Eichen gezogen. — Graph. Rotundana Fr. wie No. 31, Stücke Exemplare.

51. Anf. Juni, Darmstadt. — Gel. Consonella Hyda. Gel. Nanniella Hb. variirt ziemlich

52. Frankfurt. Raupe an Hypericum. — Ornix? Incusella Hyda. Von Gnesse ein Exemplar Exemplare die auch gezogen sind wie Imbutella.

53. Mitte August, Frankfurt. An Blättern von Rubus fruticos. — Rich. Fimbriatella Hyda. Stück Rubicinella Scheffer, auf sie in den Blättern an Rubus minirend?

54. Frankfurt — Pter. Pterodactylus, ein Stück wie Exemplar Exemplare

55. Mitte Juli, Frankfurt — Lithocolletis Kleem. als Scandactylus M. beschrieben. Stück ist etwas mehr schwarz Exemplare wie andere, Stücke Flügel 55 Lin. Ist zu lange an Baumen gezogenen Raupen Spondactyla die Falter.

56. Ohne Raupe Alyssum. — Coccyx Bugnionana Fr. nach Dr. Bugnion in Lausanne, der Raupe auf Kohlarten Kohlrüben fand. Stück wie Exemplare Exemplare der Stücke Exemplare, wie Exemplare variirend.

57. Ende August, Frankfurt. Von Heide gezogen. — Pter. Montana Hb. variirt sehr.

58. Ohne Raupe Alyssum. — T. Roebeana Fr. } Varietäten v. Graph. Siliceana Hb. 196
59. Ohne Raupe Alyssum. — T. Rubiana Haw.? } wenig auch Pudana Hb. 210 zahlreich. Variirt wie Exemplare Exemplare.

60. Anf. Mai, Frankfurt — Kann wohl die Zachana Fr. (nicht Hb. welche unsere Gattung Exemplare Fr. 268) sein, welche auf Juncus sehr häufig und Alliacetana Curt. ist.

61. Anf. Mai, Frankfurt. — Graph. Plumbagana Fr.

62. Ohne Raupe Alyssum — T. alpicolana Hb. — Riffelg.

63. Mitte Juli, Frankfurt. Von Erysimum alg. gezogen. — Von Kindermann als T. Zephyrana Fr. erhalten. } Ich kann beide nur für Exemplare Exemplare Zephyrana Fr. halten, obschon sie [illegible] nicht ganz gelb sind. Der gelbe Ton ist [illegible] Exemplare mit Fumi, kann aber wegen der Farbe Kindermann's Raupe nicht entscheiden.
64. id.

313 raphie de la Russie, Mémoires, Tom. VIII. — 27
[illegible] und d[illegible]
[illegible] oder Russ. Geschichte
[illegible] in Petersburg.
[illegible] Liefg. von 1842
[illegible] Mitglied des Archäol.
[illegible] Bonbonnat

317

v. Hoyden.

Wien am 28 October 1847

183 312

Sehr verehrter Freund!

Wegen Ihr Ihr werthes Schreiben vom 19 d. M. und Ihre Einwendung so wird, um so mehr, da ich Ihnen seit sehr langer Zeit keinen Brief aus der Hand meines Sekretairs angefangen habe. Selbst an Tagen machen die Briefe meines Collegen, seinen sehr Fleiss. Aber da ich selbst meine Schrift, da muss ich alles Schreiben an die alten lieben Freund übertragen, aber besser gesagt, nicht mehr Zeit mehr habe. Es geht mir wie Ihr Bruder, ich werde halt ganz den Rücken der Sekretairs anfangen müssen; ob aber Ihr Bruder Schriftlein Verfassen, wie ich sehr wünsche ich nicht. Es Lust der zu sehr ab wie Verstand will, und ich sehe auch gar gewaltig in die Augen und Ferne muss, wenn ich meine Welt sehe, sehr muss alles in die verschiedenen Schriften. Ich habe stets die Hoffnung gehegt, einmal sehr zu können, Ihnen auf wieder ganz den Lieblingen zu werden können; allein es scheint nicht dazu zu kommen. Die Sorgen für meine zahlreiche Familie bricht mich zu sehr an der Berufsgeschäft, das jetzt seine ganze Kraftanstrengung, und grosse Thätigkeit erfordert, wie mir unerlässig Tagesstunden. Ich werde ein offenes müssen, wollte ich mich stets einen andern anfolgen lassen, um freier leben zu können, und öffentliche Kosten meiner Kinder nicht entziehen. Gottlob! ich bin sehr gesund, weil gesunden alle fünf Kinder und in Kinder, ungeachtet meinen 61 Jahren noch zu leisten, als man jetzt von der jungen Leuten gelaufen erfüllt. Endlich aber ich nicht so gesund, wenn ich in andauernden Winter sehr mit Augenentzündung und eine noch sitzende Lähmung fühle. Dann bin ich auch mit meinen Augen gefährdet, so ungern ich auch den Lieblingsstudien entsage. Es dauert mich, aber man Sammlung nicht mehr benutzt wird, nicht sehr mein Leben verursacht werden kann. Ich möchte für gern jemanden gönnen, wenn ich aber so fleissig benutzt würde, wie ich es mir geschah. Aber solches Vergnügen scheinen niemand mehr, der Gnädige aber immer noch zu werden.

Der zweite Theil meiner Sammlung ist bei Hoerich-Schaffer. Ich war nicht noch in Stande ihre Sendungen in ordentlicher Ordnung zu machen, noch weniger, Ordnung Sorge zu geben, und so selbstlos ich mich, ihre alte Kräfte meinen Fleiss & Akribie zu schenken. Sie fürchte ich ein so mühsliches Arbeit (da viele Notizen dabei stehen) und Sachkenntniss wieder einmal ist so sehr und besser als mich angehen Kräfte behalten. Ich war den ganzen Winter über damit zu thun zu haben gläubt. Ich wie ich gern zum Nutzen der Wissenschaft arbeiten, habe ich mich in die übrigen Gelehrten mich genug zu thun, wenn ich Lust und Zeit habe abwechseln.

Für die mir gütigst gesandten Blumen bitte meinen verbindlichsten Dank, gern gäbe ich Ihnen antwort, wenn ich es hätte. Augustin M. habe ich von Ihnen auch das Besuch des Evangelium gegeben. Viele Zeit nöthig. alle denken andern Arbeiten sind nun.

Verzeihen Sie, dass ich Ihnen andere mich B. Mac erfüllt mich wieder zu andern Geschäften und Ihnen viel Freude zu machen. Leben Sie wohl Mein bester Freund auch und die Verfertigung des Buches Leben Sie wohl Ihnen ganz ergebenster Freund

Böckh

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

313

raphie de la Russie,
Mémoires, Tom. VIII. — 77
[illegible]
317

Fischer v. Waldheim, Gotthelf.

in

Moscau.

Vice Praes. d. naturf. Gesellsch.

Prof. Excellenz.

geb. 15. 10. 1771 zu Waldheim, Sachsen

† 18. 10. 1853 in Moscau.

62.
63.
64.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt 27:24 Dec. 1848.

Sr Excellenz
Mgr. Fischer de W.
Vice-Président de la
Société Imp. des Naturalistes
de Moscou etc. etc.
à
Moscou

186

316

Der verehrteste Herr [illegible] Vice-Président de la Société Imp. des Naturalistes de Moscou etc. etc.

Indem ich vor allem noch nachträglich meine herzlichsten Glückwünsche zu dem Ihnen gewordenen so schönen und ehrenvollen Beweise der [illegible] dargebrachten und [illegible] Gott zu Ihrem [illegible] Freunde u. Verehrer, so wie zum [illegible] der Gesellschaft noch recht lange [illegible] wünsche und

[illegible] Berg, 6. Dec. 1850, für die Ostéographie de la Russie, [illegible] 4 Bandl. Ihr Beitrag zum Band. Mémoires, Tom. VIII. — Bulletin, drei einzelne entomol. Hefte [illegible] und [illegible] worden wäre angenehm sein. Direct oder durch d. Buchhandel [illegible] Leben, mein Vorgänger Mgr. Kieder, sind in Petersburg. [illegible] Herzog Johann [illegible] die Namen-Liste von 1842 [illegible] gehören u. dabei [illegible] daß sie die Mitglieder [illegible] bekannt. [illegible] Helgoland wollte ich auf das [illegible] einen neuen Bombus art [illegible] entdeckt.

317

187

187

312

184

Hochgeehrter Herr Senator
Wohlgeehrter Herr College,

Mit innigem Bedauern habe ich vernommen, daß Sie leidend sind. Ich hoffe (nicht Ihr) wesentliches Unwohlsein sei nicht bedeutend, daß Sie recht bald wieder vollkommen hergestellt sind. Ich [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

62.
63.
64.

Frankfurt 27/14 Jan. 1848. Übersendung der Schrift an Sr. Excellenz Hrn. Fischer de W. Präsidiat de la Société Imp. des Naturalistes de Moscou etc. à Moscou

186

316

Indem ich vor Allem noch nachträglich meinen herzlichsten Glückwunsch zu dem Ihnen so schönen und interessanten Ereignisse darbringe und hoffe daß der gütige Gott zu Freude Ihrer vielen Freunde u. Verehrer, sowie zum großen Vortheile der Wissenschaft noch recht lange [illegible]

315

Indem ich Ihnen die allerbeste, ich wünsche auch mit Ihnen, daß Sie an der Spitze Ihrer Lehranstalt noch lange Jahre ein Lepidopteren-Lichtpunkt & Mittelpunkt bleiben.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und verbleibe ich Ihr ergebenster Diener

Ihr ergebenster Diener
G. Fischer v. Waldheim

Moskwa, d. 17/29 Febr. 1848.

Wenn ich Ihnen recht, so empfehlen Sie mich bestens an Hrn. Herm. v. Meyer, Käppel, in Simmeringg.

Leipzig, 6. Jan. 1850. Für die Entomographie de la Russie d. 4 Bandl. Ihr Herr Sohn Conrad. Hémiptères, Tom. VIII. Bulletin, das ringsherum [illegible] Hefte dieses und der [illegible] würden mir angenehm sein. Direct oder durch Buchhandel [illegible] Mein Vorname ist Moritz, und in Frankfurt [illegible] Johann Jakob. In der Namensliste von 1842 [illegible] dabei bemerken, daß [illegible] die Mitglieder [illegible] Helgoland wollte ich auf Ihre [illegible] Barbarus art [illegible]

317

[illegible] Herr Senator
[illegible] Bürgermeister
[illegible] Collegen von Seiten
[illegible] schaft der Naturforsch.
[illegible] sa.

[illegible] Band der Entomo-
[illegible] ch Hrn. Arnt nach
[illegible] rt, um vielleicht
[illegible] Nachsendung
[illegible] an Sie gelangen
[illegible] Sie, Ihren Kopf
[illegible] Nachricht von hier
[illegible] mal da er wohl
[illegible] nachher viel Roman

62.
63.
64.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

185

21

Heinroth, J. C. A. M. D. Prof. *Leipzig.*
Helm, Gustav. *Ekathérinenburg.*
Helmersen, Grégoire Pétrov. *St. Ptbg.*
Henderson, Ebenezer. Ph. D.
Henry, William. *Manchester.*
Hermann, François. *St. Ptbg.*
Herrmann, Jean Rodolphe. *Moscou.*
Herzen, Alexandre. *Vologda.*
Hess, Hermann. Acad. *St. Ptbg.*
Heuland, Henry. *Londres.*
de Heyden, Charles Henri George. *Francfort.*
Hisinger, Guil. *Upsal.*
Hiltebrandt, Frédéric. Andréev. M. et Ch. D. Prof. *Moscou.* †
Hiltebrandt, Jean Féod. M. D. Prof. *Moscou.*
Höfft, François M. D. *St. Ptbg.* †
Höninghaus, J. W. *Crefeld.*
van der Hoeven. *Leyde*
Hoffmann, Louis. M. *Moscou.*
Hoffmanseeg, J. G. Comte. *Dresde.*
Hohenacker, Fr. *en voyage*
Hohenwart. Comte. *Laibach.*
Holland, Henry. *Londres.*
Holme, Edward. M. D. *Edimburgh.*
Hooker, William Jackson. M. D. Prof. *Glasgow.*
Hope, the Reverend Fréd. William. *London.*
Hoppe, D. H. M. D. Prof. *Ratisbonne.*
Horkel, Jean. *Berlin.*
Hornschuch, Fr. Prof. *Greifswalde.*

Hosack, Dav. *New-York.*
Host, N. J. M. D. *Vienne.*
Hügel, Baron. *Vienne.*
de Humboldt, Baron. J. H. Alexandre. *Berlin.*
Hunnemann, John. *Londres.*
Huot, J. J. N. *Versailles.*
Jackson, Charles. *Boston.*
Jacksits, Grégoire. *St. Ptbg.*
Jacobson, Louis. M. D *Copenhague.*
Jacovicki, Ignace. Prof. *Vilna.*
Jacoutovicz, Dion. Adam. Prof. *Vilna.*
Jäger, Benoît, *en voyage.*
Jähnichen, Frédéric Auguste. M. D. *Moscou.*
Jänisch, Charles M. D. Prof. *Moscou.*
Jänisch, Nicolas. *Moscou.*
Jameson, Horatio G. *Baltimore.*
Jameson, Robert, Prof. *Edinburgh.*
Jastrebtsoff, Jean. M. D. *Milatine.*
Jan, G. Prof. *Parme.*
Jarocki, Felix. Prof. *Varsovie.*
Jensen, Henning. Ph D. *Pensa.*
S. A. I. l'Archiduc Jean d'Autriche.
Iliine, Médecin de la marine. *Sévastopol.*
Iofsky, Alexandre M. D. *Moscou.*
John, F. M. D. Prof *Berlin.*
Joukovsky, Basile. *St. Ptbg.*
Joundzill, M. D. Prof. *Vilna.*
Julius, N. G. M. D. *Hamburg.*
Jussieu, Adrien. Prof. *Paris.*
Kachintsoff, Nicol. Andr.
Kämmerer, Alexandre. *St. Ptbg.*

62.
63.
64.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt 24. Feb. 1848.

Sr. Excellenz
Herr Fischer de W.
Vice-President de la
Société Imp. des Naturalistes
de Moscou etc. à
Moscau

186

Euer Hochwohlgeboren

Indem ich vor allem noch nachträglich meinen herzlichsten Glückwunsch zu dem Ihnen gewordenen so schönen und ehrenvollen Beweise der Anerkennung darbringe und hoffe daß Ihr fortgesetztes Wohl zu Ihrer und vieler Freunde und Verehrer, so wie zum großen Vortheile der Wissenschaft noch recht lange Jahre gütigst erhalten wollen möge, glaube ich mir die Freiheit nehmen zu dürfen, Ihnen hiermit gehorsamst anzuzeigen, daß ich mich gegenwärtig mit der Herausgabe eines entomologischen Werkes beschäftige, welches ich mir ganz besonders Ihrer Gewogenheit empfehlen möchte, und Sie ich deshalb ergebenst bitte, mir Ihre gütige Unterstützung durch Mittheilung Ihrer entomologischen Schätze zu Theil werden zu lassen, damit ich mir die Hoffnung machen darf, daß mein Unternehmen Ihren Beifall erhalten und mir Ihre gütige Unterstützung nicht fehlen werde.

Ich habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, eine vollständige Fauna der Insecten Europa's zu liefern, und da ich von Ihrem entomologischen Reichthum überzeugt bin, da Sie ferner am besten unterrichtet sind, welche Species in Ihrem Vaterlande vorkommen, so wende ich mich an Sie mit der Bitte mir diese Species, so weit Sie solche besitzen, gefälligst mittheilen zu wollen, damit ich mir die Gewißheit verschaffen kann, ob ich mein Werk vollständig liefere

Des baron:

Entomographia Imperii Rossici. Vol. 1–3 und
Vol 4. Fasc. 1 [illegible] Buchhandel [illegible]
[illegible] Exemplaren auf [illegible]

Lettre sur le Physodactyle. 1824
Lettre a Mr. Pander. 1821
Adversaria zoologica. 1819
Notice sur une Mouche carnivore. 1819.
Catalogus coleopt in Sibiria or. a G. I. Karelin coll. (1842)
Genera Insectorum. Vol. 1. 1821.

Der [illegible] wünschte ich [illegible] die entomologischen Arbeiten von Jean zu erhalten, die sich in den Bulletin de Moscou befinden, da [illegible] Herr v. Meyer das nur vorübergehend von seinen Freunden geliehen hat. Mit dem allerverbindlichsten Dank werde ich sofort [illegible] bestätigen und bitte ich für mich bestimmte Druckschriften, etwa über Cäcilien oder die kürzeste Anzeige, oder zur Weiterbeförderung an meinen Schwager, den General der Infanterie v. M. in Riga zu senden. Ich glaube mich [illegible] Jahre 1830 entsinnen zu können, daß mir [illegible] zeigte die K. naturforschende Gesellschaft zu Moscau [illegible] Ehre mich zum Mitglieder [illegible] zu ernennen und stellte [illegible] die große Güte mir das Diplom, während der Versammlung der Naturforscher in Hamburg zuzustellen. Zufällig kam aus einer vor einiger Zeit im Bulletin das Verzeichniß der Mitglieder in die Hand und fand ich unter denselben meinen Namen nicht. Auf meine Erkundigung im Jahre 1830 [illegible] mir in dem Bescheid [illegible] daß die Gesellschaft [illegible] Fräulein [illegible] Bitte [illegible]

Jähnichen, Frederic Auguste. M. D. *Moscou.*
Jänisch, Charles M. D. Prof. *Moscou.*
Jänisch *, Nicolas. *Moscou.*
Jameson, Horatio G. *Baltimore.*
Jameson, Robert, Prof. *Edinburgh.*
Jastrebtsoff, Jean. M. D. *Milatine.*
Jan, G. Prof. *Parme.*
Jarocki, Felix. Prof. *Varsovie.*
Jensen, Henning. Ph D. *Pensa.*
S. A. I. l'Archiduc Jean d'Autriche.
Iliine, Médecin de la marine. *Sévastopol.*
Iofsky, Alexandre M. D. *Moscou.*
John, F. M. D. Prof *Berlin.*
Joukovsky *, Basile. *St. Ptbg.*
Joundzill, M. D. Prof. *Vilna.*
Julius, N. G. M. D. *Hamburg.*
Jussieu, Adrien. Prof. *Paris.*
Kachintsoff, Nicol. Andr.
Kämmerer, Alexandre. *St. Ptbg.*

62. 8
63. 4
64.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. 6. Jan. 1850. Für die Ictonographie de la Russie, Bd. 4 gedankt. Ich bitte sie Hon. Mémoires, Tom. VIII. — 27
das Bulletin, das einzelne entonol. Hefte des selben und die Mem. sonder nicht angenommen sein. Brach der Russ. Buchhandel
Nikolai, mein Schwager in Moskau, sind in Petersburg.
Dem Erzherzog Johann sahen wir die Ehre zu Ostern 1842
gegeben u. dabei erfahren, daß sie die Mitglieder [illegible]
für Helgoland wollten es aber dort einen Vorwurf machen
könnten.

317

187 ~~187~~

Hochverehrter Herr Senator
u. Bürgermeister
Wohlweiser Vorsteher von Seiten
der Gesellschaft der Naturforscher
in Moskau.

Ich habe den IIten Band der Entdeckungen des Russischen durch Herrn Arthur nach Leipzig befördert, um denselben durch die Dyckische Buchhandlung nach Frankfurt an Sie gelangen zu lassen. Ich bitte Sie, diesen Band gütig in mit Nachricht von dem Empfangnehmen, zumal da er wohl schwerlich in Frachtgeld kommen wird.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sa habe die Liste der Mitglieder von
1842 beigelegt für Ihren Gedächtniß
zeigen wird, dass Charles Henri George
von Heyden in Frankfurt unser
Mitglied ist. Dabei die grosse Bitte, dass
Sie bei S. K. H. dem Erbherzog Johann so
gütig wären, wenn Sie Gelegenheit
haben, ob die Gesellschaft seinen Namen
als Ehrenmitglied behalten darf. Ich
habe auch die Liste für dieselben beigelegt.
Derselbe ist vor 20 u mehr Jahren zum
Ehrenmitgliede ernannt, allein ich erinnere
mich nicht mehr durch wen ich das Diplom
geschickt. Die Liste muss am Ende des Jahres
od. mit Anfange des Neuen ausgedruckt
werden.
Auf dem ersten Blatte steht der Name
des Kaysers als Protector. Das 2te Blatt
enthält seine Ehrenmitglieder,
wie Sie aus beigelegten Blättchen sehen.
Das anschreiben an Hamburg ist
mir noch frisch im Gedanken u. ich sehe
noch lebhaft, wie Sie aus Helgoland

mit Labarak zurückkehren u. doch
wieder daher wollten. Wie diese Stunde habe
ich die Ursache nicht ergründen können.
Prof Wiebel hat eine Beschreibung
davon geliefert.

Genehmigen Sie die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung
mit welcher ich zu seyn die Ehre habe

Ihr ergebenster Diener

Fbrnhelm von Baltheim

Moskwa
d. 8 Oct. 1849.

Wenn ich die genaue Adresse von Hrn.
v. Nadejdjerna hätte, d. h. richtig Namen
u. Vaternamen, so könnte ich Ihnen das
Billetten durch denselben zukommen
lassen, ungeachtet zu fürchten ist dass
es hier liegen bleibt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

321 327

Abschrift Herr Oberlieutenant
Joseph Anschreiber Herr Ludwig!

189

320

Franz. J. W. B.

in

Frankenthal.

Oberbürgermeister

F.

319

d: 27 Jan. 1852

an Fischer v. Waldheim in Moscau geschrieben.
Für den Bd. 5. der Entomogr. de la Russie. Lepid. Nymphales
gedankt. Ich besitze das Werk jetzt vollständig. Die 3
ersten Bände geschenkt. Libr. Eversmann.
Daß ich 1848 u. 50. Lepidopteren. 1851 in Graubündten. Dort viel gesammelt, aber noch nicht untersucht.
Meine Verwendung.

188

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

321

327

Abschrift

Ihro Excellenz Herr Generalleutnant
Freiherr von Hanxleden Herr Exzellenz!

189

320

Franz. J. W. B.

in

Frankenthal.

Oberbürgermeister

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wohlgeborner Herr Oberlieutenant
Hochgeehrtester Herr Vetter!

189

Ich hoffe, Ihre Wohlgeboren haben bei unserer
Abreise hier gesunde Gesellschaft, welche
Ihnen über Vieles hinweghalf, und
Ihnen nicht allzu schwer machte unsere
und mit den alten Herrn Gemeinschaft zu
stehen in Verbindung der Ihnen
in unserer Gegend unsere Verbindlichkeiten
entfällt. Ich schicke ungefähr 1000 Rthlr
Cour. Briefe Legitimationen und alles beisammen
Vorhaben weder Hindernisse. Meine Verbindung
mit Circa 400 Rthlr und den afrikanischen Nachrichten.
Ueberhaupt wenn Sie Vorhaben
abgehen könnten, wenn es Ihnen gefällig
wäre: Wir haben so viele Noth und Sorgen
[illegible] Regelmäßigkeit [illegible]
[illegible] Verzeichniß [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]

322

327

325

373

Frankfurt
den 6. April
1824.

Ergebenster
J. H. B. Jenny
Oberbergrathsassessor

Der Abschrift
Herrn Oberlieutenant
von Hayden
in
Fr. Pr. Linien
Frankfurt am Main.

190

Registrator Fritze in Wiesbaden (Friedrichstraße) hat Nov. 1838 Johann Heinrich Jacobi aus Langenschwalbach zu halten:

Bemerkungen

324 327 328 323

Fritze

in

Wiesbaden

Registratur

4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

190

326

Registrator Fritze in Wiesbaden (Stiftstraße) hat Nov. 1838 folgende Insecten erhalten:

Buprestis gigantea L. Bras
——— vittata F. China.
Elater intermedius Illst. Bras.
Euchlora viridis F. China.
Calandra palmarum F. Bras.
Lamia suboccellata Bl. Bras.
Sagra purpurea F. China
Fulgora laternaria F. Bras.
Tettigonia maculata F. China
——— sanguinolenta F. China.

Hr. Fritze dagegen von hiesigen japanischen Insecten von Herrn Friedel 2 Mal Fritze in Para erhalten: Buprestis bicolor, Lamia maculata, Calandra und einen Anzahl kleinere Insecten unbestimmter Ordnungen erhalten.

325

327

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

271
327
326

Froriep, Robert

in

Weimar

Professor u. Dr. med.

geb. 1804.

† 1861.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

191

Hrn. Professor Lebert

Indem ich mich mit ergebenstem Dank für die
gefällige Mittheilung über Anwendung des
Pflanzenalkohols zu pharmazeutischen Präparaten
beehre und gleichzeitig einen Katalog desselben
gehorsamst zu übersenden. (P. P.)
Indem ich damit Sie bitte meinen unsere Notizen
ein freundliches Wohlwollen zu erhalten war-
den ich mich mit ausgezeichneter Hochachtung

Hrn. Professor Lebert

Weimar 20 Mai 1845

P.S. Meine Mutter sah Ihre Briefe mit Vergnügen
entgegen, leider ist sie in letzter wiederholten
Krankheitsfälle noch in fortschreitender Besserung
sehr geschwächt, so daß sie mit einer Feder
nicht eigenhändig beschäftigt sein darf, doch geht
es doch in den letzten Tagen so viel besser
daß wir wieder Hoffnung zu ihrer ganz

ganz ergebenster

J. J. Bouché

Herrn Damian von Heydenreich
Professor der Medizin
in
Frankfurt a/m

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main