

Handwritten text on a small, decorative paper label at the top center of the book cover.

44

VISUM REPERTUM
über den Leichnam
des seligen Herrn Hofraths
Senckenberg
des
Stifters des
Bürgerspitals.

T 1^e/44

Wir Endes unterschriebene Medici
und Chirurgi haben am 17.^{ten} huius
am Tringuanus des saligen Herrn Johann Fr:
Treu Sanktburgs, am am 15.^{ten} ejusdem A:
bundes gegen 4. Uhr von dem Subälten eines
zu nebst dem Surgenpitale herunter gel,
am nach dem Wunden nach dem, in dem un:
zu auctoritativem Thutur gnosunt, am sol:
genur Witer bey der Daction comert.

1.) Was sehrlich stunden wir am für einigen un:
nigen stunden Contusionen am der
Wunden mit dem Dite des Wunden,
am beträchtlich, am soll laugen, am
zinnen soll tiger Wunden, am nicht weis

2
vum esse occipitis gleich über dem Na-
ken riss, und zwischen dem integumentis
communibus non unten fünf über das pe-
ricranium weg, bis zu dem margine
lamboideo ossis occipitis in der Höhe
ging. In der Wunde selbst, woraus in
solichem Mann so wohl ein Blut, wo er
ging, als auch im Fortwachen, eine stark
Hämorrhagie solichem hatte, dann sich noch
ein zinnliches coagulum. Derselbe war
ein solich nicht unbedeutend, wenn man eine
kleine unbedeutliche Contusion am Un-
terleib in regione iliaca sinistra aus-
nehmen will.

2.) Der die Injuration der integumento-

rum communium non cranio, nicht
sich gegen die hinteren margines der bey-
den ossium bregmaticis in der membra-
na aponeurotica musculorum fron-
talium et occipitalium in der
contusum et extravasatum; Furchen
gegenüber unter dem Jugo der ossium tem-
poralium mitten in dem musculo cro-
taphite linker Seite einer contusion.
Das nur vorzüglich der Tumor crani-
um sowohl in einem oberen Sinus, als
auch in einem Tumor war immer:
kalt, nicht fluctuirt, nicht sehr hart.
Dura mater war immer hart. Die
großen Sinus des Gehirns waren hart

ganz ohne Blut. Die mater
resinae bey der harten Extremität des
Korsts lobis cerebralis nitens nollens
getratnen Bluts zu seyn. Unter den
beyden meningibus aber bey dem
foramine magno im in medullam
oblongatam et spinalem herum,
unter der noch in der harten Dura her-
über, ein notabler sanguis extrava-
satus. Der ganze cerebrum
ganz. Unter bey dem corpore callo-
so noch auch in den ventriculis cere-
bri unter der geringsten Minernaturlich.
Der plexus choroides unter phena-
her mit Blut angefüllt, als wenn

bey Lymphnaden zu sehn zu sehn, und
Klein. Cerebellum zeigt sich oben
so natürlich als das cerebrum.

3.) Depar, lien, renes und übrige
viscera in dem bey der Insection ins
Unterleibs, wozu man mit Messer
alles genau untersuchte, quam sa-
nissima. Nur die beyden anuli der
musculorum oblique descenden-
tium in dem, bey denen der Lute, stark
verwahrt, und Ursache und Wirkung
der hernie, die der valige Lute Hof-
rath mit einigen Jahren verliessen hatte.
Omentum seht sich kurz und un-
sig stalt. Quoad vasa majora

ist zu merken, daß die iliaca bey
Durchschneiden ganz leer, und die vena
cava und die arteria magna
nicht wenig von Blut in sich enthalten.

4.) Aperto thorace können die Lobi
pulmonum schon mit geysser zusammen-
gepresst; nicht aber mehr wie mit zween
bis drey kleinen rundherb Zoll langen
Ligamenten an die pleura flüchtig
angehängt, aber nicht unmittelbar ver-
wachsen: unter dem rechten Lobe ist etwas
von sanguine extravasato in cavo
thoracis: bey dem übrigen zusammen-
lich zusammengepresst.

Das Geyß mit geysser und geyßer,

tebrarum, inter cui sanguis extra-
vasatus obliquiter nunc sunt grossi,
inter quos hauriuntur nunc sunt vertebrae colli-
nae tractu.

5.) Dignum sanguini extravasato
quod nunc sunt, inter quos sunt ver-
tebrae colli, nunc sunt, nunc sunt
inter quos sunt nunc sunt apophysibus
transversalibus et spinosis quod sunt
quod sunt, nunc sunt nunc sunt corporibus
sunt sunt nunc sunt sunt, nunc sunt
sunt sunt. — Sunt sunt sunt sunt
sunt occipite, sunt sunt sunt sunt
sunt, sunt sunt sanguine extravasato
circa medullam oblongatam et spina-

lem, aus dem verlorsten in der Structur der Verte-
 bris colli et thoracis nehallt also in der
 Tois, in thails vürhinn noch gurgungun lathala
 Gämorrhagin, thails vürhinn nbn so lathala
 Compressio in medullae oblongatae et spi-
 nalis in der Manns bewußt geht, in der Brust
 in der Spitzes und Spitze der Lungen auch in der
 in der Throat noch bewußt in der. Frankfurt
 den 18. ten November 1772.

- A. Behrens Dr.
- J. C. Kistner Dr.
- F. S. Müller Jun. Dr.
- J. G. Giese, Collegii Chirurg. Senior.
- J. C. Behrens Collegii Chirurg. Sub. Sen.
- A. F. G. Jonas. Chir.
- C. F. Meyer. Chir.
- J. L. Bücher. Chir.
- Ch. F. Graßmann Chir.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



