

schalt man durch in der
: Negation

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

Angelhaken...

8^o No. 2.

2 fah. den Wingerd.

2 Kistchen Eingeweide

Catheter

Bekken

Halb - Kanne

1 Glas

Linsen

Kabane

Derhamat

+
[Rueppell, Eduard Wilhelm Peter Simon:
Verzeichniss von Anneliden, Crustaceen, Zoophi-
ten, Mollusken, Säugetieren, Vögeln, Amphibien
und Fischen Nord-Afrikas. Bd 4.]



025

002

051

002

005

052

052

052

Handwritten text on the left margin of the top page, possibly a list or index.

Handwritten text on the top page, partially obscured by the bottom page.

Blank page with a faint circular stamp in the lower right corner.

Handwritten text on the bottom page, including names like "Bauer" and "Lange".

Handwritten numbers on the bottom right of the bottom page: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Angelhaken

8^o No. 2.

2 fah. den Weingart.

2 Kistchen Eingemachte

Catheter

Betten

Kalium - Hausse

1 Grosse

Linsen

Kabanen

Derikamab

Musir

Sargethiere

Syathien

Magnanien

Gelidat

Maabien

Kababien

Arab. Schmitz

im Kordofan

im Darfur



130

11

13

2

025

002

051

002

009

052

056

N^o Genus & Species Geschlecht Bräuterei Länge

1. *Putorius conillo* masc 6 am Bauch
skel.

2. *Hesperetes sanguineus* masc 4 Bräuterei, mit hornigen
& fem waren Stacheln besetzt
am Bauch
skel.

3. *Sciurus hirsutus* fem 6 6i zart, länglich
4 Backenzähne oben & unten
Bauch oval fleischig
am Bauch &
Zam. Tergine
skel.

4. *Viverragenetta* m & f 6 am Bauch
skel.

Zwischen dem Affen & dem Geschlecht theilen eine
Vertheilung im Gestalt von 1 zu beiden Seiten am
2. & 3. Daumen; die Molare liegen hinter dem
Vertheilung bei dem Menschen.

Iris Pupilla Nahrung Landesthume Vorkommen

Vogel, Ein Ratte Abu Afene in Erdhöhlen
f. f. + Anfangs
februar bei
Abu Harase

hellbraun, groß. Wie vorstehende Abu Wosie in Erdhöhlen
Speis + Anfangs
februar bei
Abu Harase

dunkel, sehr groß. Pflanzensamen; Sabere in Erdhöhlen
braun, in kleinen faulen
Der Penis ist die Luer nach gerichtet; er endet in einer
cartilaginösen Membrane, die wie ein S gekrümmt ist.
Das freistehende Ende dieser Knorpel Membrane bildet
einen Haken

hellbraun, groß, rund Vogel f. f. Sabake Paarweise
auf Baumen
in d. Steine
Gebirge

N.	Genus & Species	Geschlecht	Brust Warzen	Länge
----	-----------------	------------	-----------------	-------

5	Camelopardalis Giraffa	mas	4 an Inguine	lang, an
---	---------------------------	-----	-----------------	----------

Skell

Andromeda de Vossia Genetta

Liben 7 Leypen

Milch lang, ^{sch}thural 3 Kantig, verwand
roth

Kleiner Cocoon

Länge links 3
rechts 4

6	Gallina senegaleensis		2 an d. Brust & 4 an Bauch	
---	-----------------------	--	-------------------------------	--

Der Magen wie bei den Meerkatzen,

Skell

Die dünne Darm 2mal so lang als die Kiemen
dann folgt ein ungeheures Cocoon $\frac{2}{3}$ so lang
als die Kiemen; die d. Kiemen sind $3\frac{1}{2}$ so lang als
die Kiemen. Liben 3 Leypen

Einmal hat einen Knochen, & d. Egel
ist sehr merklich stehende Flecken
bevorzugt

Tris	Pupilla	Nahrung	Landesnahme	Vorkommen
------	---------	---------	-------------	-----------

hell
rothbraun klein
schwarzgrün groß

heißt Tsch
in den Löchern von hohlen
Bäumen Paraversion
kelt von Vögeln & Insekten



N ^o	Genus & Species	Geschlecht	Brust Warzen	Zunge	Ins
7.	<i>Nicturus Taboldi</i>		2 auf d. Brust	fleischig, rauh	
	oben & unten 2 Schenkel, rauh				
N ^o 52.	Tiefe Grube auf der Stirn;			lange Ohren; lange	
Skelet	Fleischhaussprossen auf der Nase			Schwanz verbunden bis	
	11 R + 1 Skelet			an die Spitze mit der Kiste	
				füßen	
8	<i>Desperillio leucogaster</i>			fleischig, mit etwas	
	Kerndfleischhaussprossen auf der Nase; kleine Ohren;			braunen Spitzen	
	2 Phalangen am Index; langer Schwanz, bis				
Skelet	an die Spitze verbunden durch eine Membran				
	mit den Hinterfüßen;				
	Oben 2 zusammenhängende, lebhafte Schenkel, rauh;				
	unten 6 kleine Schenkel, rauh				
N ^o 53.	8 R + 1 Skelet				
9	<i>Canis flavus</i>				
	52 N ^o				

4.
Iris Pupille Nahrung Landnahme Vorkommen

Schwarz

^{Ukrabat}
Schwarz und in gelblichen Spine; Index 1 Phalange
auf Tabolet Bäumen
heißt Abu Prigak. —

hellbraun

heißt Abu Kosein

Hyena leucobris.

Nach neuerer Untersuchung scheint mir dieses Thier
ein eigenes Genus zu bilden, das zwischen Canis &
Hyena eingeschaltet werden muss. Ich möchte es
Kynos maculatus benennen.

Das Karkassianbraun; Lunge glatt; Lungen
rechts 5, links 4 flügel; Leber 9 Lappen
Darmkanal vom Pilon bis zum After $2\frac{1}{2}$ mal
so lang als der Körper (ohne den Schwanz gemessen);
nicht sonderlich langer Genus; Magen wie bei den
Keruben; Penis mit einem Knochen versehen; bes.
in jeder Seite des After eine ^{die sich nach außen öffnet}
Genus ~~schneidet~~ Genus ~~drüsen~~ am After. Um die
Vulva ein dicker Muskelring; denn innerhalb
derselben 2 blinden Röhren auf beiden Seiten eines Clithrons;
in der Vertiefung dieser Blindröhren öffnen sich zwei
kleine Drüsen.

Das Thier heist Simit; lebt truppweise an den
Bäumen, und jagt in Gesellschaft Gazellen,
Schaf, p.p. Dieses ist das einzige Thier dessen
Fleisch die Araber nicht essen.

Harpastor dispar.

Lunge länglich fleischig, die Mitte des vorderen Drittels
mit rückwärts stehenden Hornschalen versehen. Sämmt-
liche Ringe der Trachea unvollständig. Jeder Lungen-
flügel in 4 Theile getheilt. Leber 9 Lappen; mittellange
Caecum. Pechen & dicke Dünne $9\frac{1}{2}$ "
Dünne Dünne & Duodenum $4\frac{1}{2}$ " 3"; Milz
länglich 3 kantig

Dipus minor

5


Jeder Lungenflügel 3 Abtheilungen; Leber 6 Lappen
sehr dickes kurzes Coecum; Ductus spermaticus
macht im Bauche eine doppelte Windung in
Gestalt eines Ammonshorn.

Felis leopardus? Tubata

Lunge links 3 rechts 2 flügel; Leber 5 Lappen
& ein Einschnitt. Iris braunlich gelb; Kein Coecum
& Driese öffnet sich an beiden Seiten hinter der
After; heißt Tahat. Sehr häufig bei in der
Wüste südlich von Arabien, kommt selbst
bis Susat vor, und scheint ehemals in Egypt
gewesen zu sein, wo es in den Catakomben von
Gurna abgebildet ist; Die Klauen sind ab-
stumpf, wie bei den Hunden, denn sie sind
nicht zurückziehbar wie bei den andern Katzen
Arten.

Histiot cristatus?

Iris schwärzlich; Lunge fleischig etwas rauh
Magen wie nebensächlich; sehr dickes
großes Coecum zu welchem sich die Därme
schlingförmig inseriren; Leber 6 Lappen
Jeder Lungenflügel besteht aus 7 Haupt & 2 Neben-
Abtheilungen, und jede derselben aus zahlreichen kleinen
Unterabtheilungen. Am der Basis der Prosthe, da
wo sich die Urethra inseriren 2 große in viele
Lappen getheilte Drüsen, ferner ein Appendix



bestehend aus einem länglichen Blinddarm, in
welchem sich 12 kleinere Blinddärme inseriren.
Heißt Nadge bei den Arabern; wohnt in
Erdböhlen, frisst Gras und geht nur bei Nacht
aus. Gulo Lectorius? megalonix m. l.

Iris dunkelbraun; 4 Milchwarzen, 2 am
Bauch, 2 am Inguine; Lunge fast ohne
merkliche Stacheln; Lunge auf jeder Seite 3flügl.,
Leber 6 Lappen. Milz länglich 3 kantig; kein
Cöcum; keine Hinführung am After oder den
Geschlechts theilen. Heißt Abukern; wohnt in
Erdböhlen, frisst Mäuse, Schildkröten, p. p.

Antelope Leucorix.

Iris kastanienbraun. 4 Milchwarzen am Inguine;
zwei Bälle ohne Öffnung nach außen zu innerhalb
der Phalangen, welche mit Haaren bewachsen sind.
Keine Vertiefung an den Wüthen; keine Thurensische.
Ein gleiches bei A. addax.

Antelope Dama.

Iris kastanienbraun; Thurensische & Vertiefung an den
Wüthen; kein Haarballen zwischen den Phalangen.
Leber Hauptmasse mit einem Einschnitt für die
Cistifelle; nach hinten zu ein kleines Nebelappen.
Lunge links 4, rechts 3 flügl; nur 2 Milchwarzen
am Inguine. Heißt Ad Ledra, oder Adia.

6
Belis caracal
~~*Lion melanolepis*~~ heißt bei den Arabern
Omreichat; er ist häufig bei Abu Kale, Weberi
und tötet selbst Giraffen. Das hellgelb. —

Notizen über einige Thiere die südlich von Gannu
nach dem Bakhti Abiad zu vorkommen.

a) Omjabe; eine Antilope von der Größe der A. Dama
man; Hörner wie das Weibchen der A. Dama;
Balz ganz roth, mit Ausnahme des unteren Theils
der Füße, welche weiß sind; die Stirn ist schwarz.

b) Tedal. Antilope von der Größe eines Pferdes.
Hörner wie der Addax aber weit größer & dicker
Balz roth, Hinterfüße schwarzlich, Stirn schwarz
Schwanz wie A. leucoria.

c) El Hamra, Antilope ^{etwas größer als} von der Größe der A. Dorcas
Hörner gleichfalls etwas größer & von derselben form
wie die Dorcas. Balz ganz roth, nun längst jede
Flanke ein breiter schwarzer Streif.

d) Abu Delaf, ein Art Ameisenfischer, von der
Höhe eines großen Schafs, lange Ohren & lange
Schwanz, länglichen Kopf mit fleischiger
Schwanz ohne Zähne, Balz von der Farbe &
sparsam behaart wie die Bauchseite des Putorius
mexicanus; 3 Zehen an jedem Fuß; wohnt
in Erdhöhlen; frisst Ameisen.

e) Om Gissa, ist das formosianische Teufelchen.
an jedem Fuß 2 große & 2 kleine Zehen.

f) Anase das Einhorn. Balz weißlich; Größe
& Bau eines Pferdes, gespaltene Krone; auf der Stirn
ein langer gerader dünner Horn; kommt in den südlichen

sten Wisten vor: ich habe nun 3 Personen ge-
sprochen die dieses seltene Thier gesehen haben.

g.) Marafief. Hyänen Art graues Balck mit
schwarzen runden flecken.

h.) Nimmer bidah l. Gebel; ist mit den großen
Wahrscheinlichkeit flüß ^{Leopardus} ~~inbata~~ ^{inbata}: soll bei weitem
größer sein als flüß ~~Leopardus~~ ^{inbata} ~~mit einem roten~~
~~von~~ ~~ausgestrichen~~ ~~linget~~ ~~den~~ ~~Parten~~, und schwimmt
auf gelblichem Grund.

Siale ist ein Akarienbaum, die Aststimmung mit weit
ausgestreckten linget der Erde herlaufenden Aesten;

er hat 2 erlei arten Stacheln, lange & kurze wie
Wiederhaken; seine Samenschoten sind gekrümmt,

er schirmt einen schwarzen Harz aus. Acacia Legat

Sinner eine andere Akarienart, die viel sehr hoch
wird; der Busch erhebt sich konisch & ist oben

gleichsam horizontal abgestutzt; die Aeste sind
mit kleinen gepaarten Wiederhaken versehen.

Karare eine Strauch, der sich etwas rankt und
die felsigen Hügel liebt; er ist mit kleinen einfachen
Wiederhaken versehen. Acacia albid.

l' Baum eine Baumart ohne Blätter, deren frische
lange Schoten bildet, die viele kleine Nüsse enthalten.

sie sind von angenehmem Geschmack. Moringa zeylanica

Ocher = Asclepias procera
Gelb = Balanites egyptiaca.

Marschroute vom Nil bis an den
Brunnen C. Webi. —

21. 17. Apr. Abreise von Marsakotta, marschirt 3^h
10° S. W., Kieselstein Hügel mit wenigem Buschwerk.

21. 18. — Nebelwolken, denn doch Regen nach Sonnen
Aufgang, warmer S. O. Wind; Mittags Windstill, wolky,
marschirt 6^h in einer Richtung von 10° S. W.

21. 19. — Nachts Windstill, Gewitter im Süden; Marsch
8^h in Richtung von 10° S. W. bis wir uns bei dem Brun-
nen Abu Sale lagern; er ist umgeben von Sandstein
Hügel, welche ein großes Thal bilden, das voller Bäume
ist; man findet hier immensviele Wäpser, aber in
an Regen sparsamen Jahren in sehr geringer Quan-
tität; der Brunnen hat eine Tiefe von 12 fup zwischen
Lager von Kieselgerölle und Töpferthon.

Hier geblieben 2 1/2 20. Apr.

21. 21. Marschirt 9 1/2^h in einer Richtung von 10° S. O.
bis wir in das kleine Wadi des Brunnen C. Webi kamen.

Hier fanden wir in einer Tiefe 10 fup an mehreren
Stellen zwischen einer sandelblauen Töpferthon
Schichte reichliches Wäpser; Auffallend war es uns
deshalb in anderen Brunnen gruben die wir 5 Schritte von
den unsrigen bis zu einer Tiefe von 18 fup in gleicher
Töpferthon Schichte einwühlten, wäpserlos waren!

Von hier liegt Simrie nach W. S. W. in einer
Entfernung von circa 7^h —

Von Webi liegt Gummer direct nach S. O.
in einer Entfernung von 12^h. Der Brunnen von Wadi
Mallagh liegt in gleicher Richtung 8 weiter.

Der Brunnen Kapsanacci liegt von Webi dies
Südlich, in einer Entfernung von 8^h; die Brunnen
von Elai in gleicher Richtung 9^h weiter.

Von Gummier östlich in einer Entfernung
von 4^h sollen sich die Trümmer von 2 großen An-
siedelungen vorfinden, deren Gebäude aus Leaden
bestehen, und mit Schiffeu versehen sind. 3 groß
ausgemauerte Brunnen finden sich vor; der 8
ist heißt Wadi Mogattem. —

Abu Gaschim ein Hügel der gleichfalls einige
Trümmer von Wohnungen vorfinden, doch sind sehr
nicht von bekannten Steinen; er liegt von Webi nach
P. P. W. in einer Entfernung von 5^h circa; ein
anderer Hügel — Abu Gelie — der W. N. Westlich
von Webi in einer Entfernung von 4^h circa liegen soll
enthalt gleichfalls Trümmer von Wohnungen. —

1. Teil
Sögel

—

530

N^o Geschlecht & Species Iris Pupilla Zunge

1. *Colinus scansorius*? braunroth — Kurz, platt, mit
ausgestrich. hornig
Spitze
Tiefe Dunkel
rosenroth; alle 10 Zehen nach
vorn ausgerichtet
219 + 1 Skelet

2. *Nectarica scapularis* (im Winterkleid) / Schwarzbraun, lang, schmal
H^o = 231 zugespitzt, horn.
faunt. 231 schnellte

3. *Pyrula*? *melas* (in Winterkleid) / Kastanienbraun Kurz zugespitzt
hornartig.
233

4. *Tringilla superciliaris* / hellbraun
5. 244

5. *Pogonias erythrocephalus* / rothbraun Kurz flach, hornig
13 202
+ 2 Skelet

6. *Buceros corpicillatus* / rothbraun sehr Kurz launlich
4 St. horn. Abm. mangor. hornig
+ 1 Skelet 230

7. *suberiza*. *flavigaster* / schwärzlich mittelmaßig, hornisch.
4 St. hornartig, scharfe Spitze
234

Nahrung & Magen Vorkommen Bemerkung

Kernbeeren (Gelid) Truppweise auf + in Tannu in Lubeid.
im halbem Kuloß Magen den Gelid Bäumen Schnabel basis blutroth;
nachher Ring um die
Augen Koscheniller olt;

Kleine Insekten Einzel auf dem + Ende Tannu bei
im membranösen Magen dem Bischen Oberid.

Lämmerlein im halb Truppweise auf + Ende Tannu bei
neum Kuloß Magen niedrigen Dombischen Oberid.

Lämmerlein Truppweise auf + Ende Tannu bei
den Strauchwerk Oberid.

Lämmerlein im halb Einzel auf Bischen + Ende Tannu bei
muskulösen Magen dem Strauchwerk Oberid.

Lämmerlein im halb Einzel auf Bischen + Ende Tannu bei
loßem Magen dem Strauchwerk Oberid.

Lämmerlein im muskulösen Magen Truppweise auf + Ende Tannu bei
dem Strauchwerk Oberid.

N^o Geschlecht & Species Iris Pupilla Zunge

8 *Lanius rubigaster* 1. Strohgelb 207 schaufelförmig
hornig, eiserige
Spitze

9 *Tringilla ^{picta} ~~gularis~~* 4 Karminroth 210 Kegelförmig, flei-
schig mit horniger
Spitze

10 *Tringilla ~~caerulea~~* 6. Karminroth 209 wie vordahend

11 *Trochus plebejus* 4 Strohgelb 235 schaufelförmig
hornig, doppelt
spitzig

- 12 *Colinus ^{Schwamm-braun, mit einem} ~~flavescens~~ ^{eingefärbter Ring umh.} ~~flavescens~~* 5 große Kasse fleischig
auf dem 236

- 13 *Sorex ^{leuc} ~~caeruleus~~ ^{caeruleus}* 1. Zitronengelb groß Kasse hornig
fleisch, ausgekerbt
Spitze 237

- 14 *Muscipora torquatus* lebhaft Zitronelb Kurz fleisch lancetten-
(Geschlechtsknoten) 5 + 1 Keil 238 förmig, hornig mit
gespaltenen Spitze

- 15 *Lanius superciliosus* 3 Kastanienbraun Lancettenförmig
206. fleisch hornig, rasig
Spitze

- 16 *Tringilla cinerescens* 1 hellbraun 245 Kegelförmig fleischig

Nahrung & Magen Vorkommen Bemerkung

Ameisen im menschlichen Magen ^{Truppweise} ~~Einzel~~ im Gebirg + Erde Lamm auf Harare

Lamprosen im menschlichen Magen mit andern Insekten + Erde Lamm bei Harare

im halb menschlichen Magen Vegetabilien ^{Truppweise} ~~Einzel~~ auf Bäumen

Kabackbeeren, Gelb, Baumwolle Lamm ^{Truppweise} auf Bäumen + Erde Lamm 1 Paar heist Schilling Käfer ^{Einzel} auf Bäumen + Erde Lamm 1 Paar

Kleine Insekten ^{Einzel} auf Buschwerk + Erde Lamm 1 Paar

Kleine Käfer ^{Einzel} auf Bäumen + Erde Lamm 1 Paar

Lamprosen ^{Einzel} auf Bäumen + Erde Lamm 1 Paar

97. Geachtelt & Species Iris Pupilla Lunge

- 17 *Centropus superciliosus* lebhaft Karmosin, Laurettenförmig
1 roth 200 hornig, wenig
gepunktet Spitze
- 18 *Sitta hexicaudata* Karmosinroth langschmal,
3 = 221 schaufelförmig
- 19 *Picus ocellatus* Dunkelbraun lang, spitz, hornig
1. Knochentrost - schnellbord
232
- 20 *Sitta musciptera* Kastanienbraun, flach, hornig
1. 248 rasenig
- 21 *Fringilla leucogaster* Dunkelbraun hornig, schaufel-
Edolis, 3. rang glou förmig, zugespitzt
rasenig
- 22 *Parus caeruleus* Karmosinroth schaufelförmig, hornig
1 220 rasenige Spitze
- 23 *Sitta subquadrata* gelbbraun hornig, schaufelförmig
7 247 zugespitzt
- 24 *Columba caespitellata* rothbraun, nach Basis flüchtig
2 ansonsten einen 1/2 Spitze
schmalen goldgelben
ring 196
- 25 *Fringilla Ptiliacus* rothbraun klein, konisch
2 162 flüchtig
- 26 *Merula philochina* Kastanienbraun
2 193
- 27 *Corvus isabellus* Dunkelbraun hornig, ausgehöhlt
25. 26. + 2 Kiel. länglich zugespitzt

Nahrung & Magen	Vorkommen	Bemerkung
Candela in membra neß Magen.	Truppenweise auf Buschwerk	+ Ende Januar Abri Kanar
Vegetabilien?	Einzeln auf Buschen	+ Anfangs sehr
Kleine Puppen pp.	Einzeln auf Bäumen	+ D ^o
Klein Insekten	Einzeln auf Gebüsch	+ Anfangs sehr
Larven	Einzeln auf Gebüsch	+ D ^o
Karabene	Einzeln auf Gebüsch	+ D ^o
Kleine Insekten	häufig auf Buschwerk	+ D ^o
Larven	Paarweise auf Bäumen	+ D ^o
Larven	Truppenweise auf Busch	+ D ^o
Larven im harten muskulösen Magen & sehr lange Coecum	Truppenweise auf Gebüsch häufig auf der Erde	+ D ^o
Käfer, Scarabaeen im muskulösen Magen	Truppenweise auf der mit Halpa bewachsenen Ebene	+ D ^o harte Kje.

N^o Geschlecht & Species Iris Pupilla Länge

- 28 Neues Geschlecht, wenn Dunkelbraun
es nicht von Mullifera
2 239 nicht sonderlich
groß, fleisch, hornig
mit ausgehebelten
schwarzen zaserigen
Spitze
- Epimachus minor
Charabel Lenz, zugespitzt, Naselchen länglich Die außen fleisch-
halt bedeckt durch Zehen der Bar-
Membrane, an dem Barotives vermahten
ein Schnabel mit 2. mittl. Lein
- 29 Lampyratensis ^{acurra} strohgelb 205 laurritzenförmig
hornig, zaserig
- 30 Perdix ^{stappertonei} Kartausenbraun Kurze Hornig mit
Gendelicht. Unterhünd. Naselchen Ring um die Augen & f. f.
Leit. Quere 4. 240
- + 31 Perdix ^{ventralis} Dunkelbraun; Kurze zugespitzt
Naselchen Ring & f. f. 241 Liggelrot
- # 32 Laniellus capistratus Dunkelbraun; f. f. Lang, schmal
& schmal, schwarze fleischig, mit hornig
Spitze 174
- 33 Charadrius palustris Orange gelb 198 länglich schmal
fleischig, hornig
9 St. + 1 Kelet Schnabel bapen &
f. f. - rosenroth
- 34 Florey galbula. rötlich orange gelb
4. 212
- 35 Fingilla maskerata schwarz Kurze Hornig
5 242 fleischig
- = 36 Fingilla torquata rothbraun Kurze Hornig
1 213 mit hornigen Spitze

Nahrung & Magen Vorkommen. Bemerkung

Insekten Larven auf niederen Gebirg + Anfangs februar
in membranösen kleinen Truppen bei Ab. Harare
Magen. Gesellschaften

1. fliegende Wespe, Schwarm längliche Oberseite des Kopfes Kopf
die folgende Insekten etwas zugespitzt & Schwarm Stahlblau
bei den 5. welche die in die fliegende mit Metallglanz, Kahl, Hals
längste ist weisse Binde. & Bauch rauchschwarz
Amerisen im halb Einzel auf Bäumen + Med. februar
muskulösen Magen

Larven im stark Paarweise in der Halfe + Med. februar
muskulösen Magen in großen Ecken
Vergelbte

Larven im stark Truppenweise + Med. febr. bei
muskulösen Magen Halfe Ab. Harare
Vegetabilien im
stark muskulösen Magen

halb muskulösen Mag + Med. febr.
bei Ab. Harare

im stark muskulösen Mag Larven
L.

N: Geschlecht & Species Iris Pupilla Lacaze

- 37 *Puccia pictus* Kochenillenth 218 lang warmsfarig
tapinophiles 1.
 = 38. *Puccia olivaceus* 1. 243 stark lamellenförmig
 hornig, mit schwarz
 gespaltenen Spitz
 Stenabel gerade; stark, zusammengedrückt mit hakenförm.
 Spitze, wenn stark ausgekerbt; Nadelchen unbedeckt,
 mit einer Membran versehen, die an einer kleinen
 runden Öffnung liegt

39 *Pittacus torquatus*

40 *Pavola nigricanda*

41 *Coracias ^{abyssinica} cyanus* 1 175 hornig flach und
 eanig. Spitze

42 Neues Geschlecht
oxydactylus gigas

Stenabel lang, gekrümmt, zusammengedrückt,
 geröhrt; oben mit einem hornartigen
 versehen; Nadelchen an der Basis, dieselben
 länglich, mit feinem bedeckt. Nadelchen
 violettgelbe Königsblau; nadelhafte an der
 Stenabelbasis & hakenförmig Königsblau &
 Karmosinroth ^{bei jungen} Iris schwarz.

6 + 2 Nekt

& bla Königsblau bei d
 & der Jugend

229

Nahrung & Magen Vorkommen (Bermer Kasse)

Larven, Puppen, Einseln auf Bäume + Mischfütterung

Eisener & Kupfer im halb Einseln auf Bäume + Mischfütterung

muskelst. Magen
iffligfede Körner, deren Stufenweise bis zur 5. welche die längste ist; auf ihre Leber etwas verwaschen an der Basis und der Mitte.

Kopf & Nasen aschgrau; Brust flügel & Schwanz
graugrün, die Federn der flügeldecken enden mit einem
weißlichen fleck; Kehle, Bauch & füße rotbraun gelb.

Carabaceen im halb Einseln auf Bäume + Mischfütterung

Zunge sehr kurz, Carabaceenförmig, fächerförmig
flügel zugewandt; die 5. am Ende.

Die 5. mit der Mittleren Leber verwaschen
Nagel kurz; Schwanz mittel lang.

Alle Federn, Schwanz mit Ausnahme der
flügeldecken, welche alle schwarz sind
im halb muskelst. Magen Käfer, Puppen, etc.
Korn Cereale, hat 2 Paar Beine

W. Entschl. & Species Iris Pupilla Lenziger
43 *Lanius* ^{collurio?} ~~collurio~~ Kartaginensis
hörnig, kasing

44 *Otiscaptes* ^{arabs} ~~arabs~~ gelblich; rotblau; hornig, nach
2 H. n. 228. hinterm gerichts

- 2 *Pyrrhula minuta*.
1 *Nedarius cabulus*
2 *Turdus atropurpureus*
1 *Lanius bicolor*.
1 *Merops rubicus*. 217
1 *Nalaeus lugubris*.
11 *Fringilla sibilatrix*
1 *Chalchala*
1 *Saxicola aurita*.
1 *Saxicola olivacea*
1 *Saxicola nigricans*
2 *Alauda*
1 *Pyrrhula fusca* 249
1 *Silvia* . . . 250 ? bullbraun.

Nahrung & Mag. Vorkommen Bezeichnung

Insekten

Eier in auf Blüth + Med. f. ab

in halbm. Kulsf. Eier in den Tafl. hart Merba.
Magen Scarabien

Florence

- N: 1. *Herpodes griseus Geoffroy*
2. *Gallas senegalensis*
3. *Phrynosoma coronatus*
4. *Nestaria metallica*
5. *Colinus caucasicus*
6. *Bucconas nasutus*
7. *Poconias erythrocephala*
8. *Lanius barbarus*
9. *Merops viridis*
10. *Cuculius isabellus*
11. *Lanius personatus* /



6

Amphibien?

Nr.	Geschlecht & Species	Tris	Peperilla	Leung
-----	----------------------	------	-----------	-------

1.	<i>Monitor ocellatus</i> (m)	rothlich mit groß gelb braun gemischt		1 schwarz in 2 lange Spitzen aus- laufend.
----	------------------------------	---	--	---

2.	<i>Nepura reticulata</i> od. <i>Coluber nauama</i>	strohgelb länglich gespalten		Körner fleischig nicht lang zwei spitz
----	---	---------------------------------	--	--

Pipistrellus asietanus

Leup

Nahrung & Magen

Vorkommen

Bemerkung

80

Eidecken, Ratten,
Vögel pp

in Erdhöhlen, im
Sande

Anathomydas wie
die des Mouton
terrestris; hier gleich
falls Woran

Bäume
Korwofan


✓

schwarze
2 lange
Leitungen
auf

schwarze
Leitungen
auf

41

14





Einhorn



8° Hs 2 Bol. 4
Fundert. Bol. 6

