



5

Soe 6

A

La vaccine ne peut se développer que lorsque
le vaccin a été mis en contact avec les vaisseaux
absorbans, par le moyen d'une pustule, de la peau
privée de son épiderme.

Hufon. Recherches
etc. p. 64.



3

ontyd pag 58. Ms.

Entered 149 54 12

2


- uliginosa* ^{ibid} pag. 411

on five causes."



On a dit, que dans la tendre
enfance, le calus croît ordinairement
avec l'âge, et peut
produire des difformités
par l'accumulation de la
matière qui le forme; mais
l'expérience ne confirme point
cette assertion, qui nous parait
plutôt dictée par la théorie
que fondée sur l'expérience
et l'observation.

Recherches de maladies chirurgicales
Paris. 1814
Tome 3^{ème} page 82.



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]

ad morbos universales vasorum absorbentium.
 congestio activa et passiva Sprengel cfr. Dico. Gregorini.
 congestio activa passiva Sprengel cfr. Dico. Gregorini.

3

quod morbus est in his partibus ubi vasa sunt et quod morbus

Ontog. pag. 38. 113.

Ontog. pag. 38. 113.

J. Hunter. s. the blood. p. 244. de fulginatione vasa. Dico. Dico.

quod si vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo

quod si vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo

pag. 338.

Sympathia contraria ejus applicanda vasa sunt a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

duo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo

duo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo

duo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo vasa sunt in morbo

Leber intermittenter ab intestinalis glandulis ingluviatis pag. 411.
 Cap. 12. in primis de absorptione agit.

pag. 446. Parts are capable of being absorbed from five causes.

1. Tension of parts
2. Irritation or pressure
3. Wear and tear
4. Ulcers or sores
5. Death of parts

go S. 69. 433. = See 6



85.69.733 [2.Ex.]
= Soe 6



+
S. TH. SO

M O
VASORUM
CORPO

DISSERTATIONIS QU
MEING - TRALIC

PARS

INDEX
DE

TRA

SUMMARI VA

[2. Ex.]

Salz. Blanquet

Salz. med. chir. Zeit. 1797. I. p. 241.
Allg. Litt. Zeitung. 1796. p. 679. 24
no 88.

Ann. all. Suédy. Bill. Ark. p. 1-
XXVIII. 2. doppel. p. 101
Hofst. Commentar. V. Band p. 169

+
S. TH. SOE MMERRING

DE

M O R B I S
VASORUM ABSORBENTIIUM
CORPORIS HUMANI

SIVE

DISSERTATIONIS QUAE PRAEMIUM RETULIT SOCIETATIS
RHENO-TRAIECTINAE ANNO ^{MDCC} M. DCC. LXXXIV.

PARS PATHOLOGICA.

ACCEDIT

INDEX SCRIPTORUM
DE ~~SYSTEMATE~~ ^{Vascul} ABSORBENTIA

TRAIECTI AD MOENUM
SUMTIBUS VARRENTRAPPII et WENNERI

1 7 9 5.





In tracta
stematis
ita versat
proferam
illustratio
riori syste
tius cogn
contuleru
nostra ae
tium tum
tione, tu
tum dilige
notuerunt
Medicina
debantur
neque s
tuera ob
common

In tractandis eis, quae ad Pathologiam ^{Vasculorum} systematis absorbentis corporis nostri faciunt, ita versabor, ut morbos singulatim in medium proferam, ad quos tum aliorum tum meae illustrationes, e doctrina recentiori et uberiori systematis absorbentis depromptae, penitus cognoscendos meliusque curandos aliquid contulerunt; ex illis ergo, quae ^{profectum} in primis nostra aetate de morbis vasorum absorbentium tum e vivorum contemplatione et narratione, tum demortuorum artificiosa sectione, tum diligenti et considerata ratiocinatione innotuerunt, ea selegi, quae proxime ad Medicinam rationalem exercendam facere videbantur. Omnia autem paucis exemplis, neque speculatione neque hypothesi, sed mera observatione natis, quantum ptereo, commonstrabo.

Hac enim methodo ^{omne} ~~unum~~ quodvis dogma eo facilius inveniri et vel emendari, vel ulterius illustrari, vel omnino novis additamentis augeri poterit.

Generatim autem notandum erit, prouti in omnibus fere morbis Arteriae, Venae et Nervi plus minusve actuosi animadvertuntur, ita ut nullus fere morbus cogitari queat, in quo non Arteriae et Venae directe vel indirecte patiuntur, in quibus non Nervi vel ~~mediate~~ ^{scriptur vel remediur} ~~immediate~~ afficiuntur, ita vix ullus morbus cogitari potest, in quo vasorum absorbentium sytema, nisi primas partes, saltem secundas teneat agatque.

Vasorum absorbentium genus enim corpori sano commodissimum, plurimorum morborum verus fons ad intelligendas, cohibendas, demonstrandas, vel removendas varias variarum affectionum causas, uberrimam largitur messem.

Et profecto verisimile est, ut cum CELSO loquar, et HIPPOCRATEM et ERASISTRATUM (BOERHAAVIUM et HOEMANNUM), et quicumque alii, non contenti febres et ulcera agitando, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem Medicos fuisse, verum ideo quoque maiores Medicos exstitisse.

Systematis autem absorbentis morbos in quinque Classes distribuit CL. CRUIKSHANK a).

a) Anatomy of the absorbent Vessels, p. 111.

Ad Primam scilicet retulit: Morbos a non resorptis sanis et innoxiiis fluidis et solidis; quorsum pertinent: Defectus absorptionis Chyli, Obstructio glandularum mesenterii (Tabes sic dicta mesenterica), Hydrops, Incrassatio ossium.

Ad Secundam: Morbos a resorptione nimia solidorum et fluidorum sanorum; quorsum pertinent: Absorptio Bilis e vesicula fellea calculo obstructa, Absorptio Lactis in Puerperis (Depot du Lait), Absorptio Urinae secretae, Mollities ossium.

Ad Tertiam: Morbos a resorptione fluidorum morbidorum, v. c. Variolas, Syphilidem, Rabiem caninam, Febres ab Ichore cancroso, a pure absorpto.

Ad Quartam: Morbos a resorptione solidorum morbidorum, v. c. Scrophulas, Ventriculi erosionem, Erosionem ipsius Encephali.

Ad Quintam: Morbos a resorptione Substantiarum irritantium in corpore humano non generatarum, v. c. Absorptionem Spiritus Terbinthinae, Cantharidum, Mercurii, Arsenici, Pestilentiae, Virus venerei.

Minutius inquirendo tertiam inter et quintam Classem non sat notabile discrimen invenio, virus enim Rabiem caninam excitans in corpore humano non paratur, et vice versa Pestis virus in corpore nostro paratur, ut ob sidio Bredana luculenter docuit.

Clar. NUDOW *b)* vero vitia Systematis absorbentis in *tres* Classes distribuit:

Ad *Primam Classem* retulit: Cohesionem et Qualitatem vitiatam.

Ad *Secundam*: Quantitatem vitiatam.

Ad *Tertiam*: Motum humorum lymphaticorum vitiatum, v. c. inordinatum et retrogradum.

Hinc etiam ISENFLAMMIO *c)* non absolum videtur, torporem et atoniam Systematis absorbentis accusare in pluribus stagnationibus lymphaticis — neque prorsus inconcinnum, de Asphyxia eiusdem Systematis in variis morbis explicatu difficilibus loqui.

Morbosas affectiones systematis absorbentis Cl. MAANEN distinguit in *Communes* et *Proprias*.

Communes Affectiones considerat ~~in~~ quantum hocce Systema construitur.

1) *Per partes solidas*, hinc eius abundantia oritur rigiditas, defectu autem debilitas.

2) *Per partes solidas continentes*. Hinc nimis amplo hoc systemate oritur *εὐρυςμα, ἀναστομωσις, διαπνδσις*,

b) In Aphorismis ueber die Erkenntniß der Menschen Natur. Riga 1790. p. 59. et 60.

c) I. CH. ISENFLAMM Dissertatio de Absorptione sana, Erlangae 1791. Nota ad §. 19.

διαίρεσις: nimis angusto vero ἐμφρα-
ξις, στενοχωρία, θλίψις συνίσεις συμ-
φουσις.

- 3) *Per Partes solidas instrumentarias*
huc pertinent: continui solutio,
et connectio excedens.

Proprias Affectiones considerat in
quantum.

Vis contractilis huius systematis pec-
cat: excessu eius plethora, poly-
chylia cacochylia, contractio et
tandem induratio vasorum oritur;
defectu eius, corpus nutrimento
privatur, et lymphae crassities, *hypostasis*
obstructio vasorum absorbentium,
et motus lymphae inversus oritur.

Vita propria huius systematis peccat:
excessu eius oritur cacochymia,
concretio viscerum inter se, ancylo-
sis; defectu eius oritur *ex*tabes-
centia partium, fluxus coeliacus,
icterus, obesitas, hydrops, rachitis.

Vis assimilatrix peccat: excessu eius
oritur densitas et coagulabilitas
lymphae; defectu eius oritur, cru-
ditas humorum, rachitis, lues ve-
nerea, scrophulae.

Nisus formativus peccat et vitiosas
partium regenerationes infert.

VIII

Medicis autem ^{Doctis} eruditis, non tironibus
scribens, non solum praecipua Systematis ab-
sorbentis dogmata physiologica cognita ^{sup-}
pono, sed etiam ne nimia prolixitate taedium
eis parerem, studio omisi Morborum Defini-
tiones, Diagnoses, Symptomata, ^{causae et effectus} Causas et
Curaciones usitatas.

- §. 1. Inflam
§. 2. Erysip
§. 3. Defec
§. 4. Desq
§. 5. Supp
§. 6. Gan
§. 7. Febr
§. 8. Febr
§. 9. Pesti
§. 10. Vari
§. 11. Morb
§. 12. Petec
§. 13. Scarl
§. 14. Febr
§. 15. Arthr
§. 16. Catar
§. 17. Angi
§. 18. Dysc
§. 19. Chl
§. 20. Chl
§. 21. Sang
§. 22. Vas

CONSPECTUS
RERUM ORDINE SYSTEMATICO
EXPOSITUS.

- §. 1. Inflammatio.
- §. 2. Erysipelas.
- §. 3. Defatigatio Corporis.
- §. 4. Desquamatio Epidermidis. *cuticularis*
- §. 5. Suppuratio.
- §. 6. Gangraena et Sphacelus.
- §. 7. Febres intermittentes.
- §. 8. Febris Carcerum et Nosodochiorum.
- §. 9. Pestilentia.
- §. 10. Variolae.
- §. 11. Morbilli.
- §. 12. Petechiae.
- §. 13. Scarlatina.
- §. 14. Febris urticata.
- §. 15. Arthritis et Rheumatismus.
- §. 16. Catarrhus.
- §. 17. Angina.
- §. 18. Dysenteria.
- §. 19. Cholera.
- §. 20. Chymi Ecchymosis in Abdomen. *effusio*
- §. 21. Sanguis extravasatus. *vapor effusus*
- §. 22. Vasa absorbentia varicosa.

- §. 23. Vasa absorbentia obstructa, callosa, ossea.
 §. 24. Glandulae absorbentes tumidae et obstructae
 §. 25. Vermes in Glandulis absorbentibus.
 §. 26. ^{Ruptura} ~~Ruptura~~ ^{Vasorum} ~~Vasorum~~ absorbentium.
 §. 27. Vulnere ^{Vasorum} ~~Vasorum~~ absorbentium.
 §. 28. Venena.
 §. 29. Cantharides.
 §. 30. Rabies Canina.
 §. 31. Ictus Scorpionum.
 §. 32. Morsus Serpentum.
 §. 33. Virus Vesparum.
 §. 34. Punctio Culicum.
 §. 35. Malum Venereum.
 §. 36. Gonorrhoea a balneo tepido.
 §. 37. Scrophulae.
 §. 38. Rhachitis.
 §. 39. Scorbutus.
 §. 40. Tinea Capitis.
 §. 41. Plica polonica.
 §. 42. Elephantiasis.
 §. 43. Ulcera Crurum.
 §. 44. Carcinoma.
 §. 45. Icterus.
 §. 46. Scirrhus ^{liveris} Hepatis.
 §. 47. Morbi Lienis.
 §. 48. Hydrops.
 §. 49. Emphysema.
 §. 50. Empyema.
 §. 51. Atrophia.
 §. 52. Phthisis Pulmonum.
 §. 53. Sputum nigrum.
 §. 54. Malum Hypochondriacum.
 §. 55. Tabes.
 §. 56. Stillicidium Lacrymarum.

- §. 57. Cataracta.
 §. 58. Dentitio difficilis.
 §. 59. Hernia.
 §. 60. Cirsocele.
 §. 61. Callus [†]Ventriculi.
 §. 62. Diarrhoea.
 §. 63. Fluxus Coeliacus.
 §. 64. Lienteria.
 §. 65. Obstructio Alvi.
 §. 66. Diabetes.
 §. 67. Struma.
 §. 68. Steatoma.
 §. 69. Ossium Inflammatio.
 §. 70. Mollities [†]Ossium.
 §. 71. Claudicatio.
 §. 72. Cyphosis.
 §. 73. Anchylosis.
 §. 74. Hyperostosis.
 §. 75. Caries.
 §. 76. Necrosis Ossium.
 §. 77. Metastasis.
 §. 78. Coctio Materiae morbosae.
 §. 79. Partus siccus.
 §. 80. Febris Puerperarum.
 & 81 *Ancurisma*.

CONSPPECTUS
RERUM ORDINE ALPHABETICO
EXPOSITUS.

<i>Amblyopia. L.</i>			
<i>Amputatio. L.</i>			
<i>Aneurysma. S.</i>	Anchylosis	§.	73.
<i>Angina polytrufa. A.</i>	Angina	—	17.
<i>Apoplexia. C.</i>	Arthritis et Rheumatismus	—	15.
<i>Asphma. L.</i>	Atrophia	—	51.
	Callus Ventriculi	—	61.
	Cantharides	—	29.
	Carcinoma	—	44.
	Caries	—	75.
	Cataracta	—	57.
	Catarrhus	—	16.
	Cholera	—	19.
	Chymi Echymosis in Abdomen	—	20.
	Cirsocele	—	60.
	Clandicatio	—	71.
	Coctio Materiae morbosae	—	78.
	Cyphosis	—	72.
<i>Deolutio impedita</i>	Defatigatio Corporis	—	3.
	Dentitio difficilis	—	58.
	Desquamatio Epidermidis	—	4.

Diabetes
Diarrhoea
Dysenteria

Elephantiasis
Empyema
Erysipelas
Exanthema

Febres intermi
Febres Carceru
Febres Puerpe

Febres utricu
Fluxus Coelia

Gangraena
Glandulae
Gonorrhoea

Hernia

Hydrops
Hyperostosis

Icterus

Ictus Scorpi
Inflammatio

Lienteria

Malum Hy

Malum Ve

Metastasis

Nitro aqua. 30

XIII

Diabetes	§. 66.
Diarrhoea	— 62.
Dysenteria	— 18.

Elephantiasis	— 42.
Emphysema	— 49.
Empyema	— 50.
Erysipelas	— 2.
Exanthema	— 10.

Febres intermittentes	— 7.
Febris Carcerum et Nosodochiorum	— 8.
Febris Puerperarum	— 80.
Febris urticata	— 14.
Fluxus Coeliacus	— 63.

Gangraena	— 6.
Glandulae absorbentes tumidae et obstructae	— 24.
Gonorrhoea a balneo tepido	— 36.

Hernia	— 59.
Hydrops	— 48.
Hyperostosis	— 74.

Icterus	— 45.
Ictus Scorpionum	— 31.
Inflammatio	— 1.
— — — Ossium	— 69.

Lienteria	— 64.
-----------	-------

Malum Hypochondriacum	— 54.
Malum Venereum	— 35.
Metastasis	— 77.

Metu aquae. 30

XIV

<i>Infiamm. oss. spongiosa</i>	Miliaria	
<i>latens</i>	Mollities Ossium	§. 70.
	Morbi Lienis	— 47.
	Morbilli	— 11.
	Morsus Serpentum	— 32.
	Necrosis Ossium	— 76.
	Obstructio alvi	— 65.
<i>Ophthalmia. F.</i>	Ossium Inflammatio	— 69.
		<i>in oss. spongiosa</i>
	Partus Siccus	— 79.
	Pestilentia	— 9.
	Petechiae	— 12.
	Phthisis Pulmonum	— 52.
	Plica Polonica	— 41.
	Punctio Culicum	— 34.
	Rabies Canina	Melior aquae — 50.
	Rhachitis	— 38.
	Ruptura ^{Filio} Vasorum absorbentium	— 26.
	Sanguis ^{e vasis effusus} extravasatus	— 21.
	Scarlatina	— 13.
<i>Spiritus jecoris</i>	Scorbutus	— 39.
<i>Spiritus ventriculi B.</i>	Scrophulae	— 37.
	Sphacelus	— 6.
	Sputum nigrum	— 53.
	Steatoma	— 68.
	Stillicidium Lacrymarum	— 56.
	Struma	— 67.
	Suppuratio	— 5.

Tabes
Tinea Capiti
Torpor
Temperantes
Ulcers Crur
Varicel
Vasa absorbe
Vasa absorbe
Vasa absorbe
—
Venena
Vermes in G
Virus Vespar
Vulnera vaso

XV

Tabes	§. 55.
Tinea Capitis	— 40.
Torpor Systematis absorbentis	— 24.
<i>Tympanites</i>	
Ulcerā Crurum	— 45.
Variolae	— 10.
Vasa absorbentia obstructa, callosa, ossea	— 23.
Vasa absorbentia varicosa	— 22.
Vasa absorbentia rupta	— 26.
— — vulnerata	— 27.
Venena	— 28.
Vermes in Glandulis absorbentibus	— 25.
Virus Vesparum	— 33.
Vulnera vasorum absorbentium	— 27.

Fora. P.

IN

In ^{primi} ~~inter~~
internā ob
Systema pra
que inflamm
di a), ver
loco sangui
vasa ad
et occlusa
etiam salut
riam nimis
vel pure ad
Quodsi
promoveri
flammatione
et lymphae

a) Ingenios
absorbent
pedita ele
Tu. Da
ruli in
excitabant
batur ade
inflamm
Medical
secundo.

SUMMAR

INFLAMMATIO.

§. I.

In ^{omni} ~~quavis~~ Inflammatione \ Causa^{is} externa^{is} vel interna^{is} oborta, etiam Vasorum absorbentium Systema praeter sanguiferorum laborare, ^{et partem} ~~locum~~ ^{resistentem} ~~que~~ inflammatum minus ^{parum} ~~resorptioni aptum~~ red-di a), verosimile videtur; dum enim tali in loco sanguis vel vasa sua distendit, vel extra vasa adit, absorbentia vasa ~~ab eo~~ sanguine pressa et occlusa officio omnino fungi nequeunt, vel etiam salutarī profecto naturae conamine materiam nimis acrem recipere respuunt, donec sero vel pure admixto ista acrimonia minuatur.

Quodsi autem statuas, musculorum motu promoveri Lymphae fluxum, cessante per inflammationem ob dolorem musculorum mobilitate et lymphae cursum ibi turbari, necessarium est.

a) Ingeniose JOHN HUNTER locum inflammatum „a bad absorbent surface“ vocat. — De hac absorptione impedita eleganter egit HAASE Pag. 28.

TH. DAVISON filia viri varioloso imbuta brachio pueruli imponebat, quae inflammationem et suppurationem excitabant absque infectione, quam tamen postea experiebatur idem puerulus, manifesto argumento, superficiem inflammata male vel prorsus non absorbere. London Medical Journal, Volumine decimo, 1789. Articulus secundo.

Nihilominus tamen in quavis fere inflammatione plus minusve materiae morbidae in sanguinem absque sensibili noxa vehi, quotidiana experientia docet; et in me ipso saepius expertus sum.

Sic quoties in partibus inflammatis sanguis effusus deprehenditur, toties etiam absorbentia vasa harum partium lymph^a rubra et densior turgent, et glandulae eorum vasorum intensius rubent; Si vero sanguis non effusus, serum tantum densius, levi colore luteo tinctum vasa absorbentia replet b).

In puerperis die tertia plerumque vasa absorbentia Mammarum ad glandulas axillares tendentes a lacte inflammantur, intumescunt et tactu facile dignoscuntur c).

Ad inflammationis autem sic dictam discussionem vel resolutionem vasa absorbentia evidenter plurimum conferre, saepenumero vidi d); scilicet vasa absorbentia colore sanguineo notata, sub cute ludentia, in loco inflammato orta.

Sic in infantibus dentitione difficili laborantibus ob inflammationem gingivarum et processum alveolarium tument glandulae colli e).

*Christ. Sennar de Fabrica
de Empyemate Mediastini
anterioris feliciter curati.
Althofii 1796 4. p.*

b) MASCAGNI. Pag. 21. f

c) CRUIKSHANK in editione altera operis sui.

d) Hinc J. GARDINER. „The Lymphatics are the most powerfull agents in terminating Inflammations by Resolution“ — on the Gout London 1792. Pag. 223.

e) CRUIKSHANK Anatomy of the absorbent Vessels. Pag. 125. et 131. — Confer et Paragraphum nostram de Carie.

INFLAMMATIO.

Sic a vulneribus Natum et Haemorrhoidi-
bus sic dictis inflammatis tument glandulae in-
guinales f).

Sic in inflammatione Pedum prope tarsum
glandulas inguinales tumentes et inflammatas in
se ipso observavit VAN DEN BOSCH g).

Quin ipsa vasa absorbentia et eorum glandu-
las h), vel acritate fluidorum in nostro corpore
generatorum, vel miasmate morbozo quodam,
vel vulneratione i), vel venenis, inflammari
posse, inficiendum non est, quum irritabili-
tate gaudeant, et arterioli et venis manifeste
dotata appareant. Striarum rubrarum adinstar
tunc subcutanei trunci absorbentium saepe oculis
cernuntur, ut variis locis retuli. Sola enim
irritatione rubent, inflammantur, chordarum ad-
instar tenduntur, et tactu sentiuntur. Simulac
enim inflammantur, vasa absorbentia inflammatio
in telam cellulosa circumiacentem transit, ea-
que de causa facilius tactu dignoscuntur; pari
modo glandularum inflammatio ut notissimum
est, in telam cellulosa circumiacentem
transit k).

f) CRUIKSHANK. Pag. 118.

g) Theoretische und practische Bemerkungen ueber das
Muskelvermoege der Haargefaesse. Muenster 1786.
Pag. 60.

h) CRUIKSHANK. Pag. 26. — ASSALINI loco citato tres
casus fusius narrat.

i) Cfr. §. de vulneribus vasorum absorbentium.

k) J. ABERNETTY in egregiis suis surgical et physio-
logical Observations, Lond. 1793. p. 179.

Symptomata orthostidis ex
inflammatione vasa absorbentia
necesse. Finis apud HORN.
archiv f. pract. Med. 45. 1. 2.
1808.

Illos
fines nunc non tam
absorptioni quam gestioni
imitationi dedit. vasa
absorbentium quae in
tactu cutis quibusdam
corpore dispositionibus
tribuit. J. Hunter.
on the Blood. p. 276.

fere inflamma-
tione in sangui-
ne quotidiana ex-
piti expertus

inflammatis sangui-
ne absorbentia
et densiori
um intensius
us, serum
tinctum vasa

que vasa ab-
axillares ten-
escunt et tactu

dictam discus-
sionem eviden-
ter vidi d);
immo notata,
o orta.

icili laboran-
n et proees-
colli e).

sui.
ica are the most
nations by Reto-
Pag. 223.
nt Vestels. Pag.
um nostrum de

Ex leuori A laesione in cute frontis leuiori, simulac
non inflammatio oboriebatur, Vasa absorbentia striarum
 rubrarum adinstar ad angulum Oculi internum tendentia animadverti l). — A laesione
 in Collo leuiori vasa absorbentia pari modo ad glandulas subclaviculares tendentia. — A laesione
 in Pectore leuiori vasa absorbentia ad glandulas axillares. — A laesione in Abdomine leuiori
 pari modo ad glandulas inguinales vasa absorbentia tendentia vidi. — A laesione digiti minimi
 leuiori vasa absorbentia dorsi manus. — A laesione Pollicis vasa absorbentia Antibrachii laete
 rubentia pluries vidi. — Et quis non a panaritio glandulas axillares tumidas vidit?

Interdum etiam inflammatio vasorum absorbentium non solum versus cor ascendit, sed etiam infra locum laesum descendit.

*Ergo de vasorum absorbentium
 in progressu
 inflammatione testat. J. Feoriar*

(H. & L. Vol. 5^{to}) opinatur aliam
 acutam, aliam lentam esse. Hanc
 inflammationem magis sympathicam
 esse quam primariam monet Ch. Bell. *System of Dissections*. Parte IV^{ta} p. 109.

Vasa absorbentia inflammantur

frictione nimia cutis Listerford apud

Charl. Bell. System of Dissections Parte quarta edit. secunda. Edinb. 1800 pag 109

1) Vidit pari modo post grave capitis vulnus remanentes
 in collo et prope aures glandularum tumescencias, facile
 tamen sanabiles. *Korrum* loco citato, Tomo primo,
 Pag. 278.

*In inflammatione Vasa cephalica. q^{ue} supra claviculam sita sunt tumida et
 horrida Joseph. Hadgson. on Dissection of Arteries and Veins
 London 1815. pag 514.*

Eiam infla
 bentia corrip
 non atas,
 vili a)

Liceat lo
 DE KANILFE
 memoria prob
 ex observatio
 bus inferiorib
 femoris glan
 adatas, an
 atque intuz
 ac cervicales
 immineat.

Notum p
 cutis dolori,
 inflammationi
 neis morbis
 glandularum l
 secto et labor
 sitae sunt. Qu

a) In inflama
 dula pone
 tumores vid
 b) Inflatione
 pite de Ery
 q^{ue}dam.

et progressum noscunt, paene omnes sibi persuadent, puris, ichoris aut alius noxii humoris aliquid a Venis lymphaticis absorberi, deferrique ad glandulas conglobatas, ad quas progrediuntur, indeque has tumere ac dolere. Recte hi quidem Sed ubi glandulae prius tument ac dolent, quam humor ullus ab aliqua parte subpeditari possit; undenam earum tumorem ac dolorem deduxeris? An aliquid per arterias ad glandulas, antequam in cutem pellatur, deferitur, quo ipsae intumescunt?

Minime gentium! sed a miasmate irritante, quod interdum vix percipitur nostris sensibus, prouti inprimis in Capite de Variolis videbimus, ubi eadem phaenomena adnotavi fusiusque exposui.

primary cause of an erysipelatous inflammation attending wounds and ulcers on the legs there will be a considerable inflammation along the course of the lymphatics of the leg and thigh, quite up to the groin, where the lymphatic glands will inflame and sometimes suppurate
Many preceding abscesses appear to be suppurations of the lymphatics.

*See Whately on Wounds & Ulcers of the Legs
 London 1799. p. 112-114.*

DEFATIGATIO CORPORIS.

§. III.

Partus labores, quinimo iter pedestre nimis protractum, tumores glandularum inguinalium excitant a); quod non mirandum; quippe in istis negotiis plantae pedum inflammantur, unde isti tumores oriuntur, prouti iam superius de inflammatione verba faciens adnotavi.

a) BERTRANDI, Von Geschwuelsten.

DESQ

In facie ma
 guntur, epide
 quae vestimen

Saepissim
 recedit, dum
 inter cutim
 has partes se
 strunt, qu
 potest, quin
 tio locum

Simili
 exfoliation

a) Petr. Ja
 L. B. 17

Cuticula
DESQUAMATIO EPIDERMIDIS.

§. IV.

In facie ^{et} manibusque, quae vestibis non te-
guntur, ^{epidermis} epidermis secedit pariter ac in partibus
quae vestimentorum frictione exponuntur.

Saepissime post morbos acutos ^{epidermis} epidermis
secedit, dum ^{scilicet} vasa absorbentia illud, quod
inter cutim et ^{epidermidem} epidermidem medium est, atque
has partes secum invicem nequit, absorbendo de-
struunt, quo destructo nexu non aliter fieri
potest, quin ^{epidermidis} epidermidis secessus seu desquama-
tio locum habeat.

Simili ergo modo ac in necroseos et sic dictae
exfoliationis ossium negotio natura procedit a).

- a) Petr. JAC. VAN MAANEN de Absorbtione solidorum.
L. B. 1790. Sect. 3.

SUPPURATIO.

§. V.

Quotidie videmus, in supurationibus, quovis corporis nostri loco et quovis modo ortis a), Vasa absorbentia pus deferre ad glandulas inter eum locum et cor sitas, glandularumque istarum tumorem excitare.

Adeo luculenter hoc nonnunquam reperitur, ut vasa pure ipso vel puris tenuiore b) parte turgida adinstar funium vel chordarum nodosarum tactu explorari, vel ipsis oculis c) sub cute ludentia cerni, vel ab aegris dolore percipi, vel demum cultro post mortem pure referta aperte demonstrari possunt.

Ut enim, quae de Variolis, Empyemate, Carcinomatibus, aliisque Morbis speciatim attuli, taceam, in Cerebri exulceratione d), pro-

- a) In locis exulceratis vasa absorbentia adinstar bombycis rodentis agere opinatur *JOHN HUNTER* on the Venereal Disease. London 1786.
- b) *S. G. BRUGMANN*s Dissertatio de Puogenia. Groningae 1785. pluribus locis asserit, tenuiorem puris partem absorberi a vasis absorbentibus. — Non est, quod moneam, quod reliquum puris est, exinde spissius reddi.
- c) Coram video feminam, in qua ab ulcere scrophuloso orientia Vasa absorbentia, non modo dolore et tactu ad instar funiculorum nodosorum, sed etiam ob rubedinem oculis manifesto cernuntur.
- d) Notissimum est Regis Angliae Georgii Tertii exemplum, qui oborto ulcere in cerebro glandularum iugularium demum abscessum felicissimo eventu expertus est.

uti fere in omni morbo ^{capite} Encephali e), in Carcinomate Oculi, in abscessu Buccarum, in Carcinomate Labii inferioris, in Carcinomate Linguae, in ulceribus ^{gules} Faucium, in ulceribus ^{submaxillae} Oesophagi, in ulceribus ^{laryngis} Laryngis saepissime vidi, glandulas in Colli lateribus sitas insigniter tumentes.

Sic in me ipso ^{faciem} pluries observavi, quoties fonticulus, in medio Collo pone Musculum Cleidomastoidem situs, accedente irritatione et inflammatione paulo maiori, pus copiosius funderet, glandulas sub clavicula eius lateris sitas insigniter dolere et tumere; manifesto argumento: pus a vasis absorbentibus ad glandulas istas revera delatum fuisse.

In exulcerationibus ³ Mammae ² quibuscunque ^{omnibus} glandulas axillares tumere, vulgo constat.

A pure inter phalangem primam et secundam digiti indicis, in latere volari haerente, glandulam in medio brachio ^{humeri} f) tumentem vidi.

In me ipso, dum Infantem, pustulis nodisque viridem materiem continentibus obsessum, lustrarem, pollicis vulnus, quod adustione neglecta ortum erat, sanescens recruduit, glandulasque axillares ^{prope} tumentes et dolentes reddidit g).

e) CRUIKSHANK. Pag. 125.

f) Hanc glandulam delineat HEWSON, Volumine secundo. Tab. VI. d. et MASCAGNI. 24. 25. 26.

g) Similia observavit A. BRAMBILLA; scilicet: a laesione digiti indicis per costam cadaveris et resorpta

In ulceribus

non sunt

Garnier 1800
2. pag. 131.

jam glandulas
nonum pefilari
applicato

apud Schroder

188.

se ipsum
mactate
istam non
infectione

nihil
vult

noto in
ccij. Lond. 1805
Ling. 1805.

peffilantiam
observant

infectione
subigendo
abscessum

Hist. medicale
1802

216.

non caracten

Et quis non glandularum axillarium tumorem a panaritio saepius ^{est qui} observavit?

Eadem prorsus in extremitate inferiore contingunt. Quoties non glandulae inguinales a pure absorpto post amputationem Cruris vel Femoris tument h)? Quoties non glandulae

*Quamquam illi Dupuytren
visu ab amplitudine
glandulae corvi*

prope abscissum in femore

pure turgentia manifeste

invenit, non inferior

Magnum adhuc

dentat an illo vase

abscissum pure ipsius

abscessus repleta

invenit an non

potius illud per

ab inflammatione

resorptum ab

ipsum provenit?

** Physiologia*

Paris. 1817.

Tom. 2. p. 195.

inguinales a pure in abscessibus pedis absorpto tument? Eiusmodi autem tumores glandularum, sponte iterum sanescente ulcere vel suppuratione cessante, evanescent; immerito enim scirrhusae tales glandulae habentur. — Mentionem hic tantummodo fecisse sufficiat bubonum aliorumque abscessuum clausorum sponte vel artis ope resolutorum. Saepe saepius abscessus largam copiosamque suppurationem minitantes sponte evanescere mecum viderunt quam plurimi i).

Quocirca monendi mihi videntur Medici, ne eiusmodi glandularum tumores a pure bono et laudabili abortos pertimescant, et chirurgiam necessariam admovere vel omnino negligant k),

materia tetanum et exulcerationem glandulae axillaris. in Abhandlungen der K. K. Josephinischen Militair-Academie zu Wien. Tomo Primo. Pag 90.

h) In homine, cui pes infra genu ablatus erat, post mortem tumidas glandulas, tum in femore tum iuxta vasa iliaca sitas invenit. — WILLIAM HUNTER Medical Commentaries. Pag. 53. Saepenumero inprimis in hoc bello gallico eadem vidi.

i) In glandulis post inflammationem inclusum pus resorberi testatur ASSALINI. Pag. 39.

k) Novi chirurgum illustrem, qui ex suppuratione pedis ortos glandularum inguinalium tumores adeo pertimesce-

vel aegros glan
pervacanea cru

Plas m
feliciter squi
parum nudis

Eadem pro
intermarum ani
cavo Theoraeis
costales et ster
Vidi a pure i
tento glandul
das n). — In
Phthisicorum

Sic glan
conspicuae

bat, ut
ret. —
tro autem
matici, q
Pag. 66.

l) Pari mo
litionem
tumidas e
cessu.

Drass
cacothet
dulae axi
res non u
tus com

m) In Ca

n) J. H.

num 17

o) Condi

vel aegros glandularum istarum ^{resectione} extirpatione sup-
pervacanea crucient.

Plus una vice Carcinoma Mammae cultro
feliciter sapavi relictis glandulis axillaribus non
parum tumidis l).

Eadem prorsus et in suppurationibus partium
internarum animadvertuntur. — Vidi a pure in
cavo Thoracis sinistro ^{non affluo} stagnante glandulas inter-
costales et sternales eiusdem lateris tumidas m). —
Vidi a pure in ipsa Pulmonum substantia con-
tento glandulas bronchiales absorbentes tumi-
das n). — In Vasis absorbentibus pulmonalibus
Phthisicorum pus verum inventum est o).

Sic glandulae circa ^{hepar} Hepar sitae, alias vix
conspicuae, ingentes visae sunt. — Vidi ab exul-

bat, ut eam ob causam amputationem instituere renue-
ret. — Moriebatur homo testiculi cancro, quem cul-
tro auferre renuebant chirurgi ob tumorem funiculi sper-
matici, qui sanus post mortem reperiebatur. ASSALINI
Pag. 66.

- l) Pari modo et LOUIS teste ASSALINI Pag. 63. post ab-
lationem mammae carcinomatosae glandulas axillares
tumidas cultro intactas derelinquebat fausto cum suc-
cessu.

DESSAULT teste eodem ASSALINI Pag. 62. ob ulcus
cacoëthes audacter brachium amputavit, quamvis glan-
dulae axillares tumerent, persuasum habens, eos tumo-
res non nisi a pure resorpto ortos fuisse; nec prosper even-
tus eum fefellit.

- m) In Capite de Empyemate fusius casum narravi.
n) J. BLEULAND. Icon Hepatis, etc. Traiecti ad Rhe-
num 1789. Pag. 6.
o) Confer Caput de Phthisi Pulmonum.

t jam glandulae
numm. pefilae
e applicatur

opus Schreud
v. 38.

Scipion
mucronate
clat. man
luctione 10

videtur
uato

ueto in
ccij. Lond. 1803
Lij. 1805.

peffidentiam
obferunt

ationibus
fabrigando
accelerari

NH. medialis
802.

216.

car. caracter

cerato ovario dextro vasa ^{ab}sorbentia alae vesper-
tilionum dextrae pure referta p).

Nullus etiam dubito, quin analogo partium
externarum modo saepenumero abscessus par-
tium internarum pure resorpto per vasa ²absor-
bentia ~~nostra~~ sanentur.

p) Viderunt mecum SCHUMLANSKI et WEIDMANN;

GANGRAENA ET SPHACELUS.

§. VI.

Nata gangraena vasa absorbentia ad agendum
compelluntur; absorbtio ^{etc} incipit ^{us} et ^{ut} absorbentur,
quidem illae ^{absorbentur} vivae partes quae mortuis ^{proprie} directe
adiacent; ^{absorbentur} eschara hinc separatur et decidit a).

a) P. G. van MAANEN de absorptione solidorum. L.
B. 1794. p. 84.

"The absorbents detach the ~~living~~ dead and living parts from
each other" Edw Kentish. on Burns Lond 1797. p. 143.

FEBRES INTERMITTENTES.

§. VII.

Miasma febrile per Vasa absorbentia Corpus intrare, profecto verosimillimum a).

Post *Febres intermittentes*, ^{in primis} autumnales, vel ^{maxima veru} suppressas vel male curatas, saepissime infarctus Viscerum abdominalium, et in primis quoque glandularum mesentericarum ^{ta mesen} obstructions, ventris tumorem efficientes, remanere, inter omnes constat.

Generatim observat KORTUM b), e quo haec mutuavimus, morbis, ex catarrhali et gastrico caractere complicatis, facillime glandularum tumores adiungi.

a) TH. EVANS. Dissertatio Observationes de Febre Edinburgi 1790. Sedem febrium intermittantium in glandulis absorbentibus haerere posse, autumat BASILEWITSCH; et ab hoc miasmate glandulas inguinales in tumorem tolli.

b) De Vitio scrofuloso Tomo Primo p. 260. et 262.

"we have agues from the induration of mesenteric glands" Hunter on the blood p. 411.

+ jam glandulae
innumerae
e applicati

1/3
1/3
i apud Schraud
p. 38.

scilicet
miasmate
utroque non
fatione
mider
masto

procto in
ecij. Lond. 1803
Lond. 1803.

pepiliation
observant
notionibus
fingendo
"accelerari
Nip. medice
1803

1/3
1/3
sicut caracit

FEBRIS CARCERUM

ET

NOSODOCHIORUM.

§. VIII.

Expressis verbis monuerunt ^uViri clarissimi a), in ista febre non parotides glandulas salivales, sed solummodo glandulas ^{abf}sorbentes vicinas in inflammationem et suppurationem rapi, interdum absque ulla praevia ^{perforata}indispositione.

Quis non videt, quanti momenti sit ista adnotatio, tam insigne discrimen inter sedem veram et supposititiam morbi demonstrans.

- a) Nominasse sufficiat J. PRINOLE. On the Diseases of an Army, Parte tertia, Capite septimo, Pag. 298.

per unguem
a los mado
de iguantes placo
particularmente agudas

PES

Horrendum P
Vas absorbentia
nihil aliud sunt
malae, utpote
morbum videri
Mali primum
monstrant.

Hinc etiam
quod demum
dolor in pube
Hinc n
colli et axi
rum et ing
tes, a q
oritur,

et contaminat
taminat m

Vibices

aliud, nisi E
factos, esse.

Hinc liq

bubores in

Post co

pus ingredi

a) Joann
Jenae 172

Hinc et alio
determinat
in hunc modum

15

§. IX.

negat in afectione imaginariis
explicationem

the glandular
common peptilar
the application

4 apud Schraud
p. 38.

paterem iam. P. ipsum
 sub prima nobi. magnate
 invaginare onusta fritione. ulata non
 subonar in invaginencia
 qui intra Passerem rearto
 horum fritione as
 magnitudinem ori
 gallinacei: invagin. par d. in
occ. Lond. 1804

Bubonis suppuratus, Lixy. 1805.
 inaequaliter firmus, ollen-
 go, et capsulata
 bubo inflammatus,
 fronschus purifici,
 roffat, sedimato
 fuc del suppuratione
 et digito impressionem.

penitentiam
observant.
notantibus
fabrigando
= accelerari
Hisp. medice
1802

et 216.
voir caractère

A. Ant. Canestrini. notigibber
de Piffero Ragazzi fuliginea
Salaffurogi 1798 " aculearia
egregia id. de Nip. meridiale
comp. avast. 1862

Manget traite de la Peste (sans L'apocryphe)
Vat. Lat. 2. p. 136,

Hibentur et alius affliguntur, eo quod non prope axillum
abdominali, sed profundius in pectus sita sint supra pectorem musculum
in hirsute femore jacent.

*But in se ipso in piliorem passim aliquem effectum infertur
Gelganetter tulle Aspalini p. 22. l. v.*

PESTILENTIA.

17

quamvis non ignorem, MACKENZIE observasse,
non semel, sed vel duodecima ^{et} vice Peste correptum
fuisse eundem hominem.

Secundum experimenta, a DEIDIER i) in
Peste Masiliensi 1721. instituta, Venenum pesti-
lentielle ore sumptum non noxium fuit, pericu-
losum autem sanguini admixtum, prouti iamiam
indicavi.

Neque improbabile, subtilissimum Pestis ve-
nenum putrefaciens omnia, destructis minimis
Vasis, tam subitam mortem inferre k). —
Partem enim Corporis, quam inquinat, subito
destruit, anthracemque excitat l).

Hinc fuga aut omni commercio cum alio
sublato Pestis evitatur.

Hinc obvelatione et inunctione cum oleo m)
forsan praecaveri posse, non improbabile videtur;
cum experimentis SAMOILOWITZII constet,
ipsum pus peste laborantium cuti per linteum
carptum adplicatum, sufficere ad morbum ex-
citandum.

Experiences de frictions glaciales pour la guérison
de la Peste. Paris 1781. — Eiusdem Memoire sur l'In-
oculation de la Peste, à Strasbourg 1781.

i) Philosophical Transactions abridged. Vol. VII. Pag. 3.
165. et 168.

k) G. van SWIETEN Commentaria in BOERHAAVE. Tomo
primo, p. 124.

l) Van SWIETEN l. c. Tomo primo, Pag. 748.

m) CRUIKSHANK Anatomy of the absorbent Vessels.

Pag. 114. in Versione germanica p. 109. — ASSALINI
in editione gallica Pag. 137.

SÖMMERRING DE MORBIS.

B

*Altero die tunc jam glandulae
inguinales si venenum pestilan-
tiale per se applicetur*

*Bulag apud Schraud
Vol. II. p. 38.*

*St. White scilicet in miasmata
pestilentialia inoculata, non
modo per se infertur, sed
inquinans, bubonibus
multatum die quarto
moriatur.*

*Will. Wittmann Travelle in
Turckij. Lond. 1805.
überst. u. Berghen Litz. 1805.*

*unctionibus olei olivarum pestilentiam
arceri Baldus observant.*

*non arceri si per unctionibus
in corpore fixanda
sunt, multum accelerari*

*Gelganetter pag. 26. Hist. médicale
de l'armée d'Orient. Paris 1802.*

et Pagnat p. 188 et 216.

*par les fèvres se mouvant caracté-
risant par son 1804.*

Hinc remedia antiseptica topica non contemnenda, v. c. Acetum, Camphora, Acidum minerale, Glacies, Alcali causticum dilutum.

*Bubones now and then give rise to
buboes, for it frequently happens
that when the former appear the
skin, the glands of the axilla swell,
these have been observed to be less
painful than primary buboes,
and they disappear when*

*the carbuncles come
to a favourable
suppuration, which is
not the case with primary
buboes. These lymphatic
buboes, as they have
been termed, are also observed,
but much more rarely,
in the arria, when the carbuncles
appear on the thigh, leg, or
foot.*

*Phillips Wilson on the
febrile diseases. Vol. II.
p. 497.*

Quae circa ^{Carbunculos} Anthraces monenda essent, potius ad Gangraenam et Sphacelum pertinent.

Peragi autem Anthracis separationem ope vasorum absorbentium non est, quod dubitem; quum ^{saepius} ~~multoties~~ etiam in me ipso cutis Sphacelo corruptam partem, verum Anthracem ergo, istis separari viderim a parte sana. Suppuratione enim oborta vasorum ^{absorbentium} truncos pure plenos, et tactu et dolore, quin imo ipsis oculis distincte animadverti.

Autore EUSEBIO VALLI n) teste autopte illi qui secunda vice a pestilentia corripuntur, vix aliud symptoma eius experiuntur quam tumorem glandulae absorbentis, minime periculosum.

n) Experiments on animal Electricity. London 1795
Pag. 287.

*Descriptionem bubonis pestilentialis vide apud J. Jones. Transacti,
one of Physicians of Philadelphia Vol. I. p. 1793.*

*Jam Monget vero et Benard annotant potius glandulas inguinales
inferiores five femorales quam inguinales ^{superiores five} ~~in~~ ^{vires} pestilentiali tumorem tolli; facile
hinc diagnosi posse a re vulgari bubone venereo.*

*Frans von Schraud Geschichte des Pest in Sirmien. in den Jahren 1795 & 1796
Vösl. 1801. 600*

Koseleij on Leger.

VARIOLAE.

§. X.

Virus variolosum per vasa absorbentia, nec ulla alia via a), corpus humanum ingredi, insitio vel inoculatio sic dicta huius morbi adeo luculenter demonstrat, ut ulterius ea de re omnino dubitari nequeat.

Virus variolosum enim, vel per digitos, vel in manu, vel iuxta inferiorem ³insertionem Musculi deltoidei, quavis Insitionis methodo applicatum, saepissime glandulas ^{axillares} axillares b), ^{inguinales} in Pedē applicatum glandulas ^{inguinales} inguinales c), ^{dolorem} dolorem ^{tumorem} tumorem ^{ponderis} ponderis ^{sensationem} sensationem excitat, vel in ipsam suppurationem ^{glandularum} rapit d).

Neque dubium est, methodum Insitionis Sinensium, qua gossypium miasmate varioloso imbutum, naribus intruditur, glandularum iugularium dolorem excitare. *proximis cum*

Meo hanc methodum retinere videtur.

- a) CHRISTOPHORUS LUDOVICUS HOFMANN. Von den Pocken. Münster 1770. 8. cuius circa huius morbi historiam et curationem immortalia profecto sunt merita. — Eadem expressis verbis confirmat in Beantwortung der Einwürfe von H. UNZER. Münster 1781. §. 483.
- b) Idem HOFMANN. Von den Pocken, zweiter Theil. 1789. §. 175. et 456. — Eodem redeunt et verba NICOLAI ROSENSTEIN von Kinderkrankheiten. Goetting 1774. Capite decimo tertio. Pag. 266.
- c) C. L. HOFMANN. Loco citato. §. 152. Pag. 69.
- d) C. L. HOFMANN. Loco citato. Tomo secundo. Pag. 459.

Et factis comperit est per variolosum lacte aliave liquida, deloque opulenta exspecta et degentium praeferre frontes, facies variolas

Stanni p. 24.

Dolor autem harum glandularum plerumque iam die tertio oritur, et ad diem sextum nonnunquam cum tumore augetur, ante ullum febris vel eruptionis Indicium, manifesto argumento: Virus variolosum per vasa absorbentia in has glandulas delatum earum dolorem et tumorem excitare.

Curatione rite adhibita, etiam ante ullam febrim iste dolor et tumor evanescere, prouti et omnino abesse solet, ut multoties in Infantibus et Adolescentulis, insitione a me instituta, observavi.

Recte hinc concluditur: Virus variolosum Corpus nostrum subiisse, simulac insitione administrata illae glandulae vel dolent vel intumescunt e), quas Virus variolosum ^{sub}transire debet, ut in sanguinem pervenire possit.

In glandulis ipsis vero doloris sedem haerere, nec tantummodo Nervos axillares ^{ex}consensualiter

e) Principes Medici in eo uno ore conveniunt; v. c. Tissot. Avis au peuple sur la santé. Quatrième Edition. Paris 1770. — Versio germanica Mannheimii 1772. Pag. 586. — Certum esse signum asserit, neque se reminisci, unquam hunc dolorem glandulae adfuisse ^{fieri}absque insequente eruptione Variolarum, quamquam non semper intumescant glandulae; quum vero intumescant, certissime erumpunt Variolae.

Pari modo et PETRUS CAMPER in Dissertatione de Emolumentis et optima methodo Insitionis Variolarum. Groningae 1774, a die tertio ad usque quintum hunc dolorem auctum vidit.

Manifeste, inquit ISENFLAM de Absorptione morbosa §. 12. in variolis systema lymphaticum primum addici constat.

Hofmann l. c. Hufeland. u. Sclater Kort tenten 1798 p. 20

dolere *f*), crederem; quum certum sit, plures ramulos transire glandulas, qui vel irritatione miasmatis variolosi irritati, vel a tumore, irritationis istius effectu, pressi dolent.

Hinc intelligitur hodie, cur vere dixerit MEAD. „Iis, qui tumoribus glandularum ex te-
„naci lymphæ laborabant, morbum variolosum uti-
„lem fuisse.“ — Accedente enim novo et for-
tiori stimulo virus variolosi, lentor huius Syste-
matis adeo tollebatur, ut inveteratae stases in
glandulis depulsae evanescerent.

Adtrahi autem in corpus miasma variolosum etiam per aërem posse, ibique pulmonibus male affectis, glandulas bronchiales in tumorem, inflammationem et suppurationem *capere*, vel in stomachum depelli cum cibis, et ea via corpus invadere, probabile videtur.

Idem miasma in cutis pustulis confectum vasa *absorbentia* pustulis eripiunt, iterumque *massae* sanguinis tradunt, ut demum per pulmones exhaletur.

Quodsi Miasma variolosum in sanguinem e pustulis per vasa absorbentia receptum, et ad glandulas delatum, diutius in glandulis haeret, in tumorem quinimo et suppurationem easdem *vertit*, morbo reliquo iam superato.

f) PETRUS CAMPER, loco citato, p. 109. ita et COORMANNS in Neurologiæ, prima editione. Ipsi autem hi Viri abrogarunt novissimis temporibus hanc opinionem; ut patet e nova editione Neurologiæ-Francu-
querae 1789.

form. secunda
Quodsi Miasma variolosum in sanguinem per vasa absorbentia e pustulis ^{deletum} receptum, ^{et} apto loco, id est, per pulmones eliminatur, nimia *vera* quantitate peccat, Febrim sic dictam secundariam excitat g), quinimo vera peripneumonia necat.

Quodsi autem idem miasma variolosum, e pustulis in sanguinem ^{deletum} receptum, non apto loco eliminatur, sed ad alia loca abeat, Nervos prehendit Convulsionibus mortiferis. h).

Suppurationem autem glandularum post Variolas melius cortice peruviano et similibus remediis, quam purgantibus et debilitantibus, sanari, experientia docuit — etiam, ni me omnia fallunt, applicationem Mercurii topicam profuisse mihi visus sum.

*non etiam hoc haerere
videtur variolosum in ipso
loco et est in cute*

Etiam Virus vel Miasma variolosum in loco ipso, id est, cute haerere vel parari, praeter alia

g) Consentientem mecum invenio JOHN GARDINER, On the Gout, London 1792. Pag. 227. In the Small Pox the morbid matter is carried again into the Circulation and produces a secondary Fever — ROBERT WALKER vero opinatur; non a resorpto pure oriri febrim secundariam, sed a materia morbida in sanguine retenta.

Minus recte vero intelligo, quae HAASE, loco citato, Pag. 9. habet, scilicet: „Variolas superatas tumores glandularum Colli sequuntur, sine dubio fomes variolosus in contextu celluloso sub cute contentus per vasa absorbentia resorbetur, et ad glandulas defertur, unde morbo iamiam superato inflammatio et suppuratio non parum molestiae faciunt, quum vasa sanguifera ab obstructis lymphaticis irritantur et ad inflammationem evocantur.

h) Dom. COTENNI. De Sedibus Variolarum. Neapoli 1775. fere similia docet, §. 19.

^{probat} et haec suadent: Novi Medicos non incelebres i), qui Variolis defunctorum corporum scrutatione insitionibusque occupati, plus tertia vice in manibus a miasmate varioloso inquinatis, unius vel alterius pustulae perfecte variolosae eruptionem experti sunt. Pari modo nutrices infantibus variolosam faciem vel mammam admoventes pustulis iisdem locis mulctantur. Novi virginem dudum variolas passam, quae variolis laborantem amicum exosculando varioloso miasmate ita denuo adficiebatur, ut variola in labio oborta solitum pustulae variolosae decursum teneret. Hisce in casibus vix verosimile videtur, totam massam sanguinis a miasmate infectam fuisse, illudque miasma iisdem locis evomuisse, quibus acceperant.

„In morbis exanthematicis“ — Inquit ISEN-
FLAMM k) — „habitus vasculorum absorbentium
„cutaneorum saepe in censum venit. Video in Puero
„sexenni, Variolis non quidem vere confluenti-
„bus, sed valde confertis decumbente, in utro-
„que crure supra genu, in ea ipsa regione, ubi
„periscelides adplicari solent, unam solam va-
„riolam confluentem erupisse, et in suppuratio-
„nem abiisse, sic, ut crusta exsiccata et detracta

i) *Wrisberg* in Novis Commentariis Goettingensibus, Tomo quinto — *Camper* loco citato — item (*Osiander*) in Goettingsche gelehrte Anzeigen 1793. Stück 115. *Fordyce* in Medical Transactions 1793. in se ipso pluries instituit insitiones variolarum.

k) Dissertatio De Absorptione morbosa. Pag. 50.

*Comm. op. populi exanthemati-
ci, adeo, ut conflatae et
prostatu darent.*

„verum periscelum exhiberet. An forte taenio-
„lae arctius constrictae quidquam in vasculis cu-
„taneis mutarunt? “

Profecto cutem densiorem reddiderunt; cu-
tem densiorem autem peius affici, cute laxiore,
in Variolis animadverti.

De metastasi variolosa in paragrapho de
Metastasi quaedam attuli.

Variolae vaccinae

P. finck

MORBILLI.

§. XI.

Miasma morbillorum pari modo ac Variolas⁵,
vel effluviis aegrorum, vel rerum contaminata-
rum contactu, vel insitione a) cum sanis com-
municatur, vasa sorbentia ~~nostra~~ intrat, oculis,
naso, cuteque male adfectis iterum sanguini, eo-
rum vasorum absorbentium ope, absque mani-
festa glandularum adfectione, redditur, ut de-
mum partim per pulmones exhaletur, partim per
alvum eiiciatur.

Et quidem Morbillos, ^{prospertum} inprimis, ni in ulti-
mo stadio debitum ^{a. cura} administretur regimen, ma-
xime, si admittatur refrigerium, haud raro ~~omnis~~
generis morbos ^{vari} chronicos, et inter hos quoque
glandularum tumores ^{bu} excipere, constat; non

Hughes account of the malignant Measles at Plymouth. in 1745.

Watson in Medical Obs.
Vol. IV^{to}

a) Confer Opus classicum: ROSENSTEIN. De Morbis in-
fantum. Capite decimo quarto. et GIRTANNERI opus.

tamen tale
observatur.
ris paribus
Interim, si
lympham pot
symptomati
concomitant
bitur, illius
phatico obse

Quod v
recte monetur
losi infectur
chus adligat
nicare. A
pure imbu
saliva,
bus, at
corpore.
Hinc
aut imper
dicatis sue
dularum t

Inven
mesenteric
to, System
morbo lab

b) Korr
c) De
d) Al
burg
e) Farn

tamen tale quid adeo frequenter post morbillos observatur, quam post variolas, hae enim ceteris paribus, morbum longe graviores constituunt. Interim, si cogitemus, morbillosus virus in lympham potissimum dominari, id quod satis ex symptomatibus catarrhalibus morbillos constanter concomitantibus apparet, mirum sane non videbitur, illius quandoque reliquias in systemate lymphatico observari b).

Quod vero Insitionem istius morbi adinet, recte monetur c), Gossypium sanguine morbillosi infectum etiam incisa prius cute nudis brachiis adligatum contagionem aequo certo communicare. Alii praeferunt insitionem per lanam pure imbutam d); Alii sanguinis loco utuntur saliva, aut lacrymis tempore criseos stillantibus, aut squamulis decidentibus ab aegrorum corpore.

Hinc inter morbos, qui morbillis malignis, aut imperfecte solutis, sive, ut aiunt, male iudicatis succedunt, referuntur a MORTONO glandularum tumores.

Inveniuntur enim post mortem glandulae mesentericae mole auctae e), manifesto argumento, Systema vasorum absorbentium etiam in hoc morbo laborare.

b) KORTUM. Tomo primo. Pag. 257.

c) BUSERIUS DE KANILFELD. l. c.

d) ALEXANDER MONRO. In Praelectionibus 1778. Edinburgi habitis.

e) FRIDERICUS HOFMANN. De Febris. *Philipp Willer on Febrile Diaper Vol. 2.*

*nam exyptian
stomach
virescent
H. L. c. 59.*

*novissimis etiam
temporibus fuerit
e pustulis infecti
omni infectu
Lab. Willan. (ed. 2)
p. 219.*

Mirifice hinc Camphora, quae simili modo per pulmones redditur, prodest; dum enim miasma morbillosum sanguini admixtum per pulmones comitatur, ulteriorem miasmatis acridinem vi sua antiseptica arcere videtur.

Si autem nimia quantitate istud miasma sanguini redditur, febrim secundam f) excitat, quae tempestivo Camphorae usu vitatur.

Hinc idem miasma morbillorum, diutius in glandula quadam retentum, interdum morbum recrudescere facit g), dum scilicet per vasa absorbentia in sanguinem reducitur.

Glandularum autem tumores, post Variolas et Morbillos remanentes, absque ulla concurrente causa non nisi rarissime fieri, recte censet KORTUM.

f) JOHN GARDINER. On the Gout. pag. 227.

g) FRANCIS HOME. Medical Facts and Experiments. Edinburgh 1759. Pag. 250.

P E T E C H I A E.

§. XII.

Cum absque suppuratione atque desquamatione, ut cuius notum est, evanescent Petechiae, sanguinis quod in cutis cellulas effusum erat, vasorum ab sorbentium genere resorberi, probabile videtur, analogo fere modo ac de Echymosis sive san-

*Variolae
v. finis*

*Hughes acc.
Wolff in oha.
Vol. IV.*

PETECHIAE.

27

ginis maioribus effusionibus et stagnationibus fusius diximus.

Memoratu digna sunt Experimenta satis periculosa, quae circa contagionis modum in febre petechiis iuncta instituta sunt, quamvis rem adhuc non solvant.

Petechias enim, insitione instituta, non communicari, iam M. STOLL a) annotaverat.

CL. KRAUS vero cum socio ANDRÉ gravissime febre putrida decumbentium halitum sat diu exceperunt, sanguinem e macula magna petechiali quinque ante aegrae morbum ^{horas} ~~horas~~ extractum lanceola sibi per insitionem communicarunt, tandem sudore squalidissimum aegri indusium induerunt, et per nycthemerum gestarunt, nec infectionem, nec quidquam mali inde passi sunt b), neque id mirum videtur.

Juvenem, Petechiis laborantem, lavando decocto Corticis peruviani morti eripuit BASILEWITSCH c).

a) Ratione medendi, parte septima, post obitum edita ab EYEREL. Viennae 1790.

b) KRAUS. Praeside PLOUCQUET Diss. An febris putrida sit contagiosa?

c) Loco citato.

nimis exiguu
stomaco
unus oris
7 l. c. 59.

E.

esquamatione,
petechiae, san-
erat, vasorum
abile videtur,
abus sive san-

SCARLATINA.

§. XIII.

Otium mihi fecit circa hunc morbum Cl. KONTUM a), inquit: „Quae scarlatinam febrim concitat, materiae morbidae insignis aptitudo inest, glandularum, imprimis colli, et salivalium tumores, jam in ipso febris decursu, generandi et diu saepe post iam perpassas relinquendi.“

„Cum anno 1787. epidemice saeviret febris scarlatina, observabam in plurimis, potissimum adultis, non febrim declaratam, sed glandularum colli, parotidum, etc. tumores phlegmaticos, et porro.“

„Quae vero post scarlatinam veram remanebant glandulosae tumescentiae, in plerisque casibus prorsus non scrophulosas fuisse, satis apparet, cum ex facili discussione, tum si forsan in suppurationem transirent, ulceris facili et absque mora ut plurimum consolidatione, prorsus ceterum exulantibus cachexiae scrophulosae signis. Ex adultis feminis frequentius quam viris tales glandularum tumores residuos molestos fuisse, observaverim.

„Nec non iisdem ii prae aliis mihi pati visi sunt, qui quondam adfectibus scrophulosis laborabant, quibusque forsan debilitas systematis glandulosi atque lymphatici supererat. Neque pror-

a) Tomo primo, §. 43.

Varicellae

8. febrilis

Hughes avar

Wahler in alla
Vol. IV

sus deerant, haud tamen frequentia exempla, ubi scarlatina pueros scrophulososprehendens posteriorem hunc morbum auctum et exacerbatum relinqueret."

Manifeste ergo cernitur, etiam in hoc morbo Systema nostrum Vasorum absorbentium laborare.

FEBRIS URTICATA.

§. XIV.

Febbris urticata protheiformis speciatim non nisi vasorum absorbentium subsidio tollitur, ipso autore JOSEPHO GAUTIERI (de struma Vindobonae 1794. p. 78.).

ARTHRITIS ET RHEUMATISMUS.

§. XV.

Ad Arthritidem Vasa absorbentia nostra symbolam suam conferre, diligens huius morbi frequentissimi indagatio adeo luculenter me docuit, ut dubium amplius ea de re mihi nullum supersit.

Recte hinc pronuntiat CL. KORTUM e duobus casibus, quos fusius narrat, concludens: „Tumores glandularum a materia arthritica in „utroque casu fuisse derivandos, nemo inficias „ibit.“

26
28
nimio exyptian
stomacho
tumor oris
H. L. c. 5. 59.

INA.

orbum Cl. Kort.
latinam febrim
signis aptitudo
i, et salivarium
rsu, generandi
linquendi."

saeviret febris
s, potissimum
sed glandula-
res phlegmati-

veram remane-
in plerisque ca-
uisse, satis ap-
um si forsitan
ceris facili et
atione, pror-
scrophulosae
ius quam vi-
uos molestos

mihi pati visi
ulos labora-
tematis glan-
Neque pror-

In Morbo articulari, sive strictius sic dicta Arthritide vera, synoviam corruptam inter alias partes ipsa ossa, quae cavum articulare constituunt, laedere, quanquam saepius viderim, attamen adferre liceat testimonia trium Virorum, doctrina atque experientia et iudicio clarissimum, FRIDERICI HOFMANN, HAASE et BONN.

1802 pag. 24.

FR. HOFMANN enim de Podagra et Arthritide vera ait a): „Serum salsum excrementitium, ad articulos descendit ad ipsos articulos, humorem illum mucilaginosum coagulat — immanes, in parte adfecta cruciatus suscitatur, etc.“

HAASE vero — „Serum, quod ad articulos eorumque cava confluit, quo diutius iis inclusum tenetur, eo maiora mala aegro infert. Humor enim effusus primum lymphaticus limpidus esse, et a blanda indole parum recedere, postea talem tamen acrimoniam sibi contrahere, solet, ut molliores partes corrodantur b).“

In omni carie — acres humores esse, ponimus, quorum effrenata, quaecunque propinqua loca devastandi, vi tanta strages ossium editur, ut etiam densissimae laminae destruantur.

BONN autem: „Capitis et Colli tubercula, femoris locum dant supicioni, acrem humorem, intra articuli cavum effusum fuisse c).“

a) Fundamenta Pathologiae specialis. Halae 1747. p. 545.

b) Dissertatio de Unguine articulari eiusque Vitiis. Lipsiae 1774. §. 8.

c) Descriptio Thesauri Ossium morbosorum Höviani Amstelod. 1783. p. 71.

in morbo articulari
quoniam *White swelling*
Angli vocant
glandulas inguinales
subiacte tumere
annotat, *Jamieson*
Fuskel on the morbid
knee joint Edinb.

Van der Lae

P. finck

Hugheim accu

Walzer in Hla
Vol. IV

Hinc profecto non mirum, a tali acrimonia ossa ipsa adfecta talem subiisse mutationem, qualem CHESELDEN d), RUYSCH e), TRIOEN f), ALBINUS g), BONN h), egregie pinxerunt, et HALLER i), BONN k), van der HAAR l), PALETTA m), descripserunt, qualemque ipse fusius exposui n).

Quis autem negare ^{est} sustineat, Vascularum absorbentium auxilio istam Ossium mutationem accidisse, cum notum sit, ab iis solis auferri particulas fluidas non modo, sed etiam solidas.

Deinde Vascularum absorbentium ope morbum arthriticum solvi, idonei autores testantur, solum van der HAAR nominasse sufficiat.

Patet, ^{igitur} cur in Podagra Vasa absorbentia inflammantur o).

- d) Osteography Tab. 46. Fig. 1. et 2. Tab. 50. Fig. 1.
- e) Thesaurus anatomicus Nonus. N. 74. Pag. 57.
- f) Observationes medico chirurgicae. Tabula undecima et duodecima.
- g) Annotationes academicae. Liber quintus. Tabula secunda.
- h) Tabulae ossium morbosorum. Tabula decima quarta, Fig. 1. et 2.
- i) Elementa Physiologiae. Tomo quarto. p. 505.
- k) Descriptio Thesauri Ossium morbosorum Hoviani, pag. 20.
- l) In Actis Harlemensibus. Volumine octavo.
- m) Adversaria chirurgica prima, de Claudicatione congenita, quam Dissertationem recudi fecit ED. SANDIFORT. Leidae.
- n) In BLUMENBACHII, medicinische Bibliothek, dritter Band, pag. 493.
- o) JOHANNES FRIDERICUS HOFMANN, Dissertatio de Podagra.

nimio oxygenu
ulmones
tumores ossi
H. l. c. § 59.

Calculus arthriti
cos. form. a nimio
veluti absorptione
partium tunicarum
et fibrillarum musculi
E. Darwin
Zoon 2. p. 46.

Podas arthriticos e
fuerat vasorum
absorbentium
ruptura ossi.
Alard Hist. d'une
maladie particulière
au système lymphatique
Paris 1806. ch. 10.

Notissimum denique, acrem materiam arthriticam resorptam, et massae sanguineae red-
ditam et oberrantem, in corpore nostro, ni
apto loco excernitur, vel si nimia quantitate
adest, huc vel illuc deponi, et gravissimos
immo lethales morbos excitare.

Post Rheumatismos, quorum cum Arthri-
tide analogia ab omnibus cognoscitur, itidem
haud raro glandularum lymphaticarum tumores
remanere, experientia quotidiana constat p).

p) KORTUM. Tomo primo. pag. 272.

*in Rheumatismo
fue tumore
glandularum non
raro (glandulae)
saepe primo ex hoc
causa glandularum colli et caricis tumores inveni, praecipue in Sclerotionibus
hominis.*
Kortum Pathologia Bd. 2.
S. 740.

CATARRHUS.

§. XVI.

In Odontalgia catarrhali, gravedine, generatim
in Catarrhis recte monet KORTUM a): „Non
„raro glandulae circa collum, caput et sub
„mento, tum conglomeratae salivales, tum
„conglobatae intumescunt: qui quidem tumores
„licet docente BIERCHÉN b) saepe satis pertina-
„ces sint, nec suetis cedant remediis, plerumque
„tamen abeunte catarrho sponte evanescunt, vel
„facile saltem discutiuntur. A scrofulis tumores
„catarrhosi, monente CHARMETTON c), ex eo
„facile distinguuntur, quod molles ac leviter
„sensi-

a) Tomo primo. pag. 261.

b) Vom Krebse. pag. 40.

c) Prix de l'Academie de Chirurgie 3. pag. 201.

*Huguenot acce
Wasser in Olla
Vol. IV*

„sensiles sint, et facile resolvantur. In infanti-
 „bus ac iunioribus praecipue observantur, quo-
 „rum glandulae laxae et debiles sunt, et non
 „raro per longum tempus, catarrho licet de-
 „pulso, in iis persistunt. Scrofulosi infantes in-
 „primis catarrhis obnoxii esse videntur, indeque
 „malum illud haud parum exacerbatur. Oph-
 „thalmia nempe scrofulosa accedente catarrho
 „gravius afficit, narium stillicidium et excoria-
 „tio labiorum augetur, increscitque glandula-
 „rum tumentium numerus.“

„Huc quodammodo referendus quoque ille
 „glandularum morbus, quem BURSERIUS d) tam
 „praeclare delineavit, quemque Angli the
 „MUMPPS e), Galli ORPILLONS, les OURLES,
 „Itali ORECCHIONI vocant. Cui vero cum scrofu-
 „lis nullam affinitatem esse, nemo certe cau-
 „sas eius, ortum totumque decursum f) perpen-
 „dens, dubitabit; inepteque profecto illum
 „forsan etiam ad scrofulas pertinere, idcirco
 „sentit ACKERMANN, quoniam infantes praeci-
 „pue infestant, qui quidem scrofulis prae aliis
 „obnoxii sint. Namque non scrofulis solum,
 „sed quibuscunque ad glandulas congestionibus
 „iuniores inprimis patere, constat.“

d) Institutiones medicae practicae. Vol. tertio. Cap. 15.

e) GOOCH Cases and Remarks. p. 17. seqq. — Confer
 RUSSELL Oecon. Nat. p. 114.

f) Confer BURSERIUM, loco citato, et ab illo citatos
 Auctores.

*forfan a nimio oxygenu
 per totum et pulmones
 reserpto, catarrhus oriri
 opinatur H. Gilibert L.c. 559.*

acrem materiam ar-
 massae sanguineae re-
 corpore nostro, si
 si nimia quantitate
 poni, et gravissimos
 tare.

quorum cum Arthri-
 cognoscitur, itidem
 phaticarum tumores
 iudiana constat p).

272.
 principis in Scleritide

travetine, generatim
 partum a): „Non
 caput et sub
 salivales, tum
 quidem tumores
 epe satis pertina-
 diis, plerumque
 evanescunt, vel
 scrofulis tumores
 rton c), ex eo
 molles ac leviter
 „sensi-

„Generatim observaverim, morbis febrilibus ex catarrhali et gastrico caractere complicatis facillime glandularum tumores adiungi. Huius v. c. indolis, si a specifico miasmate discesseris, scarlatina et modo dictus morbus glandularum esse videntur. Ceterum rarissime occurrere, morbos catarrhales puros, sed illos plerumque bilioso vel alio primarum viarum inquinamento complicatos esse, hodie ab omnibus agnoscitur.“

„An a catarrhalibus distinguendi sunt glandularum tumores a refrigerio oriundi? Clima frigidum et humidum ad scrofulas veras efficiendas causae remotae instar multum conferre, deinceps dicitur. Sed de hac re nobis hic sermo non est. Intellego potius glandularum tumescentias absque alia reperiunda causa post refrigerium, et quidem subito saepe, contingentes. CL. RIED glandulas in uno colli latere frigida aura per momentum admissa tumescere, ac inflammari vidit. Verbulo sub scrofularum spuriarum serie illam a refrigerio notat PLENK.“

Equidem non crediderim, hosce glandularum tumores catarrhales distinguendos esse ab illis, qui ^{frigore} refrigerio oriuntur.

Hosce autem glandularum tumores pertinacissimos felicissime Camphorae topico usu superavi, credens, stimulum quam proxime loco adplicandum, ubi stases essent depellendae, neque ~~prosper~~ successus spem meam fefellit.

Saepe in hominibus angina inflammatoria laborantibus observari
 glandularum absorbentium tumorem in collo sitaram bolearum et
 tumorem
 saepe observari si in uno tantum latere angina haerebat hujus
 tantum lateris glandularum affici

ANGINA.

§. XVII.

Post anginam observatum est, glandularum
 colli imprimis tumores remansisse, interdum
 quoque abdomen tumidum, quod sine dubio
 a tumidis glandulis mesenterii provenit a).

a) KORTUM. Tomo primo. p. 260.

Dysenteria esse morbum
 vaporem absorbentium
 1792. 97.
 1794.

DYSENTERIA.

§. XVIII.

Vasa sorbentia Intestinorum, vulgo chylosa dicta,
 in Dysenteria, prouti etiam in aliis ulceribus
 Intestinorum, adeo luculenta ob spissitudinem
 puris absorpti vidi, ut non modo trunci ma-
 iores, sed etiam radiculae ipsae subtilissimae,
 longitudinaliter concurrentes, quae alias vix
 nulla artificiosa administratione, hucusque saltim
 nota, demonstrari possunt, appareant; quae
 melius adhuc, si tubi intestinalis hoc morbo la-
 borantis particulam secundum longitudinem se-
 ctam et expansam luci oppositam teneas, con-
 spicies. Eiusmodi egregia specimina non modo
 ipse servo, sed etiam Londini in G. HUNTERI
 et SHELDONI Thesauris anatomicis servantur.

Exinde etiam glandularum Mesenterii tu-
 mores, quos in dysenteria et in aliis Intestino-

in aere haerentes
 Materiam aerem per
 vase absorbentia cutis et
 pulmonum corpus subscitum
 ad intestina feci delatam
 Dysenteriam excitare
 suspicatur. C.C. Matthaei

x. Wismar 1797. 1797. p. 72. quia in der Luft sich aufhaltend
 wiggende Materie, fließt sich durch die feinsiebigste Gefäße des Haut und
 Lungen zu d. feinsten, nicht für die feinsten Gefäße geeignet. Sie werden
 nicht zu Grunde, sind nicht selbst eine Krankheit, sondern nur eine
 vorübergehende, bleibt in der Dysenterie ganz unbenutzt.

rum gravioribus exulcerationibus observavi, derivari, atque facile explicari possunt; ³Vasa enim haec² pus, chylo certe spissius, e loco affecto^{ad} sorbentia ad istas glandulas advehunt; quod cum difficilius chylo per illud^{ad} transeat, vel penetrare interdum plane nequeat, tumore excitato molem auget.

Glandulas autem Mesenterii, ^{maxime}inprimis eas, ad quas Vasa absorbentia a Colo venientia abeunt, tumidas et simul duriores in Dysenteria Clarissimi Autores viderunt a).

^{similiter}Etiam a Dysenteria, ut vocant, suppressa^m glandularum tumorem adnotarunt b).

~~Minime autem credendum est, ex~~ ^Evasis chylosi motu retrogrado materiam aquoso-serosam depluere in Dysenteria, ~~ut~~ ^{apert.}DARWIN (de quo in Capite de Diabete fusius verba feci) epinatur; ista enim opinio ab omni verisimilitudinis specie adeo abhorret, ut seriam refutationem vix mereatur.

a) In Alvi fluxibus glandulas Intestinorum saepe grandescere aut erodi, iam Morgagni annotavit. De sedibus et causis morborum Epistola 31. Articuli 15.

Glandulas Mesenterii ex inflammatione tumidas vidit in dysentericis summus M. Stoll. Rationis medendi Parte tertia, pag. 281.

In Mesocolo glandulas in dysentericis tumidas vidit KAUHLEN. Von der Ruhr. Bonn 1787. 4. p. 6.

Confer et CRUIKSHANK Account of the Absorbent Vessels, p. 121. — et COWLEY in London Medical Journal, Volum. septimo, Casum quartum et undecimum. &

b) TRILLER Dissertatio de Tumoribus subitis a Dysenteria suppressa. — Recusa in eius Opusculis.

f. Will. Lempriere Practical Observations on the Diseases of the Army in Jamaica. Vol. 2. London 1799. pag. 207.

ERIA.

onibus observavi, de-
icari possunt; Vasa
erte spissius, e loco
landulas advehunt;
per illud transeat,
nequeat, tumore
erii, imprimis eas,
o venientia abeunt,
Dysenteria Claris-
vocant, suppressa
runt b).
m est, ^E vasis
eriam aquoso-sero-
^{apert.}
DARWIN (de
fusus verba feci)
ab omni verisimi-
ut seriam refu-
stinorum saepe gran-
annotavit. De sedi-
51. Articul. 15.
natione tumidas vi-
L. Rationis medendi
tericis tumidas vidit
1767. 4 p. 6.
t. of the Absorbent
in London Medical
quatum et unde-
us subitis a Dysen-
Opusculis.

CHOLERA.

§. XIX.

^{cadaveribus}
In Cholera mortuis Vasa absorbentia intestino-
rum, vulgo chylosa dicta, bile plena visa
sunt a), manifesto argumento: Bilem (forsan
a miasmate epidemico) copiosam et corruptam
per vasa absorbentia sanguini reddi, cor vasaque
stimulare, ~~et~~ ^{hinc} dira, huius morbi symptomata
excitare.

Facile hinc etiam optima curandi methodus
intelligitur. Praeter purgantia enim cholagoga,
iusto tempore adhibita, prodest potio, quae a
RIVERO nomen gerit b), bilis plus iusto copio-
sioris in tubo intestinali remorantis corruptionem
arcendo; prodest balneum vinosum, sangui-
nem reliquasque partes a putredine arcendo;
vasorum enim absorbentium ope in hisce balneis
tantum absque dubio sanguini traditur, quan-
tum ad corruptionem ~~vel sepsin~~ ^{vel} eius vitandam
vel arcendam vel tollendam sufficit.

- a) ASSALINI, loco citato, p. 41.
- b) SELLE Medicina clinica, p. 174.

^{ut vestigium}
*Attentio for vero purgationem
quidem bilem in vasis offer
bantibus hoc morbo periculis
rum in vasis. 5223.*

Indubit

*prodest roborantia
tipe attentio for lo.*



CHYMI ECCHYMOSIS IN ABDOMEN.

§. XX.

^R**A**rupto Intestino duodeno ^{causam} Cavit^{as} Abdomi-
nis materia lactea replebatur, quae irreperat
in Absorbentia Vasa superficialia, quotquot per-
tinebant tum ad ^{causam} cavitatem, tum etiam ad viscera
ad usque ductum thoracicum a).

Perfecte eadem bis vidi accidisse rupto per
sphacelum Intestino ileo.

a) MASCAGNI. p. 20.

SANGUIS EXTRA^{ex vasa effusus}VASATUS.

§. XXI.

^m**U**bicun^{que} Sanguis extra Vasa sua fertur, adeo,
ut alicubi stagnet, vel etiam coaguletur, a ^{ab} Vasis
sorbentibus sensim sensimque aufertur; ea enim
sola via patet ad reditum in reliquam massam;
ni autem nimis ^{quoniam} magna quantitas sanguinis ^{vel} aut
seri effusi vel coagulati adest, tota reassumitur.

*After blood when extra-
vasated undergoes a
chemical change
before it is sufficiently fluid
to be taken up by the lymphatic
absorbents, and in that
process changes its colour
to green and then yellow.*

Vera haec esse, neque hypothesi quadam
niti, observationes ^{super effuso rubro sanguine} demonstrant, ubi effusus
iste sanguis ^{et in} ruber in Vasis absorbentibus inven-
tus est. *probat*

*E. Davinia. Zoon. Vd. 2.
pag 74*

Ipse pluries oculis ^{vidi} meis usurpavi, su-
gillationem in fronte apparentem post aliquot

dies, non ^{per telam cellularem} infiltrationem quadam, sed in ipsis vasis absorbentibus, ad angulum oculi internum et ad radicem nasi decurrentem.

Vidi infantis in partu laborioso natam effusionem sanguine^{lentam} in osse verticali sinistro, dum resolveretur, tumorem excitare glandulae in latere sinistro Colli sitae.

Vidi ⁱⁿ pari modo et alibi in corpore nostro Ecchymoses sanguinis sugillationes et vibices dictas eorum actione sublatas, ^{vidi}

Sic LUDWIG a) in Viro, qui casu ab alto haemorrhagiam auris passus est, Vasa absorbentia Cerebri sanguine turgida vidit.

Sanguinem in Thorace effusum Vasa absorbentia pulmonum, ^{superficialia} diaphragmatis, et pleurae repletam pluries vidi b).

Servatur specimen in G. HUNTERI Museo, in quo in ipsa substantia pulmonum vasa lymphatica admodum conspicua sunt, desumptum ex homine haemoptysi mortuo; in illo apparet, vasa lymphatica ex parte coagulato sanguine plena ulteriorem repletionis artificiosae progressum cohibuisse c).

A sanguine in Abdomen effuso Vasa absorbentia superficialia Hepatis et Intestinorum turgentia reperimus d). A ^{rupta} vena splenica a

a) In versione germanica MASCAGNI, p. 24.

b) Vidit eadem MASCAGNI, p. 21.

c) CRUIKSHANK Anatomy of the absorbent Vessels. p. 42.

d) MASCAGNI, p. 21.

lapsu abdominalia vasa absorbentia sanguine turgida invenit MASCAGNI.

In Peritonaei et Intestinorum Inflammatione vasa absorbentia lymphā sanguinolenta repleta vidit CRUIKSHANK.

*Sanguinem menstruum effusum in
vagina clausa quovis mense per
tres annos per vasa absorbentia
tamque diti sine noxa
evanescentem vidit.*

*J. D. Brandt von d.
Antonyse Gannover
1778. pag 163.*

A sanguine menstruo vasa absorbentia ad glandulas usque repleta visa sunt e).

In haemorrhoidibus sic dictis suppressis glandularum in pelvi sitarum tumores oriuntur.

A sanguine inter Musculos artuum effuso Vasa absorbentia ad usque glandulas repleta visa sunt f).

Interdum vero non solummodo ad glandulam proximam, sed ad ipsum Ductum thoracicum usque Vasa absorbentia sanguine rubro repleta offendi g).

In ipso Ductu thoracico denique illorum, qui ~~ecchymosi~~ ^{sanguine effusione} perierunt, verum sanguinem fluidum vel coagulatum saepius inveni; invenerunt et alii quam plurimi h). Non ignoro autem, in-

e) Exempla tumorum glandularum a Menstruis tum suppressis tum cessantibus allegavit KORTUM Tomo primo §. 45. p. 265.

f) MASCAGNI, p. 21.

g) Idem viderunt CRUIKSHANK et MASCAGNI.

h) Autoribus, quos allegat ALBERTUS HALLER de corporis humani fabrica Libro Secundo, Sectione prima, §. 28. Tomo primo, p. 209. addo adhuc WEFFERUM MONRO et SABATIER in Memoires de l'Academie de sciences à Paris 1780. In equo, cui contusionibus multum sanguinis, tum in abdominis cavum, tum et in telam cellulosam effusum fuerat, in Ductu thoracico postea lympham sanguine mixtam reperit DESSAULT Autore narrante WEIDMANN de Necrosi ossium. Francof. 1793. fol. p. 3.

*in Ductu thoracico felis suffocatae sanguinem invenit Gerdorff Anatomia
§ 2743. Vindob. 1792.*

*remarques sur le canal thoracique
de l'homme, qui remplit de sang
fluide dans un sujet et de sang
coagulé dans deux autres.*

terdum in cadaveribus ob sublatam resistantiam
valvularum ^{finalium} huius ^{Ductus} sanguine e
Venis sanguiferis se insinuante repleti.

Quoties ergo lympham rubram in Vasis ab-
sorbentibus viderunt, toties pariter in cavis cor-
poris, a quibus ista Vasa absorbentia originem
trahunt, sanguinem extra vasa viderunt i).

Hinc concludit L. M. A. CALDANI k), In
sugillationibus, sanguinem, aut certo cruentum
serum viderunt ^{ab} sorbentia vasa nonnulla in cada-
veribus replevisse, *longo etiam temporis inter-
vallo*, a sugillationum principio, id quod signi-
ficare videtur, *lente admodum ac difficulter*
per lymphae ductus liquida *recipi* atque *moveri*,
quae a lymphae tenuitate non parum distant.

Ex eorundem autem vasorum absorbentium
cognita natura et remediorum idoneorum non
vanus, sed efficacissimus usus *topicus* apparet: v. c.
Acetum, *Solutio Salis ammoniaci* in *Aceto*,
Vinum calidum prodest in sugillationibus, cum
ea horum medicamentorum pars, quae absorbe-
tur, sanguinem stagnantem simul diluit, et
dilutum a corruptione servat, dum illum per
vasa ^{ab} sorbentia comitatur.

i) MASCAGNI. p. 16.

k) Institutiones anatomicae. Venetiis 1791. Tomo se-
cundo p. 110.

per vasa absorbentia
propria negotia
optime cytat.
x)

Joh. Hunter on the
Blood. Lond. 1794.
pag. 199

VASA ABSORBENTIA VARICOSA.

§. XXII.

Angustissima Vasa absorbentia intestinorum, vulgo lactea dicta, phlegmaticis, amplissima melancholicis esse; Auctor Anonymus de Natura cholicorum asseruit; ipse tamen, in hominibus proceris vasa absorbentia ampla, magnitudini corporis proportionata, in nanis angustissima inveni, prouti in Archetypis, quos servo, cuius cernere licet.

Hinc varicosa non dicenda sunt vasa absorbentia $\forall$ & e gigantibus desumta.

Varicosa autem in universum redduntur vasa absorbentia vel pressione, vel ligatura, vel obstructione glandularum, ad quas abeunt, vel forsitan debilitate tunicarum.

absorbentia
vafa varicosa in
duca membrana sanguinis
effusionem videt.
Allenhofer. 5. 118.
Varicosa vasa absorbentia in ipsa coniunctiva oculi viderunt et delineant SCHREGER et TILESUS (vid. Beitrage, Theil I. in fine).

Hinc varicosa apparent nostra vasa, si illico post mortem hydropicorum forti ligatura comprehenduntur a); hinc ipsae cellulae glandularum dilatari videntur b); — immo glandulae ipsae in hydatides abeunt c).

- a) ASSALINI, p. 56.
b) MASCAGNI, p. 34. et Allenhofer 5. 118.
c) CRUIKSHANK. Anatomy of the absorbent Vessels.

§ 23. Structura unius lactae. Libuamur tempore a morte
phlegmaticis, duam tuncum sanguinis, etiam
cholicis, quatuor melancholicis.

Sanguinem meum
clausa
vagina quovis
fere anno pe-
tiamque de-
vanescentem

J. D. Braun
Anst.
1798

Remarques
de P. homin
fleuide de
coagule 2

VARICOSA.

intestinorum,
is, amplissima
ymus de Natura
en, in homini-
mpla, magnitu-
nanis angustis-
s, quos servo.

sunt vasa absor.

sum redduntur
vel ligatura, vel
mas abeunt, vel

ipse coniunctiva
REGIA et TILE-
fine.)

in vasa, si illico
in ligatura com-
cellulae glandu-
lino glandulae

Absorbent Vessels

1893

U. Alard in libro in Catalogo Anatomico citato, doctè et fide
demonstrat: In Elephantiasi Arabum (Necnon illa ab
Elephantiasi Graecorum) in hydrocele (l'andem Kaeupferi)
pede febricitante (Pencil Kaeupferi), Colica Japonum,
(Seaki) Hernia gelatinosa Keifellii, metastasi lactea,
arthritide, plica polonica, phlegmasia alba Hullii,
utpote morbis affinis, vasa absorbentia sola,
arterio, venis, nervis et cute integerrimis laborant.
In cadaveribus hominum scilicet his morbis peremptorum, reperit
ur, vasa absorbentia dilatata, varicosa, lympham
turgida et pennae asperinae crassitiem aequantia, funicula
eorum adeo debilitata ut injectione tentata rumpantur.
Quinimo in paucis hujus morbi aliquot casibus
videntur. In fictis mortis vasa absorbentia solent quae
chordarum durarum et nodosarum ad instar sub cute
tanguntur solent, et inflammatione correpta, dum
interim glandulae eorum nonnumquam per longum
temporis spatium sanae persistunt.

7 in the
not
of a
is ferrous
rated
of a

Sea Plants.
Select
S Medicine

Sanguinem men-
struam clausa
vagina quon-
dam annos f-
tiamque d-
evanescentem

J. D. Bro
Mr
179.

remarques
de P. homa
fleuside du
cragule



cholanis, quoniam metacholici.

VASA

Sic Vasa

rum ab ich-

ioneo.

Sic quid-

admodum vario-

rali pign. MA

Concreta

Conis absorbe-

Vasa absor-

primis in ea

exipit, vulge-

sectionibus p-

la, attamen

star, enormi

in ipso tub-

liquore id-

WALTER

testini Jen-

ginta circi-

SANDROFF

dicuntur, e-

cui glandula

et bini volv-

ricosa dican-

d) Tab. XI

e) Institutio

cundo,

f) Memoir

nie royal

et in vers

g) Observ

cundo C

VASA ABSORBENTIA VARICOSA.

43

Sic Vasa absorbentia mammarum cancrorū ab ichore absorpto varicosa servo in liquore idoneo.

Sic quaedam vasa absorbentia pulmonum admodum varicosa nitidissime magnitudine naturali pingit MASCAGNI d).

Concreta lymphæ parumper albescente vasa Cordis absorbentia turgere vidit CALDANI e).

Vasa absorbentia Intestinorum tenuiorum, imprimis in ea parte, quæ proxime Duodenum excipit, vulgo chylosa dicta, saepius inveni in sectionibus pathologicis, materia quadam lacteola, attamen spissiore, mollioris fere casei adinstar, enormiter expansa, margaritarum adinstar, in ipso tubo ludentia; selecta specimina servo in liquore idoneo. Eiusmodi specimen nitide pinxit WALTER f), scilicet vasa lactea et glandulas Intestini Jeuni obstructas et induratas e viro triginta circiter annorum. — Sic etiam EDUARD. SANDIFORT g) Vasa lactea, quæ primi generis dicuntur, ex infante paucarum septimanarum, cui glandulae mesentericae admodum tumidae, et bini volvuli erant, admodum crassa, ni varicosa dicenda sint, pingit. — Pari modo vasa

am firri effert
in induratis
Vasa absorbentia
similia
in testinorum et
caseo quasi plena
vidit Haller. *)
ut vasculum ad
quædam villum suum
reduci poterit.

in the
not
of a
is forms
ates
of a

See flint.
select
to medicine

to
the

to
the

d) Tab. XX. HH. Tab. XXI. 21.

e) Institutiones anatomicae. Venetiis 1791. Tomo secundo, p. 102.

f) Memoire sur la Resorption, in Memoires de l'Academie royale des sciences à Berlin, ad annum 1787. p. 21. et in versione germanica eiusdem dissertationis.

g) Observationum pathologico-anatomicarum Libro secundo Capite octavo Tab. 8. Fig. 5.

Elam Myssil
Tom 7. p. 29.

lactea vidit LUDWIG h) in puella septem annorum, quae glandulas mesentericas scirrhoſas habebat. *laborant.*

Vasa absorbentia Intestynorum in herniis varicosa reddi, in capite de Hernia retuli.

Vasa ^{ab}sorbentia Areolae Mammae materia ^{ex} albo luteola referta in Vetula vidi.

Pari modo materia albida referta vidi vasa ^{ab}sorbentia hepatis et vesiculae felleae.

Immo in femina vivente robusta, Ancylosi genu laborante, vasa ^{ab}sorbentia eiusdem cruris adeo varicosa vidi, ut oedematis pedis speciem praeberent, semel tantum hucdum mihi visam; cum impetu lympham prosilientem vidi e vase tali varicoso, vel acu vel lanceola in hac femina aperto. *eadem vidit. F. Magendie... l. c. p. 199. 200.*

h) Epistolarum ad Hallerum scriptarum. Volumine secundo. p. 294.

VASA ABSORBENTIA OBSTRUCTA, CALLOSA, OSSEA.

§. XXIII.

Post usum Cantharidum fere semper vasa absorbentia obstructa invenisse vult MASCAGNI a). Etenim ab irritatione mechanica vel chemica Vasa ^{ab}sorbentia concitari spastice videntur.

a) Pag. 23.

Sanguinem me.
clausa
vagina quo

tror annos
tiam que de
evanescentem

J. B. 13.

M

17

remarg
de 14 h
fluide
craque

in h. h. h. h. h.
Tunicae
callosae qua
immo semel
MASCAGNI b)

Materia la
bentia, notav
viti in Lapid
tracheam sitas

Calculis vel L
videtur: pulv
in auras ab
a vasis sorben
glandulis tra
sorbentium

densa,
quae a loc
MASCAGNI

In Raci
dulis et vasa

Ductum
teria caseosa

b) Pag. 30.
c) Pag. 74.
d)
e) Pag. 29.
f)
g) Apud 3.
val. 3.

Tunicæ vasorum absorbentium quandoque callosæ quasi redduntur, ut sæpius vidi; quin immo semel tunicas ossificatas circa pelvim vidit MASGAGNI b).

Materia lapidea et ossea repleti vasa absorbentia, notavit CRUIKSHANK c); ipse etiam vidi in Lapidariis glandulas lymphaticas circa tracheam sitas concrementis terreis veris ergo Calculis vel Lapillis refertas. Neque hoc mirum videtur: pulvis enim in Lapidum praeparatione in auras abeunt, et cum aëre pulmones intrans, a vasis sorbentibus trachealibus attrahitur, inque glandulis trachealibus deponitur. Vasorum absorbentium lapidefactorum figuram dedit WALTER d).

Aliquando vasa absorbentia materia tenaci,
densa, veluti tartarosa repleti, praesertim ea,
quae a locis scirrhus affectis nascuntur, notavit
MASCAGNI e).

In Rachitide non raro cum obstructis glandulis et vasa absorbentia obstructa invenerunt.

Ductum thoracicum ^{tena cum} ~~enique~~ glandulas ma-
teria caseosa repletum vidit. PONCEY g).

- b) Pag. 30. *gastricorum papillae*
c) Pag. 74. *Ter Gentilis apud Portal l.c p 493.*
d) ~~Loco citato in~~ Memoires de l'Academie royale des sciences à Berlin 1786. et 1787. p. 21. *craspi admodum opacae
inveni esse
ut ductus thoraci-
cus collofas,
teret esse et nervo
familiar optet.*
e) Pag. 29.
f) *As LINI*, p. 57.
g) Apud *SARTIARD* in Observations chirurgicales. Obser-
vat. 5. — item *CRUIKSHANK*.

vafa afferbente
opferita vidi
Monro morbid
anatomy. p 254

Glandulam abfor-
dentem in quatuor
ex parte in or-
bis formam flexo.

Glandulae mesentericae
sive plerumque offu-
concremanti conti-
nenter vidit

Hopfengärtner.
Hufeland. Journal.
N. 4. p. 494.

189
 nie que
 France

7 in the
not
of a
is ferrous
ated
of a

Sea Plants.
Fishes
& Medicines

fellicera convectionem
glandula mefamica
infantis atrophici repio
lan = tom vixit
Alcahoser G.
D. 126

ma- ^{membranas,}
Non rariſſima tunc
ſuavitate poſſentis
eripar admodum, ſpaci
inveni adeo
le des ut ductus ſuavi
tus colloſus,
tunc et nervo
ſimilis eſſet.)

* *visitata eadem viam*
Asper l.c. in Catalya
 p 97

Londini et alibi se vidisse ductus thoracicos obstructos materia terrea vel ossea, testatur ASSALINI h).

Materia ossea e spina ventosa ossis ilei adeo repletum vidit CHESTON i) Ductum thoracicum, ut aërem inflatum aegre transmitteret.

Cavitatem Ductus thoracici angustierem, utpote ab Aneurysmate ad dextrum latus pulsam et elevatam a spina vertebrali, ideoque etiam elevatam, observavit BAYFORD k).

Ductum thoracicum posteriorem autem obstructum repertum, et marasmi insanabilis causam fuisse, WATSON l) ex hypothesi potius quam observatione scripsisse videtur. Etenim eo adduci nequeo, ut credam, occlusa hac via vitam per aliquot dies superstitem esse posse; neque unquam in hominibus decrepitis ductus thoracicos obseratos inveni; neque novi a quoquam anatomico fide digno obseratos revera inventos

minus recte afferunt esse.

Calculus denique in Ductu thoracico posteriori inventum pro causa^m hydropis habuit I. D.

SCHERB m).

h) P. 52.

i) Philosophical Transactions. Volumine Septuagesimo. Anno 1780.

k) Medical observations and Inquiries. Volumine tertio. p. 18.

l) Philosophical Transactions. Volumine quinquagesimo. P. 392.

m) In libello peculiari 1729. edito. — Recens. HAL-

LENB in Dissertationibus pathologicis/ *recuso.*

Medical records and

Researches Vol. I. Lond.

1798 germanice in

Hessmann & Asenmüller

Beiträge zur Vergleichungs-Kunst. Erford. Band. pag. 47

*Sanguinem me-
clausa
vagina quo
fuerit annos
tiamque de
evanescente*

J. D. B.

in

1.

*Ductum thoracicum
posteriorem duobus
locis, valvularum
crassitie morbo
occlusum vidit et
innovo plango occlusum
vidit et pingit
in Cooper quater
ejus obstructions
exempla vidit.*

*reman-
de p. 1
fuerit
cong.*

GLAND
TUMID.

Licit in qu
verbo facio,
absorbentibus
dam, utpote
universum ad

Glandulas
das vidit C
primentes aeg
larum concre
in paragra

Gland
sitis et P
invenit M
Saepe

cuius reper
rius, magna
glandulas tra

Chylus
acri absorptu
defectus, in
et gravatae
mirum est

a) Loco ci
b) Pag. 11
c) Pag. 20

GLANDULAE ABSORBENTES
TUMIDAE ET OBSTRUCTAE. *nigrae.*

§. XXIV.

Licet in quovis Capite de glandulis tumidis verba facio, hac tamen data occasione de vasis absorbentibus obstructis loquendi, pauca quaedam, utpote minus apte alibi inserenda, hic in universum adnotabo.

Glandulas bronchiales ^{absorbentes} adeo tumidas vidit CRUIKSHANK a), ut tracheam comprimentes aegrum iugulando necarent. Glandularum concrementis terreis refertarum exemplum in paragrapho antecedente retuli.

Glandulas pulmonales absorbentes in Phthisicis et Peripneumonicis plerumque obstructas invenit MASCAGNI b).

Saepe autem glandulas adeo impervias mercurio reperit MASCAGNI c), ut potius Mercurius, magna vi impulsus, vasa rumperet, quam glandulas transiret.

Chylus ^{parvus} a nimis ineptis alimentis, a lacte acri absorptus, glandulas mesentericas, ad quas defertur, in tumorem tollit; hinc, si ^{parva} ~~obstructae~~ ^{revera} gravatae hae glandulae ^{occalluerunt}, non mirum est, hominem denique tabie consumi.

a) Loco citato, p. 124.

b) Pag. 112. in nota.

c) Pag. 20.

* Morgagni de sed. et
caus. mort. Epist. XXII.
Art. 21

*in the
not
of a
no forms
ates
of a*

*See Glands
selected
in medicine*

*Incipiente glandulae
absorbentis bronchialis
atro mucosae repletas
invenimus. (x)*

*de
lib.*

"

*1.
lib.*

48 GLANDULAE ABSORBENTES TUMIDAE

In istarum glandularum mesentericarum ^{hic dicitur} obstructione et impedito itinere per Ductum thoracicum, chylum annotarunt devium ad ea vasa sorbentia transire, quae cum absorbentibus hepatis communicant; hinc ea absorbentia ^{hepatica} chylo plena reperiri, quae ad radicem dextram superiorem Ductus thoracici posterioris abeunt, utpote obstructa parte inferiore Ductus thoracici d).

In Atrophia glandulas mesentericas tumidas, chylo caseoso plenas, viderat iam DIEMERBROECK e).

Immo tumorem Mesenterii cum hydatidibus et partibus cartilagineis triginta librarum pondere observavit de HAEN f).

Glandulae sorbentes sacrales adeo tumidae inventae fuerunt, ut intestini recti compressione obstructionem alvi lethalem cierent g).

Glandulae sorbentes Pelvis internae adeo tumidae visae sunt, ut partum impedirent h).

„In tota Classe conglobatarum glandularum,“ inquit ALBERTUS HALLER i), „longe, quam in „conglomeratis, frequentiores scirrhi sunt, et „cum hac posteriori tribu tota sana Cl. viri lymphaticum

d) ASSALINI, p. 53.

e) Pag. 59.

f) Rationis medendi Tomo septimo.

g) CRUIKSHANK, p. 119.

h) G. HUNTER Autore CRUIKSHANK, p. 119.

i) De Corporis Humani Fabrica. Tomo primo, p. 365.

Sanguinem me
clausa
vagina quo
fret annos
tiamque de
evanescentem

p. 2. 15

Glandulae inguinales
sunt in ulcere
vaginae Baillie
Appendix p. 129.

Glandulae lumborum
in viro testiculo
cancro
labante
pondere novem
librarum cum
dimidius inveniunt
A. Cooper
(p. 96).

remar
de h.
flos.
crag

Glandulas mesentericas intumescere, a pressione
~~oborta ductus thoracici~~ in venam subclaviam
 expectata a thymo tumido

Allan Burns in vesp. germ. p. 8.

in the
 not
 of a
 no forms
 cates
 of a

See fluids
 select
 & medicine

pe
 184

"

1.
 18.

)



ES TUMIDAE

esentericarum ob-

per Ductum tho-

rium ad ea vasa

orbentibus hepa-

urientia hepatica

ad dextram

terioris abeunt,

Ductus thora-

tericas tumidas,

iam DIEMER-

um hydatidibus

orarum pondere

es adeo tumida

ecti compressione

ent g).

internae adeo

mpedirent h).

glandularum,

onge, quam in

rhi sunt, et

a Cl. viri lym-

phaticum

p. 119.

no primo, p. 361.

Sanguis
de
vagina
tror an
tiam que
evanesce
p.

remas
de p.
flecti
croaz



„phaticum
„repererunt
„Neque
„quare in
„transeuntis
„rubris vasis
„dulis adpell
„ob minus lu
„trunci comp
„pauciora su
„maiores h
„tamen non
„ius pars r
„quae fit,
„tia vasa d
„distendit
„retardati
„dulis nas
„metallum
„lactum s
„urgere pot
„cum sum
„mentum fa
„tum est, u
„dulis, ex
„scurhos su
Silentio
egregios Ja
viscerum o
i) Loco
Sander

„phaticum glandularum genus scirrhis obsessum
„repererunt.“

„Neque, si ad causas recurras, obscurum est,
„quare in conglobatis glandulis celeritas fluidi
„transeuntis minuatur. Perinde enim, ut de
„rubris vasis dicetur, ita in lymphaticis ad glan-
„dulas adpellentibus, celeritas lymphae minuitur,
„ob maius lumen omnium ramorum, cum lumine
„trunci comparatum: deinde etsi vasa efferentia
„pauciora sunt, et in universum inferentibus non
„maiores habent luminum summam, in iis
„tamen non potest amissa celeritas reparari, cu-
„ius pars non exigua destructa sit, frictione,
„quae fit, dum per minora et conica decrescen-
„tia vasa delatus humor parietes suorum vasorum
„distendit. Ipso Experimento adeo potentem
„retardationem ex his causis in lymphaticis glan-
„dulis nasci reperio, ut nulla vi fluidissimum
„metallum in lactea vasa impulsum ad totum
„lacteum systema, aut in ductum thoracicum
„urgere potuerim, neque magis successisse vidi,
„cum summus anatomicus ALBINUS id experi-
„mentum faceret. Recte adeo dudum observa-
„tum est, uti in hepate, sic in conglobatis glan-
„dulis, ex mora transeuntis humoris frequentes
„scirrhos subnasci.“

Silentio tamen hoc loco premere nequeo
egregios JACOBI REZIAE k) argumentationes circa
viscerum obstructionem cum molis incremento.

k) Loco citato.

Martin Wall
"Swellings of the glands in the
axilla and inguen are not
uncommon attendants of a
great variety of epidemic fevers
and diseases communicated
by contagion, though not of a
syphilitic nature".
on the Diseases of the South Sea Islands
in two Disputations on Select
Subjects of Chemistry and Medicine
Oxford. 1783.

mem. A. W. Cruickshank Anatomy
of the absorbent vessels p. 44. et
Consentit Blum en buch
n. 5 431. Physiologie

S.
V.
Fr.
et

et
de glandulis mesentericis, morbo
tumoris vulge dicto
explicat. in Sep. p. 1. Chylos
Bern. Bernardi Quaestiones medic.
argum. p. 1. 1796
proposita easdem ducunt.
nobis allentitur Rust Sprengel
pathologie Band 1. 5 387

Minia prospecta videntur quae
Haller (Element. Physiologiae
lib. XXI. Sect. 1. 5 8. Tom. 7. p. 174)
habet: sunt glandularum
mesentericarum evarescent
per aetatem, & tela cellulosa
filamenta sunt robustiora,
capsula glandularum mesentericarum
obstant anteaque ut coque
proinde humoribus suis perfusi
possint, acque ab incisore repleti
et dum um frigore glandulae et complementae cumque
tela cellulosa confusae evanescent.

Minus recte Rayss se dedum abque lacteis glandulis vivere existit,
ut jam monuit Cruickshank (tant p. 30 & 44. editionis primae)
et Blum en buch Physiologiae 5 431.

DE GLANDULAE OBSTRUCTIONES TUMIDAE E. O.

quippe ad glandularum lymphaticarum sic dictam
obstructionem facile applicari poterunt. Verum
enimvero non omnis tumor glandulae ^{ab}sorbentis
obstructio adpellanda est, prouti vulgo fieri
solet. Ipse enim expertus sum in iniectionibus
meis, in demortuorum corporibus institutis,
per eiusmodi glandulas tumidas expeditiorem esse
mercurii viam, quam per glandulas solitae ma-
gnitudinis l).

Glandularum absorbentium a vi externa tume-
factarum exempla collegit KORTUM m).

Quae BARTHEZ n) habet: „Les glandes
„conglobées ont entr’elles une forte sympathie,
„que manifeste la succession de leurs engorge-
„ments dans des parties bien éloignées,“ non
a sympathia, sive facultate occulta quadam, sed
a structurae similitudine, et miasmate in toto
corpore oberrante, omnes glandulas simili modo
afficiente, explicanda mihi videntur, prouti ipse
etiam a glandularum obstructione ^{non} precedente
(a sympathia ~~inde~~pendente) explicat, quod in
Atrophia infantum et Phthisi tuberculosa gland-
ulae mesentericae et Colli intumescant. At
in tumoribus glandularum inguinalium pressione
bracherii ortis tumores glandularum Colli et
pone Aures a ^{confer}sympathia quadam derivandos
opinatur.

l) Confer casum, quem in Capite de Empyemate retuli.
m) Tomo primo. §. 47.
n) Nouveaux Elemens de la Science de l’homme. Mont-
pellier, 1778. p. 68.

flor. an
part of the
anatomically
resting the
flor. 1810

glandulae
vulgi
mesentericae
et
colli

glandulae

glandulae
et
colli

I have known several instances of the most
part of the mesenteric glands being
considerably tamed, without either inter-
rupting the transpiration of fluids to the
blood vessels, on occasioning any distress

Cullen First Lines Vol. IV. pag. 289.

BUS. 51
in vivo-
tae quid
il affici-
n inepta
idam.

a tumore glandularum axillarum
brachii et manus in immensum
tumentur

Heberden
Commentarii in
partem Historiam
Londini 1802.
Cap. 60

LIS

glandulae albescentes vel velut axillae
videt. ^{et} adeo tumida
Attenhofer ut partem capitis
impedirent.

gland-
pertam

humani.

Plenex
Josephus Plessner Novum
Systema tumorum Vindobae 1767.
"tumor lymphaticus ex rupto vase aquo
natum accurate descriptus quem saepe vidit
agustus cordis."

M

Ligatura vasorum albescenti
ura in omni fere ligatione graviter
artusculi enjunctis accidere
vero pallidum.

glandulae albescentes aspreatae
a Monro Morbid Anatomy
Edinb 1812 p. 254.

rorsus
m de-

J. Seman. M.
H. & K. Vol. 3.
p. 115.

glandulae albescentes siue
peritumulae ~~aspreatae~~ vicinas siue
et cancro accipiuntur
Monro. ibid p. 324.

ipsis
larum
ratio-
niam

Hyaliter nini a
ruptura vasorum abf. 1)

* Gregorini p. 64.

nam Al. li. Cruicthano Anatomia
of the absorbent Vessels p. 44. et
Consentit Blumenbach
in § 431. Physiologie

se
v.
fr
t

et Brugmanni ~~facturum~~
de glandulis mefentericis, morbo
fumentibus vulgo dictis
exponit. in 3. p. p. Brugmanni
Bern. Bernardi Quaestiones medic.
argumenti. § 1176
per se habet eadem docent.
nobis allenther Rust Brangel
pathologie Band 1. § 387

HO GLANDU

quippe ad g
obstruction
enimvero
obstructio
solet. Ip
meis, i
per eius
mercurii
gnitudin

HO Gla

factarum

Q

„congl

„que

„ment

a sym

a stru

corpe

affici

etian

(a sy

Atro

dula

in t

brai

por

opi

Nimia profecto videntur quae
Halleri (Element. Physiologiae
lib. XXV. sect. 1. § 5. Tom. 7. p. 274)
habet: sumus glandularum
excrecentiarum exarscit
per acetam, & tela cellulosa
stramenta sunt robustiora,
vascula glandularum neptentiam
atrahunt acrioraque ut acriora
proinde humoribus suis perfici
possint, acque ab incisore rep
et domum frigoris glandu
tela cellulosa confusae et

Nimia recte Kayser se dedum abque lacteis glandulis videri
ut jam monuit Cruicthano (Anat. p. 30 & 4. editionis primae)
et Blumenbach Physiologie § 431.

VERM

Deni

rum tu
valeant,
tur, sed
relinquim

VER M

A

Verm

dula sorb
nitide del

a) Au
Lip

R U

E rap

improbab
rivari po
Vas

rupturam

annume

nem en

esse, r

a) d

latus humor
epitaxi, qui
latus singula
Epitaxi singula

Esectione, per ^{per} ~~cultro~~
punctura thoracis ^{varicose} phthisin pueri gibbosi
derivat Collingwood. Medical Commentaries Vol. nono 1783-84. Ed. 2.

52 VULNERA VASORUM ABSORBENTIIUM.

Phthisin ipsam e ruptura vasorum chylo-
rum explicat R. MORTON b).

Ruptura vasis absorbentis ^{per} ~~proferium~~
capiti infanti in marginem
pectoris, tumorem pedum
fem post partum explicat.
White. Libia contra hanc
appt. antimum movet J. Ferriar.
qui hanc morbum ex inflammatione
vaporum absorbentium
explicat.

Rumpunt autem vasa lymphatica autore
WHITE c) vel contusione vel nisu in partu la-
borioso.

A ruptura vasorum lymphaticorum fungum
articularem oriri posse autumat BRAMBILLA d).

A ruptura Ductus thoracici hydropem lacteum
Pectoris ortum vidisse vult BASSIUS e). Ductum
thoracicum ruptum invenisse vult in puero qua-
tuordecim annorum GUIFFART f).

Hydropem chylosum (vero similiter effusum)
vasis absorbentis chylosum ortum paracentesi
abdominis bis administrata feliciter
sanavit. Ann Smith. Medical Repository
New York Vol. tertio. 1800. pag. 361.
*) Medical Hist. & Reflections Vol. tertio.
p. 310.

In Phthisiologia — et apud R. VIEUSSENS Novum
Vasorum Corporis Humani Systema Amstelod. 1705. in
Monitione ad lectorem — et DONALD MONRO Ou Dropsy.
pag. 28.

c) Apud ASSALINI, p. 115.

d) Acta Academiae medico-chirurgicae militaris Viennensis.
Tomo primo, p. 16. et 17.

e) Observationum Decade secunda. Observatio septima.

f) Apud BARTHOLINUM. Oper. nov. p. 490.

glandulae inguinales femori mortui
induratae et nigrae coloris

Walton Museum anat. Berl. 1805.
p. 135.

VULNERA VASORUM
ABSORBENTIIUM.

§. XXVII.

Vulnus vasculi sorbentis prodit lymphae te-
nuis perpetuum et pertinax stillicidium, ces-
sans compressione inter vulnus et locum, a quo
oritur istud vasculum, ad vulnus illud abiens a).

a) Qui opportunitate non fruuntur, naturam ipsam con-
sulendi, adeant Tabulas egregias MASCAGNI ad ea per-
fecte intelligenda, quae hic expono.

nota* Contusio vasorum lymphaticorum ⁴⁴


gemaklyke, spoedige en eenvoudige manieren
om de kwatting van een watervat by
eene aderlating te genezen. van Gerrit Jan
van Wy. ^{Utrecht}
Verhandelingen van het Genootsch.
Deel 1. Bl. 506.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of script.







Sic in vulneribus dorsi pedis prope malleolos b) vel prope genu, pari modo ac in vulneribus dorsi manus vel prope plicam cubiti, generatim *ubique prope articulationes*, ob laesionem vasorum sorbentium et lymphae continuum stillicidium cicatrix impeditur.

Constat autem, Vasa absorbentia circa articulationes non modo in truncos numero minores colligi, sed etiam cute tenuissima et pauca pinguedine tegi: hinc oborientis inflammationis tumore ob cutis tenuitatem non facile eo usque comprimuntur, ut stillicidium cessare possit, prouti in aliis partibus id fieri solet.

Non raro etiam Venae sectione, in Brachio vel praecipue in Pede instituta, Vasa sorbentia, in *vicinitate currentia* vel ipsam Venam trans-euntia, cultello laeduntur, parci enim illis omnino nequit; stillicidium autem insequens magnam creare molestiam imperitis solet c); ni enim arte inhibetur, diu manare potest d).

b) Confer Exemplum, quod in Capite de Hydrope retuli.

c) ANTONIUS NUCK. De Vulneribus Vasorum lymphaticorum, in egregiis Experimentis chirurgicis Lugduni Batavor. 1733. Capite 28. — Casus, quos HALLER de Corporis humani Fabrica Tomo primo, p. 318. collegit, hic repetere nefas duxi, liceat tamen in medium proferre proprias ipsius observationes; in Elementorum Physiologiae Libro undecimo Sectione prima, §. XI. „Ipse vidi — inquit — adeo et longum et contumax „lymphae post incisam venam profluvium, ut non aliunde, quam de grandi vase lymphatico inciso, possem „explicare.“

d) VAN SWIETEN Comment. ad §. 1228. Tres casus vasorum absorbentium venae sectione inflammatarum fusius nar-

Cornelius a Solingen Anst. cas. Hirscht. p. 118. Den. 1703. vromen. Anst. 1684. 4.

a laesione vasorum lymphaticorum tumor aquosus compressione fractus.

a laesione vasorum lymphaticorum in venae sectione. Distentione distillationem lymphae ipse vidi. Haller. Bibliotheca chirurgica.

Tom. I. p. 112 & 329 in nota a laesione vasis absorbentis, venae sectione neglecta. Bledium puerulo die sedentifera paulo post quatuordecim corruptum vidi. Altenhofer. §. 109.

D 3

In venae sectione vasculum lymphaticum laesum lymphae stillicidium aegre compressum. Haller v. d. Will. 1781. var. in ed. 1718. 1715. Hiera Conrad Ludwig Walther Medicinisch chirurgische Beob. Leipzig 1759. vasa lymphaticum in Venae laesum aegre curatum.

*Lacis in aperto bubone vase lymphatico
plenum per phlebotomiam circa 54
compressione demum compressum.*

per Lymph. Off. anat. chir.

VULNERA VASORUM ABSORBENTIIUM.

Vulnerato enim Vascularum sorbentium maiori trunco quodam, non modo sanatio et cicatrix pertinaci lymphae effluxu retardatur, sed etiam sanato tandem vulnere oedema oboritur ab obstructione viae, per quam lymphae in sanguinem redeundum est; non raro id post extirpationem glandularum axillarium accidere solet *e)*; neque rarum, istiusmodi stillicidium taediosum glandulae inguinalis tumidae incisionem intempestivam insequentum esse *f)*.

Oedema autem tali modo obortum tamdiu durat, donec vasa sorbentia *lateraliter* eo usque extendantur, ut eorum amplitudo sufficiat ad lymphae insolitam quantitatem transmittendam.

Neque rarum, sorbentia nostra vasa, quae per ulcera feruntur, corrodi et liquorem stillare *g)*.

Quantitas autem non contemnenda lymphae vel parvo eiusmodi vulnuscule sine dolore pro-

rat J. ALBERNETTY. Surgical and physiological observations. Lond. 1793. parte secunda, p. 170.

e) B. BELL. System of Surgery. Volum. quinto, p. 28. et Capite 36. Sect. 6.

f) „Chirurgus bubonem venereum ante perfectam maturitatem aperuerat, et mala fortuna vas lymphaticum dissecuerat, unde magna lymphae copia quotidie effluebat; splenis infra locum affectum impositis, et per fibulam arcte compressis, compescuit lymphae per vasa lymphatica ascendens motum, et sic curavit feliciter.“ SWIETEN Commentariorum Tomo quarto, p. 189. ad §. 1228.

g) MASCAGNI p. 30. novem trunco vasorum sorbentium dissolutos in ulcere tibiali numeravit.

manat *h*); trium dierum spatio enim quinque libras lymphae effluxisse exigua apertura in interiore parte femoris vidit ASSALINI *i*).

Ad stillicidium compescendum et tale vulnus sanandum commendarunt: compressionem per splenia infra locum affectum imposita *h*), per fibulam arcte adstrictam *l*); agaricum *m*); aquam calcis cum Myrrha *n*). Spiritum vini *o*), Naphtham *p*), Vitriolum romanum *q*), immo difficilem admodum et aegre ob subtilitatem nimiam peragendam vasculi ligaturam *r*), quin causticum lunare sive lapidem infernalem *s*), eundem lapidem infernalem et spiritum vini, scilicet ne

h) IOANNES MUYS, De vulnere Vasculi lymphatici in eius Praxi medico chirurgica. Amstelodami 1695. Decade sexta, observat. tertia, p. 240. „Quotidie, ait, ingens copia aquae profluebat.“ Eadem vidit et PATEK, Autore SCHREGER in Beitrage etc. p. 184.

i) Loco citato, p. 54.

k) NUCK, loco citato. *Stamm* *Jenaischen Beschr.* 3 Bant. 1812. *Geleitung eines*

l) VAN SWIETEN, §. 1228.

m) BELL Capite 36. Sect. 6.

n) TH. WHITE On the struma. London. 1784. in Pragmatione. In laesionibus vasorum absorbentium quibus fungi succrescunt laudat;

Rx. Calcis vivae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

gum. Myrrhae $\mathfrak{z}\text{ij}$, teratur in Mortario marmoreo et add. Aquae bullientis $\mathfrak{lbj}$. Digeratur per dies aliquot et servetur ad usum.

o) A. MONRO Works Edinb. 1781. 4. p. 313. Histories of the Cure of Lymphatics opened in Wounds.

p) Ex amico habeo.

q) Idem MONRO, loco citato, et HALLER de Corporis humani Fabrica Tomo primo, p. 313.

r) BELL System of Surgery. Cap. 38. Sect. 6.

s) MONRO, loco citato.

tum supervenientia e vasorum ^{ab}sorbentium lae-
sione, quam e libera aëris admissione, expli-
cari posse videntur. BENJAMINUS BELL x) qui-
dem chirurgus dexterrimus Edinensis eam sen-
tentiam defendere studuit, sed pleraque eius
argumenta, vasa ^{ratione}sorbentia laesa potius, quam
aëris admissionem accusandam esse, indicant.

Dixit: „Aërem, ^{ut}pus quod forte antea opti-
mum erat, simulac incisione facta ad missus est,
illud mox in tenuiorem incoctumque ichorem trans-
mutare, pulsum celerem, sudores admodum
debilitantes, aliaque febris hecticæ symptomata ex-
citare, ac plerumque intra breve tempus mortem
aegri ^{inferre}accelerare. Saepius ipsi opportunitatem datam
fuisse haec observandi, qua ipsi constiterit, solum
aëris accessum causam pessimorum horum sympto-
matum esse. ^{Infimum}In primis haec eo cognosci, quod
plerique aegrorum, post apertum demum absces-
sum male se habentium, antea per longum tem-
pus absque ullo signo tumores purulentos maturos
fere gessissent. Simulac vero (sin solito latius
vitium erat) incisione larga aperiebatur, omnia
fere symptomata febriculæ, et haec quidem intra
duorum dierum minus spatium orta fuisse. Diffi-
cillimum quidem esse, hunc subitaneum aëris

- x) Treatise on Ulcers. Edinb. 1778. 8. BELLIO assenti-
tur inter alios et M. FODERÉ, Essai sur le Goitre
et le Cretinage. Turin 1792. p. 74 „L'Introduction
„seule de l'air rend souvent de très-mauvaise nature
„des ulcères fistuleux, qui sans cela auroient été très-
„benins.“

Mirr. A. Josephum Rajani

D 5 Collezione d'osservazioni, e riflessioni
S' Chirurgia. Tomo I. Roma anno VI. 1763. ~~ad~~ eadem repetere.

videtur
si non
eo impediret
ut per
genu
Rum
dinde licet
in gen
in, p
t
den Le. vel
to. affot
genu
con nichil
ne
frange
amatum
licet
impetum
et lant
fractur
fractur
fractur
fractur
fractur
fractur
fractur

21793.

illima
galla
mora

chobu

Sanctum vuln-
 rentis fassa-
 rem in panti-
 aqua frigida
 et Fr. Loeffler
 Jussieu & Co.

hic fissura
 Vulnus Venae fuit
 totum quo dicitur
 videri Luffa (et
 ut ne diffundat
 sanguine nixit
 in cute ferrea

effectum explicare y), nonnihil tamen irritationi
 aëris in superficiem exulceratam tribuendum esse.
 Aëre enim finibus vasorum absorbentium, in ab-
 scessum patentium, irritatis solito maiorem puris
 copiam in corpus resorberi; qui simul pus etiam
 magis corrumpendo efficaciam eius in producenda
 hectica augere possit. Experientia denique inno-
 tuisse, omnem materiam, et serum (pus ma-
 xime constituens) citius putrescere aëre admissio,
 quam excluso. Hinc ^{parva} setaceo non magna plaga ab-
 scessum magnum incidi, commodissimum esse,
 exemplis comprobatur; praecipue autem requirere
 hanc methodum partes glandulosas abscessibus af-
 fectas, cum magis adhuc magna plaga ibi ^{plac} no-
 ceat. “

Sed per singula eundem, quae ad abrogan-
 dam hanc sententiam me moverunt.

Dicit primo: Aërem admissum pus, antea
 optimum, in ichorem mutando, febriculaque
 excitata, mortem hominis accelerare. Equidem
 eum, qui diligentius vasa absorbentia lustraverit,
 ea omnia incisionem hanc subsequenter sympto-
 mata, ex ipsorum laesionibus explicari posse,
 intellecturum opinor. Vera observavit Cl. BELL,
 sed aliter explicanda; adspicias enim modo ta-
 bulas HEWSONIS et MASCAGNII, parvum profecto
 vasorum lymphaticorum numerum, si cum na-

y) Egregie causas horum phaenomenorum explicavit,
 ANKENETTY in surgical observations, on Lumbar Ab-
 scesses.

VULNERA VASORUM ABSORBENTIIUM. 59

tura comparantur, exhibentes, et fingas tibi sectione longitudinali brachium vel pedem circa articulos incidi, vel abscessum magnum aperiri, lymphaticorum truncorum adscendentium orificia secta haud contemnendam exstillabunt humoris quantitatem. Notissimum est, post venae-sectionem vel etiam articuli laesionem interdum exstillare humorem limpidum, vulneris glutinationem impredientem. Inepte illud e laesione tendinum antiquo errore explicant. Veteribus, ut Celso Libro quinto Capite 28. dicenti, „ex carne pus laeve, album, copiosius fertur, „at ex nervoso loco coloris quidem eiusdem, sed „tenuius et minus, ex nervo pingue et oleo non „dissimile,“ ignoscendum, quia ea vasa nota non habebant; at recentioribus veros eius humoris fontes nostra aetate notissimos, ignorantibus eadem venia non danda. Idem autem in hoc casu fieri, non improbable est; magna enim copia effusae lymphae quotidie amissa, brevi certe tempore toto corpore debilitato febriculam excitabit.

Deinde, quod tam brevi tempore id accidat, a vasis absorbentibus laesis potius quam aëre id fieri demonstrat. Tot enim oris vasorum absorbentium lata plaga apertis ingentem copiam humoris ad vitam necessarii brevi tempore effundi posse, negari nequit, quanquam vice versa, quo modo aër tam brevi tempore id peragat, acrius, ut ipse confitetur, comprehendi possit. Cur

in hunc
viri non
co impedit
ut frangi
gentium
Nunc
deinde licet
in gressu
m, prorsum
+
ven. le. vel
so. affet
genu
in nuchae
ue. franga
ematurum
licet digne
impeditum
et lantia
ductus
i. pectus
vna. pedum
toni
pauca
venerat
cunctis

1798.

foit

illina
malia
morp

chobii

Sanctum vultu
lentis facie
tem inquit
aqua frigida
H. Fr. Loeffler
Jefferson v. 10

pro fissura
Vulnus Venae furi
bosum quo dicitur
videt Lentin &
vixit in vixit
fugit in vixit
in vixit forma

eamdem autem puris quantitatem, ante ferro aper-²tum abscessum, vasis scilicet nondum sectis, gerere poterant? quum horum vasorum sectione effusae lymphae, imprimis febricula excitata, tribuenda sit.

Deinde adfirmat: *Difficile esse, huius aëris tam subitaneum vehementemque effectum explica- re; nonnihil tamen irritatione aëris in superfi- ciem exulceratam tribuendum esse. Aëre enim stimulata ora vasorum lymphaticorum majorem puris copiam resorbere, et hinc oriri tabem.*

Difficile hanc aëris vim intelligi, lubentis- sime concedo. At lympham sectis illis vasis, et quidem ex ea parte, quae infra sectionem est, effundi, quis negare sustineat? Nullam tamen omnino particulam puris resorberi, ideo non reiicitur.

Tum contendit: *Pus simul aëre admissio putridius redditum, generationi febriculae inprimis favere. Experientiam docuisse, serum, pus constituens, citius putrescere aëre libero, quam excluso.*

Haec sententiae meae inprimis favent. Nonne enim hoc serum, hocce pus, citissime, ipso consentiente, in corruptionem ichoremque ver- sum, lympham ipsam? Sicuti enim, pus in loco affecto nonnumquam parari, negari nequeat, ut etiam Vir clarissimus alio loco praecepit, sic et tali in casu ichorem ibidem, materia maxime vasis lymphaticis suppeditata, gigni atque con-

strui, vix dubitandum, aëre insuper libero, si placet, auxiliante.

Hinc *setaceum*, methodo ab ipso descripta adplicatum, *magna plaga ad aperiendum abscessum praeferendum esse*, proponit. Lubentissime egregio Viro adstipulamur in exercenda hac saluberrima methodo, quam ratam pluribus exemplis comperimus, quanquam aliis argumentis ad eam adducti. Primo, hanc methodum vasis lymphaticis parcere, non est, quod demonstrem. Deinde, si tanta cura aëris admissio vitanda esset, vel hac methodo eam arcere-
mus? Equidem credo, hoc in casu aërem arceri omnino non posse; vel si hoc etiam negemus, per spatiola, inter funem setacei et vulnus relicta, ingredi. Tum sin in abscessu adeo pertimescendus esset aëris adgressus, cur in aliis vulneribus, cur in aliis superficiebus, v. c. in amputatione Mammae vel Femoris, non de eadem re solliciti fuerunt chirurgi?

Postquam haec scripseram, apud HALLE-
RUM lego: z) „Ex lymphaticis etiam vasis
„prodeunt insignia stillicidia lymphae, quae ex vul-
„neribus circa cubitum, occasione sectionis venae
„inflictis, passim succedunt, et quorum exem-
„pla ipse vidi, ut aegerrime ea aquula plurimo
„vitriolo imposito demum compesceretur.“ Ea
occasione citat C. M. ADOLPHI, J. BOHN, ZA-

z) De Corporis humani Fabrica. Tomo primo, p. 318.

anhem
vi non
eo impediret
ut pro
ingressum
dum
deinde licet
in gang
in, pro
et
vicia le. vel
so. affet
gum
non nichil
no foranga
acuturum
dicandura
impetum
no lantia
ductus
i. p. d. b. u.
v. h. a. p. d. u.
d. t. o. n.
p. a. i. n. a. m.
p. e. c. t. u. r.
v. a. c. u. m.

in intestinis
an in Emphy-
semata non dolo
noxius aër habe-
tur?
Ulceri faucium q. f. o. s.
aër expositus, quod
facile
paratur.

1798.

Ulceri
facili
muri

phobis

RINI, A. MONRO, STALPART VAN DER WIEL, SCHOUTEN.

Egregie haec mea sententia confirmatur TH. KERCKRINGI a). Observatione in fistulosis cruris vulneribus vinculo infra genu applicato, fluxum humoris perpetuo stillantis cessare quidem, sed, quod infra ligaturam est, intumescere; ~~et~~ merito inde concludit; fistulositatem istam vulnorum externorum et oedematosas hydropicasque plurimas internas constitutiones a vitio lymphae lymphaticorumve vasorum capere originem.

Pari modo KIRKLAND b) ^dasserit, se sanasse abscessus lymphaticos prope articulationes incisione, quos setaceo ad sanationem ducere nequibat; aërem cum setaceo in abscessum insinuari, et ^{antra} pus blandum reddi acre.

Etiam SHARP c): „I do not think, the air „has that ill effect on sores as is generally conceived, nor would the large abscesses on breasts „which are often exposed to the air the whole „time of cure do well if it was so very pernicious as is represented — But as it tends to „make a scal and in winter is a little painful „to the new flesh, it will be right to finish „the dressing as quick as may be without hurrying.“

a) Spicilegium anatomicum. Observatione 91.

b) Inquiry into the present state of Surgery. Volumine secundo, p. 112. et seqq. p. 123.

c) Introduction on Surgery, p. 17.

*Sanatum vult
brantio fassu
tem infuso
aqua f. rida
H. Fr. Loeffer
Jessey & Co*

*Pro fistula
Vulnus Venae f.
bocum quo dicitur
videt. Contra &
ut ne iurissimile
fanguine mixt
in tota forma*

*Emat qui vult ingrederi
vultu abscessu notum
patet. P. Camper.
de optima agendi vel
expectandi ratione
pag. 647.*

in
 in
 deo impedit
 ut
 in
 in
 in

Hinc in infans
 a. interperior et
 incomptuor vulnora
 is plopato inflictorum in gony
 penulafas fructum
 offerant.

John Hunter. 2) inden Le. vil
to affot
der per se mon ut
gennem hvidt

Goet- corpus putredine
49 in fava, p^{er} non nuchae
ultra in l^ona frangu
p^{er}purant^{er}
agit, laedit, acmationem
h^off. B^o iliciduen
ard B^o impo^{er}tem
med. argum^{er} catthas
inaxim. b. fractus

ærem
non computat in ulceribus.

Campes ~~pro~~ intata opera demonstrat acem
epe Remoires pour le Trig de l'Acad de Ch.
Tome V. p. 949 remota ista Trig in
diffinitionibus decem ad Herbell. &
estitit

common view on
 Wilson Land. 1797. p. 126. for the inoffense
 - is on the opinion
 that atmospheric
 air contained some
 thing that irritated
 and excited inflamma-
 tion. Sufficient
 proofs have been esta-
 blished that air has
 "no fresh property"

and excited inflammation, sufficient
proofs have been obtained that air has
"no fresh property"

illius
qualia
dura

+ de Arsenici usq. Norim. 1811

*) *For on the Blood-Lord 1794. pag. 374.*

Gregory's address in argumentis demonstrat acris admiſſionem innoxiam in civitates
 J. Haughton in Medical Records and Recorder of a private Association. Lond. 1798.

RINI, A. MONRO, STALPART VAN DER WIEL,
SCHOUTEN.

Egregie haec mea sententia confirmatur TH.
KERCKRINGI a). Observatione in fistulosis cru-
ris vulneribus vinculo infra genu applicato,
fluxum humoris perpetuo stillantis cessare qui-
dem, sed, quod infra ligaturam est, intum-
lescere; et merito inde concludit; fistulosi-
tatem istam vulnerum externorum et oedemato-
sas hydronicasque plurimas internas constitutio-

eadem opinatur A. Ruff in Salzburgerische
Med. chir. Zeitung 1813 N. 56.

Wroczna
Venaum ~~venarum~~ dictam digito indur applicatum
glandular axillares tumores reddit

Bancroft

ant. Emmert - p. 2. Medical Critic 4. pag 185.

Errant qui non ingreditur,
intra abscessus novum
patent. P. Camper.
de optima agendi vel
expugnandi ratione
pag. 697.

which are often exposed to the air the whole
time of cure do well if it was so very perni-
cious as is represented — But as it tends to
make a scal and in winter is a little painful
to the new flesh, it will be right to finish
the dressing as quick as may be without hur-
rying.

a) Spicilegium anatomicum. Observatione 91.

b) Inquiry into the present state of Surgery. Volumine
secundo, p. 112. et seqq. p. 123.

c) Introduction on Surgery, p. 17.

Hinc et A. G. RICHTER d) ^{injectionem} aperitionem genu
cum cultro vetat; plerumque enim, monet,
nil nisi serum sanguinolentum effluere, violenta
insequi symptomata saepe cum periculo iuncta.

Hinc in universum abscessus solito rarius
aperiendos docet PETRUS WEIDMANN e).

Nec non mihi assentiunt JOSEPHUS CLAU-
DIUS ROUGEMONT f), et BASILEWITSCH g).

d) Medicinische und Chirurgische Bemerkungen. Goet-
tingen 1791. Tomo primo, Capite ultimo de Fungo
articulari.

e) ~~In Opere classico de Necrosi.~~ Francofurti 1793. fol.
p. 14. et in F. E. A. BRUNNERT Dissertatione de Ab-
scissibus solito rarius aperiendis, Wirceburgi 1793. 8.

f) In libro egregio Handbuch der chirurgischen Opera-
tionen für Vorlesungen. Erster Theil. Bonn 1793. 8.
p. 204.

g) L. c.

VENENA.

§. XXVIII.

Eadem symptomata ab Arsenico externe ad-
plicato oriuntur, quae ab interne sumto Ar-
senico excitantur, ut docte demonstravit HAN-
NEMANN a). ^{in primis vero Ch. H. Harter}

A Vinis plumbo mangonisatis vasa absorben-
tia coarctari, et atrophiam oriri b).

Venena alia, praesertim saturnina, inge-
sta quandoque glandulas lymphaticas in tumo-

a) Ueber die Arsenikvergiftung, Leipzig 1786.

b) BASILEWITSCH. Loco citato.

+ de Arsenici usu Nürnberg 1831
*) See on the Blood Lead 1794. pag. 374.

"I have seen more than once, very troublesome inflammations of the
absorbent vessels of the leg and thigh, with a chain of abscesses along
their course, arise from the application of Mercurius nitrat. (Barytina,
ruben) to joints of the leg." John Johnston. on mineral poisons. in James Johnston
Medical Essays. Everham 1798. p. 61.

Egregio, admodum argumentum demonstrat aeris admissionem innoxiam in caritates
J. Johnston in Medical Lectures and Researches of a private Association. Lond. 1798.

ENTUM.

N DER WIEL

firmatur Th.

stulosis cre-

applicato,

cessare qui-

est, intu-

listulosis-

cedemato-

constitutio-

urgische

1813 N. 36.

indice applicato

er reddit

4. pag. 185.

the whole

very perni-

it tends to

little painful

ght to finish

without hur-

de 91

gery. Volume

RABIES CANINA.

65

parti impositum, glandulae axillares; — si Lumbis, Abdominis parti inferiori, Femoribus, Cruribus, vel Pedibus impositum, glandulae inguinales intumescunt et dolent.

Simulac vero cantharides removentur, etiam glandularum tumor et dolor evanescere incipiunt.

Eandem vero stranguriam excitare cantharides vel adinstar vesicatorii, vel in tinctura applicatos, vel interne sumtos, vulgatissimum est, dummodo quantitas sufficiens Cantharidum absorbetur, et ad renes deferatur.

MASCAGNI a) glandulas nostras obstructas invenisse vult in corporibus eorum, quibus vesicatoria adplicata fuerant, quod tamen nimium videtur.

Potentissimum remedium adversus Cantharides oleum unguinosum inguinibus illinitum b).

a) Loco saepius citato.

b) MOENCH Materia medica 1789. p. 170.

RABIES CANINA.

§ XXX.

Terribile Rabiei caninae Miasma Vasorum absorbentium, minime Venarum sanguiferarum a),

a) Non ignoro, Cl. Chirurgum Anglicum BLIZARD (Goettingische gelehrte Anzeigen 1787. Stück 89. p. 889.) et LUDWIG Professorem Lipsiensem in versione germanica MASCAGNI p. 167. asserere: per Venas sanguiferas invadere istud venenum corpus nostrum. Neque ignoro, CAROL. FR. BADER germaniae Medicum

SÖMMERRING, DE MORBIS.

E

Emplestrum cantharidem capiti adhaerens ut non parum acris adeo impeditur lymphae cursum, ut per tota in truncum intumescit affurgetur biduum manentem, qui deinde lenta forma defecit in ganglionem et collum, proinde ex toto defecit

Heberden L. vel p. 60 affert

Can autem vesicatorium nuchae impositum propter frangibilem crustam vel haematum exigit facile explicandum vesicatorium nuchae impositum immediate quasi virus cantharidis impellit, per ductus thoracicos utroque, per vias vero impositum lymphae pedum pelvis per testiculos, per urethram et ipsius cordis temperaturam antiquam in cor pervenit.

1798.

note p. 143 p. 143

illina malia moria

"no doubt can remain, that the lymphatic veins were affected in hydrophobia" Andrew Marshall. Morbid Anatomy of the Brain. London 1815. page 106.

E summa autem vasorum absorbentium irritabilitate patet, quam ob causam substantiae irritantes inprimis canis rabiosi venenum, osculis vasorum absorbentium applicatae non illico absorbentur g).

ligatura
Hinc apparet cur membrum applicata
absorptione impeditur. x)

Hinc apparet etiam, cur excisio h), vel ustio i) loci laesi, tempestive administrata, solum infelix remedium haberi possit. *semel cum cautum*
For san canis morbo vasorum absorbentium structura vel
statura vel alio modo ita mutatur ut absorptio tandem cesset
donec (clausa vel morte vel anno) vasorum absorbentium reparationum opera corpus intret et
Neque causticum loco laeso applicatum *V.C. Lapidis caustici chimurgorum*
solutionem x)
minimo contemnendum.

Reliqua remedia vero sic dicta interna venditata pro specificis antidotis, vana, cum profecto, si etiam aliquid efficaciae contra illud miasma habeant, certo nimis parva quantitate ad locum laesum veniunt, quam ut aliquid ab illis expectari possit.

Nullis ergo remediis praeter topicis fidem haberem.

- g) Interdum hoc virus per *tres* quinque vel sex hebdomadas in cellulosa tela haeret, auctore CRUKSHANK edit. ali. iter *ordo mensis. Roux l.c.*
p. 134.
h) Solam excisionem iuvare, sex casibus comprobatur J. For — In Medical Facts and Observations, Volumen third Articul. 5. *Barbington in Medical Records. Lond. 1798.*
i) MEZLER et JOHNSTONE, Memoirs of the Medical Society of London 1787. Volumine primo.

Bergengrün scripsit haec methodum bene cum paucis adhibuisse affirmat. Grosse in Varsavia vivens
is in Varsavia vivens
1774.

xx Moderer Methodus facilissima
et certissima homines et animalia
unita a bellis rabiosis admodum
conservandi Vindoburgi 1784.

+ *Baronio* *Tigli inest animalis. Milano. 1804.*

ICTUS SCORPIONUM.

§. XXXI.

Observante MOSELEY a), ab ictu scor-
pionis ^{wolnus} inflicto ⁱⁿ pedis digito ⁱⁿ minimo ⁱⁿ Feminae
post ⁱⁿ adplicatum ⁱⁿ Spiritum ⁱⁿ vini, ⁱⁿ dolor, ⁱⁿ e ⁱⁿ pede
transiit ad inguen; postea versus stomachum et
collum ⁱⁿ adscendebat; ⁱⁿ tremorem ⁱⁿ deinde, sudo-
rem ⁱⁿ frigidum, ⁱⁿ languorem, ⁱⁿ quin ⁱⁿ diarrhoeam, et
deliquium ⁱⁿ animi ⁱⁿ exortabat; ⁱⁿ manifesto argumen-
to: et hoc venenum per vasa absorbentia corpus
intrare.

Ligaturam strictam autem suadet, ad ulte-
riorem ⁱⁿ Veneni ⁱⁿ progressum ⁱⁿ impediendum b); quum
notum sit, tali ⁱⁿ ligatura ⁱⁿ lymphae ⁱⁿ cursum ⁱⁿ sal-
tim retardari, ni omnino inhiberi.

a) On tropical Diseases, p. 25.

b) Idem Consilium iam GALENUS de Locis affectis Libro
tertio, Capite septimo, dederat.

MORSUS SERPENTUM.

§. XXXII.

Per morsum serpentum vel viperarum com-
municatum generi humano ⁱⁿ venenum, hoc syste-
mate corpus invadere, ex hoc demum perferri
in ⁱⁿ Venas ⁱⁿ sanguiferas, et ⁱⁿ sanguinem ⁱⁿ coagulare,
demonstrant tumores glandularum, ad quas vasa
absorbentia, in loco laeso orientia, perveniunt.

Thomas Winterbottom. on the
Native Africans ⁱⁿ the
Neighbourhood of Sierra Leone.
London 1803. Cap. X. ⁱⁿ infia
pag. 190. ⁱⁿ ab ictu ⁱⁿ paffina
ⁱⁿ morum ⁱⁿ dolor ⁱⁿ ad ictu
ab ⁱⁿ araneat ⁱⁿ avicularia ⁱⁿ puncto
digito, ⁱⁿ dolor ⁱⁿ vespis ⁱⁿ axillar,
procedunt etc.

Benj Smith Barton. Memoir
concerning the ⁱⁿ serpentine ⁱⁿ Family
of the ⁱⁿ rattlesnake ⁱⁿ Philadelphia
1796. ⁱⁿ Medical Repository New
York. Vol. I. 1798. p. 86

Experimentis Cl. FONTANAE a) interim satis constare videtur, Viperarum venenum¹⁷⁷⁴ ore assumptum minime insons, sed tantum minus noxium esse, quam vulnere applicatum.

Eius Observationis varia ratio cogitari potest: etenim, dum in ventriculum demittitur istud venenum, non modo variis humoribus, v. c. saliva, succo gastrico, temperatur, sed etiam obtunditur, mutatur, et saltem ex parte iners redditur, adeo ut ex parte vera maneat, quae CELSUS habet: „Non gustu, sed in vulnere, nocet — et quae LUCANUS cecinit:

„Noxia serpentum est admisto sanguine
pestis;

„Morsu virus habent, et fatum dente
minantur:

„Pocula morte carent.“

Dolendum autem quam maxime Cl. F. FONTANAM in experimentis innumeris fere, ab eo circa Viperarum venenum^{venen} institutis, non attendisse ad statum glandularum sorbentium: praeter ea enim, quae Tomo primo p. 303. circa vasa absorbentia habet, et quae ~~verboten~~^{at verbum} hic transcribere liceat, in toto voluminoso opere ne verbulum, quidem de statu systematis lymphatici post morsum viperarum addidit.

„Je finis en rapportant en peu de mots deux
„expériences faites sur deux Lapins, auxquels

a) Traité sur le Venin de la Vipère, sur les Poisons américains, etc. Florence 1781. 4.

„j'avois coupé dans le Bas-ventre tous les Vais-
 „seaux lymphatiques, que je puis trouver, et
 „jusqu'au canal thorachique. Une heure après
 „cette Opération je le fis mordre aux jambes
 „couvertes de leur peau, par trois Vipères à
 „plusieurs reprises. Au bout de six heures, les
 „jambes présentoient les signes les plus certains
 „de la maladie du Vénin. La jambe étoit livi-
 „de et enflée, et rendoit beaucoup d'humeur.
 „Ils moururent au bout de dix-huit heures.“

„N'espérant rien de la continuation de cett^es
 „expériences, et voyant, que l'arrêt de la Cir-
 „culation de la Lympe et du chyle n'influe point
 „sur les effets ordinaires du Vénin de la Vipère,
 „j'ai cru ne devoir pas aller plus loin.“

At vasa lymphatica non modo nimis subti-
 lia sunt, in cuniculis, quam ut sine subtilis-
 sima dexteritate in illa inquirere possit, sed
 etiam alter ductus thoracicus adhuc supererat,
 quem forsan incognitum tum temporis habuit
 Autor clarissimus.

Hinc nihilominus certi esse possumus, per
 vasa absorbentia in corpus animale serpere istud
Viperarum ^{venenum}, cum alias vias ad sangui-
 nem quaerere, absonum sit.

Crotali horridi virus nimis acre esse, quam ut
 a vasis absorbentibus nostris recipi possit, opina-
 tur CL. WILSON a).

a) On the Influence of Climate, p. 165.

VIRUS VESPARUM.

§. XXXIII.

A Vespis inmissum Venenum inflammationem tumoremque glandularum proximarum excitare, quotidie oculis nostris cernimus, prouti, si auctoritate opus esset, ASSALINI a) exempla in medium protulit.

a) Pag. 56.

PUNCTIO CULICUM.

§. XXXIV.

Punctionem copiosam culicum pipientium inflammationem veram cum rubore, tumore et dolore ciere, adeo ut vasa absorbentia cutanea ipsa striarum rubrarum adinstar sese prodant, quin et glandulas proximas in tumorem tollere, quotidiana experientia, imprimis tempore aestivo, in locis paludosis docet, adeo ut dubium nullum sit, et culicis emissum venenum hoc vasorum genus invadere.

MALUM VENEREUM.

§. XXXV.

Vasa absorbentia, accepto viru^s venereo, saepissime funiculorum vel chordarum adinstar turgent^x, et quae sub cute ex illis decurrunt,

E 4

gutberlet in Selbst Samml. selbstem in aufserst Beobachtungen etc 1812 Dritter Band

F. Howard l.c. p. 63.

ipso tactu et visu facile dignoscuntur, et sectionibus post mortem, foedo illo miasmate plena, manifestantur.

miasmate

Pari modo et horum vasorum glandulas, accepto hoc viru, plerumque in bubones sic dictos abeunt; manifesto ^{etiam} ~~perfecto~~ argumento: *Vasis sorbentibus solis a) tribuendam esse infectionem veneream, omniaque inde mala prono quasi alveo profluere.*

Ubicumque *b)* enim miasma venereum corpus ^{immediate} attingit adeo ut vel ulcus venereum, vel gonorrhoea, vel fluor albus oriatur, saepissime glandulae vicinae, ad quas nimirum ii trunci perveniunt, per quorum radices istud miasma irrepsit, in tumorem vulgo bubonem dictum tolluntur, quin ipsa ista vasa absorbentia inflammantur.

Sic ^{etiam} ut egregio exemplo illustrat JESSE FOOTE *c)*, oculorum gonorrhoea oriebatur ab urina, qua aeger semihora post impurum concubitum oculos suos lavabat.

John Howard on the Venereal Disease
London 1797 p. 28. 29. 34

pag. 35. *The system of the absorbent vessels is the common channel, by which (venereal) infection is conveyed into the blood; and I am of opinion that the absorption commences from the instant the poison touches a wound or denuded surface.*

Vol. 2. p. 46. The absorbent vessels are certainly the canals by which the venereal poison enters the circulation, and they may perhaps be the outlets by which it escapes etc.

a) Iam omnes recentiores Pathologi in eo uno ore conveniunt: Morbum venereum in Systemate sorbenti contineri. — Confer inter multos Auctores Triumviros classicos. *ASTUC, HUNTER, CIRTANNER.* Ueber die venerische Krankheit, Goettingae 1788. Capite 8. In huius editione 1793. huius operis omnia, quae ad Litteraturam pertinent, continentur.

b) Bubonem non in inguine solum, sed ^{tantum} ~~ubique~~ ^{omnibus} in corpore oriri, ubi glandulae reperiuntur, *BELL, System of Surgery.* Volum. quinto, Cap. 38. §. 7. p. 405.

c) A complete Treatise on the origin, Theory and Cure of the Lues venerea. London 1792. 4.

Sic glandulae ^{ab}sorbentes prope parotidem, vel prope maxillam inferiorem, collique in lateribus sitae, tument a resorpto viru venereo, vel ex ulceribus gingivarum, linguae, palati, faucium, promanante *d*), vel ex ulceribus labiorum vel oris per osculum accepto hoc viru, vel ex poculis hoc viru inquinatis *e*).

Sic ^{ex} papillarum mammae rhagadibus, scissuris, et ulceribus venereis in nutricibus tumores glandularum suppositarum basi mammarum vel axillarum ^{tument} observantur *f*).

vel super claviculas

Sic etiam cum lacte vel saliva ^{mixtum} virus venereum inficere, observarunt *g*).

Sic ^{an}atomicos vidi, cadavera ob veneream labem sordida lustrantes, quum infortunio vel cultro inquinato, ut plerumque fit, digitum laesissent, nonnunquam in loco affecto ulcuscule excitato, ^{hic} absque mercurio aegre sanabili, laborantes. Interdum vero idem virus, ulterius in brachio adscendens, vel vasa absorbentia inflammatione corripit, vel glandulam, prope

d) Astruc De Malo venereo. Venetiis 1748. Libro secundo, Capite tertio, p. 155.

e) Infectionem veneream per pocula communicari cum aliis posse, solidis satis argumentis et testimoniis stabilivit GRUNER: Die venerische Ansteckung durch gemeinschaftliche Trinkgeschirre aus Theorie und Erfahrung bewiesen. Lipsiae 1787. 8. — Hunc infectionis modum vero negat JOHN HUNTER, loco citato.

f) Astruc. Loco citato, p. 122. et 317.

g) Astruc. Loco citato, p. 317.

*visatur
in radice
cervicis ut
tunicarum*

F. Howard l.c.

processum anconeum sitam h), vel glandulas circa vasa sanguifera brachii sitas, in suppurationem inflammationi supervenientem vertit. In aliis vero, digito miasmate venereo valde vitiato, idem virus per truncos, nimirum non ad has neque ad alias in brachio sitas glandulas peruenientes, sed altius delatum, glandulas axillares multavit i), quinimo luem universalem excitavit k).

h) modo Sic infantum genitalia sauciata digitorum unguibus nutricum venerearum, isto viro foedantur l).

h) Vasa absorbentia Penis, a glande et praeputio orta m), per totum dorsum eiusdem lu-

h) *SHELDON*, Anatomicum Londinensem, huius rei perpetuum brachio inustum vestigium gerentem vidi; glandula enim ista praeter solito maiorem duritiem et tactu et rubore cutis et cicatricula proditur. Huius rei etiam mentionem fecit *WILLIAM HUNTER*, Medical Commentaries, London 1777. Parte prima, p. 9. Similia narrat et *CRUIKSHANK*, Anatomy of the absorbent Vessels, p. 27.

i) *CRUIKSHANK*, p. 14.

k) *SWEDIAUR* Practical Observations on the more obstinate and inveterate Venereal Complaints. Lond. 1784. p. 94. — Casum refert, quo digitus scalpello viru venereo inquinato vulneratus, ulcus mali moris, cum dolorifico et obstinato tumore glandularum axillarum, et symptomatibus universalis infectionis ciebat.

l) *A. HINZE* apud *STARKE* Archiv Band 4. Stück 1. Artikel 10.

m) Vasorum sorbentium sic dicta orificia, quae non modopinxit *WATSON*: Philosoph. Transactions, Vol. 59. p. 392. sed per quae etiam virus venereum corpus absque locali affectione ingredi posse, et quorum obstructionem vel conferruminationem stillicidii aegre curabilis causam esse scripsit, anatomicis idoneis non comprobata sunt.

*Non unquam attenti
idem virus digito
infiltratum in laterali
usque vasis glandulas
non tetigit, ut solas axillares glandulas
cominaret quoniam
luem generaret*

*John Howard
London 17
pag. 35. 4
absorbentia
common
(venereal) is
into the 6
opinion the
commence
the profo
or deau
Vol. 2. p. 46
the virus*

^{miasmate} dentia, ~~viri~~ venereo turgida usque ad glandulas superiores in bubones per illud miasma transmutatas, exporrecta digitis et post mortem etiam oculis n) sese offerunt. Atque hic eo melius percipiuntur, quo aptius hoc membrum ad illud experimentum exstat; non enim pinguedine, ut reliquae corporis partes, circumfunditur. Neque haec in cole tantum, sed et reliquis in partibus observantur, adeo ut virus venerei viam presso pede quasi legere possimus.

Durities ista vasorum ^{ab} ~~sorbentium~~, ^{miasmate} ~~viri~~ venereo affectorum non tam, ^{a crassescitibus membranarum} ~~ab~~ ~~incrassatione~~ ~~tunicarum~~ et appositione lymphae ad parietes internos eorum, quam potius ab inflammatione in telam cellulosa circumiacentem transeunte o), oriri videntur p).

Ex sententia CRUIKSHANKII glandulae inguinales gonorrhoea *sympathice*, ab ulcusculis vero venereis (Chancres) *specificè* tument.

Interdum enim tumores glandularum inguinalium in ipso morbo venereo a sola inflammatione vasorum absorbentium oriri videntur, prouti a sola punctione digiti glandulae axillares intumescunt.

Lacunas enim glandularum mucosarum ductusque excretorios prostatae esse patet, prouti etiam MONRO et CRUIKSHANK observarunt.

- n) STOLL, examinans viri gonorrhoea virulenta laborantis cadaver, invenit, praeter urethrae superficiem internam rubram, et vasa absorbentia duo praeter naturam alba et distenta, Auctore SWEDIAUR, loco citato, p. 18.
- o) Confer quae paragrapho de Inflammatione attuli.
- p) JOHN HUNTER, loco citato.

videtur
in catarr
reus est
tumorem

Hinc in corporibus scrofulosis a sola irrita-
tione virus venerei in gonorrhoea a bubones
nasci non venereos sed scrofulosos, mercuriali
unguento discutiendos, arbitrantur q).

Facilius etiam glandulae inflammantur, quam
vasa absorbentia, quoniam facilius in iis miasma
venereum (vel potius lympham ab illo miasmate
coagulata) stagnat; plerumque tamen magis ab
aucta resorptione, quam ab obstructione, glan-
dula in tumorem tollitur.

Neque mirum, viros facilius ulcusculis mul-
tari, quam feminas, quum labia pudendorum per-
petuo scateant copioso muco, miasma illud partim
abluente, partim temperante, partim a cute arcente.

Minus certa adhuc videtur quorundam r)
assertio, scilicet: Sanguinem hominum vene-
reorum, vulnere hominis sani adplicatum, si-
phylidem excitare.

Alio etiam modo istud virus corpus huma-
num exagitare videtur. Contagio nimirum iam
antiquo, quod in lue venerea lympham inficit
et inspissat, unde facilis eiusdem decubitus in
has illasve glandulas, ubi primum frigus exter-
num, vel ictus, attritus pressusve fortuitus ido-
neam dederit occasionem s).

Dixit Monro t): Lucem veneream in coitu

q) JOHN HUNTER, loco citato.

r) JESSE FOOTE, loco citato.

s) ASTRUC, loco citato, p. 217.

t) De vasis lymphaticis valvulosis, Edinburgi 1770.
p. 84. — Pari modo et HENSON: „It is in these

F. Howard l.c.

quomodo rare
poterant, virus venere-
um non plura
vel ulcusculis, sed
etiam atque ulla
inflammatione
glandulae affor-
centia transiit in
sanguinem

(Howard Vol. 1. p. 194)

John Howard
London 17

pag. 35. 4

absorbent

common

(venereal) is
into the 6
opinion the
commence
the possi-
or venere

Vol. 2. p. 46

the virus

impuro conceptam, in glandulis inguinalibus, supremo loco iuxta Musculi obliqui externi Abdominis tendinem sitis, haerere; dum caeteras ~~scilicet~~ inferiores glandulas haud, nisi rarissime, attingat; istas autem (ut iam MASCAGNI Tabulae omnium optime declarant) a genitalibus, has vero a pedibus lympham accipere; quibus adhuc addidit in praelectionibus: quodsi praeter superiores istas etiam inferiores glandulae inguinales intumescant, signum esse, virus venereum non recentissime in corpus receptum esse, sed iam e massa sanguinis contaminata in eas glandulas depositum esse, atque luem toto corpore diffusam hominem exagitare.

In gonorrhoea virorum et fluore albo feminarum, ^{in primis} male suppressis illis turpissimis fluxibus, ^{absque} ulcusculorum in parte affecta suspitione ulla, bubones oriri, quotidiana experientia comprobatur.

Minus recte id explicat HEWSON per vasa absorptentia, quae nulla salutata glandula in ductum thoracicum perveniunt.

Minus recte etiam CRUIKSHANK u) credit, glandulas in pelvi a ^{mixta} venereo non inflam-

upper glands alone, that the lymphatic Vessels of the Genitals enter, so that the venereal bubo, is always seated in these upper glands, and the lower are never affected, except by the regurgitation of the matter. — In Inquiries of the lymphatic system. Capite tertio.

u) Loco citato, p. 73. et 118.

Ulex in praecipuo
bubone, ulcus
in glande, vero
non bubonem
exagitat.

Coniunctum
p. 153. (Lug. de Bell)

In universum
glandulae profundae
sunt sitae rarius
in suppurationem
expirantur quam
et cetera
glandulae profundae proprie

de Bell.

videtur
90 in casu
venis est
tenuiorum

It seems probable that the Venereal poison in some cases, enters
at the orifice of the Lymphatic Vessels; for it sometimes occasions
a Bubo, without a previous Gonorrhoea or Chancre.
Mém. outines of the Acad. H. B.
Eras 1813 Vol. 2. p. 296.

mari; saepius enim Cancrum^o uteri venereum^o
glandulas pelvis male afficere vidi.

^{quare non} Non ideo improbabilis sententia, virus
venereum prima glandula egressum, dum secunda
in glandula continetur, temperari vel mitius
reddi.

Cum porro sectiones docuerint, vasa absor-
bentia, in utroque Penis latere orta, proceden-
do coniungi, non mirum est, interdum bubo-
nem etiam in latere a Cancro venereo intacto
oriri, quamquam plerumque in latere affecto
oriatur.

Suppurationem
non in ipsa substantia
glandulae affectae
sed in substantia ejus
locum occupante

U. Howard l.c.
Vol. 1. p. 27.

Bubone venereo (sin ulterius non processe-
rit malum) exulcerato vel exciso x), saepe
virus venereum brevi tempore e corpore elimi-
natur, et in integrum restituitur aeger y). —
At inveterato malo et ulcere oborto, ipsa arte-
ria femoralis arrosa, haemorrhagia aegrum
subito necavit z).

Ad sanandum autem bubonem inguinalem
frequenti experientia comprobatum habeo con-
siliu, quod mercurium non solum buboni
et inguinibus a), sed etiam peni ipsoⁱ, vel va-

x) CRUIKSHANK.

y) Mr. FARRÉ pense, que le danger de la Verole est moins
grande, lorsqu'il survient aux chancres dans les glandes
les plus voisines, un bubon, qui se termine par une
suppuration louable et abondante — Cui assentitur LOM-
BARD sur l'utilité des Evacuans dans la cure des tumeurs
etc. p. 101.

z) HUNTER autore CRUIKSHANK, p. 118.

a) BELL. System of Surgery. Cap. 38.

John Howard
London 18

pag. 35. 3

absorbent

common

(venereal) in

into the 6

opinion the

commences

the poison

or second

Vol. 2. p. 46

the virus

ginae, id est, propius locis, per quos virus corpus ingressum est, vel ad vitandam omnem ulteriorem irritationem partium affectarum, plantis pedum inungendum suadet; tali enim modo applicatum nobile hoc medicamentum efficacius redditur, et presso quasi pede virus in itineris primo iam stadio ^{cautius} ~~prosequendo~~ debellat atque vincit.

Interne autem sumtus mercurius virus venereum vix ante ductum thoracicum attingit *b*). — Plerumque enim virus istud, per genitalia in Corpus serpens, ni in ipsa via ad ductum thoracicum destruitur vel temperatur, glandulas, quas in itinere salutatur, ~~scilicet~~ ^{tantum} non ~~modo~~ inguinales, sed etiam glandulas pelvis, glandulas lumbales, glandulas renales, glandulas denique circa Aortam et Venam cavam sitas laedit, stragemque edit horrendam, eo magis timendam, quia clandestine accidit. Hinc, ni me omnia fallunt, testiculorum, hinc renum morbi, adeo frequentes in venereis, quae omnia mala vitantur, si mercurius iam ante glandulas inguinales (inunctione nimirum vel in Pene vel in Vagina vel in planta pedis instituta) virus venereum pre-

- b) Satis bene *SWEDIAUR* — p. 123. — suadet, non buboni ipsi venereo, sed potius paulo inferius unguentum ad discussionem inungendum esse; e situ etiam glandularum inferiorum et superiorum diverso explicat, cur non semper bubo hac methodo discutiatur. Miror autem illum ~~Virum~~ ^{ad illud} consilium non ~~adhibere~~ ^{adhibere}, ut mercurius Peni ipsi applicaretur, ~~quoniam~~ ^{quia} enim certius mercurius ad omnes eas glandulas pervenit.

in testem
90 in testem
venis ut
tenuior

hendit, vel si virus remediis topicis novissima methodo adhibitis, ab ipso infectionis loco vel abluitur, vel iners redditur, vel effectus eius cohibentur.

Neque male etiam bubonis suadet²ur discussio cum saccharo ^{plumbi} saturni, vel unctione insti-

tuenda c).

*in folliculo venereo
Quamvis enim autem unguentum
mercuriale applicetur
fistula illi
vasa absorbentia
tenuia non attingit
focum tumorem
et non tollit ob
diffusionem inter
vasa superficialia et profunda
de foris.*

Neque contemnendum consilium, mercuriale unguentum ad genua potissimum, vel generatim ad articulos inungi debere, quod iis locis et patentissimi sint vasorum ^{absorbentium} lymphaticorum trunci, et cuti proxime subiacentes d).

Neque effectui destituitur, si, ut iam bis monui, per vasa absorbentia plantae Pedis mercurius corpus intrat e).

Mox autem intra paucas horas, mox aliquot post hebdomades demum, ab infectione vasa absorbentia Luem totius corporis inducunt.

Senes rarius afficiuntur miasmate venereo ob torporem Vasorum absorbentium f).

Digestionis organa a Miasmate venereo intacta relinqui, exemplo hominis, qui lac, in quo Penis venereus ablatus erat, comprobare studet

JOHN

c) BELL. Capite 38.

d) WERNER et FELLER, loco citato, in Praefatione.

e) Haec est methodus CIRILLOT, Cl. Chirurgi Neapolitani; Osservazioni pratiche intorno alla Lue venerea. Neapoli 1783. — Etiam MASCAGNI, p. 23. vidit, glandulas inguinales a viru venereo affectas detumescere hac methodo.

f) BASILEWITSCH. Loco citato, confer, quae libro vom Baue des menschlichen Körpers, vierter Theil, §. 56. exposui.

John Howard

London 17

pag. 35. 3

absorbent

common

(venereal) is

into the

opinion the

common

the poison

or venereal

vol. 2. p. 46

the venereal

^{JOHN} HUNTER, attamen omne miasma, cui aliquid admiscetur, minus nocet, ni perfecte iners redditur.

Ad debellandam Luem veneream universalem praeter methodum nostris diebus usitatissimam, per frictiones nempe mercuriales, eo magis commendandas, quum mercurius tunc in iisdem viis persequitur virus, per quas corpus irrepit, CAROLI LUDOVICI HOFFMANNI Methodus g) laudanda venit, qui solummodo mercurium in sal versum, ~~valde~~ ^{vocant} sublimatum, vel aqua pura solutum partibus affectis adplicat, vel remixtum cum mica panis interne ita adhibet, ut lente tantum et longiore forsitan via, sed eo perfectius ab humoribus nostris solvi, iisdemque blande et intime admisceri queat.

Caeterum experientia docuit, interdum mercurialia a cute omnino non absorberi, sed a tubo intestinali suscipi, interdum vero vice versa — generatim autem mercurialium applicatio externa topica praeferenda videtur usui interno.

Suadent autem, ut sapone viliori nigro vel oleo illiniantur manus, quum corpus, venerea labe inquinatum aut corruptum, scrutandum est.

- g) Vide eius tractatum: Vom Scharbock, von der Lustseuche etc. Münster 1782. — Item CHAPET Vorschlag zur gaenzlichen Ausrottung der venerischen Krankheit. Düsseldorf 1781. 8. qui ex auctoritate HOFFMANNI scripsit.

SPIDMERRING DE MORBIS,

F

*Nota dignum videtur
Altenhoferum § 190 in casu
d'ur commun, qui mercurio usi
fuerunt, lympham tenuiorem
invenisse*

REUM.

topis novissima me-
onis loco vel abluatur,
tus eius cohibentur.
onis suadet discuti-
vel unctione insti-

consilium, mer-
potissimum, vel
debere, quod iis
abstrahitur
orum lymphatico-
subiacentes d).
si, ut iam bis
plantae Pedis mer-

horas, mox ali-
n, ab infectione
corporis inducunt.
miasmate venereo
tium f).

mate venereo in-
qui lac, in quo
improbare studeat
Joux

in Praefatione.
chirurgi Neapolitani;
Lue venerea. Ne-
p. 25. vidit, glan-
tas detumescere his

aler, quae libro non
sienter Theil, § 56

Alii ad infectionem praecavendam unguenta mercurialia, vel lotionem mercurialem loco suspecto adplicanda suadent. Aliis videtur per alcali causticum debite dilutum quaecumque mala a venereo miasmate ^{trahenda} caveri posse h).

Ex his aliisque permultis, quae huc non pertinent, nostris diebus est evidentissimum: Contactum ^{prophylacticum} ~~immediatum~~ requiri ad infectionem veneream, nisi enim virus siphyliticum vel ex gonorrhoea, vel ex ulceribus manans corpus inquinat, morbus non oritur, alia enim infectionis methodus ad fabulas aniles pertinet. — Deinde eo ipso loco plerumque se prodere, quo ista contaminatio accidit. — Tum Siphylidis fontem in vasorum absorbentium systemate esse quaerendum. — Tum merito reiectam iacere opinionem eorum, qui miasma venereum a materia gonorrhoeica et bubonibus distinguere variis ³ annisi sunt argumentis i). Tum remedia topica in gonorrhoea et ipsa Lue optima esse k).

h) KERN. Dissertatio de infallibili remedio prophylactico Siphylidis.

i) Optime hanc opinionem refutarunt CHAFET, loco citato — SWEDIAUR, loco citato, p. 20. — KRIPPENDORF Praeside PLOUCQUET, Dissertatio, Leucorrhoea masculina siphylitica, Tubingae 1783. — MEIZGER, vermischte Schriften, Volume tertio, p. 70. — BALDINGER, pluribus locis. — GIRTANNER, loco citato — et recentissime JESSE FOOT, loco adducto, solidis argumentis contrarium stabilivit.

k) GIRTANNER, METZLER, FRITZE Handbuch über die venerischen Krankheiten. Berlin 1790.

*Reich in Hufeland Journal 2. p.
H.K. 1811. Nov. p. 29.*

GONNORRHOEA A BALNEO TEPIDO. 83

Itaque horum vasorum cognitio vulgatissi-
mum hoc malum non modo multo melius cogno-
scere, sed etiam in ^{tantis} principio ^{in principio} ~~extinguere~~ ^{extinguere} et ex-
pellere, vel progressum impediendo universa-
lem corporis labem praecavere, melius ergo etiam
^{sanare} curare, docuit.⁹

*James Little System of Surgery.
Edinburgh Lond 1793. Vol. III. p. 290.*

GONNORRHOEA A BALNEO
TEPIDO.

§. XXXVI.

Aliquando in se ipso CL. MASCAGNI observa-
vit, cum per horas pedes aqua mersos detine-
ret, glandulas inguinales cum dolore intumesce-
re, ac ex glande penis tumorem exsudare, de-
inde capitis fluxione corripui, atque humorem
salsum et acrem naribus effluere, quae phaeno-
mena sic explicat: „Cum Pedum vasa absor-
bentia insolita humoris copia obrueret, eoque
„glandulae turgerent, hinc absorbentia Penis,
„quae in glandulas inguinales communem habent
„cum primis sui fluidi exitum, eodem difficiliter
„se exonerabant. Vasa sanguinea eandem humoris
„quantitatem deponere pergebant; hinc vero
„avehere totum non poterant vasa absorbentia,
„utpote quae proprium fluidum ferebant motu
„retardato; itaque ex Penis glande humor re-
„liquus exstillabat. Similiter cum ex abundanti
„absorbentium ad pedes pertinentium absorptio-

„ne magna fluidi vis Ductum thoracicum distenderet, minime fieri poterat, quin ex hoc „pituitariae absorbentibus sinistri lateris impedimentum occurreret. Quapropter humor in Narium cavitates a vasis sanguineis effusus neque „ab absorbentibus copiose satis absorptus in tenuis Coryzae forma effluebat a).“

Idem ipsi accidit, cum aër humidus in pedes aut brachia velocius incurreret.

a) Loco citato, p. 23.

SCROPHULAE.

§. XXXVII.

Adeo notum est omnibus, Scrophulas vel Scrofulas morbum esse ~~systematis~~ vasorum absorbentium glandularumque ad illud pertinentium, ut denominatio earum Anglis, Belgis, Germanis — *Glandular Disease* — *Klierziekte*, *Kliergezwellen* — *Drüsenkrankheit*, *Drüsengeschwulst* — inde desumpta sit a); quinimmo a Gallis hoc morbo laborantes uno verbo quasi *κατ' ἐξοχὴν* Glandés vocentur. — In plerisque autem aliis morbis Corporis humani istud Vasorum genus etiam laborare, Dissertatio nostra comprobare annuitur.

a) Jam *BARBETTE* enim de Scrophulis. Genevae 1688. scrophularum sedem in glandulas absorbentes posuit.

Optima hinc definitio scrofularum haec est:
Glandularum lymphaticarum sive absorbentium
~~intumescencia et induratio~~ ^{Scur et chronicae tumor} chronica ex peculiari
lymphae Systematisque lymphatici vitio orta,
peculiari ut plurimum corporis habitu externo
~~comitata~~ ^{us} b).

Rich. Carmichael. on the Nature
of Scrophula Lond. 1810. 42a
1816 77/17

George Henning. Critical
Inquiry into the Pathology
of Scrofula. Lond. 1816
p. 209. Scrofula dependit

- Confer et, quae *JACOBUS van der HAAR* in Libro: *Proeve over de Herfenen*, enz. benevens 150 *Genees-en Heelkundige Waarneemingen*. Tweede Druck. Amsterd*am*. 1790. egregie exposuit.

Erp. Darwin Zoonomia Vol. 2. p 23. & 115
serofula. "Tender or irritability of the
"lymphatic glands seems to be ^{produced} by
"an excess in eating salt, added to food of bad
"nourishment."

„In lymphâ imprimis“ — inquit KORTUM c) — „scrofulosum virus residere, tum ex frigida horum „tumorum (inflammationem difficillime concipien- „tium) natura, sanguineae congestioni prorsus „contraria, satis patet, tum partes, quas pri- „mario occupant, luculenter coarguunt.“

„Et Systema quidem lymphaticum — recte „monuit KORTUM d) — primariam morbi nostri „sedem constituit, virusque scrofulosum tantum „non semper primos decubitus facit in glandu- „las conglobatas sive lymphaticas. Minime vero „ad hasce solas adstringuntur scrofulosi tumo- „res, prout inepte asserit Cl. DIEL, sed si „invaluerit malum, penitusque insederit, alius „quoque generis glandulae, quin etiam partes „non glandulosae ab eodem afficiuntur.“

Non peculiare Miasma esse, sed causam proximam in ^{latere} inspissatione lymphae ^{adine} latere per animale ^{orta} acidum (Oxide), asserit TARANGET e).^f

Item F. AUG. WEBER. Von den Scropheln. Salz-
Erster Theil, 1793. 8.

c) KORTUM, loco citato, Tomo primo, p. 54. — Pari modo et DE FAURA et CHAFFOT pronuntiant: „Presque „tous les Auteurs reconnoissent pour cause de l'Ecronelle „l'Epaisissement de la Lympe, dont THOM. BARTHOLIN „decouvrit les Vaisseaux“ — in Systeme de la Nature sur les Virus ecrouelleux, p. 32.

STREIT, in Actis Academiae militaris medico chirur-
gicae Viennensis, Tomo primo, asserit: „Miasma spe-
ciale esse.“

d) KORTUM, loco citato, p. 77. — Hinc ab ovario scro-
phuloso glandulas lumbales tumentes annotavit CRUIK-
SHANK.

e) In Journal de Médecine, et Chirurgie, etc. à Paris
1792. Julius. Articulo secundo.

^x) loc. cit.

Non peculiaris miasma esse Attenuatum
p. 151.

et SALMADE.^x)

Debile autem et ^{laesum} relaxatum f) admodum Systema lymphaticum in scrophulosis videtur, quum vasa absorbentia ^{significum} valdopere dilatata, et chor-
darum nodosarum adinstar turgentia invenian-
tur. „Quin et in propriis vasis — ait TOET-
„TELMANN g) — lymphæ stagnante, tunicas-
„que, quibus continetur, diducente, tumores,
„eodem, quo in vasis sanguiferis modo varicosi
„tumores generantur, oriri queunt, quo structura
„vasorum lymphaticorum valvulosa multum
„omnino confert; confirmante id observatione
„PORTALII, qui Ductum thoracicum ac vasa
„chylosa infarcta vidit.“

Atoniam vasorum sanguiferorum et resorptio-
nis imminutionem causam proximam scrophu-
losae obstructionis esse h), alii asserunt.

Disserte hinc HEINE asserit, Lentorem Sy-
stematis resorbentis causam scrophularum pro-
ximam esse.

A nimia ergo ^{laxitate} vasorum absorbentium derivanda videtur lymphæ vitiata indoles in hoc morbo i).

f) BELL. System of Surgery Capite 38. p. 571. — I. A. GARN vermischte wichtige Krankenfälle, Witteberg 1789. Articul. 13. asserit, Scrophulas a debilitate Systematis lymphatici oriri. Eadem et BASILEWITSCH autumat.

g) KORTUM, loco citato. Tomo primo, p. 65.

h) BLIZARD in goettingsche gelehrte Anzeigen 1787. Pag. 893.

i) KONING, p. 67.

"In scrophulous swellings of
the glands the absorbents act
more feebly than the arteries
more is conveyed than is
carried back."

The Beddoer Essay on
Consumption Second Edition
Lond 1800. p. 150. p. 183/4

Transeo glandularum tumores, qui pubertatis tempore ob lymphaticorum humorum abundantiam ^{et falso} apparent, sponte iterum evanescunt, ^{inter} et erronee pro scrophulosus habentur ^{inter} k); et ad naturam glandularum absorbentium per hunc morbum mutatarum me converto.

Inveniuntur Vivorum glandulae scrophuloso morbo affectae plus minusve tumidae, ^{non} dolentes, et quae cuti proxime subiacent, mox pallidae, mox lividae; lente admodum inflammantur, sero in suppurationem abeunt, et, si etiam suppurant, vix vel parum dolent l). Liceat singula prosequi.

Interdum vix visu, nec, nisi tactu, produntur glandulae scrophuloso viri tumentes; interdum vero adeo mole augentur, ut non modo corporis ^{pulchritudine} concinnitati noceant, sed etiam gravissima mala producant, quae diu sine ^{totius} universi corporis labe ferri nequeunt.

Sic observarunt a glandularum scrophulosarum colli pressione in tracheam iugulationem lethalem, a pressione earundem in ^m Oesophagum deglutitionem impeditam m), a glan-

k) Monet KORTUM, p. 268. ne talis glandularum inguinalium tumor pro bubone venereo habeatur, quod aliquando accidisse novit.

l) CRUIKSHANK, p. 122. ingenue fatetur, se scrophulosam suppurationem erronee pro coagulatione chyli habuisse.

m) Huc referrem casum Infantis, quem J. BLEULAND narrat, in Observationibus de sana et morbosa Oesophagi structura.

*Mourquet. Sympliciter: pharynx oesophagus
trophica chomatosa Feb. 1794.*

dularum scrophulosarum thoracis mole asthma lethale n).

Aliam glandulam post aliam in collo Infantis intumescere vidit Cl. LUDWIG o).

A glandularum scrophulosarum mesenterii mole atrophiam; a glandularum in Pelvi sitarum nimia mole vel obstructionem alvi lethalem, vel partum impeditum viderunt.

Pari modo Capitis motus impeditur per glandulas scrophulosas in Collo; prouti motus Brachii a glandulis axillaribus scrophulosis, et q. s. r.

Quo magis autem volumine augentur glandularum istarum tumescentiae, eo firmiores evadunt atque immobiliiores, et cum vicinis partibus concresecunt. Cl. BERTRANDI scrophulosorum infantum cadavera secuit, in quibus glandulae colli tumentes involucro suo tam firmiter magnis Colli vasis accreverant, ut absque dilaceratione inde separari non possent p).

~~Non Indolentes esse~~ glandulas scrophulosas, licet in locis, quae nervis abundant, (v. c. axilla) iaceant, non mirandum; omnis enim inflammatio lente procedens nervos sensim sensimque et suaviter quasi e loco movet, ita ut pressio vix dolorem excitare possit; omnis vero subitanea glandularum inflammatio pressione nervorum immanes saepe dolores excitat.

n) CRUIKSHANK.

o) Pag. 18. ad vers. germ. CRUIKSHANKII, Tomo tertio.

p) Confer KORTUM, loco citato. Tomo primo. p. 55.

Da scrophulosorum
tumorem in
glandulis axillaribus
scrophulosis inveni-
t Goldmann
Nene Allgem.
Med. 1848. p. 45.
14. 6. 1848. p. 45.

Difficile autem
et saepe ex parte
tactum in suppu-
rationem abeunt
susceptibilitate nova
acquisita.

x Davia Economia
Vol. 2. p. 116.

Lividas esse glandulas scrophulosas subcutaneas non miror, quippe cum earum mole et sanguifera vasa increscunt, a quibus, ^{scitum} inprimis a Venis, istum colorem accipiunt.

Invenimus in mortuorum glandulis scrophulosis lympham viscidam q), vel materiam caseosam, duram, plerumque in rotundis cellulis contentam r).

Quamvis autem hi glandularum tumores vulgo *obstructiones* vocantur, nihilo secius tamen non credendum est, *inpervias*, sive *vere obstructas* esse eiusmodi glandulas, saepius enim saltem mercurio pervias eas reperi, quo circa et hic, quae in paragrapho de *Empyemate* notavi, conferenda erunt.

*Difficile etiam a White
Cruikshank locat. of
the abs. Vess. p. 49 /
offert, se nunquam
vidisse glandulas mesentericas
scrophulosas chylis corporis
retardantes.*

Carie sive ulcere ossa scrophulis laborantium exedi, quotidie videmus, quae ossa in scrophulosis affici, existimat WHITE s), laeso per vim externam aliave ratione periostio; inprimis lympham ex rupto vasa lymphatico inter os et periostium destillantem ex frequentissimis causis esse credit, quae corruptioni ossiculorum digitorum in pueris ansam suppeditant.

Neque materies ex ulceribus scrophulosis benignis effluens, inquit KORTUM, contagiosam vim habet id quod ex nonnullis a me institutis

q) KIRKLAND. Volum. secundo, p. 452.

r) CRUIKSHANK. Loco saepius citato.

s) Confer WHITE. Ueber Scropheln, pag. 46. — et KORTUM, loco citato, Tomo secundo, p. 297.

tentaminibus apparet. Quippe materiem ex talibus ulceribus desumptam puello sano ad latus colli integra cute infricavi, alii vero puero cuticula exiguo vulnuscule, velut in variolarum insitione fieri solet, disrupta, itidem in superiori colli regione, nempe infra et pone processum mastoideum applicavi — et ne ullam quidem inde observare potui morbi communicationem. Nemo dicat audacula haecce tentamina, cum firmissimis indubitatisque rationibus essem persuasus, nullum inde damnum pueris subnasci posse t).

At enim vero, si materies scrofulosa insigniter depravata, corrupta et quasi exaltata est, tunc aliter se res habet.

Hinc etiam remedia aptissima antiscrophulosa in illud potissimum vasorum Systema agunt, v. c. Barytes, s. p. u).

t) Loco citato, Tomo primo, p. 21. — Confer et, quae in paragrapho de suppuratione et ulcere scrophuloso attuli.

n) Die Schwererde wirkt vorzueglich auf das lymphatische System in die Druesen, und vermag durch vermehrte Thaetigkeit des lymphatischen und Druesensystems die Resorption zu vermehren, Stockungen und Verhaertungen zu zertheilen, und die zache Lymphe zu verduennen. Vide HUFELAND, p. 8. et imprimis A. CRAWFORD in Medical Communications. Volumine secundo 1790. Articulo 25.

In order to give efficacy to medicines, specifically proper in scrophulous diseases, it is necessary to apply them topically to the absorbent vessels, which enter into the oppressed glands, and again emerge from them, in their course to the lacteal duct. This is a point of great importance; for being thus applied medicines will very probably go in full power and efficacy into the oppressed glands. Medicines which are conveyed into the body by the lacteal vessels, have no such advantage. They mix with the blood, and circulating with it, have only a remote chance of ever arriving at the seat of the obstructions intended to be removed. In order to arrive at these glands, they must be thrown out in secretion, and again absorbed by the lymphatic vessels, which are to convey the lymph of the glands in question and along with that lymph these specific medicines; a piece of luck, if duly considered, hardly to be expected. P

It is therefore certain, that the holding the medicines directed for the bronchiae, under the tongue, till gradually dissolved, is, in the highest degree, a rational practice, and indeed, found such by experience long before this reason was thought of, James Johnson's Medical Essays. Birmingham. 1795. p. 312.

Il existe identité de nature entre les scrofules et le rachitis.
Arthur Richmand. Nosophie chirurgicale.
Tome 2. Paris 1845 pag 206.

It appears to me that scrofula and rickets are but modifications of the same disease arising from the same identical cause. Carmichael.
on Scrofula Lond 1810. p. 107.

RHACHITIS.

§. XXXVIII.

act. 24

Similia pro habet

Cullen. art. Scrofula

Vasa
Potentiam vasorum absorbentium ad Rhachitidem procreandam, data opera peculiari et elegantius scripta dissertatione recentissime exposuit **CL. HEINE a)**, hisce fere in compendium a me *recatis* **contractis** Verbis, ingeniose comprobat.

Rhachitidis Causam proximam esse actionem Vasorum absorbentium auctam.

Rhachitis id prae reliquis — inquit — morbis peculiare habet, quod aetatem infantilem imprimis infestat. Conditionem itaque quandam adultis deficientem infantum corporibus inesse, qua, ut in morbum hunc irruant, apta redantur.

In rhachitide opera leviora plerumque inveniuntur actione vasorum absorbentium.
Mag. Meuro. Thae.
Treatise. p. 53.

In genere autem eo laxior, debilior et succulentior est corporis humani compages, quo propius origini suae, eo firmior vero et densior, (et aridior, adderem) quo magis ab illa recedit. Aetate infantili itaque solida mollia et laxa sunt — ossa multum a duritie absunt, quam provectiori aetate nanciscuntur.

Praeter solidorum hanc debilitatem insignis etiam est universi corporis infantilis irritabilitas, ut stimuli levissimi vehementissime saepius illud convellant.

a) **ERNESTUS FRIDERICUS GUILIELMUS HEINE**, Dissertatio inauguralis de vasorum absorbentium ad rhachitidem procreandam **Potentia**, Goettingae 1792. 4.

M. Heringer Entom. etc. 65
p. 131. nota

67

RHACHITIS.

93

Omnia autem partium corporis infantilis, uti Cl. KORTUM recte monet, longe debilius est Systema lymphaticum, simul autem et irritabilius: Functio enim huius Systematis longe sollemnior et maioris momenti in infantibus ac in adultis est, quod liquorem vehit nutritioni dictum, qua illi, qui adhuc in incremento sunt, magis quam adulti indigent, qui restitutione solum amissi opus habent; hinc etiam egregie explicat, cur iuniores praesertim morbis Systematis lymphatici laborent.

Nonnulli Auctores inter quos CULLEN, observarunt, irritabilitatem hancce et ad spasmos proclivitatem hominibus rhachitide quondam correptis per omnem reliquam vitam inhaerere.

CAPPELIUS in cacochymia acida proximam Rhachitidis causam ponit. Acidum enim in primis viis generatum, et a vasis lacteis susceptum chylum et sanguinem inspissare, omnibus symptomatibus in rhachitide conspicuis ortum praebere, ipsaque ossa emollire arbitratur. Sin autem naturam acidi irritantem et oeconomiam corporis humani, irritamenta quaecunque aversantem recte contemplemur: haud satis firmo talo sententiam hancce inniti apparebit. Acidum enim, in primis viis exortum, vasorum lacteorum initiis, summopere irritabilibus, difficillime sane excipitur; sin autem mitior et dilutior eius pars cum chylo tandem absorbeatur, ob longum tamen per vasa lymphatica et glandula-

to propolis et le thau...
Néanmoins de...
Tome 2. Mai 1801 pag 101
avec les modifications
et les causes...
TIS.
II.
ntium ad Rhachi-
peculiari et elegan-
issime exposuit Cl.
ompendium a me
omprobatur.
um esse actionem
inquit — mor-
atem infantilem
itaque quandam
corporibus inesse,
nant, apta red-
debiliior et suc-
ompages, quo
vero et densior,
ab illa recedit.
et laxa sunt —
nam proveciori
litem insignis
illis irritabilitas,
ae saepius illud
Hering, Disser-
tionum ad rhachi-
dae 1792. 4.



rum anfractus iter ita subactum et commutatum erit, ut, si sanguini demum advehatur, naturam suam iam plane exuerit, et ossibus emolliendis haud amplius sufficiat. Hoc ita esse, tot infantes et adulti nos docent, qui, licet acido misere vexentur, rhachitide tamen non corripuntur. Non intelligo insuper, quare in infantibus tantum nec in adultis etiam vis haecce rhachitidem procreandi acido insit; qui demum fieri possit, ut tot et tam variae caussae, quibus saepe nulla acidi gignendi vis inest, morbo huic ansam praebere possint? b)

Constat, Partes solidas non omnes aequaliter vim vasorum absorbentium sentire, sed quasdam prae reliquis et inter illas ossa praesertim illorum actioni exposita esse, ita nempe, ut materia calcarea ossium continuo tramite a vasis absorbentibus recipiatur, ab arteriis autem eodem modo perpetuo restituatur. Si autem actio vasorum supra modum augetur, adeo quidem, ut plus excipiat, quam iterum restitui possit, fieri aliter non potest, quam, ut in multis partibus defectus quidam, et in ossibus praecipue materiae terrestri defectus appareat, quae dum ex ossibus educitur, et robur duritiemque istorum secum aufert, ossa mollia et flexilia relinquat, necesse est. Per se autem iam patet, hoc eo facilius et citius fieri posse, quo magis ossa

b) E. F. G. HEINE. Loco citato, p. 26.

adhuc in eo statu sunt, ubi crescunt, materia calcarea primum replentur, ideoque potissimum illa indigent.

Haud male autem haecce, ni fallor, in rhachitidem quadrant. In omnibus enim partibus, in quas vasa absorbentia magis minusve in statu sano agunt, in morbo hocce maior minorve defectus percipitur. Simulac enim morbus incipit: cutis flaccida et rugosa evadit; muscoli marcescunt et attenuantur, omnesque partes, quae vel adipe vel lymphâ exsudata turgidae esse solent, illis sensim sensimque privatae collabuntur, et insignem post mortem depletionem, qualem praecipue tela cellulosa subcutanea et omenta, demonstrant. Morbo paullulum progresso, in ossa inprimis saevire incipit, materia calcarea nempe educitur, unde extrema ossium ob minorem in fluida irruentia resistantiam intumescunt, et corpora istorum, rigiditate privata, vi cuicumque cedunt, flectuntur et recurvantur. Quin dentes eroduntur et germina, secundae dentium seriei formandae destinata, iterum destruuntur, quae causa esse videtur, ut priores dentes elapsi saepius non restituantur. Sin autem insignem harum partium depletionem et destructionem recte consideremus; si perpendamus, quam levis sit partium corporis infantilis cohaesio et nexus, quanta contra vasorum absorbentium hac aetate irritabilitas, et quam levis ideo stimulus ad illa com-

movenda requiratur; non me nimium conari, patebit, si auctae horum vasorum actioni quamplurimum ad hunc morbum procreandum imputem. Hoc eo verosimilius evadet, si observationum rationem habeamus, quae de systemate lymphatico in rhachitide factae exstant. CALLISEN *c)* nempe illud in hominibus, rhachitide necatis, valde amplum invenit, ideoque non exiguum in hoc morbo personam agere, non dubitat. KORTUM *d)* insignem analogiam rhachitidem inter et scrofulas (morbum systematis lymphatici) monstrat, facileque unum ex altero enasci docet.

BÜCHNER *e)* undecim narrat infantes, qui ab una scrofulosa matre procreati ideoque forsan peculiarem systematis lymphatici conditionem nacti, omnes rhachitide corripiebantur. Exemplum, quod imprimis resorptionem materiae calcareae ossium ope vasorum absorbentium demonstrat, FRIES *f)* exhibet. Rhachiticae enim mentionem facit, cuius vasa lymphatica circa vertebrae praecipue ita materia calcarea indurata erant, ut scalpella anatomica inde obtunderentur,

c) Principia systematis Chirurgiae hodiernae, Volumine secundo, Capite de Rhachitide.

d) Loco citato, p. 236. et seqq.

e) Dissertatio de Rhachitide perfecta et imperfecta. Argent. 1754. — Recusa in A. HALLERI collect. disput. pract. Volumine sexto, p. 235.

f) De emollitione ossium.

tur. Nonnulli etiam concretiones calcareas vel in glandulis lymphaticis g) ipsis vel etiam in aliis partibus invenerunt h).

Varia quidem exstant phaenomena, quae ex aucta vasorum absorbentium actione derivari nequeunt, quo imprimis referenda est ingens proclivitas ad acidum primarum viarum, vermes, pituita, et sic porro. At bene considerandum est, semper fere debilitatem totius corporis, praecipue primarum viarum simul adesse, quae horum omnium ortui lubentissime favet. Aliud adhuc adest symptoma, quod theoriam hancce funditus fere evertere videtur, cerebri hydropem puta, qui nempe languoris quasi vasorum absorbentium speciem prae se fert. Interea tamen hydropis huius causam ex alio fonte derivandam esse arbitror ex ingenti scilicet sanguinis versus caput congestione, ideoque vel ex statu cerebri inflammatorio inde oriundo, vel ex compressione vasorum lymphaticorum in foramine lacero et canali carotico i), ab inflata vena iugulari et arteria carotide interna repetenda, vel etiam ex utraque causa simul.

Ut autem actio vasorum absorbentium augeatur, duo omnino requiruntur: 1) irritabilitas

g) *FRIES*, loco citato.

h) *TACCONI* in *Comment. Academiae scientiarum et artium Bononiensis*, Tomo quinto, Parte secunda, p. 81. — *Comment. Lipsiens.* Vol. decimo octavo, p. 589.

i) *PAULUS MASCAGNI*, loco citato.

vasorum absorbentium aucta; 2) Stimulus, qui in ista agat, motumque istorum acceleret.

Corpus infantile insigni irritabilitatis gradu gaudere, satis iam constat; illam autem in systemate lymphatico imprimis conspicuam esse, ex praemissis apparet. Quo irritabilius autem hoc, eo rapidior eius actio, eoque leviori stimulo opus est, ad illam enormem reddendam. Aetatem infantilem itaque iam per se, omnesque insuper causas, quae corpus et praecipue systema lymphaticum irritabile reddunt, ad hunc morbum disponere posse, in aprico est. Reddunt autem irritabile non solum istae, quae stimulo quodam perenni in illud agunt, sed etiam quaecunque debilitant, et hinc mirum non est, quod debilitas corporis causa proxima huius morbi a plurimis hucusque putata est.

*Rachitidis occisionem
probatum imprimis
defectum huius in organi-
smi vita agentis
et vitiosam alicuius re-
sponse egrae huiusmodi
Gr. Gottlob Wiegmann
de Rachitide confectio
physico-chemica.
Halle 1806.*

Haec dispositio vel post partum primum ex-
oritur vel etiam haereditate acquiritur.

S C O R B U T U S.

§. XXXIX.

Scorbutus, secundum IOAN. IOACHIM. HACHSTEDT a) sententiam, est morbus systematis vasorum absorbentium et receptaculorum corporis nostri, ubi ob horum organorum debilitatem

a) Dissertatio inauguralis de scorbuto. Göttingae 1792.
Pag. 17.

*Sal maxime debilitat
stimulato vasa absor-
bentia*

C. Darwin Zoon.
Vol. 2. p. 77.

huc potius videtur exemplum
J. J. Brandis ^{in fine libri} 4. J. J. Brandis in fine
relatum.

quae Athenas per 1788 Ali
contra monuit
facile Scorbuto
refelli

nomine.
Femina Sul quotidie
magnam quantitatem
Salis devoraverat.

up Monroe
Three Months
p. 53

Scorbutum esse morbum diabete
oppositum apud Rollo

et 3 Patagon⁸ ab iere sumptu
vini'

x) on the Scurvy. Edinburgh 1795.
Scurvy is the produce of
contaminated, poisonous
or foul air.

- b) London Medical Journal for 1787. Parte prima, —
et European Magazine 1787. May. p. 329.
- c) Tabulae ossium morbosorum, Tabula Vigesima. Fi-
gura 2.

Natura acrimoniae rhachiticae — inquit ERNESTUS CHRISTIANUS BÜCHNER d) — non multum differt ab illa Scorbuti.

d) Observationes et epicrisis circa quosdam ossium morbos. Wirceburgi 1795. p. 9.

TINEA CAPITIS.

§. XL.

*J. A. Alibert Maladies de la
Veuve Paris 1806. p.*

13.

A Tinea Capitis glandulae Collis intumescunt a).

Etiam a reliquis morbis cutaneis chronicis, v. g. Scabie, Herpete, Impetigine, Jonthis, et quae sunt reliqua, cuiuscunque generis et indolis glandulas saepe intumescere, pervulgatum est b).

Recte hinc ISENFLAMM c): Dum efflorescentiae cutaneae partem capillatam in pueris occupant, vel saltem imminet, vix non semper glandulae lymphaticae Colli plus minusve vehementer turgent, iamque aniculae, imminere achores, praedicunt, aut hos non prius disparituros, quam hi tumores glandularum evanuerint.

a) KIRKLAND. Loco citato. p. 484. ROB. HAMILTON on scrophulous Affections London 1791. p. 196. LUDWIG in vers. germ. CRUIKSHANK, Band 5. p. 18.

b) KORTUM. Loco citato, p. 275.

c) Dissertatio de Absorptione morbosa. §. 21.

PLICA POLONICA,

§. XLI.

hujus morbi quatuor
 Propria experientia parum tantum ~~de hoc morbo eruditus~~, liceat aliorum suffragia in medium proferre.

Plicam polonicam — inquit KORTUM a) — antecedere solent et comitari glandularum tumores scrofulis similes. VICAT, annunciari, ait, plicam ante aliquot ~~septimanas~~ *hebdomadas*, vel menses, quin integros annos, antequam erumpat, variis tumoribus, glandularum obstructionibus, scrofulis, ulceribus; — ut omittam aliorum, qui ipsi hunc morbum observarunt, Autorum testimonia, notissimam rem confirmantia.

Pari modo et recentissimus Autor classicus de hoc morbo F. L. de la FONTAINE b) tumores glandularum a foedissimo hoc miasmate annotavit.

Neque dubium est, etiam hoc miasma per vasa absorbentia corpus humanum invadere, cum secundum eundem Autorem insitionem cum succesu saepius instituerunt Medici.

a) Loco citato. Tomo primo, p. 272.

b) Chirurgisch - Medicinische Abhandlungen verschiedenen Inhalts, Pohlen betreffend. Breslau 1792. 8.

ELEPHANTIASIS.

§. XLII.

Glandularum lymphaticarum Colli tumores coram video in adolescente Elephantiasi perfecte tali laborante, qualem descripserunt et delineaverunt STALPARTUS VAN DER WIEL a), et Auctor anonymus b). Cutis brachiorum sive potius epidermis huius adolescentis adeo similis est epidermidi elephantinae, ut, dum utramque compararem, in natura, ut dicunt, parum discriminis cernerem.

Recte ergo KORTUM c) adnotat: Leprosi ^avera Laborantes tumoribus glandularum per totum corpus (Auctoribus GILBERT et GORDON) obsidentur, quos ad scrofulae genus refert, et tuberculis glandulosis porcorum analogos censet SAUVAGES. Quin BIERCHEN nondum extra omnem dubitationis aleam positum esse censet, an Elephantiasis scrophulosae indolis sit, et Siphylidis Caussis accessoriis iunctae progenies habenda.

Certe, quod me attinet, BIERCHENIO assentiri, nullus dubito, quum etiam idem ille adolescens,

a) Observationum Centuria secunda. Pag. 374. Tabula 11. et 12.

b) In Actis medico chirurgicis Academiae militaris Viennensis, Tomo primo, pag. 369. Tabula octava et nona.

c) Loco citato. Tomo primo. Pag. 273.

ULCERA CRURUM. 103

cuius supra mentionem feci, vestigia nonnulla dispositionis scrofulosae gerat.

Contagiosam esse, plurimi affirmant d).

d) FRANK Medicinische Polizey. Pag. 55.

ULCERA CRURUM.

§. XLIII.

Causam ulcerum crurum saepe in vitiis systematis absorbentis latere, suspicatur ROWLEY a); neque id sine causa.

Etenim ad sanationem omnium ulcerum partes suas conferre vasa absorbentia, non improbabile videtur. — Ut enim reliqua taceam, istorum vasorum actione vel ipsum pus laudabile dictum paratur; praeter eam partem enim puris, quae in auras avolat, istam spissitudinem acquirit pus, dum vasa absorbentia partes eius tenuiores avehunt.

a) Seventy four Cases. London 1779. in Introductione.

CARCINOMA.

§. XLIV.

De atrocissimo malo, *Scirrho* et *Carcinomate* nimirum, paulo fusius agere liceat; omnibus nimirum, quae ad diri huius morbi naturam illustrandam conferre possunt, notatu dignissimis, si fidis observationibus nituntur; eo libentius autem addam meas circa hunc morbum animadversiones respectu vasorum absorbentium, quo maiori diligentia atque cura ad indolem eius veram penitus cognoscendam semper usus sum, et quo frequentius auxilium a me petierunt, commiserationemque excitarunt meam hoc malo laborantes.

Primo in hoc morbo systema vasorum absorbentium affici, iam uno ore confitentur

omnes *Medici et Chirurgi* a).

a) Principes ex illis tantum nominare liceat: — *ASSALINI*, loco saepius citato. — *BELL*, loco citato. — *PEHR. BIERCHEN*; *Intraedes Tal om kaeritskadors, scrophuloese och veneriske Saers och Syvullnaders igenkaande*. Stockholm 1773. 8. — *PETRUS CAMPER*, *Over den waaren Aart der Kankerwording*, 1779. 8. — *A. CRAWFORD*, in *Philosophical Transactions*, Volumine 80. vel in *Medical Facts and Observations*, Volumine secundo 1792. Article 13. — *G. COOPMANN*s in *Neurologiae Editione Francquerensi* 1789. 8. in Praefatione. — *CRUIKSHANK*, loco citato. — *HAASE*, loco citato. — *HEWSON*, loco citato. — *JUSTAMOND*, *Treatment of Cancerous and Scirrhus Disorders*. London 1780. — *MASCAGNI*, loco citato. — *G. PROCHASKA*, *Annotationes academicae*, Fasciculo secundo, p. 58. — *SWEDIAUER*, loco citato. — *WERNER* et *FELLER*,

Jänisch

Will. Resnik. Hist. Nature & Cause of Scrophula & Cancer. Lond 1795.

Bera Regn'ke. Syst. de Cancer

Explin praevis sonata a Acad. Lugdun.

ans 1773. Paris. 1774.

Bell. & Gessner. Inaugural

quae. 1793. Leipzig.

Adams. illen handskriftliga

version. 1796. pp. 68.

W. Simmons. Reflections on the

Caesarian Operation. with Observations on Cancer.

London 1795. 8 p. 68.

Reardon Obs. on Cancerous complaints,

John Abernethy Surgical Observations. Lond. 1804. egregie exposuit affectiones

vasorum absorbentium in diris hoc malo.

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

Amad. Ponsée sur le Cancer. in Volumine sept. Mémoires de la Soc. Méd. de Paris

plurimae *tonnisi* *71* *75*
Cancrum glandulas absorbentes secundario tumorem
afficere recte annotat Boyer (Mat. chirurg. calen.
Pari. 1814, Vol. 2, p. 295)

C A R C I N O M A .

105

Vasa absorbentia enim, quae in parte carcinomatosa oriuntur, non modo ichore turgent, sed etiam glandulas illas, ad quas abeunt, in tumorem tollunt b).

Scirrhum autem a Scrofula, et Carcinoma a suppurante et exulcerata Scrofula sollerter distinguere oportet. Tanta enim horum malorum est similitudo, ut saepissime confundantur, et de Cancro scrofuloso verba faciant Medici c).

1) Sedes mali toto coelo diversa; Scirrhus enim est morbus glandulae conglomeratae secermentis, verbi causa: Mammae, Scrofula, ut vidimus, glandulae absorbentis.

2) Tota natura scirrhi et scrofulae diversa. In scirrho vasa secermentia et sanguifera obstruuntur, clauduntur, et penitus coalescunt, adeo, ut praeter remotionem scirrhi vel suppuratione naturali et exterminatione, vel cultro, aliud remedium fere cogitari nequeat. — In scrofula vasa absorbentia debilitantur, infarciuntur, intumescunt. Hinc liquet, cur scirrhus multo periculosior sit scrofula.

3) Scirrhi superficies plerumque gibberosa; scrofulae glabra. *laevior*

loco citato. — A. VAN WY, Heelkundige Mengelstoffen. Amsterdam 1784.

b) Scirrhosus vocat istos tumores glandularum ichore absorpto ortos A. CRAWFORD. *negat absorptionem Amest. l. r.*
 c) LERCHE Dissertatio de Cancro. Goettingae 1776
 scirrhi scrofulosi mentionem facit.

O M A.

o et Carcinomate
 liceat; omnibus
 s morbi naturam
 notatu dignissi-
 untur; eo liben-
 hunc morbum
 rum absorben-
 e cura ad indo-
 cendam semper
 kilium a me pe-
 excitantur meam

ema vasorum ab-
 ore confitentur

licet! — Asta-
 loco citato. —
 aeriskadens, scro-
 pulluaders igenta-
 i CAMPER, Over
 1779. 8. — A.
 tions, Volumine
 tions, Volumine
 PHANUS in Neu-
 8. in Praefatio-
 HAAS, loco ci-
 STAMOND, Treu-
 fordets. London
 G. PROCHAZA
 undo, p. 58. —
 NER et FALLER,

andess
 exposit affectus

de sc. Med. Timotheo

del. d. m.
scrofula
num.

post
in conatus
ex affectu
angillari
hinc v. d. d.
in scirrhus
diffa
l. r. 1821.

4) *Scirrhus* lentius *scrofula* oritur; licet eadem causa, verbi causa: vi externa, percussione, lapsu, et *scirrhus* et *scrofula* generantur.

5) *Scirrhus* saepe solus in corpore latet; *scrofula* vero raro sola adest, sed aliis *scrofulis* sociatur.

6) *Scirrhus* et cancer saepe cum partibus ferruminantur, adeo, ut immobiles reddantur, *scrofula* vero a partibus vicinis soluta et mobilis manet.

7) Semper causam quandam internam in *scirrho* adesse debere arbitrantur van GESSCHER d) et LEURS e).

8) *Scirrhus* nullo remedio noto cedit, quod omnino non mirum videtur consideranti, nullo remedio vasa clausa reserari posse? *Scrofula* saepe remediis cedit, et imminuitur, vel tollitur.

9) *Scirrhus* durior est quam *scrofula*.

10) *Scrofula* imprimis infantes et adolescentes; *scirrhus* viros et feminas quadragenarios vexat.

11) *Scirrhus* denique in carcinoma abeunt^{iens} tenuem, nigricantem, foetidum ichorem corrosivum stillat, ichor vasa arrodit, quae sanguinem effundunt, et summis doloribus comitatur, et, ni cultro vel caustico tollitur, mortem infert.

d) Heelkundige Mengelstoffen.

e) Prysverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam 1791. Eerste Deel. *confermet* de a *Thuyne*. Waarnemingen in het *Observatorium clinicum*. 1808 p. 210

Jänisch
~~Janisch~~ 1874

Will. Rostk. 11.
Beschreibung d.

Bern. Reqn'k.
Expositio praesent.
anno 1773. P. 109.

Bell. 2. 9. 9. 9.
Quint. 100.

Joseph
Adams. 1800.
Gent. 100.

W. Semmon.
Caesarian
London 1779
Pearle.

Joh. Albra

Roma

ga canoro lingua glandulas adspersas. colli transire
unamq; ex illis in ulcerationem alvei vidit Attenhofer 223.
et ichorem fudere vidit —

*In cancro ulcer
ta glandular inui
leas admodum tumida
vidit J. A. Klesio.
Chic. Carob. exple
sup. 1798 Off. 52.*

x) In Dyer Decem ab
Hewell critic
Lingua 1798. Vol. 1
pag. 328.

tudinem Capitis infantis neonati auctam vidit CRUIKSHANK g).

*A cancro tibiae
glandulas inguinales*

f ^a Cancro inguinali fere omnes glandulas abdominis tumidas reperit de MAN h).

In Scirrho i) et Carcinomate Uteri glandulae in pelvi et circa vasa iliaca sanguifera sitae intumescunt.

W. Simmons p. 76.

Hinc non miror, glandulas Mesocoli et Mesorecti saepius, ac glandulas Intestinorum tenuium scirrhis et carcinomatibus affici k), quippe communicationem alunt hae glandulae cum vasis absorbentibus genitalium, prouti egregie admodum id exhibent icones praestantissimae MA-SCAGNI.

*glandulae absorb
ventriculo, vel
intestini quovis
scirrhis vel cancro
vicinae pari
scirrhis et cancro
corripit. Novus
Morsid anatomy
glandulae locis*

Glandulas Mesocoli et Mesorecti non adeo facile ac Mesaraicas in scirrhos abire, est annotatione CRUIKSHANKII.

Jänisch

1867

JUSTAMONDIO l) tamen assentiri nequeo, qui canceri originem ab insectis vel germinis in-

g) Anatomy of the absorbent Vessels. Pag. 124.

h) Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. XV. Deel. p. 150.

i) In scirrhis uteri bis glandulas absorbentes iliacas medio-cris pugni magnitudine tumentes vidit PROCHASKA, loco citato. p. 58.

k) Ibidem, p. 122.

l) I have long suspected, that the Cancer was produced from insects, or the germina of them, taken up from the air by the lymphatic Vessels, and that in instances of scirrhus tumours, these germina remain in an inanimate state, till some accidental circumstance brings them to life. This has appeared to me, to constitute the ulcerated state of the Disease. — Loco citato. Pag. 65.

Will. Astle. 18

Josephus 18

Ben. Reynold

duplex praesent.

and 1773. Paris

Bell. 9. 1867

Green 1867

1867

Adams. 1867

1867

W. Simmons.

Caesarian

London 1773

Parlo

Joh. Albern

1867

sectorum per vasa absorbentia ex aëre arreptis derivat. Saepius enim vel contusionibus vel pressionibus glandularum secernentium, vulgo conglomeratarum dictarum, ortos scirrhos in feminis non modo sed etiam viris novi.

Sic PETRUS CAMPER ^{idem} m) a contusione Mammae cancrum nascentem in flore aetatis feminae vidit. — Sic in iuvene cancrum mammam a contusione ense globulo armato facta observavit.

^{hinc et} Sic vestes arctae, Thoraces abominabiles, feminarum, ^{hinc} Mammæ scirrhosas n) reddunt consentientibus omnibus attentis observatoribus.

^{hinc et} Sic labii carcinoma ^{hinc} ibi frequentissimum, ubi homines ^{hinc} fistulis tabacinis indulgent; labium inferius enim solummodo carcinomate corripitur, quoniam inter fistulam tabacinam et dentes comprimitur.

Glandularum autem absorbentium tumor viri carcinomatoso obortus, etiam remoto per cultrum foco carcinomatoso malum ^{periculat} recrudescere facit, adeo ut plerique chirurgi carcinoma insanabile iudicent, simulac glandularum absorbentium tumorem excitavit.

^{hinc} Sic BIERCHEN Cancrum Mammae insanabilem declaravit, simulac glandulae axillares tument.

m) Dissertatio de agendi vel expectandi in medicina ratione.

n) Confer Dissertationem meam: Von der Wirkung der Schnuerbrueste. Berlin 1793. 8.

*Hydatidum formam
Carcinoma abis
formam epe epinatis
Joseph Bramer*

*post
carcinomatosi
ex objectis
axillari
quæ vidit
Bramer
Talis 1821.*

1) f. c. f. p. p. p.

Sic CAMPER Cancrum Mammae insanabilem declarat, simulac aegri dolorem in glandulis absorbentibus inter cartilagine costarum et ossa sterni sitis sentiunt; remota enim etiam Mamma carcinomatosa ex his glandulis, quas nempe culter attingere nequit, recrudescere carcinoma vidit.

Confirmarunt CAMPERI animadversiones imprimis inter alios VAN WY et COOPMANNUS o).

Sed audiamus ipsum autorem.

„Alle Geneesmeesters“— inquit CAMPER p)— „hebben zig, zoo veel my bekend is, alleenlyk „toegelegd op het onderzoek der Klieren van den „Oxel en van den zydelingschen omtrek der „Mam, en de Afzetting dan alleenlyk afgeraad, „den, wanneer deeze angedaan of opgezet waren. „Dog hieromtrent is hunne hoop dikwerf verydeld „geworden, om dat de Kanker, ofschoon deeze „Klieren op een allernauwkeurigst onderzoek „geheel vry gekend wierden door allerkundigste „Mannen, evenwel weder ontstak of in de byna „geneezene Wonde, of kort naa dat het wond- „teken geheel volkoomen was, of in de andere „Mam op nieuws hevig woedde, gelyk door „TRILLER en anderen is waargenoomen.“

„Geene Gelegeneden hebbende laten voor- „bygaan om deeze Ongemakken en derselver uit- „komsten te zien en naa te gaan, vond ik één

o) Locis supra citatis.

p) Over den waaren Aart der Kankervording. p. 7.

Jänisch
1777

Will. Ross. H.
Annot. 1777
Been Regn. H.
Duplex prae-
sent. 1778. Paris

Bell. 7. giff
Gruen. Ann.

Giff
Adams. H.
Gruen.

W. Simmons.
Caesarian
London 1777
Pearle.

Joh. Abern

„Teken altoos nadeelig, ofschoon de Oxel, en
 „andere Klieren ter zyde van de Mam geheel
 „vry waren: namelyk, de stekende Pyn op die
 „plaats van de Borst, daar de invendige Mama-
 „ders tussen de tweede en derde Ribbe naar bui-
 „ten, en naar de Mam, loopen. Zoo dikwerf
 „de Lyderessen op die plaatse steekende, en
 „dikwyls wederomkoomende Pynen gevoelden,
 „zag ik'er den Kanker op nieuws weder uit bot-
 „ten, ofschoon de afzetting door de allerkundig-
 „ste Hand verrigt was geworden.“

„Het is dit teken, 't welke ik kann zeggen
 „my nooit bedroogen te hebben, ofschoon ik
 „te vooren niet, gelyk als nu, in staat was den
 „zaamenhang uit te leggen.“

„Derhalven wordt 'er vereischt alvorens tot
 „het mes overgegaan wordt, dat men Onderzoeke;
 „voor eerst, of het knoest - en kreeft - gezwel
 „van inwendige Oorzaaken afhange? ten twee-
 „den, of de Schyf van de Mam wel los zy? ten
 „derden, of de Klieren van den Oxel, boven
 „het sleutelbeen, van den Hals, en wel in-
 „zonderheid of de Klieren, die de uitwendige
 „Mamaders verzellen, volkoomen vry zyn? En
 „ten laatsten, of de steekende Pyn zig dikwyls
 „laat gevoelen op de aangewezene plaatse tus-
 „sen de tweede en derde Ribbe niet verre van
 „het Borstbeen.“

„Wanneer dan dit laatste plaats heeft, of-
 „schoon de vorige Klieren gezond zyn, moet

post
 carcinoma
 ex affectu
 maxillari
 quare videt
 remissionem
 piffa
 Haller 1821.

„men volstrekt nooit de Borst met het mes aan-
„raaken.“

Hasce glandulas, quas CAMPER primus, quantum novi, detexit, et quas ex industria prosecutus sum in multis cadaveribus, variae aetatis, varii sexus, et variae valetudinis, quarum vero vasa absorbentia advehentia et avehentia vel evehentia sollerter ipse primus examina-^{jacquin}vi, pluries mercurio replevi, magnopere quidem numero, situ, magnitudine et colore variare q), in eo tamen omnes generatim convenire, vidi ^{quod} et manifesto a mamma venientia vasa absorbentia suscipiant: (quae nimirum per cartilaginum intervalla penetrantia ipsis inseruntur), dextrarum glandularum vasa absorbentia evehentia denique in ductu thoracico dextro, prouti sinistrarum in sinistro ductu thoracico finiri.

Miror, Clarissimum CRUIKSHANK r) nunquam hasce glandulas morbosas vidisse, quas tamen non modo in carcinomatibus, sed etiam in ipso Empyemate Thoracis admodum turgidas inveni, quas CAMPER s) in phthisica femina turgidas vidit.

Eadem glandulae carcinomate affici testatur Sic,

Abcrnethy

Carpa viv. fuscum q) Optime has glandulas intercostales sternales sive anteriores cum earum vasis delineatas exhibuit MASCAGNI, Tabula vigesima sexta, Fig. 2. in versione germanica LUDWIGII, Tab. VI. Fig. 2. magnitudine naturali.

r) Loco citato, p. 125.

s) Confer Caput de Phthisi Pulmonum.

Jänisch

~~Will. Nestl.~~ 1817

Will. Nestl. 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Becc. Pagni 1817

Cancer occurrat in
glandulis pnc.
Horti opay, in
ingentem molem
auctae

Waller Museum
anatomicum. Berl.
1805. pag. 130.

Carpa viv. fuscum q)
eadem locat.

Sullo Scirro e ful

Cancro Milano

1821. pag. 19.

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

(1822)

W. Simon.

Casparian

London 177

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Pearle

Hyge
Sic, ut redeamus, quo digressi sumus, CRUIKSHANK ^{t)} recrudescere vidit Carcinoma a glandula absorbente, quae in cicatrice post amputationem Mammae comprehendebatur.

Sic idem CRUIKSHANK ^{u)} Cancrum recrudescere vidit a glandulis supra claviculam sitis.

Idem annotat virus cancrorum vel duos annos in glandulis absorbentibus latere posse.

Cancr
Sic Labii inferioris carcinoma insanabile (quod tamen nimium videtur) declaravit BIERCHEN, simulac glandulae absorbentes infra maxillam sitae tument.

Hinc SWEDIAUER monuit: In Cancro Testiculi sollerter examinandum esse, an vasa absorbentia funiculi spermatici simul affecta sint; in eo enim Casu plerumque Ren eius lateris, ad quem nimirum ista vasa ascendunt, laborat, et ipsam castrationem inutilem reddit. Quomodo hoc accadat, iam in morbo venereo explicavimus.

Quasi immo
Sic CRUIKSHANK secundo anno post castrationem testiculi cancrum visam glandulas absorbentes lumbales tumidas vidit ^{x)}.

Saepe etiam Oedemate a glandularum obstructione orto vicinum Carcinoma proditur, prouti compertum habeo, Chirurgum nescivisse,

t) Loco citato, p. 126.

u) In editione altera.

x) Ibidem.

*Plur una vice post
amputationem concionatis
labii inferioris ex affectu
glandulae inframaxillari
malum recidivare vidit
Allan Burns Chir. Lond.
über die Spitzkrebs
Anatomie. Halle 1821.
p. 229.*

Summa autem attentione dignum videtur salutare et rationale consilium MASCAGNII, dicentis: Quum vasa absorbentia mammaria cum lymphaticis artuum superiorum, dorsi, cervicis etc. in easdem glandulas axillares concurrant, et innumeris truncis et plexibus communicent, atque in mammarum morbis hae glandulae afficiantur, perutile erit, per remedia ad eas partes admota eorum affectuum solutionem moliri.

Nimis vero subtile et vix peragendum videtur consilium WEARNERI et FELLERI a), *scribet*: In cancro Mammarum et Praeputii forsitan vasorum absorbentium compressionem, immo ipsam sectionem utilem esse, ad virulenti laticis resorptionem praecavendam.

Hanc mere theoreticam coniecturam plane rejecit DESGENETTES, asserens, Vesicatoria, Setacea et Escharotica sufficere.

Ante novissima inventa circa vasa lymphatica autem horum omnium longe diversim esse datam rationem atque explicationem, uno saltem testimonio, omni exceptione maiori, comprobare liceat. GEORGIUS COOPMANNUS nimirum in nova editione Neurologiae b) haec habet:

„Plurimorum Neurologiae et Pathologiae scriptorum vestigia secutus ex eodem fonte quaedam quoque symptomata deducere conatus sum,

a) Loco citato, in Praefatione, p. XIII. et XIV.

b) Neurologia et observatio de Calculo ex urethra excreto Franequerae 1789. 8. in Praefatione, pag. XV, et seqq.

„quae non tantum aequè facile, verum etiam
 „potiori iure, ex vasorum lymphaticorum de-
 „cursu, quam nervorum distributione et com-
 „municatione determinari atque explicari possunt.
 „Vasa enim lymphatica extremitatum aliarumque
 „partium ad glandulas vicinas progrediuntur: ut
 „illa faciei ad Parotidem, quae cum Colli vasis
 „communicant; linguae et labii inferioris ad
 „sublinguales atque submaxillares; extremitatum
 „superiorum mammaeque ad glandulas subaxilla-
 „res decurrunt; ita vasa illa lymphatica ex-
 „tremitatum inferiorum, penis, scroti, testi-
 „culorumque ad glandulas inguinales transeunt. —
 „Ex hoc vasorum lymphaticorum decursu statim
 „apparet, quid de quorundam symptomatum ex-
 „plicatione ex nervorum communicatione deducta
 „iudicandum sit.“

„Ex Maxillaris superioris decursu deduxi
 „symptomata, odontalgiam, catarrhum, dentem
 „cariosum, et ulcus narium, vel palati con-
 „comitantia, quae procul dubio ex materia,
 „acri, corrupta, vel acrimonia lymphae, per
 „vasa lymphatica absorpta, producuntur.“

„Ex Maxillaris inferioris distributione, quare
 „cancer linguae, labii inferioris, vel glandularum
 „sublingualium et submaxillarium vicissim has
 „partes afficiat, quondam Cl. CAMPERUS expli-
 „cuit; quae, nisi me fallit animus, potius
 „ex absorptione et actione vasorum lymphatico-
 „rum deducenda sunt.“

„In catarrho, faciei vel parotidis inflammatione agnovi, totum glandularum Colli tractum ob septimi paris vel nervi facialis decursum in consensum trahi, cum illa symptomata ex lymphae acrimonia derivanda sint.“

„Ex secundo parè costali deduxi rationem, quare cancer Mammae glandulas vicinas, et subaxillares, atque brachium in consensum trahat; attamen vasa lymphatica mammarum, quae ad glandulas in cavo subaxillari sitas progrediuntur, absorptione virus cancrum ad illas deferre, et has glandulas eodem malo inquinare possunt.“

ICTERUS.

§. XLV.

Secundum et felle
Hepati et Vesiculae felleae vasa absorbentia admodum numerosa esse, iam Antecessoribus a) nostris notissimum erat, et nostra aetate tanta

- a) Verbi causa: Vasa absorbentia in superficie superiori ~~Hepatis~~ ^{hepatis} centum abhinc annis nitidissime magnitudine naturali delineata exhibuit Vir solertissimus *FREDERICUS RUYSCH*, epistola problematica quinta, Amstelodami 1696. Tabula sexta.

Eadem in superficie ~~hepatis~~ ^{hepatis} satis copiosa pinxerat *WILL. CRUIKSHANK*, Anatomy of the Absorbent Vessels, London 1786. Tabula prima.

Multo autem copiosiora, non modo in superficie superiori hepatis, sed etiam in inferiori, magnitudine naturali, delineata exhibuerunt *WERNER* et *FELLER*, Anatomi Lipsienses: *Vasorum lymphaticorum atque lacteorum anatomico physiologica descriptio*, Lips. 1794.

eorum Abundantia et Copia innotuit, ut nil, nisi vasis istis construi vel conflare ^{membranam} tunicam eorum externam, palam pronuntiare sustinuerit ^{cl}vir illustrissimus MASCAGNI.

Tabula tertia et quarta. Tantam enim repraesentarunt vasorum absorbentium copiam, adeoque novae istae icones videbantur summi Anatome *WALTERI* Filio, ut de veritate earum dubia non modo moveret, sed etiam, Venae portarum ramos pro vasis absorbentibus venditatos esse, censeret.

„Depinxero“ — inquit — „hi clariss. Viri vasa hepatis lymphatica tam numerosa et in tot ramulos se dispergentia, ut superficies superior et inferior hepatis instar retis vasculosi appareat, quam structuram, ni ramulos Venae Portarum una cum vasis lymphaticis iniicimus, certe nunquam repraesentare possumus, nam invenimus, si injectio etiam felicissime successerit, maiores tantum truncos lymphaticorum minime vero illam structuram arboraceam.“

„En rationes meae, quae probant Illorum rete vasorum lymphaticorum in superficiebus hepatis esse solam Venae Portarum distributionem.“ — Vide eius Annotationes academicae. Berolini 1786. p. 101.

Hinc paulo post — „Elegantem quidem, sed fictam delineationem“ — vocat — ibidem p. 104.

Sequente etiam anno 1787. Clariss. MASCAGNI — in Vasorum lymphaticorum Corporis humani Historia et Ichnographia, Senis, folio — Iconem vasorum absorbentium hepatis, Tabula decima septima, magnitudine naturali edidit, quae longe adhuc maiorem eorum copiam exhibet, quam *WERNERI* et *FELLERI* icon. — Haec MASCAGNI pictura tanta veritate, subtilitate, et elegantia se commendat, ut, qui superari possit, non intelligam.

Pari modo vesiculae felleae vasa absorbentia praeterito iam saeculo non modo cognita, sed etiam, quamvis ruditer, delineata exstant; v. c. apud *GODOFREDUM BIDLOO*, Anatome Humani Corporis Amstelodami 1685, in folio, Tabula trigesima septima, figura secunda.

Nitide satis vasa absorbentia Vesiculae felleae cum glandulis, quae ad ea pertinent, delinearunt iidem Anatome *Lipsienses WERNER* et *FELLER*, loco citato,

jacquies
icon
jacquies
 Multoties in vasa absorbentia sana et mor-
 bosa Hepatis et Vesiculae felleae ex industria in-
 quisivi, pluries ea in corporibus variae aetatis et
 sexus, quinimmo in tenellis infantibus mercurio
 replevi, selectaque specimina servo in liquore
 idoneo. Tanta in eis vasorum absorbentium co-
 pia cernitur, ut, ni superet tabulas MASCAGNII,
 saltim eas exaequet. Eadem vasa absorbentia
 etiam materia ceracea per arterias hepaticas re-
 plevi, dum nimirum hinc et illinc ista materia
 extra vasa iret.

Eadem aëre turgida vidi in corporibus pu-
 trescentibus.

Eadem et via retrograda, valvulis vel vi vel
 putredine destructis, facili satis negotio replen-
 tur, quamquam vix eo adduci possum, ut cre-
 dam, hoc etiam vivo in corpore unquam accidere.

Eorundem vasorum denique splendidissima
 specimina Londini in Museo HUNTERI, et Edin-
 burgi apud MONROUM lustravi.

Inprimis autem ad morbos hepatis Icterique
 naturam penitus intelligendos, vasa absorbentia
icon
 hepatica interna, sive profunda, in ipsa scilicet
icon
 hepatis substantia, detegere et eruere studui.
 Eorum autem, quantum novi, nulla omnino
 adhuc exstat Icon.

nimis tamen regularia et iusto graciliora valvularum
 intervalla exhibentur.

Optime ea idem MASCAGNI exhibuit fida ad natu-
 ram imagine.

Vasa absorbentia hepatica, ordine naturae solito, subtiliores bilis particulas, vaporemque in Abdomine exhalantem, revelunt; morbose vero dilatata, ipsam bilem suscipere poterunt. Patulae enim satis viae in ipsis videntur *b)*, ad bilem, iam a sanguine secretam, in ductibus biliariis remorantem, sanguini reddendam.

Quotiescunque ergo Ductus hepaticus, et Ductus cholodochus, quinimmo Ductus cysticus *c)*, tanta vi ab irritatione quadam contrahitur *d)*, vel obice quodam, v. c. calculo felleo *e)*, obstruitur, vel ab ipsis tumidis glan-

b) Viam valde patulam ex ductu hepatico in vasa absorbentia hepatis iam *NUCK* invenit. *MECKELIUS*, Pater, omnesque, qui illos tempore exceperunt, Physiologi confirmaverunt.

c) *DELIVS* — p. 17. — testatur, a resorpta bile cystica icterum oriri.

d) Consentientem habeo *A. G. RICHTER* — Medicinische und chirurgische Bemerkungen, Erster Band, Goettingen 1793. 8. Seite 59. — Mir ist es wahrscheinlich, dass die gewöhnlichste Ursache der Gelbsucht ein Reiz ist, der auf das Gallensystem wirkt, und den Zufluss, die Absonderung und die *Aussonderung* der Gallenfeuchtigkeiten hindert, et q. s. r.

e) A Ductu choledochu, per calculum felleum obstructo, icterum oriri, quamquam vulgatissimum videatur, testes tamen aliquot, omni exceptione maiores, in medium proferre liceat.

J. B. MORAGANI annotat, calculos felleos icterum non producere, nisi ductum choledochum obstruxerint.

G. PROCHASKA — Annotationum academicarum, Fasciculo secundo, Pragae 1781. p. 30. — disserte asserit, a calculo felleo ductui cystico impacto nascitur icterus, nullo simul in hepate vitio obtinente.

ALANUS MONRO — The structure and Physiology of Fishes, Edinburgh. 1785. fol. p. 14. — Versione germanica, quam *J. G. SCHNEIDER* cum notis *CAMPERI* edidit,

*de quibus capitulum de ictero
proponitur infantum auctore
Hering*

dulis ^{ab} sorbentibus prope Venam Portarum sitis comprimitur f), ut bilis profluvium in Intestinum duodenum, vel in ^{felleam} Vesiculam felleam cesset, nihilosecius autem bilis secretio continuatur, omnis omnino bilis secreta, in ductibus biliferis remorans, a vasis absorbentibus aufertur, per ductum thoracicum utrumque sanguini redditur, absolutoque per pulmones itinere ad cutis eam partem, quam rete mucosum vocant, defertur, eamque flavo suo colore imbuens icterum inducit.

Vel si ab ira incitantur vasa absorbentia, bilem assument, eaque bile vel icterus inducitur, vel lac nutricis inficitur, adeo ut infans vel lae respuat, vel diarrhoeam vel emesin experiatur g).

Vere hinc asseritur h): icteri caussam proximam in vasis absorbentibus ^{hepatis} haerere.

Vera autem observatione anatomica, nec hypothesis quadam, haec nituntur; etenim non modo ipse saepius in ictericis vasa absorbentia ^{hepatis} ^{felleae} hepatis et vesiculae felleae liquore luteolo, bilis

Lipsiae 1787. p. 22. — aperte docet, quoties calculus ductum ^{hepaticum} hepaticum vel choledochum obturat, toties etiam icterum oriri. Confer et tractatum meum de concrementis biliariis. Frosti 1795.

f) CRUIKSHANK Ductum choledochum et pancreaticum ab ipsis glandulis tumidis compressum vidit — Loca citato, p. 123.

g) BASILEWITSCH. Loco citato.

h) HEINE in Dissertatione in ^{capitulo} de Rhachitide ^{ad-} ducta. et C. H. RIEMANN Diss. sistens Icteri pathologiam, Goettingae 1793. aperte asserit Icterum oriri aucta actione Vascularum absorbentium per irritamentum quoddam; eadem et W. SAUNDERS Treatise on the Liver London 1793. p. 88. propriis experimentis docet.

H 5

*siq. arepa
re. cutis. oritur
Hydropem anafora
... Clig in Gufioni
atm de mellefaja*

*t, quod tractum
delipionum aigant
absorbentibus
p. 60. 5. XI.*

*repa vasa absor
bentibus, eoque
reporum humum*

*d. Handbuch
Icteric. 5378*

Quamquam autem ^{segni}ties alvi in ictericis observatur, attamen in obstructionibus alvi pertinacissimis, quin immo lethalibus, icterum non vidi.

Eorundem autem vasorum absorbentium ope Icterus, quocunque demum modo natus, postmodum evanescit, dum bilis particulas, in reticulum cutis mucosum depositas, iterum revehunt.

SCIRRHUS HEPATIS.

§. XLVI.

Si eadem vasa absorbentia ^{hepatica} vel ob debilitatem vel ob aliam causam v. c. inflammationem contrario modo officio suo omnino non funguntur, lymphamque stagnantem relinquunt, ^{hepar} turgebit, increscet, scirrhosumque denique redditur. Diutius autem persistente ^{hepatis} scirrho, vasa absorbentia ad actionem redeuntia, omne istud inutile avehunt, ^{hepatis}que volumen imminuunt a).

- a) Merito hinc *WILL. SAUNDERS* Tr. on the structure economy and diseases of the Liver London 1793. p. 199. pronuntiat: We know, by a law of the absorbent system, that such parts as cease to perform the office nature intended they should do, are considered as useless bodies and are fit subjects for the action of these vessels: hence it is that there is a greater diminution of substance in those scirrhosities which are of long standing, than in such as are of more recent date.

*hepatica
e cutis cutis
Hydropem anafora
...elig in gusfion
...de mellefion*

*t. quod tratum
delipionum aquam
absorbentem
...f. 60. §. XI.*

*hepatica vasa absor
...humana*

*d. Handbuch
...378*

Mirifice hinc profuerunt, ad hepatis et splenis infarctus reserandos, discutiendos, et abigendos, frictiones ^{ex} cum unguento ^{ali} Mercurio ~~parato~~ plantis pedum adhibitae. Medicamentum enim istud solvens easdem glandulas transeundo reserat, quas lymphæ in hepate remorans permeare debet, ut in sanguinem redire possit.

MORBI LIENIS.

§. XLVII.

Nonne plurimi Lienis Morbi, praesertim stases sic dictae atque indurationes, in isto contextu celluloso essent inquirendi, si iste modo praeternaturali impletur cruore? Et nonne, vasorum absorbentium systema aliquantum simul compatiatur, necesse est? a)

Confer quae paragrapho antecedente dicta sunt.

a) IOANNES LEONHARDUS FISCHER Anweisung zur praktischen Zergliederungskunst. Leipzig 1793. 8. p. 236.

*de quibus
propheta
Hörning*

HYDROPS.

§. XLVIII.

Omne fere Oedema, omnemque Hydropem, derivandum esse a vitio systematis absorbentis, sive a resorptione impedita a) seri sanguinis, vel in contextu celluloso depositi, vel in cavitates corporis nostri exhalati, experientia et ratione comprobatur.

Trifariam distribuit Hydropes quoad causas Cl. CRUIKSHANK: Ad primam Classem retulit; Hydropes a debilitate universali corporis, a relaxatione finium arteriarum, et amisso tono (sic dicto) vasorum absorbentium: — ad secundam; Hydropes a praegressa inflammatione, qua seri secretio augetur: ad tertiam; Hydropes ab obstructione venarum, si sanguis non libere per venas refluere possit.

Bifariam vero distribuit Hydropem MASCAGNI. — Primam Speciem vocat, ubi glandulae obstructae sunt; — Secundam Speciem vero a dilatatis vasis absorbentibus derivat, ubi valvulae in truncis maioribus regressum non impediunt.

Notissimum enim est, Hydropem utpluri-

- a) A resorptione impedita ipsum Hydrocephalum oriri. ED. FORD, in London Medical Journal 1790. Volume undecimo asserit.

Hydrops
in cutis oritur
Hydropem anasarcae
in celis in pleura
et pericly vasorum
absorbentium cutis communis
et telae cellulosa
explant. Darwin.
Lyonen. p. 39.

et, quod tertium
dispositionem aquae
absorbentem
inf. 60. 5. XI.

scilicet a vasa absor-
bentibus, etque
aggregantibus
humoribus

gel Handbuch
Pathologie. 5378

mum obesitatem pedissequum esse b), absorbentia autem vasa in obesitas angustata, et quasi ab adipe compressa, animadvertere mihi visus sum.

Vulgatissimum profecto est, oedemata pedum videre in gravidis, a pressione uteri gravidi in vasa absorbentia glandulasque absorbentes Pelvis, quae partu edito sanantur, pressione ista nimirum cessante c).

Nec minus notum, ab aliis tumoribus quoque, vasa absorbentia prementibus, oedema hydropemque nasci d); v. c. ab aneurysmate Arteriae popliteae oedema cruris e) oritur.

Rectius hinc Oedemata explicantur a vasorum absorbentium potius quam a Venarum Compressione.

- b) Hydropem obesitatis pedissequum non tam e compressione absorbentium vasorum, quam e debilitato vitiatoque chylicationis et haematopoieseos opere nasci autumat JANSSEN — Dissertatio de Pinguetudine, Lugd. Batav. 1784. p. 151. — Nonne vero compressione quacunq[ue] absorbentium vasorum et glandularum mesentericarum chylicatio et haematopoiesis turbatur?

Consentit vero mecum BASILEWITSCH, a compressione vasorum absorbentium hydropem derivans.

- c) Idem asserunt: MASCAGNI — p. 18. — et HASE — p. 28.

- d) Oedema brachii tumorem carcinomatosum glandularum axillarium insequens saepius vidi.

Beobachtung ueber ein lymphatisches Anschwellen am Fusse mit Beinrass des Mittelfusses durch Nussbaumlaub-decoct mit Potasche geheilt — CAGNON in DESSAULT Journal de Chirurgie, Tome 3. Article 40. ab abscessu in axilla oedema brachii vidit FRANK auctore J. GAUTIER l. c. p. 89.

- e) BASILEWITSCH l. c.

der quod illa
pedissequum
pedissequum

„Crebrius autem Oedema nascitur, — inquit
JOANNES ZACHARIAS PLATNER f) — „si san-
„guis non libere per Venas refluere potest Mem-
„brum enim quodvis intumescit, si maior vena
„ita comprimitur, ut sanguis . . . per eam aegre
„fluat. Eam ob causam gravidis, quarum iliacae
„venae ab uteri mole premuntur, pedes intumes-
„cunt, id quod etiam iis accidit, qui, in rheda
„sedentes, vel equo vecti, iter faciunt, quorum
„etiam venae, quae per femora descendunt,
„premuntur. Si ossibus fractis ferulae pannique
„ita accommodati sunt, ut venae comprimantur,
„idem tumoris genus oriri solet.“

Facilem explicationem haec omnia admit-
tunt; ex anatomicis enim disquisitionibus no-
stris diebus notissimum est: Venas, imprimis
maiores et profundas, a Vasis absorbentibus non
modo comitari, sed etiam venas plexibus horum
vasorum circumdari et inretiri adeo, ut separata
illorum pressio ne cogitari quidem queat, quocirca
cum venis compressis simul necessario vasa
absorbentia comprimuntur.

Optime hinc ipse PLATNER alio loco g) do-
cuit: „Oedemata etiam nasci, si Venae illae
„exiguae quae lympham recipiunt, a quacun-
„que caussa comprimuntur atque arctantur.“

f) Institutiones Chirurgiae rationalis tum medicae tum
manualis. Editio novissima. Lipsiae 1785. §. 729.

g) Loco cit. §. 730.

*Hydrops
in cutis oritur
Hydropem anafro-
dis. Cuius in pueris
et in metafora*

*et, quod tritum
dilectum aequum
absorbentibus
inf. 50. §. XI.*

*crep a vasa absor-
tentibus, eque
appositorum
humoribus*

*gel Handbuch
Pathologie. 5378*

^{con oculi}
Hydrophthalma. (Kaspering) polype nasi obortam exspiratione polypi
sanatum vidit Attenhofer §. 132.

Hydrocephali causam in expleti spirituum obstructio sanatur (vel obortam?)
vidi Attenhofer §. 132.

128

HYDROPS.

Quinimmo calculum, in ductu thoracico
haerentem, ut causam hydropis accusarunt *h*);
quod tamen nimium videtur, cum non simplici
tubo ipse sinister ductus thoracicus construatur.

A furunculo in dorso Penis, prope Synchon-
drosin ossium pubis, saeviente stricturam vaso-
rum absorbentium excitante, ingens oedema prae-
putii ortum vidi, quod sponte iterum sanescente
furunculo evanescebat *i*).

Hydrocalen oris
vitio vasorum absor-
centium.

Job. Aug. Ehrlich.
Chirurg. Joh. Beck
abth. 1. Leipzig
1795. pag. 158 Cap. 12.

Hydrarthrum oriri a pressione vasorum ab-
sorbentium in vicinitate articuli *h*), alii anno-
tarunt.

Pari modo glandulae absorbentis obstructio-
nem *l*), vel cicatricem *m*), vel excisionem *n*)
oedema insequitur.

Hydrothorax fere
hydroem Uteri
oriri a furore
Uteri
progrini p. 30.

Bubonem

h) J. D. SCHERB. — In ALB. HALLERI Dissertationi-
bus pathologicis.

i) Terribiliter dolens hic furunculus, utpote partem
adeo sensibilem occupans, stranguriam praeterea et fe-
brim, deliria convulsionesque excitaverat, donec cultro
pus emitterem, quo morbus illico levabatur.

k) BASILEWITSCH. Loco cit.

l) Saepe MASCAGNI — p. 20. — glandulas hydropicorum
adeo obstructas invenit, ut liquor magna vi impulsus potius
vasa rumperet, quam glandulas transiret. — Glandularum
inguinalium suppuratione orta obstructio oedema pe-
dis excitat, ut G. HUNTER — loco cit. p. 58. — ob-
servavit. — Pari modo iam I. Z. PLATNER eadem fere
annotaverat, in Institutionibus Chirurgiae, §. 750. ^x

m) G. HUNTER — loco citato.

n) Exstirpata glandula in artubus oritur oedema, quod
illico sanatur parvis puncturis in inferiore parte ar-
tuum — BENJAMIN BELL, System of Surgery, Capite
58. Sectione 3. §. 6. p. 502. —

J. Camper in aegria Sift
de Hydrop. Cap. 4. §. 9.

et quod ille
spatium
Hydrum

Bubonem autem venereum sive glandulam inguinalem viru venereo tumentem, oedema pedis non ciere ^{potest} non mirandum, quippe praeter hanc unam (plerumque enim bubo una tantum glandula constat) glandulam morbosam aliae adhuc supersunt glandulae perviae.

Quare non difficilis omnino videtur explicatio: Cur bibitores liquorum spirituosorum denique diu hydrope insuperabili mulctantur; Spiritu nimirum sensim sensimque lympham inspissatur, adeo, ut glandulas obstruat o).

Aliis visum est, aquam ex Atmosphaera humida resorptam Hydropem ciere posse p).

Quin frigore diu in vasa absorbentia agente oedema oriri q).

Quidquid ergo lymphae vitalem motum, et lymphae excretionem impedit, potest oedemati occasionem dare r).

Subtilior videtur quaestio: an a vi irritabili vasorum absorbentium immutata pendeat hydrops,

Extirpata glandula axillari oedema Brachii oriri, CRUIKSHANK — p. 126. — vidit.

Eadem ipse pluries vidi.

- o) HEINE Dissertatione citata, p. 17. — rem paulo aliter explicat. *El. Phys. Tom 5. lib 12. sect 2. §. XX.*
- p) BASILEWITSCH. *Brachiare, Hutter, & Meier*
- q) KEUP in BALDINGER Neues Magazin fuer Aerzte, Band 9. Stück VI. p. 500 eiusmodi exemplum narrat.
- r) G. I. PLATNER. Institutiones Chirurgicae. Lipsiae 1783. §. 728.

SÜMMERRING DE MORBIS.

I

passive
A transpiratione cutis, cutis
oedema vel Hydropem una, sive
Lentin. Hydropem. *1780*
Guernel. Brande über die Metastase
p. 127

"Dubio hodie caret, quod tractum
non omnino hydropticum aquam
ex Atmosphaera absorbentur
G. G. Oltrop l. c. p. 50. §. XI.

Sic hinc compressa vasa absor-
bentia vases tolluntur, eoque
motu passiva aqua foras
congestio oriri.

Springel Handbuch
der Pathologie. 2378

ut nimirum irritabilitatis diminutione oriatur hydrops, auctione ^{aliter} ~~ione~~ evanescat s).

In cadaveribus hydrope defunctorum vasa absorbentia tum ob dilatationem, tum ob fluctuationem in sero, tum ob pelluciditatem minorem tunicarum magis conspicua occurrere, adeo, ut multo facilius eorum indagatio succedat, iam vulgo notissimum videtur t).

Prouti porro lymphæ hydropicorum vel in cellulis cutis, vel in cavitatibus stagnans, colore et densitate variat, pari modo et liquorem, in vasis absorbentibus contentum, variantem invenimus, modo enim limpidior, modo flavus, subrubellus, rubicundus, aquosior, vel serosior cernitur u).

Cellulas medullares ossium etiam in anasarca sero, locum medullae occupante, adeo repletas vidi, ut vel in ipsa sic dicta diploë cranii loco medullae, per vasa nostra absorptae, serum tantum tenue invenirem v).

s) Hydropum a spasmō vasorum absorbentium derivatorum exempla vide in Commentariis Lipsiensibus, Tomo trigesimo, p. 343. — A languore eorum, p. 351. et METZLER Preisschrift von der Wassersucht, p. 86. — Hydrocelem frequentissime a vasorum absorbentium, ad tunicam vaginalem et albugineam pertinentium inertia oriri, assertit JAMES EARLE On the Hydrocele. London 1791. 8.

i) Confer inter alios et HAASE, loco cit. p. 2.

ii) MASCAGNI, loco cit. p. 20.

iii) HALL in London Medical Journal for the Year 1786. p. 11. p. 158. — vidit et ASSALINI, p. 44.

Hydropis in a paralyti
vasorum absorbentium
E. Darwin assertit *Œconomia*
Lond. 1794. Vol. 2. p. 10. Vol. 2. p. 68.

In ascite et hydrothorace biliosa tumen
tuncquam vas absorbens eā aqua tur-
pida potius detegit in superficie, cui alluit
aqua colorata.)

x) Cf. Brugmann auctore C. G. Ontog. 1c
pag. 194.

³ Vasa lymphatica in ¹ Hydrothorace
² praecipue hepatic sero
substantia semper impleta
invenit Schroeder van der Kolk
loc. p. 101.

Plerumque quamquam non semper in hydrope cum vasis absorbentibus praeter modum dilatatis simul glandulas absorbentes tumentes inveniuntur. Sic cuiusvis quotidie licet in oedematibus pedum animadvertere glandulas inguinales inferiores tumentes. ^{faciunt etiam} Sic pluries in hydrope ovarii vasa absorbentia, ab ovario ad glandulas lumbales tendentia, praeter modum diducta et dilatata vidi x); vice versa enim glandularum tumorem insequitur oedema, et oedema insequuntur glandularum tumores.

Aliis Auctoribus simul glandulas in hydrope ^{de sunt} durescere visum est.

At nihilosecius eiusmodi glandulas adhuc satis pervias esse, iniectionibus mihi constitit, quibus in oedematosi corporibus per vasa absorbentia digitorum pedis ipsum ductum thoracicum replevi.

Hydatides ex obstructione vasorum lymphaticorum oriri iam docuerat BIDLOO y).

Hinc non displicent, quae VAN SWIETEN z) habet: „Cum valvulas adeo manifestas detexe-

w) Consentit mecum MONRO — On the Nervous System — non semper tumere glandulas in hydrope, sed saepe sanas esse. Glandulam porro pituitariam in duodecim hydrocephalicis sanam reperit, quam PETIT tumidam vidisse vult.

x) Confer egregiam eiusmodi observationem WRISEBERG in Notis ad HALLERI Primas Lineas Physiologiae. Nota 36.

y) Exercitationes anatomico chirurgicae. Leid. 1708. 4.

z) Commentariorum in BOERHAAVII Aphorismos Tomo quarto, ad §. 1215. — ibid. ad §. 1220. p. 169.

Warton et

cfr. quae circa hanc rem annotavit Morgagni de Sed et Caus. Morb. Epist. XXXVIII. art. 352. 1637.38.

„rint Anatomici in his (absorbentibus) vasis tu-
„mebit locus inter binas valvulas interceptus, et
„forte haec una ex caussis est, unde hydatides
„oriuntur;“ et ex his hydatidibus -- adde-
rem — hydropem, v. c. funiculi spermatici
et testiculi, quem hydrocelem dicunt, quam-
quam non ignorem, hydatides nonnullas ve-
ros esse vermes a).

Vasa absorbentia distenta in Hydatides ab-
ire, et interdum e corpore, v. c. e renibus
per ureteres eliminari; si vero hydatides in
cavo quodam contentae adeo distenduntur, ut
denique rumpant, hydropem topicum oriri/
BASILEWITSCH autumat.

At etiam e ruptura vel sectione vasculi ab-
sorbentis oedema vel hydropem oriri posse b),
certe non improbabile videtur, quod vel exinde

a) J. L. FISCHER Taeniae hydatigenae in Plexu choro-
ideo inventae historia. Lipsiae 1789. — et F. A.
TREUTLER, Dissert. Auctuarium ad Helminthologiam
Corporis humani, Lipsiae 1793. 4.

b) Negavit, a ruptura vasorum absorbentium hydropem
frequenter oriri, DONALD MONRO — On the Dropsy.
London 1765. — Contrarium vero idem VAN SWIE-
TEN, loco citato, Tomo quarto, ad §. 1228. p. 180.
aperte docuit: „Patet, inquit, rupturam vasorum
„lymphaticorum inter causas hydropis numerari posse.“
Idem docent HAASE, loco citato, Capite quarto,
Dissertatione de Hydrope, p. 23. f

Mediam quasi sententiam tueri videtur MASCAGNI,
dicens: se non credere, a ruptura absorbentium va-
sorum, nisi a causa mechanica vel corrosiva, hy-
dropem oriri posse; id enim coniectura assequutus
videtur, quod revera vidi.

hydr
vase
E. D.
Lons

In apertis et
mucosa m
gida postea
aqua col

Lower 20. lorde cap. 2. et.

et Grunzel Pathologie 557 et 652 p. 8.

concludo, quum verum oedema pedis natum viderim a vulnerato vasculo absorbente in mal-
leolo interno decurrente; vasculum enim illud
vulneratum, sub cutis vulnere crustula clauso
apertum adhuc latitans, lympham contextui
celluloso infiltrabat.

Pari modo a laesione trunci maioris horum
vasorum in operationibus chirurgicis oedema
nonnunquam oritur c).

Pluries etiam observavi, in recentissimis cada-
veribus mercurium integra sub cute in regione
vel tibiae vel genu extra vasa ivisse, licet
tubulus remoto satis loco inter hallucem nempe
et digitum secundum pedis vasculo absorbenti
infixus esset, nullumque obstaculum offenderet
Mercurius, libere ad usque glandulas inguinales
procedens; nonne idem, quod hic lenissimo
mercurii impulsu et tam remoto in loco acci-
dit, violentia maiori quadam, cui vivum cor-
pus saepius exponitur, accidere poterit?

Hinc non mirandum, Hydrocephalum in-
ternum pro insanabili morbo esse declaratum a
medicis, qui e ruptura ^{vale}vasculi absorbentis illum
derivabant d). Non autem omnis Hydrocephalus
insanabilis est e).

c) BENI. BELL, loco citato, Capite trigesimo octavo,
Sectione tertia, §. 6.

d) MANNING, Modern Practice of Physick, p. 220.

e) CRUIKSHANK in celebri illa Littera ad CLARE hydro-
cephalos sanatos commemoravit; ita et FOTHERGILL
et MONRO, on Nervous System, — et novissime CL.
FLAJANI in Osservazioni pratiche.

I 3

in telum cellulofan
proprio

non improbabile.
Exemplum hydropsis ex
erofine vel ruptura vas-
culi absorbentis intestinum
chyliferi. — auctor
Charl. Smith. American
Medical Repository Vol. 3.
p. 110. in Folio Phila.
phical Magazine number
34. Novbr. 1807.

Mutationes quae in
structura cerebri & cerebelli
per Hydrocephalum acci-
dunt ope vasorum ab-
sorbentium fieri demonstrant

Alex. Monro. Three Treatises.
Cap. 4. Edib. 1797.

*Hydrophthalmiam a systematis vasorum absorbentium paralyti pendere
annotat Cl. Haugwitz phil. phil. Bened. in egrigia op. de morbis
humani vitrei in oculo humano Liff. 1809. §. 50.*

Neque displicent, quae MASCAGNI habet f): Cum alicubi cessat absorbentium vasorum actio, aucta ex aliis partibus affluxus facilitate, eo validius absorbeant absorbentium extrema, quo facilius se exonerabunt. Hinc in Hydropicis retenta lymph^a in corporis cavitatibus, ob suspensum ^{ab}sorbentium officium; et facta absorbentibus aliunde orientibus via liberiore, urina ^{partim} ~~mi-~~nor fit et crassior, quae deinde statim augetur, cum, restituta collecti fluidi absorptione, reliqua absorbentium systematis actio retardatur. Hinc et sitis hydropicorum explicanda. Sitis enim actionis auctae vasorum absorbentium criterion esse solet g).

Functione autem absorbentium vasorum restituta hydrops sanatur, ad quod frictio et inunctio stimulantibus iuncta multum valet, absorbentis systematis lentorem sublevans. Sic durum hydrocephalum vel mercurio interne sumto, vel inunctione mercuriali, quin sola externa vini scillitici applicatione h) sanatum novi-

f) Loco cit. p. 106. Nota a).

g) JOHN GARDINER, on the Gout, p. 236.

h) GIUSEPPE FLAJANI, Osservazioni pratiche sopra l'amputazione degli articoli — l'idrocefalo etc. Romae 1791. disserte asserit, p. 206. — „L'effetto, che „questo rimedio (scilicet vinum scilliticum) ha pro- „dotto nei tre consecutivi infermi, mi da luogo di „proporlo come specifico ed unico per vincere e dis- „sipare una raccolta, o sia travaso di linfa, che si fa „nell'interna o esterna parte del cranio.“ Etenim per vasa absorbentia ^{portantem} scillae subtilissimam corpus intrare, idem Autor p. 204. non immerito suspicatur.

h7/

orfi

E.D.

Coni

In afeit
mucosa
gida pro
agua

mus i). Sic ^{ingeritis} oedema palpebrae superioris; sic hydropem Pectoris k); sic hydrocelen testiculi l); sic oedema pedum tumoremque genu lymphaticum m) saepius unguento mercuriali inuncto feliciter sanavi, Sanarunt et discipuli mei.

Notandum autem, hasce frictiones ita esse instituendas, ut semper secundum ductum vel cursum vasorum absorbentium ex anatomicis notum peragantur.

Emeticum pari modo omnis corporis, hinc et totius systematis vasorum absorbentium, imprimis ductus thoracici utriusque, anterioris et posterioris, conquassatione, absorptionem augendo, in hoc morbo prodesse, experientia docuit, adeo ut minime mirandum sit, emeticum subito saepe hydropem sanasse; ex stupenda enim vasorum absorbentium copia, cuius ne decima quidem partem optimaе MASCAGNII Icones exhibent, luce clarius apparet, nullum hucusque exemplum exstitisse tam subitaneae excretionis criticae aquarum hydropicarum, cuius ratio non facile reddi queat.^{x)}

i) CRUIKSHANK Littera ad Clare.

k) CRUIKSHANK Littera ad Clare.

l) Venerabilis Doctor DEJEAN mecum communicaverat miram huius remedii efficaciam, multis mihi casibus stabilitam.

m) GAZETTE de Santé, p. 63.

oedemata pedum quae lentius
sequebantur, felicissime in se
ipso sanavit, unguento a mercurio
sublimato parato plantis
pedum illinito. Cf. Dr. Seubert

oedemata pedum rebellia tali modo
sanavit sequitur Altenhofer § 142.

x) Landont caetium et
Cruikshank & Camper
ingerens oedema parati
pauculi lapsa ortum
iacta nycthemera emetici
ope sanavi

Latam superficiem Pulmonis, inquit HAL-
LER n) aquulam de Pectoris cavea sorbere, non
dubium est. Nam vulnerarii medicamenti in
cavam Pectoris effusi sapor et odor in ore per-
cipitur.

vafa absorbentia

Laxantia medicamenta hydropem sanare vi-
dentur, dum vel ^{stimulo} ~~stimulo~~ vel ^{imminuendo} ~~imminuendo~~ massam
sanguinis ^{resorptionem} ~~resorptionem~~ augment.

Pari modo ipsa venae sectio interdum iuvat
in hydrop^e ~~scilicet~~ dum ^{massae} ~~massae~~ sanguinis immi-
^{nutio} ~~nitione~~ resorptio ^{augetur} ~~augetur~~ o). Nocet autem, ubi
venaesectione debilitatem totius corporis hinc et
systematis absorbentis auget.

Morbum, a laxitate vasorum absorbentium
et accumulatione lymphae ortum, manipulatione
magnetica dicta sanavit EBERHARDUS GMELIN p).

n) De Corporis Humani Fabrica. Tomo septimo. p. 20.
vel Libr. 8. Sect. 5. §. 19.

o) Sic STOLL et ill. FRANK acutos revera Hydropes repetitis
tantum venaesectionibus et refrigerantibus debellarunt
auctore J. GAUTIERI de struma, Vindobonae 1794. p. 87.

p) Materialien für Anthropologie. Tübingen 1791.

EMPHYSEMA.

§. XLIX.

Empysema sola systematis lymphatici ^{vi} actione tolli videtur.

Saepe enim in morbis ~~ipsis~~ ^{ostem} observamus aërem in tubo intestinali ex cibis vel succis propriis evolutum, magna interdum copia, ~~absque~~ ^{fine} ructuum vel flatuum emissionem sensim sensimque evanescere. An iste aër prius cum succis intime mixtus et quasi solutus in minus volumen redactus ^s cum chylo vasa absorbentia intrat? An solita forma et habitu elastico e ductu thoracico in venas pervenit? Prius longe probabilius videtur.

Aërem autem ipsa elastica forma sanguini ~~in venis immisum~~ ^{venarum mixtum} subito satis evanescere, BLUMENBACHII a) experimenta in canibus instituta abunde docent.

Aërem, ^{quocumlibet} ~~etiam~~ elastica forma in cutis contextu celluloso vel sub cute ~~hominum~~ contentum, horum vasorum ope evanescere, experimenta in hominibus instituta docuerunt, v. c. Nigritas orae dentariae, ut rheumatismo medeantur, cutem bono eventu sufflare, idque auxilium etiam

a) Medicinische Bibliothek, Band I. Seite 178. quo experimenta cum aëre fixo ^{quod aëre} et dephlogisticato sic dicto in vasa sanguifera siphunculi ope pulsa narrat.

Belgas bono eventu imitatos esse, GALLANDAT autor est b).

Facillime vero in cadaveribus aër putredine evolutus, ~~nostrum~~ ^{absorbentium} vasorum systema intrat, ut quotidie oculis ipsis cernimus. ^{obscure nunt.}

vafa asper
~~Sic in homine veneno peremto,~~ ^E eodem aëre, quo pectoris et abdominis cavitates textusque cellulosus inflata erant, simul vasa absorbentia ~~harum~~ ^{caputis} partium repleta invenit MASCAgni c) ^{in homine quem venenum suffulerat}

Sic eadem vidit in quibusdam inflammatione Intestinorum mortuis.

Saepeissime etiam ipse in sectionibus, tum anatomicis tum praecipue pathologicis, aërem putredine evolutum, vasa absorbentia replentem, reperi, adeo ut ^{nullos} ~~mihi~~ ^{tam} dubium nullum supersit, quodvis emphysema, dum aër vel a nixu erumpit e), vel a causa interna evolvitur in cavitate quâdam naturali, vel in abscessu includitur, vel largo et denso emplastro eius exitus impeditur, vel e laeso pulmone efflatur, non evaporatione aëris, sed vera assumptione per vasa absorbentia evanescere. ^{at}

b) Apud HALLER de Corporis humani Fabrica, Tomo primo, p. 27.

c) Pag. 21.

d) A. G. RICHTER Anfangsgründe der Chirurgie, Tomo primo, Capite 25. p. 682. aperte docet: his remediis actionem vasorum absorbentium augeri.

e) Exemplum Emphysematis in partu laborioso orti vide in Medical Facts and observations, Volumine secundo, Article quinto.

non minus spiritibus infusata emphysema tollunt

EMPHYSEMA.

139

Frictione autem et spiritiosa topice applicata in Emphysemate prosunt, ^{prim. videri} actionem vasorum absorbentium sublevando ^{et}).

f) Vide paragraphum praecedentem.

EMPHYSEMA.

§. L.

In emphyemate ingenti, quippe in cavo thoracis sinistro undecim librae puris continebantur, vasa absorbentia mirae dilatata, et glandulas, quae ad ea pertinent, inter cartilagineas costarum et ossa pectoris sitas, in eodem latere insigniter tumidas, in puero sedecim annorum ipse observavi; a resorptione ^{inter} vero puris tumores istos glandularum obortos esse, vel ex eo intellexi, quod in latere altero, dextro nimirum, cum sano fere pulmone etiam glandulae intercartilagineae ^{interpositae} dextrae a) naturalem molem non excederent.

Tanta autem puris copia, non modo diaphragmatis partem sinistram in saccum tenuem, in abdomen valde prominentem, et Ventriculum et Jecur e situ ^{de} pepulerat, sed etiam cor adeo ^{moverat} depulerat e sua sede, ut omnino in cavo thoracis dextro contineretur, idemque Cor ab eadem certe pressione undiquaque pericardio fir-

a) Has glandulas descripserunt et pinxerunt PETRUS CAMPER, — Over den Waaren Aart der Kankerwording, — et MASCAGNI, Tabul. 26. — Confer Caput de Carcinomate.

missime ^{adco} coalitum erat, adeo ut omnino nullibi separari posset.

Pulmonis autem sinistri, affecti et ad do-
drantem absunti, quod supererat fragmentum,
duriusculum et pleurae firmissime adhaerens in-
veniebatur. Cera tamen artificiose iniecta per
hocce fragmentum, lacerum undiquaque et ex-
ulceratum apparens, nullibi penetravit, sed
hinc inde eius particulas pelluentes, tenuissi-
ma membranula obtectas inveni.

Glandulae autem istae lymphaticae intercar-
tilagineae sinistrae ^{ibidem} quamvis insigniter tumerent,
facillime tamen repletionem cum Mercurio ad-
mittebant, e quo experimento iam tum tem-
poris intellexi b), eiusmodi glandularum tumo-
res inepte obstructions vulgo dici.

*Etiam in glandulas
sin. dext. obstruuntur
gravi in Jecore fit oratio
obstruunt vasa sanguis
ferri. duntaxat. bit. v. g.
et vasa absorbentia
pari fere modo (glandulas
dilatata videntur)
vasa absorbentia dilatata
reperiuntur.
Jecur. ut in vasis
vase obstruuntur vel
clausis v. v. duntaxat. arteriis.
Metalli, ut Theriacis
sanabili color.*

An Empyema, vel pus e Vomica rupta in
thoracem effusum, ni nimia eius sit quantitas,
totum resorbere et sic omnem morbum auferre
valent vasa absorbentia nostra? ^{Contingere licet} Quamvis raro,
tamen talem Epyematis sanationem contingere,
memoriae prodiderunt Viri idonei c). Neque

b) Hac die 21. Martii 1782. annotaveram, Post J. RE-
ZIUM, Virum egregium, similia de aliis viscerum
sic dictis obstructionibus docentem lactabar in specimine
observationum anatomico pathologicarum. Ticini 1784.

Eodem fere redeunt, quae CRUIKSHANK serius ad-
huc, nempe anno 1786. in Anatomy of the absorbent
Vessels dicit: „I do not remember an instance of sero-
„fulous obstruction in the mesenteric Glands, as made
„the Chyle remain in the Vessels.“

c) CRUIKSHANK, p. 235. et ASSALINI, p. 39.

me iudice ista spes omni probabilitate destituitur, si ex iis, quae in nonnullis aegris viventibus animadvertere mihi visus sum, concludere liceat.

A T R O P H I A.

§. LI.

Non alibi, inquit HALLER *a*), in corpore humano, quam in glandulis mesentericis, frequentior scirrhus locus est, et steatomatibus, etiam lapideis concretionibus *b*), ut omnino dudum earum tumor, et scirrhus pro causa peculiaris atrophiae infantilis habiti sint *c*).

a) Elementorum Physiologiae Tomo sexto, p. 361.

b) Scirrhus enormis librarum decem, et cystides oleosae, melleae, sebaceae, *PARE* Libr. XXIII. c. 36. In centro mesenterii gypsum pene durum *ELLER* Mem. de l'Acad. de Berl. XI. p. 26. add. *SYNOPSIS* p. 49. In atrophía mesenterium totum lapidosum *PANAROL* Pentec. V. Obs. 19. et lapilli, ut credebat, in venis mesaraicis *SCHNEIDER* catarrh. L. III. p. 257. Glandulae mesenterii tumidissimae, intus tartaro fetae *LOBSTEIN* de nerv. access. p. 41. In mesenterio atrophici glandulae lymphæ, etiam gypso, plenae *DROVIN* Journ. sav. anno 1690. n. 25. In Mesenterio strumae 70. *INGRASS.* tum. p. 229. Mesenterium scirrhosum *SALZMANN* p. 68. Ossicula in Mesenterio *A. BALTH.* ann. 1699.

c) Phthisis ex glandulis mesenterii scirrhosis *HORST* ad *MARCELLUM* p. 677. In tabido puero steatoma mesenterii pugni mole *GOELIKE* affect. mesent. n. 36. In atrophía glandulae mesentericae tumidae caseoso chylo plenae *DIERMBROECK* p. 70. In tabida glandulae mesenterii maximae *KERKRING* Obs. 18. Post febrim lentam saepe mesenterii glandulae argilla plenae *POMP. SACCHUS.* Scirrhus mesenterii in atrophía *NOUV. de la Republ.*

In Infantibus atrophia consumtis saepissime vidi glandulas mesentericas admodum tumidas. Quamquam autem eiusmodi glandularum tumores medicis vulgo *obstructiones* vel *scirrhi* vocentur, nihilosecius tamen ^{mercurio injecto} in artificiosis iniectionibus mercurio satis pervias reperi d).

Quocirca minus dubito subscribere, quae Cl. KORTUM e) habet: „Malum semper, „si mesenterium simul affectum. Duplex interim „casus distinguendus est. Si in scrofula proprie „dicta, sive nostra priori varietate, in qua „mesenterium non adeo pati solet, glandulae me- „sentericae quoque afficiuntur et tumere ac in-

des Lettres M. Julii N. Litt. Mar. Balth. 1705. p. 75. Acibo crudo scirrhi mesenterii morb. Vratisl. histor. 1702. p. 129. Atrophia ex glandulis mesenterii tumidis COLLINS p. 396. In Atrophia infantuli cum colicis doloribus scirrhus mesenterii grandis exulceratus HEBENSTREIT in disp. propr. In Rhachitica glandulae mesenterii induratae LANGCUTH puell. rhachit. Sed et ipse adeps mesenterii morbis est obnoxius PARE Libr. XXII. p. 707. Tumores mesenterii innumerabiles omitto. Ecce unicum Saccus 10 gallons capax cum plurimis hydatidibus minoribus. Ea aqua inter duplices laminas mesenterii effusa hepar et ventriculum in thoracem egerat, venas coëgerat in varices abire et rumpi MORLE chir. mem. p. 58. Tumore mesenterii cum hydatidibus, etiam cartilagineis partibus, tringinta librarum pondere HAEN IX. c. i. Mesenterium amplissimum, ponderosum, sursum et deorsum extensum, adipe duro plenum BADER Observ. 20.

d) Confer, quae de glandularum obstructione monui. BAUMEZ Mémoire, qui a remporté le prix sur la Maladie du mésentère propre aux Enfants, nommée CARREAU. Nîmes 1788. — Salzburger Literaturzeitung 1790. Nro. 5.

e) Loco citato, Tomo primo, §. 57. p. 346.

„durari incipiunt, pessimum, quoniam tunc exal-
 „tatum vitium omne corpus infecit, et mesente-
 „rium facilius in exulcerationem transit, veluti et
 „glandulae externae in scrofula proprie dicta ad
 „exulcerationem valde proclives existunt. In le-
 „viori e contra scrofulae mesentericae gradu in-
 „farctus glandularum mesenterii tam magni mo-
 „menti non est, sed saepe facile satis vincitur;
 „quare et atrophiam non nimium progressam
 „satis curabilem esse videmus. Hinc restringendum
 „duco assertum G. IOSEPHI f), atrophiam ex
 „obstructione glandularum mesentericarum ortam
 „curatu difficillimam et fere semper insanabilem
 „esse; quia vitium plerumque nimis sero in statu
 „demum morbi cognoscatur, glandulis iam fir-
 „miter induratis. Diagnosin quidem infarctus
 „glandularum mesenterii adeo difficilem haud
 „dixerim, si signa alibi proposita curate atten-
 „dantur.“

f) Observationes ad anatomiam et artem obstetriciam,
 pag. 14.

(The wasting of the body from fever)
Tuber corporis a febre (actione vasorum absorbentium)
omni *J. Quater on the Blood. p. 443.*

Atrophiam, quam idiopathicam, simplicem, vocat Halle) ex obliteratione*
vasorum absorbentium explicat.

Mém. de l'Institut national. Paris.
Tome premier. 1786. Observation

D'une Atrophie idiopathique simple, c'est-à-dire,
qui n'a été précédée par aucune maladie
antérieure, et n'a été accompagnée d'aucun
accident et d'aucun symptôme étranger.

PHTHISIS PULMONUM.

§. LII.

vafa aspi
scapulari
In vomica et exulceratione pulmonum glandularum absorbentium bronchialium tumores saepenumero vidi, in Pleuresia, Peripneumonia, et Phthisi Pulmonum glandulas axillares tumidas vidit ^{et} CRUIKSHANK a). — Glandulas absorbentes intercartilagineas in Empyemate vel rupta Pulmonum vomica intumescere alibi b) notavi.

Recte hinc CAMPER c) annotavit: „In de „Longteering is gemeenlyk het geheele kliergestel, „vooral rondom de Borstholte, zeer sterk aange- „daan, en opgezet.“

„Den 13. Dec. van den Jaare 1775. opende „ik de Borst van eene Vrouwe aan Longteering „gestorven, en vond alle die Klieren geweldig „nitgezet, die rondom de groote Vaten van het „Hart langs den Slokdarm, en tussen de long- „pypen enz. gelegen zyn, van gelyken.

„Als ik die Pleura, agter welke die Mam- „vaten liggen, geheel wegnam, vond ik voor „het eerst verscheidene aanzienlyke Klieren, „welke deezen Vaten verzelden, waarvan inzon- „derheid twee merkelyk nitgezet, schoon pla- „tachtig

a) Anatomy of the absorbent Vessels, p. 126. et 131.

b) In Capite de Empyemate.

c) Verhandeling over den waaren Aart der Kankerwor- ding, §. 6. et 7.

Some authors (Wells?) have supposed
Tubercles to be diseased Lymphatic Glands;
though anatomists have ^{not} hitherto detected
Lymphatic Glands in the healthy Lungs; and
for the following reasons.

1. Because disease has discovered Lymphatic Glands
& Lymphatic Vessels in many parts of the human
body which had been supposed to be destitute
of these.
2. Because Tubercles of ^{the} Lungs bear a
striking resemblance to the Lymphatic Glands in
colour & consistence, and to other diseased Lymphatic
Glands, as those of the Mesentery and Neck.
3. As Tubercles are often observed in clusters like
diseased Lymphatic Glands.
4. As Tubercles undergo the same morbid
changes as diseased Lymphatic Glands; and
where diseased, are filled by similar contents.

Edinb. 1813

Wm. Moore Culliver of Anatomy Vol. 2. p. 404

MONUM.

pulmonum glandu-
tumores saepe
a, Peripneumonia,
as axillares tumidas
undulantes absorbentes
ate vel rupta Pul-
libi b) notavi.

notavit: „In de
geheele kliergestel,
zeer sterk aange-

Jaare 1775. opende
ve aan Longteering
e Klieren geweldig
te Vaten van het
n tussen de long-
elyken.

welke die Mam-
, vond ik voor
nlyke Klieren,
waarvan inzon-
et, schoon pla-
„tachtig

s, p. 126. et 131.

art der Kankerwac

vafa. a. 10.

propi.

vafa alfo

foepi

„tachtig, de
„de overig
„naar evenre

„Dan ve
„gestorven w
„den buik al
„opgezet war
„deze Klieren
„lyk door de
„geweest zyn
„herinneren
„gemeld gevon
„als nog niet b
„heb kunnen o

In lapid
phthisin exci

Servo gl
tracheales ver
rius e) a me i

Non infre
dulas bronchia
sabulo intus a
gineis, osseis
farciri, quae
seos causa e

d) Charac
1787. p.
e) Conter
f) De Cor
Sommari

„tachtig, de groote hadden van eene haselnoot :
„de overige, die nederwaarts liepen, waren
„naar evenredigheid dier Vaten kleiner.“

„Dan vermits dit lighaam door Longteering
„gestorven was, en alle de Klieren zoowel in
„den buik als Boorst even eens aangedaan en
„opgezet waren, oordeelde ik, of misschien
„deeze Klieren, in gezonden onzichtbaar, alleen-
„lyk door deeze Ziekte dus aangedaan mogten
„geweest zyn: te meer, om dat ik my niet
„herinneren konde ergens deeze Klieren
„gemeld gevonden te hebben, gelyk ik dezelve
„als nog niet by de Beroemdste Ontleedkundigen
„heb kunnen ontdekken.“

In lapidariis pulvis inspiratione absorptus
phthisin excitat d).

Servo glandulas lymphaticas bronchiales et
tracheales verissimis calculis refertas in, lapida-
riis e) a me inventas.

Non infrequens est, inquit HALLER f), glan-
dulas bronchiales lymphaticas durescere atque
sabulo intus aspero repleti, aut variis cartila-
gineis, osseis lapideisque demum concrementis
farciri, quae non infrequens lentissimae phthi-
seos causa est.

d) CHAVET De Phthisi pulmonali haereditaria. Monasterii
1787. p. 44.

e) Confer §. de Obstructione glandularum.

f) De Corporis Humani Fabrica. Tomo sexto, p. 248.

SÖMMERING DE MORBIS.

Rectissime hinc meo iudicio Phthisin pulmonalem calculosam, id est, phthisin, ubi verissime calculi in pulmonibus ipsis reperiuntur, vasis absorbentibus tribuit DES GENETTES, ut egregio satis exemplo lapidarii ab ipso secti demonstravit g) ubi revera vas absorbens materia calculosa refertum vidit.

Phthisin vero non contagiosam esse, ingeniose demonstravit CHAVET h), sive potius HOFFMANN, cuius argumentis addere possum, quod saepissime anatomici et pathologi manus pure pulmonum e phthisicorum corporibus polluant, vix autem umquam id noxium fuisse novi.

Febrim hecticam a resorpto pure oriri, CULLEN et MICH. RYAN i) ^{et Willen^x} asserunt.

Tubercula morbosa in Phthisicorum pulmonibus fere semper reperiunda, glandulas affectas, recte animadvertit S. F. SIMMONS k).

In phthisi glandulae colli inferiores intumescunt et interdum suppurant l).

g) Journal de Medecine à Paris 1790. Juin. Idem ibidem 1792. Mart. Confer et SCHREGER Beitrage. Tomo primo, pag. 258.

h) Loco citato.

i) Ueber die Lungenschwindsucht. Leipztg 1790. 8.

k) Practical Observations and Consumptions. §. 1.

l) Glandulas colli inferiores intumescunt in phthisicis iam observavit SYDENHAM — Opera. p. 793. de HAEN — Rationis medendi Parte tertia, p. 187. — imprimis BRILLOUET Journal de Medecine 1777. Nov. — et PORTAL Memoire de l'Acad. des Scienc. à Paris 1780. omnium plurimis exemplis demonstravit Idem viri et. in opere classico *De la phthisie pulmonaire* Paris 1809.

Tomel p.

418. *procurat vero Tome II. p. 314 / 4.*

*secundum argumenta
Baumei Subitari
non posse phthisin vere
contagiosam esse camque
effugiam per atmospheraem
fides, urinam pedorem
spata communicari
posse. Paris. Gilibert.
p. 31.*

*x) on febrile discafer.
Vol. quarto p. 496. p.
Lond. 1804.*

Quinimmo in vasis absorbentibus pulmona-
libus phthisicorum pus verum inventum est m).

In phthisicis ex ulcere pulmonum peripneu-
monia (in qua praeter visceris infarctum frequen-
ter cito gignitur suppuratio), vomica, empye-
mate, et sic porro, a pure resorpto aliisque
miasmatis obstructae glandulae intumescunt,
inflammanur, et insuppuracionem abeunt.

Remedia ergo non solum morbo primario,
sed etiam partibus systematis lymphatici adfectis,
prudenter adplicanda. Cum vero obstructarum glan-
dularum actio vel tota, vel ex parte intercipitur,
indeque stases in pulmone et aquarum collectiones
in thorace enascuntur, remedia in glandulas
quo tendunt pulmonum vasa absorbentia, recta
ferenda sunt. Id optime efficitur, medicamen-
torum in vapores redactione, ut inspiratione
ad amplissimam pulmonum superficiem perve-
niant m).

*glandulae absorbentes pectoris
in phthisi, atro colore tinctae
et materia caesa maddo
simili infarctae reperiuntur*

*Mark on pulmonary consumption
with remarks by D.C. Smith.*

*In phthisi glandulae
mesentericae semper tumidae
reperiuntur. J. Kello p. 295.*

m) MASCAGNI, loco citato. — Confer Caput de suppu-
ratione. Wie oft ich ich nicht bei Sectionen von Lungenkrüftigen die eingefangenen Gelfasse der Lunge
vom Lungenarterie, Stroben, Adonophor. & 202
n) MASCAGNI, loco cit. p. 112.

*inquit Vir egregius Lentin in Commentationibus Giedlingensibus ad an. 1791 & 92.
occurrit agnita absorbentium vasorum systemata, inde ab anno 1789
quo Beytraege zur richtigen Verencywiffenschaft Edideram
tribus aliis tale pulmonali confectis quae foveculorum in ipsius
Diaphragmatis et costarum verarum systemate exortatorum vitam
servare potuit.*

K 2

NUM.
io Phthisis pulmo-
phthisis, ubi re-
ipsis reperitur,
GENETTES, ut
ab ipso secti de-
absorbens materia
sam esse, inge-
ve potius Hoff-
possum, quod
i manus pure
ribus polluant,
nisse novi.
to pure oriri,
erunt.
isicorum pulmo-
landulas affectas,
k).
inferiores intu-
l).
min. Idem ibidem
ege. Tomo primo,
ipaz 1796. 8.
ions. p. 1.
ntes in phthisis
p. 793, de Haer
187. — imprimi
77. Nov. — a
a Paris 1780. om-
em vir. cl. inque
annus 1804
Tome II. p. 34 p.

SPUTUM NIGRUM.

§. LIII.

Sp. nigrum a glandulis absorbentibus, prope Tracheam sitis, plerumque nigrum colorem gerentibus, interdum provenire videtur.

Vidit Editor Dissertationum selectarum pro usu Medicorum practico-^{a)}rum a) revera eiusmodi glandulam in Tracheam apertam, adeo, ut e glandula in hunc canalem materia ista promanaret.

a) Sammlung auserlesener Abhandlungen fuer practische Aerzte. Tomo sexto, p. 255. *

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

§. LIV.

In hominibus vitam sedentariam viventibus vasa absorbentia viscerum abdominalium a situ corporis flexi comprimuntur, lymphæ chylusque in glandulis retardantur, et obstructio glandularum oritur Autore BASILEWITSCH.

Sp. nigrum a glandulis absorbentibus, prope Tracheam sitis, plerumque nigrum colorem gerentibus, interdum provenire videtur.

Sp. nigrum a glandulis absorbentibus, prope Tracheam sitis, plerumque nigrum colorem gerentibus, interdum provenire videtur.

Sp. nigrum a glandulis absorbentibus, prope Tracheam sitis, plerumque nigrum colorem gerentibus, interdum provenire videtur.

T A B E S.

§. LV.

In tabe confectis optime conspiciuntur vasa absorbentia intestinorum, ^{quod} cum nihil adipis intestinis inesset; quare ex tali subiecto haec vasa pinxit I. D. SANTORINI a).

Sic in ^{homo} Viri cadavere, qui lenta febre perierat, cum ^{hepatis} hepatis, lienis, pancreatis, glandularumque mesentericarum obstructione, viginti post horas inciso, vasa chylosa ob residem chylum evidenter et perspicue iam apparabant IOANNI FONTAN^o b).

MASCAGNI c) autem vasa absorbentia et cellulas glandularum corrugatas et coarctatas, cum duritie maxima, et decremento glandularum, in tabidis vidit, praesertim in glandulis mesentericis.

Emaciationem etiam partis cuiusdam sive topicam actione vasorum absorbentium aucta oriri posse, non improbabile videtur d).

- a) Tabula posthuma decima tertia, Figura secunda, p. 154.
- b) Dissertationes anatomicae, Taurini 1745. — Dissertatio quinta, p. 176.
- c) Loco citato, p. 34.
- d) VALLI on Animal Electricity. Lond. 1793. pag. 309. teste MORGAGNIO nempe, in hydrophobia partem corporis quandam emaciari, reliqua corporis pinguedinem retinente.

STILLICIDIUM LACRYMARUM.

§. LVI.

Oculus lacrymans et Nasus stillans a functione Vasorum absorbentium debilitata provenit Auctore BASILEWITSCH.

CATARACTA.

§. LVII.

Post depressionem ^{an operatione chirurgica} Cataractae Lentem obfuscatam totam absumentam animadvertit POTT; id autem actione Vasorum absorbentium fieri verosimillimum est.

DENTITIO DIFFICILIS.

§. LVIII.

In Dentitione difficili ab inflammatis alveolis Dentium et gingivis saepissime, ut vulgo notum est, Colli glandulas intumescere et dolere, iam in Inflammationis generali consideratione notavi.

Cavendum hinc, ne isti tumores perperam scrophulosi habeantur.

HERNIA.

§. LIX.

Vasa Intestinorum, vulgo chylosa, in intestinis hernia devolutis diducuntur, vel varicosa redduntur, adeo, ut, si mercurio repleantur, pennae columbinae diametrum superantes, simul contortae, quasi et conglomeratae deprehendantur, cuius elegantissimum specimen MONRO Edinburgi servat, et (quantum quidem novi) inedita adhuc tabula exhiberi curavit, quam apud illum vidi.

x, *Monro Morbid anatomy* Edinb 1841. pag. 384.

a profrone herniae in
vasa lymphatica absorbentia
Hydrocelea cruri *W. Wilmer*
on herniae. Lond 1862. p. 27.

aperte sacro hernia
vasa absorbentia intestini
jejuni et ilei aere
expansa in vivo vidit
Asp. Copen. Anatomy
of the Hernia London 1804
pag. 29.

CIRSOCELE.

§. LX.

In Cirsocele Vasa absorbentia maximam tumoris partem constituere, autumat BASILEWITSCH a).

a) Loco citato.

CALLUS VENTRICULI.

§. LXI.

An Callus Ventriculi a Vasorum absorbentium actione impedita, opinabatur PETRUS CAMPER in colloquio mecum habito.

ACRYMARUM.

stillans a functione
bilata provenit Au.

CTA.

Lentem obfusca
verit Porri; id
entium fieri vero-

FICILIS.

matis alveolis
et vulgo notum
et dolere, iam
ratione notavi.

ores perperam

DIARRHOEA.

§. LXII.

Diarrhoeam oriri ab aqua ex aëre humido absorpto, suspicatur BASILEWITSCH.

FLUXUS COELIACUS.

§. LXIII.

Fluxum coeliacum

*phthisin intestinalem
lymphaticam vocandum
esse autumat auctor in
Allgem. Literatur-
Zeitung zu Jena. 1798.
Nov. 88.*

*Sectiones fluxu coeliaco
praeterea, ^{demonstrant} ~~in~~ ^{docent} ~~in~~
glandularum, intestinalium et
mesentericorum tumores.*

*K. Sprengel. Vothologie
Berol. 5. 5264.*

A resorptione chyli impedita fluxum ^{coeliacum} sive passionem coeliacam derivat HAASE a); parum vero me intelligere, quomodo id fieri possit, lubens confiteor.

In fluxu coeliaco enim chylum evacuari, ne cogitari quidem posse, mihi videtur, prouti VOGEL validis argumentis stabilivit in propria dissertatione b); docuit nimirum:

1) Recentiores Compendiorum Autores perperam fluxum coeliacum vocasse excretionem chyli, sive sinceri, sive cum fecibus remixti; nam

2) Nemo observatorum dixit, se vidisse hanc excretionem chyli.

3) Neque caussae a nuperis allegatae sufficiunt ad explicandam indolem morbi, scili-

a) Loco cit. p. 28.

b) Fluxus coeliacus genuina notio atque ratio exposita, Göttingae 1786. 68.

cet hunc non eiicere posset, si per longum tempus nulla chyli resorptio fieri posset.

4) In atrophia, aliisque morbis, v. c. rha-
chitide, ubi adsunt scirrhi glandularum mesenterii
et obstructio, non animadvertitur passio coeliaca.

5) Remedia iuvantia, quae sunt potis-
simum roborantia, testantur, contrariam plane
causam adesse, scilicet relaxationem potius,
quam obstructionem.

Et in compendio idem VOGEL c) denuo ex-
presse monuit.

„Nec obstructionem glandularum mesaraica-
rum pro communi causa atrophiae et coeliaci
fluxus venditare licet, nisi fallaciam in argumen-
tando committere insignem velis. Primum enim
non tam frequens est fluxus coeliacus, quam
dictarum glandularum obstructio; hocque post-
remum vitium millesies occurrit sine ventrali
fluxu. Quamvis equidem, quisquis hoc ipso
laborat, obstructas habet glandulas mesaraicas;
non tamen vicissim ille in profluvium nostrum
semper coniicitur, cuius mesenterii glandulae
intumescunt ac induratae sunt. Quapropter licet
haec duo mala se interdum comitentur; nulla
tamen necessitas nos cogit ad concludendum, quod
unum alterius causa sit sive producat ab al-
tero. Habent potius haec duo mala communem

c) Academicae Praelectiones de cognoscendis et curandis
praecipuis corporis humani affectibus. Goettingae 1772.
8. §. 339 et 340.

parole
sur intelli
actuelle
No. Diabète
1. Léod 1797.

entre stabiliser
has morbo
balnei non
dél Gérard
H. 11.

time Léod 1798
Spection has
condition or
patens gland
glands etc

11.
11.
volgata et
ita
567.08.69

„aliquem fontem, ex quo simul propullulant,
 „sesequae adeo nonnumquam comitantur, cache-
 „xiam, puta, quae, in pueris inprimis, persaepe
 „utrumque producit.“

„Non magis vero Coeliaca ab obstructione
 „vasorum lacteorum in suis osculis bibulis, quam
 „multi quidem ex recentioribus adeo pro unica
 „huius fluxus causa habent, quam ab ante me-
 „morata obstructione glandularum mesaraicarum
 „oritur. Sive enim illam a pituita vel muco in-
 „testinali, sive a cicatriculis aut ab aphthis in-
 „testinorum fieri iubeas; utrobique non levia
 „dubia moveri possunt.“

Nihilo secius apud BURSERIUM DE KANIL-
 FELD d) adhuc haec reperiuntur:

„In Coeliaca passione alvi excrementa ex
 „concoctis quidem, sed liquidis, et chylo in-
 „tersperso albicantibus constant . . . vera eius
 „causa haberi potest impedita chyli in vasa lactea
 „propulsio, aut absorptio vel bilis, et succi pan-
 „creatici defectu, quod chylum non satis atte-
 „nuarint, vel intestinorum vitio, quod infirmio-
 „ra, et languidiora sint, vel vasorum lacteo-
 „rum, quod vim absorbendi amiserint, vel,
 „cicatrice clausa, obstructa, aut compressa,
 „chylo iter denegent. Quae omnia quum variis

d) Institutionum Medicinae practicae Volumine quarto,
 parte altera, Capite quinto, §. 55. p. 352. Li-
 psiae 1790.

Fluxum
 phthysin
 lymphat
 esse au
 Allgen
 lung &
 pro 88

Sectiones
 praeterea
 glandular
 hepatis

„ex caussis fieri possint, cuilibet vel leviter
„physiologia imbuto facile innotescunt.“

Rectius hinc, si Fluxus coeliacus definitur:
*Excretio alvina puriformis vel chyliformis, cum
tenesmo, febre lenta, et consumptione; cum
RICHTERO e), Chirurgus inter Germanos Celeber-
rimo, Fluxum coeliacum pro morbo topico
intestini recti haberem, materiamque excretam
minime chylum verum, sed tantum mucum puri-
formem esse, hinc rectius morbum dicendum
esse Fluorem album Intestini recti, haemor-
rhoidum enim mucosarum nomen minus apte
videtur.*

Praeter ea, quae bono cum successu ad-
hibuit medicamenta Vir clarissimus, ^{final} adhuc clys-
mata adstringentia et antiseptica, v. c. De-
coctum Corticis peruviani vel Ligni Campechen-
sis, ad morbum citius tollendum, in usum vo-
carem.

- e) Medicinische und Chirurgische Bemerkungen. Goet-
tingae 1795. Capite tertio.

parte
in intelli
actuosa
No. Brablon
1. Lond 1797.
entro stabilis
hac morbo
balnei non
d. Gerard
H. II.

time Lond 1798
Ripetition has
condition or
patens quod
glands etc

volgata et
ta
567.08.69

TACUS.

simul propullulant,
comitantur, cache-
s imprimis, penespe

ca ab obstructione
culis bibulis, quam
us adeo pro unica
quam ab ante me-
um mesaraicarum
ita vel mucos in-
t ab aphthis in-
que non levia

UM DE KANIL-
:

excrementa ex
s, et chylo in-
... vera eius
li in vasa lactea
, et succi pan-
non satis atte-
quod infirmio-
sorum lacteo-
userint, vel,
t compressa,
a quum variis

Volumine quarto,
5. p. 352. Li-

LIENTERIA.

§. LXIV.

In Lienteria vasa absorbentia Intestinorum, chylosa vulgo dicta, laborare, ut ex cibis succum nutritium sugere nequeant, vel renitantur, adeo luculenter oculorum, cibos crudos indigestosque alvo excretos videntium, testimonio usurpatur, ut nullum dubium supersit, ^{quoniam} insignem admodum symbolam ad hunc morbum conferre systema nostrum. ^{conferat utrum}

Sub iudice autem lis est, irritabilitatis an excessu, an potius defectu id accadat? — SWIETEN enim Intestinorum Irritabilitatem nimiam, BURSERIUS DE KANILFELD vero Ventriculi languorem, et Pylori relaxationem accusat, et cum reliquis Pathologis ne cogitare quidem de actione vasorum chylosorum videtur. Si mea quidem valeant, irritabilitatem debilitate auctam statuerem. Neque miror, glandulas mesaraicas obstructas contiguas et tandem contingas, tumorem scirrhosum, unum chaos inconditum, referentes, esse inventas a).

a) Acta Naturae Curiosorum, Volumine secundo, Observation. LXV. Confer et Dissertationem R. A. VOGEL, respondente BIEL, De Lienteria. Goettingae 1770. 4.

Merum
phlegma
lymphat
epe au
Hilger
lung &
Nov 88

Sectiones
praeter
glandulas
mesenterii

OBSTRUCTIO ALVI.

*glandulae absorbentibus juxta os sacrum positis tum inter intestina rectum arcu compi-
mebant ut obstructio alvi tolleretur* §. LXV. oritur. *Cruicq. p. 119. uti § 28. case*

Pari modo scybala sicca duriora redduntur, obstructionisque alvina species inde oritur.

obstructionem alvi actione vasorum absorbentium intestinalium aucta
napf *Croft Darwin (Economia p. 38.) docet.*

DIABETES.

§. LXVI.

In huius imprimis morbi explicatione Pathologorum recentiorum nonnulli a) ad systema absorbentium vasorum confugerunt.

DARWIN b) enim ex hypothesi nimis audaci causam huius morbi, ut et aliorum morborum, quaesivit in motu inverso sive retrogrado Chyli, ita ut Chylus, per vasa mesenterica adveniens, non ad ductum thoracicum, sed ad renes, feratur.

- a) Experiments establishing a Criterion between mœcaginous and purulent matter, and an Account of the retrograde Motions of absorbent Vessels in some Diseases Lichtfield 1780. 8. f.

Confer et Fr. HOME Clinical Experiments and Histories. Edinburgh. 1780. — MEZLER Preisschrift von der Wassersucht. — KORTUM De Vitio scrofuloso, Tome secundo, p. 103. — PLATNER in Notis ad FABRE. — SCHREGER De vasorum absorbentium, irritabilitate, p. 61. et in Beitræge, Erster Theil, p. 177. in nota. SELLE Medicina clinica in Editione quinta Berolini. 1789. p. 525. — NUDOV. loco citato. — D'HAME l. c.

- b) Praeter diabetem enim e motu lymphæ inverso derivat DARWIN Hydropes varios, sudorem frigidum Metastasin puris, chyli, lactis et urinae; Actionem Medicamentorum purgantium, cuti adplicatorum.

Ruminationem, Ructus, Pyrosis, Vomitus, Ileum, Affectus hystericos, Borborygmos, Hydrophobiam.

*parte
in intelli
actuosa
No. Brader
Lond 1797.*

*actio vasorum
absorbentium
intestinalium aucta
napf
C Darwin
p. 38.
hac morbo
balnei non
H Gerard
de H.*

*time Lond 1798
Ripetition has
condition or
patiens
glands etc*

*vid Haller's Clin
Physiol Libr. XXV
Lond 2. 53. p. 230
Tome VII. edit
Lausanne 1793.*

*et Erasme Darwin
Economia.*

*est
est
vulgata et
est
567. 68. 69*

Quamquam autem non ignorem, **GUILLI-
MUM HUNTER** c) semel cadaver dissecuisse,
in quo valvulae aëri in ductum thoracicum in-
flato cedebant, adeo ut e ductu thoracico in
vasa chylosa mesenterii aër transiret.

Quamquam non ignorem, **SCHUMLANSKI** d),
cui fidem maximam semper habui, vidisse qua-
tuor truncos valvulosos vasorum renalium comi-
tes, in quos Mercurius ex chyli sic dicto recepta-
culo, superatis valvulis, retrogradā via ad renis
usque sinum penetravit, et in alio rene plura
lymphatica ab aëre per putrefactionem sponte
evoluta et distenta.

Haec duo autem experimenta, **DARWINO**
incognita, fortius pro eo militare videntur,
quam omnia, quae ipse in medium protulit,
et quae hic repetere ~~et refutare~~ nimis profecto
~~tadiosum et longum foret.~~

Nihilo secius nunquam eo adduci potui, ut
crederem, haec etiam vivo in corpore accidere,
et si revera accidunt, morbum ullam unquam
medelam admittere. Meis autem consiliis dia-
beten sanātā fuisse, certo novi.

- Nimis vere paradoxa omnia sunt, quam ut seriam refu-
tationem mereantur, eoque minus, quo certius ex
Amici eius ore scio, experimenta, quae circa Puris a
Muco differentiam tradit, nunquam ab ipso instituta
fuisse, sed e mera hypothese eum ea proposuisse;
hinc non mirum, neminem experimenta repetentem
eadem reperisse, quae **DARWIN** tradiderat.
- c) Auctore **CRUIKSHANK** Anatomy of the Absorbent Ves-
sels; in fine Capitis decimi tertii.
- d) Dissertatio inauguralis de structura Renum, **Argente-**
rati 1782. p. 62.

F. v. Wedewid v. d. Entz.
in Vissent. d. Bibl. felter
Band. p. 248
Michaelis 1803. Libenter
Band. p. 585. 2.
Salmut. d. d. Nagel.
p. 178. Götting. 1785.
F. v. d. Bibl. d. d.
Lib. in G. d. p. 761.

Glucosum
Phthysin
lymphas
epc an
Allge
lung 2
p. 88

Sectiones
pneumorum
glandular
mesenterii

That it is possible
in winter (and)

159

e parte
 da intelli
 gencia
 No. Diabolus
 1 Lond 1797.

am
 = praeter Hallenura
 Elem Physiol. Tom VII.
 Sect II. p. 230. §. 3.

interstiti
hoc morbo
balnei non
~~est~~ Gerard
H. II.

The Young[†]
M. Baillie . . .) + l.c.
Francis Blanchet^{xx}
Townsend^{xx})
Schwitgue Memo
re tu à la Soc. de l'E
cole de Médecine)

time Lond 1798
 Dissection has
 condition on
 intestines ~~found~~
 & glands etc.

F) Anatomy of the absorbent Vessels, in fine Capitis
decimi terti; quamquam DARWINUM non nominat.

100

how the Con- and Recovery.

* Diffe. Ventriculus
humanus anatomicus
et physiologicus.
Regim. 1708. 8.
Eggenst. academici
Regim. 1792. 8.
518.

*) Chemical Experiments

103. 2^a edit. p. 314
humani viribus conservatibus

14. x2) Observations on the
Economy of Enzym Darwin
Edinb. 1798. Sect. XII.

Review for Febr 1797. p. 129 et seq.

Her in Medical Repository
1. fasc. n. 2, p. 178.

77. Salzsaure von der Reinigung
tanzaufl. Marc. f. 1800 pag 45

John Vaughan
in the Medical &
New-York 1800 Vol.
p. 334.


this is soluble
in nitric acid

Mr Sarsia, tells us, that coagulable lymph
 is not soluble in ~~the~~ vitriolic acid. on
 this account ^{he} ~~proposed~~ the blood of different persons;
 and treated it by effusion and trituration.
 with the same result. We can scarcely
 suppose, ^{that} there is such an important physical
 difference between Scottish and American blood,
 therefore one of us must be mistaken.

~~Any other~~

102
 (that it is soluble
 in vitriolic acid)

John Vaughan
 in the Medical Repository
 New-York 1800 Vol. third.
 p. 334.



Egagropis verber egregius antonimus M. Baillie in Diffusione Diabetici viri
annotat "var ~~egregius~~ ^{habitu} ~~egregius~~, magnitudine naturali, et
foliis valvulari asperis, (had the common, valvular appearance).
Transactions of a Society for the Improvement of Medical & Chirurgical
Knowledge Volume secundum. 1800.

D I A B E T E S.

159

Novimus etiam antispasmodicis sanata^m fuisse. Quomodo autem antispasmodica valvularum destructionem tollere poterunt?

Novimus digestionis organa in isto morbo
absque ^{ita} ~~vito~~ officio suo fungi e), quamquam
morbi progressu debilitentur, necesse sit. *aff. elen.* 7

Consentientes mecum inveniō Cruikshank f),
Mascagni g), v. Heuvel 1), Ludwig h),
Hecker i), J. G. Jahn k), Othmar Heer l),
Joseph m), Webster 2) et Basilewitsch n),
J. Gautieri. Henle 3) f. Browne. xx

Multo minus ergo assentiri possum KOR-
TUM o), ulterius adhuc procedenti:

„Fit nempe in quam plurimis casibus mo-
„tum vasorum lymphaticorum, quin et resor-
„bentium sanguiferorum, retrogradus, veluti

- e) Disserte id assertit A. G. RICHTER, l. c. — Non ignoro, BURSERIUM DE KANILFELD viscerum, chyli-
ficationi dicatorum, debilitatem pro causa agnoscere.
- f) Anatomy of the absorbent Vessels, in fine Capitis
decimi tertii; quamquam DARWINUM non nominat,
patet tamen contra illum disputari.
- g) Loco cit. p. 107.
- i) C. G. VAN HEUVELL Tentamen nosologicum, p. 95.
nota a).
- h) In versione germanica operis CRUIKSHANKII, p. 102.
- i) Allgemeine Geschichte der Natur und Arzneikunde.
Erster Theil. Leipzig 1795. 8. p. 89.
- k) In Dissertatione ^{no 292} citata bene contra DARWINUM disputat.
- l) De Renum Morbis. Halae 1790. 4.
- m) Dissertatio de Metastasi Lactis. Halae 1791.
- n) CHARLES WEBSTER Facts tending to shew the Con-
nection of the stomach with Life Disease and Recovery.
London 1795.
- n) Loco citato.
- o) Loco citato, Volumine secundo, ^{no 292} p. 103.

ss Recherches sur la Médecine ou l'application
de la Chimie à la Médecine. New-York
1870 pag 33

vid Elements of Therapeutics.

etiam de gubernat aduocatus
Walter, ~~the~~ huius theoriae.

By J. King on Com. p. 120

undo, p. 103. 2^d edit. p. 314
+ *Exp. de Conjectur. humani viribus conservativibus* 1796. 14. 2^d. Observations on the
Gen. 1796. 14. 2^d. Observations on the

14. 22. Observations on the
Zoönomia of Crofton Darwin
Edinb. 1798. 8vo. XVII.

Anal. Chem. Review for Febr 1707. p. 129 et 27

also Eschmüller in Medical Repository
New York Vol. fifth. N. 2. p. 198.

Erzähltes Mischelstücken von der schreibenden
Längenschrift. Manuscript 1806 pag 45

„ubertim docuit b. DARWIN. Et talem quoque
 „motum retrogradum purgantia canalis intestina-
 „lis parietes potenter irritando sollicitandoque
 „excitant, in vasis saltem lymphaticis mesente-
 „rii, hinc stagnantem in iis vel in glandulis
 „illa interiacentibus materiem, praesertim si re-
 „solventibus praeparata fuerit, ad intestina evo-
 „cant, ac directe et immediatae evacuant, cum
 „diuretica et indirecte et longa demum via prae-
 „stitissent; — praeterea oscillatorium istorum
 „vasorum motum irritatione sua augendo ad re-
 „solutionem impactorum egregie conferunt. Hinc
 „apparet, iure dici, cathartica remedia rese-
 „rare, evacuare obstructum mesenterium. Etiam
 „resolventia remedia eodem modo, motum vide-
 „licet retrogradum vasorum resorbentium excitan-
 „do, mesenterii sordium effusionem quandoque
 „causantur; veluti luculentum est in curatione
 „februm gastricarum sive mesentericarum BAGLI-
 „VII; in quibus nempe salibus mediis cum tar-
 „tari stibiati refractis dosibus, etc. per aliquot
 „dies exhibitis ingens saepe sordium in intestinis
 „collectarum vis suis signis sese manifestat eva-
 „cuante medicina nunc eiiciendarum. Consentit me-
 „cum III. PLATNERUS, egregie ostendens, evacua-
 „tiones pituitas, quae in acutis chronicisque
 „morbis per intestina fiunt, saepe esse imme-
 „diatas effusiones venae portarum atque vasorum
 „lactorum, ab horum vasorum motu retro-
 „grado pendentos. Hinc et, pergit, per tales effu-

Glucuron
 Phosphor
 Lymphas
 epe an
 Allge
 lung
 no 88

Sectiones
 praeterea
 glandulas
 mesenterii

16

F
 B
 M
 B
 S
 P
 L
 S

Fine scriptum
 per vero

„effusione
 „rum le
 „bienis so
 „tia rem
 „allicere

Ejane se

per 100

contra sordium

Abdellah Rik
 Physiolo
 pag 270

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Frank specifi-um fuit in tamentum, autem systematis lymphatici totum exortum.
 car vero omnes humores absorpti veniunt afferuntur? Altmannhofen p. 281.

DIABETES.

161

„effusiones systema portarum et vasorum lacteo-
 „rum levare, infarctusque mesenterii, hepatis,
 „lienii solvi; — purgantia quoque et resollen-
 „tia remedia saburram abdominalem ad intestina
 „allicere, resorbentia mesenterii vasa ad motum

in Habitu ex parte
 vasa absorbentia intelli-
 guntur nimirum actus
 esse. John Rollo. Diabetes
 mellita (p. 26.) Lond. 1797.

et repetitis
 Egregio experimentis stabilivit
 sententiam, in hoc morbo
 cutem aquam balnei non
 non recipere. H. Gerard
 ibid. ap. Rollo Vol. II.

Wern in secundae editione Lond. 1798
 pag. 402 aperit Siphonem has
 siphonem fove morbid condition or
 arrangement of the mesenteric glands
 or intestinal absorbent glands etc

Examen della dottrina di Garwin
 per Jos. Jacopi, Pavia. 1804. 8vo.
 in Aug. j. Phil. Brit. Vol. 52
 1813. facies pag. 114
 contra Garwinum disputat

Dr Garwin's retrograde action
 of the absorbents is so strongly opposed
 by the known structure of that system
 of vessels, that I believe few persons
 will admit it to be in any degree
 probable.

Wallaston in Phil. Trans. 1811.
 p. 104.

Athanas. Richerand. Nouveaux Elements de
 Physiologie 5e edition Paris 1811. Vol. I.
 pag. 270 pro Garwinis ex parte militat.

Journal de Medecine, Chirurgie etc. à Paris 1789.
 Mois de May.

1) L. c. p. 10.

contra Mascaagni disputat. Petr. Lupi. Romanus.

SÉMÉRING DE MORBIS.

L

in Nova per poros inorganicos
 theoria Mascaagni iterum vulgata et
 parte altera (refutatione) aucta
 Linnæ 1793. parte secunda. 567. 68. 69

„ubertim docuit b. DARWIN. Et talem quoque
 „motum retrogradum purgantia canalis intestina-
 „lis parietes potenter irritando sollicitandoque
 „excitant, in vasis saltem lymphaticis mesente-
 „rii in vasis saltem in iis vel in glandulis

„il

„sc

„ci

„d

„st

„v

„s

„a

„r

„r

„l

„c

„c

„l

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„c

„diatas effusiones venae portarum atque vasorum
 „lactorum, ab horum vasorum motu retro-
 „grado pendentos. Hinc et, pergit, per tales
 effu-

Thyrium

Phthysia

lymphas

epc an

Allyes

lung

nov 88

Sectiones

prentum

glandulas

infectis

10

F

z

Ba

M

B.

S

P

6

h

Franci specifiū fahit intimentum, auctum pphimato lymphatici actum excitantem.
Sed vero omnes humores absorpti venibus afferuntur? Altmacher § 241.

DIABETES.

161

„effusiones systema portarum et vasorum lacteo-
rum levare, infarctusque mesenterii, hepatis,
„lienis solvi; — purgantia quoque et resolven-
tia remedia saburram abdominalem ad intestina
„allicere, resorbentia mesenterii vasa ad motum
„retrogradum et eructationem contentorum sti-
mulando.“

Non possum ergo non consentire cum A.
G. RICHTERO p), allatis doctissimis et solidis
argumentis non solum, sed etiam felicibus cu-
rationibus statuente: Diabetem esse morbum
spasmodicum, et irritatione quadam in renes
agente, oriri secretionem urinae auctam inter-
dum etiam perversam q).

Hisce perfecte conveniunt observationes ana-
tomicae CRUIKSHANKII r), qui arterias renales
dilatatas invenit in hoc morbo peremptis.

Etiam TH. CAWLEY relaxationem et dilata-
tionem organorum uropoieticorum accusat s).

Neque abhorret ab ista sententia, neque
displicet MASCAGNII t) ingeniosa, naturae per-
fecte consentanea huius morbi expositio, e cogni-
tione subtilissima systematis vasorum absorben-
tium hausta.

p) Medicinisch Chirurgische Bemerkungen. Goettingen
1793.

q) BURSERIUS DE KANILFELD Renum laxitatem et ato-
niam inter causas ponit.

r) Loco modo citato.

s) Journal de Medecine, Chirurgie etc. à Paris 1789.
Mois de May.

t) L. c. p. 10.

contra Mascagni Dissertat. Petr. Lupi Romanus.

SCHMERRING DE MORBIS.

L

in Nova per poros inorganicos
theoria Mascagni iterum vulgata et
parte altera (resorptione) aucta
Linnæ 1793. parte secunda. 567. 68. 69.

in Diabete ex parte
vasa absorbentia intelli-
guntur nimirum absorpta
esse. Joha Rollo. Diabetis
mellita (p. 26.) Lond 1797.

et repetitis
Egregiis experimentis probavit
sententiam, in hoc morbo
cutim aquam balnei non
non recipere. H. Gerard
ibid. op. Rollo Vol. II.

Item in pseudoe Editione Lond 1798
pag 402 aperit Dissectionem has
theoriae morbi conditionem or-
derangement of the nephritic gland
or lacteal absorbent glands etc.

Glandulae mesenteriae tumidas inveniunt in Diabeticis.
et Rutherford
Horne Clinical Experiments. et Edinburgh Journal. Vol. 1.

In Diabete nimirum glandulas, quo tendunt renum vasa absorbentia, saepe obstructas esse u); inde fieri, ut humor secretus, quem lymphatica, utpote iam repleta, haurire nequeunt ac ultra transferre, totus fere in cellulis maneat, atque hinc transeat in tubulos uriniferos, et in pelvim ureterum ac Vesicam feratur.

Tunc igitur remedia vel intestinorum cavo, vel inferiorum corporis partium superficiei erunt admovenda v).

Glandulae mesenteriae et Mesocolicae
tumidas inveniunt in Diabeticis.
Horne
Chemical Experiments. p. 119.
et John Rollo. on Diabetes mellitus
Lond 1797. Vol. 1. p. 122.
semper adfuisse glandulas mesenteriae
tumidas ibid p. 207.

- u) Glandulas circa renes tumidas in dissectionibus diabete morthorum ipse annotavit DARWIN, l. c.
v) Pag. 107. in Nota.

Diabetes ex parte a constitutione vasorum
absorbentium ex capite John Hoyer in Affluencia.
gen. lit. 1782.

S T R U M A.

§. LXVII.

Strumam, id est, Glandulae thyreoideae tumorem, proprie non esse morbum vasorum absorbentium, patet; cum ista glandula prorsus peculiari structura, a structura glandularum lymphaticarum admodum diversa, gaudeat.

Quocirca, strumam in systemate lymphatico sedere, non dicerem cum TH. WHITE a) et cum ASSALINIO b).

Thomas anatomicae Lectiones
vasa absorbentia pulmonum
porreptantia, ab eis amplius
videt ut liquorum glutinosorum
circulatio tractum facillime
intermittunt. Glandulae bronchiales
non tumidulae modo, sed foeculentae
decoloratae.

Hinc Rutherford putat, oxygenium
cassum aëris spiritui ductu cum
hydrogenio, quo Diabete laborantium
propter abundantiam spirituum inire, atque
aquam hinc generatam ab illis absorberi.
vid. Poterius Exercit. Syst. de Diabete
Lond. 1801.

- a) Treatise on the Struma etc. London. 1784. in Praefatione. Morbum scrophulosum autem ab anglis strumam vocari, me non latet.

Rectius veram strumae sedem in glandula thyreoidea quaerit M. FODERÉ Essai sur le Goitre et le Cretinisme. Turin 1792.

- b) Loco cit. p. 67.

Alex. Monro. *mult. p. 510.* In diabete invenit
 glandulas iliacas, mesentericas coeliacas et
 bronchiales dilatatas — Glandulas mesentericas
 colore ^{colore} dilatas (enlarged) latas. — in tunica intima
 tenui et crassi glandulas nullas. ^{Septura} Structura harum
 glandularum ^{erat} magis deprimita. Glandulae
 lumbares materia parti fibrosa sanguinis simili
 infarctae. Glandulae bronchiales attractu durae
 materia viscosa cretacea ^{infarctae} repletae. Vasa albor=
 sentia vero nullomodo dilatata. Vasa absorbentia
 hepatis distincta, lymphis repleta.

Watt *Edinb. Med. Journal No 19.*
 contraria fore a Rollei *methodo Diabetis, p. 101.*

Rid. Carmichael *finitudinem diabetes cum scorfulis*
demonstrat. on scorfula. Lond. 1810. pag. 21/49.



Summa a
 scorfulae
 ale, non
 utraque
 mole
 aquam
 4 Saque in
 umopi
 gula raro
 effluat
 rit, fere
 tatione
 in ope

actio fere semper tollitur, scorfulas natura
 fere semper, aut raro tollit. 17) Mire regiones
 Annapolis aliae scorfulops abundant.

adulas, quo tes-
 saepe obstructas
 secretus, quem
 eta, haurire ne-
 at in tubulos ur-
 Vesicam feratur.
 testinorum cavo,
 superficie erunt

e thyroideae tu-
 um vasorum ab-
 glandula prorsus
 ra glandularum
 gaudeat.
 emate lymphae
 Th. White d)

on. 1784. in Prae-
 ab anglis nomen
 glandula thyroidea
 entre et le Cretinge

Glandulae mesentericae tumidas invadunt in Diabeticis.
et ^{Rutherford} ~~Rutherford~~
Horne Clinical Experiments. et Edinburgh Journal. Vol. 1.

crater

Glandulae
mesentericae

Chemical E

et John Ke

Lond 1797.

semper ad
tumidas ibi

Diabetes ex p
absorptione

germ. d. 171

Thomas anat
vasa absorbentia
perceptantia,
videt ut liquor
circularetur sine
intermissione. q
non tumidulae m
de mutata.

Hinc Rutherford

capitulum minus
hydrogenio, quo
sanguis abundat
aquam hinc q
videtur Expt
Lond. 1801.



Sym
rum abs
dum e
tur: Q
vicinas

Be

struma

mili v

malum

vergens

thorum

etiam a

sanation

quod e

B

glandu

GAUT

e) S

tre

mu

non

multi

absor

d) A

Tou

e) 13

Gregor
a Joseph
trahit se
1802 S 43.

Symbolam tamen non contemnendam vasorum absorbentium systema conferre ad generandum et tollendum strumam hisce minime negatur. Quamquam non ignorem Cl. GAUTIERI c) vicinas strumae glandulas ^{scilicet} nil passas fuisse vidisse.

Bene etiam differentiam inter scirrhum et strumam exposuit STREIT d), quae eo maior mihi videtur, cum notissimum sit, strumam malum locale, vix unquam in suppurationem vergens esse, praeterea non modo multo minus durum esse, tumorem, quam scirrhum, sed etiam saepissime, praesertim aetate iuveni, sanationem vel resolutionem certam admittant, quod equidem nunquam in scirrho vero vidi.

Bene etiam differentiam inter strumam et glandulam scrofulosam exposuerunt JOSEPHUS GAUTIERI et Cl. WICHMANN e).

- e) Strumae incrementum ab inactione vasorum lymphaticorum non est deducendum, cum vasa lymphatica non multa glandulae thyreoideae fuerint tributa, cum licet non impedita eorum actione habeatur strumae explicatio JOSEPH GAUTIERI de struma Vindobonae 1794. p. 15. p. 71. seqq.

multus est in refutanda opinione quae strumam a vasis absorbentibus derivat.

- d) Actorum Academiae medico chirurgicae Viennensis, Differt autem struma a Tomo primo.

- e) Ideen zur Diagnostik, Hannover 1794.

Egregie etiam et accurate strumam a scrophulis distinguit HEDENUS tractatu de glandula thyreoidea dijs 1822 § 43. pag 87.

L 2

scrophula 1) scilicet: fester scrophulae generis glandula absorbens
2) struma est malum locale, non quam more scrophulae in suppurationem abiit; struma hinc non nisi mole molestat 3) struma nunquam tumet latius superius. 4) Lacus in scrophulosis sagittatus, in strumosis suppuratus observatur. 5) scrophula raro ante secundum annum manifestatur et sponte in crescente aetate evanescit, seu struma quae et citius existit et mutatione celi evanescit. 6) struma raro natura operis fere semper tollitur, scrophulae naturae fere semper, ac raro tollit. 7) Aliae regiones strumosis aliae scrophulosis abundant.

S T E A T O M A.

§. LXVIII.

Probabile videtur — inquit JANSEN a) — steatoma nasci ex lymphaticorum (id est: ^{ab} sorbentium) vitio; si vasa lymphatica, ^{ad} pinguedinis ^{deorsum} resorptioni ⁱⁿ destinata quacunque de causa comprimuntur, obstruuntur etc. ut debitam adipis copiam recipere non valeant, accumulatio pinguedinis in illa parte fiat, necesse est, sensim increscens, donec tandem in incredibile onus tumor augeatur.

impunguntur.

*a laesione quadam telae cellulosae
viri probabile videtur. Dns
steatomata ipse auctro feliciter
removet, quae paulatim in illo
loco orta erant, utque cui viri
externa illata fuerat.*

a) Dissertatio de Pinguedine. Lugduni Batavorum 1781.
p. 138. — PLATNER Chirurgia. §. 761.

OSSIUM INFLAMMATIO.

§. LXIX.

Vasa absorbentia ab ipsa inflammatione ad actionem naturali maiorem stimulata, ⁱⁿicitata absorbendo ossium particulas ossium, poros maiores distinctioresque reddunt. Imminuta inflammatione alius naturae processus incipit ad reparandum, quod deperditum erat. Vasa (Arteriae?) ^{hinc} seilicet largam materiam osseam secernunt, et in absorptae locum deponunt. Levis autem quae superest inflammatio vasa solito magis stimulat, adeo ut plus secernant, quam ad restitutionem requiritur, aut quam vasa absor-

*videtur
vires
infirmitas
non
dilectum*

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

*x) to me, it appears probable
that the cause of a
steatoma is some rupture
in the vessels, appertained to
absorb the adipose matter."*

James Latta. Surgery Vol. 2 p. 470

Edinb. Lond 1795.

*by which means it accumulates in proportion to the secretion and the
number of absorbents destroyed.*

bentia naturaliter nunc tantum agentia absorbere proportionaliter valent; hinc sanata saepe solida observantur crassiora et ponderosiora.

Ex hac Phaenomenorum, quae inflammatis ossibus observantur explicatione, ex mente CL. BRUGMANN'S dirimi etiam valet, quae ratio sit, cur lue venerea correptorum ossa alias ponderis sui multum amittant, et spongiosa fiant, alias contra naturalibus multo ponderosiora observentur, cuius rei explicationem varii vario modo aggressi fuerunt. Putat enim Vir Cl. levialia ossa ad tales pertinuisse aegrotantes, qui a lue, vel ante eandem sanata obierunt, ponderosiora contra ad tales, qui a lue sanati redierunt a).

a) MAANEN Diss. de Absorptione solidorum.

MOLLITIES OSSIIUM.

§. LXX.

In Mollitie Ossium iure accusanda esse vasa absorbentia, videntur, nimirum eorum actione, et quidem interdum satis cito a), materia calcarea in sanguinem rapitur et per urinam excer-

a) Sex hebdomadam spatio totum fere Sceletum emollitum vidit BRÜNNIGHAUSEN in Tractatu de Fractura Claviculae; quod egregium admodum specimen optime paratum Wirceburgi in Theatro anatomico lustravi. — Osteosarcosin vasorum absorbentium ope fieri asserit. J. CH. PLANK Diss. de Osteosarcosi Tubingae 1781.

Joseph. Ant. Seabert Siffr. de Osteosarcosi Libell. Lips. Magdub. ad 1797

A. Murro three treatises pag. 53. L 3
George Lee in Medical Repository Vol. 4. p. 142 143. de adfusione osium ingeniose disputat.

OMA.
II.
ANSEN a) —
(il est: sorber
phatica, pinguet
unque de causa
etc. ut debitam
ant, accumula
neceste est,
in in credibile
ni Batarorum 1781.
761.

IMATIO.

inflammatione ad
culata, incitata
poros ma
minuta inflam
ncipit ad re
Vasa (Arte
osseam secer
onunt. Levis
sa solito magis
quam ad re
vasa absor

nitur b). Plerumque Mollitiem ossium scorbuti symptoma esse, animadvertere mihi visus sum. — Saltim ossa scorbuticorum semper manifesto molliora inveni; quod adeo verum, ut CHRIST. LUDOV. HOFFMANN scorbutum declaret esse morbum succi sic dicti ossei.

- b) HERRISANT Memoires de l'Academie des sciences, à Paris 1758. — HALLER, Elementorum Physiologiae libro vicesimo sexto, p. 362. — Medical Observations and Inquiries, Volumine quinto, p. 266. — CRUKSHANK in Praelectionibus 1785. habitis; et LUDWIG in versione eius germanica, p. 107. — Idem vidit in Mollitie Ossium Cranii B. COURTETZ Dissertation sur la Formation du Cal.

C L A U D I C A T I O .

§. LXXI.

In Claudicantibus totum caput et collum ossis Femoris e capsula sua lapsum ^{sine} absque ulla Carie absumitur a).

Eiusmodi specimina ipse varia servo, in quibus totum caput ossis Femoris non modo, sed simul totum Acetabulum ossis coxae absumtum est, ^{sine} absque omni dubio actione vasorum absorbentium nostrorum.

Hinc non mirum etiam in vera Carie acetabuli ossis coxae et capitis ossis femoris glandulas inguinales intumescere b). ^{heu nimis} uti saepe animadverti

- a) PETRUS CAMPER, Over het Mankgaan der Kinderen, p. 4.

- b) EDW. FORD, Observations on the Disease of the Hip Joint etc. London 1794. qui optime hoc malum descripsit iconibusque exhibuit, p. 15. expressis verbis monuit glandulas inguinales in hoc malo coxae saepe intumescere, item p. 23. 141. 145.

Albert u. d. Gyalge.
Wien. 1807 gr. Quart.
et H. A. F. von Kautzke über
das fröhliche Hinken der Kinder.
Wien 1807. p. 39. et Off. 6 v. 85. Off. 7. f. 1.

CYPHOSIS.

§. LXXII.

Cyphosin a) ex absorptione corporum vertebrarum, tum cariosarum tum nulla mollietate corruptarum, ortam esse, innumeris fere exemplis vidi, et quamplurima eiusmodi specimina servo b). Auferri autem per vasa absorbentia vertebrarum materiam osseam resolutam dubitari, omnino nequit.

Hinc et van MAANEN c) statuit plus iusta pressione vasa absorbentia ad actionem incitata pressas absorbent cartilagineas vertebraeque et absorbendo notabilem saepe columnae vertebralis partem destruunt.

Immo in ipsis vasis absorbentibus ab arrosiis vertebrae lumbalibus orientibus concrementa calcarea reperta sunt d).

- a) Confer egregiam *Dissertationem G. COOPMANS de Cyphosis*, Franecquerae 1770. 4. cum figuris.
Minus recte *Pott* in *Works* hunc morbum explicaverat, prouti in eum 1779. in *Programmate*; De cognitionis subtilioris systematis lymphatici in *Medicina* utilitate, Cassellis edito animadverteram; errorem ingenitus *Vir* ipse agnovit in altero *Scripto*: *Farther Remarks, etc*
- b) Casum *Fracturae Vertebrae primae lumborum* in quo glandulae absorbentes, in spina sitae [†] hucbant fusius [†] narrat *I. A. SCHMIDT* *Commentariis de Nervis lumbalibus*, Vindobonae 1794. §. 43.
- c) Pag. 89.
- d) Notes du second *Volume des Ouvres posthumes de POUTEAU*, p. 327.

Ductum thoracicum autem utrumque in quavis distorsione Thoracis, ergo etiam in Cyphosi vario modo pati, situ moveri, vel plus minusve comprimi sponte patet; hinc non mirum, tabe hominem consumi.

ANCHYLOSIS OSSIUM.

§. LXXIII.

Accidit anchylosis quando vasorum absorbentium actione cartilaginee articulares et ipsae ossium superficies vicinae absorbentur, et postmodum lue superficies confervent *a*).

Ab absorptione Synoviae nimia Anchylosin et spuriam et veram oriri, affirmat BASILEWITSCH.

a) Consentit van MAANEN, Dissertatio de absorptione solidorum. Lips. 1794. p. 86.

HYPEROSTOSIS.

§. LXXIV.

Hyperostosin oriri vitio vasorum absorbentium asserit FR. GEBHARD *a*).

a) Adversaria medica Basileae 1777.

C A R I E S.

§. LXXV.

Ossa vera inflammatione corripiuntur, et si urgere stimulus non desinit, perinde, ut in partibus mollibus, suppurationem movet.

Si ergo os a suppuratione elementis suis dissolutis et sublatis actione vasorum absorbentium excavatur, Caries oritur, quae nihil aliud est nisi *ulcus ossis*, ut optime CULLEN eam definit.

Quae ergo de suppuratione et ulceribus notavi, et hic erunt adplicanda; v. c. in *Carie Dentium* glandulas tumentes saepe, quamvis non semper, videmus. In *Carie Pedum* a), glandulae inguinales tument.

- a) A Carie Ossium Tarsi glandulas inguinales tumidas vidit J. KRAETZON in Verhandelingen v. h. Genootschap der Heelkunde te Amsterdam 11. Deel 1793. p. 96. 100. et 101. ubi casus egregie describitur.

*In finibus sive
tuberculis ossis, vasorum
lymphaticorum absorbentium
vi, terra absorbente
ex nudato ibidem
terre moleculis
parenchymate
cavumcula emittit, quae emolli-
entibus blandisque topicis
tractata ultro se effert
Cariesum os a sano undique
que sejungit, atque expellit.
Ant. Scarpa de punctura
offium punctura 1799.*

NECRÔSIS OSSIIUM.

§. LXXVI.

Ingeniose admodum et naturae perfecte consentaneo modo *Necrosin* ex actione vasorum absorbentium explicavit, a reliquis ossium morbis distinxit, et optimam methodum, ipsam cu-

L 5

*vasa absorbentia
omnes acrios, nris
esse dunt mortu-
um os. J. K. F. L. 1804.
Mémoires de l'Académie
de Médecine de Paris
par Scarpa. et
par Lavoisier. Paris 1804.
pag. 7. pag. 289. 290.*

HYPEROSTOSIS.

ntem utrumque in
ergo etiam in Cy-
moveri, vel plus
et; hinc non mi-

OSSIIUM.

urum absorbent-
res et ipsae os-
tur, et pest-
a).

imonia Anchylo-
affirmat BASILE-

ario de absorptions

SIS.

absorbentium

randi, tradidit Cl. WEIDMANN a) in opere peculiari classico, cuius argumentatio ad haec fere redit:

Ossium ortus, incrementum, decrementum, habitus et morbi declarant, viribus vitae ali, sustentari et defendi ossa.

In Ossium cavis interstitiis, canalibus, cellulis, reticulis, humores vasis contenti agitantur diversae indolis; vel enim sanguis est, vel lymphæ, vel medulla; hi ne stagnando corruptionem concipiant, et a dotibus suis bonis et requisitis recedant, communi humorum circulo veniunt redeuntque.

Etiā elementa illa terrea, quae ossium compagem constituunt, perennia non sunt, sed singulari circulo mutantur, et reducuntur, vel quod frictu et attritu per motus corporis deterrantur, vel quod indolem, ex qua eorum integritas pendet, mora aut alio modo amittant.

Ossium infantilium Cava, tum communia, veluti Capitis et Thoracis atque Pelvis, tum propria, ut ossium longorum medullam continentia, tum sinus frontales et maxillares, progressu temporis ampliantur, quod fieri sane non posset, nisi horum ossium elementis pristi-

a) De Ossium Necrosi Francofurti 1793. folio, cum figuris. — Cui assentitur E. C. BÜCHNER in Dissertatione: Observatio sistens quorundam ossium morbos. Wirceburgi 1793. p. 13.

nis dimotis nova succederent elementa, ^{quae} ampliora cava constituentia.

Ossa praeterea non raro emolliuntur, fragiliora redduntur, cavorum et capitum articuli luxati forma mutatur, quin tota evanescit. Quantopere autem ossa in hydrocephalo mutantur? Paralyti et Ptyalismo ossa tenuiora redduntur. Limbus ossis, sera recisi, non asper manet, sed obtunditur *b*); quae particulae ossium reduces cum urina denique eliminantur.

Post terebrationem ossis, vel emortuo toto osse parietali, in exfoliatione vivum os eo loco, quo cum emortuo iungitur, removeri; emortuum os non mutari, sed vivum os se quasi subducere emortuo, docet CRUIKSHANK *c*).

E contrario non raro ossa morboris quibusdam mutationibus massa augentur, et quasi ponderosa fiunt *d*).

Particulas autem subtrahi ossibus morboris, sed non sanis, concedit KEMME.

Num vero morbo nova vis novaque facultas insurgit? Minime; adsunt enim vasa resorbentia id peragentia.

Videmus enim illorum actione fluida non modo assumi et reduci in humorum massam,

b) Confer opus nostrum, vom Baue des menschlichen Koerpers. Erster Theil. §. 46. sq.

c) Anatomy of the absorbent Vessels, p. 104. — „As „it were in consequence of the living bone's retiring „from it.“

d) CRUIKSHANK, l. c. p. 106.

sed et solida etiam. Neminem latet, Mercurium dulcem, immo Mercurium vivum ipsum, a vasis absorbentibus abripi, et in totam humorum massam dispergi.

Vasa absorbentia autem, quae revera resorbent et resumunt ossium elementa, descripsit WINTERBOTTOM, quamquam modus adhuc lateat, quo hoc peragatur.

Prouti autem os quoddam mox totum, mox particula tantum eius, inflammatione et suppuratione afficitur, ita et, quando vis omnis ossium vitalis exstinguitur gangraena et sphacelo corripitur potest. — Qui ossis status Sphacelismus, Necrosis, Gangraena, vel Sideratio, Mortificatio audit.

Tria Necroseos stadia sunt; in primo stadio pars laesa ossis emoritur; in altero emortua est, et separatur; in tertio demum stadio separata est.

Generatim ego separationis illius ratio, quae actione vasorum absorbentium fit, in subductione particularum consistit, quae inter vivam mortuamque ossis partem affines iacent; ita tamen, ut plurimum a viva nonnihil et ab emortua parte auferatur.

M E T A S T A S I S.

§. LXXVII.

Metastaseos nobilissimam et difficillimam doctrinam magnopere illustrari, ni perfecte explicari posse diligentiore cognitione systematis vasorum absorbentium, nonnullis exemplis comprobabo a).

Miratur Cl. BORRICHIVS b): Tumores glandularum subalarium, quae alias iam quinque libras puris suppuratione dederant, subito a refrigerio evanescere, et pulmonibus affectis mortem ciere potuisse; et, qua via tam promte eatur a glandulis subalaribus in pulmones, interrogat.

Responsio nostra aetate facillima, ad oculum, ut dicunt, demonstrari potest. Notissimi enim et perquam egregie etiam delineati sunt illi ipsi plexus vasorum absorbentium copiosi, largi et ampli, qui assumtum omne illud pus glandularum subalarium, subito satis perductum thoracicum in Venam cavam, ex illaque recta via in pulmones perferunt c).

Pus autem etiam remotissimo a Pulmonibus natum loco absorberi, ad pulmones deferri, et

a) Eadem et SCHREGER affirmat in Beitrage Erster Theil, p. 197. „Die Metastasen sind groessestentheils das „Werk der Saugadern.“

Metastasin, dicit BASILEWITSCH, oriri, si materies, quae corpore eliminanda erat, e vasis absorbentibus reassumitur.

b) In Actis Hafniensibus, Volumine secundo, p. 226.

c) HEWSON Volumine secundo. — CRUIKSHANK, Tabula prima. — MASCAGNI, Tabula prima 25. 24. 26.

*Transfationem
puris, lactis
et urinae c.
motu retrogrado
vasorum lactis
blatium explicat.
E. Darwin. Econom.
Vol. 2. p. 163. 184.*

illaesis istis visceribus excerni, optimis observatoribus adeo constat, ut nullum amplius huius metastaseos dubium superesse possit.

Sic pus absorptum, per viginti annos pulmonis ulcus mentiens, integris tamen pulmonibus, vidit DE HAEN d). Dolendum autem, focum puris verum in hoc prouti etiam in alio ab eo relato casu e), per anatomem non indagatum esse.

*Alfapue non raro
penitus resorptus et in alia
loca delatus. etiam
per alvum et urinam
evacuatus vidit.
P. Camper.*

*Eidem contigit
cum e lapsu
graviore fructu
fugillatum et inde
abscessum magnum
confluxerat, cum
chirurgus ad abscessum
percutit, atque
tunc, integra cute
exanipie miroratum
monstravit ipsi
pur copiosum in
matulae fundo,
quod nocte praecedente
sem urinam depopulerat.*

Pus absorptum e glandulis per tussim integris pulmonibus redditum vidit CHRISTOPH. LUDOVICUS HOFFMANN f).

Adipem in febribus acutis solutum ad Metastases conferre g), visum fuit.

CRUIKSHANK febrim hecticam, quae annos quinque duraverat ante tertiam diem post amputationem evanescere vidit CRUIKSHANK h).

Idem Vir puris, e fistula ani absorpti, exscreationem vidit, quae exscretio post sanatam per cultum fistulam cessabat i).

Idem puris ex ulceribus brachiorum, crurum et pedum resorpti, exscreationem illaeso pulmone vidit k).

Non ignoro, Cl. PORTAL morborum pectoris senem novitralium acutorum et Catarrhorum exitum prouti hydropne pectoris die laborantem

vomitum aquae ferac d) Rationis medendi Volumine Primo, p. 42.

purae a morbo e) Ibidem, p. 43.

liberatum. f) Von den Pocken, §. 162. — et ex eo VIRO CHAFET Dissert. de Phthisi pulmonali haereditaria. §. 99.

g) *Extrait de l'optima agendi* Prix de l'Academie. Tome 2. p. 299.

h) *vel expectandi in modis* Edit. altera: Historiae vasorum absorbent.

i) *na ratione in Bist* Apud CHAFET, l. c. §. 101.

k) *Decem. Vol. 2. p. 599.* Apud CHAFET, l. c. §. 100.

lactis metastasin, a brachiis et axillis ad pulmones abeuntem, aliter explicare, scilicet per cohaesionem partis superioris pulmonum per telam cellularem cum brachiis.

Exscreationem puris, nati circa genu, quod ossibus cariosis laborabat, tam diu vidit KIRKLAND 1), donec puris focus per amputationem auferret. *Eodem vitit post aut brachii cariosi amputationem Attenhofer p. 250.*

Interdum in Phthisi pulmonum, praesertim scrophulosa, Colli glandulas lymphaticas intumescere exemplis comprobarunt SYDENHAM, DE HAEN, BRILLOUET m).

Pus ipsum resorptum de Pectore aliisque abscessibus in sanguinem visum et depositum in urinas, per vomitum redditum, et per alvum excretum, adnotat HALLER n).

Cui vero non notum est, febrem hecticam, phthisin pulmonalem spuriam, e pure absorpto oriri?

Post febres acutas cuiuscunque generis — inquit KORTUM o), praecipue tamen, quarum fomes in primis viis inhaeserit, glandularum saepe tumores oriuntur, tanquam metastases perfectae vel imperfectae, levantes vel non levantes, remanentes diu vel evanescentes brevi. Metastases ad Parotides, Glandulas axillares,

1) Present state of Surgery. Volumine secundo, p. 230.

m) Confer et Caput de Phthisi Pulmonum.

n) ~~HALLER~~ in Addendis ad Elementa Physiologiae p. 152. *Sanjan 1778*

o) Tomo primo, p. 260. §. 43. *et Hil. Rossner p. 144.*

Glandulas inguinales, antiquissimis Medicis satis notatae. RUSSELL asserit, glandularum aliquas, potissimum inguinales, tempore pubertati propiore fere semper patere febrium, inprimis malignarum, crisi. In *Commentariis Instituti Bononiensis* descriptam legimus febrem epidemicam biliosam, cum petechiis et verminosa colluvie, qua perpressa nonnullis colli glandulae intumuerunt, sed tumores iterum evanescere absque pravis effectibus.

Duplicem metastasium variolosarum classem constituendum censet idem KORTUM p): *Aliae* nempe statim in stadio suppurationis vel exsiccationis contingunt, dum pus variolosum in humorum massam resorptum, vel intrinsecus, v. c. ad pulmones, in cerebrum etc., deponitur, quod omnino periculosissimum, vel quod minori periculo fit, extrinsecus in aliquo corporis loco colligitur, sic v. c. VAN SWIETEN tumorem glandularum inguinalium in puero variolis confluentibus periculose decumbente, maturationis tempore subito ortum vidit; morbus feliciter sublatus et cum eo quoque tumor sponte evanuit. — *Aliae* vero non statim in stadio maturationis vel exsiccationis variolarum, vel paulo post morbum superatum contingere solent, sed vel plures hebdomades post exsiccationem consequuntur, lente proserpunt, nec adeo in col-

lectioni-

p) Tomo primo, §. 42. p. 252. et 253.

lectionibus puris variolosi consistunt, sed potius a subtiliori variolosa acrimonia producuntur, corpori adhuc inhaerente; in has illave partes coniecta, easque male afficiente, et innumeram morborum varietatem inducente. Et huc quoque pertinent glandularum Colli aliarumque tumescentiae, cum ophthalmia, Capitis Scabie, aliisque veris scrophulosi vitii indicibus coniunctae.

Facillimam profecto haec omnia phaenomena explicationem e doctrina de systematis absorbentis actione admittunt.

Quamquam a sanguine menstruo ipso, ut in capite de sanguinis effusione retuli, glandulae utero vicinae tument; interdum tamen etiam a menstruis, tum suppressis, tum cessantibus, glandulae lymphaticae Colli aliarumque partium metastatice tumere videntur, quorum referrem aliquos casus, a KORTUMIO q) allegatos.

Scabies, diu in cute residens, in sanguinem continuo mittit particulas noxias, morbum excitantes, qui a scabie retropulsa vel regressa derivatur; vidit CHR L. HOFFMANN r) dyspnoeam cum tussi inde orientem; felicissime autem sanabat malum mercurio, quem in ipso loco affecto, vel mali foco, applicabat.

q) L. c. Tomo primo, §. 45.

r) Apud CHAFET, von der Ausrottung der venerischen Krankheit, §. 46.

Sic in me ipso, dum sudorem refrigerium
 subitaneum exciperet, et perspirationis suppres-
 sae materies illico genu sinistrum molestaret, ^{in adheret}
 proxima nocte vasorum absorbentium ope ad
 inguen delatam materiam distincte sensi, ^{quasi} ibi-
 que aliqua ^{medie} ~~mora~~ ^{retenta} in glandulis ^{manifesta} facta sensim sangui-
 nis massae reddita evanuit.

Post suppressos Pedum sudores glandulas in-
 guinales tumere, vulgatissimum est.

Generatim in Catarrhis, ut supra iam mo-
 nui, glandulae absorbentes non raro intumescunt,
 et quidem subito, absque alia ^{linea} ^{manifesta} reperta causa,
 post refrigerium, materia perspirabili nimirum
 retenta, per metastasin ad eas delata. Et quam-
 quam saepe satis pertinaces, nec suctis reme-
 diis cedentes, immo et suppurantes glandulas ^{nam}
 istas viderim, sanationem tamen in casu fere
 desperato, per Camphoram externe adplicatam,
 feliciter absolvi.

Exempla Metastaseos Lactis collegerunt:
 HALLER s), et post eum CHR. FR. JAEGER t),
 NATH. BERENDT u), IOAN. IAC. EMBESER v),
 AND. AUG. ROEMER w), IOAN. RUD. RATZKY x),

Ind. van Rooze de opoplexia lactea L. v. 1771.

s) Elementorum Physiologiae Tomo ultimo 1765. in Ad-
 diamentis, p. 144.

t) Dissertatio de Metastasi Lactis. Tubingae 1770. 4.

u) Dissertatio de Lactis Metastasis. Goettingae 1780. 4.

v) Dissertatio de Metastasi lactea. Argentorati 1781. 4.

w) Dissertatio sistens observationes de Metastasi Lactis.

x) Dissertatio Lactis Metastasis Causa febris Puerpera-
 rum. Jenae 1789. 4.

PUJOL y), ANDRÉ z), et ISAAC JOSEPH a), SACHTLEBEN b), RÜST c), ad quos ergo lectorem ablego.

Verum autem lac in mammarum vasis absorbentibus, ad glandulas axillares abeuntibus, ipse inveni in feminis partu enixis nec lactantibus. — In ipsis glandulis axillaribus lac vidit ASSALINI d). Glandulas axillares in puerperis, ubera infantibus vel denegantibus vel alia caussa non lactantibus, non modo tumere, sed non nunquam etiam in suppurationem abire, vidit GUILIELMUS HUNTER e). Eadem et ipse vidi.

Lacti simile fluidum, e fistuloso ulcere in medio femoris feminae prorumpens per novem annos, in aliis duabus feminis ex umbilico, quin ex umbilico Viri lacti simile fluidum effluere vidit ASSALINI f). Lac verum autem fuisse, merito dubitat, cum simile prorsus fluidum eodem tempore in Viro post bubonocelen et in feminis post puerperium, prouti in quavis fere inflammatione abdominis reperiret.

- y) PUJOL in Journal de Medicine, Chirurgie, Pharmacopie etc. Paris 1789. Volumine primo.
- z) J. B. ANDRÉ sur les Maladies lacteuses chroniques. Paris 1791. 8.
- a) Dissertatio de Metastasi inprimis lactea. Halae 1792. 8.
- b) SACHTLEBEN in STARKE Archiv, Zweiter Band.
- c) CARL FRID. RÜST Diss. de metastasibus Lactis. Goettingae 1795.
- d) L. c. p. 118.
- e) Medical Commentaries, p. 59.
- f) L. c. p. 119.

*quod Absurdum esse sententiam
lac in mammis secretum
resorbatur in hunc
modum censet J. Brandes
vultu de Lactis Angli
Hanser 1795. pag 167.*

*hanc Brandes ii et Har,
regii opinionem experientia
contrarium esse prout. et.
Ev. J. Thomepin a Thues
Linc. Waarnemingen etc
Groning. 1805. pag 286*

*metastases revera locum
habere secundum sententiam
reptam probat J. H. Wachter
in peroratoria disputatione
de articulis exspirantibus
Groningae. 1810.*

*Keil in Journal d. Geyndingen
6. Stück.*

Lac Mammarum colli glandulas tumefacere⁴²⁰ vidit ASTRUC g).

In puero trophicum pappaveri-
one laborante, urinae
seditionem, purulentam
longicollis, et asphyxiam
in femore dextro, observata
calenter sanctorum

Attenhofer.

Femina vincti dierum spatio nullam uri-
nam, sed vomitu continuo urinae similem li-
quorem reddere, visa est ASSALINIO h).

Subito saepe fungum articulare spurium
per metastasin ortum vidit A BRAMBILLA. i).

Non amplius ergo omnes isti motus incogniti,
quos BAGLIVIVS k) obscuros vocat, et cuius
generis dicit, *Metastases ad has potius, quam
ad alias partes*; iam patet enim consensus,
quem *obscurum* vocat; inter tibias et pectus,
inter pudenda et pectus; perfecte enim novi-
mus iam vias, per quas pus ex ulcere tibiae
vel pudendorum in pulmones defertur.

Hisce si addantur, quae sparsim in supe-
rioribus, data occasione, ad hanc doctrinam
illustrandam attuli, pauca haec profecto suf-
ficere poterunt, ad id demonstrandum quod in
principio huius capitis asserere non haesitavi.

Saltem cognita vera systematis lymphatici
natura et indole, nunquam nos eo abripi patie-
mur, ut cum DARWINO l) in motu retrogrado

g) *Maladies des femmes.*

h) L. c. p. 42. — Urinae resorptionem vero negat
METZGER, in *Exercitationibus*, p. 33.

i) In *Actis Academiae medico-chirurgicae Viennensis*,
Tomo primo, p. 11. et 15.

k) *Praxeos Medicae, Libro primo, Capite secundo*,
§. 10.

l) De quo in *Capite de Diabete* loquutus sum.

COCTIO MATERIEI MORBOSAE. PART. SIC. 181

lymphae quaeramus Caussam Metastaseos Chyli,
Lactis, Urinae, Puris. Facillime enim, uti vidi-
mus, vel naturae perfecte consentaneo, non
vero prorsus contrario et violentissimo, modo
omnia ista phaenomena explicari possunt.

COCTIO MATERIEI
MORBOSAE.

§. LXXVIII.

Coctionem, quae multum a resolutione et
vera suppuratione differt, et medium quasi
inter utramque locum tenet, potissimum ab
actione Vasorum absorbentium pendere, KIRK-
LAND monuit.

PARTUS SICCUS.

§. LXXIX.

Partus sicci diffilis caussam in nimia liquoris
amni resorptione quaerendam esse, docte do-
cetur a RUDOLPH a).

a) JOH. PHIL. IUL. RUDOLPH Diss. de Partu sicco. Er-
langae 1790. 8. §. 4.

FEBRIS PUERPERARUM.

§. LXXX.

Febbris puerperarum vera est inflammatio viscerum abdominalium. Humor sive liquor in abdomen effusus nihil est aliud, nisi lymphæ coagulabilis in omnibus inflammationibus exhalans, quæ proxime intestinis ac abdominis superficie interna, ^{absorbentibus} vasorum lymphaticorum ~~resorptione~~ ⁱⁿ menstruo ~~suo~~ ^{essent} aquoso spoliata, ad hanc materiam caseiformem indurando abit a).

- a) M. BAILLIE Anatomie des krankhaften Baues des menschlichen Koerpers, p. 211. Cap. XIX.

ANEURYSMA.

§. LXXXI.

Adeo actuosi conspiciuntur vasa absorbentia ad tollendum aneurysma, ut ligata arteria methodo HUNTERI (v. c. poplitea) supra saccum aneurysmaticum iam altero die plus tertia parte volumen eius morbosum imminuant a).

- a) E. Home in Transactions of a Society for the Improvement of medical and chirurgical Knowledge. London 1795. articulo 9.

est inflammatio vascu-
lorum sive liquor in ab-
domine, nisi lymph-
mationibus exha-
bit ac abdominis su-
perficiei lymphaticorum re-
pleta, ad hanc
transit a).

Frankhaften Bases des
Cap. XIX.

asa absorbentia ad
arteria methodo
sacculum aneurys-
matis parte volu-
m.

Society for the Improve-
ment of Knowledge. London

SCRIPTA

DE VASIS ABSORBENTIBUS EORUMQUE
GLANDULIS, ORDINE CHRONOLOGICO
ENUMERATA.

Praeter pauca, quae

1) CLAUDIUS GALENUS, de usu partium Libro Quarto, Capit. 19. de HEROPHILO narrat; quae

2) NICOLAUS LEONICENUS, de PLINII et aliorum Medicorum erroribus 1509. de vasis absorbentibus Mesenterii suspicatur, quae

3) NICOLAUS MASSA, in libro introductorio Anatomiae, Venetiis 1536. 4.

4) GABRIEL FALLOPIA, in observationibus anatomicis, libro de Venis, Venetiis 1561. 8. nec non

5) J. COSTAEUS, de Venarum mesaraicarum veteris opinionis confirmatione adversus eos, qui Chyli in iecur distributionem fieri negant per mesaraicas venas, Venetiis 1565. 4. et quae

6) BARTHOLOMAEUS EUSTACHIUS, in Libro de Vena azyga 1565. Opusculorum anatomicorum p. 280. circa Ductum thoracicum obiter sibi visum habet, et memoriae tradidit,

7) CASPAR ASELIUS primus nominandus venit, qui die 22. Julii 1622. Vasa absorbentia revera detexit,

M 4

Jupanus

Kernutt

Nicolaus

Fournier

Blasius

Excerpt

Habenstam

Birk

Lypaeus

Hampacher diff. 1742

Agg. in H. ap. Nell

Jacobus Off

Parani, Bonicelli

Bonicelli

Caghi

Andreae

Bitcaine

Paris

Quabenton

in libro de p. natura

in altera contin. cap. 5

de ERASISTRATO

Vigeneridenim Caphonem

medicum salernitanum

art. medic. ex. Argent

1554 vasa lymphatica nota

habuisse ut opinatur

Sprunzel G. G. G. G. G.

arg. p. R. de 2. theil

Halle 1823. pag. 494

opinaturo.

*fabula ejus fabrica colonibus
opinctam adjungit*

*de egregio ejus fabricae
artificio, videri Mößler
Sammlung von M. C. G. p. 238.
An. Augst.*

ansamque ulterius ea investigandi dedit. Descripsit inventa in Libro de Lactibus sive lacteis Venis, Mediolani 1627. 4. recuso in Bibliotheca anatomica MANGETI Tomo Secundo.

Hos deinceps tempore exceperunt:

8) GUERNERUS ROLFINK, qui 1626. illa vidit, prouti memoriae prodidit in Dissertationibus anatomicis de Chylificatione et Circulatione sanguinis, Jenae 1632. 4. de Chylo et sanguine, Jenae 1652. 4. Jenae 1656. 4. recusis.

9) ADRIAN SPIEGELIUS, de humani Corporis Fabrica, Venetiis 1627. folio.

10) NICOLAUS CLAUDIUS FABRICIUS DE PEIRESCIUS, anno 1634. primum vasa absorbentia in homine ante suspendium bene pasto vidit, Autore PETRO GASSENDO in Vita eius viri Operum Tomo Quinto p. 307.

11) NICOLAUS TULPIUS (Autore WITTWER in BALDINGERI Medicinisches Journal, Stueck 13.) anno 1639. illa vidit.

12) CAELIUS FOLIUS, Sanguinis e dextro in sinistrum Cordis Ventriculum defluentis Via, cui non vulgaris in lacteas nuper patefactas Venas animadversio praeponitur, Venetiis 1639. 4.

13) J. WALAEUS, Epistola ad Thomam Bartholinum de Motu Chyli et Sanguinis, Leidae 1641. 8. recusa in MANGETI Bibliotheca anatomica.

14) JOHANNES VESLING, in Syntagmate anatomico, Pataviae 1641. et in Observationibus anatomicis etc. Hafniae 1664. 4. Tab. VIII. primam iconem vasorum absorbentium Hominis exhibuit.

15) PETRUS GASSENDI, de Philosophia Epicurea, Capite de Nutritione animalium, de Venis lacteis etc., Lugduni 1649. folio.

*Anno 1635 J. Fournier
Anat. p. 107.*

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. L. 185

16) MAURITIUS HOFMANN, Dissertatio de lacteis Venis oculatioris aevi decantatis, Altdorfii 1650. 4.

Idem, de Lactis ex Chylo statu tum naturali tum praeternaturali, Altdorfii 1673. 4. *Lange (1652)*

17) NICOLAUS PECQUET, experimenta nova anatomica, quibus incognitum Chyli Receptaculum et ab eo per Thoracem in Ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur. Editio prima Parisiis 1651. Editio auctior Parisiis 1654. 4. cui accedit nova de Thoracis lacteis Venis Dissertatio, in qua IOANNIS RIOLANI Responsio refutatur. Parisiis 1654. 4. recusa in Bibliotheca anatomica MANGETTI Tomo Secundo.

Idem. Lettre à Mr. CARCAVI touchant une nouvelle découverte de la Communication du Canal thorachique avec la Veine emulgente, 27. Mars 1667. et avec la Veine cave inferieure, en Memoires 1669. Tome X.

18) NATHANAEL HIGHMOR, Corporis humani Disquisitio. Hagae Comitum 1651. folio.

19) GUILIELM. HARVEY, Exercitationes de generatione animalium, Londini 1651. 4.

20) IOLYFFE, secundum Anglorum testimonium, anno 1652 vidit vasa absorbentia.

21) J. MARET, Abrégé des nouvelles Experiences anatomiques des Veines lactées etc. Toulouse 1652. 8.

22) OLAUS RUDBECK, Disputatio de Circulo Sanguinis. Arosiae 1652. 4.

Idem. Exercitatio anatomica exhibens Ductus Hepatis aquosos et vasa Glandularum serosa, 1653.

Idem. De Sero Sanguinis eiusque vasis, Upsalae 1661. 4.

Recusa reperiuntur duo ultima Opuscula tum in HEMSTERHUYSI MESSI aurea, tum in Bibliotheca anatomica MANGETTI Tomo Secundo, tum in ALBERTI

*of a
699.
in
meson
12. 6/*

von HALLER Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Septimo.

23) THOMAS BARTHOLINUS, de Lacteis Thoracis, Hafniae 1652. 4.

Idem. Vasa lymphatica nuper in animalibus inventa, Hafniae 1653. 8.

Recusum opus in Bibliotheca anatomica MANGETI.

Idem. Vasa lymphatica in Homine inventa, Hafniae 1654. 4.

Idem. Opuscula nova de Lacteis Thoracis et lymphaticis Vasis. Hafniae 1670. 8.

Idem. De iisdem rebus in variis aliis Operibus verba fecit.

24) IOANNES VAN HORNE, Novus Ductus Chyliferus nunc primum delineatus, Lugduni Batavorum 1652. 4.

25) PETRUS GUIFFART, Cor vindicatum sive de Cordis officio et proxima Lactis materie, Rouen 1652. 4.

Idem. Lettre touchant la Connoissance du Chyle et de ses Vaisseaux, qui le portent au Coeur, ensemble la decouverte de la noble Valvule et des observations sur l'Hydropisie, Rouen 1656.

26) ISAAC CATTIER, Historiae et observationes medicophysicae, 1655.

27) FRANCISCUS GLISSON, Anatomia Hepatis; adiiciuntur nonnulla de lymphaticis Ductibus. Londini 1654. 8. Recusa in Bibliotheca anatomica MANGETI Tomo primo.

28) JACOB ISRAEL, de Liene ac Vasorum lymphaticorum Observatio. Heidelbergae 1654.

29) HEINRICUS a MOINICHEN in Litteris ad Bartholinum 1654. Centuria Tertia, p. 8.

30) MARTIN BOYDAN, Insidiae structae BARTHOLINI Vasis lymphaticis ab OLAO RUDBECKIO 1654. 4.

fabulae
specimen

de egregio
artificio,
sanctum
non angust

1635 2^o
1648

117 120 21

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 137

Idem. Apologia pro Vasis lymphaticis THOMAE BARTHOLINI contra Insidias secundo scriptas ab OLAVO RUDBECKIO, Hafniae 1654. 12.

31) J. ALCIDIUS MUNIER, de Venis tam lacteis quam lymphaticis, Genevae 1654.

32) SEBASTIANI ALETOPHILI ad PECQUETUM, venarum lactearum thoracicarum Inventorem, Epistola 1654.

33) CAROLUS le NOBLE, observationes rarae et novae de Lacteis mesentericis et thoracicis, Parisiis 1655. 8.

34) JEAN CLAUDE DE LA COURVEC in Epistola ad BARTOLINUM 1655.

35) WILHELMUS de HENAUT, Clypeus, quo tela in PECQUETI Cor a cl. CAROLO le NOBLE Collega suo coniecta infringuntur et eliduntur, Rothomagi 1655. 12.

36) IOANNES DANIEL HORST, observationes anatomicae, et Decas Epistolarum, Francofurti 1656, 4. Vasa absorbentia Cordis vidit.

37) JOHANNES CHRISTIANUS AGRICOLA, in Literis ad BARTOLINUM 1656, varia de Morbis Systematis Chylificationis protulit.

38) THOMAS WHARTON, Adenographia, Londini 1656. 8. recusa in Bibliotheca anatomica MANGETTI, Tomo secundo.

39) CLAUDE TARDY, de la Monarchie du Coeur de l'Homme — des Vaisseaux du Chyle, Parisiis 1656.

40) GEORGIUS SEGER, de Quidditate et Materia Lymphae BARTHOLINIANAE ac de eadem Lympha doctorum Virorum epistolae, Hafniae 1658. 4.

Idem. Dissertatio de HIPPOCRATIS Orthodoxia in Doctrina de Nutritione Foetus etc. Basileae 1660. 4.

of a
677.
in
meson
nabf

Large 5/4 12
1657.

de Vasis absorbentibus Placentae et funiculi umbilicalis.

41) SIBOLDI HEMSTERHUIS Messis aurea, Lugduni Batavorum 1654. et Heidelbergae 1659.

42) FRANCISCUS SYLVIVS de le BOE, de Chyli a faecibus alvinis Secretione atque in lacteas Venas Propulsione, Leidae 1659. 4.

Idem. De Chyli mutatione in Sanguinem, Leidae 1659. 4.

Idem. De Vasis lymphaticis et Lympha, Leidae 1661. 4.

43) LUDOVICUS de BILS, ad TOB. Andreae Responsio, qua ostenditur verus usus Vasorum hactenus pro lymphaticis habitorum etc., Rotterodami 1659. Haec et alia opuscula eius recusa in eiusdem Speciminibus anatomicis Interprete G. BUENIO, Rotterodami 1661. 4.

44) GUALTERUS CHARLETON, Natural History of Nutrition etc. methodically delivered in Exercitationes physico-anatomical, London 1659. 4.

Idem. Exercitationes physico-anatomicae de Motu animali, Amstelodami 1659. 12.

45) CONRADUS VICTORINUS SCHNEIDER, Dissertatio de Catarrhis, Wittebergae 1660. 4.

46) ANTONIUS DEUSING, de Nutrimenti in corpore elaboratione, de Chylificatione etc. Groningae 1660. 12.

Idem. Oeconomia animalis, Groningae 1660. 12.

47) JACOBUS de BACK, Dissertatio de Corde, Rotterodami 1660. 12.

48) IOANNES RHODIUS, Mantissa anatomica ad BARTHOLINUM, Hafniae 1661. 8.

49. OLAUS BORRICHIVS, in Epistola ad THOMAM BARTHOLINUM, 1661.

fabula
de agria
artificio,
Groningae
An Angli

1630 30
1630

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 189

50) NICOLAUS STENONIS, de Musculis et Glandulis Observationes, Hafniae 1664. 4. Recusae in Bibliotheca anatomica MANGETI Tomo Secundo.

Idem. In Actorum Hafniensium Volumine Secundo, p. 241.

51) BERNHARDUS SWALWE, Querelae et Opprobria Ventriculi, Amstelodami 1664. 12.

52) FRIDERICUS RUYSCH, Dilucidatio Valvularum in Vasis lymphaticis et lacteis, cui accesserunt Observationes anatomicae rariores, Hagae Comitum 1665. 12. Recusa in eius operibus Lugduni Batavorum 1687. et in Bibliotheca anatomica MANGETI Tomo Secundo.

Idem. In Epistola anatomica Quinta, Tabula Sexta, Vasa absorbentia Hepatis nitide pinxit.

Idem. De Fabrica Glandularum Epistola ad HERMANNUM BOERHAAVE, Leidae 1722. 4. Recusa in eiusdem Operibus.

53) IOANNES HEINRICUS PAULI, Anatomiae Bilisanae Anatome, Argentorati 1665. 8.

Idem. Ad Dubia IOANNIS JOSEPHI WEPFERI Responsio.

54) GERARDUS BLASIUS, in Appendice ad VESLINGII Syntagma anatomicum, Amstelodami 1666.

55) IOANNES SWAMMERDAMM, Tractatus de Respiratione usque Pulmonum, Leidae 1667. 8. Recusus in MANGETI Bibliotheca anatomica.

56) REGNER de GRAAF, de Virorum organis Generationi inservientibus, Leidae 1668. 8.

Idem. De Mulierum organis Generationi inservientibus, Leidae 1672. 8.

57) RICHARDUS LOWER, Tractatus de Corde, Motu Sanguinis et Chyli in eum Transitu, Londini 1669. 8. Recusus in Bibliotheca anatomica MANGETI.

of a
1677.
in
mesen
faabf

58) THEODORUS KERCKRING, Specilegium anatomicum, Amstelodami 1670. 4. Observatione 91. p. 173. summe memorabilem locum habet.

59) ISBERT VAN DIEMERBROECK, Anatome Corporis humani, Ultraiecti 1672. 8.

60) IOANNES NICOLAUS PECHLIN, de purgantium Medicamentorum facultatibus, Leidae 1672. 8.

61) J. G. GRUBEL, Praeside IOANNE HADRIANO SLEVOGT, Dissertatio de Ductu Chylifero PECQUETIANO, Jenae 1674. 4.

62) IOANNES MURALT, Experimenta de Chylo et Lacte, Tiguri 1675. 4.

Idem. Vademecum — de Humoribus, Tiguri 1677. 12.

Idem. De Humoribus Microcosmum irrigantibus Chyli et Lactis natura, Tiguri 1695.

Idem. De Sanguinis et Lymphae natura, Tiguri 1696.

63) CASPARUS BARTHOLINUS, de Diaphragmatis Structura, Parisiis 1676. 8.

Idem. De Oeconomia Corporis Humani, Hafniae 1678. 8.

Idem. De Via Alimentorum et Chyli, Hafniae 1709. 4.

64) IOANNES CONRADUS PEYER, de Glandulis Intestinorum, Scaphusiae 1677. 8.

65) GUNTHERUS CHRISTOPHORUS SCHELLHAMMER, Tractatus de Voce, Jenae 1677. 4.

Idem. De Lymphae ortu et Vasorum lymphaticorum caussis, Helmstadii 1683. 4.

66) LEONHARDUS TASSIN, les Administrations anatomiques, Paris 1678. 12.

67) IOANNES DANIEL DORSTEN, de Ductu thoracico chylifero, Marburgi 1678. 4.

*fabulae
de spectant*

*de egritudine
artificio,*

*de egritudine
An. Augst*

*Anno 1630. 25
Anat*

*de Physiologia
§ 139.*

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. G. 191

68) IOANNES BOHN, Circulus anatomico-physiologicus, Lipsiae 1680. 4.

69) TILEMANN, Cous sive Hippocratica Praxis, Ulmae 1680. 4.

70) PETER van den BOSCH, de Lympha. Leidae 1680. 4.

71) CORNELIUS STALPART van der WIEL, Observationum rariorum Centuriae duae, Hagae Comitum 1682. 8.

72) WILLIAM MUSGRAVE, in Philosophical Transactions for the Year 1682.

73) HEINRICUS MEIBOM, et J. G. SCHMIEDT, Dissertatio de Valvulis Vasorum, Helmstadii 1682. 4.

74) IOANNES CONRADUS BRUNNER, Experimenta circa Pancreas, accedente Diatribe de Lympha, Amstelodami 1685.

Idem. De Glandulis in Duodeno, Heidelbergae 1687. 4.

Idem. De Glandula Pituitaria, Heidelbergae.

75) GODOFREDUS BIDLOO, Anatome Corporis humani centum et quinque Tabulis per G. de LAIRESSE ad vivum delineatis, Amstelodami 1683. folio max. — WILLIAM COWPER eundem Librum turpi plagio edidit Lugduni Batavorum 1739. sub titulo: Anatomia Corporum humanorum centum et quatuordecim Tabulis aucta.

Idem. Vindiciae contra Animadversiones RUYSCHII, Leidae 4.

Idem. Exercitationes anatomico-chirurgicae, Leidae, 1708. 4.

76) JEREMIAS LOSSIUS, Dissertatio de Glandulis in Genere, Witebergae 1683. — Recusa in ALBERTI HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Secundo.

et a
1677.
in
mesen
faabf

*fabulae
specimen*

*de egregio
artificio,
famulus
An. Aug.*

*anno 1635 3^o
vrat*

77) CAROLUS DRELINCOURT, Experimenta ex Viscerum secretionibus petita, Leidae 1684. 12.

78) SAMUEL COLLINS, System of Anatomy, London 1685.

79) BERNARDUS ALBIN, et GUSTAVUS DAVID LIPSTOERP, Dissertatio de Poris humani corporis, Francofurti ad Viadr. 1685. 4.

80) ANTONIUS NUCK, de Ductu salivali — Ductibus Oculorum aquosis, Leidae 1685. 12.

Idem. Defensio Ductuum aquosorum 1691.

Idem. Sialographia et Ductuum aquosorum Anatome nova, auctior, Leidae 1695. 8. — Recusa in MANGETI Bibliotheca anatomica.

Idem. Adenographia, Leidae 1691. 8.

81) FRIDERICIS SCHRADER, Lympha et Glandulae pathologice consideratae, Helmstadii 1686. 4.

82) IOANNES THILE, Spirituum cum Lympha connubium, Wittebergae 1686. 4.

83) IOANNES ZELLER, Dissertatio de Vasorum lymphaticorum Administratione, Tubingae 1687. 4. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine primo.

84) FRANCISCUS ZYPAEUS, Fundamenta Medicinae reformatae, Bruxellis 1687. 8.

85) MARCELLUS MALPIGHI, de Glandulis conglobatis, Londini 1689. 4.

Idem. Opera posthuma, Londini 1697. folio.

86) RICHARDUS CARR, Epistolae medicae, Londini 1691. 8.

87) JOSEPHUS HALSEY, de Lympha 1691. 4.

88) JOHANNES MUYS, de Vulnere vasculi lymphatici in Eius Praxi medico-chirurgica, Amstel. 1695. p. 240.

89) MAU-

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 193

89) MAURITIUS van REVERHORST, Dissertatio de Motu Bilis circulari eiusque Morbis, Leidae 1692. 4. Recusa Lugduni Batavorum 1696. 8.

90) JOHANNES van SWARDT, de Distributione Chyli, Ultraiecti 1692. 4.

91) PHILIPPUS VERHEYEN, Anatome 1693.

92) JOHANNES JACOBUS DOEBEL, et JOHANNES ERNESTUS SCHAPER, Valvularum Vasorum lacteorum, lymphaticorum et sanguiferorum Dilucidatio, Rostochii 1694. 4.

93) PETRUM CHIRAC 1694. Tabulas egregias parasse dicit MONTAGNAT confer N. 173.

94) HEINRICUS RIDLEY, Anatomy of the Brain, London 1695. 8.

95) OLIGER JACOBÆUS et I. I. WOYT, de Chylificatione, 1697.

96) ANG CRÉSSE et LUDOWICUS LEMERY, Ergo proxima, quo corpus alitur, materia Chylus, Parisiis 1697. 4.

97) GUILIELMUS MYLIUS, de Glandulis, Lugduni Batavorum 1698. 4.

98) JACOBUS RHEINHARDUS WAGNER, in Actis litterariis Maris Balthici 1700.

99) IOANNES MARIA LANCISI, de subitaneis Mor-
tibus, Romae 1704. 4.

100) RAYMUNDUS VIEUSSENS, Novum Vasorum Corporis humani Systema, Amstelodami 1705. 8.

Idem. Dissertatio de Structura Uteri et Placentae prodiit cum VERHEYEN Supplemento anatomico, Coloniae 1705. 12.

101) ANTONIUS PACCHIONI, de Glandulis conglobatis durae Meningis indeque ortis lymphaticis ad piam Matrem perductis, Romae 1705. 8.

SUMMERING DE MORBIS:

N

*Ed. Tyson Anatomy of a
Pygmy Lond. 1699.
pag 34. mercurio in
vasa sanguifera mesen-
teris pulsus, in vasa ab-
sorbentia.*

PTA
urt, Experimenta ex Visc-
eidae 1684. 12.
System of Anatomy, Lon-
et Gustavus Davin
Poris humani corporis,
Ductu salivari - Du-
e 1685. 12.
quosorum 1691.
um quosorum Ana-
5. 8. - Recusi in
1691. 8.
Lympha et Glandu-
stadii 1686. 4.
itum cum Lympha
sertatio de Vasorum
linguae 1687. 4. -
num anatomicarum
damenta Medicinæ
Glandulis conglu-
ni 1697. folio.
olae medicinales,
apha 1691. 4.
ere vasculi lymphati-
u, Amstel. 1693.
89) Mar.

fabula
sp. acta

de egr.
art. f.
t. an. a.

Idem. Dissertationes physico-anatomicae novis Experimentis auctae, Romae 1721. 8.

102) WILHELM des NOUES, Lettre à Mr. Guilielmi, Rome 1706. 8.

103) JACOBUS DRACKE, Anthropologia nova or a new System of Anatomy, London 1707. 8. Recusa Londini 1723. Append. Tabul. 18.

104) JACOBUS KEIL, An Account of animal Secretion, London 1708. 8.

105) JOHANNES MERV, Probleme de Physique; si la Generation du Foetus dépend de sa Nourriture etc. Paris 1711. 4.

Idem. In ^{Epistolis} ~~Letteris~~ ad PACCHIONUM, ^{Romae 1721. 8.} vide supra.

106) JOHANNES FRIDERICUS HELVETIUS, de Chylōsi, Leidae 1711. 4.

107) JOHANNES SALZMANN, Dissertatio Encheiresis inveniendi Ductum thoracicum, Argentorati 1711. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Primo.

108) IOANNES BAPTISTA BIANCHI, Historia Hepatis, Taurini 1711. 4.

Idem. De lacteorum Vasorum Positionibus et Fabrica, Genuae 1743. 4.

109) ALEXANDER PASCOLUS, Il Corpo umano, Venetiis 1712. 4.

110) GIGOT, de Valvulis Vasorum lymphaticorum, in Journal des Sçavans 1712.

111) JOHANNES JACOBUS HUBER, Dissertatio, Doctrina de Glandulis, Basileae 1713.

112) IOANNIS FANTONI, Manuductio ad Historiam anatomicam Corporis humani, Venetiis 1713. 4.

Idem. In Dissertationibus anatomicis, Taurini 1745. 8.

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 195

113) JOHANNES ADAMUS WEDEL, Dissertatio de Valvula Venae subclaviae Ductui thoracico imposita, Jenae 1714. — Recusa in ALB. HALLER Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Primo.

114) IOANNES SIGISMUNDUS HENNINGER, Dissertatio de Mesenterio, Argentorati 1714. — Recusa in ALB. HALLER Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Primo.

115) JOHANNES SAMUEL BERGER et GOTTFRIDUS FLOERKE, Dissertatio de Transitu Sanguinis per Vasa minima, Wittebergae 1715. 4.

116) EDUARDUS PETRUS WIOM, Dissertatio de Via Alimentorum et Chyli, Hafniae 1717. — Recusa in ALB. HALLER Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Septimo.

117) FRIDERICUS HOFFMANN, Medicina rationalis et Systematica, Tomus primus, Halae 1718. 4.

118) HERMANNUS WERNERUS ENGELBERTUS VON WESTHOVEN, de Angina ex obstructis Glandulis Glandularumque thyroidearum lymphaticis Vasis deducta, Lemgo 1718. 4.

119) LAURENTIUS HEISTER, Dissertatio de vera Glandulae Appellatione, Altdorfii 1718.

Idem. Medicinische Chirurgische und Anatomische Wahrnehmungen, Rostock 1753. 4.

120) IOANNES BAPTISTA MORGAGNI, Adversaria anatomica, Patavii 1719. 4.

121) RICHARDUS HALE, in Philosophical Transactions for the Year 1720. Vasa absorbentia Colli et Thymi describit.

122) HELVETIUS, in Memoires de l'Academie des Sciences de Paris, année 1721. cfr. N. 106.

123) ARENTIUS CANT, Dissertatio de Receptaculo et Ductu Chyli, Leidae 1721. 4. Recusa in eiusdem

*religiosa ejus scripta vide
N. 153.*

opere: Impetus primi anatomici, Leidae 1721. folio.

124) ABRAHAM VATER, Vasa lactea in cadavere feminae visa, Wittebergae 1722. 4.

125) HERMANNUS BOERHAAVE, Epistola ad RUY-
SCHIIUM de Fabrica Glandularum in Corpore humano,
Leidae 1722. — Recusa in eius Opusculis, Hagae Co-
mitum 1738.

126) CROMWELL MORTIMER, Dissertatio de In-
gressu Humorum in Corpus humanum, Lugduni Ba-
tavorum 1724. — Recusa in ALE. HALLERI Disputa-
tionum anatomicarum selectarum Volumine Tertio,
p. 623. Item in FR. I. OVERCAMP Collectione Disserta-
tionum inauguralium Lugduno-batavarum Tomo Primo.

127) BENEDICTUS STEHELIN, Tentamen medicum,
Basileae 1724. de Vasis absorbentibus Uteri.

128) GEORGIUS DANIEL COSCHWIZ, de Ductu
Salivali novo, Halae 1724. 4. Vasa absorbentia Linguae
trahit.

129) IOANNES GEORGIUS GMELIN, Praeside IOAN-
NE GEORGIO DUVERNEY, Dissertatio de Actione Glan-
dularum mesentericarum retardativa, Tubingae 1725. 4.

130) JACOBUS HOVIUS, de circulari humorum
Motu in Oculis, Lugduni Batavorum 1726. 4.

131) IOANNES GEORGIUS DUVERNEY, Descriptio
Vasorum chyliiferorum, in Commentariis Academiae
Petropolitanae Tomo Primo ad annum 1726.

132) NOGUEZ, Anatomie du Corps de l'Homme,
à Paris 1723. et 1726. 12. Egregia admodum de hoc
Vasorum Systemate tradidit. — Confer Excerpta apud
SIMMONS in Vita WILLIAM HUNTERI, et apud BLUMEN-
BACH, Medicinische Bibliothek Tomo Secundo, p. 569.

133) LAURENTIUS HEISTER, in Compendio ana-
tomico, Norimbergae 1727. 8.

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 197

Idem. In Actis Naturae Curiosorum, Centuria Secunda et Sexta; et in Medicinisch Chirurgische und Anatomische Wahrnehmungen, Rostock 1753.

134) PAULUS HIERONYMUS BIUMI, Esame d'alcuni canaletti chiliferi, chi del fondo del Ventricolo per le tonache dell' omento sembrano penetrar nel fegato, Milano 1728. 8.

135) IOANNES ANDREAS FISCHER, de Chylificatione integra et laesa, Erfordiae 1728. 4.

136) JOAN. D. SCHERB, de calculo in ductu thoracico 1729. Recusus libellus in ALB. HALLERI Opusc. pathologicis.

137) IOANNES AMMANN, Dissertatio de Venis in Corpore humano bibulis, Leidae 1729. 4. — Recusa in Collectione Dissertationum OBERKAMPI.

138) IOANNES FRIDERICUS CASSEBOHM, de Differentia Foetus et Adulti anatomica, Halae 1730. 4. de Vasis absorbentibus Ventriculi.

139) NICOLAUS ROSEN et GEORGIUS WALLERIUS, Dissertatio de Existentia Vasorum absorbentium in Intestinis partem Chyli ad Venas mesentericas immediate deferentium, Upsaliae 1731.

140) P. NANNI, in Commentariis Bononiensibus, Tomo Primo 1731.

141) AUGUSTUS FRIDERICUS WALTHER, Dissertatio de Ductu thoracico bipartito, Lipsiae 1731. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Primo.

142) JACOBUS BENIGNUS WINSLOW, Exposition anatomique de la Structure du Corps humain, Paris 1752. 12.

143) ALEXANDER MONRO (Pater), Descriptionem Ductus thoracici ad calcem Editionis quintae Osteolo-

giae exhibuit, London 1732. 8. Recusam in eius Works, Edinburgh 1781.

144) SAMUEL THEODORUS QUELLMALZ, Dissertatio de Venis absorbentibus, Lipsiae 1732. 4.

145) M. P. DEISCH, Dissertatio de Splene canibus exciso 1735. in Thesi adiecta Nro. X. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Tertio.

146) FRANCISCUS NICHOLS, Compendium anatomico-oeconomicum etc. Londini 1736. 4. de Vasis Ventriculi.

147) IOANNES ZACHARIAS PETSCH, Sylloge Observationum anatomicarum, Halae 1736. 4. — Recusa in Selectu HALLERI; de Vasis absorbentibus Cerebri et Oculi observationes tradit.

148) ALEXANDER CAMERARIUS, Dissertatio: Sorbendi actus, modus, ususque multiplex, Tubingae 1736. 4.

149) ABRAHAM KAAUW BOERHAAVE, Perspiratio dicta HIPPOCRATIS per universum Corpus illustrata, Leidae 1738. 8.

150) CHRISTIANUS GOTTLIEB LUDWIG, de Cuticula, Lipsiae 1739. 4.

Idem. De Arteriarum Tunicis, Lipsiae 1739. 4.

Idem. De Glandularum Differentiis, Lipsiae 1748. 4.

Idem. Institutiones Medicinae clinicae, Lipsiae 1758. 8.

Idem. De celeri Corporum Incremento causa debilitatis in Morbis, Lipsiae 1760. 4.

Idem. De celeri Corporum obesitate causa debilitatis in Morbis, Lipsiae 1760. 4.

151) ANTONIUS PHILIPPUS QUEITSCH, Anatomische Nachricht von der grossen Speisesaftroehre in der Brust, Frankfurt an der Oder 1740. 4. cum Figura.

Idem in Selectis Medicinis Francofurtensibus Tomo 1^o

1739. p. 77 de praecipuis ductum thoracicum investigandi methodis.

Idem ibidem 1743. Tomo tertio. de duplici ductu thoracico inferiorem finitima in vena jugulari, Dextra vero in subclavia ubi jugularem dextram emittit.

*Non ibid. Francofurti 1748.
Effigies ductus thoracici
humani. pag. 76. Indicia
et animae versiones in figurarum
aeneas ductus thoracici corporis
humani.*

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 199

- 152) ^{Will.} CHESELDEN, The Anatomy of the human Body, London 1741. 8. — Germanice vertente I. F. WOLFF, Goettingae 1790. 8.
- 153) RENATUS JACOBUS CRESCENTIUS GARENGEOT, Splanchnologie, Paris 1741. Tabula decima Septima Figuram Ductus thoracici exhibuit.
- 154) ALBERTUS VON HALLER, Dissertatio de Ductu thoracico, Goettingae 1741. — Recusa in eiusdem Selectu Disputationum anatomicarum Volumine Primo.
- Idem.* In Elementis Physiologiae Tomo Primo et Septimo, Lausanne 1757.
- Idem.* In Opere de Corporis humani Fabrica et Functionibus, Bernae 1777. Tomo Primo.
- Idem.* In Primis Lineis Physiologiae.
- 155) IOANNES CHRISTOPHORUS BOHL, Dissertatio: Viae lacteae Corporis humani Historia naturalis, Regiomonti 1741. 4. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Primo.
- 156) IOHANNES GOTTFRIDUS BRENDEL, Dissertatio de Chyli ad Sanguinem publico privatoque potissimum Commeatu per Venas mesaraicas non improbabili, Goettingae 1741. — Recusa in eiusdem Opusculis, Goettingae 1769.
- 157) IOANNES FRIDERICUS CRELL, de Glandularum in caecae et apertae Divisione, Helmstadii 1741. 4.
- 158) PETRUS BERCHER et DIONYSIUS PONCHON, An a Valvulis Intestinorum Chymi Progressionis Determinatio? Parisiis 1742. 4.
- 159) THEOPHILUS BORDEU, Chylificationis Historia, Monspeliae 1742.
- Idem.* Recherches anatomiques sur la Position des Glandes et sur leur action, Paris 1751. 8.
- 160) CORNELIUS HENRICUS VELSE, Dissertatio de mutuo Intestinorum Ingressu etc. Leidae 1742. — Re-

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 201

171) PETRUS TARIN, Dissertatio sistens Problema anatomicum: Utrum inter Arterias mesaraicas Venasque lacteas immediatum detur commercium? Parisiis 1743. — Recusa in ALB. HALLERI Disputationum anatomicarum selectarum Volumine Septimo.

172) JOSEPHUS EXUBERIUS BERTIN, sur le nouveau Systeme de la Voix et sur les Arteres lymphatiques, Paris 1748. 12.

173) HENRICUS IOSEPHUS BERNHARDUS MONTAGNAT, Lettre à Monsieur BERTIN, au sujet d'un nouveau genre des Vaisseaux, Paris 1748. 8.

Idem. Supplement à la Lettre précédente sur les Vaisseaux lymphatiques.

174) IOANNES CLAUDIUS MERTRUD, in Memoires des Sçavans étrangères, Tome troisieme 1750.

175) CHRISTIANUS EHRENFRIEDUS ESCHENBACH, Anatomische Beschreibung des menschlichen Koerpers, Rostock 1750. 4.

176) GEORGIUS EHRHARDUS HAMBERGER, Physiologia medica, Jenae 1751. 8. 468.

177) GEORGIUS HEUERMANN, Physiologie, Copenhagen 1752. 8.

178) ALEXANDER MONRO (Filius), Dissertatio de Semine et Testibus, Edinburgi 1753. 8. — Recusa in G. SMELLIE Thesauro medico Disputationum Edinensium, Volumine secundo.

Idem. De Venis lymphaticis valvulosis et de earum imprimis Origine, Berolini 1757. 8. — Editio altera 1770. 8.

Idem. Observations anatomical and physiological, wherein Dr. HUNTERS claim to some Discoveries is examined, Edinburgh 1758. 8.

Idem. Answer on the Notes and on the Postscripts to the Observations anatomical and physiological, Edinburgh 1758. 8.

Idem. Observations on the structure and Functions of the Nervous System, Edinburgh 1783. folio. — Germanice cum Notis SOEMMEBRINGII, Lipsiae 1787. 4.

179) ANDREAS ELIAS BUECHNER, respondente FRIDERICO JACOBO VOGEL, Dissertatio de Vasorum lymphaticorum Glandularumque conglobatarum Utilitate, Halae 1757. 4.

180) BERNHARDUS SIEGFRIEDUS ALBINUS, Tabula Vasis chyliferi, Lugduni Batavorum 1757. folio majori. — Explicationem huius splendidissimae tabulae exhibuit Vir summus in non satis laudandis Annotationibus academicis Libro Quarto Capite Nono.

181) JOANNES FRIDERICUS MECKEL, Dissertatio epistolaris ad ALB. HALLERUM de Vasis lymphaticis Glandulisque conglobatis, Berolini 1757. 4.

Idem. Nova Experimenta et Observationes de Finibus Venarum et Vasorum lymphaticorum, Berolini 1772. 8. — Recusa in ROZIER Observations sur la Physique, Parisiis 1773. Tomo Secundo.

182) MARKUS ARENSIDE, Notes on the Postscript of a Pamphlet (MONRO) intitled observations anatomical and physiological, London 1758. 8.

*A
Observations on
the origin and use
of the lymphatic
Vessels in Animals*

183) DIEDRICH, de Morbis Glandularum, Lipsiae 1759.

184) IOANNES FRIDERICUS FASELIUS, Dissertatio de Absorptione, Jenae 1760. 4.

Idem. De Arteriis non sanguiferis, Jenae 1763. 4.

185) IOANNES MARTINUS BUTT, de spontanea sanguinis separatione, Edinburghi 1760. — Recusa in EDUARDI SANDIFORT Thesauro Dissertationum, Tomo Secundo.

186) PETRUS CAMPER, Demonstrationes anatomico-pathologicae, Libro Primo, Amstelodami 1760. folio.

*Daniel Lani
Compositus
Jussu 1774
Jussu in
Pianis
Jussu 1753.8*

Idem. Over den waaren Aart der Kankerwording in Genees - Natuur - en Huishoudkundig Kabinet N. 3.

187) DOMINICUS COTTUNNI, de Aquaeductibus Auris humanae, Neapoli 1760. 8. — Recusa Viennae et in ED. SANDIFORT Thesauri Dissertationum Volumine Primo.

188) RUDOLPHUS AUGUSTUS VOGEL et DESBANS, Dissertatio de Hydrope Peritonaei saccato, Goettingae 1761. 4. — Recusa in ED. SANDIFORT Thesauri Dissertationum Volumine Primo.

189) WILLIAM HUNTER, Medical Commentaries, London 1762. — Editio altera Londini 1777. 4 maj. — Supplement, London 1764. 4. — Versio germanica, Lipsiae 1784. 8.

Idem. In Opere posthumo: Introductory Lectures etc. London 1784 p. 58.

190) SAMUEL AURIVILLIUS, Dissertatio de glandulis animalibus, Holmiae 1764.

191) ALEXANDER BERNARDUS KOELFIN, Dissertatio de Structura Mammarum, Gryphiswaldiae 1764. 4.

192) JOSEPHUS LIEUTAUD, Essais anatomiques, à Paris 1766. — Editionem auctam edidit PORTAL, confer et versionem germanicam huius libri.

193) IOANNES SOGRAPHI, Libellus in quo Theoria Lymphae Ductuum MONROI et HUNTERI exponitur, et ad Praxin clinicam adaptatur, Patavii 1766. 8.

194) CAROLUS LINNÉ, Venae resorbentes, Upsalae 1767. 4.

195) JOSEPHUS DOERNER, Dissertatio, Corpus animale Chemista, Argentorati 1767. 4.

Idem. De Balneis immersivis eorumque modo agendi.

196) A. BRILL, Observatio de Humore lacteo cum Placenta humana reperto, Groningae 1769. 8.

germanice versa & in Sammlung für praktische Anst. Volamine undecimo Lips. 1785.

Ejusd. Dissertationes

decem quibus ab ab industria Europaei academici palam affunditur. Volumina duo 1798 et 1800 pluribus locis

même année. 1797-1800.

idem in Anatomy of the gravid uterus editore Baillie, London 1794.

Cheston Pathological Inquiries Gloucester 1766 (cit. A. Monro. 1767)

e structure and Fun-
linburgh 1763 folio. —
INGII, Lipsiae 1767. 4.
CHNER, respondente
no de Vasorum lym-
globularum Utilitate,

US ALBINUS, Tabula
1757 folio majori. —
tabulae exhibuit Vir-
tionibus academicis

NEL, Dissertatio
Vasis lymphaticis
57. 4.

servationes de Fi-
ticozum, Berolini
vations sur la Phy-

s on the Postscript
vations anatomici-

landularum, Li-

us, Dissertatio

, Jenae 1763. 4.

de spontanea su-

— Recusa in

ationum, Tomo

strationes anat-

ustelodami 1760.

197) WILLIAM HEWSON, An Account of the lymphatic System in amphibious Animals — in Philosophical Transactions Volumine Quinquagesimo nono, Anno 1769. p. 198.

Idem. In Philosophical Transactions, Tomo LIX. p. 204. of the lymphatic System in Fishes.

Idem. Experimental Inquiries into the Properties of the Blood, London 1771. Volumen Secundum continet Descriptionem Systematis lymphatici, Londini 1774. — Cuius editio latina vertente van de WYMPRESSE cum Praefatione HAHNI prodiit Traiecti ad Rhenum 1783. 8. — Volumen Tertium posthumum prodiit, Londini 1777. 8. Germanice in Sammlung aus-erlesener Abhandlungen fuer practische Aerzte, Tomo Primo et Quarto, et Norimbergae 1780. 8.

198) D. WATSON, de Vasis lymphaticis Cervicis Vesicae, in Philosophical Transactions Volumine LIX, Anno 1769.

199) ANTONIUS PORTAL, in Memoires de l'Academie des Sciences 1770. et 1780.

200) IOANNES GOTTFRIEDUS LEONHARDI, Dissertatio de resorptionis in Corpore humano praeter naturam impeditae causis atque noxis, Lipsiae 1771. 4.

Idem. De Vi suctionis in Corpore humano, Wittebergae 1772.

201) PHILIPPUS AMBROSIIUS MARHERR, Praelectiones in BOERHAAVII Institutiones, Viennae 1772. 8.

202) ACHILLES MIEG, Specimen Secundum Observationum botanicarum anatomicarum et physiologicarum, Basileae 1772. 4.

203) LASSUS, sur la lympe, Paris 1774. 4.

204) JOHANNES FRIDERICUS LOBSTEIN, Dissertatio de Liene, Argentorati 1774. 4.

205) IANUS BANG, in Collectaneis Societatis medicae Hafniensis, Volumine Primo 1774. 4.

Daniel Lant.
Composit.
1774.
1774.
1774.
1774.
1774.

206) IOANNES BAPTISTA FELS, Dissertatio de Glandulis conglobatis, Argentorati 1774. 4.

207) IOANNES DOMINICUS SANTORINI, Tabulae anatomicae Septendecim a cl. GIRARDI editae, Parmae 1775. folio minori — Tabula decima Ductus thoracici Transitum per Diaphragma, et Tabula decima tertia Vasa absorbentia Intestini tenuis nitide pingit.

208) IOANNES GOTTLIEB WALTER, Observationes anatomicae, Berolini 1775. folio. Instrumenta ad replenda absorbentia pingit.

Idem. De Nervis Thoracis et Abdominis, Berolini 1783. folio, in praefatione.

Idem. In Mémoires de l'Académie des Sciences à Berlin 1786. et 1787. p. 21. Sur la Resorption. Vasa absorbentia Intestini tenuis lapidifera nitide pingit. — Germanice versae sub Titulo: Bemerkungen ueber das Einsaugen, in B. N. G. SCHREGER Beitrage zur Kultur der Saugaderlehre, Leipzig 1793. 8. Erster Theil. Ipse autor germanice edidit hanc Dissertationem Berolini 1794.

209) FERDINANDUS LEBER, Vorlesungen ueber die Zergliederungskunst, Viennae 1776. 8.

210) (ANONYMUS), de Cholerarum Natura, Viennae, 1776. 8. promisit, p. 131. Commentationem de Vasis lacteis primo Sanitatis et Morborum et Morum fundamento, quam vero hucdum apparuisse non novi.

211) ESCHENBACH, Schediasma de Glandularum mesaraicarum in Chylum Actione, Lipsiae 1777.

212) FR. GEBHARD, Adversaria medica, Basileae 1777. 8.

213) IOANNES CHRISTIANUS KEMME, respondens F. S. PIETSCH, Dissertatio Glandulas conglobati generis Organa esse Lympham conficiencia, Halae 1777. 4.

troisième année.
1799. 1800.

An Account of the Lym-
phatics — in Philosophi-
cal Magazine, Anno

actions, Tomo LIX.
in Fishes.

into the Properties
men Secundum con-

ymphatici, Londini
ente van de Wyn-

prodiit Traiecti
erium posthumum

in Sammlung aus-
che Aerzte, Tomo

80. 8.

ymphatici Cervicis
ns Volumine LIX,

moires de l'Acade-

WARD, Dissertatio

ano praeter natu-

psiae 1771. 4.

corpore humano,

ERR, Praelectiones

nae 1772. 8.

Secundum Ob-

et physiologi-

ris 1774. 4.

STEIN, Dissertatio

is Societatis me-

4.

214) CAROLUS GOTTLIEB KRAUSE, Praeside IOANNE GOTTLIEB HAASE, Dissertatio de Motu Chyli et Lymphae Glandulisque conglobatis, Lipsiae 1778. 4.

215) SAMUEL THOMAS SOEMMERRING, Dissertatio de Basi Encephali, Goettingae 1778. 4. — Editio aucta recusa LUDWIGIO in Selectu Scriptorum neurologicorum minorum Tomo secundo.

Idem. Programma de ^{cl. Haufmanni} Cognitionis subtilioris Systematis lymphatici in Medicina usu, Cassellis 1779. 4. — Versio germanica in Sammlung fuer Wundaezte.

Idem. In PETRI CAMPERI, Dissertatione on Kankerwording 1780.

Idem. In Notis ad A. MONRO, ^{Observatione} vom Nervensystem 1787.

Idem. In BLUMENBACHII Medicinische Bibliothek, Tomo tertio ^{Stellingen} 1791.

Idem. In Notis ad versionem germanicam Primarium Linearum Physiologiae ALBERTI von HALLER, Berolini 1788. 8.

Oftologia.

Idem. Vom Baue des menschlichen Koerpers, vier-
Angiologia Franckter Thril, Gefaelslehre, Frankfurt 1792. 8.
1800.

Idem. In Versione germanica M. BAILLIE Morbid
Anatomy, Berlin 1794. 8.

Idem. 216) WILLIAM CRUIKSHANK in PETRI CLARE
Essay on the Cure of Abscesses by Caustic etc. Lon-
don 1779. — Versio germanica prodit in Sammlung
Lingen 1795. 8. fuer Wundaezte, Erstes Stueck; item in Sammlung
auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche practischer
Aerzte. Sechster Band.

Idem. The Anatomy of the absorbent Vessels of
the human Body, London 1786. 4. Editio altera
auctior 1790. accesserunt et Tabulae novae — Ver-
tabula.

Daniel Län
Compositus
Gott. 1774
Idem in:
Pneum.
Jung 1753. 8

Reichthum über die Nadelnischen.
Reichthum. de fluido nervo.

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 207

sio germanica cum Notis CHRISTIANI FRIDERICI LUDWIGII prodit Lipsiae 1789. et 1794. — Versio gallica
 74 PETIT RADEL, Paris 1787. 8.

217) EDMUNDUS DARWIN, Experiments establishing a Criterion between mucaginous and purulent matter; and an Account of the absorbent Vessels of animal Bodies in some Diseases, Lichtfield and London 1780. 8. — Germanice versum in Sammlung auserlesener Abhandlungen fuer practische Aerzte, Sechster Band, p. 556. — Gallice versum in Bibliotheque du Nord Tome LXXV.

218) CHRISTIANUS FRIEDERICUS NÜRNBERGER, Dissertatio de Glandulis conglobatis, Wittenbergae 1780. 4.

219) NATHANAEL BERENDT, de Lactis Metastasis, Goettingae 1780. 4.

220) SABATIER, de Ductu thoracico, in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris 1780.

221) WILSON, Observations relative to the Influence of Climate on vegetable and animal Bodies, London 1780. 8.

222) HENRICUS AUGUSTUS WRISEBERG, tum in Notis ad ALBERTI VON HALLER Primas Lineas Physiologiae, Goettingae 1780. 8. tum in Commentationibus Societatis regiae Goettingensis ad Annum 1787. et 1788. Volumine Nono. Excerptam hanc Dissertationem cum Notis et Figura PHILIPPI MICHAELIS vide in C. GROSSE Magazin fuer die Naturgeschichte des Menschen.

223) FRIDERICUS JACOBUS RIESE, Dissertatio de Glandulis, Giessae 1781. 4.

224) WINTERBOTTOM, Dissertatio de Vasis absorbentibus, Edinburgi 1781. 8.

troisième année.
 1799-1800

225) GEORG PROCHASKA in Annotationum academicarum fasciculo secundo, Pragae 1701. p. 58.

226) JOANNES CHRISTIANUS PLANK, Morbus Osteosarcoseos singulari casu et epicrisi illustratus, Tubingae 1781. 4.

227) COLONBIER, Dissertatio de Lacte humano, 1782.

228) I. C. SZOMBATHI, de Morbis Glandularum secundum aetates, Viena 1782.

229) ALEXANDER SCHUMLANSKY, de Renum structura, Argentorati 1782. 4.

230) ANDREAS BONN, Descriptio Thesauri ossium morbosorum HOVII in adnexa Dissertatione de Callo, Amstelodami 1783. 4.

231) EDUARDUS SANDIFORT, Exercitationes anatomicae, Lugduni Batavorum 1783. 4. Capite Septimo.

232) ANTONIUS SCARPA, Oratio de promovendis anatomicis rationibus Administrationibus, Ticini 1783. — Recusa Lipsiae 1785. 8.

233) DOMINICUS CYRILLO, Osservazioni pratiche intorno alla Lue venerea, Napoli 1783. 4.

234) (ANONYMUS) Storia dei vasi linfatici in Giornale per servire alla Storia ragionata della Medicina di questo secolo, Venezia 1783. Tomo Primo, 4.

235) FELIX FONTANA, Opuscoli scientifici, Firenze 1783.

Idem. In Traité sur le Venin de la Vipere etc.

236) PAULUS MASCAGNI, prodrome d'un Ouvrage sur le Systeme de Vaisseaux lymphatiques, Siena 1784.

Idem. Vasorum lymphaticorum Corporis humani Historia et Ichnographia, Senis 1787. folio maximo. — Versio germanica cum Notis CHRISTIANI FRIDERICI LUDWIG prodit Lipsiae 1789. 4.

237) IACO-

Daniel Lön
conspic.
Jett. 1774
idem in
Pian.
Jung 1753.8

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 209

237) JACOBUS REZIA, Specimen Observationum anatomicarum et pathologicarum, Ticini 1784. 8.

238) WILHELMUS SHELDON, History of the absorbent System, London 1784.

239) IOANNES HENDY, Treatise on the glandular Disease of Barbados proving it to be seated in the lymphatic System, London 1784. 8. *gallice Mém de l'Acad. d'Emulation. quatrième année. 1799. 1800.*

240) CHARLES WHITE, Inquiry into the Nature and Cause of that Swelling in one or both of the lower Extremities, which sometimes happens to lying in woman, Warrington 1784. 8. Germanice Wien 1786. 8. Belgice vertente viro egregio THUESSINK cum notis et praefatione 1787.

241) TH. WHITE, on Struma, London 1784. 8.

242) JANUS BLEULAND, Observationes anatomico-medicae de sana et morbosa Oesophagi Structura, cum Figuris, Leidae 1784. 4.

Idem. Experimentum anatomicum, quo Arteriarum lymphaticarum existentia probabiliter adstruitur, Leidae 1784. 4.

Non non Hepati.

243) AUGUST CHRIST. REUSS, Novae Observationes circa Structuram Vasorum in Placenta humana et eius nexum cum Utero, Tubingae 1784. 4.

244) J. ROLLO, Remarks on the Disease lately described by Dr. HENDY etc. London 1785. 8.

245) SEBALDUS JUSTUS BRUGMANNS Dissert. de Puogenia, Groning. 1785. 8.

246) PAULUS CHRISTIANUS FRIDERICUS WERNER et CHRISTIANUS GOTTHELF FELLER, Vasorum lacteorum et lymphaticorum Descriptio, Lipsiae 1785. 4. cum iconibus accuratissimis.

247) JOHANNES GOTTLÖB HAASE, de Vasis Cutis et Intestinorum absorbentibus, Plexibusque lymphaticis Pelvis humanae Annotationes academicae cum iconibus, Lipsiae 1786. folio.

idem. De Fine Arteriarum earumque cum Venis Anastomosi, Lipsiae 1792. 4.

in opere posthumo edito a Everardo Home.
248) JOHN HUNTER, Observations on certain parts of the animal Oeconomy, London 1786. 4.
Nov. Treatise on the Blood Inflammation and gunshot wounds. London 1794.
249) Van den Bosch Theoretische und praktische Bemerkungen über das Muskelvermögen der Haargefäße, Münster 1786. pag. 60.
4. — inprimis Capite 4to.

250) I. C. A. MAYER, Beschreibung des ganzen menschlichen Koerpers, Berlin 1786. Vierter Band.

251) L. L. van MEURS, Dissertatio: Descriptio systematica Vasorum absorbentium, Harderovici 1786. 4.

252) FRIDERICUS AUGUSTUS WALTER (JOHANNIS GOTTLÖBI Filius), Annotationes Academicae, Bero-
lini 1786. 4.

253) C. G. van HEFVELL, Tentamen nosologicum, Lugduni Batavorum 1787. 8.

254) IOANNES FRIDERICUS BLUMENBACH, Institutiones physiologicae, Goettingae 1787. 8. — Belgice vertente GISEERTO JACOBO WOLFF cum Praefatione R. FORSTEN, Harderovici 1791. 8.

255) WILLIAM BLIZARD, Physiological Observations on the absorbent System. Confer Goettingsche gelehrte Anzeigen 1787. Stueck 89. — Recusa Dissertatio LUDWIGIO in versione germanica MASCAGNII, pag. 164.

256) JAMES JOHNSTONE, Account of the Walton Water, with Thoughts on the use and Diseases of the lymphatic Glands, London 1787. 8.

DE VASIS ABSORBENTIBUS. E. G. O. C. E. 211

257) FRANCISCUS XAVERIUS METZLER, von der Wassersucht, Ulm 1787. 8.

258) G. E. LINDNER (potius P. F. MECKEL), Dissertatio de Lymphaticorum Systemate, Halae 1787. 8.

259) ANDREAS GOTTHARDUS PFLUG, Dissertatio de Glandulis Corporis humani, Duisburgii 1787. 4.

Paul 260) ASSALINI[†], Essay medical sur les Vaisseaux lymphatiques, avec le moyen de prévenir les Effets venimeux des Substances venimeuses, Turin 1787. 8. — Germanice Dresdae 1788. et in Sammlungen fuer practische Aerzte, Fünfzehnter Band.

Medecin et 1^{er} chirurgien du Roy d'Italie Chirurg. major de la Garde Impériale de France membre de la légion d'honneur et de plusieurs académies

261) LUDOVICUS FORMEY, Dissertatio de Systematis absorbentis Pathologia, Halae 1788. 8.

262) I. COVEY, Account of the good effects of the Mercury in a Disease of the lymphatic System attended with nervous Symptoms, in London Medical Journal, Tomo Octavo.

263) ERNEST PLATNER, ueber einige Milsgeburten des HARVEY'SCHEN Systems, in Appendice ad ANTONII FABRE Untersuchungen ueber Gegenstaende der theoretischen und practischen Arzneiwissenschaft, Lipsiae 1788.

Leutungen

Idem. Quaestionum physiologicarum, Lipsiae 1794. 8.

264) P. F. MECKEL (Filius), in Notis ad Versionem germanicam primarum Linearum Physiologiae ALBERTI VON HALLER, Berolini 1788. 8.

265) CAROLUS GEORGIUS THEODORUS KORTUM, Commentarius de Vitio scrofuloso, Tomi duo, Lemgoviae 1789. 8.

266) GEORG. COOPMANN'S Neurologia, editio altera, Franequerae 1789. 8. in Praef.

267) TH. DAVISON in London Medical Journal, Vol. 10. 1789.

268) PAULUS FRIDERICUS HERMANNUS GRASMEYER, de Conceptione et Foecundatione humana, Goettingae 1789.

269) AUTOR ANONYMUS einzig moegliche Zeugungstheorie, Berolini 1792. 8. eadem docet quae GRASMEYER.

270) BERNHARDUS NATHANAEL GOTTLÖB SCHREGER, Dissertatio de Irritabilitate Vasorum lymphaticorum, Lipsiae 1789. 8. — Recusa in FRANKII Dilectu Opusculorum, Tomo Decimo.

Idem. Fragmenta anatomica et physiologica Fasciculus Primus, Lipsiae 1791. 4.

Idem. Theoretische und practische Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre, Erster ^{Band} Theil, mit 2 Kupfer-
tafeln, Leipzig 1793. 8. *article VI. proprias observationes
cyclidit*

271) GOTTFRIEDUS PHILIPP MICHAELIS, Beobachtungen über die Saugadern des Mutterkuchens und des Nabelstranges, in C. GROSSE Magazin fuer die Naturgeschichte des Menschen, zweiter Band, Zittau und Leipzig 1789. — ^{Germanice} Recusum in B. N. G. SCHREGER Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre, Erster Theil, Leipzig 1793. 8.

Idem. Dissertatio: Observationes circa Placentae ac Funiculi umbilicalis Vasa absorbentia, Goettingae 1790. 4.

272) GEORGIUS HEINRICUS THILOW, Dissertatio de Vasis Bilem resorptam ex receptaculo Chyli ad Renes ferentibus, Erfordiae 1790. 4. — Germanice

in B. N. SCHREGER Beitræge zur Kultur der Saugaderlehre, Erster Theil.

Idem. Anatomisch-pathologische Abhandlung von den Nieren, welche keine Harnleiter hatten, nebst einigen Erklärungen in Rücksicht des Geschäfts der Saugadern, Erfurt 1794, cum figuris.

273. CHRISTIANUS FRIDERICUS LUDWIG, Primæ Lineæ Anatomiae pathologicae, Lipsiae 1785. 8.

Idem. Commentatio prima Physiologorum et Pathologorum de Systemate absorbente recentissima quaedam Decreta, in ejusdem Exercitationibus academicis Lipsiae 1790.

Idem. In versione germanica CROIKSHANKII et MASCAGNII, Lipsiae 1789. et 1794. Tomis tribus 4.

274. NICOLAUS D. RIEGELS, de Usu Glandularum suprarenalium, Hafniae 1790. 4.

275. FLANDRIN, in Journal de Medecine et Chirurgie, Paris 1790. Decembre — et 1792. Janvier et Septembre.

276. OTTMAR HEER de Renum morbis, Halae 1790. 4.

277. IOH. PHIL. JUL. RUDOLPH de partu sicco, Erlangae 1790. 8.

278. R. DES GENETTES, Observationes de Suctionis Facultate Systematis lymphatici post mortem Animalium, in Journal de Medicine à Montpellier 1791. Tome Premier.

Idem. Analyse du Systeme absorbent ou lymphatique, à Paris 1792. In Journal de Medicine à Paris de Mars 1792. Volume XC. — Germanice excerpta in B.

*L. F. B. Lentin in Commentationi
huc Soc. Guelphens.
ad annos 1791. & 1792.*

N. G. SCHREGER Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre, Erster Theil, Leipzig 1793. 8.

279. GREGORIUS BASILEWITSCH, Systematis resorbentis Descriptio physiologico-medica, Argentorati 1791. — Germanice titulo: Pathologie des Saugadersystems in B. N. G. SCHREGER Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre, Erster Theil.

280. IOANNES CHRISTIANUS FRIDERICUS ISENFLAMM, Dissertatio de Absorptione sana, Erlangae 1791. 8.

281. HENRICUS FRIDERICUS ISENFLAMM, Dissertatio de Absorptione morbosa, Erlangae 1791. 8.

282) GISEBERTUS IACOBUS WOLFF, Dissertatio: Quaestiones medicae varii Argumenti, Hardervici 1791. 4.

283) W. LEURS, over de Kropkliergezwellen in Prysverhandelingen bekroond door het Genotschap der Heelkunde te Amsterdam, Erste Deel, Amsterdam 1791. 8.

284) IOANNES CHRISTIANUS REIL, Memorabilia clinica, Halae 1791. 8.

*Essai sur les maladies propres
à la lymphe et aux vaisseaux
lymphatiques.*

285) ^{Alexis} PUTOL, de Morbis vasorum absorbentium, in Memoire de la Société royale de Medicine, à Paris 1791. Tome Septieme et Huitieme.

*Epistola Tractatus delle
malattie Materie
Chirurgiche fisiche
ed anatomiche avanzate
dal. Gio: Gio: Santarelli
Santarelli
Nap. 1793. Tomi per.*

286) LORENZO NANNONI, Trattati di Anatomia, Fisiologia et Zootomia, Siena 1791. 4.

287) VALENTIN, ^{Louis} in Journal de Medicine, 1791. Tome 86

288) JOHN GARDINER, on the Gout, London 1792. 8.

289) ROB. HAMILTON, Observations on scrophulous affections, London 1791. 8. germanice Lipsiae 1793. 8.

131 R.
36

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. G. 215

290) GEORGIUS FRIDERICUS HILDEBRANDT, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Vierter Band, Braunschweig 1792. 8.

Idem. In Dissertatione de Pulmonibus, Goettingae 1783. 4. §. 6.

291) C. W. HUFELAND, ueber die Inoculation, Leipzig 1792. 8.

292) IOHANNES GEORGIUS IAHN, Dissertatio inauguralis de Operationibus atque Viis Medicamentorum externorum stases Systematis lymphatici submoventium, Jenae 1792. 8.

293) IOANNES NEPOMUCENUS CONSTANTIN. D'HAME, Idea Pathologiae Systematis absorbentis, Coloniae 1792. 8.

294) CHRISTIANUS FUERCHTEGOTT SCHMALZ, Dissertatio: Examen nuperae Theoriae de Absorptione Seminis vaginali, Jenae 1792. 4.

295) ERNESTUS FRIDERICUS GUILIELMUS HEINE, Dissertatio de Vasorum absorbentium ad Rhachitidem procreandam Potentia, Goettingae 1792. 4.

296) IOANNES IOACHIM HACHSTEDT, Dissert. de Scorbuto, Goettingae 1792.

297) L. de la FONTAINE, vom Weichselzopf in Eius Chirurgisch-Medicinische Abhandlungen, Pohlen betreffend, Breslau 1792. 8.

298) IOANNES LEONARDUS FISCHER, Anweisung zur practischen Zergliederungskunde, Leipzig 1793. 8. pag. 236.

299) CAROLUS GUILIELMUS de MÜLLER, Dissertatio: Physiologia Systematis Vasorum absorbentium, Lipsiae 1793. 4.

300) MATTHEW BAILLIE, The morbid Anatomy of some of the most important Parts of the human Body, London 1793. 8. Germanice versa cum Notis et Additamentis S. TH. SOEMMERRINGII, Berolini 1794. 8.

*Quisem.
An Appendix to the first edition
of the morbid Anatomy
London 1798. 8.*

301) PETRUS WEIDMANN, de necrosi ossium, Francofurti 1793. fol.

302) JAN KRAGTINGH, in Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam, tweede Deel 1793. Amsterdam, 8. p. 96.

303) ALEXANDER KLOSE, Dissertatio de Vasis lymphaticis eorumque Usu, Duisburgi 1793.

304) FRIDERICUS AUGUSTUS TREUTLER, Dissertatio: Auctuarium ad Helminthologiam humani Corporis, Lipsiae 1793. 4.

*S. Scriptores M.
Legimus Mon. circa fur. lent.
V. Diffusum absorbent.
Annales de Chimie Tom. XC.*

305) SEGUIN, in Medicine éclairée par les Sciences physiques par FOURCROY, Paris 1793. 8.

306) FLORIANUS CALDANI, Riflessioni sopra alcuni punti di un nuovo Sistema de' vasi assorbenti, 1793. — In Actis Societatis Paduanae

307) PETRUS LUPI, Nova per Poros inorganicos Secretionum Theoria Vasorumque lymphaticorum Historia P. MASCAGNIO iterum vulgata atque Parte altera aucta, in qua Vasorum minorum vindicatio et Secretionem per Poros inorganicos Refutatio continetur, Romae 1793. Tomus Primus et Secundus, 8.

Edward Holme Esq. Sc

*fractura & rupt. Vasorum
absorbentium. L. J. D. B. 1794. 8. p. 141.
L. J. D. B. 1794. 8. p. 142.*

308) EDWARD FORD, Observations on the Disease of the Hip - Joint etc. London 1794. pag. 15. 23. 141. 145.

309) JOHN ABERNETTY, Surgical and Physiological Observations, London 1793. 8. p. 179.

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. C. E. 217

310) CORNELIUS CASPARUS DE KONING, Diss. inaug. de Affectionibus morborum Systematis lymphatici, Leidæ 1793. 4.

311) PETRUS VAN MAANEN, Diss. inaug. de absorptione solidorum, Leidæ 1794. 4.

312) IOSEPHUS GAUTIERI, de Struma, Vindobonæ 1794. 8. p. 71.

313) IOANNES ADAMUS SCHMIDT, Commentarius de Nervis lumbalibus, Vindobonæ 1794. 8. 43.

314) D. Nicol. Oudemans de Venarum meseraicarum fabrica et usu. 1794. 8. p. 100.

B. Humpage. Physiological Researches demonstrating.

1. that the present opinion concerning the Use of Lymphatic System is erroneous, and that it does not terminate in the thoracic duct. 2. The Discovery of the great Importance and Use of the Lymph, of the Lymphatic glands and of the Lymphatic System 3. That Persons etc. may be either relieved or prevented from entering into the circulation by absorption. 4. The Discovery of the Use of the Brain and its Connection with the Lymphatic System. London. 1794.

tam.

H. Histoire des
Paris 1808.medical and
merican Medicalthe groin are
extending to the
p. 129.

John Ferriar Medical Historian and O 5 Dissections. Volume third. Lond. 1798.
of an Affection of the lymphatic Vessels hitherto misunderstood.

Charles Bell System of Dissections Partes quinque Edinburg. 1800. folio
Vasa absorbentia femoris pingui et pag 109 de eorum ^{dem} morborum descriptione.

*Guftem.
An Appen
of the m
London 179*

ORES
SCRIPTA

DE VASIS ABSORBENTIBUS EORUMQUE
GLANDULIS, ORDINE ALPHABETHICO
EXPOSITA.

*numerus indicat locum quo in catalogo
praedenti supra in idem invenitur.*

*8. Scripta
Lagum i
v. Diffen
Annalen.*

Andreas (Tobias)

*Edmund
fract
absorb
1743
Lag
Lag*

Baronio 36

Behr. Henr.

Abernethy.	Nro. 309.	Bercher	Nro. 156. 158
Agricola	- 37.	Berendt	- 219 217.
Akenside	- 182 180.	Berger	- 115 114. <i>Beard.</i>
Albinus B.	- 79.	Bertin	- 172 170.
Albinus B. S.	- 180 178.	Bianchi	- 108.
Alethophili	- 32.	Bidloo	- 75.
Amman	157 - 135.	Bils, de	- 43.
Anonymus	210. 208. 234 209.	Bium	- 154 133.
Arcelin	- 165 163.	Blasius	- 54.
Asellius	- 7.	Bleuland	- 242 238.
Assalini	- 260 254.	Blizard	- 249. 25. 12.
Aurivillius	- 190 188.	Blumenbach	- 248. 54.
		Boe, de le	- 42.
Back (de)	- 47.	Boerhaave, Abrah. K.	147. 149.
Baillie	- 300 291.	Boerhaave, Herm.	125 124.
Bang	- 265 263.	Bohl	- 155. 153.
Bartholinus, Thom.	23.	Bohn	- 68.
Bartholinus, Casp.	- 63.	Bonn	- 230 227.
Basilewitsch,	279 268.	Bordeu	- 159. 157.

DE V
Borrichi
Bosch
Bosch,
Boylan
Brendel
Brill
Brugman
Brunner
Buchner
Butt
Caldani
Camer
Camper
Cant
Carr
Cassebo
Cattier
Charlet
Chesbo
Chirac
Clare
Collins
Colom
Cooper
Cooper
Coppel
Cosch
Costa
Cotru
Cov
Cove
Cov

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. A. E. 219

Borrichius	Nro. 49.	Crell	Nro. 155. 157
Bosch, vanden Petr	70.	Cresse	- 96. 95.
Bosch, van den	- 249.	Cruikshank	- 26. 214.
Boydan	- 30.	Cyrillo	- 25. 230.
Brendel	- 156. 154.		
Brill	- 196. 194.	Daunstenc	- 164. 162.
Brugmanns	- 245.	Darwin	- 217. 214.
Brunner	- 74.	Davison	- 267.
Buechner	- 179. 177.	Deisch	- 148. 143.
Butt	- 183. 183.	Desbans	- 188. 186.
		Densing	- 46.
Caldani	- 306. 308.	Diedrich	- 183. 181.
Camerarius	- 148. 146.	Diemerbroeck, van	59.
Camper	- 186. 184.	Doebel	- 92. 91.
Cant	- 125. 123.	Doerner	- 145. 143.
Carr	- 86.	Dorsten	- 67.
Cassebohm	- 138. 136.	Doulcet	- 165. 163.
Cattier	- 26.	Drake	- 105. 102.
Charleton	- 44.	Drelincourt	- 77.
Cheselden	- 182. 150.	Duverney	128. 130. 131.
Chirac	- 93. 92.	Eschenbach	- 211. 209.
Clare	- 214.	Eschenbach, Chr. Ehr.	173. 175.
Collins	- 78.	Eustachius	- 6.
Colombier	- 227. 224.		
Coopmans	- 266.		
Coppelio, van de	162. 160.	Fallopia	- 4.
Coschwiz	- 128. 127.	Fantoni	- 112. 111.
Costaeus	- 5.	Fasellus	- 184. 182.
Cotunni	- 187. 185.	Fels	- 200. 201.
Courvec, de la	- 34.	Feller	- 246. 241.
Covey	- 262. 256.	Fischer, J. A.	- 155. 134.
Cowper	- 75.	Fischer, J. L.	- 298.

Dessgenettes 278.

Dennis.

Dionis

Ensigne de l'.

Histoire des
Paris 1808.Medical and
American Medicalthe grain are
expanding to the
p. 129.

Flandrin	Nro. ²⁷⁵ 266.	Harvey	Nro. 19.
Floerke	- 115. 114 .	Hebenstreit	- 163. 161 .
Folius	- 12.	Heer	- 276.
Fontaine	- 297.	Heine	- 295. 282 .
Ford	- 308.	Heister	¹¹⁹ 119. 118 132.
Formey	- 261. 255 .	Helvetius	¹⁶⁶ 166. 122 121.
Fontana	- 237. 232 .	Hemsterhuis	- 41.
		Henaut, de	- 35.
Galenus	- 1.	Hendy	- ² 139. 336 .
Gardiner	- 288.	Henninger	- 114. 113 .
Garengot	- 153. 151 .	Heuermann	- 177. 175 .
Gassendi	- 15.	Heuvell	- 255. 177 .
Gautieri	- 312.	Hewson	- 197. 195 .
Gebhard	- 212. 210 .	Highmor	- 18.
Genettes, des	- ²⁷⁶ 276. 277 .	Hildebrandt	- 290. 277 .
Gigot	- 110. 109 .	Hofmann, M.	- 16.
Girardi	- 205.	Hoffmann, Frid.	- 117. 116 .
Glisson	- 27.	Horne, van	- 24.
Gmelin	- 129. 128 .	Horst	- 36.
Grasmeyer	- 268. 263 .	Hovius	- 150. 129 .
Grubel	- 61.	Huber	- 111. 110 .
Guiffart	- 25.	Hufeland	- 291. 278 .
Guenz	- 170. 168 .	Hugo, de	- 168. 166 .
		Hunter, John	- 248.
Haase	²⁴⁷ 247. 242 .	Hunter, William	- 189. 187 .
Hachstedt	- 296.		
Hale	- 121. 120 .		
Haller	- 154. 152 .	Iacobaeus	- 95. 94 .
Halsey	- 87.	Iahn	- 292. 279 .
Hamberger	- 174.	Iohnstone	- 156. 150 .
D'Hame	- 295. 280 .	Iolyffe	- 20.
Hamilton	- 289.	Isenflamm, I. Ch. F.	- 269 280.

*Gustem.
An Appen
of the m
London 179*

Fournier. 19.

galestin. 170

*S. Script
Legum i
v. Diffessu
Annalen*

*Grutt. R. 56.
Jregorini*

*Edward 1
florist
alforb
1793
Key
San*

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. ~~G. A. E.~~ 221

Isenflamm, H. F.	Nro. 270.	Maanen	Nro. 311.
Israel	28.	Malpighi	85.
		Maret	21.
Keil	104 103.	Marherr	201 199.
Kemme	213 211.	Mascagni	230 233.
Kerckring	58.	Massa	3.
Klose	303 285.	Mayer	280 277.
Koelpin	191 189.	Meckel, J. F.	181 179.
Koning	310.	Meckel, P. F.	254 258.
Kortum	265 259.	Meibom	73.
Kragtingh	302.	Mertrud	174 172.
Krause	214 212.	Mery	105 104.
		Metzler	257 251.
		Meurs, van	251. 245.
<i>Langens</i> Lamure	104 162.	Michaelis	222 262. 271.
<i>Langens</i> Lancisi	99 98.	Mieg	202 200.
<i>Langens</i> Lassus	503 201.	<i>Nolenatti</i>	
<i>Lee</i> Leber	209 207.	Moinichen, a	29.
<i>Lentin</i> 279. <i>Leveille</i> 75. Leonhardi	200 198.	Monro, Filius	178 176.
<i>Levery</i> 96 Leonhardi		Monro, Pater	143 141.
Leonicenus	2.	Montagnat	173 171.
<i>Lepratti</i> Leurs	283 272.	Morgagni	120 119.
Lieberkuehn	166 164.	Mortimer	126 124.
Lieutaud	192 190.	Muillér, de	209 283.
Lindner	258 252.	Munier	31.
Linné Carl	194 192.	Muralt	62.
Lipstoerp	79.	Musgrave	72.
Lobstein	204 202.	Muys	88.
Lossius	76.	Mylus	97. 96.
Lower	57.		
Ludwig, Chr. Fr.	273 264.	Nanni	140 138.
Ludwig, Chr. Gottl	150 148.	Nannoni	275. 286.
Lupi	307 289.		

Manget. 7. 17. 22.

clam
8,

in Histoire des
r. Paris 1808.

Medical and
American Medical

the groin are
 Appendix to the
 4. p. 129.

Narcissus	Nro. ¹⁶¹ 159	Reil	Nro. 273 284
Nichols	-146 144	Reuss	-273 239
Noble, le	- 33	Reverhorst, van	- 288 39
Noguez	-152 131	Rezia	-257 234
Noues, de	- 102	Rhodius	- 48
Nuck	- 80	Ridley	- 94 92
Nuernberger	-218 216	Riegels	-274 265
		Riese	-223 221
		Rolsink	- 8
Pacchioni	-101 100	Rollo	-244 240
Pascolus	-109 108	Rosen	-139 137
Pauli	- 53	Rudbeck	- 22
Pechlin	- 60	Rudolphi	- 277
Pecquet	- 17	Ruysch	- 52
Peirescius, de	- 10		
Petsche	-147 145	Sabatier	-220 218
Peyer	- 64	Salzmann	-107 106
Pflug	-259 253	Sandifort	-251 228
Pietsch	- 211	Santorini	-207 205
Plank	-226 223	Scarpa	-252 249
Platner	-263 257	Schaper	-92 91
Ponchon	-158 156	Schellhammer	- 65
Portal	-109 107	Scherb	-18 136
Prochaska	-225	Schmalz	-294 281
Pujol	- 274	Schmidt	- 313
		Schmiedel	-169 167
Quarin	-167 165	Schmiedt	- 73
Queitsch	-151 149	Schneider	- 45
Quellmalz	-144 142	Schrader	- 81
		Schreger	-270 261
Regner de Graaf	-56	Schummlansky	-229 226

Schuster.

Schuster.

Quidem.
An Appen.
of the m
London 179

Olyd.

Cudemman. 314

S. Brief
Jagun
v. Hoffmann
Annalen

Erhard
Hof
1793
Jag
Sau

Seger

Seguin

Selbst

Selbst

Soemmer

Sograph

Spiegel

Stehelin

Stenonis

Swalve

Swamme

Swarit

Szomb

Tardy

Taria

Tassin

Thile

Thilow

Tilera

Trent

Taipin

Typh

Valentin

Vater

Vesle

Verhe

Veslin

DE VASIS ABSORBENTIBUS E. G. O. A. E. 223

Nro. 33.	Seger .	Nro. 40.	Vieussens	Nro. 99. 100
horst, van .	Seibert. Seguin .	- 38. 287.	Vogel .	188. 186. 178.
- 37. 287.	Scheidt. Scheldon .	- 23. 235.		
- 48.	Soemmerring	- 25. 213.	Wagner .	- 98. 97.
- 41. 213.	Sographi	- 19. 199.	Walacius .	- 13.
- 27. 213.	Spiegelius .	- 9.	Wallerius .	- 139. 137.
- 23. 213.	Stehelin .	- 127. 126.	Walter .	- 208. 206.
- 8.	Stenonis .	- 50.	Walter, F. A. filius .	- 246. 252.
- 24. 213.	Swalwe .	- 51.	Walther, A. F. .	- 141. 139.
- 31. 213.	Swammerdamm	- 55.	Watson .	- 198. 196.
- 22.	Swardt, van	- 90. 89.	Wedel .	- 113. 112.
- 217.	Szombathi	- 228. 225.	Weidmann	- 301.
- 52.			Werner .	- 245. 241.
	Tardy .	- 39.	Westhoven, von	118. 117.
- 23. 213.	Tarin .	- 171. 169.	Wharton .	- 38.
- 17. 213.	Tassin .	- 66.	White, Ch. .	- 240. 237.
- 23. 213.	Thile .	- 82.	White, Th. .	- 241.
- 17. 213.	Thilow .	- 272. 263.	Wiel, Stalpart van der	71.
- 17. 213.	Tilemann .	- 69.	Wilson .	- 221. 219.
- 17. 213.	Treutler .	- 304. 287.	Winslow .	- 142. 140.
- 17. 213.	Tulpius .	- 11.	Winterbottom	- 224. 222.
- 17. 213.			Wium .	- 116. 115.
- 17. 213.	Valentini .	- 237. 276.	Wolff .	- 282. 271.
- 17. 213.	Vater .	- 124. 123.	Wrisberg .	- 222. 220.
- 17. 213.	Velse .	- 166. 158.		
- 17. 213.	Verheyen .	- 91. 90.	Zeller .	- 83.
- 17. 213.	Vesling .	- 14.	Zypaeus .	- 84.

Senckenb.
med. Institut.

in Histoire des
r. Paris 1808.

W. J. Gerit Jan van
27. American Medical

the prin are
Appendix to the
4. p. 129.

Quorum.
An appen
of the m
London 179

P. Strip
Lagium
y. Differe
Annalen.

Edward
first
1696
1793
Key
Lau

(Rosa)
(Coram vides in puella octo anaxenon fluorem album ^{capitulum singulorum}
^{infignitibus octum analogis propter medos}
ab herpetibus femur ^{infignitibus octum analogis propter medos}
gonorrhoeam a balneo tepido orientem ^{infignitibus octum analogis propter medos}
materiam vel per anion absorpto tumet ^{infignitibus octum analogis propter medos}
atque, ut mutum Uteri et vaginae auferre nequeant qui per
gusto ^{infignitibus octum analogis propter medos} ea de causa ^{infignitibus octum analogis propter medos}

Angina polyposa
(five Cynanche trachealis. Croup Anglonum.)

Oritur in trachea e mucos durecente, per vim vasorum absorbentium auctam.
E Darwin Economia Vol. 2. p. 38.

^{catarrho chronico} ^{similium}
in Angina polyposa ^{similium} glandulae absorbentes tracheales tumidae, rursus,

The lymphatic glands of the Neck are sometimes swollen
in consequence of Croup, and also in the Cynanche
Maligna. J. G. V. Broussais Histoire des
Phlegmasies. Paris 1808.
pag. 76.

A Moore. Outlines of the Anatomy of the H.B.
Edinb. 1815. Vol. 2. p. 431.

Tracheitidem sive torpore vasorum absorbentium. J. Stearns American Medical and
Philosophical Register Vol. 2. 1817. pag. 60. ibid. Inferior Vol. III^{to} p. 258. Item in American Medical
Museum. Vol. 5. p. 195.

Ulcus Uteri et Vaginae

When the ulcer has spread far into the vagina, the glands of the groin are
often affected by the absorption of the pus.
M. Baillie Appendix to the
Morbid Anatomy. p. 129.

Fungus Vespicae albidus.

mitt like Tumour
of the mucous membranes
Monro. Morbid anatomy

p. 162.

⁴ glandulam s. ¹ ² ³ ⁶
Vasa absorbentia in tali casu vicinam vespicae simili materia
turgentem plenam vidit Monro. (negus)

Spuma fungosa testiculi Calliscai
et Scarpa

Fungus medullaris J.P. Maunoir ^{allotop per}
in hoc morbo terribili ^{glandulae} ^{testiculis} valde pure intermesant

*) Mémoire sur les Fongus médullaire
et Hématode. Paris 1820 pag 27

Varices
a varicibus vasa absorbentia comprimuntur
hinc oedemata (empâtement) quae varices concomitant
soleant. Boyer Traité des maladies chirurgicales,
Paris 1814. 2^e tome second p. 246.

Hydrocele: Tunicae vaginalis testiculis oris a vi vasorum
absorbentium imminuta. Benj Bell. on the Hydrocele. Edinb. 1794. sect 3.
et in system of Surgery. Cap. 6.

Hydrocele funiculi spermatici oris obstructione vasorum
absorbentium, a febre hepatis. J. ibid pag. 180.
vel alius ripenit abdominalis
preponum.

Apoplexia

apoplexiæ causam in tumidis glandulis absorbentibus coll: ~~invenit~~
Attenhofer 1857

258. Aneurysma

In aneurysmo especially when the are in the Aorta,
and principally at the curve; and when arrived at a
considerable size, so as to press against the surrounding parts,
particularly against the back-bone, or also against the
sternum; all of which will be according to the situation
of the aneurysm; we find in such cases, that from
the dilatation of the artery (which arises from the force
of the heart) it is pressed against those bones, and that
the substance of the artery in that part pressed
is taken into the constitution. This absorption begins at the
external surface of the artery, where it comes into in
contact with the bone, and continues there till the
whole artery is absorbed; then the bone itself comes in
contact with the circulating blood, and not being naturally
intended to be washed by moving blood, the bone or bones are
also absorbed from their pressure, and motion of the blood
against it etc. them. The adhefive or strengthening disposition
takes place in the surrounding parts, and in the interstices under the circumference of the unabsorbed
parts of the artery to the surrounding parts; as also the cellular membrane beyond the course
of absorption (when in soft parts) similar to the preceding adhesive inflammation going

before alteration in an artery, but it is here much stronger,
~~for~~ for strength is wanted as well as adhesion
while it is healing; so that a cavity of some strength
for the moving blood is ~~at~~ always kept entire, and no
extravasation can take place, nor can the parts readily
give way.

John Hunter on the Blood Lond 1794.
pag. 454.

Ergo admodum de eadem re agit Ant. Scarpa in ^{vine} *Opera de* ^(P. 992. 1806)
Soll. a nexissima Parvae. 1804. ^{in fine} Cap. quinti et octavo.
Joseph Hodgson on Diseases of Arteries and Veins. Lond 1815
et Allan Burns Obs on the Surgical Anatomy



l. Parvina

l. Parvina
l. Parvina

l. Parvina
l. Parvina
l. Parvina

l. Parvina
l. Parvina
l. Parvina

l. Parvina



den an
e fleten
aefophr

f hae
den a
of the

J. Palloni
de gyl
Fubel
vafpen
fervif.

Trat
Hermist

Ophthalmia.

when an ophthalmia begins to become pelen, say acid eye water, or
a solution of six grains of white Vitriol in an ounce of water hastens the
absorption, and clears the eye in a very short time.

E. Darwin Zoonomia Lond. 1794.
pag. 410

Yellow Fever.

"I have met with babes both in the groin & armpits."

There was generally a torpor of the lymphatic system, which prevented the action
of the mercury.

J. Davidson in the Medical
Repository N. 2. Vol. 1. p. 166.

J. Palloni memor. Soc. de Littere 1804 of Erkrankung der Gese. schiffes mit Chingon
der gilt der dort herrschenden gelben unvergleichlichen
Fieber einzigsten, bekann grössten Verbreitung bedauerlichen, die
Verbreitung überlegen. U. f. medicinisch beobachtungen über die de de Livorno
seiner ersten Erkrankung mit dem gelb. von dem in franz. Genf 1805.

Zona.

Traitemen et puncti rem in curia et horae spatium zona in sequelam
affermati Attenhofer 5196

Joseph
Josephine (Christine) de
co. 1714
Josephine (Christine) de
1714

R. 7.
Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de
Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de
duet, mit
Tang. 1714

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

Josephine (Christine) de

~~Doffenbach~~ Analyse du système lymphatique ou des absorbans. Paris. 1792 12
 Gerasimo Constantini Gregorini. De Hydropse Uteri et de Hydatidibus in Utero visis vel ab eo exclusis. Halae. 1795. 4.

Conradus Gerardus ontys Praefate Brugmanns de causa absorptionis per
 vasa lymphatica. Lugd. Bat. 1795 8.

Ph. F.

Hopfinger in Hufeland. Journal der prakt. Heilkunde 1795. N. 4.

Josephus Chrysostomus Bernardinus Bernard. Quaestiones medicæ argumenti. L.B. 1796.

Erasmus Darwin Zoonomia. or the laws of animal Life London 1796. Vol. duo forma quarta

Josephus Anton Seubert. Dis. de opeosarici. Nagoniæ 1797.

Afley Cooper Three Influences of Obstruction of the Thoracic
 duct, with some Experiments shewing the Effects of
 tying that Vessel. & fig
 in Medical Records, of a Society private medical
 Association. Lond 1798. art VII.

Jani Bleuland. Vasculum in intestinum tenue fuit, subtilior
 anatomicæ opera detegendorum descriptivis iconibus illustrato
 Trject ad Rheu. 1797 4to.

Comanus Adolph. Hedwig Dissquisitio Anquillanum Lieberkuhani
 physico microscopica. Lipsiæ 1797. 4t. c. fig.

Ph. Piel. Hystographie philosophique Paris. An. VII. Tome 2. Classe quatrie

1. N. A. Salma. Précis d'observations pratiques sur les maladies de la Lymphe.
 ou affections scorbutiques et rachitiques etc. Paris. 1803. 99 a 1803.

2. Gulielmi Heberdeni Commentarii de natura Hæmorrhoidum et curatioe Londini 1802. Cap. 60.

Townsend Elements of the Therapeutics.

Oedema puerperarum.
l' Oedème des femmes nouvelles accouchées

Les phénomènes essentiels de cette maladie étant
l'engorgement inflammatoire des glandes
lymphatiques iliaques, ou des inguinales, ou de
celles ^{du} jarret, et des principaux vaisseaux
lymphatiques de tout le membre, et conséquemment
l'infilt. l'infiltration du tissu cellulaire —

Boyer Traité des Maladies chirurgicales
Tome second, Paris 1814 pag 335.

John Howship Practical Obs on Surgery and Morbid Anatomy.
London 1816. 8. p. 159.

J. L. C. Schroeder van der Kolk Obs. anatomico pathologicae
novae
Tafel 1 Amstelodami 1826. egregia officina
vase ad sorbentia continet

Calculus felleus.

143

Calculus bilis ori a veloci absorptione partium tenuiorum bilis, residuum ^{bilis} ~~residuum~~ ^{viscosum} ~~viscosum~~ ^{reliquum} ~~reliquum~~ relictis, et crystallis abstratis.

E. Dron. For. 2. p. 40.

Humorum secretorum mutatio.

Quoties hominum secretorum ~~mutatio~~ mutatio a vasis absorbentibus pendit ingratum circa humores in lingua apparenter demonstrant

J. F. Hernandez Mem. quels sont les signes diagnostiques - que peut fournir l'état de la langue. Paris 1809

Resum et
Calculus Vesicae urinae.

resorptione partium tenuiorum urinae per vasis absorbentia ori.

E. Darwin For. Vol. 1.
p. 41. 42.

Haemorrhoides

M. Truxa de Kozowitz Historia haemorrhoidum. Vindobon 1794 Tom. I. p. 157

Glandulae ^{rum} ~~rum~~ ^{lium} ~~lium~~ ^{catum} ~~catum~~ ab ~~haemorrhoidibus~~ haemorrhoidibus exempla affert.

the operation
which by
it appears
supposed by
activity
the result

in preparation

the
at Mark, 1800
the first

motion pro
Eton a
exposed

Hydrograph
Fothergill
London, 18

the generation of these worms is promoted by the too dilute state of the bile which depends on the deficiency of the absorption of its thinner parts it appears that the tumid belly and bloated countenance, and swelled upper lip, are a concomitant circumstance attending the general inactivity of the absorbent system; which is therefore to be esteemed the remote cause of the generation of worms.

C. Darwin. Zoonomia 2. p. 55.

Suppuratio Henri.

In suppuratione virus dextræ glandulae inguinalis et axillares sumunt et dolent.
Catter in Medical Facts and Obs. Vol. 3. p. 3.

nova periculi Veneni ulcera phagedenica producentia
ab Ulceris ^{id est} novo quodam ^{suppuratio} materia absorpta vasa et glandular intumescentia
et per miasmata orientibus, materia absorpta vasa et glandular intumescentia
Kello. on Diabetes Vol. 2 p. 201.

modum quo

Vulnera osium.

Etiam ad vulnera osium sananda et cellum pro dextræ formationem
exponit Cuvillie .1. 75. cit. pag. 77. et 76.

Hydrocephalus

Hydrocephalum ruptura vasis absorbentis omni pape, opinebatur. Celeb.
Fathergill quem refutat. James Carmichael Smyth on Hydrocephalus
London. 1814. pag 60

we have much less control over the absorbents than we have over the blood vessels, and this happens because the former are placed more in the extreme parts of the system, and commence their action there. They are difficult to excite into action, and it is frequently difficult to stop them when acting. This observation applies to the absorbents all over the body but particularly to those of the testicles, for those glands being the essential parts of the genitals, they are, as it were, placed more out of the constitution than any other organs, and therefore are in truth the most extreme parts of the whole system; and this, in my opinion, does in some degree account for the occasional absorption of the testicle, in toto.

Rob. Bingham on Structure of the Urethra.
etc. etc. Lond 1826 8^{vo} pag 334.



Stade
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.

Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.

Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.

Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.
Hofm. Hofm.

Hofm. Hofm.

^{letale}
Asthma abortum ad glandulam ^{Asthma} trachealem tumore coningham (p. 124)

147 L.

Vesicatorium iufer, quem adeo insignem vidit in Asthma

(Mich. Ryan Observations on the Asthma. Londm. 1793. pag 93.

facile e doctrina vaporum absorbentium explicandus.

^{et tracheales}
glandulae mediastinae profundae asthma producant, pulmones premendo

M. Baillie morbid Anatomy p. 72.

Rob. Bree on disordered respiration Birmingham 1797. p. 46.

Paralyticam atoniam vaporum absorbentium ad capillas concurrenter fluidi accumulati in vesiculis
^{pulmonalibus}
Asthmaticum refert. Rob. Bree (B. C. Disp. Med. p. 273.)

Amblyopia.

^{praecavanda} ^{damna} ^{quae}
ad sanandam amblyopiam orientur commendat El. Gentilh. Blain
^{sanita} ^{Vini} ^{mixtum}
Terebinthinae, quae minimam vasa absorbentia eo gradu exstantem
^a
quae vasa exhalantia excitantur, adeo ut circulus actionum fervet
ac vitam alendam necessarius.

Essay on Burns. Lond
1797. p. 129.

Amputatio.

Adipis consumptionem, paucis diebus post amputationem membri, in tela
~~conspicua~~ cellulosa ac vulnere locum conspicuam, potissimum a
vi actus vaponum lymphaticorum, ad cutem maxime lateantem,
ac per insolitum ad vulnus illatum stimulum potenter excitatorum
unice pendere haud levis videtur conjectura.

P. Godof. van Hoorn Diss. de iis quae post amputationem vulnere
notanda sunt L. B. 1803. 4to.

et docet quae in vapo lymphatico contingunt.

Charles Bell.

at. 1. 1799 ^{at.} Porten

Parislar 1

Abt. H. H. H. H.

qu
Vat

Gift de l'Inse
mide d'Inse

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

Baron

J. P. Mayge

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

17. 17. 17. 17.

J. L. Alibert. Nosophie naturelle ou Les Maladies du Corps humain
Distribuées par Familles. Paris 1817. 4^{to} maj.
En Septième Famille. Les Leucoses.

van Wij f. 27.

F. Magendie. Précis élémentaire de Physiologie Tome 2.
Paris. 1817. De l'Absorption et du cours de la Lymphe.
Varia monet contra Hunteri doctrinam, propriis experimentis
facta.

C. E. de Vrij. Ueber die gleichförmige Hältigkeit der Vasa
in den Transact of the Physico-medical Society of New-York 1817. Vol. 1.

472
1822.

Alles Bureau

Beobachtungen von G. E. Dohlhoff. in Verhandl. d. J. & Neural. Halle 1822.

Alard Du Siège et de la Nature des maladies, ou nouvelles considérations
sur la véritable action du système absorbent dans
les phénomènes de l'économie animale. Paris 1821. 2. Vol.
vasa capillaria nomine vasorum absorbentium. 472 n. 98
comprehendit. 1822.

Fodera. Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation
Mém. couronné l'avez une planche coloriée Paris 1827. 8^o.

Jean Mazouze

Chapman's

1822 Vol. 6

Lawrence, Coates, & Hubbard

Philadelphia. Journal. 1822 in Revue médicale

^{Julius} Mazouze's Magazin für arzt. Literatur
Juli 1823, Nr. 151

Ferdinandus Nocker Sieburgensis de morbis ductus thoracici.

Bonna. 1801.

ladies du Corps
4th May
Co.

logie Tome 2.
de la dysphagie
mies experiments

York 1817. Vol. 1.

Chem. Halle 1811.

elles confinent
forbent de
Paris 1831. 2. Vol.
1812.

tion et l'exhalation

