


Inkunabelraum





6

M.S.
Löffel

1
inter
peric
ad
vita
G. A. M. Nam. Lij. ad. de. non. luvior. inguinito

go S. 130. 1346/2 = Soe 20

Beihängen aus dem Jahrbuch 1812 für die N. K.

W
contai
specie
and
entary

1
D. G. H. *Man Dip. de nova leonice inguinale*
curandi methodo chirurgica praefata est.
C. F. Graefe: *tab. an.* *Berlin 1810* 12 gr.

a treatise on *kyphoses*
omical description of each
ent of its symptoms, Progress
third edition revised, corrected and
16. grs

99a
1/1818.



80 S. 130. 1346/2 = Soe 20
 Vögelungen und ihre Züchtung 1812 für den N. H.

Will Lawrence a Treatise on Legitimes
 containing an anatomical description of each
 species with an account of its symptoms, Prognosis
 and Treatment. the third edition revised, corrected and
 enlarged London 1816. 8vo

892
 17818.



Sam

lle

R a

Eine in

8 e

Samuel Thomas ⁺Sommerring

über die

Ursache, Erkenntniß und Behandlung

der

Nabel = Brüche.

Eine im Jahre 1807 zu Amsterdam gekrönte Preisschrift.



Mit einer Kupfertafel.

Frankfurt am Main,
bey Johann Friedrich Wenner.

1811.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Small handwritten mark or number.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Small handwritten mark or number.

Large handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Small handwritten mark or number.

Handwritten text on the right edge of the page, partially visible.

Herniae umbilicalis tanta est atrocitas , regiis con-
firmata funeribus , ut felicioribus eventibus spem chi-
rurgorum confirmasse non inutile studium videatur.

Haller in Tab. Diss. chirurg. Tomo 3. pag. 653.



Die von den Administratoren des Monnikhoffischen
Legats für das Jahr 1807 über die Nabelbrüche ausge-
setzte Preisaufgabe:

„Tandis que l'Expérience anatomique et chi-
rurgicale apprend à connoître une variété re-
marquable des Hernies ombilicales, et de
celles qui en portent souvent le nom; des-
quelles les *vraies*, qui sortent par l'anneau de
l'Ombilic, se rencontrent très-souvent parmi
les jeunes enfans, et plus rarement parmi les
adultes; et que celles de ces derniers sujets,
faisant issue par d'autres ouvertures à l'en-
tour du dit anneau, méritent plutôt le nom
de *fausses*, et d'être comptées parmi les Her-
nies ventrales; et que cette même distinction
devient intéressante pour le traitement de ces
maladies; l'on demande:

1. „Quelle est la structure de l'Ombilic et des
parties les plus voisines, avant et au moment
de la naissance d'un enfant; quel changement
naturel subit-il dans l'enfance et à un âge
avancé; quelles indispositions contraires à la

„nature peuvent y avoir lieu dès la naissance,
 „ou arriver ensuite, et donner occasion à des
 „descentes des viscères abdominaux, et à leur
 „enclavement; et qu'est-ce, que les observa-
 „tions anatomiques et chirurgicales ont appris
 „et confirmé à ce sujet?“

2. „Quelle lumière repandent ces observa-
 „tions sur l'indication curative, à traiter, pré-
 „venir ou guérir ces maladies, dans les jeunes
 „enfants et dans les adultes; quels sont les sé-
 „cours de l'art et opérations les plus simples ou
 „moins composées, qui y conviennent, décrites
 „par les Chirurgiens les plus experts, et con-
 „firmées par leurs observations; ou bien fondées
 „sur une propre expérience et des preuves rai-
 „sonnées; et quels de ces traitemens méritent
 „d'être recommandés en général, contre les
 „Hernies ombilicales vraies et fausses, ou plus
 „particulièrement pour l'une ou l'autre de ces
 „espèces?“

zerfällt ganz natürlich in sechs Abschnitte, welche ich der
 Reihe nach, so weit meine Erfahrung, neuerdings ange-
 stellte Untersuchungen, und Zuratheziehung bewährter
 Schriftsteller reichen, mit Bestimmtheit zu beantworten
 mich bemühen werde.

Quelle
 part
 men
 We la
 und
 und
 de s
 Der
 vor der
 fanges
 größer,
 sey über
 zu seyn
 B. S. A
 ter An
 Obs.
 ring
 ses it
 die schen
 p. 247,

Erster Abschnitt.

Quelle est la structure de l'Ombilic et des parties les plus voisines avant et au moment de la naissance d'un enfant?

Welches ist die Struktur des Nabels und der zunächst liegenden Theile vor und zur Zeit der Geburt eines Kindes?

§. 1.

Der Nabel des Menschen zeichnet sich im Allgemeinen vor der Geburt, durch die ansehnliche Größe seines Umfanges aus. Je jünger der Embryo, desto dicker oder größer, freylich aber auch um so gerader und kürzer, pflegt, bey übrigens natürlicher Beschaffenheit, seine Nabelschnur zu seyn. So zeigen sie auch die besten Abbildungen bey B. S. Albinus Annotat. acad. Lib. I. Will. Hunter Anatome uteri gravid. Tab. ult. Ed. Sandifort Obs. anat. patholog. Tab. VI. S. Th. Soemmering Icones Embryonum humanorum Tab. I. Dieses ist auch um so begreiflicher, da nach der Bemerkung, die schon W. Harvey (Exercitt. de gen. animal. p. 247.) machte, die Nabel-Vene derjenige Theil ist, wei-

... la naissance, occasion à des aux, et à leur e les observa ales ont pris

... ces observa à traiter, pré- dans les jeunes els sont les sé- lus simples ou ment, décrites erts, et con- u bien fondées preuves rai- mens méritent al, contre les sses, ou plus l'autre de ces

... welche ich der euerdings ange- ung bewährter zu beantworten

chen man fast am frühesten wahrnimmt. „*Venae umbilicales multo ante conspicuae sunt, quam quippiam corporis inchoamentum*“. Ueberhaupt aber liegt die Nabelschnur im zarten Embryo in der Linie, welche man von einem Hüftbein-Kamme zum andern in Gedanken zieht.

Je mehr sich der Embryo (mit dem neunten Monate seiner Reife nähert, desto kleiner pflegt verhältnißmäßig die Nabelschnur gegen den Körper, insbesondere gegen die Bauchdecken, aus welchen sie hervorgeht, zu erscheinen; ungeachtet sie freylich zu der Zeit, absolut genommen, am dicksten oder größten erscheint. Oder mit andern Worten: Die Nabelschnur und der Nabel nimmt mit dem Alter und Wachsthum der Frucht nicht in gleichem Verhältnisse an Größe zu, sondern die erstere scheint gleichsam durch ein allmähliges Zurückbleiben in der Zunahme sich schon zu ihrem künftigen Schicksale, des Absterbens nämlich, vorzubereiten. Denn sollte die Nabelschnur mit dem übrigen Körper, sich gleichmäßig vergrößern oder fortwachsen, so würde sie am Ende, zur Zeit der Geburt, (*au moment de la naissance*) wenigstens die Dicke des Schenkels übertreffen müssen.

§. 2.

Ferner erscheint der Nabel vor, und selbst noch zur Zeit der Geburt, in Rücksicht seiner Form im Allgemeinen, als eine Fortsetzung des Unterleibes oder des Bauches, so daß man gewissermaßen sagen könnte: Das Kind hat vor und zur Zeit der Geburt noch keinen Nabel: oder sein Nabel besteht in einem kurzen Cylinder; insofern man nämlich, unter dem Worte Nabel im streng-

ren Sinne die Vertiefung, das Grübchen, oder die Narbe versteht, welche sich erst nach abgegangener Nabelschnur bildet.

S. 3.

Betrachtet man genauer die Nabelgegend des Kindes vor und zur Zeit der Geburt in Rücksicht der Substanz der Masse, so bemerkt man einen sehr deutlich auffallenden Unterschied zwischen dem Ende der Bauchdecken, und dem Anfange der Nabelschnur, oder eine Grenzlinie, welche ziemlich scharf und genau die Grenze bestimmt und bezeichnet, wo die Natur gleich nach der Geburt, die Nabelschnur von dem Unterleibe zu trennen beginnt. Gemeiniglich bilden die Bauchdecken selbst eine Linie lang die Nabelschnur, welche daher auch wie von einer Scheide oder einem Futterale, (quaedam, quasi vaginae species, cutis propago, unde principium umbilici. B. S. Albinus Tab. V. Uteri gravid, bey Buchholz tubus fastigiatus), von ihnen umfaßt erscheint. Ich bemerkte an mehreren eigens deshalb untersuchten, neugebohrnen, reifen Kindern, daß dieser Futteral- oder scheidenartige Fortsatz der Bauchdeckenhaut an der rechten Seite (Fig. 1. a.) länger und stärker sich zeigt, als an der linken. (b) Ja er hat hier manchmal ein fast aufgeworfenes wulstiges Ansehen (c), wenn der Uebergang auf der linken Seite gleichsam verstrichener aussieht. Auch ist gewöhnlich diese Grenzlinie nicht rund, sondern etwas wellenförmig. (Fig. 1. b. c. d.) Diese Scheide besteht aber nicht aus der bloßen Haut der Bauchdecken, sondern selbst ein Theil des sehnigen Striemens (linea alba) zieht sich rundlich, von innen nach

Venae umbilic
e sunt, quam
entum. Über
Embryo in der
Kammer zum an
neunten Monate
verhältnismäßig
sondere gegen die
t, zu erscheinen;
it genommen, am
andern Orten:
it dem Alter und
Verhältnisse an
ichsam durch ein
sch schon zu ih-
nämlich, vorzu-
nit dem übrigen
retwachsen, so
(au moment
Schenkels über.
selbst noch zur
im im Allgemei-
oder des Bau-
unte: Das Kind
keinen Nabel:
Zylinder; ins-
abel im streng-

ausen her, in diesen kleinen Cylinder, (Fig. 3.) Nach
Wrisberg's Bemerkung (de peritonaei diverticulis, illisque inprimis, quae per umbilicum et lineam albam contingunt, Goett. 1780. pag. 28.) ließe sich hier diese Scheide von der Nabelschnur leicht trennen.

Der Unterschied zwischen diesem Hautcylinder und der eigentlichen Nabelschnur zeigt sich ferner in der Farbe, Glätte und Masse. Der Hautcylinder hat nämlich die fleischfarbene Röthe der übrigen Haut des Kindes; die eigentliche Nabelschnur ist dagegen merklich weißer. Den Hautcylinder bedeckt die feinvollige, (lanuginosa), feinerungliche oder zartfaltige Oberhaut; die Nabelschnur dagegen eine sehr feine haarlose aalglatte Oberhaut. Vortreflich bemerkte schon A. Bonn (in seiner classischen *Dissertatio de continuationibus membranarum*, welche in zweitem Bande von Sandifort's *Thesaurus Dissertationum* wieder abgedruckt ist §. VIII.): In fune umbilicali adultioris foetus, ubi ad aliquam distantiam ab umbilico distincte adhuc separari potest epidermis, mox vero inde cum cutis abdominis producto corio confluit. Endlich besteht jener Hautcylinder aus dem dichten lederartigen Gewebe der übrigen wahren Haut; die Nabelschnur dagegen, außer ihren Gefäßen, aus einer sulzigen, gallertartigen halb durchsichtigen Masse. Im frischen, und lebendigen Zustande zeigen sich alle diese Unterschiede weit auffallender, als in Kindern, die man lange Zeit im Weingeiste aufhob.

S. 4.

Öffnet man den Unterleib von Kindern, die vor oder

Gleich nach
Bauchhöhlen
der man diese
den, ja selbst
falle bedeckt,
Nabelvene als
femäsur (U
sich befind
sehung des
Blutgefäße
Wenn (a.
Untersuchun
Separato p
vasa haec
lineae alb

Berg
fen oder ve
türlichem
man das
als von de
merkt man
Striemen
fünftlichen
des sehnige
unter eine
Unterleib
durchgegene
Nabelringe
neuden, Ba

gleich nach der Geburt sterben, um die inwendige oder Bauchhöhlenfläche der Nabelgegend zu untersuchen; so findet man dieselbe mit dem ungetrennten, kein Loch habenden, ja selbst nicht einmal eine Vertiefung zeigenden, Bauchfelle bedeckt, überzogen oder überspannt, weil sowohl die Nabelvene als die beiden Nabelarterien sammt der Harnblasenschnur (Urachus) hinter und außerhalb dem Bauchfelle sich befinden. Hier zeigt sich schlechterdings keine Fortsetzung des Bauchfells zur Begleitung für die Nabelblutgefäße durch den Nabelring, wie ebenfalls schon *Wonn* (a. a. O. S. LXIV.) unvergleichlich durch eigene Untersuchungen an zwei Foetibus gegen *Douglass* lehrte: *Separato peritonaeo a subjectis vasis evidenter vidi, vasa haec sola tela cellulosa in exitu per foramen lineae albae comitari.*

S. 5.

Zergliedert man sodann die Nabelgegend in fast reifen oder völlig reifen Kindern; so findet man sie im natürlichsten Falle von folgender Beschaffenheit. Indem man das Bauchfell behutsam sowohl von der Nabelvene, als von den Nabelarterien mit dem Messer ablöst, bemerkt man, daß es sich ziemlich leicht von dem sehnigen Striemen, (linea alba), noch leichter von der vor ihm befindlichen Nabelvene, und am leichtesten von dem Theile des sehnigen Nabelringes ablösen läßt, unter welchem, wie unter einem Bogen oder einer Brücke, diese Vene in den Unterleib tritt, weil ein lockerer, sogar mit etwas Fett durchzogener Zellstoff, die Furche zwischen dem sehnigen Nabelringe, der Nabelvene und dem, diese Theile überspannenden, Bauchfelle ausfüllt. (Fig. 2. 5.) Etwas dichter

Fig. 3.) Nach
 ei diverti-
 per umbi-
 unt, Goett,
 unt, von der Na-
 icsylinder und
 in der Farbe,
 at nämlich die
 Kindes; die ei-
 weisser. Den
 ginosa), sein
 esschnur dage-
 unt. Wortrefe-
 classischen
 us mem-
 Bande von
 tationum
 ine umbili-
 distantiam
 potest epi-
 ominis pro-
 Hautensin-
 übrigen wä-
 ren Gefäßen,
 ytigen Masse.
 sich alle diese
 en, die man
 die vor oder

und fester haftet das Bauchfell auf den beiden Nabelarterien. Ueberhaupt aber läßt sich das Bauchfell in unreifen Früchten, z. B. in sieben- bis acht monatlichen, leichter ablösen, als in den der Reife näher gekommenen. Es scheint gleichsam verhältnißmäßig dicker, stärker, und zugleich lockerer angeheftet.

Nach abgelöstem und zurückgelegtem Bauchfelle erkennt man nun deutlich; daß die obere Hälfte, oder der obere Bogen des Nabelringes (Fig. 2. 3. 4. 6.) aus vorzüglich starken, rundlichen, bogenförmigen, sehnigen Faserbündeln besteht, welche einen förmlich abgerundeten Rand eines Loches, oder eine deutlich geendigte Mündung bilden, so daß sich selbst sehnige Fasern nach außen über die Ebene der Bauchhöhle hinaus erstrecken. An diesen oberen Bogen des Nabelringes ist die unter ihm befindliche Vene nur sehr locker angeheftet. Präparirt man daher diesen sehnigen Bogen und die Vene sauber; so bleibt zwischen ihnen eine sehr deutliche ansehnliche Furche (Fig. 3.) übrig, welche ein nur lockerer Zellstoff ausfüllte. Ein vorzügliches und starkes Bündel von sehnigen Fasern dieses Bogens pflegt sich nicht nur bey solchen Kindern, sondern selbst bis ins späteste Alter, besonders auszuzeichnen. (In der Fig. 5. aus einem Kinde, in Fig. 6. aus einem Erwachsenen). Die untere Hälfte oder der untere Bogen des Nabelringes dagegen besteht aus weniger starken, weniger bogigen, auch weniger leicht von der Nabelarterien trennbaren Sehnenfasern. (Fig. 4.) An diesen unteren Bogen sind die Nabelarterien, nebst dem conischen Harnblasenbändchen, so fest und dicht angeheftet, und selbst mit der sulzigen Masse der Nabelschnur so innig zusammenhängend, (Fig. 4.) daß man fast nicht im

Stande ist
mit abzulösen
zu trennen.
weniger abger
überhaupt we
Bennischen
überein. Der
von den Ma
den ganzen
beischnur v

Unter
nen Kindes
den sehnige
weicher, a
alten Kin
stärksten
fange des
Bündel v
menden

Die
beling fell
arterien,
welche sie
wie sich die
cas begeben
ner Einspre
masse, fei

Stande ist, die Arterien von dem Nabelringe rein und nett abzusondern, oder sie ohne Verletzung von einander zu trennen. Der Rand dieses unteren Bogens ist daher weniger abgerundet, als der Rand des oberen Bogens, und überhaupt weit straffer. Diese Schilderung stimmt mit der Bonnischen oben angeführten Beschreibung vollkommen überein. Der Urachus, welcher gewöhnlich sich dicht an eine von den Nabelschnur-Arterien schmiegt, läßt sich durch den ganzen Nabelring hindurch bis in die eigentliche Nabelschnur verfolgen.

§. 6.

Untersucht man die Bauchmuskeln eines neugeborenen Kindes, sowohl von außen als innen; so findet man den sehnigen Striemen (*linea alba*), kürzer, schmaler und weicher, als in den einige Wochen oder ein Paar Monate alten Kindern, und den Nabelring ihren breitesten und stärksten Theil ausmachend. Nur vorzüglich im Umfange des Nabelringes entdeckt man deutlich ausgebildete Bündel von Sehnenfasern, welche selbst mit den zunehmenden Jahren ferner nicht viel stärker werden.

§. 7.

Die Nachbarschaft des Nabelringes, so wie der Nabelring selbst, und die Häute der Nabelvene und der Nabelarterien, erhalten Ästchen von den *arteriis epigastricis*, welche sie selbst bis in den Nabelring hinein versorgen, so wie sich die Venen dieser Gegend in die *venas epigastricas* begeben. Übrigens habe ich, selbst nach wohlgerathener Einspritzung der Blutgefäße mit der feinsten Einnobermasse, keine Blutgefäßchen weiter, als im Nabelringe

von innen, und in der häutigen Scheide von außen, entdecken können. Auch ist mir nicht bekannt, daß Andere in der eigentlichen Nabelschnur, außer den drey starken Gefäßstämmen, feinere Ästchen von Gefäßen entdeckt hätten.

§. 8.

Vergleicht man die Nabelgegend neugeborhner männlicher Kinder mit der bey weiblichen Kindern; so findet man weiter keinen besonderen eigentlichen Unterschied, außer daß sich die Nabelschnur am männlichen Kinde merklich näher an den Geschlechtstheilen befindet, als am weiblichen. Um über diesen Umstand völlige Gewißheit zu erlangen, verglich ich besonders ein Paar Zwillinge von verschiedenem Geschlechte mit einander, weil bekanntlich Zwillinge sich so ähnlich sehen, daß selbst die Ältern sie nur mit besonderer Aufmerksamkeit unterscheiden; und fand, daß die Nabelschnur an dem männlichen Fötus sich nur zwey volle Linien den Geschlechtstheilen näher befindet, als an dem weiblichen.

3 w
Quel char
dans

Welche n
bel in

Um mich
tate, zu
in diesen
männliche
sein wird
der Natur

Der
gebene die
§. 3. besch
von den
nach der
schnur, th
wicklung n
oder seltn
Reinwand,

Zweiter Abschnitt.

Quel changement naturel (l'Ombilic) subit-il dans l'enfance et à un age avancé?

Welche natürliche Veränderung erleidet der Nabel in der Kindheit und im hohen Alter?

§. 9.

Um mich kürzer, und, ohne Unterbrechung durch viele Citate, zusammenhängender fassen zu können, werde ich auch in diesem Abschnitte Alles meist nach eigenen Ansichten und mannigfaltigen Erfahrungen schildern, indem es leicht seyn wird, täglich die Wahrheit meiner Schilderungen in der Natur selbst nachzuprüfen.

Der gewöhnlich unterbundene und mit Leinwand umgebene Rest der Nabelschnur, trocknet bald bis an die oben §. 3. beschriebene Grenze zwischen ihm und der Scheide von den Bauchdecken. Dieses Vertrocknen erfolgt, theils nach der dünneren oder dickeren Beschaffenheit der Nabelschnur, theils nach der reichlicheren oder sparsameren Umwicklung mit sauberer Leinwand, theils nach der öfteren oder seltneren Abwechslung mit frischen Unterlagen von Leinwand, früher oder später.

§. 10.

Diese Vertrocknung des Nabelschnur - Nestes erfolgt aber jederzeit ganz genau bis an jene Grenze, der Rest der Nabelschnur mag länger oder kürzer seyn. Bisweilen bleibt in diesem, durch die Austrocknung durchsichtig gewordenen Neste der Nabelschnur, ein dünner Streifen des in den Arterien geronnenen und ausgetrockneten Blutes.

§. 11.

Wenn eine Nabelschnur dick und mastig war, fand ich, daß sie faulig oder stinkend wurde, und Haller's Worte: (*Element. Physiologiae Lib. XX. Sect. 1. §. 1.*) „*Particula umbilici relicta abit in sphacelum quasi ambusta*“, auf sie passen. Vielleicht trägt selbst zum schnelleren und leichteren Austrocknen dieses Nabelschnur - Nestes der Umstand bey, daß er nur mit einer äußerst zarten Oberhaut bedeckt ist. Denn es ist bekannt, daß die Oberhaut vorzüglich vor der Austrocknung schützt; welche deshalb auch W. Hunter gar artig mit einem glasartigen Blättchen verglich. (*Medical Observations and Inquiries, Volume 2.*)

§. 12.

Gleich in den ersten Tagen der Austrocknung des Nabelschnur - Nestes erfolgt, rings um diesen Rest der Nabelschnur, im Endrande der Scheide von der wahren Haut, eine leichte, unbedeutende Entzündung, welche in eine eben so leichte Eiterung übergeht, mittelst welcher eine ringförmige Furche genau in jener Grenzlinie (§. 3.) entsteht, die durch allmähliges Tieferwerden, endlich den wankend gewordenen Rest der Nabelschnur von den Bauch-

decken vollends trennt, so daß im ganz natürlichen Falle, nach endlich wirklich abgegangenem Nabelschnur-Neste, in der dadurch entstandenen kleinen ovalen Vertiefung, ein kaum eine Linse großes, wundes oder schwärendes, unbenarbttes Stellchen übrig bleibt, welches in wenigen Minuten austrocknet, und mit einem Schörschen oder Krüstchen bedeckt wird, um in ein Paar Tagen, nach der unter ihm erfolgten Benarbung, gleichfalls abzugehen.

Dieser, die Nabelschnur von den Bauchdecken trennende, Prozeß der Natur ist nun derjenige, welcher den eigentlich sogenannten Nabel bildet.

§. 13.

Die Dauer dieses Prozesses der Absonderung der Nabelschnur und Bildung des Nabels, beträgt im natürlichen Falle drey bis sechs Tage.

Hierbey ist aber nun noch Folgendes zu bemerken:

a) Der trockne oder dürre gewordene Nest der Nabelschnur wird, als ein abgestorbener, nunmehr fremder Theil, so wie jeder andere dürre, am lebendigen menschlichen Körper entstandene, Schorf oder Kruste, (z. B. der Schorf der Pocken, und ganz besonders der Schorf der Schußblattern; mit dessen Absonderung sowohl was die Zeit, als die Erscheinungen anbetrifft, hier die größte Analogie Statt findet), von der Natur selbst abgesondert und abgestoßen.

b) scheinen bey dem Prozesse der Bildung des Nabels sowohl die Arterien, als die Saugadern der Nabelgegend, besonders thätig, durch Erregung einer Entzündung und Eiterung in dem le-

r. Nestes erfolgt
 renze, der Nest
 enn. Bisweilen
 rechtfertigt gewor-
 Streifen des in
 ten Blutes.
 ig war, fand ich,
 aller's Worte:
 XX. Sect. 1.
 in sphacelam
 icht trägt selbst
 dieses Nabel-
 nur mit einer
 es ist bekannt,
 eknung schädet;
 mit einem glas-
 servations
 kinnung des Na-
 Nest der Nabel-
 wahren Haut,
 welche in eine
 ist welcher eine
 ie (§. 3.) ent-
 , endlich den
 en den Bauch-

bendigen Rande der Haut, rings um den dürrerh
 Rest der Nabelschnur, welcher dadurch gleichsam
 erweicht, geschmolzen und zur Einsaugung vorbe-
 reitet wird. Auch sind es eben die Arterien, wel-
 che zu gleicher Zeit die Bildung der Narbe ver-
 richten. Die Saugadern zeigen sich wirksam, in-
 dem sie die mittelst der Arterien erweichten, und
 fast flüßig gemachten, soliden Theilchen aufnehmen
 und eine wahre Furche, Welle und endliche Ver-
 tiefung der Nabel-Grüben veranlassen.
 Denn daß auch solide Partikelchen eingesaugt wer-
 den, haben unter Andern P. Weidmann (de
 necrosi, Frcti. 1793.) und P. van Maanen (Diss. da absorptione solidorum, Leidæ 1793.) gründlich erwiesen.

c) Während aber auch die, durch Eiterung erfolgende,
 Absonderung des Restes der Nabelschnur, all-
 mählig von der Peripherie her gegen das Cen-
 trum hin fortschreitet, so heilt und benarbt sich
 zu gleicher Zeit hinter her, die wund oder eiternd
 gewordene Stelle, so daß, bey dem endlichen
 Abfallen dieses dürrerh Körpers, fast die ganze
 Oberfläche bekleidet erscheint, bis auf ein kleines
 Zellchen im Mittelpunkte, welches, wie schon ge-
 sagt, sich auch bald mit einem Krüstchen, und
 zuletzt mit einem wahren Oberhäutchen bedeckt.

d) So wie bey allen ähnlichen Bemerkungen eiter-
 ternder Flächen des menschlichen Körpers, zieht
 sich auch, bey Bildung der Nabelnarbe, die wund
 gewesene Fläche ringsum von der Peripherie ge-
 gen den Mittelpunkt so zusammen, daß die Ver-
 tiefung

tiefung und Narbe, die man eigentlich den Nabel nennt, einen auffallend kleineren Umfang zeigt, als die ehemalige frische lebendige Nabelschnur zeigte, die sich an dieser Stelle befand.

e) Vielleicht hilft selbst die Zusammenschrumpfung oder Zusammentrocknung des Restes der Nabelschnur schon zur Verminderung der nachherigen Narbe.

f) Ferner kam mir der Gedanke: ob nicht die, gar bald sich in ein solides Seilchen verwandelnden, folglich nicht mehr so willig nachgebenden Arterienreste, auch durch ein Festhalten von innen her, zur Vertiefung des Nabels das Ihrige beitragen, wovon mich öfters wiederholte Untersuchungen belehrten, daß, wie ich schon oben bemerkte, die Arterien nebst dem Urachus besonders fest am unteren Rande des Nabelringes haften.

S. 14.

Betrachtet man die Oberfläche der hier entstandenen vertieften Narbe, das ist, des so eben gebildeten Nabels, von außen auch aufs genaueste; so zeigt sich eine kaum entdeckbare Spur von den drey, hier ehemals durchgegangenen, großen Stämmen der Blutgefäße; sondern diese ganze Oberfläche scheint ziemlich gleichförmig etwas uneben, und härlicher, als irgend eine andere Stelle auf der Oberfläche des Körpers, anfangs röthlicher, nach einigen Monaten aber weißlicher, als der Rest der Haut der Bauchdecken. Kurz, man findet hier völlig die analoge Beschaffenheit, die man an allen gut gebildeten Narben mit Verlust von Substanz antrifft.

In diesem ganzen Prozesse bemerkt man durchaus mehr Wegnahme als Zufügung von Masse; daher auch im natürlichen Falle der Nabel gleich von Anfang als eine Vertiefung, keineswegs aber als eine Ebenheit, vielweniger als eine Erhabenheit erscheint.

§. 16.

Hierdurch werden im Allgemeinen die Sehnenfasern des Nabelringes, so wie die eigentlichen Nester der Blutgefäße, ziemlich dicht an einander gedrängt.

§. 17.

Untersucht man ferner, insbesondere von innen oder von der Bauchhöhlen-Seite her, die Nester der Arterien, die durch diese Stelle in die Nabelschnur drangen, in Kindern von einigen Wochen oder Monaten, besonders nach wohlgerathenen Einspritzungen; so scheinen sie nicht plötzlich oder stumpf geschlossen, sondern von ihrem Ursprunge an, regelmäßig zusammengezogen, und schon in einer merklichen Entfernung von dem Nabelringe, nicht nur zu einem soliden Seile zusammengezogen, sondern selbst größtentheils geschwunden zu seyn. Gemeiniglich findet man den, zwischen der Urinblase und dem Nabelringe befindlichen, Theil der Nabelarterien, in den ersten Wochen völlig geschlossen und verdünnt. Denn daß die Nabelarterien länger, ja lebenslänglich offen bleiben, gehört zu den sehr ungewöhnlichen Erscheinungen, dergleichen Böhmer¹⁾ und

1) Diss. resp. Burchart, de necessaria funiculi umbilicalis deligatione, wieder abgedruckt im fünften Ban-

Haller (a. a. O. S. 18.) gesammelt haben. Als Ursachen dieser Schließung, betrachtet H. v. Haller theils die sogenannte Derivation des Blutes, theils den Druck der vollen Leber, theils die Contractilität des Zellstoffes, welcher scheideartig diese Arterien an die Harnblase und an das Bauchfell heftet, theils die Veränderung des Kreislaufes des Blutes durch das Herz. Auch meinen Untersuchungen zufolge, ist Nicolaus's Meinung, daß nämlich die Nabelarterien sich vom Nabelringe weg zurückzögen, ungegründet, ungeachtet ihr Schulz, Threw, ja selbst Weitbrecht, beypflichten.

Je älter das Kind wird, desto mehr schwinden auch die Reste dieser Nabelarterien, so daß man in der Entfernung eines Zolles vom Nabel, nur mit Mühe ihre völlig soliden Reste deutlich darzulegen vermag.

§. 18.

Untersucht man die Nabelvene, die durch diese Stelle aus der Nabelschnur in den Unterleib drang; so erscheint sie schon in den ersten Wochen nach der Geburt, in ein solides, dichtes, seilartiges Wesen umgebildet, und in der Nähe des Nabels, zu einem sehr unbedeutenden dünnen Faden geschwunden. Denn das längere, ja lebenslängliche Ungeschlossenbleiben dieser Nabelvene, gehört zu den sehr seltenen Fällen, dergleichen ebenfalls Haller (*Element. Physiologiae, Lib. 30. Sect. I. §. 1.*) verschiedene zusammen getragen hat.

de des von Hallern herausgegebenen *Selectus Diss. anat. §. XXI.* welcher diese Arterien in einem vierzigjährigen Manne bis an den Nabel hin noch offen fand.

§. 19.

Mit dem zunehmenden Alter des Kindes, wird im ganz natürlichen Falle, das Nabelgrübchen noch vertiefter, und zwar um desto mehr, je häufiger sich in dem Zellstoffe der Haut rings um den Nabel Fett ansammelt. Denn es tritt bey der Narbe des Nabels der Fall, wie bey allen Hautnarben, mit bedeutendem Verluste von Substanz, ein, daß sie in ihrem verdichteten, härtslichen, wenig nachgebenden Zellstoffe kein Fett aufnehmen, sondern lebenslänglich fettlos oder mager bleiben, folglich ebenfalls desto tiefer erscheinen, je mehr sich zunächst um sie herum Fett anhäuft. Je vertiefter die Nabelgrube durch das Fettwerden, der um ihn befindlichen Haut wird, desto faltiger oder runzlicher pflegt ihr Umfang, besonders an der tiefsten Stelle gegen den Mittelpunkt hin, zu erscheinen.

§. 20.

Ein wohl gebildetes Nabelgrübchen pflegt schon bey Kindern oval zu erscheinen, so daß der längste Durchmesser desselben queer liegt, ungeachtet der Rest der Nabelschnur, folglich auch das nach seinem Abgange entstandene Nabelchen, rundlicher ist. Die Ursache hievon liegt wohl in der allgemeinen Tendenz aller Hauptfelle des Unterleibes, der Queere nach zu laufen.

§. 21.

Bis zu den Jahren der Mannbarkeit nimmt aber, mit der Ausbildung der Bauchdecken, des sehnigen Striemens, (den man die linea alba nennt), der Muskeln, der Blutgefäße, der Saugadern und des Bauchfelles, die Nabelnarbe, und somit das Nabelgrübchen, nicht in gleichem

Grade an Größe zu, sondern zeigt, nach Art aller Narben, einen geringeren Wachsthum. Folglich leidet die Nabelgrube in dieser Lebensperiode weniger natürliche Veränderung, (*changement naturel*), als die ihm zunächst liegenden Theile (*les parties les plus voisines*). Daher findet man das Nabelgrübchen bey Kindern und jungen Leuten verhältnismäßig desto größer, je jünger sie sind. Der Umfang der eigentlichen Narbe des Nabels pflegt, nach vollendeter Ausbildung des Körpers, kaum drey bis vier Linien im größten Durchmesser zu halten, (*Fig. 6.*) falls auch der längste Durchmesser der Nabelgrube über einen Zoll hielte.

S. 22.

Der sehnige Striemen oder die weiße Linie der Bauchdecken, welcher nach vollendeter Ausbildung des Körpers, im besten, kraftvollsten Alter ebenfalls seine größte Vollkommenheit erreicht, und unter der knorpeligen Spitze der Brustbeine anfängt, besteht hauptsächlich aus dichten Sehnenfasern, welche als Fortsetzungen der Sehnen, sehnigen Häute und Scheiden der Bauchmuskeln, vorn, gegen die Mitte des Unterleibes hin, nicht blos zusammenkommen, sich wechselseitig verweben und verflechten, sondern sogar, indem sie bis auf die entgegengesetzte Seite verlängert erscheinen, sich mannigfaltig kreuzen, und mit einigen ihrer Bündel und Fasern aufwärts, mit andern abwärts streichen, an dieser Stelle gleichsam noch einen Zuschuß von dichtem Zellstoffe besitzen. Um die letzten Reste der ehemaligen Nabelgefäße herum, zeigen sich etwas gebogene sehnige Fasern, welche die Spuren des ehemaligen Nabelringes ausmachen. Denn gewöhnlich zieht sich diese Stelle

im Erwachsenen so dicht zusammen, und schließt sich so fest, daß man außer einer unbedeutenden Vertiefung, in welcher die fadigen Reste der ehemaligen Nabelschnur-Gefäße fest haften, kaum noch eine andere Spur des ehemaligen Nabels bemerkt. Nicht selten jedoch trifft man in beiden Geschlechtern diese Stelle schlaffer und zu Nabelbrüchen geneigt an¹⁾. Unter dem Nabel gegen die Schaambeine hin, scheint die Kreuzung der sehnigen Fasern fast noch häufiger, fester und straffer, als über demselben, und zeigt nur einige kleine Zwischenräume, Schlappen oder Lücken zum Durchgange der Blutgefäße und Nerven. Der sehnige Striemen erscheint überhaupt unter dem Nabel schwächer, platter, ebener, dicker und stärker, als über demselben. Die verschiedene Breite in Gestalt dieses sehnigen Striemens an den verschiedenen Stellen, so wie ihren Zusammenhang mit den Bauchmuskeln hat B. S. Albini, in seinen unübertroffenen *Tabulis musculorum hominis*, musterhaft abgebildet, und in seiner *Historia musculorum* am richtigsten und vollständigsten beschrieben. Von dem untersten Theile desselben besitzen wir die herrliche Abbildung in natürlicher Größe von Astley Cooper *The anatomy and surgical treatment of inguinal and congenital hernia*. London. 1804. Schade nur, daß die Darstellung nicht bis zum Nabelringe reicht!

§. 23.

Untersucht man im vollkommen ausgebildeten Körper

- 1) Wrisberg, resp. Rudolphi, de diverticulis peritonaei, in primis quae per umbilicum et lineam albam contingunt. pag. 9.

die Reste der ehemaligen Nabelvene und Nabelarterien; so findet man sie nun so sehr vermindert oder geschwunden, daß man Mühe hat, von Nabel her den Rest der Vene gegen die Leber, und die Reste der Arterien gegen die Harnblase hin rein und nett darzustellen.

S. 24

Ungeachtet schon bey reifen Kindern (S. 8), ja sogar einigermassen schon bey Embryonen, die Lage des Nabels nach den verschiedenen Geschlechtern sich verschieden zeigt; so fällt doch dieser Unterschied erst in vollkommen ausgebildeten Körpern am stärksten in die Augen. In diesem Lebensalter ist die Entfernung der Nabelgrube von den Geschlechtstheilen merklich länger, als in dem Kindesalter. Der Theil der Haut, welcher sich gegen die Nabelgrube hinauf zieht, wölbt sich gleichsam mächtiger von unten als von oben her in die Nabelgrube, so daß die untere Lippe (um mich des Ausdrucks zu bedienen), der Nabelgrube dicker, wulstiger, kurz, größer als die obere Lippe erscheint. Auch zeigt sich im völlig ausgebildeten weiblichen Körper, die Nabelgrube, in Rücksicht des Brustkastens (Thorax) vorliegender, als im männlichen Körper. Der Grund hiervon beruht in der bekannten Bemerkung ¹⁾, daß im weiblichen Körper der Unterleib oder Bauch, im männlichen der Brustkasten mehr vorspringt. Diese beiden Umstände der Nabelgegend findet man vortreflich von den Alten in ihren schönsten Statuen beachtet und ausgedrückt. Man kann

1) J. F. Ackermann Diss. de discrimine sexuum praeter genitalia, Moguntiae 1788. Deutsch mit Anmerkungen von J. Wenzel. Mainz 1788.

sich hievon gar leicht, durch Vergleichung der sogenannten Mediceischen Venus mit dem Apollo vom Belvedere, überzeugen.

§. 25.

Mit den Jahren der Mannbarkeit tritt noch der auffallende Unterschied zwischen beiden Geschlechtern ein, daß nämlich bey dem männlichen Geschlechte die Haare, die auf dem Schaamhügel hervorsproßen, sich pyramidalisch bis gegen die Nabelgrube hinauf erstrecken; welches bey dem weiblichen nie der Fall ist, dessen Schaamhaare weit unter der Nabelgegend zurück bleiben, und sich wenig über die horizontalen Schenkel der Schaambeine hinauf zu erstrecken pflegen.

§. 26.

Nach den Jahren der Mannbarkeit erreicht, mit vollendeter Ausbildung des Körpers, auch der Nabel seine vollkommene Größe, und im Falle sich Fett in den Bauchdecken anhäuft, auch seine größte Tiefe. Mit dem Wechsel von Fett- und Magerwerden, wechselt sodann auch die Tiefe der Nabelgrube.

Nach Proli's Bemerkung ist der Nabel im Menschen schwächer, als in Thieren. (Göttingische gelehrte Anzeigen 1796, Seite 18.)

§. 27.

Hat sich der Nabel in der Jugend gehörig ausgebildet; so erleidet er während der Schwangerschaft so wenig Veränderung, daß er nach der Niederkunft meistens auf seine vorige Gestalt zurück kehrt. Wenigstens habe ich ihn,

selbst bey Weibern die mehrere Kinder gehabt hatten, kaum vom normalen Zustande abweichend gefunden. Daß der Nabel inzwischen während der Schwangerschaft, besonders durch die unter ihm ausgehobten Bauchdecken, nicht bloß aus seiner Lage geschoben, sondern auch in seiner Form etwas verändert wird, ist wohl natürlich. Doch da dieser Gegenstand nicht zur Frage gehört, berühre ich ihn auch nur im Vorbeygehen.

§. 28.

Mit herannahendem Alter pflegt die Nabelgegend keine besondere Veränderung ferner zu erleiden, außer derjenigen, welche der ganzen Haut im Allgemeinen widerfährt. Die Haut nämlich, welche die Nabelgrube bildet, wird ihres Theils ebenfalls magerer, trockener, dünner, spröder, härlicher, runzlicher, und mit der Abnahme des Schmeerbauches wohl auch flacher.

g der sogenannten
dem Belvedere,
ritt noch der auf-
lechten ein, daß
Haare, die auf
amidalisch bis ge-
thes beim weiblich-
re weit unter der
ig über die hori-
uf zu erstrecken
reicht, mit wols-
er Nabel seine
in den Bauch-
Mit dem Wech-
sodann auch die
der Nabel im
(Sörtingische
hörig ausgebil-
chaft so wenig
istens auf seine
habe ich ihn,

Dritter Abschnitt.

Quelles indispositions contraires à la nature peuvent y avoir lieu de la naissance, ou arriver ensuite, et donner occasion à des descentes des viscères abdominaux et à leur enclavement? Et qu'est-ce que les observations anatomiques et chirurgicales ont appris et confirmé à ce sujet?

Welche widernatürliche Indispositionen können am Nabel von der Geburt an Statt finden, oder in der Folge eintreten, und Gelegenheit zur Vordrängung der Eingeweide des Unterleibes und ihrer Einklemmung geben? Was haben hierüber anatomische und chirurgische Beobachtungen gelehrt und bestätigt?

Erstes Hauptstück.

S. 29.

Zu den Indispositionen, welche von der Geburt an Statt finden, gehören wohl hauptsächlich die sogenannten angebohrnen Nabelbrüche, welche von Anatomen und Chirurgen häufig genug beobachtet und bestätigt worden sind.

Georg Albert Fried hat in seiner Diss. de foetu, intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus, nato, welche im ersten Bande des Sandifortischen Thesaurus Dissertationum wieder abgedruckt ist, bis zum Jahre 1760, acht und dreyßig solcher Fälle gesammelt, und die Stellen genau citirt, wo sich dieselben von Mauriceau, Stehelin, Lehmann, Hochstetter, Mery, Bonnet, Bausch, Döring, Gesner, Gockel, Marrigues, Van der Monde, Gölike, Blegny, Reichmeyer, Stalpart van der Wiel, Blankard, Haller, Trumph, Hasenest, Panaroli, Lachmund, Sampson, Mercklin, Francur, Paullinus, Hünerwolff, Ritter, Schröck, Müller, Donauer, Trew und Solingen aufgezeichnet befinden, nebst der Nachricht, daß sich zu Strassburg ein Mädchen mit einem angeborenen Nabelbruche befinde.

Ich erlaube mir um so weniger, diese Stellen einzeln zu wiederholen, da sich der Sandifortische Thesaurus Dissertationum in Jedermanns Händen befindet, und begnüge mich, außer fünf eigenen Beobachtungen, diesen Fällen noch folgende, in chronologischer Ordnung beyzufügen, welche ich aus den bewährtesten seit 1760 erschienenen Schriftstellern ausgezeichnet habe.

B. S. Albinus, Annotationum academicarum 1754. Libro primo. Tab. V. Fig. 3. bildet unvergleichlich schön einen Embryo von wenigen Wochen mit einem Nabelbruche ab, welcher sich rechts über der Nabelschnur zeigt. Hierzu gehört noch die Anmerk. Lib. III. Cap. XVI.

Alb. v. Haller, Opuscula pathologica Lausannae 1754, welche im dritten Bande seiner Operum

nitt.
à la nature
ance, ou arri-
à des descen-
à leur encla-
es observations
ont appris et
nen können am
finden, oder
Belegenheit zur
des Unterleibes
sahaben hier-
e Beobachtung:
f.
der Geburt an
die sogenannten
von Anatomen
und beschäftigt

minorum Laus. 1768. wieder abgedruckt sind, beschreibt S. 315 noch zwey ihm seitdem (s. oben) vorgekommene Fälle von angebohrnen Nabelbrüchen.

Schäffer in den *Novis Actis Naturae Curiosorum* 1761. Tomo. 3. Obs. I.

J. B. Morgagni de sedibus et causis morborum, Venet. 1761. Epistola XLVIII. Art. 55. schildert den Nabelbruch eines neugebohrnen Kindes von der Größe einer Faust, rechts, etwas über dem Nabelstrange, von der Haut entblößt. Das Kind starb den 35. Tag am Brandigwerden dieses Bruches.

H. A. Wrisberg *Descriptio anatomica Embryonis, observationibus illustrata*, Goettingae. 1764, wieder abgedruckt im dritten Bande des Sandifortischen *Thesaurus*, bildet Fig. 1. und 2. einen Embryo von zehn Wochen, im Eichen hängend, mit einem Nabelringe ab, und commentirt diesen Fall meisterhaft. Der Bruch zeigt sich auf der rechten Seite der Nabelschnur.

Gualt. van Doeveren, *Specimen Observationum anatomicarum*, Leidae, 1765. Cap. II.

F. H. Buchholtz, de *Hepatoomphalocoe congenita*, Argentorati. 1758. mit Kupfern, ist eine der vorzüglichsten Monographien über diesen Gegenstand, die ganz gelesen zu werden verdient, da sie wohl Lobstein selbst geschrieben hat.

Cosmus d'Angerville, in der *Gazette salutaire* 1768. oder in Leutfrink's *Geneskundig Tydsch*, Deel II. p. 224.

Gentleman's Magazine for the Year 1769. February page 64.

Will. Hunter, *Anatome Uteri gravidi*, Lon-

don. 1774. Tab. XXXIII. Fig. 3. bildet sehr niedlich einen Embryo im Eyschen von wenigen Wochen mit einem ansehnlichen Nabelbruche ab.

Sam. de Wind, in den Abhandlungen der See-ländischen Gesellschaft der Wissenschaft zu Vlissingen 1775. erster Band, beschreibt das äußere Ansehen eines großen Nabelbruches an einem neugebohrnen Kinde, welcher Leber, Milz, und Magen nebst dem größten Theile des übrigen Darmkanales enthielt.

Im Jahre 1776 wurde ich mit dem Falle eines Kindes bekannt, welchem die Därme mit einer dünnen Haut bedeckt außer dem Leibe hiengen, und welches fünf Tage lang lebte.

Ed. Sandifort, Obs. anatomico-pathologicae, L. B. 1778. Libr. I. Cap. 4. und Lib. III. Tab. I. beschreibt mit Abbildungen solche Fälle.

J. de Man in den Verhandelingen M. v. h. G. t. W. te Haerlem, Deel XVIII. p. 179.

Wern. Ern. Rudolphi, praeside H. Wrisberg, (s. oben.) Diss. de pertonaei diverticulis, illisque imprimis, quae per umbilicum et lineam albam contingunt, Goettingae 1780. Wrisberg schildert auch hier genau und meisterhaft drey Fälle.

And. Bonⁿ, Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amst. Deel II. S. 133. gedenkt mehrerer solcher Fälle, die er selbst untersucht hat.

F. G. Voegtel, Fragmenta Semiologiae obstetriciae, Halae 1790. schildert auch mit Abbildungen den angebohrnen Nabelbruch.

Joh. Chr. Starke's Archiv für Geburtshülfe,

Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, enthält im 1ten Bande einen, dem Friedischen, und meinem vierten, ähnlichen Fall, mit deutlichen Abbildungen Tab. 1. und 2. im dritten Bande S. 89. Heroldt's Nachricht von einem großen angebohrnen Nabelbruche, und im vierten Bande S. 646. D. W. Sachtlebens treffliche Schilderung eines dem de Windischen sehr ähnlichen Falles. Das Kind starb den fünften Tag an Krämpfen.

S. Th. Soemmering, Abbildung und Beschreibung einiger Mißgeburten, Mainz. 1791. schildert Tab. 8 und 10. ein Paar ungeheure angebohrne Nabelbrüche.

Calder, Medical Commentaries of Edinburgh, Vol. I. giebt Nachricht von einem ähnlichen Falle.

Ed. Sandifort, (s. oben) Museum anatomicum Academiae Lugduno-Batavae 1793. bildet Tab. CXX. einen Bruch an der gemeinschaftlichen Nabelschnur zusammengewachsener Zwillinge ab, und Tab. CXXVI. Fig. 2. einen sehr beträchtlichen Nabelbruch an einer hirnlosen Mißgeburten.

Sabatier, Lehrbuch für praktische Wundärzte, aus dem Franz von Borges, Berlin 1797, sah mehrere male angebohrne Nabelbrüche.

Chopart et Desault, Traité des maladies chirurgicales à Paris an 4, und ebendesselben J. P. Desault, Chirurgischer Nachlaß, herausgegeben von Kav. Vichat, übersetzt von Wordenburg, Göttingen 1800. lehrt die Behandlung der, ihm nicht selten vorgekommenen, angebohrnen Nabelbrüche.

Jak. Logger, Prysverhandeling by het Leegaat van Monnighoff §. 37. Deutsch übersetzt. Leipzig. 1805.

*Alex. Monro Outlines of the anatomy of N.B. Edinb. 1813. Vol. 3 p. 480.
 (s. oben) angebohrner großer Nabelbruch, Labor in 3 Mogen
 aufgeführt*

Charles Bell, A System of Dissections, Edinburgh. 1799 — 1800. in der Erklärung der Plate 1.

Lassus, Mémoires de l'Institut national des Sciences Tome III. page 378. scheint diesen Fall nach eigenen Ansichten zu schildern.

S. Spruyt gedenkt in seiner Preisschrift, Leipzig 1806, eines ihm vorgekommenen Falles.

J. A. Lobenwein Mem de l'Acad Roy. Des Sc de St. Peterbourg Tom 6 S. 30. 1818 gedruckt in der Schrift von ... Fall. p. 372.

Zu diesen Beobachtungen will ich blos diejenigen fünf Fälle fügen, die ich gegenwärtig in der Natur, im Weingeiste aufgehoben, vor mir habe.

Erste Beobachtung.

An einem Embryo, der an Größe dem, von B. S. Albinus Annot. acad. Lib. I. Tab. V. in der fünften Figur abgebildeten, gleicht, und den ich in einem unverkehrten Eichen erhalten habe, finde ich ganz deutlich einen Nabelring rechts am Nabelstrange, der ungefähr eine halbe Linie im Durchmesser hält.

Zweite Beobachtung.

An einem weiblichen Embryo, der an Größe, dem bey Albinus am angeführten Orte in der siebenten Figur, oder bey *Wrisberg* ²⁾ dem in der vierten Figur, oder bey *Denmann* ²⁾ dem in der siebenten Figur gleicht, bey *Simmerring* ³⁾ etwa zwischen die achte und neun-

- 1) Descriptio anat. Embryonis.
- 2) Collection of Engravings, tending to illustrate generation. London. 1787—90.
- 3) Icones Embryonum humanorum. Francof. 1799. Tab. I.

te Figur fallen würde, sah ich einen ansehnlichen Nabelbruch, fast mitten unter der Nabelschnur, welcher näher untersucht einen großen Theil des Dünndarmes enthält.

Dritte Beobachtung.

Ein männlicher, an den beiden oberen Gliedmassen mangelhafter Fötus von sechs Monaten, zeigt einen sehr ansehnlichen Nabelbruch, der an Gestalt dem, vom Sandifort im Museo anatomico Tab. 126 abgebildeten, von außen ungemein gleich kommt. Die Haut der Bauchdecken, welche gewöhnlich die Nabelschnur umschließt, scheint ihrer Textur nach, ganz natürlich beschaffen; ist aber bis über einen Zoll im Durchmesser ausgedehnt. An der rechten Seite erhebt sich in der Nabelschnur ein Bruchseil von beinahe zwey Zoll Länge, und einem Zoll 9 Linien Breite. An der linken Seite dieses Bruchsackes zeichnet sich der Stamm der Nabelschnur, 1 Zoll 6 Linien lang, durch seine Consistenz aus, worauf die Nabelschnur, wie gewöhnlich beschaffen, von dem Bruchsacke abtritt. Der Bruchsack selbst ist von außen glatt, dünn, halb durchsichtig, blos membranartig, und sehr deutlich von der wahren Haut der Bauchdecken unterschieden. Seiner Dünne ungeachtet besteht er doch ganz offenbar aus drey ¹⁾ über einander liegenden Blättern, nämlich dem Bauchfelle, der äußeren Haut der Nabelschnur, und einer dünnen Zwischenhaut, welche

1) Auch Lobstein bey Buchholz S. 21. fand einen gleichen Bruchsack dreyblättrig. Erat in hoc exemplo triplex herniae saccus, e funiculo, textu tendinoso et peritonaeo compositus.

welche wahrscheinlich von der fehnigen Ausbreitung der Bauchdecken stammt. Das Stück der Nabelschnur, in welchem sich eigentlich dieser Bruch befindet, ist platt und ebenfalls dünne, so daß man die Blutgefäße-Sämme deutlich nicht um, sonder neben einander liegen sieht; zum offenbaren Beweise, daß der Nabelstrang der Ort ist, in welchem sich dieser Bruch bildete.

Dieser Bruchsack enthält die Leber mit ihren Ligamentis coronariis, welche aber nicht nur kleiner, sondern auch ganz ungestaltet ist, und, außer ihrem verzogenen Ligamento suspensorio, einen ganz abnormen, sehr dünnen, conischen, ringsum freyen Faden gegen die Nabelschnur abschickt. Ferner findet sich in ihm das Ende des Magens nebst dem ganzen Dünndarme, an welchem sich zwey sehr starke processus coeci, diverticula oder processus digitales zeigen, und der Anfang des Dickdarmes.

Vier te Beobachtung.

Ein zwischen sieben und acht Monate alter Fötus, zeigt außer zwey Zäpfchen, welche grob genommen zwey männlichen Gliedern gleichen, außer dem Mangel eines Afters, und einem Fehler am untersten Theile des Rückgrathes, (spina bifida ossis sacri), einen großen Nabelbruch. Auch dieser Nabelbruch befindet sich an der rechten Seite der Nabelschnur, in der Substanz derselben gebildet, indem sich die Grenzlinie der Bauchdeckenhaut von dem Bauchfelle auffallend, durch Farbe, Dicke, Consistenz und Textur, unterscheidet. Die Mündung der Bauchdecken, durch welche das in diesem schrecklichen Bruche Enthaltene dringt, hat über einen Zoll im Durchmesser.

Dieser Bruchsack enthält ebenfalls die sehr misge-

sehnlichen Nabel
r, welcher näher
darmes enthält.
u ng.
Gliedermaßen mis-
igt einen sehr an-
m, vom Sandi-
abgebildeten, von
Haut der Bauch-
schnur umschließt,
beschaffen; ist
usgedehnt. An
schnur ein Bruch-
em Zoll 9 Linien
uchsackes zeichnet
Linien lang, durch
r, wie gewöhnlich
Der Bruchsack
durchsichtig, blos
er wahren Haut
linne ungeachtet
ber einander lie-
le, der äußeren
Zwischenhaut,
welche
3. 21. fand ei-
ittrig. Erat
iae saccus, e
peritoneo



staltete Leber, nebst dem, ebenfalls sehr misgebildeten, dünnen und dicken Darne. Da, wo die Nabelarterien an Bruchsaße vorbeÿ streichen, sind sie weit von einander entfernt, und gleichsam mit Gewalt auseinander gerissen.

Fünfte Beobachtung.

In einem, mir von Herrn L*** mitgetheilten Präparate, sahe ich ein weibliches, der Diefse nahes Kind, mit einem rundlichen, wie gewöhnlich beschaffenen, dünnen, glatten, fast durchsichtigen Bruchsaße, welches über drey Zoll im Durchmesser halt, da die Mündung des Nabelringes nur wenig über einen Zoll im Durchmesser beträgt. Von der linken Seite ist die Bauchdeckenhaut sehr hervorgezogen, so daß auch dieser Bruch sich eigentlich rechts befindet.

Er enthält die Leber und den Magen, nebst einem ansehnlichen Theile des übrigen Darmkanales.

§. 31.

Aus diesen Beobachtungen scheint sich zu ergeben, erstens: daß es wahrhaft im allereigentlichsten Verstande angebohrne Nabelbrüche giebt, die man füglich Nabelschnurbrüche nennen könnte, weil man solche Brüche schon an Embryonen findet, die man selbst in völlig unversehrten Eynen erhält ¹⁾, und an welchen man kaum die Theile der Gliedmassen zu unterscheiden vermag. Da nun in dieser frühesten Lebensperiode der Embryo mit vielem Wasser umgeben ist, soßlich schlechterdings kein Druck,

1) S. oben die erste Beobachtung, und die von Wrißberg und Hunter angeführten Abbildungen.

Stoß oder sonstiger Unfall mechanisch auf ihn wirken kann; so scheint offenbar, wenigstens diese Art von Nabelbruch, in manchen Fällen einen Fehler in der Urbildung zu ver-rathen; ja man darf mit Wahrscheinlichkeit fortschließen, daß schon im allerersten Keime die Anlage oder wah-re Ursache zu dieser Art Brüchen eben so gut, wie zu einem sechsten Finger, wie zu den fingerhautartigen An-hängeln des Dünndarmes in der dritten Beobachtung, wie zu einem verschlossenen After in der vierten Beobach-tung, wie zu jenem sonderbaren Fortsatze der Leber in der dritten Beobachtung, wie zum Doppelkinde und der übrigen Mißbildung in den Sandifortischen Fällen, beruhe.

Folglich gehört diese Art Nabelbrüche auch mehr zu den Mißbildungen oder Monstrositäten, als zu den Krank-heiten. Dieses erhellet noch besonders aus dem Umfande, daß solche angebohrne Nabelbrüche oft zugleich mit andern Monstrositäten Statt finden, wie bey Mery im zweiten Falle, wie bey Sandifort in beiden Fällen, und auch bey mir in zwey Fällen. Sehr richtig bemerkte daher schon Mery 1), daß z. B. in dem einen seiner Fälle, die Leber von sieben Zoll nicht wohl vorfallen konnte, da sie allein größer war, als die Mündung des Nabelringes, welche nur fünfzehn Linien im Durchmesser hatte. Da-her nennen auch die trefflichen Männer Chopart und Desault 2) diesen Fall un vice de conformation.

Zweitens unterscheiden sich diese angebohrnen Nabelbrüche gar sehr von den nachherigen, in Ansehung ihres Bruchsackes, der nebst dem Bauchfelle nicht aus der

*Kopf Mead. Vop.
an 29. 112
1750
H. J. J. J.
H. J. J. J.
H. J. J. J.
H. J. J. J.
H. J. J. J.*

1) Mémoires de l'Academie des Sciences de Paris. 1716.
2) Traité des maladies chirurgicales. Paris. an 4. page 185.

hr. mißgebildeten,
die Nabelarterien
weit von einander
einander gerissen.
n g.
itgetheilten Prä-
ise nahes Kind,
offenen, dünnen,
welches über drey
ung des Nabels.
Schneffer betrügte.
haut sehr her-
eigentlich rothes
nebst einem an-
zu ergeben, er-
sten Verstande
n fühllicher Na-
solche Brüche
n völlig unvor-
man kaum die
vermag. Da
indem mit vie-
gß kein Druck,
von Wriß-
ungen.

Haut der Bauchdecken, sondern aus der Membran der Nabelschnur besteht. Bedarf es noch eigener unverweifellicher Autoritäten, so kann ich dafür Röderern ¹⁾ aufstellen, welcher schrieb: *Cutis continuatio herniae tunica non est, sed membranae, quae funem vestit, expansio*, und Bonn ²⁾, welchem die anatomische Untersuchung angebohrne Nabelbrüche zu wiederholten Malen zeigte, daß ganz so, wie bey den in späteren Jahren gebildeten Ausstretungen der Baucheingeweide, eine Verlängerung des Bauchfells den Nabelbruchsack innerhalb der erweiterten Nabelschnur ausmacht.

Drittens scheinen solche angebohrne Brüche eben nicht selten, da außer den achtzig (im §. 29) citirten Fällen, mir allein fünf vorgekommen sind, ohne daß ich eben besonders darauf ausging.

Zweites Hauptstück.

Da ich hoffe, daß das bisher Auseinandergesetzte von den *indispositions contraires à la nature, qui peuvent avoir lieu dès la naissance* ³⁾, hinreichend seyn werde:

- 1) Bey Buchholz a. a. D. §. VII.
- 2) Verhandlungen v. h. G. ter Bevordering des Heelkonde, te Amsterdam, Deel II. page 183.
- 3) Daß Lipoma umbilicale, die Sarcomphale, die Varicomphale, daß Aneurisma umbilicale, die Hydromphale, die Pneumatomphale, daß Offenseyn des Uraachus, die Urinffleu, die Geschwüre am Nabel, welche keinen näheren Bezug auf die Nabelbrüche haben,

so komme ich nun zu dem zweiten Hauptstücke dieses Abschnittes, nämlich zu des Nabels indispositionen contraires à la nature, qui peuvent arriver ensuite, et donner occasion à des descentes des viscères abdominaux et à leur enclavement? Et qu'est-ce que les observations anatomiques et chirurgicales ont appris et confirmé à ce sujet?

§. 32.

In wiefern außer den vorbeschriebenen Fällen eines wirklich angebohrnen, ans Tageslicht mitgebrachten Nabelbruches, noch eine andere angebohrne oder angeerbte Prädisposition, welche Franz von Hilden, Blumenbach, Richter, Leurs, van der Haar u. m. A. zu den Brüchen überhaupt annehmen, auch noch zu den Nabelbrüchen insbesondere Statt finden mag, lasse ich dahin gestellt seyn, weil ich darüber keine besonderen zuverlässigen Nachrichten vorfinde.

§. 33.

Chapmann's, Burmann's und Heuermann's

und deren Errösterung auch die Preisfrage nicht erheischt, übergehe ich; so wie Varietäten und Missbildungen am Nabel. B. B. das angebliche Fehlen der Nabelschnur bey widernatürlicher Beschaffenheit der Harnblase, worüber wir die meisterhafte Schrift von Bonn besitzen, und welchen Fall ich auch an beiden Geschlechtern in der Natur sehe, den Mangel einer Nabelarterie, wovon ich auch ein Beyspiel besitze, den gemeinschaftlichen Nabel zusammengewachsener Zwillinge, wovon ich ebenfalls ein Beyspiel besitze, und dergleichen Mehreres.

Membran der
ner unverwerf-
Nöberern *)
natio herniae
unem vestit,
anatomische Un-
erhalten Malen
Sahren gebilde.
Verlängerung
als der erwei-

Brüche eben
citirten Fäl-
ohne daß ich

ff.

esetzte von den
qui peuvent
seyn werde

ng des Heel-
83.

hale, Die Va-
die Hydrom-
ten des Ura-
Nabel, wels-
brüche haben,

Besorgniß, daß ein zu lang gelassener Rest der Nabelschnur Veranlassung zu einem Nabelbrüche geben könne, scheint mir, nach dem oben S. 10. Gesagten, ungegründet, außer insofern ein zu langer Rest der Nabelschnur zum Zerren und gewaltsamen Anziehen der Nabelgegend, etwa leichter Veranlassung geben möchte, als ein kürzerer. Heberstein dagegen (*funiculum bilicalis pathologia*, in Haller's *Selectus Dissertationum anatomicarum* Vol. V. §. XII.) behauptet gerade umgekehrt, daß von einer zu kurz, oder zu früh abgerissenen Nabelschnur ein Nabelbruch entstehen könne. Daß Letzteres wohl wahrscheinlicher seyn möchte, braucht wohl keines Beweises; da es in beiden solchen Fällen ohne Verletzung oder Schwächung des Nabels nicht füglich abgehen dürfte. Daß es indessen irrig ist, einen etwas kurz, übrigens aber gehörig abgeschnittenen und unterbundenen Nabelschnurrest, als Ursache von Nabelbrüchen anzusehen, haben schon Puzor ¹⁾ und Dehne ²⁾ gründlich dargethan.

S. 54.

Fast allgemein angenommen scheint der Satz: daß der Nabel des neugebohrnen Kindes eine Zeitlang schwächer bleibe, als der Rest der Wände des Unterleibes, folglich auch den, in dieser Höhle enthaltenen Eingeweiden, weniger Widerstand leiste. Heister ³⁾ schon setzte eine *laxitas umbilici*, oder eine *debilitas juxta umbilicum*, als

1) *Traité des accouchemens*. S. 316.

2) *Diss. de morbis recens natorum chirurgicis*. Lips. 1773. §. 11. S. 33.

3) *Institut. Chirurgiae*, pag. 225.

Ursache der Nabelbrüche an. Haller ¹⁾ schrieb: Peritonaeum debile cedit, ut intestina foetus in funiculum elabantur. Pott ²⁾, van Gesscher ³⁾ und Richter ⁴⁾ versichern das Gleiche. Sabatier ⁵⁾ hält das Bauchfell in dieser Rücksicht für desto nachgiebiger, je jünger das Kind ist. Auch Desault ⁶⁾ erklärt das kindliche Alter für dasjenige, welches den eigentlichen Nabelbrüchen am meisten ausgesetzt sey, und gründet sich dabey auf seine häufige Erfahrung, indem ihm unter zehn Nabelbrüchen neune, an zwei- bis vier- monatlichen Kindern vorkamen. Nach ihm zeigen sich dagegen im übrigen Lebensalter die falschen Nabelbrüche, welche um die Nabelöffnung entstehen.

Der Irrthum von Dionis ⁷⁾, welcher so dreist behauptete, bey seinen anatomischen Untersuchungen von Nabelbrüchen keinen Bruchsaft gefunden zu haben, verdient kaum mehr einer Erwähnung; da ihn schon längst Heister ⁸⁾ und Andere zu recht gewiesen haben.

Monro morbid Anatomy Lib 1811. pag. 506.

§. 35.

Schon lange hatte ich die Vermuthung, die sich durch eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung nur immer mehr bestätigte, nämlich: daß mechanische Fehler bey Behand-

- 1) Elementor. Physiologiae Tomo 8. S. 225.
- 2) In seinen Werken Deutsch, Berlin 1787. S. 339.
- 3) Oeffnung der Heelkonde, Deel I. S. 958.
- 4) Von Brüchen. S. 626.
- 5) Lehrbuch der praktischen Wundarzneykunst. S. 122.
- 6) Chirurgischer Nachlaß, herausgegeben von A. Bichat. S. 25.
- 7) Cours d'Opérations, Bruxelles p. 80.
- 8) a. a. D.

er Nabelschnur
konne, scheint
gründet, außer
zum Zerreiß
d, etwa leicht
rgerer. He-
lis pſtho-
rtationum
hauert gerade
u früh abgeri-
konne. Daß
braucht wohl
den ohne Ver-
füglich abge-
n etwas kurz-
unterdundenen
en anzusehen,
gründlich dar-

Satz: daß
eitlang schwä-
erleibes, folg-
geweiden, we-
ste eine laxi-
abilium, als
argicis. Lips.



lung des Nabels neugeborener Kinder, eine der häufigsten Ursachen zu Nabelbrüchen abgeben.

Gewöhnlich umwickelt man den Rest der unterbundenen Nabelschnur nicht nur mit einem Lappchen, sondern man bringt noch ein besonder Bäufchen von sechs- bis achtfacher Leinwand, ein sogenanntes Compresschen oder Pflasterchen auf einer Seite unter die Nabelschnur, oder zwischen den Bauch und die Nabelschnur, und bedeckt dann Alles mit der sogenannten Nabelbinde. Indem man aber den Rest der Nabelschnur auf solche Art seitwärts auf das Compresschen bringt; so wird eben dadurch der Hautcylinder (§. 3.) auf der entgegengesetzten Seite gewaltsam herausgezogen und gezerrt, folglich an dieser Stelle übermäßig ausgedehnt, geschwächt und zum Bruche geneigt gemacht. Man handelt also dem Proceffe der Natur, welche diesen Hautcylinder zur Bildung des Nabelgrübchens gleichsam versenkt oder in die Haut hineingeschoben haben will, schnurstracks entgegen. Freylich ist diese krankhafte, zu Brüchen disponirende, durch solche mechanische Mishandlung bewirkte, Veränderung der Nabelgegend anfangs nur den Augen des Sachverständigen bemerkbar. Wenigstens sah ich selbst ganze Familien, wo alle Kinder Nabelbrüche bekamen, welche von zu geschäftigen Hebammen und Wartfrauen auf die oben beschriebene Art behandelt wurden; dahingegen Hebammen und Kindbetterinnen, die meinem Rathe folgten, nur ein zartes Lappchen, der Reinlichkeit wegen, ohne Unterlegung von Compressen leicht um den Rest der Nabelschnur wickelten, und alles Ziehen und Zerrren sorgfältigst vermeiden, das Vergnügen hatten, natürlich, das ist schön gebildete, Nabel zu erhalten.]

Sehr richtig behauptet daher der verdienstvolle erfahr-

ne Sta
Nabelschnur
Käler ?)

Auch
das die un
ter Nabelbr

So (s
unter den
und vermut
neugebore

Die
hat Geleg
wie ein He
doch auch

Ger
das, in
Milken od
Nabelschn
men oder

Um
frühe be
näher au

1) Bra

2) Ver

3) Tra

delph

4) Medi

ne Starke ²⁾, daß durch zu großes Anspannen der Nabelschnur sich Nabelbrüche bilden. Das Gleiche behauptet Köbler ³⁾.

Auch Moses Vertram ⁴⁾ schreibt ausdrücklich, daß die unrechte Behandlung des Nabels, die Ursache vieler Nabelbrüche der Negerkinder sey.

So sagt auch Blumenbach ⁵⁾: Daß Nabelbrüche unter den Negern sehr gemein sind, ist wohl ausgemacht, und vermuthlich der Vernachlässigung des Nabels bey den neugebohrnen Kindern zuzuschreiben.

Die Nabel von Negern und Negerinnen, die ich zu se-
hen Gelegenheit hatte, waren rundlich hervorragend,
wie ein kleiner Bruch, anzufühlen. Inzwischen giebt es
doch auch bey ihnen vertiefte Nabel.

§. 36.

Eben so gefährlich scheint mir, aus gleichen Gründen, daß, in manchen Ländern aus einem Vorurtheile übliche, Melken oder Ausstreichen des Blutes aus dem Niste der Nabelschnur, besonders wenn dies rohe grobhandige Hebammen oder Wartfrauen verrichten.

§. 37.

Um aber der oben geschilderten Entstehung der Nabelbrüche bey Kindern in den ersten Lebensmonaten, noch näher auf den Grund zu kommen, und die Stelle auszu-

- 1) Archiv, Dritter Band. S. 92.
- 2) Versuch über die Ursache der Brüche. S. 13 und 86.
- 3) Transactions of the College of Physicians of Philadelphia, Vol. 1.
- 4) Medicinische Bibliothek, Band 2. S. 641.

*in
auf dem Körper sind
Es in Negerkindern
mit Nabelbrüchen
Monro (Kerbid
Anat. p. 594.*

*H. F. v. M. Pflüg
2. 8. 1735. gegen
Mefuror. S. 107. der
Mefuror. v. v. v. v. v.
g. alle.
Mefuror. d. d. d. d. d.
x. 50.
1813*

mitteln, wo sich etwa am häufigsten oder gewöhnlichsten die Brüche erzeugen, habe ich ganz eigene genaue anatomische Untersuchungen angestellt, und, wenn ich nicht sehr irre, völlig befriedigende Resultate erhalten, die ich hier kürzlich mittheilen, und durch beyliegende Zeichnungen deutlich machen, auch durch das Zeugniß berühmter Schriftsteller bestättigen will.

Der Raum nämlich, der sich zwischen dem oben (§. 5.) beschriebenen, oberen sehnigen Bogen des Nabelringes und der Vene der Nabelschnur befindet, besonders auf ihrer rechten Seite, scheint mir diejenige Stelle, wo sich am gewöhnlichsten Nabelbrüche erzeugen. (Fig. 2. 3. 4. 6.)

Hier nämlich befindet sich das Bauchfell der wahren Haut so nahe, daß beide von einander nur durch lockeren Zellstoff und einige Fettklumpchen getrennt werden.

Eine sehr deutliche sinnliche Vorstellung von einer solchen Entstehung des Nabelbruchs erlangt man, sobald man an dieser Stelle, selbst ehe noch von ihr das Bauchfell völlig abgelöst worden, eine knöpfige Sonde einbringt, und mit solcher ein wenig von innen nach außen drückt.

Falls also die im Bauche enthaltenen Eingeweide gegen den Nabelring so heftig gedrückt oder gedrängt werden, daß ein Vortreten oder Vor derselben erfolgen kann; so werden sie am Nabelringe diese Stelle vorzüglich dazu geneigt finden. Der übrige Theil des Nabelringes dagegen ist theils durch die Nabelvene, theils durch die Arterien so ausgefüllt, daß dadurch ein Vordringen der Eingeweide gehindert wird. Am wenigsten zum Nachgeben geeignet scheint der untere Rand des Nabelringes. S. §. 5.

Daß aber diese Darstellung keine bloße Vermuthung sey, das bestättigen zwey Fälle von Nabelbrüchen, die ich in

Brüchen
Stücke aufhebe
Fig. 6. verlei

An dem
Nabelring
wenig erken
dem oberen
Nabelvene
falls überzeu
und Verdä
daß die eig
unter ge
bar von der
Stoffe der

Woll
ich an der
sterken
Nur groß
ganß deut
sehnigen R
des Nabel
(Fig. 3.)
geschobene

2) De h
be des
theils

Weingeiste, so wie die übrigen hieher gehörigen Beweisstücke aufhebe, und deren eins ich deshalb in einer Abbildung Fig. 6. vorlege.

Sechste Beobachtung.

An dem Nabel eines Knäbchens von etwa drey Jahren bemerkt man einen kleinen Nabelbruch. Inwendig erkennt man deutlich, daß sich der Bruchsack unter dem oberen Bogen des Nabelringes zu rechten Seite der Nabelvene gebildet hat. Auswendig erkennt man ebenfalls überzeugend deutlich rechts, die rundliche Erhebung und Verdünnung der Bauchdecken zu einem Bruche, so daß die eigentliche Narbe des Nabels etwas links ¹⁾ herunter geschoben erscheint. Der Bruchsack selbst ist offenbar von dem Bauchfelle gebildet, und sogar leicht vom Zellstoffe der wahren Haut trennbar.

Siebente Beobachtung.

Völlig das Nämliche, nur in größerem Maasse, finde ich an dem Nabelbruche eines 40jährigen wasserflüchtig gestorbener Mannes. Der ungefähr eine halbe welsche Nuß große Bruch (Fig. 5.) zeigt inwendig (Fig. 6.) ganz deutlich seine Mündung unter der oberen Hälfte des sehnigen Bogens des Nabelringes, rechts an der Seite des Nestes von der ehemaligen Nabelvene. Auswendig (Fig. 5.) ist ebenfalls, in Rücksicht der eigentlichen links geschobenen Narbe des Nabels, der Bruchsack rechts be-

1) Dehme am ang. Orte S. 33. bemerkt, daß die Narbe des Nabels bey großen Nabelbrüchen sich mehrentheils links befinde.

findlich; auch hier ist der Bruchsaek eine wahre Verlängerung und Vortreibung des Bauchfelles, welcher sich ebenfalls leicht von der wahren Haut abschälen läßt.

Achte Beobachtung.

An den äußerst mageren Bauchdecken eines, wenige Wochen alten Mädchens, finde ich die deutliche Anlage zu einem Nabelbruche, ebenfalls rechts zur Seite und über dem Niste der Nabelvene, welche von innen als eine Vertiefung, von außen als eine Erhöhung, und gegen das Licht gehalten als eine Verdünnung der Bauchdecken erscheint.

§. 38.

Eben dieselben Bemerkungen sah ich gar oft an lebendigen Kindern und Erwachsenen bestätigt; und selbst wenn der Nabelbruch als ein Cylinder oder Würstchen hervorstand, oder gar herabhing, schien er sich mehr rechts in Rücksicht der eigentlichen Narbe des Nabels zu befinden.

Ganz hiermit überstimmend schrieb schon J. G. Günz¹⁾: *Herniae umbilicales, quas ad minimum in adultis vidimus, omnes supra umbilico a latere lineae albae fuerunt.* Und Buchholz²⁾ oder wahrscheinlich Lobstein: *Si peritoneum versus anulum cederet, forte non sic cedit, ut ante se omnia illa vasa propellat, verum ut a latere inter venam arteriamque*

1) *Observationes anatomicae de herniis.* Lips. 1744. pag. 72.

2) am ang. Orte, Seite 24.

alterutram parvum aliquem sinum formet, qui amplior factus tunc herniam ad latus annuli efficere potest. Und Chopart nebst Desault: Aux adultes la cicatrice ombilicale est le plus souvent à l'un des côtés de la hernie.

Ja selbst die angebohrnen Nabelbrüche finde ich meistens an der gleichen Stelle. Um mich nicht bloß auf meine eigene dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente und achte Beobachtung zu stützen, so betrachte man nur die trefflichsten Abbildungen von Albinus, Wrisberg, Sömmerring und Sandifort, und nehme dazu Morgagni's Bemerkung, die ich oben S. 29. citirt habe; so wird man dieses Resultat vollkommen bewiesen finden.

Bisweilen wird die Vernarbung des Nabels durch Unreinlichkeit, oder Unruhe des Kindes, oder auch wohl durch sogenannte Schärpen im Körper weit über die gewöhnliche Zeit aufgehalten. Indessen entsinne ich mich nicht, so oft ich deshalb zu Rathe gezogen worden, daß ohne andere hinzukommende Umstände bloß aus dieser Ursache allein ein Nabelbruch entstanden wäre.

§. 39.

Allgemein angenommen ist die wohlgegründete Meinung, daß oft durch bloßes heftiges Schreien der Säuglinge ein Nabelbruch entsteht; welches auch sehr begreiflich ist, indem es das gehörige Schließen des Nabelsringes hindert, besonders, wenn auf die oben (S. 35.) beschriebene Art, schon eine kleine Anlage dazu bewirkt worden ist. Wie sehr sich ferner durch das Weinen und Schreien ein Nabelbruch vergrößern muß, kann man aus der starken Spannung des Bauches schließen, welche man mit eigenen Augen

und Händen bey solchen Gelegenheiten an Kindern wahrnimmt. Um dieses zu verhüten, rath man daher, die sogenannte Nabelbinde längere Zeit fort anlegen zu lassen. Allein ob der Nutzen dieser Binde den anderweitigen offenbaren Nachtheil derselben aufwiegt, läßt sich noch bezweifeln. Denn falls auch wirklich die gewöhnliche Nabelbinde einen Nabelbruch verhütet; so veranlaßt sie dagegen gar leicht Leistenbrüche. Zudem schützt ja diese Binde nicht die eigentliche Nabelgrube, sondern liegt ja nur brückenartig über dieselbe hingespant.

§. 40.

Daß ein starkes Pressen oder Anstrengen der Kinder bey dem Stuhlgange, wozu sie besonders Hartleibigkeit nöthigt, auch Nabelbrüche veranlassen und einklemmen könne, bedarf wohl keines besonderen Beweises.

§. 41.

Das Legen der Kinder auf den Rücken, klagt besonders *Sabatier* ¹⁾ als eine Ursache von Nabelbrüchen an.

§. 42.

Schnürbrüste, die man, wenigstens ehemals, selbst zarten Kindern anlegte, werden besonders von *Walter Vaughan* ²⁾ als Nabelbrüche erregend angesehen.

1) S. 122. a. a. D.

2) An Essay philosophical and medical, concerning modern Clothing, Rochester, 1792. Deutsch Leipzig 1793. und S. Th. Schmerring über die Wirkung der Schnürbrüste. Berlin 1794.

*Selbst Meuro
Nebst anst. p. 304
im Buch dieses
Verf. 1791*

Eine der Hauptursachen, welche nächst den Schnürbrüsten bey den Frauenzimmern in Holland und Deutschland Nabelbrüche verursachen, sind ganz offenbar ihre vielen und schweren Röcke. Diese weiblichen Röcke nämlich hängen bloß, dadurch am Unterleibe, oder auf dem Bauche, daß ihr oberer Rand, der sogenannte Bunt des Rockes, oder die Leine des Rockes, eine tiefe Furche, Hohlleiste oder Hohlkehle in der Höhe der Hüftbein-Kämme in die Bauchdecken eindrückt oder einschneidet; daher die unter dieser Furche sich sackförmig oder wulstartig erhebende Gegend unter dem Nabel zum Aufhalten der Röcke dient, und selbige nicht hinab gleiten läßt. Ich bin überzeugt, daß die täglich mehr Mode werdenden Chemisen über kurz oder lang allgemeinen Beyfall, auch bey den gemeinen Leuten, finden werden, weil sie, außer andern empfehlungswerthen Eigenschaften, auch den negativen Vortheil gewähren, daß sie zuverlässig keine Brüche veranlassen.

S. 44.

In wiefern die jetzt modischen, sogenannten elastischen Hosenträger, durch gewaltsame Zusammenschiebung und Verkürzung des Rumpfes im Allgemeinen, und der Bauchhöhle insbesondere, zu Nabelbrüchen bey Knaben und noch nicht ausgewachsenen Jünglingen Gelegenheit geben, wage ich nicht zu entscheiden. Sehr verdächtig scheinen sie mir in dieser Hinsicht immer.

S. 45.

Daß die sogenannte englische Krankheit oder Nha-

chitis Ursache eines Nabelbruches abgegeben habe, führt
S. Sprunt ²⁾ aus eigener Erfahrung an.

§. 46.

Schlechte, schwer verdauliche, schleimige, fette, öli-
ge Speisen halten Günst ²⁾ und Blumenbach ³⁾ für
eine veranlassende Ursache von Brüchen.

§. 47.

So wird auch feuchte, dumpfige, dunkle, sumpfige
Wohnung von Bosch ⁴⁾, Bicker ⁵⁾, Michel ⁶⁾, und
Sprunt ⁷⁾, wenigstens als vorbereitende Ursache von Na-
belbrüchen angesehen.

§. 48.

Sabatier ⁸⁾ meynt, daß bey fetten Menschen die
Schwere des Netzes eine Ursache von Nabelbrüchen abge-
ben könnte. Indessen bemerkte van Gesscher ⁹⁾, daß
nicht immer bey fetten Menschen die Netze sich durch vieles
Fett auszeichneten.

§. 49.

-
- 1) Preißschrift S. 10.
 - 2) de herniis.
 - 3) Medicinische Bibliothek, Band 2. S. 41.
 - 4) Verhand. d. H. M. d. W. te Haarlem, Deel XVIII.
 - 5) Vertoog over de Oorzaaken de Zenuwziekten in
ons Land.
 - 6) Verhand. v. h. Z. G. de W. te Vlietsingen, Deel XI.
 - 7) Preißschrift S. 12.
 - 8) Lehrbuch der praktischen Chirurgie.
 - 9) Hedendagsche Oeffeningen der Heelkunde, Deel I.

§. 49.

Richter ¹⁾ bemerkt, daß sehr fette Personen, wenn sie mager werden, oft Gefahr laufen einen Nabelbruch zu bekommen, und führt Warner ²⁾ als Gewährsmann an.

§. 50.

Nicht selten sieht man, daß durch die starke Ausdehnung eines Bruches während der Schwangerschaft, der Nabel sich herausgibt, wie man es nennt, und einen wahren Bruch bildet, oder daß ein schon vorhandener eingeklemmt wird. Besonders schien mir jedoch dieses der Fall bey solchen Weibern, die vorher keinen gutgebildeten Nabel hatten, oder bey denen, die schwere Entbindungen ausgestanden, überhaupt aber bey solchen, die eine vorzüglich schlaffe Haut besitzen. Aus der Menge von Beobachtungen, die hierüber bey Schriftstellern existiren, will ich nur einige der vorzüglichsten älteren und neueren anführen. Franz v. Hilden ³⁾, Sennert ⁴⁾, le Dran ⁵⁾, Heister ⁶⁾, Smellie ⁷⁾, Baudelocque ⁸⁾, Rich-

§. 49.

- 1) Abhandlung von den Brüchen, 2te Ausg. 1785. S. 632.
- 2) Cases of Surgery, S. 168.
- 3) Observationes chirurgicae, p. 896.
- 4) Pract. p. 112. 115.
- 5) Chirurgische Beobachtungen, übersetzt v. Trem. 1744. S. 105.
- 6) Institutiones chirurgicae, Cap. CXIV, §. 3.
- 7) Midwifry, Vol. 2.
- 8) Entbindungskunst, Theil. 1. §. 109.

ter ¹⁾, Dupuy ²⁾, Lettsom ³⁾, Stark ⁴⁾. Die Entstehung des Nabelbruchs bey dieser Gelegenheit ist sehr begreiflich: der sich vergrößernde Uterus nämlich schiebt und drängt die Därme und übrigen Eingeweide vor sich her, die überall einen Ausweg suchen, folglich gegen die weiße Linie und den Nabelring an einem, von Muskelfasern freyen und deshalb schwächeren Theile, das Bauchfell unter die Bauchdecken mit sich vortreiben. „Wenn man bedenkt, sagt Richter, wie sehr bey Schwangern vorzüglich die Nabelgegend ausgedehnt wird, und wie gewaltsam diese Gegend bey der Geburt durch die Wirkung der Bauchmuskeln gegen den Boden der Gebärmutter gedrückt wird; so kann man sich nicht wundern, daß unter den Erwachsenen vorzüglich bey Frauenzimmern Nabelbrüche beobachtet werden.“ La Chausse ⁵⁾ sah daher einen Nabelbruch bey einer Schwangern durch das bloße Ausstrecken der Hand entstehen. Doch bemerkt Laffie ⁶⁾ S. 62. richtig, daß ein Nabelbruch gegen das Ende der Schwangerschaft vergeht, nach der Niederkunft aber wieder erscheint.

§. 51.

Alte Leute, die von Krankheiten genesen, sollen, nach Le Dran ⁶⁾, sehr den Nabelbrüchen ausgesetzt seyn.

- 1) Abhandlung v. d. Brüchen. S. 631.
- 2) Verhandelingen v. h. Zeeuwisch, Genötsch d. W. te Vliessingen, Deel XIII.
- 3) Memoirs of the Medical Society of London, 1792. Vol. III.
- 4) Archiv, dritter Band. S. 122. u. f. f.
- 5) Diss. de Hernia ventrali, Argentor. 1746, in Haller's Diss. chirurg. Tomo. 3.
- 6) Opérations de Chirurgie. p. 70.

§. 52.

Daß auch durch verschiedene Krankheiten Nabelbrüche verursacht, und schon vorhandene eingeklemmt werden, beweisen Theorie und Erfahrung. So sah Desault ¹⁾, so wie auch ich selbst, durch den Reichhusten Nabelbrüche entstehen. So braucht es wohl kaum eines eigenen Beweises, daß durch heftige Windkoliken ein Nabelbruch entsteht. Spulwürmer habe ich selbst mehrere Male lebendig durch den Nabel herauskommen sehen; welches wenigstens den Andrang der Därme gegen den Nabel beweist. Ich fand selbst in einem, dem Knaben kaum beschwerlichen Falle, jedesmal den Wurm, spiralförmig gewunden, in der Erhöhung des Nabels, einige Zeit lang liegen, ehe er lebendig herauschlupfte. Muralt ²⁾ beobachtete einen, von Würmern entsprungenen, eingeklemmten und in Eiterung übergegangenen Nabelbruch. Mehrere Fälle, z. B. von Blegny, Gooch, Hamilton, Stalpart, van der Wiel u. s. f. hat Ploucquet ³⁾ gesammelt.

§. 53.

Eine der Krankheiten, welche am häufigsten Nabelbrüche zu verursachen pflegen, ist bekanntlich die Wassersucht. Das Beyspiel, welches ich davon besitze, ist Fig. 6. abgebildet. Einen noch größeren bildet Purmann ⁴⁾ ab. Die Entstehungsart ist hier eine ähnliche, wie in dem Falle einer Schwangerschaft. An den, sich oft ungeheuer aus-

- 1) in der Obs. I. a. a. D.
- 2) Ephemerides Nat. Cur. Decas II, ann. 5.
- 3) Initia Bibliothecae medico-practicae Tom. VIII.
- 4) Chirurgia curiosa, Tab. V.

ausdehnenden Bauchdecken, widersteht nämlich die weiße Linie mit der Spur ihres ehemaligen Nabelringes weniger, als die übrigen Stellen, weil sie durch keine lebendige Muskelfasern bedeckt und geschützt wird. Rechnet man hierzu noch die allgemeine Erfahrung des ganzen Körpers, und der Bauchhöhlenwände insbesondere; so ist die Entstehung um so begreiflicher. Diese Ausdehnung und der Andrang des Wassers geht so weit, daß *Donald Monro*¹⁾ und *Warner* sogar einen solchen Nabelbruch plagen sahen. „Die Bedeckungen eines solchen Bruchs, bemerkt *Nichter*²⁾, der gemeiniglich nichts als Wasser enthält“, sind oft so dünn, daß der Bruch fast ganz durchsichtig ist, und zu großer Beschwerde des Kranken wohl gar aufbricht, wie *Koonhuyzen*³⁾ zwey solcher Fälle sah.

§. 54.

Einen, durch das Brandigwerden der Nabelgegend entstandenen Bruch, beobachtete *Bonn* in folgendem Falle, den er *Herrn Spruyt*⁴⁾ mittheilte. „Eine Frau legte gegen Kolikschmerzen heiß gemachte irdene Teller bloß auf die Haut. Es entstand heftige Entzündung und Brand. Nach Ablösung des Brandigen heilte die Stelle mit einer vertieften und schwachen Narbe zu. Diese nicht hinreichend starke Stelle konnte dem andauernden Drucke der

1) *On Dropsy*, p. 217. In der Note a. giebt er auch einige Litteratur über solche Fälle, die er *Appendages of the Ascites* nennt.

2) a. a. D. S. 631.

3) *Obs.* XII. et XIII.

4) *Preischrift*, S. 32.

Eingeweide keinen hinreichenden Widerstand leisten; sie war daher von neuem aufgebrochen; worauf das Bauchfell, welches durch die in ihm enthaltenen Eingeweide in einen Sack verlängert worden war, aus dem Grunde des Geschwürs sich erhob und aus dem Körper heraus trat.“

§. 55.

Zu den seltenen Fällen gehört wohl das Entstehen eines Bauch- und Nabelbruches bloß durch heftiges Niesen, wovon Blegny ¹⁾ ein Beyspiel anführt: oder das Entstehen eines Bauchbruchs an der Seite des Brustbein-Knorpels durch Tanzen, wovon Garengeot ²⁾ ein Beyspiel liefert, welches einen jungen Menschen betraf, der die Schultern bey dem Tanzen plötzlich und gewaltsam von einander gezogen, und zugleich die Arme einwärts bewegt hatte. Oder seltener durch heftiges Erbrechen, wovon jedoch Fabricius Hildanus ³⁾ einen Fall anführt: oder durch Reiten, welches die Breslauer Aerzte als Ursache von Nabelbrüchen angeben ⁴⁾. Daß entstandene Nabelbrüche bey solchen Gelegenheiten Einklemmung befürchten lassen, ist wohl begreiflich.

§. 56.

Daß ferner von Anstrengung, und anderer heftiger und anhaltender Leibesbewegung Nabelbrüche entstehen,

-
- 1) Zodiacus medicus Gall. Ann. 2.
 - 2) Mémoires de l'Acad. de Chirurgie, Tome III.
 - 3) Operum, p. 915.
 - 4) Historia morborum Vratislaviae 1701 grassatorum, p. 25.

nämlich die weiße
Nabelringes weni-
ge durch keine leben-
get wird. Nichts
Nahrung des ganzen
insbesondere; so ist
Diese Ausdehnung
eit, daß Denald
solchen Nabelbruch
solchen Bruch,
als Wasser ent-
fast ganz durch-
Kranken wohl
zwey solcher

Nabelgegend
folgendem Fal-
e. „Eine Frau
dene Teller blas-
ung und Brand.
Stelle mit einer
se nicht hinrei-
den Drucke der
zieht er auch ei-
er Appendages

und entstandene eingeklemmt werden, beweisen viele Beispiele. *Campers* ¹⁾ leitet die häufigen Nabelbrüche der Negersklaven von der harten Arbeit her, die diesen Unglücklichen auferlegt wird. Dies ist uns so mehr der Fall, als ich oben §. 53. schon bemerkte, daß Verwahrlosung ihrer Nabel in den ersten Lebenstagen sie besonders dazu disponirt macht. *Günz* ²⁾ führt den Fall von einem Manne an, der beym Heben einer Last auf die Schulter, die Entstehung seines Nabelbruchs spürte. Desgleichen sah *Campers* in Knaben den Nabel sich herausgeben, das ist, einen Nabelbruch entstehen, welche sich mit einem Arme an einen Baum aufhingen, oder sich mit angehaltenem Athem gewaltig streckten, um etwas hoch Liegendes zu ergreifen. Auch Andere ³⁾ sahen öfters bey Treppen hinauf Klimmenden Lastträgern, besonders gleich nach eingetommener Mahlzeit, Nabelbrüche entstehen.

Daß durch das Fallen von einer beträchtlichen Höhe Nabelbrüche entstehen, findet man ebenfalls angemerkt. So schildert *Reichmeyer* ⁴⁾ mit *Creiling*, in einer eigenen Schrift, ein Beispiel, wo durchs Fallen von einer Höhe in einem neunjährigen Mädchen ein Nabelbruch ent-

1) Verhandelingen v. d. Hollandsche Montsch. d. N. v. te Haarlem, Deel. VII.

2) Obs. de herniis p. 67. und 71.

3) Die Verfasser der *Historia Morborum Vratislaviae* 1701. grassatorum, p. 25.

4) De Exomphalo inflammato, exulcerato, et postea consolidato, Jenae 1738, in *Haller's* Diss. chirurg. wieder abgedruckt.

stand, welcher, ungeachtet er aufbrach, und einen Wurm nebst Speisen heraus ließ, dennoch glücklich geheilt wurde. So fand Paignaud ¹⁾ eine eyrunde Geschwulst in der Nabelgegend, in einem, aus dem vierten Stocke aufs Steinpflaster gestürzten Kinde. Inwendig war das Bauchfell geplast. In zwey Fällen sah Heuermann ²⁾ durch einen Stoß mit einem Fuße einen Bauchbruch entstehen, Schmeucker ³⁾ einen Nabelbruch durch den Stoß eines Wagens sich einklemmen, und Ficker ⁴⁾ durch einen Sturz vom Pferde einen Nabelbruch entstehen.

§. 58.

Daß ein starker Schlag auf den Bauch einen Nabelbruch sowohl verursachen, als zu seiner Einklemmung beytragen kann, lehren ebenfalls Beyspiele. Aus dieser Ursache sah Mery ⁵⁾ einen Nabelbruch entstehen, und Heister ⁶⁾ ist derselben Meynung.

§. 59.

Hey allen diesen mannigfaltigen Indispositionen, welche zu solchem Vorbringen der Eingeweide des Unter-

1) in Desault Journal de Chirurgie, Paris 1791. Tome I. Art. 45.

2) Chirurgische Operationen, §. 225.

3) Chirurgische Wahrnehmungen, Obs. 15. Seite 221.

4) In Richter's Chirurgischer Bibliothek im 15ten Bande Seite 609.

5) Mémoires de l'Acad. des Sciences à Paris 1714.

6) Nabelbrüche, die nämlich durch den Nabelring bey Erwachsenen gingen. Henkel, Med. chirurg. Beobach. Berlin 1779. bey einem alten Nabelbrüche.

leibes, oder sowohl zu wahren als unächten Nabelbrüchen und ihrer Einklemmung, Ursache und Gelegenheit geben, scheinen dennoch wenigstens bedeutendere Nabelbrüche in weit geringerer Anzahl, als Leisten- und Schenkelbrüche vorzukommen. Monnikhoff¹⁾ bemerkt, in seinen höchst interessanten Verzeichnissen über die verschiedenen Brüche, im ersten Tausend nur 53 Nabelbrüche, und im zweiten Tausend nur 38 derselben. Und Camper²⁾ berichtet uns, daß unter 1968, also fast zweytausend Bruchbändern, die man zu Amsterdam von dem Jahre 1744 bis 1758 an Arme³⁾ austheilte, nur 10 sich für Nabelbrüche befanden.

Auch scheinen, der nämlichen Monnikhoffschen Berechnung zufolge, Nabelbrüche bey dem weiblichen Ge-

- 1) Verhandelingen u. o. d. H. Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem, Siebenzehnter Theil 1777. S. 252. und seine Verhandeling over de Breuken S. 41.
- 2) Dissertatio de Hydrope, 1782 in den Mémoires de la Sec. Roy. de Médecine à Paris. Vol. VI. und in den Dissertationibus decem, die 1800 herausgegeben wurden, in Vol. II. S. 522.
- 3) Eigentliche oder durch den Nabelring erfolgende Brüche scheinen selten. Der, eine ausgebreitete Erfahrung habende Petit, (Oeuvres posthumes, Tome 2. page 220.) sah in Erwachsenen nur zweymal durch den Nabelring Brüche erfolgen; daher er behauptet, daß in Erwachsenen unter hundert Nabelbrüchen nicht zwey durch den Ring erfolgen, welche doch bey Kindern gewöhnlich an dieser Stelle sich befinden.

Auch nach Fajol, Avis au Peuple sur les Hernies, Paris. 1781, dringen Nabelbrüche selten durch den Bauchring.

Schichte
unter jenen
von jenen 58
worden.

Überhan
andere Brüche
zukommen.

Ehe i
verdient n
chirurgische
gewöhnlich
den Bru
Bruch (a
rung. D
que le p
mais no
j'ay lep
vert p
mes riv
pa rema
rement
Exempl
Erwachs
werden
Garen

1) Cou
2) In
3) Mém

schlechte öfter als bey dem männlichen vorzukommen. Denn unter jenen 33 waren 8 an Männern, 25 an Weibern; und von jenen 38 nur 9 an Männern, 28 an Weibern bemerkt worden.

Überhaupt scheinen Nabelbrüche nicht so plögl ich, als andere Brüche, zu entstehen, auch sich nicht so leicht einzuklemmen.

S. 60.

Ehe ich die Beantwortung der ersten Frage schließe, verdient noch das Resultat der besten anatomischen und chirurgischen Untersuchungen über den Punkt: Ob ein gewöhnlicher, durch den Nabelring erfolgender Bruch, einen vom Bauchfelle gebildeten Bruchsacl habe oder nicht, eine besondere Erwöterung. Dionis ¹⁾ schrieb nämlich ganz dreist: J'avoue, que le peritoine peut prêter dans toute son étendue, mais non pas dans l'ombilic; et j'ose dire, que j'ay l'epérience de mon côté, puisque j'ay ouvert plusieurs de ces tumeurs, et à des hommes vivans et à des corps morts, où je n'ay jamais pu remarquer que le peritoine les tapissast intérieurement — je persiste que la nature seule fait les Exomphales. Ungeachtet man gegen diesen Beweis das Sprüchwort: „Wer zu viel beweist, beweist nichts,“ anwenden könnte; so stimmten ihm doch (La Faye ²⁾ und Garengeot ³⁾ bey. Man sollte sich freylich mit der Zu-

1) Cours d'Opérations en Chirurgie, Bruxelles 1708 S. 80.

2) In seinen Noten zu Dionis Werken, page 107. Not. a.

3) Mémoires de l'Acad. Roy. de Chirurgie, Tome 3.

rechtweisung begnügen, die Herrn **Diomis** und Herrn **Lafaye**, der weit geschicktere und zuverlässigere Heister¹⁾, und dem durchaus verdächtigen **Garengeot**, oder taktfestere gründliche Zergliederer **Günz**²⁾ ertheilten; wenn nicht **Petit's** Ansehen³⁾ sogar die angesehensten Wundärzte bis auf den heutigen Tag immer noch irre machte.

Allein nicht nur der geübte **Barbette**⁴⁾ schrieb: „In apertis dissectisque cadaveribus aliquoties (man merke diese Stelle wohl!) expertus sum et demonstravi, umbilicum cum subsequentibus intestinis instar capitis virilis protuberasse, adeo ut muscoli ventris recti à se invicem separarentur: attamen peritoneum erat expansum, sed nusquam disruptum; sondern auch der erfahrenste Brucharzt **Arnaud**⁵⁾, und der wackere **ten Haf's**⁶⁾, fanden einen vom Bauchfelle gebildeten Bruchsaack bey ihrer Operationen der Nabelbrüche. **Shary**⁷⁾ fand ebenfalls bey der Operation

- 1) Institut. chirurgicae, Cap. XCIV. §. 15., und in seinen Wahrnehmungen 462. Beobachtung.
- 2) Obs. anatomico-chirurgicae de Herniis, Cap. XV. in der Note c und d.
- 3) Traité de maladies chirurgicales, Ouvrage posthume, Paris. 1774. Edit. 1740. p. 232. „Il n'y a jamais de sac dans le hernies de l'Ombilic“, sind seine Worte. Sein Grund ist bloß theoretisch, nämlich daß Peritoneum sey zu sehr mit der linea alba verwachsen.
- 4) Opera chirurgico-anatomica, Lugd. Batav. 1672. Seite 55.
- 5) Traité des Hernies.
- 6) Verhandelingen v. d. H. Maatschapye d. W. te Haarlem, Deel VIII.
- 7) Operations of Surgery, Cap. VII. und Criticael Inquiry, Lond. 1754. S. 120.

eines Nabelbruchs einen Bruchfack, vom Bauchfelle gebildet, nur an einigen Stellen geborsten 1). Dieses Reißen des Sackes vom Bauchfelle in allen Nabelbrüchen, hält noch der große Wundarzt Pott 2) für die Ursache des Zweifels an seiner Existenz. Desgleichen fanden der unbefangene Schäfer 3), und der würdige, redliche Schmucker 4), bey ihren Operationen eingeklemmter Nabelbrüche, offenbar einen vom Bauchfelle gebildeten Bruchfack. Auch versichert Heuermann 5), bey der Section eines Nabelbruchs nach dem Tode, gleichfalls einen dicken Bruchfack vom Darmfelle, wahrgenommen zu haben. Saviard 6), so wie auch sein Herausgeber le Rouge 6), fanden bey Nabelbrüchen, wahre von Darmfelle gebildete Bruchfäcke. Mit vollem Rechte erklärt daher der berühmte Leidner Anatom, Ed. Sandifort 7), das Zeugnen des Bruchfackes für einen Irrthum: Error est, herniam umbilicalem rupto peritoneao fieri, plerumque saccatae sunt. Auch Lögger 8) nahm den Bruchfack bey einem großen alten Nabelbruche wahr. Mein würdiger gelehrter Freund,

- 1) Man vergleiche hiemit oben den S. Lond. 1774. S. 120.
- 2) On Ruptures Sect. XI.
- 3) Fünfte Sammlung med. und chirurg. Anmerkungen, Berlin 1750. Seite 16.
- 4) Chirurgische Wahrnehmungen, 2ter Theil, Berlin 1774. Beob. 15. S. 221.
- 5) Von den chirurgischen Operationen, Copenhagen 1775. S. 270. S. 536.
- 6) Recueil d'Observations chirurgicales par Saviard, commentées par le Rouge, Paris 1784.
- 7) Observationes anatomico-pathologicae, Cap. IV. p. 75.
- 8) Preisschrift über die Brüche. S. 19.

ienis und Herrn
 läufiger Heiser
 ngeet, der taufte
 erhalten; wenn
 angesehenen Wund-
 noch irre machte.
 ebette *) schrieb:
 us aliquoties
 ertus sum et de-
 sequentibus inte-
 erasse, adeo ut
 a separarentur:
 sed nusquam
 e Bruchfackt ir-
 fanden einen vom
 Operationen der
 bey der Operation
 15, und in fei-
 ng.
 is, Cap. XV. in
 Ouvrage post-
 12, „Il n'y a ja-
 mblic“, sind seine
 isch, nämlich das
 alba verwachsen.
 gd. Batav. 1672.
 d. W. te Haar-
 Critical Inqui-

S. N. Fischer theilte mir einen Fall mit, wo ein großer Nabelbruch anatomisch untersucht, und der von Bauchfelle gebildete Bruchsack deutlich dargelegt wurde. Treffend urtheilt daher Richter ¹⁾: „Es ist wirklich schwer zu begreifen, warum diese Brüche keinen Bruchsack haben sollten. Hinter dem Nabelringe liegt ebensowohl das Darmfell, als hinter der weißen Linie; und folglich kann durch den Nabelring eben so wenig, als durch eine Spalte neben demselben, irgend ein Eingeweide der Bauchhöhle dringen, ohne das Darmfell vor sich her in einen Sack auszudehnen.“ Fand man nun selbst in den größten Nabelbrüchen einen Bruchsack; so wird dieser auch wohl in den mittleren und kleineren vorhanden seyn. Wenigstens fand ich in allen von mir untersuchten Fällen wahrer Nabelbrüche, ganz offenbar den vom Bauchfelle gebildeten Bruchsack. Aus Allem diesen ziehe ich nun den allgemeinen Schluß: daß die bewährtesten anatomischen und chirurgischen Beobachtungen einen vom Bauchfelle gebildeten Bruchsack gezeigt und bestätigt haben (ont appris et confirmé).

Nach Lassus, Pothologie chirurgicale, Paris 1806. p. 63. il est certain, que le peritoine forme au nombril un sac herniaire, comme il en forme un pour les hernies de l'aine, mais il est quelquefois si mince, et tellement adhérent à l'aponeurose, qui forme la ligne blanche dans le région ombilicale, qu'il semble ne point exister. In einem Falle fand er den Bruchsack nicht, weil die Bauchdecken zu fein waren, que nous ne pûmes les inciser sans ouvrir

1) Von den Brüchen, Kap. 35. Seite 623.

quelques - unes des circonvolutions de l'intestin jejunum.

§. 61.

Endlich sey mir noch erlaubt, eine Anmerkung hinzuzufügen. Ungeachtet unter den Namen Exomphalos, Omphalocoele, Hernia umbilicalis, angesehene Schriftsteller, z. B. le Dran ¹⁾, Günz ²⁾, Sauvages ³⁾, Richter ⁴⁾, Ploucquet ⁵⁾, Sabatier ⁶⁾, Chopart, Desault ⁷⁾, Leurs ⁸⁾ und mehrere an-

- 1) We call that umbilical hernia, which happens along the linea alba from the cartilago ensiformis to the symphysis of the os pubis. Operations in Surgery translated by Gataker, Lond. 1757. page 104.
- 2) Herniae, quibus ab umbilico nomen est, a latere umbilici exstant. Obs. de Herniis, Cap. XVI.
- 3) Enterocele sive Enteromphalos est hernia per anulum umbilici aut proxime ad ipsius ambitum. Nosologia.
- 4) Der Nabelbruch dringt entweder durch den sogenannten Nabelring, oder zur Seite desselben durch eine Spalte in der weißen Linie. Wundarzneykunst. 1798.
- 5) Omphalocoele rarissime per anulum umbilici ipsum, sed plerumque per rimam in linea alba prolabitur in vicinia umbilici, in Diss. Klemm Enumeratio et diagnosis herniarum, Tubingae 1789. §. XC.
- 6) Der Nabelbruch erfolgt durch das Auseinanderweichen der Fasern der linea alba, a. a. D. S. 122.
- 7) Les viscères s'échappent dans les enfans par l'anneau ombilical, et dans les adultes communement par un écartement des fibres aponévrotiques, qui l'avoisinent.
- 8) Unter einem Nabelbruche versteht man die Austragung eines Eingeweidés des Unterleibes an der Stelle des Nabels. Preißschrift S. 124.

mit, wo ein großer
 der von Bauchfelle
 wurde. Leiffend
 ricklich schwer zu be-
 ruckfack haben soll-
 sowohl das Darms
 felgich kann durch
 eine Spalte neben
 auchhöhle dringen,
 in Saft auszudeh-
 Nabelbrüchen
 in den mittleren
 fand ich in ol-
 Nabelbrüche,
 eten Bruchfack.
 meinen Schluß:
 und chirurgi-
 Bauchfelle ge-
 befähigtiget

rgicale, Paris
 oine forme au
 en forme un
 st quelquefois
 oneurose, qui
 ombilicale,
 nem Falle fand
 en zu sein wa-
 sans ouvrir

dere nicht bloß die Brüche begreifen, die durch den eigentlichen Nabelring erfolgen, sondern selbst diejenigen, welche sich in der sehnigen Strieme oder der weißen Linie bilden; und ungeachtet es freylich oft schwer hält, sie im Leben genau zu unterscheiden, so sollte man doch billig, wie schon Heister¹⁾ erinnerte, nur jene: eigentliche oder wahre Nabelbrüche, diese: un eigentliche oder unächte Nabelbrüche, *Hernias ventrales* oder *Hernias lineae albae*, *prope vel in vicinia umbilici*, nennen. Es scheint aber um so nothwendiger, hier den Sprachgebrauch festzusetzen, da bekanntlich beide Arten bisweilen zugleich vorkommen, wie uns hiervon Günz, und besonders Wisberg²⁾, ein trefflich anatomisch beschriebenes Beispiel liefert.

Auch hüte man sich, eine andere am Nabel sich zeigende Geschwulst für einen Bruch anzusehen.

Une erreur assez commune est de prendre pour une hernie commençante dans de jeunes gens et dans les adultes, une très-petite tumeur molle, compressible, située dans le centre même du nombril. L'illusion dépend, autant que nous avons pu en juger, de la situation de la tumeur, qui nous a paru être formée par du tissu cellulaire graisseux. M. Lassus Pathologie chirurgicale, Paris 1806, Tome second, page 66.

1) Institutiones chirurgicae, Cap. CXIV. in der Note b)

2) Diss. resp. Rudolphi de peritonaei diverticulis.

§. V. p. 10.

Welche Licht verbreiten diese Beobachtungen über
 die Heilanzeigen, zur Behandlung, Verhütung
 oder Heilung dieser Krankheiten bey Kindern
 und Erwachsenen? Welches sind die Hülfsleistun-
 gen der Kunst, und die einfachsten, am wenig-
 sten zusammengesetzten, Operationen dagegen,
 welche die erfahrensten Wundärzte beschreiben,

Zweite Frage.

*Quelle lumière répandent ces observations sur
 l'indication curative, à traiter, prévenir ou
 guérir ces maladies, dans les jeunes enfans
 et dans les adultes? Quels sont les secours de
 l'art et opérations les plus simples ou moins
 composées, qui y conviennent, décrites par
 les Chirurgiens les plus experts, et confirmées
 par leurs observations, ou bien fondées sur
 une propre expérience et des preuves raison-
 nées? Et quels de ces traitemens méritent d'être
 recommandés en général, contre les Hernies
 Ombilicales vraies et fausses, ou plus parti-
 culièrement pour l'une et l'autre de ces espèces?*

Welches Licht verbreiten diese Beobachtungen über
 die Heilanzeigen, zur Behandlung, Verhütung
 oder Heilung dieser Krankheiten bey Kindern
 und Erwachsenen? Welches sind die Hülfsleistun-
 gen der Kunst, und die einfachsten, am wenig-
 sten zusammengesetzten, Operationen dagegen,
 welche die erfahrensten Wundärzte beschreiben,

die durch den eigent-
 lichen diejenigen, wel-
 che der weisen Linie
 schwer hält, sie im
 man doch kiffig, wie
 eigentliche oder
 liche oder unächte
 Hernias lineae al-
 bimenten. Es scheint
 nachgedacht festzu-
 weilen zugleich vor-
 besonders Bri-
 es Bespiel liefert.
 Nabel sich zeigen
 fen.
 de prendre pour
 jeunes gens et
 tumeur molle,
 même du nom-
 me nous avons
 tumeur, qui
 cellulaire grais-
 chirurgicale, Paris

und durch ihre Beobachtungen bestätigt haben, oder welche sich auf eigene Erfahrung und vernunftgemäße Weise gründen? Welche von diesen Behandlungen verdienen im Allgemeinen gegen die wahren und falschen Nabelbrüche, oder ganz besonders gegen die eine oder die andere Gattung empfohlen zu werden?

Um ordentlich, und möglichst erschöpfend, auch diese zweite Frage zu beantworten, theile ich sie, wie die erste, in mehrere Abschnitte, und suche ihr Punkt für Punkt Genüge zu leisten.

Erster

Er
Behand
brachte

Da diejeni
aus Mutter
nen; so la
selbst ange
tung der N

Sind
Nabelbrüche
Schnur
Darmen,
bestung, ob
diese Eing
Theile gar
senbar zu
nen; so da
höhle und
haut an e

bestätiget haben,
fahung und ver-
? Welche von
im Allgemeinen
en Nabelbrüche,
eine oder die an-
den?

höfend, auch diese
sie, wie die ertü,
nt für Punkt Ge-

Erster Abschnitt.

**Behandlung der auf die Welt mitge-
brachten, oder eigentlich angebohrnen
Brüche.**

Da diejenigen Gattungen Nabelbrüche, welche die Kinder
aus Mutterleibe mitbringen, nicht verhütet werden kön-
nen; so lasse ich auch diesen Abschnitt, ganz der in der Frage
selbst angewiesenen Ordnung gemäß, dem von der Verhü-
tung der Nabelbrüche vorhergehen.

§. 62.

Sind die wahren und falschen angebohrnen
Nabelbrüche, welche man nach der Analogie billig Nabel-
schnurbrüche nennen sollte, zu groß, liegen nebst den
Därmen, noch Leber, Milz und Magen durch den Na-
beltring, oder durch eine Lücke der linea alba, vor; sind
diese Eingeweide nur mit einer dünnen Haut oder zum
Theile gar nicht bekleidet: ist der Rest der Bauchhöhle of-
fenbar zu klein, um das Vorliegende aufnehmen zu kön-
nen; so darf man wohl an eine Einbringung in die Bauch-
höhle und Zurückhaltung des Vorliegenden, so wie über-
haupt an eine lange Erhaltung eines solchen, nur Jammer

Erster

erregenden Geschöpfes, nicht denken. Ruyfch ²⁾ sah alle solche Kinder sterben. Der jederzeit äußerst bedachtsam urtheilende B. S. Albinus ³⁾ erklärt: *Hernia congenita talis immedicabilis est*, und Lobstein ⁴⁾: *Vix non jure de salute tali onere inquinati infantis desperamus.* Daher versuchte auch der große Bergliederer Wrisberg ⁵⁾ mit H. Dr. Zoll mehrere Male ganz vergebens, einen solchen Bruch in die Bauchhöhle zu bringen.

Da man inzwischen zuverlässige Fälle kennt, wo solche Mißgeburten mehrere Tage, ja Wochen lang ⁶⁾ lebten; so ist es Pflicht, ihre erbärmliche Existenz wenigstens zu erleichtern. Dieses wird wohl am füglichsten erreicht, wenn man, nach der, in einiger Entfernung vom Bruche verrietheten, Unterbindung der Nabelschnur, den Bruch selbst mit feiner und weicher Leinwand, oder mit Baumwolle bedeckt, sowohl allen starken Druck als irgend eine Be-

- 1) *Obs. anatomico-chirurgicae*, Obs. 71. pag. 91.
- 2) *Annotat. Academicarum Lib. I. Cap. XVI. p. 98.*
- 3) In der Buchholzischen *Diss. de hepatomphalocoe congenita*. S. XIII.
- 4) *Diss. resp. Rudolphi, de peritonaei diverticulis*, pag. 16.
- 5) Fünfzehn Stunden bey Mery, *Mémoires de l'Acad. des Sciences de Paris* 1716, fast zwey Tage bey Wrisberg a. a. D., drey Tage bey Amyand, drey Tage bey Borges in der Uebersetzung von Sabatier, vier Tage bey Müsler, *Ephemerides Nat. Cur. Centuria VIII. Obs. 35.*, fünf Tage in meinem Falle, fünf bey Sachtleben a. a. D., fünf bey Lassus *Mém. de l'Institut national*, Tome 3., einen Monat bey Buchholz a. a. D., ja fünf und dreyßig Tage bey Morgagni a. a. D.

Schmückung desselben verhütet, den ganzen Körper in wei-
 che zarte Bindeln locker einhüllt, und übrigenz Alles ver-
 meidet, was ein Weinen oder Schreyen des Kindes veran-
 laßt. In Fällen, wo die Eingeweide ganz entblößt liegen,
 hat man gerathen, sie mit lauer Milch zu bähnen, oder
 mit dem Nese eines frischgeschlachteten Thieres zu um-
 hüllen¹⁾. Das Beste scheint wohl der Rath von Nuy sch²⁾,
 sie mit einem weichen Pflaster zu bedecken. Ich würde
 dazu ein besonders reinlich, mild und frisch bereitetes Em-
 plastrum Lythargyrii oder commune, oder das Empl.
 Noricum, auf zarte Leinwand gestrichen, empfehlen.

S. 63.

Ist der Bruch hingegen kleiner, enthält er nur Där-
 me, ist die Bauchhöhle weniger geschwunden, scheint der
 Bruch sack stark genug, um eine sanfte Pressung zu ge-
 statten, ist die Mündung des Nabelringes, oder der soge-
 nannte Hals des Bruches, gegen den übrigen Bruch nicht
 gar zu klein; so versuche man vorsichtigst die Einbringung
 des Vorliegenden in die Bauchhöhle, und lege weiche, der
 Form des Bruches angemessene, graduirte Compressen auf,
 und darüber eine breite, auf alle Theile des Bruches, so
 viel möglich, gleichmäßig sanft drückende Nabelbinde. Le-
 vret³⁾ rath, die breiteste Compresse zunächst auf den Leib
 zu legen, um den Nabelring nicht durch die umgekehrte
 Ordnung, wie mittelst eines Kegels, zu erweitern. Der
 Verstand des Arztes muß in solchen Fällen den Verband

1) Oehme Diss. de morbis infantum chirurgicis, S. 38.
 2) Obs. anat. chirurg.
 3) Traité des Accouchemens, in der Sammlung für
 praktische Aerzte, 1. Vand. St. 4. S. 123.

Nuy sch²⁾ sah all-
 eit äußerst bedachtan
 klärt: Hernia conge-
 nd Leblein³⁾: Vir
 quinati infantis de-
 der große Zirgideuer
 mehrere Male ganz ver-
 Bauchhöhle zu beengen.
 Fälle kennt, wo solche
 schon lang³⁾ leben;
 wenigstens zu er-
 sten erreicht, wenn
 vom Bruche ver-
 den Bruch selbst
 er mit Baumwolle
 als irgend eine Be-
 71. pag. 97.
 XVI. p. 98.
 e hepatomphaloele
 tonaei diverticulis,
 oires de l'Acad. des
 ge bey Wrißberg
 d, drey Lage bey
 Sabatier, mit
 Nat. Cur. Centuris
 dem Falle, fünf bey
 su & Mem. de l'In-
 nat bey Buchholz
 e bey Morgagni



nach den Umständen einrichten und abändern. Deh me *) rath, eine bleyerne Platte, oder eine halbe wächserne Kugel damit zu verbinden; welches mir doch für so zarte Theile zu hart dünket. Uebrigens sorge man auch hier, so viel es gehen will, für Entfernung von Allem, was das Kind unruhig oder weinen macht, reiche gute Nahrung, halte den Leib gehörig offen u. s. f.

Es ist zum Erliaunen, wie weit, selbst in solchen ver- zweifelt scheinenden Fällen, die Kräfte der Natur reichen, falls man sie nicht durch unüberlegte Geschäftigkeit stöbrt. In einem der merkwürdigsten Fälle, dem nämlich, welchen Buchholz und Lobstein so trefflich schildern, wo der angebohrne Nabelbruch drey volle Zoll im Durchmesser hielt, verschwand er dennoch in einem Monate so vollkommen, (*tumor disparuit in integrum* 2), *cutisque aperta in amplexus mutuos sibi occurrit* 3), daß sich die ganze Stelle verkleinerte und gänzlich ausfüllte, auch das Kind nur zufällig am Reichhusten starb.

Daß Crew's Vorschlag 4), den Darmkanal zu durchschneiden, den oberen Theil an die Bauchdecken zu heften, und einen künstlichen After zu bilden, wirklich ausgeführt worden wäre, ist mir nicht bekannt.

Von dem tödtlichen Erfolge des Ausschneidens solcher Nabelbrüche durch unwissende Wundärzte findet man war-

1) a. a. O. Seite 39.

2) In der oft angeführten Monographie. S. VI. S. 10.

3) Ebendasselbst. S. XVI. S. 30.

4) *Commercium litterarium Noricum*. 1755.

nende Beispiele bey Paré ¹⁾ Mauriceau ²⁾ und Trew ³⁾ aufgezeichnet.

§. 64.

Ist der angebohrne Bruch noch kleiner, und läßt sich das Vorliegende bequem in die Bauchhöhle bringen; so ist bey weitem die einfachste, sicherste und kürzeste Heilmethode die Unterbindung, wie ich sie im folgenden Abschnitte angebe, und wovon uns Desault in seiner fünften Observation ein mit dem besten Erfolge gekröntes Beispiel hinterlassen hat.

1) Opera, Lib. XXIII. Cap. 66.

2) Traité des Accouchemens, Tome I. page 497.

3) Miscellanea Naturae Curiosorum, Decas II. ann. 5. Obs. 128.

ändern. Desme)
 e halbe wächserne Ka
 ir doch für so zart
 erge man auch hier,
 von Allem, was das
 reiche gute Nahrungs
 selbst in solchen ver.
 der Natur reichen,
 Beschäftigung köhet.
 Dem nämlich, wel
 sich schildern, wo
 soll im Durchmes
 Monate so voll
 am ²⁾, cutisque
 arit ³⁾, daß sich
 ch ausfüllte, auch
 ard.
 den Darmkanal zu
 die Bauchdecken zu
 lden, wirklich aus
 nnt.
 sstündens solcher
 e findet man vor.
 ie. §. VI. S. 10.
 . 1755.

Zweiter Abschnitt.

Verhütung der Nabelbrüche bey Kindern.

§. 65.

Im Vorhergehenden ist schon gezeigt worden, daß der Satz fast allgemein angenommen zu seyn scheine: der Nabel eines neugebohrnen Kindes bleibe eine Zeitlang schwächer, als der übrige Theil der Bauchdecken, und leiste folglich auch den, in der Bauchhöhle enthaltenen, Eingeweiden weniger Widerstand. Hiedurch begründet man die, eben so allgemein verbreitete, Besorgniß für Nabelbrüche bey Kindern. Man legt also, zur Verhütung dieses vermeintlichen Gebrechens, fast in allen cultivirten Ländern die sogenannte Nabelbinde an, besonders, weil berühmte Wundärzte ein zu frühes Ablegen derselben als eine Ursache der Nabelbrüche angeben. Unter andern behauptet Heister ¹⁾, daß ein Nabelbruch entstehe, wenn man, nach abgefallener Nabelschnur, nicht noch eine Zeitlang den Nabel mit einer Binde zusammenhielte. Uhoorn setzt gleichfalls eine der gemeinsten Ursachen der Nabelbrüche darinn, daß die Wärterinnen am Nabel der neugebohrnen Kinder

1) Institut. chir. pag. 736.

nicht den gehörigen Druck anbrächten. Dehme ¹⁾ leitet, freylich ganz richtig, aus vernachlässigter Zusammendrückung eines etwas hervorstehenden Nabels den Nabelbruch her. Richter ²⁾ in seinem neusten Werke über Brüche schreibt: „Ist das Kind sehr unruhig, so muß man die Nabelbinde, nach Absonderung des Nabels, noch einige Wochen liegen lassen; denn diese schützt, wenn sie gut angelegt ist, vor aller Gefahr eines Bruches.“ Daher wünscht G. J. van Wy ³⁾, daß man die Kinder zur Verhütung der Nabelbrüche, wenn auch nicht gleich nach der Geburt, doch wenigstens nach dem Abfallen der Nabelschnur, einer ordentlichen chirurgischen Behandlung unterwerfe. Eine lange Erfahrung, spricht er, habe ihn belehrt, daß dergleichen Brüche sich immer verhüten ließen; niemals, versichert er, habe er sie zum Vorschein kommen sehen, wenn er die gehörige Verhütungsmittel gebraucht hätte. Ich muß diesem erfahrenen Manne darinnen beystimmen, daß sich diese Nabelbrüche verhüten lassen, wenn ich auch in der Erklärung von ihm abweiche, und glaube, daß der wahre Ursprung der Nabelbrüche früher, nämlich schon während des Vorhandenseyns des Nestes der Nabelschnur, existire, daß folglich seine ganze zweckmäßige Behandlung mehr einen schon vorhandenen, kaum merklichen, Nabelbruch auf der Stelle heile, als einen noch gar nicht vorhandenen verhüte.

S. 66.

Oben S. 35 nämlich bemerkte ich, einer Ursache der Nabelbrüche, wenigstens in den Ländern wo ich lebte,

- 1) a. a. D. Seite 37.
 2) Wundarzneykunst 5. Band. S. 533.
 3) Preischrift. S. 166.

näher auf den Grund gekommen zu seyn, und solche in einem Ziehen und Spannen der Nabelschnur, besonders über ein, zwischen den Rest der Nabelschnur und den Bauch gelegtes Küßchen oder Compresschen, gerunden zu haben. Zuverlässig kann ich versichern, daß ich selbst sehr viele gesunde, starke und ruhige Kinder gesehen habe, welche, ungeachtet man sie mit der Nabelbinde Monatlang versehen hatte, dennoch runde oder erhabene Nabel zeigten. Und umgekehrt kann ich versichern, daß ich viele Kinder gesehen, denen man, freylich nach gehörig abgegangenem Nabelreste, gleich die Nabelschnur ablegen ließ, und die dennoch vollkommen natürliche Nabel bekamen und behielten.

§. 67.

Ich würde also rathen 1) auch das leiseste Ziehen, Spannen oder Zerren an dem Reste der Nabelschnur mit aller Sorgfalt zu vermeiden; da ich oben §. 35. nicht nur den Schaden davon gezeigt, sondern auch Starke und Kölern als Gewährsmänner angeführt habe; 2) bey ruhigen, gesunden Kindern gleich nach abgegangener Nabelschnur keine Binde anzulegen. 3) Sollte das Kind aber unruhig seyn, viel schreyen, husten, und der Nabel ein verdächtiges Ansehen haben, unvorzüglich ein kleines Bäuschchen von Leinwand oder Küßchen von Charpie, oder ein, mit Leinwand überzogenes, halbkugelförmiges Knöpfchen auf die Nabelnarbe zu bringen, und solches durch keine, wie gewöhnlich, schmahle, sondern wenigstens drey Queerfinger breite, genau sich dem Bauche anschmiegende Binde zu befestigen; 5) endlich alle Ursachen zur Unruhe des Kindes sorgfältig aufzusuchen und entfernen zu lassen.

§. 68.

Ich müßte mich sehr irren, wenn ich nicht, als Vater

und als Arzt, manchen Nachtheil von den nicht gehörig oder unnörthig angelegten Nabelbinden hätte einsehen lernen. Es kamen mir unter andern Fälle vor, wo man mich wegen des Wegbrechens der gesündesten, besten Milch von den gesündesten ruhigsten Kindern, um Rath fragte. Ich befühlte den Leib, und fand ihn (aus Furcht vor einem Nabelbruche) mit einer Binde fest umgürtet; ich untersuchte den Nabel, fand ihn in Ordnung, lies die Binde abnehmen, verbot, sie wieder anzulegen: und von der Stunde an hatte das Brechen ein Ende. Die Erklärung dieser Erscheinungen ist ganz leicht. Die Bauchdecken nämlich sind weich, und beweglich, sollen dem, durch das Saugen sich füllenden, Magen willig und beträchtlich nachgeben und sich ausdehnen lassen: die Nabelbinde dagegen, falls sie ihren Zweck erfüllt, ist unnachgebend, die Ausdehnung des Unterleibes hindernd; folglich muß der Magen von der Portion Milch, welche das Kind instinkt mäsig, zu sich nimmt, so viel wieder auswerfen, als ihm die Leibbinde zu behalten verwehrt. Dieses Ausbrechen der Milch erfolgt aber um so leichter, als bekanntlich die Bauchmuskeln am Erbrechen den größten Antheil haben; nicht zu gedenken, daß man durch solche Nabelbinden die, zur Schließung des Nabelringes erforderliche, Ausdehnung der Bauchdecken beschränkt. Ubrigens habe ich an einem andern Orte ¹⁾ die Bemerkung umständlich erörtert, daß die Nabelbinden, welche man, um Brüche am Nabel zu verhüten, anlegt, wohl dagegen, als Ursache von Brüchen in den Leisten, höchst verdächtig seyn möchten.

1) Preischrift über die Ursachen der Leistenbrüche.

seyn, und solche in
 schnur, besonders über
 r und den Bauch ge
 gerunden zu haben.
 selbst sehr viele gesün
 de, welche, ungeachtet
 lang versehen hatte,
 eigten. Und umge
 inder gesehen, denen
 m Nabelkreiß, gleich
 noch vollkommen

stärkste Ziehen,
 Nabelschnur mit
 §. 35. nicht nur
 auch Stärke und
 t habe; a) bey
 zugegangener Na
 lte das Kind aber
 d der Nabel ein
 in kleines Häufsch
 harpie, oder ein
 miges Knöpfchen
 ches durch keine,
 mens drey Quer
 schmiegende Binde
 zur Unruhe des
 en zu lassen.

nicht, als Water

Dritter Abschnitt.
Methode bey Kindern den Nabel
zu heilen.

§. 69.

Alle bewährten Schriftsteller über Nabelbrüche kommen darinn überein, daß im Allgemeinen die, bey jungen Kindern entstandenen, wahren Nabelbrüche sich leicht vermeiden und heilen lassen. *Vera hernia umbilici in infante facillime sanatur*, ist Dehme's ¹⁾ Ausspruch.

§. 70.

Dieses scheint um so zuverlässiger, als ich selbst mehrere Male, sogar schon ziemlich ansehnlich gewordene, Nabelbrüche bey Knaben und Mädchen, mit den Jahren, ohne Hilfe der Kunst, fast ganz habe verschwinden sehen. Ich entsinne mich sehr lebhaft unter andern eines sechsährigen Knaben, dem ein Nabelbruch über anderthalb Zoll lang wie ein Därmchen herabhing, und welcher sich von selbst verzog, weil die Ältern in die vorgeschlagenen Unterbindung nicht willigten. Dasselbe, um nur ein Paar tüchtige Gewährsmänner aufzustellen, beobachtete auch Desault ²⁾ in zwey Fällen, mit der Bemerkung, daß dieses alsdann erfolge, wann die natürliche Zusammenziehung des Nabel-

1) a. a. D. Seite 59.

2) a. a. D. Seite 27.

belringes so kräftig wirke, daß sie im Stande sey den Andrang der Eingeweide des Unterleibs zu überwinden. So auch Brünigghausen ¹⁾, welcher Fälle sah, wo beträchtliche Nabelbrüche bey Kindern, wann sie heranzuwachsen, von selbst ohne Bandage vergiengen, indem er sinnreich bemerkte, daß er es wahrscheinlich findet, daß durch die festere und häufigere Nahrung, welche die Kinder alsdann genießen, der Magen und die Därme mehr ausgedehnt werden, und daß durch diese mittelbare Ausdehnung und Spannung des Darmfells der Theil desselben, welcher den Bruch sack bildete, wiederum in den Unterleib hineingezo- gen werde. Ja, wie viel man hier zu hoffen hat, zeigt wohl kein Beyspiel klärer und auffallender, als der kurz vorhin angeführte Buchholzische, wo so ein so ungeheurer Bruch in Zeit von einem Monate von selbst verschwand.

S. 71.

Inzwischen ist aus den bekannten, bey jedem, also auch bey diesem, Bruche Statt findenden Gründen, durch- aus erforderlich, einen Nabelbruch möglichst bald und möglichst vollkommen wegzuschaffen; besonders weil man diesen Zweck leicht und sicher erreichen kann, und es ent- schieden ist, daß sich diese Brüche desto schneller und un- fehlbarer heilen lassen, je jünger das Kind ist.

Besonders ist es für Mädchen noch wichtiger als für Knaben, von diesem Gebrechen gänzlich befreyt zu werden, um sie bey dem künftigen Schwangerwerden allen Ge- fahren, welche ein Nabelbruch veranlassen könnte, zu ent- ziehen.

¹⁾ In Loder's Journal für Chirurgie. 3. Band 1. St.

Die bewährtesten Mittel zu diesem Zwecke sind: bey kleineren Nabelbrüchen ein, den Bruch zurückhaltender Körper, bey größeren die Ligatur.

N a b e l - S c h i l d .

S. 72.

Ist der Nabelbruch keinen halben Zoll hoch, und das Kind keine zwey Monate alt; so bediene ich mich, wie mehrere mir bekannte Ärzte, jederzeit mit der erwünschtesten Wirkung folgenden Mittels.

Auf ein ovales, zwey bis drittehalb Zoll im längsten Durchmesser haltendes, zartes, weiches Leder, wird in der Mitte ein Knopf, das ist, eine der Größe des Bruches angemessene Halbkugel von Korkholz, mit Leder bedeckt, fest aufgenäht, und der Rand rings um diesen Knopf mit einem Gesteypflaster bestrichen. Indem man alsdann mit dem Finger der einen Hand die Erhöhung des Bruchs sanft in die Bauchhöhle drückt; so legt man mit der andern Hand das Pflaster so auf, daß der Knopf die Erhöhung des Nabels vollkommen zurückhält. Dieses Nabelschildchen lasse ich gewöhnlich doppelt verfertigen, um erforderlichen Falls gleich ein frisches bey der Hand zu haben. — Die beste Pflastermasse, welche ich hierzu kenne, ist das Emplastrum adhaesivum der neuen, (nicht der alten) Pharmacopoeae Württembergica, welches mit burgundischen Pecher versehen ist. — Leder ziehe ich der Leinwand vor; weil es die Pflastermasse nicht durchläßt, auch williger sich der Nabelgegend anschmiegt. — Korkholz scheint mir zum Knopfe vorzüglicher als Wachs, welches Platner¹⁾,

1) Institut. Chirurgiae, S. 806.

Levret¹⁾ und Andere empfehlen, weil jenes nicht so weich wird und nachgiebt; auch vorzüglicher, als eine halbirte Muskatennuß, welche Richter²⁾ empfiehlt, weil ersteres sich leichter modeln, verkleinern und vergrößern läßt; wie nicht minder auch besser, als ein hölzernes, dem Erdschwamme ähnliches, gedrehtes Knöpfchen oder Hütchen, welche Armstrong³⁾, Schäffer und Brünninghausen⁴⁾ empfehlen, weil solche doch zu hart scheinen; — besser auch als eine Blechplatte, welche Mos⁵⁾ empfahl, weil diese am wenigsten paßt; oder als eine von Mohrenheim⁶⁾ empfohlene Geldmünze.

Nur in dem Falle, daß ein Kind unruhig ist, oder die Urt hat mit der Hand am Nabel zu spielen, lasse ich ein breites Bändchen von Barchent oder doppelter Leinwand anlegen. Sonst ziehe ich freylich das bloße freye Schildchen ohne Binde vor. Wie oft ein solches Schildchen frisch aufzulegen ist, läßt sich nicht genau bestimmen. Ist die Kindswärterin aufmerksam und verständig; so weiß sie leicht zu helfen. Bey ruhigen Kindern sah ich es wohl acht bis vierzehn Tage lang unverrückt liegen bleiben. Mit der allmählichen Verkleinerung des Bruchs macht man auch gradweise den Knopf des Schildchens allmählig kleiner.

1) Journal de Médecine, Tome XXXVII. 1772, in der Samml. für prakt. Arzney, Band 1.

2) v. d. Brüchen, und im fünften Bande der Wundarzneikunst.

3) Von den Kinderkrankheiten, übersetzt von Schäffer, Regensburg 1792. S. 203.

4) Am anz. Orte, Tab. II. Fig. 3. 4. 5.

5) Ueber physische Erziehung der Kinder, Leipzig 1799.

6) S. 310.

Ein solches Schildchen pflegt in ein Paar Monaten, auch wohl unter günstigen Umständen noch eher, bey verständigen Altern oder Wärterinnen und gehöriger Aufsicht, den Nabelbruch verschwinden zu machen. Übrigens muß man sich nicht verdrüßen lassen, die Wärterin des Kindes zu belehren, daß ein einziges Wiedervordringen des Bruches die Mündung, die man schließen will, öffnet, und den Bruch auf den Standpunkt zurück bringt, in welchem er sich im Anfange der Kur befand, daß folglich alle bis dahin angewendete Mühe verloren ist. Auf diese Art scheint der verdiente *Monnikhoff* 1) Nabelbrüche bey Kindern geheilt zu haben. Nicht er bedient sich, wie gesagt, einer halben Muskatennuß, die er mittelst einer Binde auf dem Nabelbrüche befestiget, und versichert, „gemeinlich innerhalb 4 bis 6 Wochen, eine gründliche Heilung bewirkt zu haben“ 2) — er habe sehr viele Kinder mit Nabelbrüchen gesehen, und erinnere sich keines einzigen, das durch den Gebrauch eines solchen Bandes nicht gründlich geheilt worden wäre 3) — er habe noch keinen Fall gesehen, wo nicht seine Methode vollkommen hinreichende Dienste gethan hätte.“ 4) Sehr treffend ist er auch dem nichtigen Einwurfe begegnet, als ob ein solcher Körper die Spalte am Nabel nur offen erhielte.

S. 74.

Die *Heisterische* Methode, durch graduirte Compressen den Nabelbruch zu heilen, verdient neben diesen kaum mehr eine Erwähnung.

1) Seite 637. Compression empfiehlt, auch *Wiseman*, *Several chirurgical treatises*, Lib. I.

2) Seite 633.

3) Seite 634.

S. 75. *Schilbchen*
 Thricht wäre es auch wohl, bey obigen erprobten, un-
 fehlbaren und bequemen Mitteln, mit einigen älteren
 Ärzten ¹⁾ noch auf Bähungen oder Aufschläge von Kräu-
 tern oder gepülverter Eichenrinde ²⁾, adstringirende soge-
 nannte Bruchpflaster (emplastra catagmata) zu sinnen,
 oder den Wasserfenchel ³⁾ gar innerlich zu brauchen. In-
 dessen rathen doch selbst noch Chopart und Default ⁴⁾,
 töpische Mittel nebst den Bandagen anzuwenden, so wie
 auch Armstrong ⁵⁾ Bähungen mit Brandwein dazu
 vorschlägt. Wie diese durch die Haut der Bauchdecken
 auf den Nabelring wirken sollen, ist nicht wohl abzusehen.

Unbemerkt darf hier nicht bleiben, daß Mädchen, die
 an Nabelbrüchen leiden oder gelitten haben, schlechterdings
 keine Röcke anlegen dürfen, aus den im 42. S. angege-
 benen Gründen.

S. 76.

Das mit einem Knopfe versehene Schilbchen oder Bind-
 chen verdient also, der Theorie und Erfahrung nach, den Vor-
 zug vor allen übrigen Heilmitteln des Nabelbruches. Denn
 1) erfüllt es seinen Zweck am vollkommensten, und drückt
 nur präcis die Stelle hinein, welche hineingebracht wer-
 den soll. Nach dem Sprüchworte: *Contraria contrariis*

- 1) Gerrit van Wy, Verhandeling over de uitwen-
 dige Hulpmiddelen tegen de Breuken, Amst. 1799.
- 2) Lange in Richters Bibliothek, 8. Band, S. 500.
- 3) Lange vom Wasserfenchel 1773.
- 4) a. a. D. S. 326.
- 5) Diseases of Children, Lond. 1777. Deutsch in der
 Samml. für prakt. Ärzte.

ein Paar Monaten
 noch eher, bey vor-
 und gehöriger Auf-
 zu machen. Ubrigens
 die Wäterin des
 es Widerverdrängen
 n schließen will, öf-
 nkt zurück bringt, in
 fand, daß folglich
 oren ist. Auf diese
 77) Nabelbrüche
 chter bedient sich,
 die er mittelst ei-
 get, und versichert,
 eine gründliche
 sehr viele Kinder
 sich keines ein-
 chen Bandes nicht
 habe noch keinen
 vollkommen hinrei-
 treffend ist er auch
 ob ein solcher Kör-
 gelte.

graduierte Compositi-
 eben diesen kaum

auch Wiseman,

curantur, thut das Schildchen das von außen, was die
 Waucheingeweide von innen thun, ohne zugleich irgend einen
 anderen Theil unnöthiger Weise zu drücken; 2) genirt es
 weder die Unterleibshöhle, noch durch die Unterleibshöhle
 die Brusthöhle; 3) gekattet es alle Bewegungen des
 Unterleibs aufs freyeste; 4) lernt jede Kinderwärterin
 leicht damit umgehen, und ab und zu thun; 5) ist es
 das einfachste und wohlfeilste. Kurz: Offenbar ist dies
 Schildchen gegen die Nabelbrüche junger Kinder, gerade
 das, was die Preisfrage verlangt: *le secours de l'art le
 plus simple ou moins composé.*

L i g a t u r.

S. 76.

Ist der Nabelbruch größer, und läßt er sich bequemt
 mit einem Faden umfassen; so ist wohl das beste, und nun
 durch so viele Erfahrungen bewährteste Mittel: die Un-
 terbindung, oder eigentlich die Abbindung.

Wollte ich mich mit der Literatur über diese Methode
 aufhalten; so könnte ich zeigen, daß Celsus und Pau-
 lus von Agina sich ihrer, so wie Paré und Mu-
 ralt¹⁾, nur mit unnöthig grausamen Handgriffen, be-
 dient daßmüunter Einige, z. B. Purman und Saviard,
 sie ganz einfach verrichtet haben, — daß sie von Crew²⁾,
 Buchholz³⁾ und Levret⁴⁾ als gefährlich verworfen,
 und fast gänzlich hintangesezt worden, bis sie Desault's
 unver-

1) Chirurgische Geschichten, Basel 1691. N. 12.

2) Commerce. Litterarium Noricum, 1735.

3) a. a. D. S. XIV.

4) Traité des accouchemens, S. 1340.

unvergleichliches Genie wieder gehörig würdigte, und durch seine und seiner Schüler häufige Erfahrungen in ein solches Ansehen brachte, daß sie nun die besten Wundärzte anwenden. Allein, mit Übergehung aller geschichtlichen Verbesserungen der Abbindungsmethode, schildere ich gleich die beste Verfahrungsart.

§. 77.

Nachdem das Kind in eine bequeme Lage gebracht worden, worinn es durch einen Gehülfen erhalten wird, versichert man sich durch genaue Untersuchung, nichts als den leeren Beutel vor sich zu haben; widrigenfalls man das in ihm Enthaltene in den Bauch vorher zurück zu bringen suchen müßte. Alsdann legt man um das ergriffene Stück einen gewicksten Faden, welchen man, um sicher zu gehen, in zwey bis drey Touren anlegt, und bey jeder Tour mit einem chirurgischen Knoten fest zusammenzieht. Den dritten Tag legt man eine zweite Ligatur an, und, erforderlichen Falls, den sechsten Tag eine dritte. Gewöhnlich fällt das Unterbundene zwischen dem achten und zehnten Tage ab, und die Heilung ist vollendet.

§. 78.

Zur Empfehlung dieser Methode könnte es hinreichen anzuführen, daß Desault¹⁾ allein über funfzig Kinder glücklich durch sie heilte, daß Plaignault²⁾, L. Frank³⁾

1) Seite 34.

2) In Desault's Journal de Chirurgie, 1792.

3) Salzburger med. chir. Zeitung, 1791. Nro. 24.

und Niemeyer ¹⁾ sie nach ihm mit dem besten Erfolge verrichteten, und daß ich sie gleichfalls aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Allein es zeigen sich so viele Gründe zu ihrer Empfehlung, daß man sich wahrlich wundern muß, sie so lange vernachlässigt zu finden. Denn 1) ist es ganz zuverlässig, daß sie radikal hilft, weil sie den höchsten Zweck erfüllt, die Ränder des Nabelringes dicht aneinander bringt, und durch Erregung der sogenannten *inflammatio adhaesiva* schließt. Sie bewirkt die Zusammenziehung des Nabels, indem sie nicht nur das unnütze Erschlafte völlig wegschaft, sondern auch aufs genaueste den Proceß der Natur bey der Bildung des vollkommensten Nabels nachahmt; 2) ist sie völlig gefahrlos; nichts kann verletzt werden; 3) ist die Operation leicht, und erfordert keine besondere Geschicklichkeit; 4) heischt sie keine besondere Aufsicht bey der Heilung. Ist der Faden einmal gehörig angelegt, so kann der Kranke am Verbande nichts verderben; 5) ist sie für den Patienten die bequemste; 6) dauert die Heilung nur kurze Zeit, 8 bis 10 Tage; 7) ist sie, außer dem Augenblicke des Zusammenziehens des Fadens, unschmerzhaft; 8) ist sie nicht festspielig.

Indessen darf man doch nicht verschweigen, daß diese Methode, im Falle der Operirte zu alt ist, nicht vor der Wiedererzeugung eines Nabelbruches sichert; wie der aufrichtige *Desault* ²⁾ selbst mehrere solcher Fälle anführt. Auch *Saviard* ³⁾ zweifelt an dauerhafter Heilung unter solchen Umständen.

1) In *Borges*'s Uebersetzung von *Sebatier*'s Lehrbuch, Berl. 1797.

2) S. 41.

3) *Nouv. Recueil d'Obs. chirurg.* p. 125.

*gegen das Abwachen ist die neue Societät zu Paris.
V. Journal de Med. chin. et Vol. XXI. no. Martin
Girard? abhandlungen von k...*

§. 79.

Elastische Bruchbänder lassen sich nicht füglich bey Kindern anwenden, nicht nur weil sie zu unruhig sind, um sie am Leibe zu dulden, sondern auch, weil, wenn das Band vermögend genug wäre, den Bruch zurück zu halten, sie durch die weichen Bauchdecken die Geschäfte der Eingeweide des Bauches stöhren, und wenn sie nicht vermögend wären, nichts nützen würden. Daher bemerkt auch Armstrong ¹⁾ und Richter ²⁾, daß der Gebrauch elastischer Bruchbänder bey Kindern nicht nur beschwerlich, sondern auch in der That unnöthig sey.

§. 80.

Klemmt sich ein Nabelbruch bey Kindern zufällig ein, welches doch nur selten geschieht; so pflegt auch hier die Heilung nicht schwer zu halten, sondern durch erweichende Aufschläge und erweichende Klystiere leicht bewirkt zu werden, wie auch schon Dehme richtig bemerkt hat.

§. 81.

Sollte man sich zur Operation genöthigt sehen; so wird dieselbe im Wesentlichen, wie bey Erwachsenen (§. 101.), verrichtet werden müssen.

§. 82.

Ungeachtet diese Mittel hauptsächlich für ächte Nabelbrüche, als die vorzüglich bey Kindern beobachtete Gattung, berechnet scheinen; so könnten doch auch keine anderen

1) S. 202.
2) S. 634.

mit dem besten Erfolge
aus eigener Erfahrung
sich so viele Grüns
sich wahrlich wundern
den. Denn 1) ist es
t, weil sie den höchsten
anges dicht aneinander
genannten in flamma-
kt die Zusammenzie-
das unnütze Erschlaf-
genauste den Proceß
kommensten Nabels
nichts kann verlegt
d erfordert keine be-
keine besondere
den einmal gehörig
bände nichts verder-
wie bequemste; 6)
s 10 Tage; 7)
sammenziehens des
t kostspielig.
weigen, daß diese
ist, nicht vor der
hert; wie der auf-
her Fälle anfähet.
ter Heilung unter

atier's Lehrbuch
25.
Larvik

gegen die unächten Nabelbrüche angemerkt werden, falls solche vorkämen; wovon ich doch bis jetzt kein deutliches Beispiel kenne.

Sollte sich nämlich ein unächter Bruch neben dem Nabelringe zeigen, eine mehr längliche als rundliche Gestalt haben, und mit seinem längsten Durchmesser senkrecht liegen; so dürfte man nur den Kopf des Schildchens nach dieser Form modeln, im übrigen aber völlig nach obiger Anweisung verfahren.

ungemerkt werden, falls
is jetzt kein deutsches
er Bruch neben dem
ische als runde Ge-
Durchmesser senkrecht
f des Schildchens nach
er völlig nach obiger

Vierter Abschnitt.

**Behandlung der Nabelbrüche bey Er-
wachsenen.**

§. 33.

Die Behandlung eines Nabelbruchs bey Erwachsenen ist hauptsächlich nach zwey Umständen verschieden, nachdem er sich nämlich entweder ruhig oder eingeklemmt befindet. Ich werde daher jeden dieser Umstände besonders betrachten.

**Behandlung eines nicht eingeklemm-
ten Nabelbruchs bey Erwachsenen.**

§. 34.

Im Allgemeinen ist die Heilung eines Nabelbruchs bey Erwachsenen weder so leicht, noch so zuverlässig als bey Kindern. Dieses lehren nicht nur die einstimmigen Zeugnisse der erfahrensten Meister in der Kunst, sondern auch, nebst der Theorie, schon der Umstand, daß man eine Menge Bänder gegen den Nabelring angegeben hat, und noch bis auf den heutigen Tag immerfort daran künstelt; welches wenigstens verräth, daß man die bis dahin üblichen nicht hinreichend zur Heilung gefunden. Um so weniger darf man sich bey Erwachsenen eine Nadikalkur versprechen; welche doch gar leicht bey Kindern erfolgt.

§. 85.

P. Camper ¹⁾ schreibt: *Herniae umbilicales, si eas bene intuitus sum, chirurgiam nullam admittunt in adultis atque obesibus hominibus, semper argentur; nullum hucusque bracherium inventum, continendo tumori aptum. Id audacter pronuntio, quia omnes machinas, in hunc usum propositas, sollertia incredibili examinavi, earum correctionem etiam tentavi; sed effectus omnem spem succedendi inludit.* Auch Desault ²⁾ hielt die Radikalkur bey Erwachsenen für beinahe unmöglich. Desgleichen schreibt Richter ³⁾ in seinem neuesten Werke: „Bey Erwachsenen werden Nabelbrüche höchst selten geheilt. Bey Erwachsenen ist es überhaupt schwer, einen Nabelbruch zurück zuhalten; und man muß gestehen, daß es noch kein vollkommenes Bruchband giebt.“

Da ich glaube, daß die Aussprüche dieses Triumvirats jedes fernere Zeugniß entbehrlich machen; so enthalte ich mich aller ferneren Citationen.

§. 86.

Diese Aussprüche der Erfahrung kann man leicht durch physiologische Gründe erläutern. 1) Bey Erwachsenen läßt sich keine Zunahme an Kräften, kein Stärker-, Fester- und Zäherwerden der sehnigen weißen Linie, keine Verdickung des Bauchfells mehr erwarten und hoffen. 2) Gemein-

1) In seiner Preisschrift *de optima agendi vel exspectandi in medicina ratione*, 1776.

2) S. 29.

3) *Wundarzneykunst, fünfter Band*, Göttingen 1798. S. 540 und S. 544.

lich haben die mit Nabelbrüchen Behafteten eine geschwächte, schlechte, zum Fettwerden geneigte Constitution; meist sind es Weiber, welche oft schwanger waren, oder schwere Niederkunften ausstanden, oder Personen mit einem schlappen Hängebruche. 3) Gemeinlich wirken die Ursachen, die zum Nabelbruche Gelegenheit geben, mehr oder weniger fort; z. B. die Lebensart, die harte Arbeit, die Geneigtheit zum Fettwerden u. s. f.

§. 87.

Dieser nicht erfreulichen Prognostis ungeachtet, müssen wir uns doch nicht abhalten lassen, unser Heil zu versuchen; und wirklich kann man in den meisten Fällen doch gar große Erleichterung schaffen.

Bei kleineren Nabelbrüchen also, die nur Einen oder höchstens ein Paar Zoll im Durchmesser halten, habe ich mich mit größtem Nutzen, als des einfachsten Mittels, folgender Bruchbänder bedient. Eine der Größe und Gestalt des Bruches angemessene platte Pelotte, worinn man auch nach Monnikhoff's 1) Vorschlag eine Spiralfeder anbringen kann, mit Kopshaaren gefüllt und mit Leder überzogen, wird auf ein ovales, der Form des Bruches ringsum den Nabel angepaßtes, sehr dünnes, schildförmig ausgebeogenes, das heißt nach außen convexes, nach innen concaves, mit zartem Leder oder Barchent gehörig ausgepolstertes Blech oder gebranntes Leder von vier Zoll Breite, befestigt, und an jeder Seite mit einem, zwey bis vier Zoll breiten, Gurte versehen. Wurde dieses höchst einfache Bruchschild gehörig angelegt; so schien es mir un-

1) Vorrede pag. VII. a. a. D.

erniae umbilicales, rurgiam nullam ad hominibus, sem bracherium inven. Id audacter as, in hanc usum examinavi, earam fectus omnem spem (t) hielt die Nabelbrüche. Desgleichen Werke: „Bey ist selten geheilt. ver, einen Nabelbrüche, daß es noch liche dieses Zeiumachen; so enthalte im man leicht durch erwachsenen läßt rker, Zeller- und keim Verdickung n. 2) Gemeinlich endi vel exspectan Göttingen 1798. S.

ter allen Bandagen, dergleichen ich eine Menge von allerhand Formen besitze, die wenigste Unbequemlichkeit zu erregen, und den Bruch ganz gut zurückzuhalten. Es kommt nur darauf an, daß das Blech so geschlagen, oder das gebrannte Leder so geformt wird, daß es sich der Form des Bruches des Individuums gehörig anschmiegt, und daß die Pelotte so lange abgeändert wird, bis sie dem Patienten die erforderlichen Dienste leistet. An den Gurten bringt man kleine Schnallen an, um dieser Bandage bequemer die gehörige Festigkeit oder Lüftung zu geben.

Der von N i c h t e r n beschriebene Mechanismus läßt sich bey derselben leicht anbringen, wodurch sie alle Vortheile des elastischen Bruchbandes erhält; welches er ganz allein, als ein sicheres und zuverlässiges Band, empfiehlt. Noch gleichmäßiger fand ich den Druck, wann ich statt einer halbirkelförmigen Stahlfeder, zwey solcher Stahlfedern, nämlich in dem rechten und linken Gurte, anbringen ließ. Mit diesem Bruchbande scheint mir das von C h o p a r t und D e s a u l t empfohlene am meisten übereinzukommen.

§. 88.

Selbst bey größeren, ächten und unächten Nabelbrüchen wüßte ich kein besseres und einfacheres Mittel, außer daß man bey unächten Brüchen die Pelotte etwas flacher, auch nicht rundlich, sondern länglich nach der Form des Bruches einrichtet. Denn überhaupt darf man wohl mit N i c h t e r n die Regel fest setzen, daß ein Bruchband nach der Verschiedenheit des Bruches verschieden seyn, und verschiedenlich wirken müsse.

§. 89.

Auch muß ich die Bemerkung machen, daß ich mich

niemals auf die Kur eines Bruches bey Frauenzimmern einlasse, ohne mir vor allem auszubedingen, daß sie fernerhin keine eigentlichen Röcke, ja selbst keine feste Schürze mehr anlegen. Ich für mein Theil war wenigstens noch nie im Stande, Brüche bey dem weiblichen Geschlechte auch durch die besten Bruchbänder so leicht zurückzuhalten, als wenn ich mit den Weiberröcken eine abgeänderte Einrichtung treffen lies. Wurde hingegen die Kleidung mit Brüche behafteter Mädchen und Weiber so eingerichtet, daß Leibchen und eigentlicher Rock nur Ein Stück ausmachten, oder daß sie nach Art der Kinderwämschen, oder langen Kinderkleider, oder der sogenannten jetzt modigen Chemisen, von den Schultern hinabhingen; so wurde mir die sichere Zurückhaltung eines Bruches sehr viel leichter.

§. 90.

Da dieses Band sich als das beste gegen Nabelbrüche jeder Art, nach Überlegung und Erfahrung, bis jetzt bewiesen hat, und den Bedingungen der Preisfrage am meisten entspricht; so will ich, nur um dem Vorwurfe der Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Unvollständigkeit zu entgehen, die vorzüglichsten, zu gleichem Zwecke vorgeschlagenen, Nabelbruchbänder kurz anführen.

Das von Heister ¹⁾ beschriebene und abgebildete Nabelbruchband ist wohl in neueren Zeiten wenig gebraucht worden.

Eben so wenig empfiehlt sich das von Alex. Monro ²⁾ dem Vater abgebildete, und von Benj. Bell ³⁾ zum Theil copirte.

1) Institut. chirurgicae, Amst. 1750, Tab. XXIII. Fig. 6.

2) Wooks, Edinburgh, 1781. Plate V.

3) System of Surgery, Tome I. Tab. IV. Fig. 3.

Das von Suret ¹⁾ sehr artig erfonnene, umständlich von ihm beschriebene und schön abgebildete elastische Bruchband, findet man auch bey Richter ²⁾ abgebildet, und so trefflich beurtheilt, daß, weil ich dieses Werk in der Bibliothek jedes Wundarztes fand, ich mich darauf beziehe, und nur noch hinzufüge, daß auch Desault ³⁾, welcher fünf Sorten von Bandagen beschreibt, bemerkt, daß dieses Band sehr zusammengesetzt sey, viel koste, und die zurückgebrachten Theile doch nicht gehörig zurückhalte.

Juville ⁴⁾ und van Gesscher ⁵⁾ geben elastische verbesserte Nabelbruchbänder an.

Richter ⁶⁾ bildet ein Nabelbruchband von seiner Erfindung mit vier Stahlfedern ab, welches gewiß vor dem Suretischen und Juvillischen den Vorzug verdient.

Thebe ⁷⁾ schlug vor, das Nabelbruchband mit elastischem Harze zu überziehen.

Trecourt's ⁸⁾ zweyköpfiges Bruchband wird von Richtern nach Gründen verworfen.

Arnemann ⁹⁾ erwähnt eines elastischen Schildes gegen Nabelbrüche, welches d'Aimé zu Sedan verkauft.

1) Mémoires de l'Académie de Chirurgie à Paris, Tome second.

2) Von Brüchen, Tab. VI.

3) Seite 323.

4) Traité des Bandages herniaires, Paris 1786. S. Richter's chirurg. Bibliothek, Band 8. S. 392.

5) Verhandelingen v. h. M. de W. te Haarlem, Deel XIII.

6) a. a. O., Tab. VII.

7) Chirurgische Beobachtungen, 2. Theil 1782, pag. 162.

8) Mémoires et Obs. de Chirurgie, Paris 1769.

9) Bibliothek für Chirurgie, 1. Band 2. St. 348.

Waugion's Bruchband mit einer doppelten Stahlfeder, deren eine von unten nach oben hinaufgeht, beschreibt Sabatier 1).

Schreger's Nabelbruchband findet sich in der Salzburger med. chir. Zeitung 2) beschrieben.

Brüninghausen 3) beschreibt mit einer Abbildung ein elastisches Nabelbruchband, welches außer dem Bauchschilde, auf welchem eine mit einer Spiralfeder versehene Pelotte haftet, im Gurte an jeder Seite zehn Spiralfedern enthält, welche die bekannte Einrichtung und Verbindung der elastischen Arm- und Strumpfbänder haben.

Noch besitze ich ein Nabelbruchband, welches die artige einfache Einrichtung hat, daß auf dem Schilde eine zurückgeschlagene Feder haftet, deren in dem Gurte befestigte Arme bey der Anlegung zurückgebogen werden. Ich erhielt es ohne den Namen des Erfinders aus Paris.

Noch ein anderes besteht aus einer Feder, welche vorne einen Ring bildet, in welchem die seitwärts mit einem Stiele befestigte Pelotte spielt; deren Erfinder ich auch nicht kenne.

§. 91.

Große Nabelbrüche, die durch kein Nabelbruchband zurückgehalten werden können, hält man durch ein Leibchen oder Corset von Fischbein, welches mit Schnallen befestiget wird, ziemlich gut zurück 4).

1) a. a. D. Seite 124.

2) Jahrgang 1800. IV. p. 137.

3) Loder's Journal, dritter Band, Tab. II. Fig. 1. u. 2.

4) Richter's Wundarzneykunst, fünfter Band. S. 462.

ersonnene, umständ-
abgebildete elastische
Richter 4) abgebildet,
ich dieses Werk in
ich mich darauf
auch De Sautil 3),
beschreibt, bemerkt,
sey, viel koste, und
gehörig zurückhalte.
4) geben elastische
and von seiner Er-
s gewiß vor dem
Vorzug verdient.
ruchband mit ela-
uchband wird von
ruchlichen Schildes
Sedan verkauft.
ie à Paris, Tome
1786. S. 114
S. 32.
urlem, Deel XIII.
1782, pag. 162.
is 1769.
St. 318.

Fünfter Abschnitt.
Behandlung der eingeklemmten Nabelbrüche.

§. 92.

Da ich mich weder auf die Contenta eines Nabelbruches, welche unter andern Logger's in seiner Preisschrift schon eigen abgehandelt, noch auf die Zeichen der Einklemmung, welche Richter gründlich geschildert hat, einzulassen habe; so wende ich mich gleich zur Behandlung der Nabelbrüche im Zustande der Einklemmung.

§. 93.

Die bewährtesten Schriftsteller in diesem Fache, z. B. Pott, Richter, Desault, kommen sämtlich darinn überein, daß einerseits die Einklemmung eines Nabelbruches gewöhnlich nicht sehr heftig, und die Gefahr nicht nahe oder dringend sey, folglich man auch nicht, wie bey anderen Brüchen ¹⁾, mit der Operation zu eilen habe, und daß anderseits diese Operation immer sehr bedenklich und gefährlich sey ²⁾. Deswegen ist es um so erforderlicher, vorher alle Mittel zur Zurückbringung anhaltend zu versuchen, indem Richter's ³⁾ Worte sehr wahr bleiben: „Die vernünftige

- 1) Greve Sendschreiben an van Wy. S. Neue Sammlung für Wundärzte, im achten Stücke.
- 2) Die Operation des Nabelbruches erklärte Dionis für „très-perilleuse et presque toujours mortelle“, und Pott und Desault stimmen damit überein.
- 3) In der Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner Abhandlung von den Brüchen.

Behandlung eines eingeklemmten Bruches erfordert weit mehr Kenntniß und Scharfsinn, als die Operation; nicht allein chirurgische, sondern auch medicinische Kenntnisse.“ Nach Desault ist diese Operation gefährlich, theils weil man das Netz zu hoch abschneiden müsse, theils weil die Lage zum Abflusse der Feuchtigkeiten unbequem sey.

§. 94.

Bei der Einklemmung eines Nabelbruches suche man also vor allen Dingen die Ursache derselben zu erforschen; nämlich a) ob sich etwa eine Entzündung in den vorgefallenen Theilen zu zeigen anfängt? oder b) ob eine bloße Ausdehnung von Blähungen, oder eine Anhäufung von Kothe Statt findet? oder c) irgend ein krampfhafter Zufall Anlaß dazu gegeben habe? Diesen Veranlassungen der Einklemmung suche man sodann durch die bekannten Mittel zu begegnen.

§. 95.

Ohne also dasjenige zu wiederholen, was Richter und Desault über die Einklemmung im Allgemeinen lehren, welches auch hier seine Anwendung findet, bemerke ich nur, daß man, um sowohl einen ächten als unächten Nabelbruch durch die Laris bequemer zurück schaffen zu können, den Nabelring und die sehnige Strieme (linea alba), so viel möglich, von der Spannung zu befreien und zu erschlaffen suchen müsse. Dieses erreicht man, wenn man den auf den Rücken liegenden Kranken sich vorwärts beugen läßt. Alsdann bemüht man sich, durch einen gerade einwärts, ein wenig links gegen den

2) Einen eingeklemmten Nabelbruch beschreibt unter Andern *Wonnikhoff* in seiner Abhandlung von Brüchen, §. 56.

H nitt.
 klemmten Na
 eines Nabelbruches,
 er Preischnitt schon
 der Einklemmung,
 einzulassen habe;
 der Nabelbrüche
 dem Fache, 3; B
 sämtlich darinn
 ung eines Nabel-
 die Gefahr nicht
 nicht, wie bey
 u eilen habe, und
 hr bedenklich und
 rderlicher, vorher
 u versuchen, indem
 Die vernünftige
 S. Neue Samm-
 ifte.
 ärte *Dionis* für
 mortelle“, und
 überlein.
 seiner Abhand-

Glückgrath hingeworfene Druck mit der Hand, den Bruch-
sack zu entleeren.

Auf diese Art brachte ten Haaf ¹⁾ mit der bloßen
Hand einen alten eingeklemmten Nabelbruch bey einer
Bojährigen Frau glücklich zurück.

Neben der Laxis kann man, nach Verschiedenheit der
Umstände, entweder Eis, oder warme erweichende Bähun-
gen gebrauchen.

§. 96.

So sah Pettson ²⁾ bey einer vier Monate schwangeren
Frau einen Nabelbruch entstehen, und sich nach einigen
Tagen mit drohenden Zufällen einklemmen. Nach ver-
geblicher Anwendung der bekannten Mittel war er endlich
so glücklich, durch vier Stunden lange Auflegung von Eis
denselben gänzlich zurück zu bringen. Indessen warnt er
vor dem zu langen und zu stark fortgesetzten Gebrauche des
Eises, wodurch in einem anderen Falle in den Bedeckungen
eines Bruches der kalte Brand erfolgte. Auch Wilmer ³⁾
brachte den eingeklemmten Nabelbruch einer Frau durch
kalte Aufschläge zurück.

§. 97.

Da man durch Anwendung von Vitriol naphtha die
Einklemmung eines Leistenbruchs in einem Paar Fällen ⁴⁾

1) Verhandelingen v. h. H. M. d. W. te Haarlem, Deel
VIII. p. 495.

2) Memoirs of the Medical Society of London, 1792.
Vol. III.

3) On Herniae, London 1804. Case XVI.

4) Duncan Medical Commentaries for the Year 1793.
Desgleichen Con sbruch in Hufeland's Journal, VII.
Band, auch in Brugnatelli's Giornale fisico me-
dico, Tomo I. p. 1794.

glücklich gehoben hat ; so wäre dieses kostbare Mittel, in Ermangelung von Eis, bey vermögenden Leuten zu gebrauchen.

§. 98.

Dem braven Silibert ¹⁾ that das Pleyertract, äußerlich gebraucht, bey dem eingeklemmten Nabelbruche einer, durch langwierige Krankheit entkräfteten Weibsperson, gute Dienste. Eben derselbe ²⁾ hob in einem andern Falle, wo ein Bauchbruch Einklemmung drohte, die Zufälle durch erweichende Bahungen.

§. 99.

Ist der Bruch glücklich in die Bauchhöhle zurückgebracht ; so sucht man ihn durch das, im 85. §. empfohlene, Bruchband für die Zukunft bestens darinn zu erhalten.

§. 100.

Zeigt sich, bey sorgfältiger unverdrossener Anwendung aller dieser Mittel, nach Verlauf mehrerer Stunden kein Anschein von Verminderung des Bruches, sondern werden im Gegentheile die Zufälle nur noch dringender und heftiger ; so schreite man zur Operation.

§. 101.

Diese Operation kommt im Allgemeinen und Wesentlichen mit der, bey Leistenbrüchen gewöhnlichen, überein ³⁾. Nachdem man nämlich die, mitten auf dem Bruche in eine Falte erhobene, Haut eingeschnitten, und, wo möglich, ohne Verletzung des Bauchfells, (welches freylich oft wegen seiner festen Verwachsung mit der Haut sehr schwer hält),

1) Adversaria medico-practica, Deutsch, Leipzig 1792. S. 98. S. 155.
2) Ebend. S. 97.
3) Saviard p. 126. a. a. D. Chopart et Desault, a. a. D., im franz. Originale p. 261.

er Hand, den Bruch
f) mit der bloßen
Nabelbruch bey einer
Verschiedenheit der
erweichende Bahun-
Monate schwangeren
sich nach einigen
men. Nach ver-
el war er endlich
Anlegung von Eis
entessen wartet er
ten Gebrauche des
n den Bedeckungen
Mach Wilmer ¹⁾
einer Frau durch
rial naphtha die
Paar Fällen ¹⁾
te Haarlem, Deel
k London, 1791.
VI.
for the Year 1792,
Journal, VII.
ornale fisico me-

auch erweitert hat; so öfnet man nun behutsam den eigentlichen Bruchfack, bringt eine geflügelte Sonde ein, und schligt diesen Bruchfack mit einem geknöpfen Messer oder mit einer, an den Spitzen mit einem Knöpfchen versehenen Scheere ¹⁾, auf. Einige, z. B. le Dran, machten, um sich noch mehr Raum zu verschaffen, einen Kreuzschnitt; welches doch sehr zu widerrathen ist.

Darauf versucht man, durch den fürs Erste nicht erweiterten Nabelring, oder bey unächten Nabelbrüchen durch den Spalt der weißen Linie, das im Bruchfacke Eingeklemmte mit Vorsicht zurückzubringen.

Will dieses auf keine Art gelingen; so rath selbst Richter, bevor man wirklich den Nabelring oder die Spalte der weißen Linie einschneidet, den le Blancischen Haken, (sein Gorgeret dilatatoire oder sein Levier d'acier), zur Erweiterung der beengten Stelle, zu versuchen, mit demselben einwärts und aufwärts zu ziehen. Desault bedient sich dazu eines Dilatatoire à deux branches.

Den Erweiterungsschnitt rath man gemeinlich aufwärts und linkerseits (Sabatier rechterseits,) zu richten, um die etwa noch offene Nabelvene zu vermeiden. Allein biefer Fall, wann er wirklich existirt hat, und man nicht

¹⁾ Camper rath, so wie Platner, zur Scheere, um dem Kranken Schmerz zu ersparen. Ad praevendendum dolorem in herniosis, aliquoties usus sum forficulae in chiri successu felicissimo; quoniam pars tendinea secunda non extenditur, sed reprimitur ab altero forficulae crure. N. a. D. Vol. II. pag. 309. Etwas ähnliches sagt er auch pag. 311.

²⁾ Opération de la Chirargie; 1775. III. Q. 1. 2

irrig etwas anders dafür angesehen, ist so selten, daß man nicht darauf achten sollte. Und selbst gesetzt, die Nabelvene wäre offen, so sähe ich keinen Nachtheil davon; denn diese Vene kann doch nicht das Blut rückwärts strömen lassen. Mir schien bey solchen Gelegenheiten der beste Rath, die Stelle einzuschneiden, wo das Gefühl mit dem Finger die stärkste Schnürung verräth. Auch Rougemont¹⁾, ein überaus geschickter Anatom, bemerkt sehr richtig, daß man ganz dreist unterwärts einschneiden könne, weil sich selbst bey Haller kein Fall von nicht geschlossenen Arterien vorfinde. (Einen von Böhmern bemerkten Fall habe ich indessen oben angeführt.) Meine vielfältige Untersuchungen zeigten mir, selbst nach den aufs beste gelungenen Einspritzungen der Bauchdecken-Gefäße, nur sehr unbedeutende Ästchen in dem ganzen Umfange des Nabels. Richter²⁾ räth daher, so oft der Bruch neben dem Nabelringe, und die Einschnürung sehr fest ist, den Schnitt seitwärts zu richten, und auf diese Art die Fleischsüßern der Spalte in die Quere zu durchschneiden. Ein kleiner Schnitt, seitwärts gerichtet, schafft hier mehr Platz, als ein großer gerade aufwärts gerichteter. Liegt die Ursache der Einklemmung nicht sowohl im Nabelringe, als vielmehr im Halse des Bruchfackes; so muß dieser eingeschnitten werden. Wilmer³⁾ verlor einen Mann, den er operirt hatte, weil ihm dieser Umstand unbekannt war. Der Verband ist übrigens der, nach Bruchoperationen gewöhnliche, einfache.

1) In seiner Uebersetzung von Richter's Traité des Hernies, Bonn 1788.

2) Seite 648.

3) Case XVIII.

§. 102.

Auf diese Art heilte Schmucler ¹⁾ einen eingeklemmten Nabelbruch aufs glücklichste. Auf gleiche Art operirten auch Charp ²⁾, ten Haaf ³⁾, de Man ⁴⁾ und Luggers ⁵⁾, eingeklemmte Nabelbrüche.

§. 103.

Zuletzt will ich nur noch einiger neueren Erfahrungen gedenken, wo selbst brandig gewordene Nabelbrüche geheilt worden sind. Außer Cheseldey, Garengeot und Heister nämlich heilte Heuermann ⁶⁾ einen brandigen Bruch in einem 10jährigen Mädchen, desgleichen de Wind ⁷⁾ und Hare ⁸⁾, ungeachtet 9 Zoll vom Darmkanale verloren gingen. Wilmer ⁹⁾ sah in einer 47jährigen Frau einen brandig gewordenen Nabelbruch, wo auch ein Stück Darm verloren ging, in sechs Wochen glücklich heilen.

§. 104.

Endlich erhellt wohl aus dem Monnikhoff'schen, oben im 57 §. angegebenen Verzeichnisse, am offenbahrsten der Grund, warum man überhaupt, bey der ungeheueren Menge der Beschreibungen von Bruchoperationen, doch nur wenig Nabelbruchoperationen geschildert findet.

- 1) Chirurg. Wahrnehmungen, zweiter Band, Obs. 15.
- 2) Anmerkungen über die Chirurgie, S. 120.
- 3) Verhand. d. Holl. Maatsch, te Haarlem, Deel VIII., in einer Frau von 86 Jahren.
- 4) Ebendasselbst, Deel XIX. p. 371.
- 5) Preischrift S. 240 und 257. Tödlicher Ausgang.
- 6) Chirurg. Operationen. S. 238.
- 7) Verhand. d. H. M. te Haarlem, Deel VII, p. 124.
- 8) Journal de Médecine, Tome. XLVI.
- 9) Case XXV. a. a. D.

anatomic Tab 40

Erklärung der Figuren.

Erste Figur.

Ein Stück der Bauchdecken eines gesunden, starken, wohlgebildeten, neugeborenen Knaben, mit dem daran befindlichen Niese der Nabelschnur.

a. a. Dicke dieser Bauchdecken.
b. o. Wahre Haut, welche als ein Cylinder unter die Nabelschnur umfaßt. Die rechte Seite desselben b. pflegt länger, als die linke c. zu seyn.

d. e. f. g. Eigentliche Nabelschnur.

h. c. d. Grenzlinie zwischen dem Hautcylinder und der eigentlichen Nabelschnur, welche genau die Stelle bezeichnet, wo die Natur die Nabelschnur vom Körper des Kindes trennt.

e. Nabelvene, und
f. g. Rechte und linke Nabelarterie.

Zweite Figur.

Eben dasselbe Stück der Bauchdecken, von innen oder der Bauchhöhle zugewendeten Seite, angesehen.

h. Leder der Haut.

i. Fett zwischen der Haut und den geraden Bauchmuskeln.

- k. Rechter gerader Bauchmuskel.
- p. Bauchfell, zum Theil aufwärts zurückgeschlagen.
- m. n. l. o. r. u. Sehnige Ausbreitung, welche von dem schrägen und dem queeren Bauchmuskel stammt, und den Nabelring bildet.
- l. o. r. u. Nabelring. o. Oberer Bogen des Nabelringes, welcher aus stärker gebogenen, sehnigen Fasern gebildet wird. u. Unterer Bogen des Nabelringes, aus wenig gebogenen Fasern gebildet.
- I. o. r. Vertiefung oder Furche zwischen dem oberen Bogen und der Nabelvene.
- e. e. Nabelvene.
- f. g. Rechte und linke Nabelarterie.
- q. s. Ein Stück der Harnblase mit ihrer Schnur.

Dritte Figur.

Das nämliche Stück; nur ist das Bauchfell Fig. 2. p. weggenommen, und die Nabelvene e. nach unten zurückgelegt, um die Gestalt des oberen Bogens l. o. p. des Nabelringes deutlicher zu versinnlichen.

* Stelle, wo sich nur lockerer Zellstoff zwischen der Nabelvene e. und dem oberen Bogen des Nabelringes l. o. r. befindet, und welche zu ächten Nabelbrüchen am geneigtesten scheint.

V i e r t e F i g u r.

Das nämliche Stück; nur sind die Nabelarterien f. h. nebst einem Stückchen der Harnblase q. s. aufwärts zurückgelegt, um die Gestalt des unteren Bogens l. u. r. des Nabelringes zu versinnlichen. Die Arterien f. h. lassen sich gewöhnlich nicht rein von den sehnigen Fasern am Nabelringe bey u. trennen.

F ü n f t e F i g u r.

Ein Stück der Bauchdecken eines vierzigjährigen Mannes, mit einem durch Wassersucht veranlaßten Nabelbruche, von vorn angesehen.

- a. Leder der Haut.
- b. Fett zwischen der Haut und der vorderen sehnigen Ausbreitung des rechten geraden Bauchmuskels.
- c. Vorderes, dünneres Blatt der sehnigen Scheide des geraden Bauchmuskels.
- d. e. Gerade Bauchmuskeln. d. Rechter, e. linker Bauchmuskel.
- f. Durchschnittsfläche der sehnigen Strieme oder der linea alba.
- g. Hinteres dickeres Blatt der sehnigen Scheide des geraden Muskels.
- h. Vergetriebene, einen Bruch bildende Haut.
- i. Eigentliche Narbe des Nabels, durch den Bruch links und unterwärts verschoben.

Diese Figur, nebst der folgenden, gehört zur sechsten Beobachtung.

Bauchmuskel.
 Theil aufwärts zu
 tung, welche von
 und dem quereen
 Kammt, und den
 et.
 Oberer Bogen des
 welcher aus stärker
 sehnigen Fasern ge-
 u. Unterer Bogen
 s, aus wenig ge-
 gebildet.
 urch zwischen dem
 und der Nabelvene.
 Nabelarterie.
 arnblase mit ihrer
 u. r.
 Bauchfell Fig. a.
 ach unten zurück-
 s l. o. p. des Na-
 r lockerer Zellstoff
 Nabelvene e. und
 gen des Nabelrin-
 ändet, und welche
 brüchen am gemei-

Sechste Figur.

Das nämliche Stück von der Bauchhohlenseite angesehen.
a. b. c. d. e. f. g. wie in der vorigen Figur.

m. i. k. Nabelring. k. Oberer Bogen desselben.

k. q. Zur Durchlassung des vom Bauchfelle

o. p. gebildeten Bruchfackes q. erweiterte

Stelle des Nabelringes, welche der Stelle

* in der dritten Figur entspricht.

l. Nest der Nabelvene.

m. n. Nester der Nabelarterien.

o. p. p. Bauchfell.

q. Durch den Nabelring, an der rechten Seite
des Nestes der Nabelvene l., zu einem
Bruchfacke vorgetriebener Theil des Bauch-
fells.

Siebente Figur.

Senkrechter Durchschnitt des Nabels und der Bauch-
decken aus einem erwachsenen Manne:

a. Oberfläche der Haut des Unterleibes.

b. Nabelgrube.

c. c. Fett unter der Haut.

d. Sehnige Ausbreitung (linea alba) oder
Sehnenstriemen.

e. Von den Sehnenstriemen abgelöstes und
zurückgeschlagenes Bauchfell.

f. g. Geschlossene, für sich bestehende, kleine
Höhle, welche ein Fettklumpchen, nach
Art eines Schleimbeutels, enthält.

h. Stiel dieses Fettklumpchens.

Senckenb.
med. Institut.



Samuel Thomas Sömmerring

über die

Ursache, Erkenntniß und Behandlung

der Brüche

am

Bauche und Becken

ausser der Nabel- und Leistengegend.

Eine im Jahre 1808 zu Amsterdam gekrönte Preisschrift.

Frankfurt am Main,
bei Johann Friedrich Benner.

1811.

Samuel Johans Senckenberg

1726

Samuel Johans Senckenberg

1726

Samuel Johans Senckenberg

1726



Experientia et ratione.

—————
 B e a n t w o r t u n g
 der für den 1. Merz 1808 zu Amsterdam
 von der
 Assemblée des Administrateurs
 du Legs de feu Mr. Monnikhoff
 ausgesetzten Preisfrage.

„Puisque les oeuvres de Chirurgie traitent non seulement des hernies inguinales, crurales et ombilicales, mais citent en outre des pareilles descentes des intestins, qui se forment au bas-ventre et aux environs du bassin; l'on demande:

„1^o Quelles de ces descentes meritent le nom d'hernies, et existent en effet, ou non?

„2^o Quelle exacte connoissance anatomique des endroits, où elles se présentent, et de ces maladies externes mêmes un Chirurgien doit-il avoir, afin de les bien di-

stinguer de tous autres maux, qui peuvent avoir lieu à ces mêmes endroits?

3° Lesquelles de ces descentes demandent un traitement chirurgical pour être guéries, et lesquelles n'en sont point susceptibles, mais exigent seulement d'être soutenues et retenues?

4° Quels manuels, opérations, remèdes, instrumens et bandages conviennent dans ces différens cas et selon les circonstances; et quels préceptes de l'art et observations convaincantes peuvent éclairer la conduite du Chirurgien, pendant le traitement de chacune de ces hernies?

Erstes Hauptstück.

*Quelles de ces descentes méritent le nom
d'hernies, et existent en effet ou non?*

§. 1.

Außer der Gegend der Leisten, der Schenkel und des Nabels giebt es besonders neun bis zehn Stellen am Unterleibe und Becken, wo Därme oder andere Eingeweide enthaltende Vortreibungen des Bauchfells wirklich mehrere Male beobachtet worden. Diese Stellen sind:

- Der Zwerchmuskel;
- die mittlere und vordere Gegend der Bauchdecken
oder die sogenannte weiße Linie;
- die ganze übrige rechte und linke Seite der Bauch-
decken;
- die Lendengegenden der Bauchdecken;
- die Stelle rechts und links, wo der ischiadische
Nerve aus dem Becken tritt;
- das Schaambein, welches ein Löchelchen hatte;
- die Stelle rechts und links am ovalen Loch des
Hüftbeins, wo die vasa obturatoria nebst
dem Nerven liegen;
- das Mittelfleisch oder der Damm (perinaeum);
- die Scheide des Uterus;
- und der Uterus selbst.

§. 2.

Nach der strengsten Analogie der allgemein angenommenen Benennungen: *hernia inguinalis*, *hernia cruralis*, *hernia umbilicalis*, verdienen, wie ich weiter unten im Einzelnen zeige, die an diesen Stellen vorkommenden Brüche den Namen:

Hernia diaphragmatica. §. 5.

Hernia lineae albae. §. 10.

Hernia ventralis. §. 11.

Hernia lumbalis. §. 15.

Hernia ischiadica. §. 16.

Hernia ovalaris. §. 18.

Hernia foraminis ossis pubis. §. 21.

Hernia perinaei. §. 22.

Hernia vaginalis. §. 24.

Hernia uterina. §. 26.

§. 3.

Wenn es nämlich durch die Zeugnisse bewährter Schriftsteller bewiesen werden kann, daß an diesen zehn Stellen (§. 1.) eben so gut, wiewohl seltner, als an den Leisten, an den Schenkeln und am Nabel, Eingeweide des Unterleibs enthaltende Vortreibungen vorkommen, 2) daß solche Vortreibungen der Eingeweide in dem gleichsam nur von seiner Stelle gewichenen (deplacirten), und sack- oder beutelförmig gewordenen Bauchfelle enthalten sind; so wird dadurch den beiden Punkten der ersten Frage zugleich ein Genüge geschehen, nämlich, sowohl daß diese, Eingeweide enthaltende Vortreibungen, wirklich existiren, als daß sie den Namen Brüche (*herniae*) verdienen.

§. 4.

Ohne mich in literarische Wortstreitigkeiten einzulassen, oder an unnöthigen Neuerungen Gefallen zu finden, bleibe ich bey den Definitionen, welche sowohl ältere als neuere Schriftsteller von dem Kunstworte: hernia, geben. Schon Celsus ¹⁾ bezeugt, daß der Name hernia zu seiner Zeit der gemeinste war: apud nos indecorum, sed commune his (nämlich für *ἐντεροκέλη* und *ἐπιπλοκέλη*) herniae nomen est.

Kuysch ²⁾ schreibt: herniam magis esse extensionem, aut expansionem peritonaei, quam rupturam aut dilacerationem ejus, haud dubito, quin inter Medicorum filios satis constat.

Nach de Gorter ³⁾: Peritonaei lamellae portio prolongata, ut specialem succum format, vel in umbilico, vel inguinibus, vel inter abdominis musculos recedentes, vel etiam ubi egrediuntur vasa iliaca, vocatur hernia.

Nach Camper ⁴⁾: omnis praeternaturalis peritonaei tumor seu dilatatio hernia vocatur.

Richter ⁵⁾ sagt in seinem neuesten Werke: „Ein Bruch entsteht, wenn irgend ein Eingeweide aus der Höhle, in welcher es sich natürlicher Weise befindet, in einen widernatürlichen Sack oder Beutel fällt.“

1) de Medicina lib. VII. cap. 18.

2) Observationum anatomico-chirurgicarum Centuria. Amst. 1691. Obs. 98. pag. 91.

3) Chirurgia repurgata. Lugd. Batav. 1742.

4) Demonstrationes anatomico-pathologicae. Amst. 1762. Libr. II. do. §. 1.

5) Wundarzneykunst. Fünfter Band. §. 211.

allgemein angeneh-
malis, hernia cru-
n, wie ich weiter
en Stellen vorkom-

5.
o.

§. 21.

agnitise bewährte
sich an diesen zehn
tner, als an den
el, Eingeweide
en vorkommen,
e in dem gleich-
placirten), und
schfelle enthalten
der ersten Frage
sowohl daß diese
irklich existi-
(herniae) ver-

Nach A. Cooper ¹⁾: A protrusion of any viscus from its proper cavity is denominated a hernia. The protruded parts are generally contained in a bag, formed by the membrane with which the cavity is naturally invested.

Und Richerand ²⁾, der neueste französische Schriftsteller, definirt: Hernie; ce terme indique toute tumeur formée par des organes, qui sortent de la cavité, dans laquelle ils sont naturellement renfermés; mais il s'étend plus spécialement de celles, produites par l'issue des viscères abdominaux.

Um dem Vorwurfe einer Einseitigkeit, oder irgend einer Lieblingsmeinung zu entgehen, habe ich diese sechs Definitionen angeführt.

Ich wende mich daher auch gleich zur Ausführung der vorzüglichsten einzelnen Beyspiele von diesen Brüchen, die ich überall, nach Maassgabe des Gegenstandes, in chronologischer Ordnung vortrage.

Hernia diaphragmatis, Zwerchmuskelbruch.

§. 5.

Die Zwerchmuskelbrüche sind entweder angeboren oder erworben.

Von angebohrnen Zwerchmuskelbrüchen haben wir folgende zuverlässige Beyspiele:

- 1) The Anatomy and surgical treatment of inguinal and congenital hernia. London 1804.
- 2) Nosographie chirurgicale. Paris 1806 et 1807. Tome 2. pag. 403.

Laur. Strauß ¹⁾ führt ein Beyspiel an, wo Magen, Netz und Colon durch eine Lücke im Zwerchmuskul in der Brusthöhle lagen.

Charles Holt ²⁾ fand in einem zweymonatlichen Kinde fast den ganzen Darmkanal in der Brusthöhle.

Lax Riverius ³⁾ sah den Magen statt der Lunge in der rechten Brusthöhle liegen in einem 24jährigen Jünglinge, welcher im Leben gar nicht darüber geklagt hatte, doch aber nach einem genommenen Brechmittel, ohne sich übergeben zu können, elendiglich starb.

Einen sehr ähnlichen Fall erzählt Blancard ⁴⁾ von einem Soldaten, in dessen rechter Brusthöhle sich der Magen statt der rechten Lunge befand.

Becker ⁵⁾ desgleichen, wo in einem fünfjährigen Knaben das Mediastinum fehlte, und Magen, Milz und Leber in der Brusthöhle lagen.

Stae helin ⁶⁾ gedenkt eines weiblichen Foetus, in welchem durch eine Spalte im linken Theile des Zwerchmuskels, Magen, Milz und Zwölffingerdarm, nebst einem Theile der Leber und des Netzes, in die linke Brusthöhle gedrungen waren.

1) Resolutio fetus singularis Mussipontani. Darmst. 1661.

2) Philosophical Transactions n. 277. in Lesske's Auszügen, Theil I. S. 130.

3) Obs. med. Centuria IV. Obs. 67. in Boret sepulchreto. libro III. Sect. 8. Obs. 27. pag. 305.

4) Obs. 70.

5) Acta Eruditorum Lipsiensium. Anno 1706. Aprilis pag. 173.

6) Tentamen medicum 1721. wieder abgedruckt in Haller's selectus diss. anatomicarum Vol. tertio. Thesi 3.

ision of any vis-
minated a hernia.
contained in a
h which the ca-
ranzösische Schrift-
e indique toute
ai sortent de la
llement renfer-
ment de celles,
ominiaux.
it, oder irgend
ich diese sechs
Ausführung der
Brüchen, die
des, in chroni-
tis,
weder ange-
rücken haben
f inguinal and
007. Tome 2.

Chauvet ¹⁾ bemerkte in einem Officiere, wahrscheinlich als angebohrne Mißbildung, den Magen, die halbe Milz, nebst einem Theile des Colons in der Brusthöhle. Das Colon trat durch eine zweyte Öffnung wieder in den Unterleib. Beyde Öffnungen im Zwerchmuskel hatten knorpelige Ränder, und waren mit dem Darne verwachsen.

Leprötti fand, nach Morgagnis Zeugniß, in seiner Epist. LIV. Art. 11. de sedibus et causis morborum, wo er trefflich von Zwerchmuskelbrüchen handelt, ebenfalls als angebohrne Mißbildung, in einem alten Manne durch eine Lücke im Zwerchmuskel einen Theil des Colons in der Brusthöhle gelagert.

Fothergill ²⁾ schildert, höchst meisterhaft, die Zufälle, welche ein zehnmönatliches Mädchen erlitt, in deren Leiche sich ein angebohrner Zwerchmuskelbruch zeigte, welcher den Magen, den Dünndarm, den Blinddarm nebst dem wurmförmigen Fortsatze erhielt.

G. Macaulny ³⁾ beschreibt sehr genau, mit vorzuziehlichen Abbildungen in Lebensgröße, zwey solche Fälle: 1) einen wahren Zwerchmuskelbruch in einem kaum anderthalb Stunden alten Knaben, wo Magen, Milz, Pancreas, und der größte Theil des Darmkanales in einem Sacke des Bauchfells durch eine Spalte des Zwerchmuskels in die linke Brusthöhle gedrungen waren. 2) Einen wahren Zwerchmuskelbruch in einem Mädchen, welches $\frac{3}{4}$ Stun-

1) Mémoires de l'Acad. Royale des sciences à Paris 1729.

2) Philosophical Transactions Vol. 44. 1746. Nro. 478. in Lesske's Uebersetzung Theil 3. S. 229.

3) Medical Observations and Inquiries. Vol. 1. Art. 4.

den lang gelebt hatte, auf der rechten Seite, welcher die Leber und den Dünndarm enthielt.

Verschiedene Fälle führt Haller 1) an, und rühmt besonders van Geuns 2) Abhandlung über diesen Gegenstand, wegen ihrer Genauigkeit.

Desgleichen Sandifort 3).

G. Ch. Loder 4) fand in einem 30jährigen Manne den vollen Magen, nebst einem Theile der Milz und des Netzes, in der linken Brusthöhle, als angebohrne Mißbildung, durch eine vor dem Schlitze für die Cardia befindliche Öffnung des Zwerchmuskels gedrungen.

C. Chr. Klein 5) fand in der linken Brusthöhle eines hirnlosen Foetus den Magen und Dünndarm.

Better 6) sah in der linken Brusthöhle sowohl in einem alten gefunden Manne den ganzen Dünndarm, — als in einem Kinde von sechs Wochen fast alle Eingeweide sich befinden.

Den Fall bey Pyl 7), wo Magen, Netz, ein Theil des Fleums, und ein großes Stück des Colons in einem Sacke des Zwerchmuskels lag, scheint auch hierher zu gehören.

- 1) Elementorum Physiologiae Tomo sexto 1777. p. 118.
- 2) Verhandlungen der Hollandschen Mantschapye. Tomo VIII. Parte 1. S. 171.
- 3) Observationes anatomico-pathologicae. Libro quarto. cap. 5. p. 48. not. p.
- 4) Progr. observatio herniae diaphragmatis. Jenae 1784.
- 5) Diss. sistens monstrorum quorundam descriptionem. Stuttgartardiae 1794. Casus 4.
- 6) Aphorismen aus der praktischen Anatomie. Seite 144.
- 7) Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 5. Theil. Nro. 5.

Officiere, wahrscheinl. Magen, die halbr. in der Brusthöhle, ung wieder in den Zwerchmuskel hatten dem Darne ver. n i s Zeugniß, in s et causis mor- selbrüchen handelt, in einem alten einen Theil des terhaft, die Zu- erlitt, in deren ruch zeigte, wel- Blinddarm nebst genau, mit vor- sey solche Fälle: m kaum andert- Milz, Pancreas, in einem Sacke Zwerchmuskels in Einen wahren Alches 3/4 Stun- ces à Paris 1729. 1746. Nro. 478. 29. Vol. 1. Art. 4.

Endlich hatte auch ich Gelegenheit, einmal in einem Kinde den Magen in der linken Brusthöhle liegen zu sehen, als angebohrne Mißbildung.

§. 6.

Von erworbenen, wahren Zwerchmuskelerbrüchen findet man ebenfalls häufige Beyspiele bey den bewährtesten Schriftstellern.

Wenn ich theils die Fälle, als sie zu unserm Zwecke gar nicht gehören, übergehe, wo durch Wunden des Zwerchmuskels, die Eingeweide des Unterleibes in die Brusthöhle geriethen ¹⁾, theils die älteren Fälle von Claudorps, Heer, Clossarus, Ballonius, nicht näher angebe, weil solche sich schon bey Bonet in sepulchreto, bey Morgagni de sedibus et causis morborum, und bey Lieutaud excerptis finden, so gehören zu den vorzüglichsten Beyspielen folgende:

Lh. Bartholin ²⁾ fand in einem jungen Manne, der an heftigem Erbrechen gelitten hatte, auf der linken Seite den Magen, den Zwölffingerdarm, und einen großen Theil des Dickdarmes in der linken Brusthöhle; die weite Mündung im Zwerchmuskel hatte einen callosen Rand.

Sagwitz ³⁾ sah in einer Frau den größten Theil des

1) Ambr. Paracus oper. Frcofti 1594. Lib. 9. cap. 30. pag. 308. Sennert bey Fabricius, Hildanus, Blancard, Moebius, Muys, St. v. d. Wiel, Valentini, Verduſ. *Leblanc*.

2) Histor. anat. varior. Centuria VI. Hist. 55. und umständlicher von Clauder Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. obs. 195. pag. 386.

3) Acta Berolinensia. Dec. II. Vol. 4. obs. I. pag. 64.

Magens durch ein rundes Loch durch den linken fleischigten Theil des Zwerchmuskels in die Brusthöhle geschlüpft.

Buddäus ¹⁾ fand durch eine weite Mündung im sehnigen Theile des Zwerchmuskels den Magen nebst dem Netze in die linke Brusthöhle vorgeedrungen.

St. Andre ²⁾ entdeckte nach einem heftigen Erbrechen, und großen Schmerzen im Unterleibe, einen Theil des Colons nebst dem Netze ^{und} Pancreas, durch die Lücke des Zwerchmuskels zum Durchgange des Nervi sympathici in die Brusthöhle getrieben.

J. B. Fantoni ³⁾ sah den Magen nebst einem Theile des Netzes durch die Mündung für den Schlund in die Brusthöhle geschlüpft.

Schober ⁴⁾ fand in eben dieser Mündung des Zwerchmuskels für den Schlund einen Theil des Dünndarms enthalten, in einem Manne der an scirrhöser Leber litt. Ueberdies war noch Magen, Netz und Dünndarm mit dem ungetrennten (integrum) Zwerchmuskel in die Brusthöhle vorgeedrungen.

Kirschbaum ⁵⁾ erzählt den Fall, wo eine, in zwölf Stunden tödliche Schußwunde durch die linke Brusthöhle

-
- 1) Breslauer Sammlungen. Tentamen 24. May Classis 4. Art. 10. p. 561.
 - 2) Philosophical Transactions. ¹⁷⁷⁷ Vol. 30. N. 351. S. 580. in Lesske's Uebersetzung. 1. Theil. S. 152.
 - 3) de Observationibus medicis et anat. Epistolae 1714. Obs. XXIII.
 - 4) Eph. Nat. Cur. Cent. 5. et 4. App. S. 147.
 - 5) Diss. de Hernia ventriculi. Argent. 1749. S. 4. in Haller's Diss. chirurg. Tomo tertio. S. 218.

einmal in einem
ste liegen zu sehen
Zwerchmuskul.
Beispiele bey den
unserm Zwecke gar
nden des Zwerch-
in die Brusthöhle
n Glauder p,
t näher angebe,
ulchreto, bey
rborum, und
ren zu den vor-
ungen Manne,
auf der linken
nd einen großen
öhle; die weite
sen Hand.
sten Theil des
Lib. 9. cap. 30.
, Hildanus,
t. v. d. Wiel,
t. 55. und um-
r. Dec. II. an
I. pag. 64.

verursachte, daß der Magen durch die getroffene Sehne des Zwerchmuskels in die Brusthöhle drang.

J. L. Petit ¹⁾ beobachtete zweymal sehr alte Zwerchmuskelfröche auf der linken Seite. In dem einen Falle waren Magen und Colon in der Brusthöhle befindlich, übrigenß frey, und nicht angewachsen. Leerheit des Magens machte Beängstigung und Übelkeit, welche mit der Anfüllung verschwanden. In dem andern Falle, welcher ihm ein angebohrner schien, bildete der Zwerchmuskel einen mit der linken Lunge verwachsenen förmlichen Sack, welcher aus der Pleura und dem Peritoneo bestand.

Andr. Bonn ²⁾ schildert unvergleichlich den von ihm selbst untersuchten Fall eines erwachsenen starken Mannes, welcher seit zwey Jahren hinkte, und auf der rechten Seite nicht nur einen Knochenbruch des Halses des Schenkelbeins, sondern auch eine Inguinal hernia hatte. Fast alle Rippen der rechten Seite waren gebrochen gewesen, einige sogar zweymal, und wieder zusammengeheilt. Der Zwerchmuskel zeigte gleichfalls im rechten Theile seines Fleisches ein längliches quær liegendes Loch, welches einen sehnigen glatten Rand hatte, an welchen Brustfell und Bauchfell zusammen geschmolzen schienen. Das Stück des Dickdarms, welches den Magen und die Leber zu berühren pflegt, war mit fast dem ganzen Netze hinter der Gallenblase umgebogen, und durch dieses Loch in die Brusthöhle vorgefallen, stellte eine hernia ohne Sack vor, welche

1) *Traité des Maladies chirurgicales. Ouvrage posthume.* Paris 1774. Edit. 1790. pag. 229. und pag. 233.

2) *Descriptio Thesauri ossium morbosorum Hoviani.* 1783. Nro. CCIV. pag. 69.

innerhalb dem Thorax durch die Anhängsel des Colons und durchs ausgeartete Netz, die mit Fett angefüllt waren, dieses Loch des Zwerchmuskels so verschloß, daß die viele in dieser Brusthöhle befindliche, und die rechte Lunge zusammendrückende Feuchtigkeit nicht in die Brusthöhle gerathen konnte. Das Brustfell und das Bauchfell zeigten hier herum Spuren von Entzündung. An ergo hernia incarcerata fuerit? an lusus naturae, an costa perfracta huic morbo ansam dederit? (Das letzte ist wohl am wahrscheinlichsten). Incertum. Aeger febre extinctus est.

S i m m o n s ¹⁾ fand in einer 40jährigen Frau einen an der unteren Fläche der Leber befindlichen Sack voll Wasserblasen, durch den Zwerchmuskel in die linke Brusthöhle gedrungen, und mit der Lunge verwachsen.

E. E. D e r r e c a g a i r ²⁾ fand in einem 54jährigen Manne, der schon vor funfzehn Jahren, und dann kürzlich wieder von einer beträchtlichen Höhe gefallen war, durch eine alte, drey Zoll weite Wunde, im sehnigen Theile des Zwerchmuskels, den Magen, nebst einem Theile des Dickdarmes in die linke Brusthöhle getrieben. Weiter linkerseits zeigte sich ein zweytes frisch scheinendes Loch, durch welches noch ein Stück des Colons ebenfalls in die Brusthöhle getreten war.

J. B. M o n t e g g i a ³⁾ fand in einem Manne, dem das Rad eines Lastwagens über den Bauch gegangen war,

1) Medical Communications. Vol. first. 1784. Art. 5.

2) Desault Journal de Chirurgie. Tome troisième 1792. Art. 2.

3) Fasciculi pathologici. Mediolani 1783. pag. 99.

den Magen und den Dünndarm, nebst dem Querstücker des Dickdarmes durch einen Riß des Zwerchmuskels in die linke Brusthöhle getrieben.

Preiß ¹⁾ sah in einem 72jährigen Manne, der vor zwanzig Jahren aus dem zweyten Stockwerke eines Hauses gestürzt war, mehrere Stücke des Darmkanales in der Brusthöhle liegen.

G. Clarke ²⁾ beschreibt einen tödtlichen Zwerchmuskelfbruch mit zwey schönen Abbildungen aus einem Manne, wo nach einem Falle die in der Brusthöhle befindlichen Eingeweide des Unterleibs eingeklemmt waren.

Das nämliche pathologische Präparat bildet fast noch schöner M. Baillie ³⁾ ab.

A. Cooper ⁴⁾ sah in einem Falle das Colon in der Brusthöhle in Berührung mit der Lunge ohne einen Sack vom Bauchfelle. Allein in einem andern Falle sah er the viscera included in a process of peritoneum.

Noch einige ähnliche Fälle von Zwerchmuskelfröchen citirt Voigtel ⁵⁾.

V. d. am Blatt 2.

§. 7.

- 1) Salzburger medicinische Zeitung 1798. S. 265.
- 2) Transactions of a Society for the Improvement of medical and surgical Knowledge. Vol. II. 1800. Art. 8. recht gut nachgestochen in Fries's Annalen der Britischen Arzneykunde. Band I. St. 2.
- 3) A Series of Engravings accompanied with Explanations, which are intended to illustrate Morbid Anatomy. London 1803. Fasciculo quarto. Plate 8. fig. 1.
- 4) The Anatomy and surgical treatment of Hernia. Lond. 1784. Fol. p. 3.
- 5) Handbuch der pathologischen Anatomie. Halle 1804. 2ter Band. S. 292. nota 26.

Notation für den Hagestätt. N. J. Médecine expérimentale T. 2.

garte leup. Journal de Médecine Tom d'III. p. 416

§. 7.

Aus diesen angeführten Fällen ergeben sich folgende Resultate:

- 1) existiren wirklich solche Vortreibungen der Eingeweide des Unterleibs durch den Zwerchmuskel in einer der Brusthöhlen;
- 2) werden solche Vortreibungen der Eingeweide des Unterleibs öfter auf der linken, als rechten Seite angetroffen. Die Ursache hiervon scheint in der Leber zu liegen, welche, indem sich ihr genau die rechte Hälfte des Zwerchmuskels anschmiegt, eine solche Vortreibung der Därme in die rechte Brusthöhle hindert. Indessen beweist das Beyspiel von Macaulny, daß die Leber selbst als angebohrne Mißbildung, in der rechten Brusthöhle gelagert erscheint, und das Beyspiel von Bonn, daß auch neben der Leber vorbey Eingeweide des Unterleibs in die Brusthöhle gerathen können. Daher Richerand (a. a. O. S. 457.) offenbar zu weit geht, wenn er Zwerchmuskelbrüche auf der rechten Seite für unmöglich hält.
- 3) Die Stellen des Zwerchmuskels, wo diese Vortreibungen vorkommen, sind gemeinlich sein muskulöser Theil, seltener sein sehniger Theil, noch seltener sein Schlig, in welchem der Schlund liegt (Fantoni und Schober), am seltesten wohl seine kleine Lücke, in welchem der sympathische Nerve liegt (St. Andre).
- 4) sind die Zwerchmuskelbrüche a) theils angeboren, b) theils erworben, durch äußere Gewalt, z. B. durch einen Stoß, Fall, Druck, oder Schuß;

ist dem Quersch
 werchmuskels in die
 r Manne, der ver
 werke eines Hauses
 armfanales in der
 lichen Zwerchmus.
 us einem Manne,
 e befindlichen Ein
 n.
 bildet fast noch
 Colon in der
 hne einen Saft
 Falle sah er the
 toneum.
 chmuskelbrüchen
 §. 7.
 S. 265.
 mprovement of
 Vol. II. 1800.
 s Annalen der
 with Explana-
 Morbid Anato-
 Plate 8. fig. 1.
 ut of Hernia.
 Halle 1804.

c) theils veranlaßt durch innere Ursachen, z. B. heftiges Erbrechen, starkes Niesen, oder Geschwülste im Unterleibe.

- 5) Daß diese Vortreibungen der Eingeweide des Unterleibs durch den Zwerchmuskel den Namen von wahren, ächten Brüchen verdienen, beweisen insbesondere die Fälle von Pyl, Macaulny und Cooper, auf welche die im 4ten §. angegebenen Definitionen eines Bruches ganz vollkommen passen. In einem Falle von Cooper, und in beyden Fällen von Macaulny nämlich, lagen die Eingeweide des Unterleibs nicht vom Bauchfelle entblößt, durch einen Riß oder Spalte des Zwerchmuskels in die Brusthöhle gerathen, sondern sie befanden sich in einem, vom Bauchfelle gebildeten, durch die bloß von einander entfernten Muskelfasern des Zwerchmuskels dringenden förmlichen Bruchsacke, in der Brusthöhle, gerade wie dieses der gewöhnliche Fall bey Inguinal-, Crural- und Umbilical-Brüchen zu seyn pflegt.
- 6) Diese Brüche verdienen eben den Namen: hernia diaphragmatis, nicht thoracis, zufolge der strengsten Analogie der Benennungen: hernia inguinalis, cruralis, und umbilicalis, nicht nur um sie von den wahren herniis thoracis, bey welchen mit oder ohne pleura die Lungen oder das Herz vordringen, zu unterscheiden, sondern auch weil sie nicht der thorax, sondern das diaphragma als Pforte durchläßt.
- 7) Daß aber auch Zwerchmuskelbrüche ohne Bruch-

fact vorkommen, beweist der Fall bey Bonn aufs vollkommenste. Rupto diaphragmate peritonaeum semper rumpi certum est, sagt daher Klinkosch 1).

8) Gewöhnlich bewirken die beträchtlichen angebohrnen Zwerchmuskelbrüche, indem sie sich der Entfaltung und Ausdehnung der Lungen widersetzen, in wenigen Stunden, durch Erstickung, den Tod des neugebohrnen Kindes.

9) Gestatten hingegen Zwerchmuskelbrüche den Lungen hinreichende Erweiterung, so werden die Kranken doch meistens lebenslänglich von Besängstigungen und beschwerlicher Verdauung gequält

10) Allein es giebt auch Fälle, wo diese Zwerchmuskelbrüche das ganze Leben hindurch keine Zufälle erregten, folglich unentdeckt blieben, und nur zufällig bey Leichenöffnungen erst entdeckt wurden; z. B. in den Fällen von Chauvet, Leprotti, Loder, Riverius und Wetter. Doch will St. Andre einen solchen Bruch schon im Leben erkannt haben.

11) Daß Zwerchmuskelbrüche, ebenfalls so wie die drey gemeinern Brucharten (inguinalis, cruralis und umbilicalis) einer Einklemmung ausgesetzt sind, beweisen die Fälle von Riverius und Clarke.

1) Programma, quo divisionem herniarum proponit. Pragae 1764. 4. pag. 18. Nota 31.

ere Ursachen, z. B.
Diesen, oder Ge
Eingeweide des
Muskel den Namen
erbienen, beweisen
yl, Macaulay
4ten §. angege
s ganz vollkommen
Cooper, und in
y nämlich, lagen
nicht vom Bauch-
oder Spalte des
e gerathen, son-
vom Bauchfelle
inander entfernten
fels dringenden
Brusthöhle, ge-
te Fall bey In-
Brüchen zu seyn
Namen: hernia
s, zufolge der
lungen: hernia
bilicalis, nicht
rniis thoracis,
a die Lungen oder
heiden, sondern
, sondern das
he ohne Bruch



Hernia ventralis ¹⁾.

Ἰπογαστροκήλη, Hypogastrocele, Bauchbruch.
Hernie ventrale.

§. 8.

Bauchbrüche, das ist, Brüche an andern als den gemeineren Stellen, (nämlich an den Leisten, Schenkeln und am Nabel), sind gar häufig beobachtet worden. Nach Günst ²⁾ sind Bauchbrüche schon von Hippokrates, Celsus, Galenus, Rhazes u. s. f. beobachtet worden. Einige ältere Wundärzte gedenken der Bauchbrüche auch wohl unter der Benennung: hernia umbilicalis. Dionis ³⁾ unterschied aber unter andern schon richtig die hernie ventrale vom l'exomphale.

§. 9.

Ich übergehe sowohl die ungeheuren angebohrnen

1) Ventrales nennt diese Bruchart schon Montagnana im 15ten Jahrhundert. Consilior. 227. Cap. 1.

Beat Ignat. la Chausse Diss. de hernia ventrali. Argentorati 1746, wieder abgedruckt in Haller's Diss. chirurg. dem dritten Bande, S. 181.

Joseph Thaddaeus Klinkosch Programma, quo divisionem herniarum, novamque herniae ventralis speciem proponit. Praegae 1764. 4to. wieder abgedruckt sowohl in Sandifort's Thesaurus Diss. Tom. 2. p. 383, als in den Dissertationibus Pragensibus. Vol. 1. p. 185.

J. Ch. Jüngken Praeside Ph. Ad. Boehmer. Diss. de herniis abdominalibus. Halae 1780.

2) de herniis libellus. Lips. 1744. 4to. Cap. XVI.

3) Cours d'Opérations. Paris 1708. p. 88.

Bauchbrüche bey meistens todtgebohrnen Mißgeburten, als die sogenannten Bauchbrüche ohne Bruchsaß, nach Verwundungen des Unterleibes, nach dem Kaiserschnitt u. s. f., weil solche eigentlich doch zu den Vorfällen (prolapsus), nicht zu den Brüchen (herniis), nach den im 4ten §. angeführten Definitionen gehören, und wovon der große B. S. Albinus ¹⁾ unter andern einen Fall höchst musterhaft schildert.

Daß solche Vorfälle der Eingeweide des Unterleibes, nach Verwundungen, überall am Unterleibe vorkommen können, braucht wohl kaum einer Erwähnung.

Ich handle daher zuerst von den Bauchbrüchen in der weißen Linie §. 10. und folg., dann von den an den übrigen Stellen des Bauches vorkommenden wahren ächten Brüchen.

Brüche in der weißen Linie.

§. 10.

Am häufigsten kommen die wahren ächten Bauchbrüche in der sogenannten weißen Linie vor. Man könnte diese vielleicht hernias ventrales medianas, und die am übrigen Bauche sich zeigenden hernias ventrales laterales dextras und sinistras nennen.

Bisweilen sind die Bauchbrüche in der weißen Linie mehr am schwerdförmigen Knorpel, und gemeinlich auf der linken Seite desselben befindlich. Sie entstehen durch ein Auseinanderweichen der sehnigen Fasern

1) Annotationes academicae. Lugd. Batav. Libr. II. Cap. 8. Tab. VI.

lis ¹⁾.
e, Bauchbruch.
e.
an andern als den
Leisten, Schenkel
bet werden. Nach
Hippocrates,
f. beobachtet wor
n der Bauchbrüche
nia umbilicalis.
schon richtig die
angebohrnen
Montagnana
227. Cap. 1.
hernia ventrali.
st in Haller's
S. 161.
ch Programma,
vamque hernie
e 1764. 4to. mit
1711's Thesaurus
Dissertationibus
A. d. Boehmer
Jalae 1760.
Cap. XVI.
8.

der weißen Linie, und haben bisweilen nur die Größe einer Olive ¹⁾. Bisweilen hingegen sind sie faustgroß, beständig aber von eiförmigem Umfange, so daß der senkrechte Durchmesser der längere ist. Sie sind bisweilen so klein, daß sie sich fast durch gar keine Geschwulst äußerlich verrathen, vorzüglich wenn sie an einer Stelle entstehen, wo das hintere Blatt der Scheide des musculi recti durch ein Geschwür gestört worden ²⁾. Richter ³⁾, der in einem eigenen Kapitel von kleinen Brüchen handelt, bemerkt gegen Pivélet ⁴⁾, daß diese kleinen Brüche, ungeachtet sie von den Franzosen Magenbrüche genannt werden, wohl selten den Magen, sondern gemeinlich ein Stück Netz oder einen Theil des Colons enthalten. Um diese kleinen Brüche zu entdecken, muß man den Patienten stehend untersuchen. G. Arnaud ⁵⁾ will auf diese Weise einen Bruch von der Größe eines Kirschenkerns (d'un noyau de cerise) seitwärts am schwerdförmigen Knorpel entdeckt haben.

Bisweilen zeigen sich solche kleine Bauchbrüche in der weißen Linie unter dem Nabel, besonders bey Frauen, die oft geböhren haben.

Littre ⁶⁾ sah in einer Frau einen kleinen tödtlichen Bauchbruch, seitwärts an der weißen Linie vier Zoll hoch

1) Garengéot in den Mémoires de l'Acad. de Chir. de Paris. Tome I. pag. 706. der Quart-Edition.

2) Le Dran Tr. des Opérations. p. 145.

3) In 34. Kapitel seiner Abhandlungen von Brüchen.

4) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome IV.

5) Traité des hernies, Tome I. Paris 1749. Préface pag. LXXXIII. ohne den Namen des Verfassers.

6) Mémoires de l'Acad. des sciences à Paris. 1714. p. 200.

über dem Nabel, in welchem sich ein Theil des Dickdarms eingeklemmt hatte.

Heister ¹⁾ gedenkt eines solchen Bauchbruchs in einer 17jährigen Jungfer neben dem Nabel, welchen er durch ein Bruchband heilte.

Saladon ²⁾ sah durch das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln den Magen bruchartig vordringen, in einem Manne, der diesen Bruch plötzlich beym Aufheben eines Sackes erhalten hatte. Desgleichen in einem andern Manne, wo durch zwey Jahr lange unrichtige Behandlung die Stelle so vernarbt war, daß sie den Magen zusammendrückte. Beide Männer wurden geheilt.

Gilibert ³⁾ fand in einem Manne, nach einem Sturz vom Pferde, in der oberen Bauchgegend einen Bruch von der Größe eines Eyes, welcher bey vollem Magen größer, bey leerem Magen und im Bette kleiner wurde, auch eine Einklemmung befürchten ließ.

Le Dran ⁴⁾ beschreibt einen Bauchbruch am schwerdförmigen Knorpel, welcher ein Stück Netz enthielt und in Eiterung übergieng.

Sharp ⁵⁾ meynte, diese Bauchbrüche seyen selten größer als eine Nuß, allein Günz ⁶⁾ bemerkte gegen ihn,

-
- 1) Wahrnehmungen. Rostock 1753. 632. Wahrn.
 - 2) In Le Blanc Précis d'Operations de Chirurgie. Paris 1775. in Hoin's Anhang, Obs. 2 und 3.
 - 3) Sammlung praktischer Beobachtungen und Krankengeschichten. A. d. Lateinischen. Leipzig 1792. N. 97.
 - 4) Beobachtungen übersetzt. Trev. 1740. Obs. 63. S. 33r.
 - 5) Inquiry into the present state of Surgery. p. 120.
 - 6) de Herniis. pag. 72.

len nur die Größe
sind sie faulig
e, so daß der
sind bisweilen so
Geschwulst äußerlich
er Stelle entstehen,
des muscoli recti
(Nichter ³⁾),
en Brüchen han-
diese kleinen Brüche,
n brüche genannt
n gemeinlich ein
enthalten. Um
an den Patienten
will auf diese
des Kirschenters
n schwerdförmigen
Brüche in der
bey Frauen, die
kleinen tödtlichen
ie vier Zoll hoch

Acad. de Chin.
rt-Edition.
p.
von Brüchen.
49. Préface pag.
offert.
tis. 1714. p. 200.

daß er sie, über dem Nabel seitwärts an der weißen Linie, nie kleiner als ein Gänseei gesehen habe.

Hoin ¹⁾ schildert vollständig und gründlich die Zufälle von einem 3 Zoll langen und 2 Zoll breiten Bruche über dem Nabel, links am schwerdförmigen Knorpel, in einem zehnjährigen Mädchen, nach einem Falle, welcher zwey Jahr lang nicht erkannt worden war, und offenbar den Magen enthielt.

Garengot ²⁾ beschreibt umständlich einen faustgroßen Bauchbruch in der Herzgrube, welcher in einem jungen Wundarzte durch starke Zurückziehung der Schultern beym Tanzen entstanden war, und sich durch eine Binde heilen ließ.

Pipelet ³⁾ untersuchte mit de la Faye einen eilfjährigen Knaben, der nach einer schweren Krankheit einen, den Magen enthaltenden Bauchbruch in der regio epigastrica bekam, welcher in einem Monate zur Größe einer Faust anwuchs, und vollkommen gehoben wurde. Desgleichen in einem 13jährigen Mädchen einen gleichen, durch das Fallen von einer Treppe entstandenen Magenbruch. Einen dritten Magenbruch heilte er an einer Nonne. So auch einen vierten und fünften, ähnlichen Magenbruch ebenfalls an Frauenzimmern; einen sechsten Fall theilte ihm Sabatier mit.

1) In Le Blanc Precis d'Oper. de Chir. Obs. 1. in Ludwigs Uebersetzung. S. 243.

2) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome premier. Obs. 1. pag. 702.

3) Mém. de l'Acad. de Chirurgie. Tome quatrieme 1768. pag. 191. Sechs Obs.

J. Ranby ¹⁾ beschreibt den, nach einem Stöße gegen den Bauch, entstandenen Bauchbruch (den er Nabelbruch nennt,) einer Frau, von der Größe eines Mannskopfs, welcher ein Drittel des Magens nebst einem Theile des Dünndarms und Dickdarms enthielt.

Auch Gilibert ²⁾ gedenkt eines Bauchbruchs in der Nabelgegend einer 34jährigen Frau von der Größe eines Kopfes, wo die Därme mit dem Netze und Bauchfelle verwachsen waren.

So schildert Bauer ³⁾ mit einer Abbildung einen Bauchbruch, welcher sich vorne von der Brust an bis zum Schaamhügel hin erstreckte, und bis auf die Knie herabhing.

Einen ähnlichen, großen, nach einer schweren Geburt, gleichsam durch eine Spaltung der ganzen weißen Linie entstandenen Bauchbruch beschreibt Mohrenheim ⁴⁾. Dieser Bauchbruch erstreckte sich ebenfalls von den Brustbeinen bis zu den Schaambeinen herunter, und hatte die Gestalt einer länglichen Melone, wenn sich die Person vorwärts beugte, hingegen die Gestalt einer schmalen vorstehenden Scheidewand, wenn sie sich gerade streckte.

J. Ruysch ⁵⁾ beobachtete in einer Dame, welche bald, nach einem geheilten großen Abscesse in der unteren Gegend des Bauches, schwanger wurde, einen großen Bauchbruch. Uterus foetu crescente tumens dilatabat hunc

1) Philos. Transactions. 1731. N. 421. in Leske's Uebersetzung. Theil 2. S. 89.

2) Am ang. Ort. N. 96.

3) Act. Phys. med. Vol. 2. Obs. 94. Tab. IV.

4) Beobachtungen verschiedener chirurgischer Vorfälle. Dessau 1783. zweiter Band.

5) Adversarium anat. Decade 2. Amst. 1720.

peritonaei locum, seque in saccum hunc dilatatum insinuabat eo usque, ut foetus tandem cum utero ad genua usque propenderet antrorsum. Sie wurde glücklich entbunden. Nonne igitur haec vera est hernia in dilatato peritonaeo vero? setzt Ruysch mit Recht hinzu.

Auch Lorry ¹⁾ sah einen solchen Bauchbruch, in welchem der schwangere Uterus lag, welcher bis auf die Schenkel hinabhing.

Einen ähnlichen Fall erzählt auch Chambon de Montaur ²⁾.

Nach Richerand ³⁾ sprang beym Fassbinden ein Meiß einer Frau gegen den Bauch, und schwächte die vordere Wand desselben so sehr, daß sie sich zu einem Sack ausdehnte, welcher fast alle Eingeweide aufnahm, selbst den Uterus, welcher, als er schwanger wurde, bis auf die Knie hinabsank.

Einen ganz ähnlichen Fall (falls es nicht der nämliche ist,) von einer Fassbinders-Frau, finden wir schon bey Sennert ⁴⁾ aufgezeichnet.

Noch einige Fälle dieser Art hat Klincksch ⁵⁾ theils angeführt, theils ausgezogen.

1) Journal de Médecine. Tome 6r.

2) Arzt für Schwangere. Bremen 1792. Cap. 36.

3) Nosographie chirurgicale. Paris 1806. Tome 3. pag. 341. Da Hr. Richerand nicht citirt, so ist auch nicht zu entscheiden, ob dies ein eigener Fall, oder der Sennertische ist.

4) Institut. Medic. Lib. 2. parte 1. cap. IX.

5) An dem im 8ten §. angeführten Orte. Nota 38.

Brügel ... d. u. Linie ... (Magen ...)

*Albert Nofologie
naturelle. Par. 1817.
p 58. ... Fall p 59.*

In einem zweijährigen Kinde trennte nach Chi-
lett ¹⁾ eine zwey Finger breite Spalte, die ganze linea
alba, durch welche die Därme vordrangen, doch so, daß
sie sich leicht zurückdrücken ließen.

So beschreibt Lhibaut ²⁾ ebenfalls einen großen
Bauchbruch.

Ein in der weißen Linie, nach vielen Schwanger-
schaften entstandener Bauchbruch wurde durch Liegen im
Bette, und mäßigen Druck, welchen ein Leibchen (corset
lace) unterstützte, geheilt ³⁾.

So sah ich ebenfalls an einer schwächlichen dreißigjäh-
rigen Frau, nach mehreren beschwerlichen Niederkunften,
die weiße Linie über dem Nabel sich auseinander begeben,
und den mit dem Bauchfelle vordringenden Därmen wei-
chen, folglich einen wahren Bauchbruch bilden, welchen
ich durch ein eigenes Leibchen ebenfalls zurückhalten ließ.

§. 11.

Haenel ⁴⁾ fand in einem Knaben von achtzehn
Wochen, einen Zoll hoch über einem Nabelbruche, zugleich
einen Bauchbruch. Beide enthielten ein Stück des Dick-
darms.

Desgleichen sah Wrisberg ⁵⁾ in einem fünfjährigen

-
- 1) The New London Medical Journal for the Year 1792.
Vol. 1.
 - 2) Journal de Médecine. Tome XIV.
 - 3) Journal de Med. et Chir. 1765. Tome 18. pag. 265.
 - 4) Bey Günst. Seite 72.
 - 5) In W. E. Rudolph's Diss. de peritonaei diverticulis, illisque inprimis, quae per umbilicum et lineam albam contingunt. Goettingae 1780. Obs. 1.

um hunc dilatatum
tandem cum utero
orsum. Sie wurde
aer vera est her-
setzt Kayser mi
en Bauchbruch, in
welcher bis auf die
ich Chamden de
Fassbinder ein Keif
wachte die vordere
im Sack ausdehnte,
selbst den Uterus,
die Knie hinabsank,
nicht der nämliche
wir sehen bey Sen
linksch) theilt
Cap. 36.
36. Tome 3. pag.
t, so ist auch nicht
1, oder der Bau
IX.
Nota 33.

Mädchen, in der weißen Linie vier Zoll über einem Nabelbruche, einen Bauchbruch mit einem Theile des Netzes gefüllt.

Bauchbrüche an andern Stellen des Bauches, als der weißen Linie.

§. 12.

Allein auch an allen anderen Stellen des Unterleibs, als dicht in oder dicht neben der weißen Linie, findet man, durch das Vordrängen der Eingeweide des Unterleibs und durch Entfernung der Muskelfasern von einander entstandene, und in einem Sacke des Bauchfelles enthaltene Bauchbrüche, so daß es fast keine Stelle an den Bauchdecken giebt, an welcher man nicht zuweilen einen wahren Bruch bemerkt hätte.

So sah Günz ¹⁾ einigemale in Knaben, welche sich mit einem Arme an einem Baum aufgehängt hatten, oder um etwas zu erreichen, zu stark, besonders mit angehaltenem Athem, ausgestreckt hatten, auf dieser Seite einen Bauchbruch entstehen.

Dicht unter dem Nabel links sahen einen Bauchbruch Regner de Graaf ²⁾, Fabricius Hildanus ³⁾, desgleichen Wolffstriegel ⁴⁾ und Garengoot ⁵⁾

1) Cap. XVI. p. 71.

2) De mulierum organis generationi inservientibus, in den Operibus. Lugd. Batav. 1677. cap. 8. p. 249.

3) Epist. LV. p. 999. In diesem Bauchbruche befand sich die Milz.

4) Miscellanea Nat. Cur. Dec. 1. ann. 11. Obs. 88.

5) Mémoires de l'Acad. de Chir. Tome I. p. 701.

unter dem Nabel, zwischen den *musculis rectis*, so groß, daß er gleichsam einen zweyten Bauch vorstellte, und bis auf die Mitte der Schenkel hinabhing.

La Peyronie sah, nach Garengeot's Zeugniß, ein Paar solcher noch größeren Bauchbrüche.

Einen ähnlichen Fall sah ich an einer Frau, der man im Leben deshalb den Spottnamen Schlampelbauch gegeben hatte.

Hierher scheint mir auch Klinkoschens ¹⁾ *nova species herniae ventralis* zu gehören. An einer 70jährigen armen Frau bemerkte er äußerlich, rechts in der Gegend der ersten *inscriptio tendinea musculi recti abdominis*, eine Geschwulst von der Größe einer welschen Nuß. Bey Eröffnung der Leiche fand er alle Eingeweide in ihrer natürlichen Lage, und bloß das runde Band der Leber in der, einen Zoll weit von einander getrennten, *inscriptio tendinea* liegen, welches Stück des runden Leberbandes eine Länge von sechs Zoll erreicht hatte.

In der sogenannten *linea semilunari abdominis* sahen Bauchbrüche (e Dran ²⁾ und Klinkosch ³⁾ an einem 24jährigen Manne links, sieben Monate nach einem Steinwurfe.

Paignaud ⁴⁾ fand in einem, aus dem vierten Stockwerke gestürzten, todtten Kinde äußerlich in der Nabelge-

1) In der schon angeführten Diff. der Originalausgabe in Quart. pag. 29.

2) *Traité d'Opérations*, p. 143.

3) Am angef. Ort. pag. 10. Nota 12.

4) In Desault's *Journal*, Paris 1791, Tome 1. Art. 23.

Zoll über einem Nabel,
dem Theile des Nabels

Stellen des
ßen Linie.

stellen des Unterleibs
in Linie, findet man
des Unterleibs und
einander entstan-
enthaltene Bauch-
den Bauchdecken
nen wahren Bruch

Knaben, welche sich
hängt hatten, oder
ers mit angehalte-
dieser Seite einen

hen einen Bauch-
us Hildanus¹⁾,
Garengeot²⁾

inservientibus, in
cap. 8. p. 249.
hbrüche befand sich

11. Obs. 83.
e 1. p. 701.

gend eine eyrunde Geschwulst, und inwendig das Bauchfell nebst den Bauchmuskeln geborsten.

Unter dem Nabel nahe an der Falte des musculi transversi sah dergleichen (siehe 1)).

Monteggia 2) fand sogar den Magen in einem Bauchbruche unter dem Nabel, und die Fasern der musculorum rectorum zerrissen.

Links am Nabel fand einen Bauchbruch Monnikhoff 3) und Terras 4), welcher ihn in einem Manne eingeklemmt fand, und glücklich operirte.

In der regione epigastrica im rechten Hypochondrio sah la Chausse 5) in einem Manne einen Bauchbruch von der Größe eines Kindkopfs.

Rechts unter den kurzen Rippen sah einen Lavater 6); im linken Hypochondrio Günz 7), und links in einer Frau nach einem genommenen Niesmittel Blegny 8).

L. Heister 9) sah in einer sechs bis sieben Monat

1) Nach la Chausse's Zeugniß S. 13.

2) Fasciculi pathologici. pag. 99.

3) Verhandlungen u. o. d. Holl. Maatschapye der Wetensch. te Haerlem. Deel XVII. 1777. S. 252. in den Abhandlungen für praktische Aerzte. 7ter Band. S. 293.

4) Journal de Médecine. Tome LXXV. 1788.

5) S. 12. der angeführten Dissertation.

6) Diss. de intestinorum compressione Thesi 13. in Haller's Diss. chir. Tom. III. Nr. 69.

7) pag. 9r.

8) Blegny Zodiacus Gall. med. Ann. 1. Febr. Obs. 1.

9) Diss. de hernia incarcerata suppurata, saepe non lethali. Helmstad. 1738. §. V. in Haller's Diss. chir. Tomo 3. Nr. 70.

Schwangern plötzlich einen Bauchbruch auf der linken Seite entstehen, als sie knieend etwas von der Erde aufheben wollte.

Navaton ¹⁾ erzählt ausführlich die Geschichte einer eingeklemmten hernie ventrale à la région lombaire auf der linken Seite, welche er glücklich operirte.

M. de la Peyronie ²⁾ fand bey der Leichenöffnung einer Dame auf der linken Seite, drey Queerfinger unter dem Nabel, einen Bruch, welcher ein Stück des Dickdarmes, (des sogenannten Coli transversi,) enthielt.

Nach Lassus ³⁾ bekam ein Mann von einer Wagenweiche einen Schlag auf den Bauch, es entstand Fieber, Spannung, großer Schmerz an der rechten und untern Seite des Bauchs, den Zosten Tag entdeckte man eine hernia, die man für einen Absceß hielt, welche sich aber doch leicht zurückbringen ließ.

Nach öfterem Heben schwerer Lasten sah ich in einem etwa 30jährigen Manne im rechten Hypochondrio in der Höhe des Nabels einen Bauchbruch entstehen.

Fieliz ⁴⁾ sah in einem 36jährigen Manne plötzlich bey heftigem Husten nach starkem Trinken im rechten Hypochondrio, unfern der linea alba, einen Bauchbruch, welcher sich einklemmte, und zum Theil zurückgebracht wurde, zum Theil in Eiterung überging.

1) *Traité des playes d'armes à feu.* Paris 1750. p. 277. Obs. 60.

2) *Mém. de l'Acad. de Chir.* Tome quatrième. 1768. pag. 198.

3) *Pathologie chirurgicale.* Paris 1806. Tome 2. pag. 80.

4) *In Loder's Journal.* 3. Band. 3. St. 1803. Nr. 2. P. 447.

Eines Bruchs in der regione hypogastrica wird von Blegny ¹⁾ gedacht.

Nach Platner ²⁾ erscheinen Bauchbrüche auch zwischen den Fasern des musculi transversi abdominis.

J. L. Petit ³⁾ sah an einer Frau nach öfteren Schwangerschaften, links zwischen den falschen Rippen und dem hintern Theile des Hüftbeinkammes, einen Bruch von der Größe eines Kindskopfes, welcher sich einklemmte.

Längst dem Kamme des linken Hüftbeins traf Le Maire ⁴⁾ einen Bauchbruch an;

über dem rechten Hüftbeine Garengot ⁵⁾, und Vogel ⁶⁾. Letzterer fand ihn hier an einer Frau so klein, daß er sich durch keine äußere Geschwulst bemerklich machte.

*→ vgl. Chauffier
Alibert p 122.*

Zwey Quererfinger über dem Bauchringe sah Le Riche ⁷⁾ einen Bauchbruch an einem Manne.

Beispiele von Bauchbrüchen in der Nähe des Bauchringes, zwischen den sehnigen Fasern der Bauchmuskeln, sahen Nuyssch ⁸⁾, Mery ⁹⁾, Garengot ¹⁰⁾, und besonders noch Nussel ¹¹⁾, welcher den Fall genau

zer-

- 1) Zodiacus med. Gall. Ann. 3. April Obs. 2.
- 2) Institut. Chirurgiae. *auf a Berner Gg. Monro Morbid Anat p 549.*
- 3) Oeuvres posthumes. p. 225.
- 4) Nach La Chauffe. §. 12.
- 5) Oper. Chir. T. I. Obs. 23.
- 6) Von Brüchen. Cap. 23.
- 7) Bey La Chauffe a. a. Ort. §. 24.
- 8) Advers. Dec. II. pag. 23.
- 9) Mém. de l'Acad. des sc. à Paris 1701.
- 10) Oper. Chir. Obs. 22.
- 11) Transactions of the Royal society. Vol. V. Edinb. 1805.

zergliederte, und ihn für eine Mittelspecies zwischen einer hernia inguinalis und ventralis hält.

Petit ¹⁾ schreibt: Je trouvai que les parties déplacées avoient écarté les fibres du pilier externe de l'anneau, et s'étoient fait place à travers cet écartement, après avoir passé sous le pilier interne.

Über dem Schaamhügel fanden einen Bauchbruch (le Dran ²⁾, le Maire ³⁾, Petit und Garengeot. Ja Reichmeyer ⁴⁾ sah hier einen Bauchbruch so groß, daß er das männliche Glied verbarg.

Saviard ⁵⁾ und Brou ⁶⁾ erzählen unter andern die Geschichten einiger, nach glücklich abgelaufenem Kaiserschnitte, entstandenen Bauchbrüche.

Max. Stoll's ⁷⁾ sogenannte hernia vesicae congenita eines 15monatlichen Knäbchens scheint mir keine eigentliche hernia, sondern die von G. A. Bonn ⁸⁾ zuerst richtig und meisterhaft beschriebene Mißbildung der Harnblase, die auch Noose und Herder in eigenen Mono-

1805. und im Edinburgh Medical and surgical Journal. Vol. 1. 1805. pag. 255.

- 1) Oeuvres posthumes. Tome 2. p. 216.
- 2) Bey Verdier in den Mém. de l'Acad. de Chir. Tome 2. Obs. 13.
- 3) Bey La Chausse, S. 12.
- 4) Diss. de Exomphalo etc. in Haller's Diss. chir. Tomo 3. p. 169. nota e.
- 5) Recueil d'Observations chirurgicales, commentées par Mr. le Rouge. Paris 1784. Obs. 59. pag. 267.
- 6) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. 1743. pag. 642.
- 7) Ratio medendi. 1780. Vol. I. p. 429.
- 8) Ueber eine seltene widernatürliche Beschaffenheit der Harnblase. U. d. Holländischen. Straßburg 1782.

hypogastrica wird
 auchbrüche auch
 vers abdominalis.
 Frau nach öfteren
 den falschen Ribben
 mmes, einen Bruch
 her sich einflomme.
 Hüftbeins traf le
 e Garengeot ¹⁾
 er an einer Frau so
 schwulst bemerklich
 Bauchringe sah
 in Manne.
 der Nähe des
 Kaisers der Bauch-
 Garengeot ²⁾,
 her den Fall genau
 ges
 Obs. 2.
 7^{te} Monar Morb
 7^{te} 1777.
 701.
 y. Vol. V. Edinb.
 1805.

graphien bestätigten. Seitdem sind noch die Beobachtungen von Flajani, A. Portal, Sartorph, Camper, A. Cooper und Coate ¹⁾ hinzugekommen.

§. 13.

Zuweilen sah man mehrere Bauchbrüche zu gleicher Zeit Statt finden.

Oben habe ich §. 12. schon zwey Fälle angeführt, wo ein Nabelbruch zugleich mit einem Bruche in der weißen Linie sich zeigte.

Allein zwey eigentliche Bauchbrüche zugleich sah le Maire nach la Chauisse ²⁾, einen nämlich längs des Hüftbeinkammes, den andern zur Seite des musculi pyramidalis.

Drey Bauchbrüche zugleich sah, nach la Chauisse's ³⁾ sehr lesenswerther Erzählung, eben dieser Mr. le Maire in einer im vierten Monat Schwangeren, welche Brüche sie sich durch unsinniges Tanzen zugezogen hatte. Zwey davon befanden sich in der linken regione epigastrica, der dritte an der Seite des musculi pyramidalis. Letzterer klemmte sich ein, und wurde durch die Operation geheilt.

Vier Bauchbrüche zugleich sah gleichfalls le Maire ⁴⁾ in einem Haarkräusler, der in seiner Jugend viel an Magenschmerzen und am Erbrechen gelitten hatte. Sie bildeten gleichsam ein Kreuz; einer lag nämlich über

1) The Edinburgh Medical and surgical Journal 1805. p. 42. und 152.

2) §. 12. p. 207.

3) §. 22. p. 207.

4) Ebendasselbst §. 12.

dem Nabe', der zweyte unter dem Nabel, der dritte rechts, der vierte links in der Lende.

§. 14.

Bisweilen wird eine Stelle der Bauchdecken zu einem Bruchsfacke auf die Art durch und durch ausgedehnt und vorgetrieben, daß ein Doreinanderweichen weder in den sehnigen, noch in den fleischigen Fasern der Bauchmuskeln erfolgt, sondern daß gleichsam die, durch und durch an dieser Stelle geschwächten, Bauchdecken den vordringenden Eingeweiden nachgeben. Der Bruchsfack besteht alsdann aus einer dreyfachen Lage, der äußeren Haut, den Bauchmuskeln und dem Darmfelle. Ein Paar solcher bruchähnlichen Geschwülste am Bauche beschreibt Henckel ¹⁾. Ein solcher Bruch ist gemeiniglich von großem Umfange, hat eine breite Grundfläche, und klemmt sich wohl niemals ein.

J. Ch. Siebold ²⁾ schildert gerade einen solchen Bauchbruch aus einer Magd von 25 Jahren, welcher sich in der Gegend unter den Ripbenknorpeln und um den Nabel von der Größe eines Laib Brods zeigte, durch einen Trit auf den Bauch verursacht worden war, um die Monatszeit ein Blutbrechen veranlaßte, und glücklich geheilt wurde.

J. Richerand ³⁾ wirft die Frage auf: *Peut-on appeler du nom de hernies les éventrations résultantes du relâchement excessif de la paroi antérieure de l'abdomen, lorsqu'à la suite de plusieurs*

1) Chirurgische Operationen. Viertes Stück. S. 67 u. 76.

2) in Lode's Journal 1797. Band 1. S. 215.

3) Nosographie chirurgicale. Paris 1806. Tome 2, pag. 108. et 454.

grossesses, ou d'une forte contusion cette paroi affoiblie cède au poids des viscères et forme une espèce de sac, qu'on a vu descendre jusqu'aux genoux, renfermant la plus grande partie des organes abdominaux et même la matrice remplie par le produit de la conception? Warum nicht, darf man antworten, da ja H. Richter and's eigene im 4ten §. angeführte Definition durchaus darauf paßt. Wahre Eventrationen sieht man ja ebenfalls auch bey Inguinalbrüchen. Das Mehr oder Weniger ändert ja nicht die Natur eines Dinges. Denn bey keinem der übrigen Bauchbrüche werden die Muskelfasern so nett und rein getrennt, daß sie bloß gespalten scheinen, sondern die zunächst liegenden werden gewöhnlich auf gleiche Art, wie bey diesen Brüchen, erschlafft, und über den Bruchsaek hingezogen.

§. 14.

Aus dem über die Bauchbrüche Angeführten ergeben sich folgende Resultate:

- 1) existiren wirklich überall, in dem ganzen Bezirke der, zwischen dem untern Rande des knöchernen und knorpeligen Thoraxes und dem oberen Rande der Hüftbeine, enthaltenen Bauchdecken, bald größere, bald kleinere Vortreibungen mehrtheils der, zunächst einer solchen Stelle liegenden, Eingeweide des Unterleibes. Man findet nämlich entweder den Magen, oder ein anderes Stück des Darmkanales, oder Theile der Netze, oder die Leber, oder die Milz, oder die Harnblase, ja sogar den Uterus vorgetrieben. Daher

unterscheidet N. A. Vogel ¹⁾, nach Maaßgabe des vorgebrängten Eingeweides, neun Species von Bauchbrüchen, nämlich:

1. Hypogastrocele intestinalis.
2. Hypogastrocele omentalis.
3. Hypogastrocele epiploico-enterica.
4. Hypogastrocele ventriculi ventralis simplex.
5. Hypogastrocele ventriculi ventralis composita.
6. Hepatocele ventralis congenita.
7. Splenocele ventralis.
8. Hysterocele ventralis.
9. Cystocele ventralis.

Allein dergleichen vervielfachte Terminologien scheinen nur das Gedächtniß unnöthig zu beschweren. Will man ja die hernias ventrales in Species abtheilen, so wäre es, meines Erachtens, genug, die hernia ventralis mediana von der hernia ventrali laterali, wie ich im 10. §. bemerkte, zu unterscheiden. Will man nach der Stelle, wo sich gleichsam die Pforte der Brüche befindet, die Brüche unterscheiden; so zeigt sich auch hier, daß die Abtheilung in hernias lineae albae und in hernias ventrales ganz schicklich ist. Im erstern Falle diene nämlich die linea alba, im letzteren der ganze übrige venter den Brüchen als Pforte.

1) *Herniarum communia attributa et partitio.* Goettingae 1764.

ntusion cette parti
ères et forme une
descendre jusqu'aux
de partie des orges
rice remplie par le
um nicht, darf man
igene im 4ten §. an
daß. Wahre Eben
bey Inguinalbrüchen.
nicht die Natur eines
brigen Bauchbrüche
und rein getrennt,
ern die zunächst lie
he Art, wie bey
en Bruchsaek hinge
angeführten ergeben
dem ganzen Be
Mande des Knöchel
s und dem oberen
enen Bauchdecken
ortreibungen meh
lichen Stelle liegen
ibes. Man findet
oder ein anderes
Theile der Diege
oder die Ham
getrieben. Daher



- 2) Die gewöhnlichste Stelle solcher Bauchbrüche ist die linea alba theils über dem Nabel, theils unter dem Nabel, seltener (ohne äußere gewaltsame Veranlassung,) die Stellen, wo sie zwischen den Fleischfasern der Bauchmuskeln erscheinen. H. Richerand behauptet, daß die herniae lineae albae häufiger unter als über dem Nabel vorkämen, weil 1) hier die linea alba ansehnlicher sey; 2) weil die Last der Eingeweide mehr nach unten zu drücke; 3) weil die sehnigen Fasern der musculorum rectorum unterwärts ein weniger dichtes Gewebe ausmachen. Ich muß gestehen, daß mir dieses nicht so scheint.
- 3) Daß solche Vortreibungen der Eingeweide des Unterleibes in dem ganzen Bezirke der Bauchdecken den Namen ächter wahrer Brüche (herniae) vollkommen verdienen, beweisen die durchaus auf sie passenden im 4. §. angeführten Definitionen eines Bruches.
- 4) Bauchbrüche, welche durch eine Spalte der weißen Linie dringen, vergrößern sich nicht so geschwinde, als die durch eine Spaltung der Fleischfasernbündel entstehen. Indessen findet man doch auch wohl den Rand der Spalte bey den letzteren unnachgebend hart und callos.
- 5) Kleine Bauchbrüche sind oft schwer zu erkennen, große desto leichter.
- 6) Kleine Bauchbrüche verursachen bisweilen mehrere Beschwerden, als große.
- 7) Kleine, besonders in der weißen Linie enthaltene, Bauchbrüche klemmen sich leicht ein, große, zwi-

schen den Fleischfasern hervorbringende, eine breite Basis habende, wohl niemals.

8) Mitunter haben solche Bauchbrüche keinen eigenen, vom Bauchfelle gebildeten Sack, sondern scheinen durch ein Platzen oder Rissen des Bauchfells zu entstehen.

*Folgen aus
Mißverhältnissen
Monro Morbid
Anat. p 520.*

9) Als Ursachen der Bauchbrüche sind beobachtet worden: ein Sprung, ein Sturz vom Pferde, ein Stoß, ein Tritt auf den Bauch, ein Fall von einer Höhe, eine Quetschung, eine heftige Streckung der Bauchdecken, ein Hängen an einem oder an beiden Armen, Schwangerschaft ¹⁾, Wassersucht, ehemalige Fetttheit, Abscesse in den Bauchdecken, Aufheben einer schweren Last von der Erde in einer unbequemen Stellung, Lanzen, besonders mit stark rückwärts gezogenen Schultern, gewaltsames oder übertriebenes Ausstrecken nach einer hoch liegenden Sache, heftiges Erbrechen, starkes Niesen, kurz jede heftige Spannung der Bauchdecken, endlich Vernachlässigung einer Hieb- wunde des Bauches, oder unvollkommene Heilung nach dem Kaiserschnitte.

10) Zuweilen sind Bauchbrüche für Abscesse ²⁾ irrig angesehen und behandelt worden.

1) Petit Oeuvres posth. p. 228.

2) L. Heister Institutiones chirurgicae, Amst. 1750. pag. 749. §. IV.

her Bauchbrüche ist dem Nabel, theils (ohne äußere ge- Stellen, wo sie zu- muskeln erscheinen, daß die herniae or als über dem hier die linea alba last der Eingeweide 5) weil die sehnigen torum unterwärts machen. Ich muß scheinet, r Eingeweide des ke der Bauchdecken Brüche (herniae n die durchaus auf hren Definitionen Spalte der weißen nicht so geschwinde, Fleischfasernbän- nan doch auch wohl zeteren unnachge

schwer zu erkennen

bidweilen mehrere

linie enthalten, in, große, zwi-

H e r n i a l u m b a l i s,
L e n d e n b r u c h.

§. 15.

Paul Barbette ¹⁾ schrieb im Jahr 1657: *Experientia me docuit, peritoneum etiam in parte posteriori versus dorsum posse disrumpi et ibi herniam efficere.*

Auch Steph. Blancard ²⁾ äußert sich, vielleicht diese Stelle von Barbette im Sinne habend: „*Peritoneum prope spinam dorsi ruptum dat herniam.*“

In den Philosophical transactions erzählt Budgen ³⁾: „*Infantula nata 1711, cujus in tergo circa vertebrae inferiores apparuit tumor indolens, cutis colorem ovique columbini magnitudinem referens, qui cum puella tantopere concrevit, ut circiter nonum vel decimum aetatis annum vesicam vitulinam plane repraesentaret.*

Anno 1728 vesicae bubulinae magnitudinem aequabat. D. 29 Januarii in lecto jacenti disruptus est hic tumor, a quo multum liquoris instar urinae profluxit. Re perspecta invenimus tunicas et interius materiam mucosam, ureteres, venas et arterias tales omnino, quales vesica habere consuevit, nec defuit commercium quoddam cum partibus internis

1) Opera chirurgico-anatomica. L.B. 1657. meine Ausgabe ist von 1672. Cap. VII. pag. 33.

2) Opera medica, theoretica, practica et chirurgica, Lugd. Bat. 1701. Tomo 2. Cap. 35. p. 385.

3) N. 410. im Jahre 1729.

per foramen, in vertebrae digiti hominis minorem in abdomen admittens, quod vasa memorata recipiebat. D. 2 Febr. obiit, et si cadaver aperire per parentes licuisset, credo equidem, in abdomine vesicae cervicem et nullam aliam vesicam invenissemus; non enim post ruptum tumorem vel semel minxerat."

Dieses wäre also eine hernia lumbalis vesicam urinariam continens. Ich mußte diesen Fall wörtlich anführen, um über drey hinzuzufügende Anmerkungen verständlich zu werden. Erstens sagt Hr. v. Haller ¹⁾ von diesem Falle: „vesicae hernia, nisi potius spina bifida.“ Allein bey einer spina bifida wäre 1) das Mädchen schwerlich 17 Jahre alt geworden; 2) der Geruch würde nach dem Platzen dieser Geschwulst doch wohl nicht harnhaft gewesen seyn; 3) das Harnen nicht mit eben dem Platzen aufgehört haben; 4) führt doch bei einer spina bifida kein Loch ins abdomen.

Zweytens vermuthe ich, dieses ist die Stelle aus den Philosophical Transactions, welche Hr. Rougemont in der Note S. 257. zu seiner Uebersetzung der Richterischen Abhandlung von den Brüchen meynt, nur daß wahrscheinlich 411 statt 410 ein Schreib- oder Druckfehler ist, auch daß wohl die Worte: par cette même échancrure, ein Versehen sind.

Drittens steht in Veske's Uebersetzung dieser Stelle, Theil 2. S. 157. für unschmerzhaft, (indolens,) „schmerzhaft.“

1) Bibliotheca anatomica, Tomo II. pag. 223. §. 934.

alis,
 ch.
 Jahr 1657: Ex-
 etiam in parte
 rumpi et ibi her-
 bert sich, vielleicht
 habend: „Perito-
 dat herniam.“
 erzählt Bud-
 in tergo circa
 indolens, cutis
 inem referens,
 ut circiter no-
 sicam vitulinam
 magnitudinem
 acenti disruptus
 is instar urinae
 tunicae et inte-
 enas et arterias
 consuevit, nec
 artibus internis
 1657. meine Ab-
 chirurgica, Lugd.

post mortem alia
Membra (s) in unum (h)uicem in unum (s)uam hinc hinc, hinc hinc
Ludwig der Land) illustriert von nicht den Eingeklemmten Gesamt von Logen
Markus Anatomy Ed. 1800. 1 3/7

Nach G. Arnaud ¹⁾ il y a des hernies qui arrivent derrière le dos à la région des reins.

Ferner erzählt Callisen ²⁾ folgenden Fall, welchen auch Ploucquet ³⁾ als ein Beispiel einer hernia lumbaris anführt. In der Leiche einer, unter Zufällen von Brucheingklemmung gestorbenen, Frau zeigte sich, außer den von ihm vollkommen zurückgebrachten Schenkelbrüchen, noch ein zweyter eingeklemmter Bruch. „Peritoneum, sind seine Worte, sub ligamento lato (uteri) sinistro versus superiora ad muscoli psoas tractum saccum formabat, in quo intestini pars gangraena correpta ad angulum acutum reflexa continebatur, quae reflexa viam intestinalis cavi praeccluderat.“ Es wäre die Frage, ob dieser Fall nicht mehr eine sogenannte hernia interna incarcerata, als eine hernia lumbalis war?

Nach J. G. Plencé ⁴⁾ hat man bisher nur eine Art von Lendenbrüchen aufgezeichnet, (welchen Fall der verdiente Mann eigentlich gemeynet haben mag, ist mir nicht bekannt, weil er ihn nicht citirt,) wobey die Nieren und das erweiterte Becken der Nieren einen Bruch zu verursachen schienen. Die Geschwulst war an den Lenden, ungeschmerzhaft, gespannt; durch einen Druck der Finger verschwand sie, und sobald die Geschwulst eingerichtet war, erfolgte ein größerer Ausfluß des Harnes.

1) Tr. des hernies. Par. 1749. Chap. III. p. 30.

2) Acta societatis medicae Havniensis. Vol. 2. Havniae 1779 Art. XXVII. pag. 329.

3) Biblioth. med. pract. Tomo 4. p. 177.

4) Lehrsätze der praktischen Wundarzneiwissenschaft. Zwote Auflage. Wien 1780. S. 163.

Meinte Plenck aber den Fall, welchen Bruck ¹⁾ für eine neue Species von Cystocele hielt, wo nämlich eine Frau seit langer Zeit eine weiche, kaum schwappende Geschwulst in der rechten vordern Lendengegend hatte, die auf einen Druck, mit einem reichlichen Harnabgange verschwand, und vielleicht in einem erweiterten Nierenbecken bestand?

H e r n i a i s c h i a d i c a .
I s c h i a t o c e l e .

§. 16.

Man hat nunmehr sechs zuverlässige Beispiele, daß die natürlich kleine, nur mit lockerem Zellstoffe gefüllte Lücke zwischen dem ischiadischen Nerven, den ischiadischen Gefäßen, dem musculus pyramiformis und gemellus in der incisura ischiadica, durch andringende Därme so erweitert wird, daß sie das, zu einem widernatürlichen Sacke umgeformte Bauchfell nebst den darin enthaltenen Därmen, als eine ächte hernia, durchläßt.

Den ersten, deutlich und genau beschriebenen, Fall davon machte Papen ²⁾ im Jahre 1750 in einer eigenen Monographie bekannt, aus welcher ich das Wesentlichste

1) Journal de Médecine. Tome XXI.
2) Christ. Henr. Papen. Epistola de stupenda hernia dorsali, in Haller's Diss. chirurg. Tomo 3. p. 313. Diesen nämlichen Fall hat Hr. Haller in den dreizehnten Band der Abhandlungen der königl. schwedischen Academie der Wiss. Hamb. 1755. einrücken lassen.

es hernies qui ar-
es reins.
nden Fall, welchen
einer hernia lum-
unter Zufällen von
eigte sich, außer den
n Schenkelbrüchen,
„Peritonaemum,
o (uteri) sinistro
psoas tractum
i pars gangraena
continebatur,
praecluserat.“
mehr eine sege-
ine hernia lum-
bisher nur eine
(welchen Fall
ben mag, ist mir
wobey die Nieren
en Bruch zu ver-
den Lenden, un-
E der Finger ver-
eingesetzt war,

I. p. 30.
Vol. 2. Hernia
77.
wissenschaft. Zwote

auszeichne. Ein starkes, 50jähriges Bauernmädchen stirbt plötzlich beym Mähen. Bey der Leichenöffnung erscheint ein, von der rechten Backe des Hintern, bis zu den Waden herunter sich erstreckender, flaschenförmiger, ellenlanger Sack. Die Haut dieses Sackes war gespannt, glänzend, und mit dicken Venen durchwebt. Der Durchmesser dieses Sackes betrug zu oberst, an der rechten Seite des Afters, eine Spanne, zu unterst eine halbe Elle. Er enthielt den größten Theil des Dünndarms mit dem verlängerten Ge-kröse, den Anfang des Dickdarms, nebst dem wurmförmigen Fortsaze, ferner den unteren Theil des Dickdarms nebst dem größten Theile des Mastdarmes. Auch der Uterus, nebst dem rechten Ovario und der rechten Tuba Fallopii, hing in der Öffnung des Bruchsacks, so daß der Bruch fast ganz leer war. Die Haut des Sackes war zollthick, und inwendig mit dem Fortsaze des Bauchfells überzogen. Dieser Bruch hatte sich innerhalb zehn Jahren gebildet.

Da schon Morgagni ¹⁾, und nach ihm Rougemont ²⁾, so wie nun auch Lassus ³⁾ bemerkten, daß diese hernia, welche Papen dorsalis nannte, eigentlich ischiadica heißen müsse, so nehme ich auch keinen Anstand, sie unter dieser Benennung hier aufzustellen.

Bertrandi sah, nach Verdiers ⁴⁾ Bericht, sogar zwey Fälle von dieser hernia ischiadica auf der rechten

1) de sedibus et causis morborum. Epist. XLIII. Art. 14.

2) in seiner Uebersetzung von Richter's Traité des hernies. Bonn 1788. Note zum 38. Kapitel.

3) Pathologie chirurgicale. Paris 1805. p. 103.

4) Mémoires de l'Acad. de Chirurgie. Tome 2. 1753. Art. I. pag. 2. note a.

Seite. In beiden war eine Portion des Dünndarms unter (sous) dem Ligamento sacro ischiadico durch die incisura ischiadica geschlüpft.

Camper 1) demonstirte diesen seltenen Bruch auf der linken Seite im Jahre 1759. im Collegio medico zu Amsterdam. „In sinistro pelvis latere peritoneum saccum profundum formabat, inter ligamentum sacro-ischiadicum, os ilium et os latum, juxta nervum ischiadicum. Fundus amplior, ostium vero compressius erat. Dextrae manus digitum in hunc saccum demissum a parte clunis, sinistrâ manû clarissime percipere potui, quamvis tanta caro interfuerit. Ovarium sinistrum, praeter naturam magnum, sibi relictum, saccum sponte ingrediebatur.

E. Gottl. Bose 2) sah in einer solchen hernia ischiadica den erschlafften Dünndarm liegen,

Lassus 3) sah im Jahre 1792. einmal die hernia ischiadica in einem dreysigjährigen Mädchen, wo sie, wie bey Pagen, aussah, aber nur faustgroß war, und für ein Lipoma gehalten worden war. Transnett schaffte sie weg, durch eine Bandage und zweymonatliches Liegen im Bette, ungeachtet der Bruch die Patientin nicht sonderlich beschwert hatte.

Sometimes, though rarely, a hernia is produced at the ischiatic notch projecting by the sides of the sciatic nerve, under the glutaei muscles, sagt

1) Demonstrationes anatomico-pathologicae. Amst. 1762. Libro 2. Cap. V. p. 17.
2) Progr. de Enterocele ischiadica. Lips. 1772.
3) Pathologie chirurgicale. Paris 1806. pag. 103.

auernmäßigen Hirte
öffnung erschein
bis zu den Boden
er. ellenlanger Saft.
glänzend, und mit
esser dieses Saftes
des Afters, eine
Er enthielt den
verlängerten Ge.
dem wurmförmig
eil des Dickdarms
emes. Auch der
rechten Tuba
schicks, so daß
des Saftes war
des Bauchstills
halb zehn Jahren
ich ihm Rouge-
bemerken, daß
s nannte, eigent-
ie ich auch keinen
aufzustellen.
Bericht, sogar
auf der rechten
ist. XLIII. Art. 4.
Traité des her-
itel.
p. 105.
Tome 2, 1755.

39. *Beleg aus dem ... 1812 ...*

N. Cooper ¹⁾, und bestätigt also durch sein wichtiges Zeugniß die Existenz dieser Bruchart.

Endlich gedenkt Richerand ²⁾ eines Falles mit folgenden Worten: Les exemples des hernies par l'échancrure ischiatique sont mieux constatés, (als die hernies ovalaires). Une femme portoit avec peine une tumeur énorme, qui de la fesse pendoit jusqu'au bas de la jambe. Elle étoit obligée de la soutenir au moyen d'une serviette. Elle mourut subitement, et l'on fut bien étonné de trouver la tumeur remplie par la plus grande partie des intestins grêles, par le colon et l'epiploon. Ob aber dieses eine eigene, oder blos Pagens abgekürzte und aus Chopart entlehnte Geschichte ist, wage ich nicht zu entscheiden. Letzteres ist mir indessen wahrscheinlicher, als ersteres. Der von Chopart ³⁾ angeführte Fall ist wenigstens, wie schon Rougemont ⁴⁾ bemerkte, kein eigener, sondern der Pagenische Fall, ungeachtet ihn Richter sowohl in seinem Werke von den Brüchen ⁵⁾, als im fünften Bande seiner Anfangsgründe der Wundarzneykunst ⁶⁾, als einen zweyten Fall anführt, woraus wahrscheinlich Klemm ⁷⁾,

Handwritten note: ... p. 73 ...

- 1) The anatomy of Hernia etc. Lond. 1804. pag. 27
- 2) Nosographie chirurgicale. Paris 1806. Tome 2. pag. 455.
- 3) Traité des maladies chirurgicales. Tome 2. p. 810.
- 4) Traité des Hernies de M. Richter. Bonn 1788. p. 257. in der Note.
- 5) Im 38ten Kapitel. Göttingen 1785.
- 6) Im 17ten Kapitel. Göttingen 1798.
- 7) Diss. Praes. G. G. Plouquet. Enumeratio et diagnosis herniarum. Tubingae 1789. S. CIX.



seroient bien fondés sur l'étroitesse de l'ouverture et le défaut d'autopsie cadaverique. Garengeot's Fälle seyen vielleicht gewesen, une hernie crurale fortement reprimée par la résistance de l'aponeurose fascia lata. Ja indem er noch hinzusetzt: Les exemples des hernies par l'échancrure ischiatique sont mieux constatés, so sieht man wohl, daß er die Beispiele von hernies obturatrices nicht für constatirt anerkennt. Dieses ist um so mehr zu bewundern, da wir, abgesehen von G. Garengeot, über ein Duzend der unverwerflichsten Gewährsmänner, mitunter Anatomen vom allerersten Range, einen Albinus, Camper, Cassebohm, Eschenbach, Heuermann, Hommel, Lentin, Klinkosch, Duverney, Arnaud, Gare, Masaval und le Maire, als Augenzeugen anführen können, wenn man nur ein halbes Duzend über die hernia ischiadica zusammenbringt.

Wenn H. Richerand über le défaut d'autopsie cadaverique klagt, so muß er wahrlich weder Arnaud's noch Garengeot's Abhandlungen gelesen haben, welche doch klar bezeugen, daß Duverney sein Präparat der Königlichen Academie der Wissenschaften zu Paris vorgelegt, so wie Hommel das seinige Herrn Garengeot vorgezeigt hat; auch müssen ihm die übrigen so eben genannten Schriftsteller gänzlich unbekannt seyn.

§. 19.

Haene's ¹⁾ Nachricht zufolge hatte die hernia ovalis im Jahre 1718. le Maire zu Strasburg beobachtet.

Einige

¹⁾ Bey Günz de Herniis. Cap. XVIII. pag. 79.

Einige Fälle von der hernia ovalaris sah nicht nur der eben so zuverlässige als subtile Bergliederer Cassebohm, nach Günzgens Zeugniß ¹⁾, sondern demonstirte sie auch seinen Zuhörern zu Berlin im Jahre 1734.

Auch ein dänischer Wundarzt sah nach Zoega's Zeugniß ²⁾ den gleichen Fall.

Hommel ³⁾ machte ein Präparat aus dem ihm vorgekommenen Falle, wo sich sogar auf beyden Seiten das Bauchfell durch das ovale Loch hinerstreckte, und ein Beutelchen von der Größe eines Laubeneyes bildete. Eben dieses anatomische Präparat zeigte er auch, wie ich schon oben anführte, Hrn. Garengeot ⁴⁾.

Keneau de la Garanne ⁵⁾ gedenkt dieser Brüche, aber noch zweifelhaft.

H. v. Haller ⁶⁾ schreibt von Sharp's Operations in Surgery, London 1740, in hernia ad foramen ovale administrationem nunquam voto respondisse. In den Londner Ausgaben sowohl von 1739, als von 1747, die ich beide vor mir habe, finde ich wenigstens nichts von einer hernia ad foramen ovale.

In seiner Critical Inquiry into the present State of Surgery Chapt. I, sagt er bloß, daß er nicht glaube, daß jemand die Operation der hernia ovalaris in allen ihren Punkten verrichtet habe. Uebersetzung von A. J. Gault, p. 73.

1) Ebendasselbst.

2) Ebendasselbst S. 80.

3) in Zach. Vogel's Abhandlung aller Brüche. Ologau 1769. S. 204.

4) Mem. de l'Acad. de Chir. Tome I. page 717.

5) Traité des hernies. Paris 1626. p. 95.

6) Bibliotheca chirurgica. Tome II. pag. 221.

esse de l'ouverture
e. Garengeot
nie crurale forte-
de l'aponeurose
gt: Les exemples
tique sont mieux
die Vespiere von
t anerkennt. Die
vir, abgesehen von
t unwerthlichsten
vom allerersten
Cassebohm,
el, Lentin,
are, Malar
führen können,
hernia ischia-

die hernia ova-
burg beobachtet.
Einige
pag. 79.



In le Dran's Übersetzung von Gataker ¹⁾ finde ich folgende Worte. „The hernia that is supposed to happen through the foramen ovale is not a settled point, whether such a case can happen.

Arnaud de Konsil gab Hrn. Garengéot von zwey Brüchen durch das ovale Loch so gar schon im Jahre 1713 Nachricht. Ja G. Arnaud ²⁾ behauptet, sein Vater habe zuerst diese Art von Brüchen entdeckt. Nach eben dem Hrn. Arnaud ³⁾ im Garengéot, zeigte im Jahre 1715 Duverney, der diese Art von Brüchen als unmöglich, zehn Jahre zuvor gänzlich verworfen hatte, selbst zwey solche Brüche in einer von ihm zergliederten Frau der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Paris vor. Seine dazu gehörige Vorlesung ist aber nicht gedruckt worden. Auf jeder Seite war der Bruch so groß als ein Ey, und zwischen den beyden anderen Bäuchen des Triceps femoris befindlich.

Desgleichen beobachtete nach Garengéot's Erzählung H. Gare, einen solchen Bruch, ja H. Malavallies einen solchen Bruch auf der linken Seite an einem Frauenzimmer durch H. Arnaud operiren, welcher nach zurück gebrachtem Darne das vorgefallene Stück des Netzes wegschnitt.

De Garengéot ⁴⁾, dem das Verdienst gebührt, diese Art von Brüchen gehörig zur Sprache gebracht zu

-
- 1) The Operations in Surgery. Third Edition. 1757. p. 120.
 2) am ang. Ort Préface. page LXXXV.
 3) Ebendasselbst pag. LXXXVI.
 4) Mémoires sur plusieurs hernies singulières im ersten Bande der Mémoires de l'Acad. de Chirurgie 1743. der pract. Ausgabe.

Haben, sah einen solchen Bruch zuerst im Jahre 1733 an einer Frau, die vier Tage nach der Niederkunft auf die rechte Hüfte gefallen war, rechts von fünf bis sechs Zoll Länge. Er brachte ihn eben so glücklich zurück, als er ihn eben durch eine schickliche Binde am Vordringen hinderte. Der zweyte Fall, den er schildert, betraf einen Sattler, welcher eine Geschwulst am rechten Schenkel in der Nähe des Mittelfleisches hatte. Überhaupt beläuft sich die Zahl der schon von H. Garengeot angeführten Fälle auf eisse.

Auch de la Faye ¹⁾ scheint diesen Bruch beobachtet zu haben.

Der große B. S. Albinus soll nach Günstens Zeugniß ²⁾ in einer Frau eine hernia ovalaris, welche die Harnblase enthielt, seinen Zuhörern demonstrirt haben.

P. Camper ³⁾ erzählt den ihm vorgekommenen Fall mit folgenden Worten: Memini me in cadavere macilenti senis, peritoneae dilatationes, profunde juxta obturantia vasa sinum ingredientes vidisse. Forsan, setzt er mit Recht hinzu, frequentiores sunt, quam quidem creditur; in ileo igitur ad omnis generis herniarum possibilitatem necessario attendendum est.

Ferdinand Martini ⁴⁾ rath, bey einem solchen Bruche, durch den, über den Schamhüften geöffneten Bauch, die Därme aus dem ovalen Loch herauszuziehen. Es ist mir aber nicht bekannt, daß dies Jemand wirklich gethan hätte.

1) Principes de Chirurgie p. 116. Remarques sur Dionis. Paris. 1740. p. 340.

2) am angeführten Orte. Seite. 96. Note p.

3) Demonstrationes anat. pathol. Lib. 2. Amst. 1762. p. 17.

4) Chirurgische Streitschriften. Kopenhagen. 1764.

Gataker ¹⁾ fide
that is supposed
ovale is not a
can happen.

Garengeot von
ar schon im Jahre
hauptet, sein Vater
deckt. Nach eben
t, zeigte im Jahre
Brüchen als unmög
hatte, selbst zwey
ten Frau der Kö
Paris vor. Sei
gedruckt worden.
als ein Ey, und
Triceps femo

engeot's Ery
a H. Malard
Seite an einem
en, welcher nach
Stück des Nez

erdiens gebühret,
ache gebracht zu
tion. 1737. p. 120.

gubieros im ersten
Chirurgie 1743

in utero latero

J. Th. Klinkosch ¹⁾ sah in einem 17jährigen Knaben in der Gegend der *vasorum obturatoriorum* einen Beutel (*sinus*), der zwey Zoll lang war, und ein Stück des Netzes und des Dünndarmes aufnahm.

Ch. F. Eschenbach ²⁾ hat diesen Bruch ebenfalls beobachtet.

G. Heuermann ³⁾ schreibt: „Ich habe ebenermaßen auf der rechten Seite bey einem weiblichen Cadaver einen solchen Bruch gesehen, wovon noch gegenwärtig das Präparatum aufhebe, weil selbige nicht täglich zu erhalten stehen; hiebey ward ich keine merkliche Geschwulst nach außen gewahr, und fand eine Verlängerung des Bauchfells, welche durch das ovalförmige Loch hindurch ging, und ein ungefähr anderthalb Finger langes Stück des Dünndarmes enthielt. Der Sack des Bauchfells von der Größe eines Hünereys war unter dem ersten und zweyten Kopf des *Musculus triceps* und *pectineus* gelagert; die Frau hatte sich niemals über merkliche Schmerzen oder andere Zufälle beklagt.“ „Hieraus“, setzt der Mann hinzu“ „erhellet also, daß man an der Gegenwart dieser Brüche gar keine Ursache zu zweifeln habe, weil solche von so vielen bemerkt worden, u. s. f.“

Den neusten mir bekannten Fall erzählt L. J. B. Ventin ⁴⁾. Ein alter Mann hatte einen Blasenbruch

- 1) in der zum §. 8. angeführten Dissertation S. 12. Note 20.
- 2) *Observata quaedam anatomico-chirurgico-medica*. Rostoch. 1769. 8. Obs. 33.
- 3) *Chirurgische Operationen*. Kopenh. Vermuthlich 1754. ungeachtet 1773. auf dem Titel steht. §. 262. S. 578.
- 4) *Beiträge zur ausübenden Arzneywissenschaft*. Leipzig. 1804. S. 42.

*Cloquet Journal de Corisat. t. 20. Bulletin de la faculté de Médecine
 par W. Lawrence pag. 529.
 Cooper. H. 2. p. 70. H. 4. fig. 2.*

194
82

durch das eysförmige Loch ohne Harnbeschwerden. Nur wenn er die Blase ausgeleert zu haben schien, konnte er durch einen unschmerzhaften Druck auf diesen Bruch etwa eine Tasse voll Harn nachliefern; worauf die Geschwulst verschwand.

§. 20.

Aus diesen achtzehn Fällen, welche untern andern von so bewährten und großen Zergliederern als Hommel, Eschenbach, Klincksch, Cassebohm, Camper, und Albinus beobachtet worden, ergeben sich, als nicht zu bezweifelnde Resultat:

- 1) daß durch das eysförmige Loch des Hüftbeines, Eingeweide des Unterleibes und Beckens Därme oder die Harnblase vorgetrieben werden, folglich, daß diese Brüche existiren;
- 2) daß diese Vortreibungen die Eingeweide des Unterleibes oder Beckens mit Recht den Namen von ächten wahren herniis verdienen, weil eben diese Anatomen wahre, vom Bauchfelle gebildete Säcke, an dieser Stelle antrafen.
- 3) Weiber scheinen, ihres breiten Beckens wegen, den Brüchen des eyrunden Loches ausgesetzt¹⁾.
- 4) Doch kommen diese Brüche nicht bloß bey Weibern, sondern auch bey Männern vor, wie Garengeot's, Camper's, Klinckschens, und Lentin's Fälle beweisen. Irrig schrieb daher M. Sellée²⁾ noch im Jahre 1789: Cette hernie n'a été vue qu'une fois chez l'homme.

1) Authenrieth's, Isenflamm's und Rosenmüller's Beiträge für Zergliederungskunst. 1803. B. 2. p. 195.
 2) Traité des Hernies, Paris, 1789. page 80.

einem 17jährigen
 obturatoriorum
 ig war, und ein
 aufnahm.
 Bruch ebenfalls
 Ich habe ebener-
 weiblichen Caba-
 n noch gege-
 weil selbige nicht
 ich keine merk-
 fand eine Ver-
 eysförmige Loch
 6 Finger langes
 sack des Bauch-
 unter dem ersten
 und pectinea
 merkliche Schim-
 heraus“, setzt der
 in der Gegenwart
 ein habe, weil
 f.
 zählt L. J. B.
 en Blasenbruch
 S. 12. Note 20.
 gico-medica. Ro-
 vermuthlich 1754.
 262. S. 678.
 schaft. Leipzig

- 5) G ü n z e n s Bemerkung S. 96. : vesicam in feminis tantum per foramen ovale devolvi, wird durch Lentin's Fall aufgehoben;
- 6) scheinen diese Brüche bisweilen keine sonderliche Beschwerden zu verursachen;
- 7) da Duverney, Hommel und Camper diese Brüche sogar auf beiden Seiten zugleich fanden, so scheint fast eine angebörne Schwäche dieser Stellen zu dieser Art von Brüchen beizutragen.
- 8) Schade, daß wir noch keine bildliche Darstellung von dieser Art Brüchen besitzen!

Hernia foraminis praeternaturalis Symphyseos ossium pubis.

§. 21.

Kavaton ¹⁾ untersuchte den Leichnam eines, unter allen Zeichen eines eingeklemmten Bruches gestorbenen Mannes, und fand ein Stück des Dünndarmes innerhalb eines sehr kleinen Loches (Vertiefung?) der Schaambeine. Je trouvai, sagt er, qu'un pli de l'intestin ileum s'étoit glissé par un très-petit trou, au travers de la portion du péritoine, qui tapisse les os pubis, un peu au dessus

1) Traité des playes d'armes à feu. Paris. 1750. page. 306. Zwischen der 66 und 67 Abb. in desselben Hugo Kavaton's Abhandlungen von Schuß- Hieb- und Stichwunden, aus der Engl. Handschrift des Verf. übersezt. Straßburg 1767. finde ich diese Abb. nicht, sowie überhaupt dies ein ganz anderes Werk zu seyn scheint.

de la vessie, et y avoit contracté un étranglement indomptable, qui étoit devenu cause de sa mort.

Bis jetzt habe ich weiter keinen ähnlichen Fall gefunden.

Hernia perinaei.

Mittelfleischbruch oder Dambruch.

Hernie périnéale.

§. 22.

Der Bruch des Mittelfleisches scheint eine eigene Betrachtung zu verdienen, und sowohl von dem ischiabischen Bruche §. 16. als den folgenden Mutterscheidenbrüchen §. 23. unterschieden werden zu müssen. Er kommt bey beiden Geschlechtern vor.

Diese Bruch-Art ist erst in neuern Zeiten gehörig bestimmt worden; daher man z. B. in GÜNZENS trefflichen Werke seiner noch nicht gedacht findet.

Erreicht ein solcher Bruch des Mittelfleisches eine beträchtliche Größe; so erscheint er bey Männern unfern von dem After, der Harnblase und dem Mastdarme; in Frauen zwischen der Mutterscheide und dem Mastdarme. Gemeinlich zeigt er sich seitwärts, selten in der Mitte.

Ist er klein, und erregt er keine Zufälle; so bleibt er lebenslänglich verborgen, und wird erst bey der Leichensöffnung entdeckt.

MERY²⁾ schildert eine hernia perinaei, indem er eine Geschwulst beschreibt, die er an einer 5 bis 6 Monate

2) Mémoires de l'Acad. des sciences à Paris. Année. 1713. Paris. 1739. page 111. Obs. 2.

vesicam in femi-
le devolvi, wird
keine sonderliche
Camper diese
n zugleich fanden,
schwäche dieser Stelle
zutragen.
che Darstellung von
ernaturalis
a pubis.
ynam eines, um
uches gestorbem
darmes innerhalb
er Schaambeine.
ileum s'étoit
de la portion
peu au dessus
1750. page. 306.
iben Hugo Ma-
chied. und Etich-
s Verf. übersezt.
nicht, sowie
zu seyn scheint.

Schwangeren größer als ein Hühnercy, etwas seitwärts, entre l'anus et la partie inférieure de l'orifice externe de la matrice antraf, und welche die Harnblase enthielt.

P. Camper ¹⁾ bestimmt von innen her, mit einer wackeren Zeichnung, die Stelle einer hernia perinaei genauer. In viris propter pelvis compressionem forsan non contingit, in feminis vero. Tab. II. fig. 1. Spatium inter os ischium, musculum sphincterem ani, et perinaei transversum U majus est, atque solo levatore ani stabilitur. Eo igitur dilatato perinaei herniam oriri posse, ipsa partium inspectio demonstrat.

Weibliche Beispiele von herniis perinaei sind folgende.

In den Ephemeridibus Naturae Curiosorum kommt Dec. H. ann. V. Obs. 71. eine vesica ad sinistram perinaei partem protrusa, ibidem tumorem efficiens, vor.

J. Sue ²⁾ gedenkt ebenfalls der Brüche zwischen dem After und den Geschlechtstheilen.

Curade ³⁾ fand in einer sechs Monate Schwangeren eine unschmerzhaftige Geschwulst gleich unter der Haut im Perinaeo, etwas seitwärts, welche, wenn die Frau auf war, und lange nicht Wasser gelassen hatte, anschwoll, und sich schwappelnd anfühlte, sich leicht wegdrücken ließ, so daß alsdann die Person harnte. Diese hernia perinaei verlor sich nach der Niederkunft, zeigte sich aber wieder bey

1) Demonstrat. anat. pathol. Libr. 2. §. 3.

2) Traité des Hernies. Paris. 1746 und 1761.

3) Nach Verdier's Zeugniß in den Mém. de l'Acad. de Chirurgie. Tome 2. page 25.

der zweyten Schwangerschaft, und zwar vergrößert, so daß sie nun das ganze Mittelfleisch einnahm.

Smellie ¹⁾ sah an einer Frau eine hernia perinaei an der linken Seite des Afters, welche verschwand, wann sie zu Bette lag, bey'm Aufseyen aber wieder kam, und während der Niederkunft sich einzuklemmen schien. Vor der zweyten Niederkunft schob Smellie, vermittelst der in die Scheide gebrachten Hand, diese hernia glücklich zurück.

Eben derselbe ²⁾ erzählt noch einen ihm vorgekommenen Fall. Nach der ersten Niederkunft erschien eine faustgroße Geschwulst an der linken Hälfte des Perinäums und des Afters, zwischen der Scheide und dem Mastdarne. Fünf Wochen vor der Niederkunft nahm diese hernia so zu, daß sie nicht mehr zurück gebracht werden konnte, nebst dem Stücke des Dünndarms, welches sie enthielt, abbrach, aber doch so glücklich heilte, daß die Person ihr Kind austrug u. s. f. Fünf Monate nach der Niederkunft erschien dieser Bruch bey der Schwangerschaft wieder, und mußte verschiedenemale zurück gebracht werden.

Pipelet ³⁾ erzählt ausführlich die Geschichte eines Mittelfleischbruches von der Größe eines Eyes, an einem 60jährigen Manne, welcher etwas rechts lag, die Harnblase enthielt, und theils durch ein Ausgleiten, theils durch

1) Cases in Midwifry. London. 1754. Collection XI, Case IV. p. 144.
 2) Ebendasselbst. Case V. pag. 154. Hoin bey le Blanc führt beide Fälle von Smellie als Beyspiele von hernia vaginalis an.
 3) Mercure de France, 1762. Juillet. p. 157. Mémoires de l'Acad. de Chir. Tome IV. 1768. p. 183.

etwas seitwärts,
 l'orifice externe
 Harnblase enthielt.
 nen her, mit ei-
 hernia perinaei
 pressionem for-
 Tab. II. fig. 1.
 m sphincterem
 us est, atque
 ur dilatato pe-
 m inspectio
 naei sind fol-
 Curiosorum
 esica ad sini-
 em tumorem
 Brüche zwischen
 te Schwange-
 ter der Haut
 die Frau auf
 e, anschwell,
 gedrückt lies,
 rnia perinaei
 aber wieder bey
 de l'Acad. de

einen Sprung über einen Graben entstanden war. Außer dem hatte dieser Mann noch einen Leistenbruch.

Bromfielden ¹⁾ kam in einem Knaben, den er am Steine operirte, eine hernia perinaei entgegen.

Chardeon ²⁾ beobachtete in dem Leichname eines 45jährigen Mannes, den vom Bauchfelle gebildeten Sack eines Mittelfleischbruches, von der Größe eines Taubeneys, welcher ein Stück des Dünndarmes enthielt, und eine harte, callose und engere Mündung, als Boden hatte. H. Chardeon brachte den Finger in den Bruchsack, legte die andere Hand auf's Mittelfleisch, und fühlte deutlich, daß zwischen der Hand und dem Finger nichts als die äußere Haut befindlich war. Als er den Bruchsack mit Charpie ausfüllte, erkannte man äußerlich ganz deutlich eine Geschwulst.

L. E. Schneider ³⁾ schildert nebst einem Kupfer einen solchen Bruch an einem neugebohrnen Kinde, welcher birnförmig und weich war, sechs Zoll im Durchmesser hatte, und, gedrückt, Rothabgang verursachte. Das Kind befand sich übrigens wohl.

Zuville ⁴⁾ bemerkte eine hernia perinaei zugleich mit einem Nabelbruche und Schenkelbruche.

-
- 1) *Chirurgical Observations and Cases.* London. 1775. Vol. I.
 - 2) *bey le Blanc Précis d'Opérations de Chirurgie.* Paris 1775. page 24., in Ludwigs Uebersetzung Leipzig. 1785. Seite 135.
 - 3) *Chirurgische Geschichte mit Anmerkungen 7. Theil.* Chemnitz. 1775.
 - 4) *Des Bandages herniaires.* Paris 1786.

Endlich schreibt der in Brüchen überaus erfahrene A. Cooper 1): Sometimes a hernia passes between the bladder and rectum in the male, and between the rectum and uterus in the female, appearing in the perinaeum. It is then called hernia perinaei; und setzt somit durch seine Autorität auch diese Art von Brüchen fest.

*M^c Lauria in Jeerman's
M^c Wifry.*

§. 23.

Ungeachtet manche bey der Betrachtung des natürlichen Baues des Mittelfleisches und seiner Nachbarschaft, besonders bey dem weiblichen Geschlechte, kaum vermüthen würden, daß in selbigen einer Vortreibung von Eingeweiden des Beckens und des Unterleibes Statt finden könnte; so ist sie dennoch oft genug als wirklich existirend, wie die angeführten Fälle beweisen, wahrgenommen und angemerkt worden. Indessen verursacht diese Art Bruch, im weiblichen Geschlechte, allemal zugleich eine bruchartige Geschwulst auf der hinteren Wand der Mutterscheide, ist also in sofern zugleich vaginalbruch.

- 1) Daß diese Vortreibungen der Eingeweide ins Mittelfleisch den Namen Brüche verdienen, erhellt sattsam schon daraus, daß man wirklich das Bauchfell hier einen wahren Bruchsack bilden sah, und da das perinaeum die Pforte enthält oder ausmacht, durch welche die Eingeweide zwischen den, von einander entfernten, Fasern des muscoli levatoris ani und transversi perinaei zu einem förm-

1) The anatomy and surgical treatment of hernia. London. 1804.

*Joseph Cooper in anatomy and surgical treatment of
p. 2. p. 67. pl. II. fig. 1
Circum and umbilical Hernia
fol. 1807.*

nden war. Aufzu-
tenbruch.
Knaben, den er am
entgegen.
dem Leichname ei-
aufhülle gebildet
der Größe eines
ndarms enthielt,
dung, als Boden
ger in den Bruch.
fleisch, und fühlte
n Finger nichts
den Bruchsack
lich ganz deut-
einem Kupfer
nen Rinde, wei-
Zell im Durch-
verursachte. Das
perinaei zu-
ruche.
London. 1778.
de Chirurgie.
ersekung Leipz.
n 7. Theil. Chem-

- lichen Brüche hervorgehen; so nennt man sie der Analogie ganz gemäß *hernias perinaei*.
- 2) Mehrentheils enthält ein Mittelfleischbruch (so wie der Mutterscheidenbruch), ein Stück Darm und einen Theil der Harnblase.
 - 3) Außer den allgemeinen Ursachen, welche Brüche veranlassen, scheinen hier noch besonders Ausdehnung der Harnblase, Vorfälle des Mastdarms und der Mutterscheide — vorzüglich aber das gewaltsame Handhieren einer Hebamme in der Scheide bey Niederkunften Gelegenheiten zu geben.
 - 4) verursacht ein solcher Bruch im Mittelfleische eine eigene ungewohnte Empfindung vor Ziehen, Spannen, Drücken oder einer Schwere.

*Hernia vaginalis*¹⁾,

Mutterscheiden; Bruch.

Hernie vaginale. Pudental hernia.

§. 24.

Bedenkt man, daß die Scheide bey der Niederkunft eine so erstaunende Ausdehnung und Weichheit in kurzer

1) Jo. Christ. Stark. de hernia vaginali et strictura Uteri, observatione illustrata Jenae 1796. 8. Teutsch in dem Neuen Archiv für Geburtshülfe u. s. f. 1. Bd. 1. St. 48 Seite.

John Burns (on Midwifry Lond. 1809.) Pudental hernia scheint eine h. vaginalis, die sich in das labium vulvae erstreckt.

Zeit erleidet, und daß die Frauenzimmer theils durch Schnürbrüste die Bauchhöhle verengen, theils durch Röße den Unterleib zusammenziehen, und die in selbigem enthaltenen Eingeweide gleichsam mit aller Gewalt gegen die frey hängende Scheide hinabstreifend drücken; so darf man sich wohl nicht wundern, daß die Scheide von den Eingeweiden des Bauches und Beckens zu einem Bruchfacke ausgehñht, und endlich sogar aus dem sinu pudoris, als ein wahrer Bruch, ans Tageslicht herausgetrieben wird. Es giebt daher auch wirklich eine Menge Beyspiele von Mutterscheidenbrüchen; ungeachtet der gelehrte Günst zu seiner Zeit nur sechs bis sieben Fälle kannte, weil in älteren Zeiten oft herniae vaginales für prolapsus vaginae galten. So sagt Heister ¹⁾: Vaginae uteri hernia a recentioribus cognita est, esse illud ipsum vitium quod alias, vaginae prolapsum Medici appellarunt.

Ant. Benevenius ²⁾ scheint eine, Därme enthaltende, hernia vaginalis beobachtet zu haben, wenn er schrieb: Vidimus feminam, de cujus vulva disrupta intestina omnia profluxerunt, paucis diebus occubuisse.

Cornelius Solinger ³⁾ sah in der vorgefallenen Scheide die Harnblase bruchartig liegen.

Nach H. v. Haller ⁴⁾ wäre H. Smetius ⁵⁾ der

1) Institutionus chirurgicae. Cap. CXX. p. 788. §. VI.
 2) de abditis et admirandis morborum et sanationum causis Florent. 1507. Cap. 5.
 3) Manuele opération de Chirurgie. Amst. 1914 p. 737.
 4) Bibliotheca chirurgica. Tom. I. p. 288.
 5) Miscellanea medica. Francofurti. 1611.

nennt man sie der
 rinaei.
 Leichbruch (so wie
 f Darm und einen
 welche Brüche ver-
 dert Ausdehnung
 f Darms und der
 das gewaltsame
 der Scheide bey
 eben.
 Mittelfleische eine
 Ziehen, Span-

is¹⁾
 hernia.

er Niederkunft
 heit in kurzer

ali et strictura
 1796. 8. Leutsch
 u. f. f. 1. Bd.

ad. Bog.) Pu-
 lis, die sich in

erste, welcher ein Beyspiel von einer hernia intra uteri cervicem anführt.

Peyer ¹⁾ fand in der Leiche einer Frau, welche lange an einem Muttervorfalle gelitten hatte, die Harnblase in der umgewandten Scheide liegen.

*Hartmann jun. gliedert
dieses in 2 Theile*
Genauer schildert schon Ruy sch ²⁾ den Fall einer 42 jährigen Frau, wo bey einem Mutterscheidenvorfalle zugleich die Harnblase mit heruntergezogen war, welche 42 Steine enthielt, die glücklich ausgeschnitten wurden.

Christ. Vater ³⁾ beschreibt eine hernia sine pudoris propendentem.

Lolet ⁴⁾ schnitt in einer 68 jährigen Frau, aus der Harnblase, welche einem Muttervorfalle gefolgt war, fünf Steine so glücklich, daß die Heilung in acht Tagen erfolgte.

Garengot ⁵⁾ fand den rechten und oberen Theil der Mutterscheide einen Bruchsaek bilden.

*Prof. Salzman
J. P. Divoux, J. P.
de Hernia vesicae
ur. Argent 1730.*
H. Bassius ⁶⁾ fand eine hernia vaginalis, welche die Harnblase enthielt, nebst einem Muttervorfalle, so groß als einen Kindskopf, ohne daß sie sonderliche Beschwerde verursachte. Bey der Leichenöffnung sah er nur einen Theil der Harnblase in der Scheide, welche den Bruchsaek vorstellte, liegen.

*Acad. N. Cur.
1686.
1686.*

- 1) Ephemeridum Nat. Curios. 1682. Dec. II. an. I. Obs. 84.
- 2) Obs. anat. chir. Amst. 1691. Obs. I. Tab. I. Die nämliche Geschichte nur mit ein wenig veränderter Abbildung wiederholt er im Thesaurus anat. octavus 1709. pag. 57. Tab. III. fig. 3.
- 3) Diss. de gangraena. Vitebergae. 1607.
- 4) de la Lithotomie Paris. 1708. Chap. 25. p. 176. In den ältern Ausgaben dieses Werks findet sich dieser Fall nicht.
- 5) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. pag. 707.
- 6) Obs. anat. chirurg. Hal. 1731. Dec. III. Obs. 2.

M. Robert ²⁾ sah in einer schwängeren Frau, eine hernia vaginalis von der Größe eines Kinds Kopfes, die Harnblase enthalten.

Duverney ²⁾ zeigte im Jahr 1743 der Königlichen Academie der Wissenschaften zu Paris eine Harnblase, welche in der Duplicatur der, nach außen vorgebrungenen, vorderen Portion der Scheide sich befand.

Drey Beyspiele von herniis vaginalibus theilte Hänel Herr Günz ³⁾ mit; einen von ihm selbst beobachteten, den zweyten von Le Maire, den dritten von Garmann. Im Garmannischen Falle schnitt der Wundarzt aus Unwissenheit den Bruch ein, worauf der Blinddarm nebst einem großen Theile des Dickdarmes vordrang, brandig wurde, und den Tod bewirkte.

Günz ⁴⁾ sah einen Mutterscheidenbruch, rechts, in einer mehr als 70jährigen Frau, welcher wenigstens dreyßig Jahr alt, und nach einer schweren Geburt entstanden war, sich aber doch glücklich zurück bringen ließ.

Verdier ⁵⁾ in seinem trefflichen, mit vieler Gelehrsamkeit geschriebenen Mémoire, führt ebenfalls mehrere der vorhin erwähnten Fälle an.

J. Arnaud. Op. on Hernia's 1748.

- 1) bey Verdier in den Mém. de l'Acad. de Chir. Tome 2. Obs. 18 page 33.
- 2) Ebendasselbst S. 28.
- 3) de herniis. Lips. 1744. p. 83.
- 4) Ebendasselbst. S. 84. Hoin bey Le Blanc in Ludwig's Uebersetzung S. 152. commentirt diesen, so wie die drey vorhergehenden Fälle.
- 5) Mémoires de l'Academie de Chirurgie. Paris. 1753. Tome 2. N. 1.

hernia intra uteri
iner Frau, welche
hatte, die Harn
n.
den Fall einer
Mutterseidenvorfall
ogen war, welche
schnitten wurden.
herniame sing
n Frau, aus der
folgt war, fünf
Tagen erfolgte.
nd oberen Theil
raginalis, welche
Mutterseidenvorfall, so
berliche Beschwerden
sah er nur einen
welche den Bruch

I. an. I. Obs. 84.
ab. I. Die näm-
änderter Abbil-
a. octavus 1709.
p. 176. In den
dieser Fall nicht.
ag. 707.
III, Obs. 2.



Einen Mutterscheidenbruch, von der Größe eines Hünereys, welcher von der linken Seite derselben her, ein wenig nach außen zu hervorragte, heilte G. Heuermann ¹⁾ glücklich durch ein Pessarium.

H. Stubbbs ²⁾ fand in einer Kreisenden, die Scheide und das Becken mit einer Geschwulst gefüllt, which probably proceeded from the intestines pushed down at the back part of the vagina — also eine hernia vaginalis an ihrem hinteren Theile. Nach der gelungenen Zurückbringung entband er die Frau glücklich vermittelst der Zange.

Ant. de Haen ³⁾ beschreibt die Krankengeschichte einer 35jährigen Frau, wo eine doppelte Geschwulst aus der Scheide hing. Das Bauchfell bildete zwey Säcke, deren kleinerer, wie die Leichenöffnung zeigte, die Harnblase, der größere Därme enthielt. Nämlich eine hernia intestinalis, incumbens in prolapsam vaginam, nebst einem prolapsus vesicae inversae. Schade, daß eine Zeichnung fehlt, welche Alles deutlicher machen könnte!

Camper ⁴⁾ sah öfters Harnblasenbrüche bey einer inversio vaginae, und bemerkte, daß alsdann die Harnblase außer-

1) Chirurgische Operationen. Kopenhagen. 1754. S. 282. Seite 618.

2) bey Smelle. A Collection of Cases and Observations. London. 1754. Case VI. page 48. Bey Hoin Obs. 14.

3) Ratio medendi. Viennae 1756. Parte 1. Cap. VII. pag. 87. bey Hoin. Obs. IV.

4) Demonstrationes anat. path. §. 4. pag. 17.

ausserhalb dem vom Bauchfelle gebildeten Bruchfacke lag.
Hernias intra vaginam prolabentes aliquot vidi ¹⁾.

Auch bey Rich de Haute sierku ²⁾ findet sich ein
Beyspiel von hernia vaginalis.

Hoin ³⁾ gedenkt mehrerer, theils von ihm selbst,
theils von Anderen beobachteter Vaginalbrüche, welche
Därme enthielten; z. B. eines Mutterscheidenbruchs bey
einer 30jährigen Jungfer, von heftiger Anstrengung bey
Stuhlgange. Desgleichen eines Mutterscheidenbruchs,
rechts ein Paar Linien weit vom Muttermunde, von der
Größe einer Nuß, welchen er erst nach der Entbindung zurück
bringen konnte, und der durch einen Sprung mit gleichen
Füßen entstanden war; welcher bey einer neuen Schwan-
gerschaft wieder kam, und nun ausser dem Darne auch
noch die Blase enthielt.

H. Levret ⁴⁾ sah mehrere Fälle von großen Vagi-
nalbrüchen. Einmal fand er das ganze linke Stück des
Dickdarms darinnen ⁵⁾. Ein andermal enthielt ein solcher
Bruch Darm und Netz ⁶⁾.

-
- 1) Dissert. de optima agendi vel exspectandi in medi-
cina ratione 1776.
 - 2) Recueil d'Observations de Médecine des Hôpitaux
militaires. Paris. 1776. p. 110.
 - 3) Essai sur différentes hernies. Paris 1768. auch in Le
Blanc Précis d'Opérations de Chirurgie. Paris 1775.
page 459. In Ludwig's Uebersetzung Obs. 3. S. 145.
Obs. 9. p. 163.
 - 4) Ebendasselbst p. 321. desgleichen Essai sur l'abus des
regles générales. Paris 1766.
 - 5) Des Polypes. page 154. bey Hoin a. a. Ort. Obs. 8.
 - 6) Bey Hoin Obs. XI.

Auch bey Zacharias Vogel ¹⁾ finden sich Beyspiele von diesen Brucharten.

So schildert ebenfalls der ehrliche Henckel ²⁾, nach eigenen Erfahrungen, die Zeichen, an welchen man eine *hernia vaginalis* von anderen Geschwülsten unterscheiden kann.

Ed. Sandifort ³⁾ beschreibt zwey Fälle von Mutterscheidenbrüchen: 1) von einer 25jährigen Frau, die nie geboren hatte, wo ein solcher Bruch durch convulsivischen Husten entstanden war. 2) Einen anderen fand er bey der Leichenöffnung einer alten Frau, an der hintern Seite der Scheide entsprungen, und zum Theil aus derselben heraus hängen. Das Darmfell bildete den Därme enthaltenden Bruchsaek.

Herbiniaux ⁴⁾ lehrt umständlich die Unterscheidung der Vaginalbrüche von den Polypen.

Chaussier ⁵⁾ erzählt die Geschichte einer Frau, welche den siebenten Tag nach der Niederkunft durchs Heben eines Eimers mit Wasser einen Mutterscheidenbruch von solcher Größe bekam, daß ihn ein Wundarzt für den Kopf eines zweyten Kindes hielt, und mit dem Haken wegzuholen sich bemühte, ja ihn deshalb anbohren wollte.

-
- 1) Abhandlung aller Brüche. Slogau 1769. pag. 35.
 - 2) Neue medicinisch-chirurgische Wahrnehmungen, 48 St. 1772.
 - 3) Obs. anat. patholog. Libro 1. pag. 55.
 - 4) Traité sur divers Accouchemens laborieux etc. etc. Polypes etc. Paris 1782.
 - 5) In Le Blanc Précis d'Opér. de Chir. Deutsch: Inbegriff aller chirurgischen Operationen. Leipzig. 1783. pag. 224. Obs. 15.

Dieser Bruch enthielt die Harnblase, wurde so glücklich zurückgebracht, und in 14 Tagen so vollkommen geheilt, daß diese Frau nachgehends mehrere Kinder ohne widrigen Zufall bekam.

Richter 1) sah ein Paar mal Mutterscheidenbrüche, welche die Blase enthielten. Sie lagen nahe über der Öffnung der Mutterscheide, und hatten die Größe einer halben welschen Nuß. Offenbar entstanden sie durch eine Ausdehnung aller Häute der Mutterscheide. Nach seiner späteren Bemerkung 2) kann man den Theil der Bruchhöhle, der in der Mutterscheide liegt, den Bruch sack, und den Theil des Bruchganges, der zwischen der Gebärmutter und dem Mastdarm oder der Blase liegt, den Bruch sack = Hals nennen. Bey den hinteren Mutterscheidenbrüchen ist der Bruch sackhals lang, bey den vorderen kurz.

Salaber.

*H. Bertrandi Ma
künstl. u. d. f. f.
Burger. 1797.*

Heinsius 3) erzählt ein Beispiel von einer hernia vaginali an der linken Seite, welche ein Stück der Scheide enthielt, und leicht geheilt wurde.

Callieca

Auch in Desault's 4) Tagebüchern kommen hierher gehörige Fälle vor.

Benj. Bell.

Starke 5) handelt von dieser Bruchart vollständig in einer besonderen Schrift, nebst lehrreicher Erzählung einer eigenen Beobachtung.

- 1) *Abb. v. d. Brüchen. Göttingen 1785. 40. Kap. S. 717.*
- 2) *Anfangsgründe der Wundarznehwissenschaft. Sechster Band. Götting. 1799. S. 16.*
- 3) *Starke's Archiv für Geburtshülfe. 2ten Bandes erstes Stück. 1789. S. 152.*
- 4) *Journal de Chirurgie. Tome 1. Paris. 1792. Art. 52. u. s. f.*
- 5) *In den zu Anfange dieses Abschnittes citirten Schriften.*

finden sich...
Henkel 2), nach...
welchen man eine...
unterscheiden...
v. d. v. d. Mut...
igen Frau, die nie...
durch conault...
anderen fand er bey...
in der hintern Seite...
Theil aus derselben...
den Darme ent...
lich die Unterschei...
en.
schichte einer Frau,
berührt durch die...
Mutterscheidenbruch...
Wundarzt für den...
mit dem Haken...
anbohren wollte.
9. pag. 55.
mungen, 48 St.
6.
borieux etc. etc.
Deutsch: Inbe...
Leipzig. 1783.

Auch verdanken wir Herrn *Murcina* *) eine eigene Beobachtung eines solchen Falles.

Walter, der Vater **), sah zweymal solche Scheidenbrüche. In einem Vorfalle der Mutterscheide, welcher beynähe die Größe eines Mannskopfs erreicht hatte, war die Harnblase so sehr heruntergesunken, daß sie einen großen Sack bildete, an dessen oberem Ende sich die Öffnung der Harnröhre zeigte.

*Chr. Cricus de Fabrica
Prolesio de cystocele
vaginali.
Annot. 1802. 4.
Nouveau
de son
brachycephale
Falle.*

Astley Cooper ***) schreibt: I have seen the vagina protruded forwards by a descent of the viscera between the rectum and the uterus, and pushed backwards by the bladder, forming a considerable external tumour, when the bladder was full, which disappeared as soon as it was emptied.

Der neueste gelehrteste französische Wundarzt *Cassus* *) bemerkt, daß Mutterscheidenbrüche, welche die Blase enthalten, gar nicht selten seyn.

Endlich finden wir von dem, zu seiner Zeit mit Recht berühmten, zum Geburtshelfer wie geschaffenen, *G. W. Stein* **) drey Fälle von *herniis vaginalibus* ange-merkt, welche von der hinteren Wand der Scheide gebildet wurden.

Cystocele

Leopoldus *gynäkolog*
und *gynäkolog*

gynäkolog
et vaginalis *fol*
a Burns *fol.* *N. 532*

von *a Burns* *in* *Monro Morbid anatomy*. p. 523.

1) *Neue medicinisch-chirurgische Beobachtungen*. 1796. N. 44.

2) *J. A. Walter* (der Sohn) *Einige Krankheiten der Nieren und Harnblase*. Berlin 1800. S. 43.

3) *The Anatomy and surgical Treatment of Hernia*. London. 1804. page 2.

4) *Pathologie chirurgicale*. Paris. 1805. S. 89.

5) *Nachgelassene geburtshülffliche Wahrnehmungen*. Erster Theil. Marburg. 1807. N. 22. 23 und 92.

de Malacarne in *Memorie della Societa Italiana Milano*. Tom 13.
providentia vaginae cum hernia

§. 25.

Aus diesen Thatsachen lassen sich folgende Resultate ableiten:

- 1) existiren wirklich Vordringungen der Eingeweide des Unterleibes, welche in der vorgetriebenen Scheide, wie in einem Bruchsacke, liegen.
- 2) Der Bruchsack wird offenbar vom Bauchfelle gebildet. Dieß beweisen die genau untersuchten Fälle von de Haen, Sandifort, Camper und Walter. Richter bemerkte mit Recht gegen Hoin, daß wohl selten das Bauchfell zerrissen sey. In so fern verdient also auch diese Krankheit mit Recht den Namen hernia, ungeachtet ich schon oben nach Camper bemerkte, daß, wenn bey einer solchen Gelegenheit die Harnblase vorge trieben wird, sie zum Theil vom Bauchfelle ent blößt in diesem Bruchsacke sich befindet.
- 3) Gemeinlich zeigt sich der Mutterscheidenbruch an einer Seite, oder an der hinteren Wand, am sel tensten an der vorderen.
- 4) Ein Mutterscheidenbruch enthält gewöhnlich ein Stück Darm, ein Stück Netz, oder die Harn blase; entweder eines von diesen Stücken allein, oder zwey, oder auch wohl alle drey zusammen.
- 5) Da wohl in älteren und neueren Zeiten oftmals eine hernia vaginalis nicht erkannt, sondern für einen simplen Vorfall (prolapsus) der Scheide gehalten worden seyn mag, so kann ich nicht um hin, die Kennzeichen derselben, so wie die Un terscheidungszeichen von einem Vorfalle kürzlich anzugeben.

in na) eine eigen
ymal solche Schie
terscheide, welcher
reicht hatte, wor
daß sie einen gro
e sich die Öffnung
ve seen the va
at of the visce
s, and pushed
a considerable
s full, which
Bundarzt Cas
he, welche die
Zeit mit Nicht
nen, S. W.
inalibus ange
Scheide gebildet
anatomy. p 523
tungen. 1796.
Krankheiten der
ent of Hernia.
hungen. Er
St. laus. Tom II

Außer den allgemeinen Zeichen, welche einen Bruch verrathen, fühlt a) bey einer Vaginal-Hernia die Patientinn, daß ihr etwas in die Scheide gerathen ist; b) findet der untersuchende Finger des Wundarztes eine Geschwulst in der Scheide; c) sind gemeinlich dabey Colikschmerzen; d) verkleinert oder verschwindet eine solche Geschwulst, wenn man sie mit dem Finger gehörig wegdrückt; e) der Muttermund ist frey, und steht in keiner Verbindung mit der Geschwulst.

- 6) Von dem einfachen, für sich bestehenden Vorfalle der Mutterscheide, unterscheidet sich die Hernia vaginalis. a) Diese Hernia vaginalis bildet eine abgesonderte, rundliche Geschwulst, oder einen Sack ohne Öffnung — der Vorfall dagegen, eine Art Wurst mit einer in der Mitte befindlichen Öffnung. b) Die Hernia vaginalis entsteht plötzlich, bey einer auffallenden Gelegenheit — der Vorfall dagegen langsam, anfangs fast unmerklich. c) Die Hernia verursacht Coliken, Harnverhaltung u. s. f. — der Vorfall nicht. d) Im Stehen, bey Anstrengen, Husten, Niesen, Athem-Anhalten, wird die Hernia merklich größer und härter — nicht so leicht und so schnell der Vorfall. e) Beym Liegen auf dem Rücken wird die Hernia vaginalis gemeinlich kleiner und weicher, und verschwindet auch wohl gänzlich — nicht so der Vorfall. f) Im Stehen nehmen bey einer Hernia vaginali die Colikschmerzen zu, und verschwinden im Liegen — nicht so bey einem Prolapsus. g) Ist die Harn-

eichen, welche ein
 bey einer Vaginal-
 af ihr etwas in die
 der untersuchen
 Geschwulst in der
 dabey Collicifimer-
 schwindet eine solche
 dem Finger gebö-
 mund ist frey, und
 der Geschwulst.
 bestehenden Ver-
 unterscheidet sich
 Hernia vagi-
 rundliche Ge-
 Öffnung — der
 st mit einer in der
 b) Die Hernia
 einer auffallen-
 dagegen langsam,
 die Hernia vorur-
 u. s. f. — der
 bey Anstren-
 Anhalten, wird
 härter — nicht
 e) Beym Lie-
 ernia vaginalis
 und verschwindet
 Vorfall. f) Im
 ia vaginali die
 den im Liegen —
 g) Ist die Harn-

blase mit im Bruche enthalten, so entstehen, we-
 gen ihrer Zusammendrückung, Harnbeschwerden
 Beym Harnlassen, die im Stehen sich vermehren,
 im Liegen vermindern. h) Die Geschwulst ist
 größer, wenn lange kein Harn gelassen worden,
 kleiner nach dem Wasserlassen. Drückt man die
 Geschwulst, so entsteht Trieb zum Harnen, und
 bey vermehrtem Drücken das Harnlassen selbst.

Mit dem eigentlichen Vorfalle des Uterus läßt
 sich eine Hernia vaginalis wohl kaum verwech-
 seln.

- 7) Zu den Ursachen einer Hernia vaginalis ge-
 hören, auffer etwa einer angeborenen Anlage, An-
 drang der Harnblase gegen die Scheide durch
 Schwangerschaft, durch Hartleibigkeit, durch
 Niederkunft, durch's Heben schwerer Lasten bald
 nach der Niederkunft, durch Niederstürzen, ins-
 besondere durch rohe, ungeschickte Behandlung
 der Scheide bey der Entbindung. Auch soll das
 beständige Schlafen auf einer Seite diese Seite
 der Vagina zu einer Hernia vorzüglich geneigt
 machen.
- 8) Bringt man die vorgedrungene Scheide zurück,
 so geht gemeinlich die Harnblase zugleich mit
 zurück.

H e r n i a u t e r i n a 1)

Enterocoele hysterica.

M u t t e r d a r m b r u c h.

§. 26.

Bisweilen begeben sich in den umgewendeten, umgekehrten, umgestülpten Uterus, der mit dem Boden durch den Muttermund in die Mutterscheide hinabgesenkt ist, folglich gegen die Bauchhöhle zu einen offenen Sack oder eine offene Tasche bildet, so wie schon Günz 2) anführte, Därme oder Netze.

Nichter bemerkt, daß man diesen Fall gemeiniglich Vorfall oder Umkehrung der Gebärmutter nenne, daß er aber wirklich zuweisen mehr den Namen Mut-

- 1) Plouquet citirt Tom. 4. p. 184. Oneides. Diss. de Hernia uterina. Lugd. Batav. 1680. die ich noch nicht gesehen habe.

Henr. von Sanden *Observatio de prolapsu uteri inversi ab excrescentia carnea fungosa in fundo ejus interno ex potu infusi crepitus lupi (Bovistae Chir.) enata. Regiomonti. 1722.* mit einem rohen, aber doch sehr deutlichen Kupfer, verdient, ihrer Gründlichkeit und Gelehrsamkeit wegen, eine rühmliche Erwähnung, ungeachtet weder in seinem, noch in den aus Andern angeführten Fällen, in dem Sacke des umgekehrten Uterus Därme oder andere Eingeweide bemerkt wurden.

- 2) S. 85. Saccum uterus format, a parte ventris apertum, in quem intestina, undique pressa, necessario descendere debent.

terbruch verdiene ²⁾, dessen Bruchsaack die Gebärmutter sey ²⁾.

Ein solcher Mutterbruch kann wohl nur kurz nach der Geburt, nach der Umwendung oder sogenannten Umstülpung des Uterus, besonders bey einem weiten Becken durch gewaltsame Herausziehung des Mutterkuchens ³⁾, oder durch die Ausdehnung und das Gewicht eines Polypen vorkommen.

H. ab Heer ⁴⁾ erzählt den Fall, daß ein Quacksalber zugleich mit dem vorgefallenen Uterus ein Stück Colon wegschnitt. Allein es ist doch nicht ganz deutlich, ob es wirklich der Uterus oder die Scheide war.

Ho in ⁵⁾ hat einen Fall beobachtet, wo man von dem umgekehrten Uterus, den man für eine Mola hielt, mehrere Stücke mit den Nägeln abgerissen hatte, den er aber so vollkommen in die Ordnung zurück brachte, daß die Frau nachgehends mehrere Kinder bekam und sich ganz wohl befand.

- 1) Abhandlung von den Brüchen. Göttingen. 1785. Kap. 40. Seite 707 und 742.
- 2) Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Sechster Band. Gbt. 1799. §. 23.
- 3) Dieser Meynung ist auch Petharding von der Umkehrung der Gebärmutter, a. d. Lateinischen, im ersten Stücke der neuesten Sammlung von Abhandlungen für Wundärzte. Leipzig. 1790. S. 194. §. 7.
- 4) Obs. 22.
- 5) Essai sur différentes hernies. Paris. 1768. Auch bey le Blanc Précis d'Opér. Tome 2. p. 384.
Levret des Polypes. p. 140. Le Roux sur les pertes de sang dans les femmes en couches. p. 56 und 140.

Puzos ¹⁾ führt eine Umkehrung des Uterus aus inneren Ursachen, ohne vorgängige Schwangerschaft, an.

L. Heister ²⁾ hat die Geschichte aufgezeichnet, wo H. Kunge, als er nach der Entbindung wahrnahm, daß die Därme durch den zerrissenen Uterus vordrangen, die Därme zurück brachte, und die Hand so lange im Uterus hielt, bis solcher sich hinlänglich zusammengezogen hatte. Die Kranke wurde hierdurch glücklich gerettet. Er lehrte daher auch schon zu seiner Zeit ³⁾: *Uteri procidentia et inversio species herniae est, in quem intestina devolvuntur.*

Selten ist wohl der ganze Uterus, sondern mehrentheils nur ein Theil desselben umgewendet. Die beste Abbildung einer solchen theilweisen Umwendung oder Umstülpung des Uterus findet sich bey Denmann ⁴⁾ und Baillie ⁵⁾. Denmann bildet diesen Gegenstand ab im frischen Zustande, Baillie, nachdem man solchen zum Präparate gemacht hatte.

1) Mercure de France. 1744. Septbr.

2) Institutiones Chirurgicae. Parte 2. sect. V. Cap. 93. §. 14. pag. 728.

3) Ebendasselbst Cap. CXX. im letzten §. pag. 789.

4) A Collection of Engravings tending to illustrate generation and parturition etc. London. 1790. Tab. XI.

5) A Series of Engravings accompanied with Explanations, which are intended to illustrate the Morbid Anatomy. London. 1799—1802. Fasciculog. Plate V. fig. 2.

Zweites Hauptstück.

Quelle exacte connoissance anatomique des endroits, où elles se présentent, et de ces maladies externes mêmes un Chirurgien doit-il avoir, afin de les bien distinguer de tous autres maux qui peuvent avoir lieu à ces mêmes endroits?

§. 27.

Da ich bey der Beantwortung des ersten Punktes der Preisfrage die möglichste Vollständigkeit ohne ermüdende Einförmigkeit zu erreichen getrachtet habe, indem ich das eigene Charakteristische eines jeden einzelnen Falles, in so fern es sich auf alle vier Punkte der Preisfrage bezieht, heraus hob; so kann ich mich bey der Beantwortung der drey übrigen Punkte kürzer fassen. Da ich mich nämlich nicht auf die trockene Bejahung oder Verneinung, ob diese oder jene Bruchart wirklich existire, beschränkt, sondern zugleich anzugeben gesucht habe, *Wie? Wo?* Unter welchen Umständen und Bedingungen, und *In was* für Körpern diese Brüche existiren, und *Von welchen* Männern sie beobachtet worden; so folgt die Beantwortung der übrigen drey Fragpunkt größtentheils gleichsam von selbst. Wenigstens sind die Quellen treulich und genau angegeben, aus denen man das allenfals noch abgängig Scheinende gar leicht nachschöpfen kann.

ing des Uterus aus
Schwangerschaft, an
ste aufgezeichnet, in
dung wahrnahm, bei
rus vordrängen, in
nd so lange im Ute
ich zusammengezogen
glücklich gerettet. Er
); Uteri prociden
in quem intestina

sondern mehren
t. Die beste Ab
dung oder Umstüß
nn) und Gail
entstand ob im frei
n solchen zum Pre

sect. V. Cap. 35.

pag. 789.

to illustrate ge
on. 1790. Tab. XI.
ed with Explana
strate the Morbid
asciculog. Plate V.

Im Allgemeinen hat ein Wundarzt unumgänglich nothwendig, sich vor allen Dingen genau mit der Beschaffenheit des Bauchfells (Peritonaeum) in der Natur selbst bekannt zu machen. Er wird deshalb den Unterleib ganz eigens anatomisch, aufs Genaueste untersuchen müssen, und zwar wenigstens in vier Körpern; nämlich 1) in dem eines männlichen und weiblichen Kindes, und in dem eines erwachsenen Mannes und einer erwachsenen Frau. Zu diesem Zwecke lehrte A. Bonn ¹⁾ schon längstens: *Ad veram corporis humani fabricam perquirendam tenuior subjectorum aetas non minus ac adultorum requiritur.* Denn so vortrefflich, lehrreich und vollkommen auch dem Kenner die Beschreibungen des Bauchfelles von Douglass ²⁾, Winslow ³⁾, Hensling ⁴⁾, Bonn ⁵⁾ und Haller ⁶⁾ seyn mögen; so sind sie doch eben so wenig, als selbst die herrlichsten Abbildungen, hinreichend, ohne eine Anschauung in der Natur, über die Lage, Gestalt, Blätte, Dicke an einigen, und die höchste Feinheit

- 1) In seiner classischen *Dissertatio de continuationibus membranorum* in *Corollario XIV.*, wieder abgedruckt im zweiten Bande des Sandifortischen *Thesaurus Diss.*
- 2) *Description of the Peritonaeum.* London 1730. lateinisch Helmst. 1733.
- 3) *Exposition anatomique de la structure du c. h.* Tomo 4.
- 4) *Diss. de Peritoneo.* Giesae 1742 in *Halleri Selectu Diss. anat.* Vol. 1.
- 5) *Diss. de continuationibus membranarum* im Sandifortischen *Thesaurus Diss.* Tomo 2.
- 6) *Elementa Physiologiae.* Tomo sexto.

an anderen Stellen, Anheftung, Zusammenhang, Faltung oder Verdoppelung, Fortsetzungen, Substanz und die übrigen Eigenschaften des Bauchfelles eine klare Idee zu verschaffen.

Denn da das Bauchfell ein in sich selbst geschlossenes Wesen ausmacht, so wird schon dadurch der bloß schriftliche Unterricht für den Schüler schwer und mangelhaft, daß ihn die doch irgendwo anfangende, und von Stück zu Stück gleichsam ununterbrochen fortgehende Beschreibung Trennungen zu erdenken veranlaßt, welche gar nicht existiren, dahingegen der Verstand durch das Auge bey der anschaulichen Demonstration oder eigenen Untersuchung in der Natur, das Coexistirende sogleich mit einer Klarheit wahrnimmt, und für immer auffaßt, welche er durch bloße Beschreibungen auch mit der besten Phantasie nie erreichen würde. Indessen ist nicht zu läugnen, daß in Rücksicht des Bauchfells die Anatomen durch gute Abbildungen noch manches Nützliche für den praktischen Arzt liefern könnten. Charles Bell ¹⁾ hat einigermaßen dazu einen Anfang gemacht, indem er die Übergänge des Bauchfells von einem Theile zum andern in einer Idealsection des Unterleibes von der rechten Seite abbildet.

Insbefondere ist aber noch einem Wundarzte zu empfehlen, in dieser Hinsicht das Bauchfell an den, im ersten S. genannten, neun bis zehen Stellen (endroits) mit ganz eigener Sorgfalt zu betrachten, und sich um klare und deut-

1) The Anatomy of the human Body. Vol. IV. London. 1804. Plate I.

Zergliederung des menschlichen Körpers, umgearbeitet von Heinroth und Rosenmüller. Leipzig 1807. Tab. XXI.

liche Ideen zu bemühen, wie im gesunden Zustande das Bauchfell ziemlich locker am Diaphragma haftet, wie es theils locker, theils an einigen Stellen dichter an den Bauchdecken haftet, wie viel fester es auf der Scheide, und wie fast am allerfestesten es auf dem Uterus haftet, wie weit entfernt es dagegen vor den Lenden hinstreicht, wie es gleichsam brückenartig am schwerdtförmigen Knorpel, am foramine ovali und an der incisura ischiadica hingespant sich befindet. Ferner ist es einem Wundarzte nöthig, nach Wegnahme des Bauchfelles, die kleinen, nur mit lockerem Zellstoff gefüllten, Lücken sorgfältig zu betrachten, welche zu Pforten für die, aus sackförmigen Vortreibungen des Bauchfelles nebst dem in ihm enthaltenen Eingeweide bestehenden, Brüche umgebildet werden.

Ausser dieser genauen Kenntniß des Bauchfelles ist einem Wundarzte, der diese verschiedenen Brucharten mit Verstand, Gründlichkeit und gutem Erfolge behandeln will, nothwendig, die Beschaffenheit und Wirkungen des Zwerchmuskels und der Bauchmuskeln anatomisch und physiologisch, und zwar sowohl in ihrer Gesamtwirkung als in ihrer theilweisen Wirkung, nach der Anleitung von Albinus, Winslow und Haller vollständig und genau zu kennen.

§. 29.

Um dieser Frage ferner nun im Einzelnen ein gehöriges Genüge zu leisten, wird es wohl am schicklichsten seyn, für jede der neun bis zehn im 1. §. angegebenen Stellen insbesondere, nach der Reihe nach die Schriftsteller und Abbildungen anzugeben, welche sowohl diese Stellen, als die an ihnen vorgekommenen Brüche anatomisch am richtigsten und genauesten geschildert haben.

§. 30.

Um jede Art von *Hernia diaphragmatica* genau anatomisch beurtheilen zu können, hat man einem Wundarzte nur das Studium der unvergleichlichen *Tabula XIV* von *V. S. Albinus* ¹⁾, nebst seiner genauen Beschreibung in der *Historia musculorum hominis* ²⁾ zu empfehlen. Nimmt er hiezu noch die *Tafel* von *Haller* ³⁾, welche den *Zwerchmuskel* in natürlicher Größe vorstellt, so kann es ihm gewiß nicht an der genauesten Kenntniß derjenigen Stellen fehlen, wo man *hernias diaphragmaticas* wirklich angetroffen hat. Diese Stellen nämlich sind, wie im 4ten und 5ten §. genau angegeben ist, bald der sehnige Theil, bald der fleischige Theil des *Zwerchmuskels*, seltner der *Schliß* (die *Pforte*) für den *Schlund*, oder die kleine *Lücke* (*Pforte*) für den *sympathischen Nerven*.

Eine genaue Beschreibung des *Dreiecks* am *schwerdtförmigen Knorpel*, wo gewöhnlich *Brüche* sich zeigen, giebt noch insbesondere *Varengo* ⁴⁾.

Die *Blutgefäße* des *Zwerchfellmuskels*, besonders die *Arterien*, hat *Hr. Haller* abbilden lassen ⁵⁾.

- 1) *Tabulae Sceleti et Musculorum hominis*. Lugd. Batav. 1747.
- 2) Lugd. Batav. 1734. Desgleichen *Sandifort Descriptio Musculorum hominis*. Lugd. Batav. 1881.
- 3) *Nova Icon Septi transversi*. Goettingae. 1741. sowohl im ersten *Fasciculo* seiner *Iconum*, als in den *Operibus minoribus*. Tom. I.
- 4) *Mém. de l'Acad. de Chir.* Tom. 1. Seite 705 der *Quartausgabe*.
- 5) In *Iconum anatomicarum Fasciculo tertio*, sowohl auf der *Tabula arteriarum renalium*, als der *Tabula arteriarum anteriorum pectoris*.

Ist ein Wundarzt mit diesen Beschreibungen und Abbildungen des Zwerchmuskels gehörig bekannt, so wird er bey vorkommender Leichenöffnung einer, mit der Hernia diaphragmatica behafteten, Person im Stande seyn, aufs Allergenaueste die Stelle anzugeben, wo sie sich befunden hat.

Über die exacte anatomische Kenntniß der Hernia diaphragmatica selbst geben Fothergill, Haller, Macaulny, Sandifort, Bonn und Clarke in den, schon im 5. und 6. Spheh angeführten, Schriften die beste Belehrung.

§. 31.

Jede Art sowohl von Hernia lineae albae, als ventralis und lumbalis wird ein Wundarzt aufs Trefflichste anatomisch beurtheilen; so wie aufs Gründlichste chirurgisch besorgen können, wenn er sich das Studium der Beschreibung und der Tafeln von den Muskeln, welche wir H. S. Albinus ¹⁾ verdanken, angelegen seyn läßt. Wenigstens kenne ich, nach einem Studium derselben von mehr als dreyßig Jahren, doch auch nicht das Mindeste, was nur einigermaßen verbessert oder hinzugesetzt werden könnte. Die linea alba, so wie die übrigen Sehnen und die Fleischbündel der Bauchmuskeln, sind in Ansehung ihrer Lage, ihrer absoluten und relativen Größe, Gestalt, Richtung, Verbindung, Anheftung u. s. f. mit einer Wahrheit und Genauigkeit geschildert, welche dem Wundarzte nichts zu wünschen übrig läßt. Schade, daß keine einzige unter den häufigen Copien das Original an Richtigkeit und Genauigkeit erreicht!

311

¹⁾ Am ang. Ort. Tab. I. II. III., XIII. XIV.

In Betreff der Bauchbrüche in der Nähe der Bauchringe sind, ausser Camper's ¹⁾ Tafeln, noch Heselbach ²⁾, und besonders A. Cooper's ³⁾ überaus schöne Tafel, welche sämmtlich diese Stelle in natürlicher Größe darstellen, zum Studiren zu empfehlen.

Über die relative Lage der Eingeweide zu den Bauchdecken geben Gerard's, Sandifort's ⁴⁾ und Ludwig's ⁵⁾ Tafeln von der linken Seite und von hinten Auskunft. Doch ließe sich über diesen Punkt noch manches für den Wundarzt Nützliche leisten.

Die Blutgefäße der Bauchdecken kann man aus Haller ⁶⁾, und den Ursprung der Arteria epigastrica aus Scarpa ⁷⁾ kennen lernen.

Über die Saugadern der Bauchdecken und Lenden enthält Mascagni ⁸⁾ das Nöthige.

Über die Nerven der Bauchdecken muß man sich noch immer an Eustach's ⁹⁾ Tafeln halten.

-
- 1) Icones herniarum. Francofurti. 1801. Tab. 4. 6. 10. 11, 12 und 13.
 - 2) Ueber den Ursprung der Leistenbrüche. Würzburg. 1806.
 - 3) The Anatomy of inguinal Hernia. Lond. 1804. Tab. I.
 - 4) Tabulae anatomicae. Leid. 1801. Tab. 3 und 4 exhibeas situm viscerum thoracis et abdominis.
 - 5) Icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum. Lips. 1789.
 - 6) Iconum anat. Fasc. XI. Tab. I. arteriarum pectoris. Fasc. VIII. Arteriae totius corporis.
 - 7) Sull' Aneurisma. Pavia. 1804.
 - 8) Vasorum lymphaticorum c. h. historia et ichnographia. Senis. 1787.
 - 9) Tabula 19. 20. 21 und 23.

Schreibungen und Bekant, so wird er, mit der Her-
 Person im Stand
 tungen, wo sie sich
 tntniß der Hernia
 ergill, Haller,
 und Clarke in den
 Schriften die beste.
 ia lineae al-
 balis wird ein
 durchheilen, so wie
 nimen, wenn er sich
 der Tafeln von den
) verdanken, an-
 nach einem Stu-
 ren, doch auch nicht
 verbessert oder hinzu-
 so wie die über-
 auchmuskeln, sind
 ten und relativen
 ng, Anheftung u.
 it geschildert, mel-
 übrig läßt. Schö-
 ent Copien das Dis-
 reicht!

Über die anatomische Kenntniß dieser Arten von Brüchen geben R. de Graaf, le Dran, Littre, Günz, Ranby, de la Peyronie, Bauer, Henkel, Wrißberg, Klinkosch, Siebold, Monteggia, Paignaud und Ruffel in den im 10ten und 11ten §. angeführten Schriften solche Belehrung, daß man sie darnach gar füglich von allen andern, an diesen Stellen vorkommenden Übeln, zu unterscheiden vermag.

§. 51.

Zur klaren Einsicht der Pforte und des Ganges, den eine *Hernia ischiadica* nimmt, so wie zu der darauf gebauten rationellen Behandlung dienen, in Rücksicht der Knochen und Ligamente, Weitbrecht's Fig. 51 und 52¹⁾, welche die Pforte für diese Brüche, (in so fern nämlich die Knochen und Ligamente sie gestatten), noch am richtigsten darstellen, desgleichen Creve²⁾.

Von innenher findet man diejenige Stelle, welche für die *Hernia ischiadica* zu einer Bruchpforte umgebildet wird, in natürlicher Größe trefflich abgebildet von Camper³⁾. Diese Camperische Abbildung hat Fischer⁴⁾ genau copirt. Von hinten sieht man die Stelle, oder Pforte, für den ischiadischen Bruch, in natürlicher Größe,

1) Syndesmologia. Petropoli. 1742.

2) Vom Baue des weiblichen Beckens. Leipzig. 1794.

3) Demonstrationes anat. patholog. Lib. II. Tab. I. Fig. 2. Nro. 21. 22.

4) Descriptio anatomica Nervorum lumbalium etc. cum tabulis. Lips. 1791. Tab. I. fig. 1.

bey Monro 2); kleiner, aber vortrefflicher, bey Albini 3).

Der Gang, welchen diese Hernia ischiadica zwischen den Muskeln des Beckens und des Schenkels nach aussen zu nimmt, (nämlich zwischen dem m. pyriformis und den gemellis unter den glutaeis,) läßt sich aus Albinus Tafeln am richtigsten abnehmen.

Die Arterien dieser Stelle hat Haller 3) abgebildet und ausführlich beschrieben.

Zur exacten anatomischen Kenntniß der Hernia ischiadica selbst, geben Pagen, Camper und Bosc in den im 16. J. angeführten Schriften so gründliche Belehrung, daß man dadurch die Hernias dieser Stelle von allen andern, an ihr vorkommenden, Übeln gar leicht unterscheiden lernt.

§. 32.

Die im natürlichen Zustande kleine Stelle, wo eine Hernia foraminis ovalis sich zu bilden anfängt, hat Günz so genau und meisterhaft anatomisch beschrieben, daß, sobald man Camper's 4) von Fischern wacker copirte Abbildung dazu nimmt, man über die Pforte dieser Art von Brüchen, den klarsten und bestimmtesten sinnlichen Begriff erhält.

- 1) Description of all the Bursae mucosae in the human Body. Edinburgh, 1788. Tab. V. die Lücke zwischen H und L.
- 2) Tabulae musculorum. Tab. VI. v. ∞. oder zwischen a. n. und d.
- 3) Iconum Fasciculo 4. Tab. 3 et 4. Arteriarum pelvis.
- 4) Demonst. anat. patholog. Lib. 2. Tab. 1. Fig. 1.

dieser Arten von ...
 in, Pittre, Günz,
 Bauer, Henkel,
 d, Monteggia,
 in roten und roten S,
 ng, daß man sie das
 in diesen Stellen vor
 vermag.

des Ganges, den
 , so wie zu der dar-
 enen, in Rücksicht
 eht's Fig. 51 und
 e, (in so fern näm-
 statten), noch am
 ere 2).

Stelle, welche für
 forste umgebildet
 gebildet von Cam-
 ng hat Fischer 4)
 die Stelle, oder
 natürlicher Größe,

3. Leipzig. 1794.
 ib. II. Tab. I. Fig. 1.

umbilium etc. com

In Rücksicht der Knochen und Bänder ist Weitbrecht's ¹⁾ Beschreibung musterhaft; auch sind seine Figuren 52 und 53 ganz brauchbar, ungeachtet sie wohl durch eine genauere Zeichnung und schöneren Stich übertroffen werden könnten. Von Creve ²⁾ ist schon Einiges verbessert dargestellt worden.

Die Arterien dieser Stelle hat Haller ³⁾ abbilden lassen. Doch verdient die Anmerkung von Thomson ⁴⁾, daß nämlich in sechs Fällen unter zehn, die Arteria obturatoria den Schenkelbruch kranzartig umgibt, eine eigene Erwähnung.

Den Weg oder Gang, welchen eine Hernia ovalaris beym Fortschreiten, zwischen den Muskeln des Schenkels, bis zum Erscheinen unter der Haut, nimmt, kann man am deutlichsten und richtigsten aus Albinus Tafeln abnehmen. Der Bruchsack nämlich dringt allmählig mit dem in ihm Enthalteneu, über dem musculus obturatorius externus, adductor magnus und brevis, unter dem m. pectineo und adductore longo so lange vor, bis er zwischen dem adductore longo und gracili unter der Haut erscheint.

- 1) Syndesmologia.
- 2) Vom Baue des weiblichen Beckens. Tab. VI und VII.
- 3) Icon. anat. im vierten Fascikel. Tab. 1. im männlichen, Tab. 2. im weiblichen Becken. Der Verlauf der Arteria obturatoria ist im fünften Fascikel Tab. 2. zu finden.
- 4) In A. Monro's on crural Hernia. Edinburgh. 1803.

Auch Schmidts ¹⁾ Abbildung in fast natürlicher Größe dient ebenfalls zur Erläuterung dieses Umstandes.

Über die exacte anatomische Kenntniß der Hernia ovalaris selbst geben Camper, Klinkosch, Eschenbach, Heuermann und Lentin, in den im 19. S. angeführten Stellen hinreichende Belehrung.

§. 33.

Zur Erlangung anatomischer Vorkenntnisse um die Hernias perinaei gehörig zu beurtheilen, hat in Rücksicht des männlichen Geschlechts Camper ²⁾ Alles geleistet, was nur ein gründlicher Wundarzte zu wissen nöthig haben möchte. Wer Camper's äußerst zweckmäßig eingerichteten Abbildungen auch nur einmal ordentlich in der Natur nacharbeitet, kann sich dadurch wahrlich über diese Bruchart die deutlichsten Begriffe für immer verschaffen. Auch Langenbeck's ³⁾, so wie auch Hase's ⁴⁾ farbige Darstellung des männlichen Perinäums verdienten alles Lob.

Es wäre zu wünschen, daß wir auch über das weibliche Perinäum so ganz zum chirurgischen Gebrauche geeignete Abbildungen besäßen. Santorini's ⁵⁾ Abbildung

1) Commentarius de nervis lumbalibus etc. Vindobonae. 1794. Tab. II. Die Stelle, wo eine H. foraminia ovalis vordringen könnte, fällt hier zwischen 78 und 79.

2) Demonstrat. anat. patholog. Lib. I. Tab. I.

3) Ueber eine einfache Methode des Steinschnitts. Würzburg. 1802.

4) De glandulis Cowperi mucosis. Lips. 1803.

5) Tabulae septendecim editae a M. Girardi. Parmae. 1775. Tab. XVII.

Händer ist Weite
auch sind seine Fl
achtet sie wech durch
en Reich übertrafen
chen Einiges vorbe
hat Haller's ab
erkung von Thoma
unter zehn, die Ar
kranzartig umgeb
Hernia ovalaris
in des Schenkels
ummt, kann man
i nus Lufte ab
allmählig mit dem
obturatoriis
is, unter dem
vor, bis er
acilli unter der
b. VI und VII.
o. 1. im männli
Der Verlauf der
Kette Tab. 2. 10
diaburgh. 1805.

ist, in Ansehung der Muskeln dieser Stelle, empfehlungs-
würdig.

Das Nervengeflechte des weiblichen Perinäums von
der rechten Seite hat Walter ¹⁾ treu und deutlich darge-
stellt.

Zur anatomischen Kenntniß der Hernia perinaei
selbst dienen besonders Chardeon und Schneider in
den im 21. §. angeführten Stellen.

§. 34.

Was die Hernia vaginalis anbetrifft, so ist die, zu
ihrer gehörigen Beurtheilung erforderliche, Vorkenntniß
sehr einfach, und auf die leicht zu erwerbende, deutliche
anatomische Einsicht der Mutterscheide beschränkt. Die
Dicke, die Größe, innere Oberfläche, den Zusammenhang
mit dem Uterus, und die Blutgefäße der Scheide im Nor-
malzustande stellt unvergleichlich, mit der größten Ge-
nauigkeit, in natürlicher Größe, Böhmer ²⁾ vor, die
relative Lage und Richtung der Scheide in natürlicher
Größe, nebst ihren deutlich ausgearbeiteten Nerven, bildet
Walter ³⁾ ab.

Hunold's ⁴⁾ Abbildung eines Proffsburchschnittes
des weiblichen Beckens scheint doch zu klein. Ihre vollstän-

1) Tabulae nervorum thoracis et abdominis. Berolini.
1785. Tab. I.

2) Observationum anatomicarum rariorum Fasciculo I.
Tab. 1. Fasc. II. Tab. 7. Halae 1752 et 1756.

3) Tabulae nervorum thoracis et abdominis. Tab. I.

4) Diss. de Pessariis. Marburgi. 1790.

digste Beschreibung bleibt noch immer die Hallerische¹⁾.

Charles Bell²⁾ suchte die Veränderung der Lage der Harnblase und der Därme bey einem Muttervorfalle durch eine Zeichnung zu versinnlichen.

Zur Erlangung einer exacten anatomischen Kenntniß der *Hernia vaginalis* dienen vorzüglich Beyer's, Nuyssch's, Duverney's, Ant. de Haen's, Sandifort's und Walter's, zum Theil mit Abbildungen versehene, Beschreibungen der im 22. §. schon angeführten Fälle.

Eine treffliche Erklärung über die Entstehung der *Hernia vaginalis* giebt auch Richter³⁾.

Im 27. §. habe ich überdies noch eigens die Unterscheidungszeichen einer *Hernia vaginalis* von anderen, die Scheide betreffenden, Übeln kürzlich geschildert.

§. 55.

Endlich was die exacte anatomische Kenntniß, in Rücksicht der *Hernia uterina*, anbetrifft, so kann ein Wundarzt, welcher keine Gelegenheit hatte einen schwangeren Uterus in der Natur selbst frisch, oder im Weingeiste in einer Präparatensammlung zu betrachten, sich dennoch eine deutliche Vorstellung davon verschaffen, wenn er die köstlichen Abbildungen des, durch die Schwangerschaft ausgedehnten und vergrößerten, Uterus entweder bey Al-

-
- 1) *Elementorum physiologiae Tomo septimo.*
 - 2) *The Anatomy of the human Body. Vol. IV. in der deutschen Uebersetzung Theil 2. Tab. 27.*
 - 3) *Richter von Brüchen. Seite 708.*

binus ¹⁾, oder Smellie ²⁾, Röderer ³⁾, oder Hunter ⁴⁾ aufmerksam betrachtet, und sich dabey vorstellt, was erfolgen muß, wenn sich ein ansehnlicher Sack umwendet. Es wird ihm deutlich einleuchten, daß ein solcher, mit einer so ansehnlichen Mündung gegen die Bauchhöhle hin offenstehender, Sack oder Tasche gar leicht die gegen ihn hinabsinkenden Därme bruchfackartig aufzunehmen vermag. Auch wird ihm eben der Umstand, daß nur ein solcher, durch ein Kind, durch Blut, oder durch eine Geschwulst vorgängig stark ausgebehnt gewesener Uterus, sich umwenden oder umstülpen kann, hinreichend seyn, um eine Hernia uterina von allen andern Übeln an dieser Stelle zu unterscheiden.

Ich beschließe dieses Hauptstück mit den Worten von Astley Cooper ⁵⁾, welchem wir die neueste reelle Bereicherung in der Lehre von den Brüchen verdanken: No disease of the human body, requires in its treatment a greater combination of accurate anatomical knowledge, with surgical skill, than hernia in all its varieties. Symptoms, immediately threatening the extinction of life, occur at times, and in situations, that afford but little opportunity for consulting the authority of others, and demand in the

- 1) Tabulae VII. Uteri mulieris gravidae, cum jam parturiret, mortuae. Lugd. Batav. 1748. Fol.
- 2) A set of anatomical Tables with Explanations. London. 1754. Fol.
- 3) Icones uteri humani. Goettingae. 1759. Fol.
- 4) Anatomie uteri gravidi humani. Londini. 1774. Fol.
- 5) In der Vorrede des oft angeführten Werkes: The Anatomy of Hernia. London. 1804. Fol.

Drittes Hauptstück.

Lesquelles de ces descentes demandent un traitement chirurgical, pour être guéries, et lesquelles n'en sont point susceptibles, mais exigent seulement d'être soutenues et retenues?

§. 36.

Die Beantwortung dieses dritten Punktes der Preisfrage läßt sich sehr kurz fassen, weil in einer genügenden Beantwortung des ersten und zweyten Fragpunktes die Beantwortung dieses dritten Punktes größtentheils schon mit enthalten seyn möchte.

Weiß man nämlich mit Zuverlässigkeit, welche, den Namen Hernia verdienende, Vortreibungen der Eingeweide wirklich existiren, und kennt man anatomisch genau sowohl die Beschaffenheit der Stellen (endroits), wo sie vorkommen, als auch die von bewährten Schriftstellern beschriebene Beschaffenheit dieser Brüche selbst, so gründlich, daß man diese Hernias von allen anderen, an diesen Stellen vorkommenden, Übeln zu unterscheiden vermag; Kennt man ferner die Art, wie die größten Meister in der Kunst diese Brüche behandelten, so wird man auch sowohl durch die Erfahrung, als durch den Verstand, mit beruhigender Gewißheit bestimmen können, welche von diesen Brüchen, bey einer verständigen chirurgischen Besorgung, eine radicale Heilung hoffen lassen, und welche eine bloß palliative Unterstützung annehmen.

§. 37. Bey den Herniis diaphragmaticis also, sie mögen angeboren oder erworben seyn, läßt sich wohl um so weniger an eine eigentliche chirurgische Hülfsleistung denken, als sie im Leben selten erkannt werden und falls sie auch erkannt würden, wie St. Andre (6. S.) dies von sich rühmt, dennoch davon kaum viel zu erwarten stünde.

Fast Alles nämlich, was sich bey einer Hernia diaphragmatica thun und rathen läßt, beschränkt sich, wie ich im folgenden Abschnitte im 41. S. zeige, auf ein bloß negatives Verhalten, in dem schwerlich hier ein positives, werththätiges Verhalten eintreten kann.

§. 38.

Da eine Hernia, die sich in ein Löchelchen des Schambeins begiebt und einklemmt, unmöglich im Leben errathen werden kann; (es müßte denn seyn, daß durch caries ein Knochenstück versoren gegangen wäre); so ist auch hier an keine chirurgische Hülfsleistung zu denken.

§. 39.

Alle übrigen acht Brucharten, von denen in der Beantwortung die Rede ist, nämlich:

- jede Hernia lineae albae,
- ventralis,
- lumbalis,
- ischiadica,
- ovalaris,
- perinaei,
- vaginalis und
- uterina,

st ü d.
demandent un
re gueries, et
ceptibles, mais
et retenues?

unktes der Prei
mer genügenden
punktes die Be
theils schon mit

k, welche, den
gen der Eing
atomisch genau
roits), wo sie
chriftsteller be
so gründlich,
in diesen Stel
bermag; Fernit
r in der Kunst
th sowohl durch
mit beruhigender
diesen Brüchen,
ang, eine rati
kles palliative

erfordern eine chirurgische Hülfsleistung, um, wenn auch nicht allemal gerade radikal geheilt, doch möglichst unterstützt, und dadurch wenigstens erträglich gemacht zu werden.

Dem fast von allen diesen Brucharten, falls sie nur nicht zu alt oder zu groß waren, hat man mitunter Beispiele einer gründlichen, ja sogar vollkommenen und dauerhaften Heilung, wie schon bey Beantwortung des ersten Fraggpunktes gelegentlich angeführt worden ist, und noch näher im folgenden Hauptstücke sich zeigen wird.

Sind hingegen diese Brüche zu alt und zu groß, so gilt freylich im Allgemeinen von einigen unter unter ihnen, Camper's ¹⁾ über die Hernias perinaei und vaginales gethaner Ausspruch: *Herniae intra vaginam in feminis prolabentes, quales aliquot vidi, nullam curationem admittunt, caveat modo medicus, ne vel prolapsum vaginae uterive herniam perinaei vel polypum esse credat. Spongia aliquando eas retinui pro tempore. De exitu vero minus judicare potui, quoniam feminae propter pudicitiam, praesertim si medela adhibita commoda non est, raro redeunt. Perinaei hernia similiter medicinam non admittit.*

1) *Dissertatio de optima agendi vel exspectandi in medicina ratione. 1776. in den Dissertationibus decem, die Herbell 1800 zu Lingen herausgegeben. Vol. 2.*

Viertes Hauptstück.

Quels manuels, opérations, remèdes, instrumens et bandages conviennent dans ces différens cas et selon les circonstances; et quels préceptes de l'art et observations convaincantes peuvent éclairer la conduite du Chirurgien, pendant le traitement de chacune de ces hernies?

§. 40.

Bei der Beantwortung des vierten und letzten Fragpunktes befolge ich, so wie bey den vorhergehenden, die im ersten Sphen angenommene Ordnung der verschiedenen Brüche.

Die Idee, welche mich eigentlich bey dieser Anordnung leitete, war folgende: Indem ich nämlich die Betrachtung der Bauchstellen, denen (außer den Inguinal-, Crural- und Umbilicalbrüchen), das Bauchfell zum Bruchsaacke dient von oben, oder von dem Zwerchmus'el (h. diaphragmatica) anfangs, gehe ich sodann in der Mitte (h. lineae albae), drauf zu beiden Seiten (h. ventralis) und rückwärts (lumbalis) am Bauche hinab, um ihnen nun noch tiefer, sowohl hinten (h. ischiadica), als vornen (h. ovalaris), und endlich zu unterst im Becken, das ist im Mittelfleische (h. perinaei), in beiden Geschlechtern

nachzuspüren. Nachdem diese Brüche betrachtet worden, lasse ich sodann noch die beiden, bloß dem weiblichen Geschlechte eigenen Brucharten (h. vaginales und uterinas), folgen.

Behandlung der Hernia diaphragmatica.

§. 41.

Gesezt, man vermuthete eine Hernia diaphragmatica aus irgend einer Ursache, so wäre einem solchen Patienten vor allen Dingen lockere, die ohnehin stets pralle Bauchhöhle auf keine Weise von aussen her beengende oder zusammenschnürende, Kleidung zu empfehlen. Männer müßten in diesem Falle alle knappe Westen, enge Ober Röcke, hohe Hosen, selbst die jetzt modischen Hosenhalter, jede Art von Gürtel, Leibbinden und Schärpen vermeiden. Frauen dürfen in solch einem Falle keine eigentlichen Röcke, keine Leibchen (Corsets) und Nieder, am wenigsten Schnürbrüste, welche die unteren Rippen fassen, anlegen.

Ein jedes von diesen Kleidungsstücken nämlich, welches die Bauchhöhle mechanisch beengt, preßt und treibt die Eingeweide derselben, besonders zunächst den Magen, durch die Bruchpforte oder den im Zwerchmuskel befindlichen, Schlitze gegen oder selbst in die Brusthöhle hinauf, und vergrößert eben dadurch den Bruch.

Der Patient muß alles starke Bücken, alles Sitzen mit stark vorwärts eingebogenem Unterleibe möglichst vermeiden, weil solches die Eingeweide des Unterleibs, durch Beengung der Bauchhöhle, gegen den Zwerchmuskel (Diaphragma) hinauftreibt.

Aus gleichem Grunde muß er alle Leibesbewegungen vermeiden, wobey die Bauchmuskeln in heftige Action ge-

rathen, auch die Eingeweide im Unterleibe gleichsam anpressen, und solche gegen das Diaphragma hinaufpressen.

Mäßige Übung der Lungen im Sprechen oder in möglichem Singen können nicht schaden. Starkes Lachen und Niesen hingegen könnte sehr gefährlich werden.

Besonders wäre einem solchen Kranken noch der Aufenthalt in einer gesunden Luft zu empfehlen, damit die Lungen, vorzüglich die linke, durch Erhaltung ihres gehörigen Tonus, sich den, gegen sie durch die Bruchpforte im Zwerchmuskel andringenden, Eingeweiden kräftig genug zu widersetzen vermögen.

Da ferner gemeinlich der Magen in einer Hernia diaphragmatica begriffen ist, so muß man den Patienten alle blähende, unverdauliche, stopfende, den Leib anhaltende Speisen vermeiden lassen. Übrigens kann der Patient sich in diesem Stücke am besten nach seiner eigenen Empfindung richten, ob ihm nämlich besser zu Muthe ist, wenn sein Magen gefüllt, oder wenn er leer ist.

Besonders muß noch auf regelmäßige und leichte Leibesöffnung gesehen, und alle Hartleibigkeit sorgfältigst vermieden werden, weil alles Drücken und Zwängen beym Stuhlgange höchst schädlich wäre.

Endlich braucht es wohl kaum mehr als einer Erwähnung, daß man bey dem leisesten Verdachte einer Hernia diaphragmatica, selbst bey den dringendsten Indicationen, kein Brechmittel reichen dürfe. Es würde wahrlich unverantwortlich gewagt seyn, den Magen, unter solchen Umständen, alle Gewalt der Bauchmuskeln, welche bekanntlich beym Brechen convulsivisch heftig auf ihn wirken, erfahren zu lassen, und ihn (den Magen) dadurch gleichsam

betrachtet werden,
dem weiblichen Ge-
tes und uterinas),

phragmatica.

nia diaphragma-

einem solchen Pa-

hnen stets praede-

her beengende oder

schien. Männer

en, enge Overten,

en Hosenthalter,

irren vermeiden,

eigentlichen Hüft-

t, am wenigsten

fassen, anlegen.

nämlich, wel-

preßt und treibt

ist den Magen,

muskel befindli-

isthöhle hinauf-

, alles Eitzen

be möglichst ver-

Unterleibs, durch

erchmuskel (Dia-

Leibesbewegungen

heftige Action ge-

vorsehtlich in die Brusthöhle hinein zu zwängen, ja selbst einer Einklemmung auszusetzen.

Behandlung der Hernia lineae albae und ventralis.

S. 42.

Die Brüche der linea alba lassen sich mit den übrigen Brüchen des Bauches auf eine ziemlich gleiche Art behandeln.

Beide Arten nämlich erfordern, ausser der bey allen Brüchen einzurichtenden Lebensordnung, im Allgemeinen, nach der Zurückbringung der vorgebrängten Theile, eine mit einem Polsterchen (Pelotte) versehene Binde (Bandage).

Es ist bereits eben bemerkt worden, daß kleine Bauchbrüche, das ist, solche, welche nicht das ganze Rohr eines Darmes, sondern nur einen Theil desselben einkneipen, oft schwer entdeckt werden, wenn große gar leicht ins Auge fallen, und daß man, um diese kleinen Brüche zu entdecken, den Patienten stehend untersuchen müsse, weil sie sich beim Liegen im Bette gerne in die Bauchhöhle zurückziehen. *Arnau*d will alsdann sogar einen Bauchbruch von der Größe eines Kirchenkerns entdeckt haben; welches doch wohl nur bey sehr mageren, zarthäutigen Personen möglich seyn möchte.

Hat man also einen Bauchbruch zu behandeln, so bemühe man sich, ihn durch die sogenannte *Laxis* zurückzubringen. Zur Erreichung dieses Zweckes sucht man sämtliche Bauchmuskeln, besonders die Stelle des Bruchs, (die eigentliche Bruchpforte), möglichst zu erschlaffen; welches durch

burch ein mäßiges Einwärtsbeugen des Unterleibs im Liegen auf dem Rücken geschieht. Am bequemsten ist hiezu die Lage des Patienten im Bette, so daß er unter dem Haupte und den Schultern ein Kissen liegen hat, und daß die aufgestellten Beine mit den Kniegelenken einen spitzen Winkel bilden. Auf diese Art wird der Unterleib einwärts gebogen, ohne daß dazu die Bauchmuskeln mitwirken, welche folglich auch erschlafft und nachgiebig weich bleiben.

Gewöhnlich begeben sich daher auch solche Brüche schon von selbst bey dem Liegen auf dem Rücken in die Bauchhöhle zurück.

Ist der Magen im Bruche begriffen; so zieht er sich meistens, wenn er bey der Anfüllung glatt und prall wird, aus der Bruchpforte zurück, wenn er im leeren Zustande wieder vorfällt. Man benutze also diesen Zeitpunkt zur Anlegung des Bruchbandes.

Ist ein Stück davon im Bruche begriffen, so sieht und fühlt man nicht nur das Verschwinden der Bruchgeschwulst, sondern man hört auch meistens im Momente des Rücktretens kollern oder gluchsen.

Ist aber ein Stück Netz im Bruche begriffen, so nimmt man blos durchs Gefühl und Gesicht das Zurückweichen desselben wahr.

Befindet sich also der Patient in einer zur Zurückbringung des Bauchbruches bequemen Lage auf dem Rücken, so drückt und streicht man mit der flachen Hand den Bruch in verschiedenen Richtungen, meistens schräg aufwärts, weil gemeiniglich in der entgegengesetzten Richtung, nämlich schräg abwärts, die Eingeweide in den Bruchsack zu gerathen pflegen. Auch kann man die Hand gleichsam im Kreise reibend und drückend auf dem Bruche herumführen.

Die meisten Wundärzte, z. B. Arnaud, Heister, Galadon, Gilibert, Hoin, Garengoet, Pipelet, Günz, Chislett, Laffus, le Maire, Henskel, Siebold und Richerand, welche Bauchbrüche selbst behandelten, bezeugen an den im 10ten und 11ten S. genau angegebenen Stellen, daß die Zurückbringung der Bauchbrüche gewöhnlich ohne Schwierigkeit erfolgt. Das Gleiche fand ich in den mir vorgekommenen Fällen.

Hat man den Bruch gehörig zurückgebracht, so applicirt man, im Wegziehen der linken Hand, womit man die Bruchspalte bedeckt oder gleichsam zugeschlossen hält, sogleich mit der rechten Hand die Pelotte des Bruchbandes auf diese Bruchspalte.

Die schicklichsten und besten Bruchbänder für Bauchbrüche bestehen aus einem, wenigstens vier Zoll breiten, mit Schnallen versehenen, Gurte aus Barchent (Calicot) auf dem sich die Pelotte befestiget befindet.

Die Größe und die Gestalt der Pelotte läßt sich so wenig im Allgemeinen genau bestimmen, als die Breite des Gurtes. Die Pelotte muß der Größe des Bruches, und der Gurt dem Umfange des Bauches des Patienten eigens angepaßt werden. Die Pelotte muß etwas größer, und der Gurt ein bis zwei Zoll breiter, als die Bruchspalte selbst gemacht werden.

Gewöhnlich sind die Bauchbrüche aller Art eiförmig, so daß ihr längerer Durchmesser der senkrechte, der kürzere der querliegende ist. Demgemäß muß man die Gestalt der Pelotte eiförmig, doch bald rundlicher, bald länglicher, einrichten. Diese Pelotte braucht übrigens nicht hoch oder dick zu seyn; bey mageren Personen von mittlerer Größe ist ein rheinländischer Zoll Höhe für die Pelotte mehr als hin-

reichend. Bey fetten Personen richtet man sich mit der Höhe oder Dicke der Pelotte nach der Menge des Fettes der Bauchdecken. Überhaupt muß sie desto höher oder gewölbter seyn, je tiefer sich die eigentliche Bruchpforte befindet. Diese Pelotte kann man mit der Abnahme des Bruches allmählig gradweise flacher machen. In manchen Fällen wird man sogar ohne Pelotte mit bloßen Compressen auslangen.

Doch habe ich mich nie bloß auf einen solchen Gurt verlassen, sondern jederzeit ein eigenes, überall sich an den Bauch gehörig anschmiegendes, ihn aber auf keine Weise gewaltsam zusammenschnürendes, ledernes Leibchen anlegen lassen, welches gleichsam die Stelle einer, im Allgemeinen die Bauchdecken unterstützenden, Bandage vertritt. Das beste Leder hiezu scheint mir Gamsenleder oder Kehlleder, und, falls die Person sehr robust und wohlbeleibt ist, Hirschleder oder Elendleder.

Ein solches ledernes Leibchen, oder auch eine Art Corset lacé, ist vorzüglich bey den breiten im 14ten S. angeführten Bauchbrüchen zu empfehlen, weil es gleichsam am besten zur Wiederherstellung der allgemeinen Form des Bruches, und zur Unterstützung der gesammten Bauchmuskeln beyträgt. Nur muß es auf keine Weise den Thorax und die kurzen Rippen zusammenpressen. In wenigen Tagen schmiegt sich ein solches ledernes Leibchen unvergleichlich an, besonders wenn man es das erstemal etwas angefeuchtet anlegte. Man kann auch auf der Stelle des Leibchens, welche gerade auf die Bruchstelle zu liegen kommt, das Leder verdoppeln, oder gleich anfangs die allerdickste Stelle des Leders für diesen Platz aussuchen lassen, damit

sich die dickste Stelle des Leders gleichsam verloren auf der Bruchpforte befinde.

Elastische, oder mit Stahlfedern oder mit spiralförmig gewundenem Drahte versehene, Gürtel hat man in der That zur Zurückhaltung dieser Bauchbrüche, so weit meine Erfahrung reicht, eben nicht nöthig.

Finden sich zu gleicher Zeit mehrere Brüche, und man hat, wie ich bereits im 13ten §. anführte, nicht nur zwey, sondern drey ja bis vier Bauchbrüche zu gleicher Zeit wahrgenommen, so bleibt doch wahrlich in diesen verzweifeltsten Fällen nichts Anderes, als ein solches Leibchen anzuwenden, übrig.

Überhaupt ist es sehr merkwürdig, daß bisweilen mehrere Brüche zu gleicher Zeit Statt finden. So sah A. Cooper sechs Inguinalbrüche, drey auf jeder Seite, zu gleicher Zeit Statt haben, deren Pforten er auch unvergleichlich abbildet ¹⁾. Gemeiniglich sucht man dieses durch eine Schwäche des Bauchfelles zu erklären. Allein mir scheint es mehr in einer Schwäche der gesammten Bauchdecken, vorzüglich der Muskelfasern und Sehnenfasern, als in einer Schwäche des bloßen Bauchfells gesucht werden zu müssen. So merkt A. Cooper ²⁾ sehr richtig an, daß mehrentheils Verengungen (Stricturen) in der Harnröhre zu so vielen Inguinalbrüchen disponiren. Eine allgemeine Schwäche der Bauchmuskeln scheint mir daher auch Statt zu finden, wenn mehrere Bauchbrüche zu gleicher Zeit sich zeigen. Folglich ist es auch wohl in diesen

1) The Anatomy of Hernia. Plate X.

2) Ebendasselbst. Chap. VI.

Fällen am gerathensten, durch ein solches ledernes Leibchen, welches gleichsam die Stelle einer allgemeinen, aufs genaueste anliegenden, Binde vertritt, auch alle Muskel- und Sehnenfasern der Bauchdecken insgesammt zu gleicher Zeit im Allgemeinen zu unterstützen, bis sie ihren gehörigen Tonus wieder erlangt haben. Denn ich müßte mich sehr irren, wenn ich nicht mehreremale eine solche Schwäche der Bauchmuskeln und Bauchdecken bloß temporär getroffen haben sollte. Wenigstens sind mir Fälle vorgekommen, wo sich bey den, mit Brüchen behafteten, Personen eine solche Weichheit in den Bauchdecken verrieth, daß sie mir in dieser Periode ganz vorzüglich zu Brüchen geneigt schienen. Manche unter diesen schienen einige Zeit drauf auffallend mehrere Elasticität ihrer Bauchdecken wieder erhalten zu haben. Sehr erinnerlich sind mir unter andern ein Paar auffallende Beyspiele von jungen Männern, bey welchen, mit wiederkehrender Elasticität (tonus) ihrer Bauchdecken, sich Inguinalbrüche bey dem Gebrauch von Bruchbändern so vollkommen, (ich kann wohl hinzusetzen): so leicht, verloren, daß sie keine Spur ihres ehemaligen Daseyns zurück ließen.

Gegen das Treccourti'sche Bruchband, welches mittelst zweyer Pelotten die Ränder der Bruchpforte zusammenschieben, verengen und schließen soll, hat Richter das Nöthige erinnert. Es ließe sich noch hinzufügen, daß schlechterdings ein solches Bruchband nie seinen eigentlichen Zweck erreichen könne; nicht nur weil es die wahre eigentliche Bruchpforte, welche sich am tiefsten befindet, unmöglich zu fassen vermag, sondern auch weil, falls es möglich wäre die Ränder der eigentlichen Bruchpforte zu fassen, diese Ränder der Pforte durch das Zusammenhalten, (eigentlich durch

Zusammenkneipen), nur geschwächt werden würden; wodurch die Bruchpforte sich nur um so leichter vergrößern könnte ¹⁾.

Glücklicher Weise bezeugen bey weitem die meisten Schriftsteller, daß sich Bauchbrüche aller Art, so wie leicht zurückbringen, also auch ganz gut zurückhalten lassen.

Ungeachtet ein solches oben beschriebenes ledernes Leisten, oder ein sonst gutes Bruchband die Hauptsache bey der Behandlung der Bauchbrüche ausmacht; so wird sich doch ein gründlich verfahren der Wundarzt nicht blos auf den Gebrauch desselben beschränken, sondern zugleich noch andere Mittel anwenden, um, wo möglich, eine radikale Heilung zu bewirken. Und oft genug hatte man schon das Vergnügen dieses zu erleben.

Vor allen Dingen ist ein ruhiges Verhalten zu empfehlen, Vermeidung aller heftigen, gewaltsamen Leibesanstrengung, besonders Vermeidung des starken Streckens des Unterleibes.

Wie viel ein ruhiges Verhalten, so wie zur vollkommenen Heilung der Brüche überhaupt, also auch zur Heilung der Bauchbrüche insbesondere vermag, hat ein praktischer Arzt tagtäglich Gelegenheit zu erfahren, so wie dieses auch mehrere Schriftsteller ganz ausdrücklich bezeugen. Schon *Fabricius von Hilden* ²⁾ sah bey einem Greise, einen alten Bruch blos allein durch das zufällige Liegen im Bette vergehen. *Za Pfann* ³⁾ sah sogar durch ein zweymonatliches Liegen im Bette einen Leistenbruch vollkommen ver-

1) Von Brüchen. Kap. 34. S. 609.

2) Observationum Centuria Vta.

3) De Enterooscheocele antiqua etc. Erlangae. 1745. im

schwinden. Das Gleiche bezeugen Riverius ¹⁾, Solingen ²⁾, Sharp ³⁾ u. m. a.

Daß enge Kleider, besonders jede Art von Schnürbrüsten, durchaus vermieden werden müssen, bedarf wohl keine eigene Erörterung. Denn indem diese Maschinen den Thorax zusammendrücken und beträchtlich verengen, treiben sie die Eingeweide des Unterleibs gewaltsam hervor, und verursachen sogar Bauchbrüche, wenn noch keine vorhanden waren.

Das sogenannte englische Kreuz, wodurch die Schulterblätter rückwärts zusammengezogen werden, ist in dieser Rücksicht sehr gefährlich, und muß deshalb sogleich weggelassen werden; da wir wissen, daß Garengeot unter andern den Fall sah, wo bey einem jungen Menschen ein Bruch in der weißen Linie plötzlich entstand, als er bey dem Tanzen die Arme heftig rückwärts zog.

Die Diät des Patienten muß gehörig angeordnet, und ihm die Vermeidung sowohl blähender, als Hartleibigkeit verursachender, Speisen angerathen werden.

Daß bey einem Bauchbruche kein Brechmittel gereicht werden dürfe, ist wohl sehr begreiflich.

Einklemmung hat man bloß bis jetzt an den Brüchen in der weißen Linie beobachtet, die übrigen Bauchbrüche klemmen sich wohl, wegen der Weichheit und Nachgiebig-

Prooemio in Haller's Selectus Diss. chirurg. Tomo 3. pag. 126.

- 1) Observationes med. 1646.
- 2) Manuele Operation der Chirurgie. Amst. 1684.
- 3) Inquiry into the present state of Surgery. London. 1750.



keit der Bruchpforte, nicht leicht ein. Selbst Richterⁿ) ist davon kein Fall bekannt. Sollte es indessen doch zur Einklemmung kommen; so wird sie sich wohl durch die Laxis, bey der Lage des Patienten auf dem Rücken, Tabaks-Flüstire, Auflegen von Eis u. s. f. heben lassen.

Wird endlich eine Operation, z. B. bey kleinen Bauchbrüchen, nothwendig, so öffne man behutsam die Bauchdecken, ohne den Bruchsack selbst einzuschneiden, und suche, erforderlichen Falls, die Bruchpforte mit den Fingern oder vermittelst des Arnaudischen oder le Blanc'schen²⁾ Hakens zu erweitern, drücke demnächst den uneröffneten Bruchsack mit dem, was er enthält, in die Bauchhöhle zurück. Der Verband geschieht ganz einfach. Man bringt die Ränder der Wunde durch Heftpflaster zusammen, bedeckt sie mit Compressen, und befestigt Alles mit einer allgemeinen Leibbinde.

Übrigens muß man sich erinnern, daß Bauchbrüche bisweilen ohne einen, vom Bauchfelle gebildeten, sogenannten Bruchsack erscheinen, (Paignaud, Monteggia,) besonders diejenigen, welche nach geheilten, tief oder gar penetrirend gewesenem, Wunden der Bauchdecken entstehen.

Auf diese Art operirten unter andern Navaton und Terras solche Bauchbrüche mit glücklichstem Erfolge.

Le Dran und Fielix heilten Bauchbrüche, welche sogar schon in Eiterung gerathen waren.

Ausser der Verletzung der Arteria epigastrica haben

- 1) Von Brüchen. S. 611.
- 2) Kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen a. dem Franz. v. Ch. F. Ludwig. B. II. Leipzig. 1783. S. 121. Platte I. Ludwig nennt dieses Instrument Aufsperrer der Bruchöffnung.

die Verletzungen der übrigen Bauchdecken-Arterien wohl wenig zu bedeuten. Die wahre Lage der Arteria epigastrica, mit Berücksichtigung ihrer Vermeidung bey der Operation der Inguinalbrüche, hat Camper ¹⁾ wahr und deutlich auf der X. XI. und XII. Tafel in natürlicher Größe dargestellt.

Behandlung des Lendenbruchs.

§. 43.

Der eigentliche Lendenbruch, *Hernia lumbalis*, wird wohl am besten, nach gehöriger Zurückdrückung des Vorgeprägten, mittelst graduirter Compressen, einer Binde oder eines ledernen, sich wohl anschmiegenden Leibschens, zurückgehalten. Auf diese Art heilte Brun in dem oben (§. 15.) angeführten Falle einen solchen Bruch glücklich. Noch sind aber überhaupt die Beobachtungen über Lendenbrüche in zu geringer Anzahl und zu unvollständig, als daß man etwas Näheres über die Behandlung derselben bestimmen könnte. Sollte z. B. eine Niere vorgeprägt scheinen; so würde man besonders auf diesen Umstand, nebenher auch mit innerlichen Mitteln, Rücksicht nehmen müssen.

Behandlung der *Hernia ischiadica*.

§. 44.

Da wir den Fall von der glücklichen Heilung eines solchen Bruches, und zwar auf die allereinfachste Art, von einem so zuverlässig scheinenden Wundarzte als Lassar, wie ich schon im 27sten § anführte, als Beispiel vor uns

1) *Icones Herniarum*. Francofurti. 1801, fol.

Haben; so werden wir auch seinem Heilungsverfahren um so sicherer folgen können. Herr *Transnett* nämlich heilte, ihm zufolge, eine schon faustgroße *Hernia ischiadica* durch eine Bandage und zweymonatliches Liegen im Bette.

Das schicklichste Band sowohl für diesen als die zwey folgenden Brucharten, besteht wohl in einer ovalen Pelotte, welche auf einem Riemen haftet, der sich vornen und hinten in zwey schmälere Riemen theilt, welche vornen zu beyden Seiten des *Scrotums* oder an den Schamlippen, hinten zu beyden Seiten des Afters über die Backen des Hintern herauf geschlagen, und an einem Leibgurt befestigt (geschnallt) werden.

Behandlung der *Hernia ovalaris*.

§. 45.

Eine *Hernia ovalaris* erfordert, ausser dem bey allen Brüchen im Allgemeinen zu beobachtenden, nach gehöriger Zurückbringung des Vorgetriebenen, die Zurückhaltung mittelst einer Pelotte.

Die schicklichste Lage des Patienten zur Zurückbringung der *Hernia ovalaris* ist, daß man ihn auf den Rücken, oder auf die dem Bruche entgegengesetzte Seite, mit dem Hintern höher, und der Brust niedriger legt. Das Bein, an welchem sich die *Hernia* befindet, läßt man aufstellen, um den *Musculus obturator externus*, die drey *adductores* und den *gracilis* zu erschaffen.

Die nach der Form und Größe der vorgedrungenen *Hernia* gemodelte, runde, eiförmige oder länglichte Pelotte befestiget man an einem, im vorhergehenden §. beschriebenen, viertheiligen Riemen, welcher an einem Gurte

um den Leib
läßt.

Vidw
für ihr gesch
angeführten
welche man
fühlte, sch
tr diese St
Nach einer
der Bruch
sehr auf,

Nach

werden, n

nand an

selchen B

den auf

und sich n

das Netz

der Geiß

ihn, sch

Nuß, ne

Ubrige zu

gezapfter

gewöhnlic

Soll

bey der

müßte n
tern such
Arteria

) De

um den Leib befindlich ist, und zwischen den Weinen hinauf läuft.

Wisweifen erfolgt die radikale Heilung verhältnismäßig sehr geschwinde. Garengeot fand in dem, im 19. S. angeführten Falle, die Vertiefung zwischen den Muskeln, welche man nach dem zurückgebrachten Bruche deutlich fühlte, schon nach fünf Tagen verschwunden. Er bedeckte diese Stelle nur mit einer dicken Compressen und Binde. Nach einem Monate legte er auch diese bey Seite, und der Bruch erschien nie wieder. Diese Kur fiel Günz 1) so sehr auf, daß er fast an ihrer Wahrheit zu zweifeln scheint.

Nach ist ebenfalls oben schon der Operation gedacht worden, welche, nach Garengeot's Bericht, Herr Arnould an einem Frauenzimmer verrichtete, das an einem solchen Bruche litt. Als er nämlich bey einem Mädchen auf der linken Seite eine Hernia ovalaris antraf, und sich wohl das vorgetriebene Stück derselben, aber nicht das Netz zurück bringen ließ, so schnitt er die Haut über der Geschwulst ein, suchte den Bruchsaek auf, öffnete ihn, schnitt ein Stück des Netzes, von der Größe einer Nuß, nebst einem Stücke des Bruchsaekes, ab, schob das Übrige zwischen die Muskeln hinauf, füllte die Wunde mit gezupfter Leinwand aus, verband die Patientin auf die gewöhnliche Weise, und die Operation gelang vollkommen.

Sollte ja eine Einklemmung sich zeigen, und man bey der Operation die Bruchspörte zu enge finden; so müßte man sie durch den Le Blanc'schen Haken zu erweitern suchen, weil ein Schnitt in dieser Tiefe, wegen der Arteria obturatoria, deren Stärke sich aus der Abbildung

1) De Herniis. Cap. 18, p. 82.

lungsvorfahren um h
ennett nämlich heilte
e Hernia ischiadi-
onatlisches Urogen im
ir diesen als die zwey
in einer ovalen Po
der sich vornen und
t, welche vornen zu
den Schamlippen,
ber die Backen des
Bruchgurt befestigt

valaris,

ußer dem bey allen
n, nach gehöriger
die Zurückhaltung

en zur Zurückbrin
man ihn auf den
engefeste Seite,
ist niedriger legt,
a befindet, löst
rator externus,
u erschaffen.
er vorgebrungen
der längliche Po
ergehenden S. be
an einem Gorte

bey Haller ¹⁾ ziemlich richtig beurtheilen läßt, wohl zu gefährlich seyn möchte, und schon Günz ²⁾ und Heister ³⁾ vor ihrer Verlesung warnten.

Behandlung der Hernia Perinaei.

§. 46.

Die Hernia perinaei kommt, in Rücksicht der chirurgischen Hülfleistung, größtentheils mit der Hernia ischiadica und vaginalis überein.

Richter schlägt zur Heilung eine anhaltende Lage mit erhabenem Hintern, nebst dem öfteren Gebrauche von kalten zusammenziehenden Rysstiren vor, bemerkt aber dabey, daß wohl wenige Kranke sich dieser beschwerlichen Kur unterwerfen möchten.

Mir scheint dieser Bruch immer wichtig genug, um in den Patienten zu dringen, daß er sich wenigstens drey bis vier Wochen lang im Bette ruhig liegend befinde, da wir im 42sten S. sahen, wie sehr viel auf ein solches ruhiges Liegen bey der Heilung ankommt. So blieb in Smellie's beyden, im 22. S. angeführten, Fällen die Hernia perinaei zurück, so lange die Kranken im Bette blieben, und erschien nur bey ihrem Auffeyn wieder.

Die bequemste Lage des Patienten zur Zurückbringung der Hernia perinaei ist die auf dem Rücken, oder auf der, dem Bruche entgegengesetzten Seite, so daß sich der Hintere etwas höher als die Brust befindet. In dieser Lage reibt man mit der flachen Hand, welche man mitunter

1) Iconum anat. Fasciculo 5. Tabula 2.

2) De Herniis. Cep. 18. pag. 82.

3) Institutiones chirurgicae. p. 788.

in einem Kreise bewegt; bringt nöthigenfalls den Finger bey Männern in den After, bey Frauen in die Scheide, um mittelst derselben die Zurückbringung zu befördern. Die eine Frau bey Smellie konnte sich selbst im Bette durchs Einbiegen von ein Paar Fingern in die Scheide den Bruch gar leicht wegschaffen.

Auch hier läßt sich wohl nicht anders die Pelotte als an einem, zwischen den Beinen durchgehenden, und an einem um den Leib gehenden Gurt haftenden, im 44sten §. beschriebenen, viertheiligen Riemen, befestigen.

Da eine Hernia perinaei gemeiniglich nicht in der Mitte, sondern gewöhnlich sich seitwärts befindet, so ist es nothwendig, diesen Umstand bey der Anlegung des Bruchbandes besonders zu beachten, und die Pelotte daher auch vorzüglich gegen diese Seite hin zu richten.

Die Pelotte selbst wird, so viel möglich, länglich seyn müssen, um bey dem Stehen nicht die zusammenkommen- den Beine zu hindern, und für Mannspersonen noch vorwärts einen Ausschnitt oder Rinne haben müssen, um keinen Druck auf die Harnröhre zu verursachen.

Weil das Mittelfleisch gerne bey ältlichen Leuten schwikt, so kann man die Pelotte mit Wachstaffent überziehen.

Auch wird dem Patienten zu rathen seyn, während dem Wasserlassen und dem Stuhlgange mit den Fingern den Druck der Pelotte auf der Bruchstelle etwas zu unterstützen.

Ist mit der Hernia perinaei zugleich eine Hernia inguinalis oder cruralis vorhanden, so befestiget man, wie Pipelet und Juville (oben §. 22.) thaten, die Pelotte an den Riemen zwischen den Beinen, und diesen

den läßt, wohl
) und Hei
 Perinaei.
 läßt der Hirn
 Hernia ischia-
 anhaltende Lage
 Gebrauche von
 bemerkt aber da
 beschwerlichen
 g genug, um
 wenigstens drei
 ab besinde, da
 in solches ruhi-
 es in Smel-
 die Hernia pe-
 rinaei blieben, und
 überbringung
 , oder auf
 daß sich der
 In dieser
 man mitunter



an das elastische, den Inguinalbruch zurückhaltende, Bruchband.

Enthält die Hernia perinaei die Harnblase, so rät man dem Patienten, seine Harnblase sich nicht übermäßig anfüllen zu lassen.

Auch muß er sich vor Hartleibigkeit hüten.

Bey Frauen, die an einer Hernia perinaei leiden, bringt man ein Paar Finger in die Scheide, drückt, schiebt und streicht den, mehrentheils auf der hintern Wand befindlichen Bruch, so viel es gehen will, über das Kreuzbein hinauf.

Auch hält man die Hernia perinaei, wie eine vaginalis, mittelst eines hohlen, vorne platten, hinten und zu beiden Seiten stark gewölbten, cylindrischen Pessariums zurück, besonders weil gemeinlich mit einer Hernia perinaei zugleich mehr oder weniger eine Hernia vaginalis verbunden zu seyn pflegt, so daß beide fast in einander überzugehen scheinen.

Nichter *) sagt: Wahrscheinlich würde bey Mannspersonen die T-Binde mit gleichem Nutzen angewendet werden, wenn man den Cylinder in den Mastdarm legte. Ich gestehe nicht einzusehen, wie dieses wohl ausführbar seyn möchte.

Sollte sich eine Hernia perinaei z. B. durch Rothanhäufung in dem vorgefallenen Darmstücke einklemmen; so gebraucht man, wie bey allen Brucheinklemmungen, nach der Verschiedenheit der Umstände, anßer dem Blut-

*) Wundarzneykunst. Sechster Band. Göttingen. 1799. S. 29.

lassen, dem Eis-Auflegen, den Abführungen u. s. f., besonders noch erweichende Klystire, und bey Frauen erweichende Einspritzungen in die Scheide, welche man so anwendet, daß sie nicht sogleich wieder abfließen können.

Smellie sah in den schon angeführten Fällen ein paarmal, daß sich solche Herniae perinaei während der Schwangerschaft und Niederkunft einklemmten. Um dieses zu verhüten, drückte er, bey der nächsten Entbindung einer solchen Patientin, nachdem sich die Wasserblase gebildet hatte, den Darm mit der in die Scheide gebrachten Hand über das Kreuzbein (*pushing the intestines above the os sacrum*), sprengte die Wasserblase, und entband die Frau glücklich, weil in dem Augenblicke der Kopf des Kindes durch die Scheide drang. Im zweyten Falle brach, kurz vor der Niederkunft, die faustgroße Bruchgeschwulst auf, es floß blutiges Eiter heraus, der Schmerz verschwand, das vorgetriebene Stück Darm wich in die Bauchhöhle zurück, die Frau wurde glücklich entbunden, und erholte sich bald wieder; doch floß beständig etwas Feuchtigkeit aus einer kleinen Öffnung.

Helfen alle Mittel nichts, so schreitet man zur Operation. Man schneidet die Haut über dem Bruchsacke auf die gewöhnliche Art ein, öffnet vorsichtig den Bruchsack, und sucht, falls sich das Vorgefallene nicht zurückbringen ließe, die zu enge Bruchpforte vermittelst des *le Blanc*'schen Hakens zu erweitern, weil es gar zu bedenklich seyn könnte in dieser Tiefe einen Einschnitt zu machen, da ohnehin die meisten hier befindlichen Theile, besonders die Fleischfasern des *musculi levatoris ani*, welche die Pforte des Bruches bilden, eine solche Erweiterung gestatten.

Bromfield heilte in seinem, im 22. S. angeführten, Falle den Knaben in kurzer Zeit.

Behandlung der Hernia vaginalis.

§. 47.

Eine Hernia vaginalis erfordert, zufolge des im 24. 25. 34. und 38. Sphen bereits Gesagten, nach gehöriger Zurückbringung, die Zurückhaltung, mittelst eines sogenannten Pessariums oder Mutterkranzes.

Zur Zurückbringung des Bruches ist meistens schon die horizontale Lage der Patientin im Bette, wodurch die Bauchmuskeln erschlafft werden, wie schon im 46. S. angegeben worden, hinreichend.

Da ferner meistens der Bruchsaß dieser Hernia von der hinteren Wand der Scheide gebildet wird, so ist auch mehrentheils die Lage der Patientin auf dem Rücken, mit höher als die Brust liegendem Hintern, und etwas angezogenen oder aufgestellten Beinen, die schicklichste. Befindet sich der Bruch mehr zur Seite als hinten, so legt sich die Patientin auf die Seite des Bruches, um gewissermaßen das im Bruche Enthaltene auszuschütten. Richter *) sagt: Ist der Bruch zwischen der Blase und der Gebärmutter durchgedrungen, so würde ich die Kranke auf den Rücken legen lassen, weil sich in dieser Lage die Gebärmutter gegen den Mastdarm senkt, und daher die Zurückbringung des Bruches weniger hindert. In dem Falle hingegen, wo der Bruch zwischen dem Mastdarme und der Gebärmutter befindlich ist, würde ich, aus gleicher Ursache, die

*) Abhandl. v. d. Brüchen. Göttingen. 1799. Kap. 40. S. 721.

die Kranke auf den Ellenbogen und Knien liegen lassen. Jedoch da sich diese Brüche gemeinlich sehr leicht, und fast in jeder Lage des Körpers, zurückbringen lassen; so hat der Wundarzt selten Ursache in Absicht der Lage sehr genau zu seyn.

Gemeinlich ist jedoch zur Bewirkung des Zurückweichens des in einer Hernia vaginali Vorgebrängten, außer der schicklichen Lage der Patientin, zugleich die Einbringung von ein Paar Fingern in die Scheide erforderlich. Mit diesen Fingern streicht und drückt man das Vorgebrängte gegen, und, wo möglich, über das Kreuzbein hinauf oder seitwärts, oder mehr vorwärts, je nachdem der Bruch verschiedentlich vorliegt, und sich darbietet, bis, wenn Därme im Bruche enthalten sind, man sie mit einem Gluchzen sich zurückziehen hört, oder wenn ein Stück Netz im Bruche liegt, man dasselbe gar nicht ferner fühle.

Man suche aber ja sorgfältigst alles Vorgebrängte aufs Genaueste zurückzubringen, weil sonst das eingebrachte Pessarium den Bruch einklemmen, folglich mehr schaden, als nutzen könnte.

Erweichende Klystire und erweichende Einsprüzungen in die Mutterscheide wird man wohl selten zur Unterstützung der Taxis bey einer Hernia vaginali nöthig haben. Die Theile, welche die Bruchpforte ausmachen und zunächst umgeben, sind schlaff, weich und nachgebend genug, und werden überdies von der Natur selbst gleichsam beständig gebäht.

Daß sich Vaginalbrüche leicht zurückbringen lassen, bezeugen einstimmig alle Schriftsteller. J. B. Günz schreibt von einem, dreyßig Jahre alten: „facile restituta,“ so auch Heuermann, Stubbs, Hoin, Levret, Chauf-

sier, Heinsius, Starke und Stein an den im 24. §. angeführten Stellen. Richter ¹⁾ versichert zu wiederholten Malen: „Die Zurückbringung des Mutterscheidenbruchs ist gemeiniglich ohne Schwierigkeit, und erfordert nichts als einen mäßigen Druck von Seiten des Wundarztes, und von Seiten der Patientin eine horizontale Lage.“

Weit schwieriger hingegen war ehemals die Zurückhaltung des leicht und glücklich zurückgebrachten Vaginalbruchs. Dieses erhellet schon sattsam aus den, in Rücksicht der Materie und Form verschiedensten Pessarinen, vermittelt welcher man im Allgemeinen, gerade so wie einen Scheidenvorfall, also auch einen Scheidenbruch zu heilen suchte.

Man könnte leicht ein ansehnliches Werk über die Pessarinen zusammen schreiben, wenn man alle beschreiben wollte, die man theils vorgeschlagen, theils wirklich angewendet hat.

In Ansehung der Materie empfiehlt man Pessarinen, bestehend aus einer mit Luft gefüllten Blase, einem Schwamme, einem mit Baumwolle gefüllten, in Öl getauchten Säckchen, einem mit Wachs überzogenen Bällchen von Hanf, einem Klümpchen Wachs, oder ein Pessarium aus Federharz, Korkholz, übersponnenen Weidenreisern, Linden- oder Buchsbaumholz, einer Nusschaale mit Wachs überzogen, gebranntem Leder, Fischbein, Horn, Elfenbein, gewundenem Eisen, oder Messingdraht und mit Leder oder Wachstaffent überzogen, oder selbst aus Kupfer, Silber, Gold, ja Glas, z. B. einem gläsernen Schröpfkopfe.

1) Auf der vorhin angeführten Seite.

In Ansehung
gedrückt, ellipti-
kreis, ring, o-
ma, conisch, ge-
ma, fetschförmig
ma, kahnförmig
gerad oder gleich
dampfen, ge-

Das gemein-
rungen das erpö-
gei Pessarium
der Scheide dien-
Standes, bey d-
wel es die Bru-
ebendrein eine

Doch da
noch von der
dem Huno l-

1) Diss. de l-
tionibus
vorzüglich
de novo
colanti 17
ch. Die
Diss. chin
Ad. Böh
1745. E
chir. T
nal de M
tiones ch
Verhande
Bell Chi

In Ansehung der Form waren die Pessarien rundlich, eysförmig, elliptisch, rundlich dreyeckig, rundlich viereckig, kreis-, ring-, oder kranzförmig, cylinder-, fingerhutförmig, conisch, zapfen- oder faßspundförmig, trichterförmig, kelchförmig, glockenförmig, flaschenförmig, birnförmig, kahnförmig, napf- oder schälchenförmig, einer liegenden ∞ gleichend, radförmig, siebförmig, korbförmig, durchbrochen, gestielt und ungestielt, u. s. f.

Das gemeinste Pessarium blieb mit kleinen Abänderungen das eysförmige. Falls indessen ein solches eysförmiges Pessarium auch zur Zurückhaltung eines Prolapsus der Scheide diente; so war es doch, wegen seines schmalen Standes, bey der Hernia der Scheide nicht zu brauchen, weil es die Bruchspalte nicht nur nicht zuhielt, sondern abendrein eine Einklemmung besorgen ließ.

Doch da ich hier weder von dem Prolapsus vaginae, noch von der Geschichte der Pessarien, (welche unter Andern *Hunold* ¹⁾ artig vorträgt), zu handeln habe, so

1) *Diss. de Pessariis, speciatim de quibusdam emendationibus necessariis.* Marburgi. 1790. Zu den älteren vorzüglicheren Schriften gehören: *Ant. O. Goelcke de novo artificio curandi proidentiam Uteri.* Francofurti 1710.; sie bildet einige Mutterkränze verkleinert ab. Diese *Diss.* ist wieder abgedruckt in *Haller's Diss. chirurg.* Tom. III. Nro. 85. pag. 537. *Phil. Ad. Böhm er de prolapsu et inversione Uteri.* Halae 1745. Ebenfalls wieder abgedruckt in *Haller's Diss. chir.* Tom. III. Nro. 86. pag. 535. *Levret* im *Journal de Médecine.* Tome 34 et 36. *Heister Institutiones chirurgicae.* Tab. XXXIV. *Schwencke* in den *Verhandlungen etc.* te Haerlem. 1776. Deel XV. *B. Bell Chirurgie Theil II.* fig. 28 und 28. *Theil V.* fig. 4.

wende ich mich gleich zur Beschreibung der, zur Zurückhaltung einer Hernia vaginalis, zweckdienlichsten zwey besten Pessarien.

Eins der besten Pessarien für die Hernia vaginalis ist ein, nach der Gestalt der Scheide eingerichteter, hohler Cylinder aus Federharz, oder der Pickelischen Ölfirnismasse. Dieser muß sanft gebogen, vorn etwas flacher, hinten gewölbter seyn; der obere Rand, auf welchen der Muttermund paßt, muß so breit als möglich seyn. Ist dieser Cylinder der Form und der Größe der Scheide gehörig angepaßt, so wird man wohl selten nöthig haben, ihn durch die Juvillesche Binde ¹⁾ zu befestigen. In jedem Falle muß dieser Cylinder die Bruchpforte vollständig, in ihrem ganzen Umfange, nicht bloß an einem Theile, zuhalten oder verschließen.

Noch vorzüglicher ist, besonders seiner Einfachheit wegen, das Denman'sche ²⁾ Pessarium (globe pessary). Dieses besteht aus einer hohlen, ein wenig länglichten Kugel von Buchsbaumholz. Diese länglichte Kugel ist dünn und glatt gedreht, und polirt, und der Größe und Weite der Scheide gehörig angemessen. Unterwärts hat sie vier Löcherchen, wodurch Fädchen gezogen werden, um das

Brünnig hausen im ersten Bande des Loder'schen Journals für Chirurgie. Tab 3. Traité des Maladies chirurgicales, ouvrage posthume de J. L. Petit, par M. Lesne. Paris. 1790. nouvelle edition. Tome 3. Pl. 69. 70.

- 1) Bell's Chirurgie, der deutschen Uebersetzung Theil 5. Tab. 5. fig. 3.
- 2) An Introduction to the Practice of Midwifry. London. 1794.

Pessarium leicht
 man verdient bei
 Vorzug — weil
 leicht auch die
 und gleichsam die
 Form wegen, ke
 gen des zwischen
 lliche Binde bot
 bend erhält, un
 als der sich au
 und selbst beim
 — weil es unt
 ist, — weil es
 ten läßt, und
 det, — weil
 nach sich nicht
 von jedem Dr
 Bedenkt
 Frauen ihre W
 gebrauchten Ap
 del³⁾, Nicht
 eigene Beyfrie
 in, buchsbaum
 vor allen ander
 sehr erfahrene

- 1) J. Bar
 dieses
 2) Bey G
 3) Abhandl.
 4) Am ang
 5) Am ang.

Pessarium leichter wieder herauszuziehen. Dieses Pessarium verdient besonders gegen die Hernias vaginales den Vorzug — weil es am gleichmäßigsten überall anliegt, folglich auch die Bruchspalte am vollkommensten zuhält und gleichsam den Bruch verstreicht — weil es, seiner Form wegen, keiner Unterstützung durch eine immer, wegen des zwischen den Beinen durchgehenden Riemens, sehr lästige Binde bedarf, — weil es sich selbst gleichsam schwebend erhält, und sowohl dem sich füllenden Mastdarme, als der sich ausdehnenden Harnblase gehörig ausweicht, und selbst beyhm Stuhlgange am wenigsten hinderlich fällt, — weil es unter allen bekannten Pessarien das leichteste ist, — weil es sich verhältnismäßig am reinlichsten erhalten läßt, und selbst den Ausfluß des Schleims nicht hindert, — weil es sich sehr leicht beybringen läßt, und hernach sich nicht verrücken kann, — weil es wohlfeil und von jedem Drechsler verfertigt werden kann.

Bedenkt man die bekannte 1) Erfahrung, daß einige Frauen ihre Muttervorfälle vermittelst eines in die Scheide gebrachten Apfels ganz gut zurückhielten, wie z. B. Wedel 2), Richter 3) und Hundt 4) unter Andern selbst eigene Beispiele anführen; so wird man einer solchen leichten, buchsbaumenen, hohlen, länglichten Kugel gewiß vor allen andern Pessarien den Vorzug einräumen. Der sehr erfahrne Denman 5) schreibt daher mit Recht: I

- 1) J. Burns on Midwifry, page 56. empfiehlt daher auch dieses Pessarium.
- 2) Bey Göblich am ang. Orte. Seite 551.
- 3) Abhandl. v. Brüchen. Seite
- 4) Am ang. Orte § 26.
- 5) Am ang. Orte S. 115. Sect. VII.

Zurückhal-
en zwey besten
ia vaginalis
eter, hohler
Hernie Masse.
hinten ge-
der Mutter-
ist dieser Cy-
schon ange-
in durch
jedem Falle
in ihrem
halten oder
schafft we-
e pessary).
glichten Ku-
gel ist dünn
und Weite
hat sie vier
um das
der schen
Maladies
Petit, par
n. Tome 3.
ang April 5.
ifry, Lon-



have never met with a case, in which the globular pessary could not be easily introduced and conveniently worn. Auch mein vortrefflicher erfahrener Freund, Geh. Rath und Leibarzt Fischer, kann diese Art von Pessarien nicht genug loben.

Solcher, aus einem hohlen Cylinder oder einer länglichten Kugel bestehenden, Pessarien muß die Patientin wenigstens zwey besitzen, um das eine, wenn es einige Tage lang gelegen hat, zur Reinigung herausnehmen, und indessen ein anderes einlegen zu können. Während des periodischen Blutganges müßte wohl täglich damit gewechselt werden.

Mery, der überhaupt in Manchem das Paradoxe liebte, erklärte Vaginalbrüche für unheilbar, weil er etwas Angebornes bey ihnen vermuthete, wurde aber darüber schon von Verdier ¹⁾ zurecht gewiesen. Glücklicherweise widerspricht ihm auch die tägliche Erfahrung; z. B. Haenel ²⁾ heilte in einigen Wochen eine Hernia vaginalis durch einen in Maunwasser getauchten Schwamm, Garengeot ³⁾ desgleichen durch ein Pessarium von der Gestalt eines Faßspundes (bondon). Hagen ⁴⁾ verhäutete Hernias vaginales durch ein Stück Waschwamm, das er in die Scheide brachte. Ja sogar alte Vaginalbrüche hat man vermittelst der Pessarien gründlich geheilt.

Trifft man eine Hernia vaginalis bey einer Schwangeren oder Gebärenden an, so bringt man solche vor der

1) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome 2.

2) Bey Gúnz. pag. 87.

3) Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. page 707.

4) In Starke's Archiv. Band 3. Seite 344.

Entbindung, auf die Art, wie Smellie verfuhr, und im 46. §. angezeigt worden, gehörig zurück.

Sollte nebst einer Hernia vaginalis die Scheide zugleich umgekehrt seyn, so wird auch zugleich mit der Zurückbringung der Scheide die Hernia gehoben.

Auch könnten, nebst dem Pessarium, zugleich noch stärkende, zusammenziehende und astringirende Einspritzungen z. B. vom Decocto Corticis Peruviani, Corticis Quercus, Grunatorum, Simarubae mit und ohne Alaun, von Nutzen seyn.

Übrigens muß man, wie bey allen andern Brüchen, also auch bey den Brüchen der Scheide, ausser den örtlichen mechanisch zurückhaltenden Mitteln, noch vor allen andern Dingen, Ruhe, Vermeidung aller heftigen Leibesanstrengung, wenigstens so lange, als man sich eine radikale Heilung zu bewirken bemüht, dringendst empfehlen, desgleichen Vermeidung aller Hartleibigkeit, aller zu engen Kleidung; auch darf die Patientin ja nicht halb sitzend, sondern horizontal liegend im Bette schlafen.

Selten klemmt sich wohl, ausser der Schwangerschaft, eine Hernia vaginalis ein. Sollte es der Fall seyn, so suche man den Mastdarm und die Harnblase zu entleeren, um dadurch die Zurückbringung zu erleichtern, und verfähre übrigens wie vorhin gezeigt worden. Doch sah Dr. Macclaurin (bey Denman) eine Kranke an einer solchen Einklemmung den dritten Tag sterben, weil die Krankheit erst bey der Leichenöffnung entdeckt wurde.

Daß eine Hernia vaginalis wirklich operirt worden wäre, ist mir bis jetzt noch nicht bekannt. Auch Richter sagt: Bis jetzt hat man noch kein Beyspiel, daß dieser

Bruch operirt werden ist ¹⁾. In allen bis jetzt bekannten Fällen hat man den Bruch durch die Taxis glücklich zurückgebracht ²⁾.

Sein schlug inzwischen vor, falls sich eine Hernia vaginalis einklemmen, und durch die Taxis nicht zurückbringen lassen sollte, und der Bruch zur Operation zu hoch läge, unter dem Nabel die Bauchhöhle zu öffnen, und das in dem Scheidenbruche Einklemmte in den Unterleib zurückzuziehen. Allein, wie schon gesagt, es ist bis jetzt, glücklicherweise, noch kein Fall vorgekommen, wo eine so missliche Operation nothwendig geworden wäre.

Behandlung der Hernia uterina.

§. 48.

Die Hauptsache bey einer Hernia uterina, falls sie vorkäme, wäre wohl die Zurückwendung des umgewendeten Uterus, nebst der Einbringung eines Pessariums.

Zum Ersteren geben alle guten Handbücher der Entbindungskunst, z. B. Levret, Stein und Baude-Loeque, die beste Anweisung, und von Letzterem ist im vorhergehenden Paragraph gehandelt worden.

Allein da ich von einer Hernia uterina keine zuverlässige wirkliche Beobachtungen vorfinde, so mag ich auch nicht, gegen den wahren Sinn der Preisfrage, ex hypothesi davon handeln, sondern lasse es bey dem, was ich im 26. 35. §. in Ansehung dieser Hernia angeführt habe, bewenden.

1) Wundarzneykunst. Sechster Band. §. 22.

2) Abhandl. v. D. Brüchen. S. 735.

Handwritten note:
Kardinal Her
Kardinal des Heil
Kardinal des Heil
Kardinal des Heil
Kardinal des Heil

Handwritten note:
Um Nichts
der Preisfrage zu
des Falles gedent
tig herausgezwan
den Fall von eine
herausziehen. -
lometit: Les i
et à se déplacer
par l'anus: il
sibles, afin de
présentent ²⁾.

1) Philosophi
Et' Weber
2) Précis de
douce par
1768. Chap

*Rudendal Hernia Cooper l. c. du Ynie Strique l'angst des
Ursprungs des Spind furch, jallim stett die Furch dieses Knochels 400g.
Touche „ gegen die junc. Spide für die Ann. Ersterer die in bilden in der
Mitt. der Nerven Laffe von junc. Spide l. c. f. ...*

121

U n h a n g.

S. 49.

Um Nichts zu übergehen, was zu dem Gegenstande der Preisfrage zu gehören scheinen könnte, will ich kürzlich des Falles gedenken, wo Därme durch den After bruchartig herausgezängt wurden. J. Needham ¹⁾ schildert den Fall von einem Knaben, welchem Därme zum Hintern heraushiengen. — Daher auch der berühmte Portal bemerkte: Les intestins ont tant de facilité à glisser, et à se déplacer, qu'on a vu sortir un sac herniaire par l'anus: il est bon de noter tous ces cas possibles, afin de ne pas se méprendre lorsqu'ils se présentent ²⁾.

E n d e.

- 1) Philosophical Transactions. Vol. 49. page 238. in Lebesue's Uebersetzung. Viertes Theil. p 273. N. LVII.
- 2) Précis de Chirurgie pratique avec figures en taille douce par M. P** (Portal) M.. seconde partie. Paris. 1768. Chap. III. pag. 661.

Senckenb.
med. Institut.

Verlags: Bücher
von
Johann Friedrich Benner,
Buchhändler und Buchdrucker
in Frankfurt am Main.

	Rthlr. = gr.	
Anastasia u. das Schachspiel. Briefe a Stalien v. Verfass. des Ardinghello u. der Hildegard v. Hohenthal (W. He in se). 2 Bde 8. 1803. Schröpp. 520 S., u. Kpftitel mit Vignetten)	1	8
Cohen (S. J.), morgenländische Pflanzen auf nördlichem Boden; eine Sammlung neuer hebräischer Poesien, nebst deutscher Überset- zung. gr. 8. 1807. (172 S.) br.	—	16
Encyclopädie (deutsche), oder allgemeines Real- wörterbuch aller Künste u Wissenschaften, v. einer Gesellschaft Gelehrten bearb. 1r—23r Bd. A—K. (nahe an 20,000 S.) kl. Folio. Subscriptionspreis à Rthlr. 4. 12 gr.	103	12
(Der 24te Band ist unter der Presse)		
— Derselben 1r Kupferband, 75 Taf. in Fol. auf Velinpapier. Subscriptionpreis	7	22
(Der 2te Bd erscheint im Laufe dieses Jahrs.)		
Handbuch, allgemeines genealogisches (von folgenden Jahrgängen sind noch einzelne Exemplare zu haben)		
1744 in 4., 1745 und 46 in 8.	à	— = 12
1753, 1754, 1757, 1758, 1762—1766	à	— = 22
1767—1782, jeder Jahrgang in 2 Bdn.	à	1 = 16
1783—1793, — — — —	à	1 = 20
1794—1797, — — — —	à	2 = —
1798—1802, — — — —	à	2 = 12
1803 u. 1804, — — — —	à	2 = 16
1805, in 2 Bänden	à	2 = 20
1811, 1r Band	à	2 = 6
(der Ilte unter der Presse.)		
Hufnagel (Dr. W. F.), Hauptsätze der christl. Glaubens- und Sittenlehre nach Bibelstellen,		

per Übersicht u
für den für me
einem Überblick
einer Confirmati
Vertrag für die er
manageschicht.
mit 22. illum. S.
Schöpp. (66
Dienr's (K. E.
Empfies seiner
des Mittelalter
Nationalinsti
7. Juli 1809 g
mit Zufügen des
gr. 8. 1810.
OSSIAN'S Ged
Jung, mit An
gen. 3 Bände
Auf Dr
— Po
— Ve
Kiepe n hau
d. hri. Genon
Erläuter in 2
Zervais (C. A.
Sprache, in ei
fachsten Regel
einer Samml
wahl von Gesp
der und junge
— — — — vollstän
Hobensarten, à
cademie fran
de Mr. de v
Dictionnai
Ed immer r
hütung der N
d. K. Societ
gekörnte Preis
— — — — vom 2
6 Bände. (66



Rthlr. = gr.

- zur Übersicht u. Wiederhol. des Unterr. im Christenthum für meine Religionszöglinge. Mit 1) einem Überblick der Gesch. d. Christenth. u. 2) einer Confirmationshandl. 8. 1797. (64 S.) — , 5
- Lesebuch für die ersten Anfänger (kleine Gedichte, naturgeschichtl. Aufsätze, Räthsel u. Spiele), mit 22. illum. Kupf. 2te, verm. Aufl. 8. 1808. Schrbpp. (96 S.) geb. 1 , —
- Bl s n e r ' s (K. E.) Mohamed. Darstellung des Einflusses seiner Glaubenslehre auf die Völker des Mittelalters Eine Preischr., welche von d. Nationalinstitut d. Wissensch. zu Paris am 7. Juli 1809 gekrönt wurde. A. d. Franz. u. mit Zufügen des Verfass. verm. von E. D. M. gr. 8. 1810. (376 S.) 1 , 16
- OSSIAN'S Gedichte, übersetzt von Fr. W. Jung, mit Anmerkung u. Erläuterungen. 3 Bände. gr. 12. 1808. (1172 S.) Auf Druckpapier 3 = —
 — Postpapier 5 = —
 — Velinpapier 9 = —
- K i e p e n h a u s e n (Franz u. Joh.), Leben u. Tod d. heil. Genoveva in XIV Platten, mit beygef. Erläuter in 22 S. Fol. 1806. gegl. Velinp cart. 9 = 12
- S e r v a i s (E. M. de), Anfangsgründe d. französ. Sprache, in einer faßlichen Darstellung d. einfachsten Regeln, m. Übungen im Buchstabieren, einer Sammlung von Wörtern und einer Auswahl von Gesprächen u. Erzählungen für Kinder und junge Anfänger. 8. 1804. (158 S.) — = 6
- — — vollständige Sammlung französischer Redensarten, nach dem Dictionnaire de l'Académie française, dem neuen Vocabulaire de Mr. de Wailly und den vorzüglichsten Dictionnaires. gr. 8. 1805. (768 S.) 1 , 8
- S ö m m e r r i n g (S. Th.), über Ursache u. Verhütung der Nabel- und Leistenbrüche Eine von d. K. Societät der Wissensch. zu Göttingen gekrönte Preischrift. gr. 8. 1797. (30 S.) — , 5
- — — vom Baue des menschlichen Körpers. 6 Bände. (2640 S.) gr. 8. 8 , 22

Benner,
 a i n.
 Rthlr. = gr.
 103 , 12
 7 , 22
 — = 12
 — = 22
 1 = 16
 1 = 20
 2 = —
 2 = 12
 2 = 16
 2 = 20
 2 = 6

- Rthlr. = gr.
- S b m m e r r i n g (S. Th.) über einige wichtige Pflichten gegen die Augen (zur Beherz für die, welche an Augen leiden, od ihre Aug. gut erhalten wollen. 4te Aufl. auf Schreibyr. mit grober Schrift gedruckt. gr. 8. 1803. (52 S.) — = 6
- SOEMMERRING (S. Th.), Abbildungen des menschl. Auges, *Der Sinnesorgane Ite Lieferung.* 14 schwarze und 2 illumin. Kupfertfln. mit 122 Seit. Text. kl. Fol. 1801. geglätt. Velinpapier. cartonirt. 19 = —
- — — Abbildungen des menschlichen Hörorgans. *Der Sinnesorgane IIte Lief.* 9 Kpftfln. mit 46 S. Text. kl. Fol. 1806. gegl. Velinppr. cart. 7 = 22
- — — Abbildungen der menschlichen Organe des Geschmacks u. der Stimme. *Der Sinnesorgane IIIte Lief* 4 Kupfertafeln mit 24 Seiten Text. Fol. 1806. gegl. Velinpap. 4 = 18
- — — Abbildungen der menschlichen Organe des Geruchs. *Der Sinnesorgane IVte Liefer.* 9 Kupfertfln. mit 34 S. Text. Folio. 1809. gegl. Velinpapier. cartonirt 7 = 22
- — — Abhandlung über die schnell u. langsam tödtl. Krankheiten der Harnblase u. Harnröhre bei Männern in hohem Alter. V. der K. K. medicin. chir. Josephin. Academ. zu Wien gekr. Preisschrift. gr. 4. 1809. (160 S.) 2 = —
Auf Velinpapier 4 = —
- Staatscalender von Frankfurt. Von 1738 an bis hierher sind von den meisten Jahren noch einzelne Exemplare zu haben — = 6
(für 1811 erscheint solcher ehestens.)
- S t i l l i n g ' s (S.), Scenen aus d. Geisterreiche. 2 Bde 3te, verbess. Aufl. 8. 1803 (763 S.) 2 = 16
Jeder Band Rthlr. 1. 8 gr.
- — Dasselbe, wohlf. Ausg. auf Druckpap. 2 Bände. 1803. (604 S.) 1 = 4
- Über das Übel auf Erden; ein Wort der Veruhig

gang und der G...
106. Schreibe...
Vedr. Wechsel...
schriften und...
stiele; ein Be...
Wechselrechts...
malariaen, Pro...
(200 S.)

lateinisch

CAMPER (Pet...
S Th. Sömm...
desr. fol rea...
HEBERDEN (C...
borum histor...
rav. S. Th. Sömm...
Ch. scrip...

KOELER, G. L...
Gallia et Ger...
tium, quam l...
provenienti...
et 36 Tabell...

Ch. scr...
SENECAE (L...
epistolae, cu...
F. C. Matthe...
— id Ch...
— id. Ch...

SOEMMERRIN...
mini fabrica...
(224 P.)
Ch. scri...
Ch. ve...

— — — de mor...
corporis hum...
renitit Societ...
1794. pars pat...
tor. de system...
Ch. scri...
Ch. veli...

	Rthlr. = gr.
SOEMMERRING(S.Th.) de concrementis biliariis corporis hum. 8m. 1795. (67P.)	— = 8
Ch. script.	— = 9
Ch. velina	— = 18
— — — tabula sceleti feminini, juncta de- scriptione. fol. reali. 1797 Ch. vel. laevig.	1 = 8
— — — icones embryonum humanorum. 4 tabb. aen. c. 10 P. descript. fol. reali. 1799. Ch. velina laevig.	6 = —
— — — tabula baseos Encephali. 2 tabb. aen. c. 16 P. descript. fol. 1799. Ch. ve- lina laevig.	3 = 16
— — — icones oculi humani. 14 tabb. aen. nigrae et pictae c. 104 P. descriptionis. fol. 1804. Ch. velina laevig. Carton.	19 = —
— — — icones organi auditus humani. 9 tabb. aen. cum 42 P. descriptionis. fol. 1806. Ch. velina laevigata. Carton.	7 = 22
— — — icones organorum humanorum gustus et vocis. 4 tabb. aen. c. 20 P. de- script. fol. 1808. Ch. velina laevig.	4 = 18
— — — icones organorum humanorum olfactus. 9 tabb. aen. c. 42 P. descript. fol. 1810. Ch. velina laevigata.	7 = 22
—————	
GENLIS (Mad. de) Alphonsine, ou la Ten- dresse maternelle. 3V. gr. 12. 806. (1000P.)	2 = —
SEVIGNE (Mad. de), Lettres à sa famille et à ses amis. Nouvelle Edition, mise dans un meilleur ordre, enrichie d'é- claircissemens et de Notes historiques; augmentée de Lettres, Fragmens, No- tices sur Madame de Sevigné et sur ses amis, Eloges et autres morceaux inédits ou peu connus, tant en prose qu'en vers; par Ph. A. Grouvelle. 11 Vol. 8. Paris 1806. Avec 2 Portraits. (5232 P.)	8 = —

VII.



Walwert sculpsit.



77. r. : gr.
 entis
 7P.) - = 8
 - = 9
 - = 18
 de-
 ig. 1 = 8
 m.
 ali,
 6 = -
 bb.
 ve-
 5 = 16
 en.
 is,
 19 = -
 i.
 l.
 7 = 22
 4 = 18
 m
 ot.
 7 = 22
 n-
 p.)
 le
 e
 ;
 -
 es
 is
 rs;
 ris
 8 = -

St. : st.
ntis
(P.) — 8
— 9
— 18
le-
1 = 8
n.
li,
6 = —
ob.
re-
5 = 16
n.
is,
19 = —
i,
7 = 22
n
4 = 18
t.
7 = 22
) 2 = —
e
s
is
s;
is
8 = —



Strixner pinxit.

I.



II.



III.




143

IV.



Stricture pinxit.

V.



VI.




VII.



Walvort sculpsit.







p. 131
alt / Ch...

7 Cyffert
Sp...
all. med
p. 160.

if b
p...
in p...
h...
der h...
C...
g...
L...
für die
P...
T...

Will...
Chap



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text on the right edge of the page, possibly from an adjacent page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

ad pag. 16.

Des hernies intestinales diaphragmatiques..

Blatt 2.

181

fränkischer Aufsatz in J. T. H. Laennec, Auscultation
médiante. Paris. 1819. Tome. 1. pag. 429. in welchem
die erste Beschreibung der Hernie des Zylinders vorkommt.
Vielleicht könnte sie sich zeigen, wenn
die Hernie feststeht an der Längs Wand, wenn die ganze Hernie
eingeklemmt, so die Hernie in die Brusthöhle gedrückt
zu können, wobei Lungenschmerzen vorkommen könnten
an dem Ort, wo die Hernie sich befindet?


[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]



192



123



124

125



126



127

