Reichard

Flora Germanica Methodo sexuali disposita

1775.

Liber I.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Monandria Monogynia.

Cl. I.

Monandria
Monogynia
Hippuris
Cal. o. Cor. o. Stig. simplex.

1. Hippuris vulgaris. Linn. spec. p.
Scholler. n.l. in horto Majo.

Locus natalis.

Tempus florendi.

Salicornia

2. S. herbacea. L.
Scholler in salinis circa Vulgn. Aug.

Locus natalis.

Tempus florendi

p. 2.

Monandria . Digynia .

3. S. virginica. ♃ Hort. Upsal. Linn. Spec. Plant. ed. III.
⅓ Aug. et ½ 7ber

Loc. nat.

Floret

B. DIOECIA

Callitriche . III . a.

4. C. verna . ♂ ♀ Hort. Upsal. Linn. Spec. Plant. ed. III. app. p. 252.
Schkuhr in Botan. Handb. Suppl. 1. p. 3. Flores masculi et feminei diversi in eadem planta.

Habitat;

Floret

5. Call. autumnalis ♂ ♀ Hort. Upsal. Linn. Spec. Plant. ed. III. app. p. 252.
Schkuhr. in Botan. Handb. Suppl. 1. p. 3. Flos masculus et femineus diversi in eadem planta. n. 4.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diandria Monogynia.

6. Callitriche intermedia Mihi. Hall. H. n. 554. Hedwig. Fr. Jun. Jul. Nov. Act. A. N. C. V. app. p. 138. Smith.

~~Locus natalis~~

Habitat. III. 6.

Bi. capitatum.

~~Tempus florendi~~

Class. II. Diandria. Linn.

A. Monogynia.

Ligustrum. IV.

7. Ligustr. vulgare. L. n. 5

Ligustrum. J. B. hist. I. p. 520. Scheuchzer. Gramin. Jun. Pl. sublucteo. Hungar.

Locus natalis.

~~Tempus florendi~~.

Hedwig. Smith. III. app. p. 253. Jul. in sepibus, collibus.

Flor.

Syringa

8. Syr. vulgaris L. J. B. hist. T. I. P. 2. p. 204. a) coerulea. Hedwig in sepibus. ½ Maj. et ½ Jun. Smith. III. app. p. 253.

Loc. nat.

Flor.

9. Verna.

Diandria Monogynia.

Veronica.

* Spicatæ

9. V. spuria. L.

10. V. maritima. L. Schoeller n. 6. ad Salam, ad Albam Dum. Jul. Spicæ laxiores.

11. Ver. longifolia. L. Schoeller n. 7. in Dumetis. Jul. Aug.

12. Ver. spicata. L. Schoeller n. 8. in Sicc. Jul.

13. V. offic. L. Hencari in sylvis. 1/3 maj. et 1/4 Jun. Sinn. III. p. 253. Schoeller n. 9. in sylvaticis Dum. Jul.

* Corymboso-racemosæ

14. V. aphylla.

15. ~~L~~ Veron. fruticulosa.

16. ~~alpina~~ Veron. alpina.

17. V. serpyllifolia. Henari. in graminos. Maii. 1/3 Apr. et Maj. Brün. ~~III~~ III. app. p. 253.
Scholler n. 10. in graminos. maio.

18. V. Beccabunga. Henari in riuulis puteorib. 1/3 Maij — Jul. Brün. III. appt p. 253.
Scholler n. 11. in fossis Jun. Jul.

19. V. Anagallis L. Henari. in riuulis et in undatis. Jun. Jul. Brün. III. p. 253.
Scholler. n. 12. In foss. Jun. Jul.

20. V. scutellata. Henari. in oliginos. 1/2 Jun. et 1/4 Jul. Brün III. 254.
Scholler n. 13. ad palud. Junio.

21. V. ~~Teucrium~~. Henari. In collinis graminos. Maj. Jun. Brün V. app. p.
Scholler n. 14. Im Büsch gegen Dossheim. Jun.

Diandria Monogynia.

22. V. supina facie Teucrii pratensis. Lob. hanc Wilrich habet. An chamædrys spuria angustifolia. H. A. 3. p. 285 ? Reich.

23. Ver. pilosa. L.

24. V. prostrata. L. Scholler. n. 15. in graminei. mihi. Calyc. 5-fid.

25. V. montana. L.

26. Ver. Chamædrys. L. Henau in prat. ½ Maj et ½ Jun. Trim. III. p. 252. Scholler. n. 16. in pomariis, pratis. mihi.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diandria Monogynia.

27. Ver. austriaca. ♃.

28. V. latifolia. ♃.

* *. Pedunculis racemosis.

29. Ver. agrestis. Jenaer. In agris, arvis. April et ½ Maj. Schm. III. 254.
Scholler. n. 17. in aridis. April. Ejusdem. Calycina foliola aequalia ovata.

30. V. triphyllos. In arvis et collibus Jenaer. ¼ April. et ½ Maj. Schm. III p. 255.
Scholler n. 18. in campis. Aprili. Calycina foliola lanceolata inaequalia. Caules erecti. Corolla calyce minor.

31. Ver. hederaefolia. ♃. In agris, arvis Jenaer. April. et ½ Maj
Schm. III. p. 254
Scholler. n. 19. in aridis Jenaer. Aprili. Maj.

32. Ver. hispidum. ♃. In arvis. Jenaer ½ April et ¼ Maj. p. 252
Schm. III. p. 255.
Scholler. n. 20. in agris. Aprili.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diandria Monogynia.

33. Ver. verna . L. Schreber. n. 21. In sterilibus. martio. Aprili. Caulis erectus hirtus.

34. V. acinifolia ♂. romana L.

35. Ver. acinifolia. L.

Gratiola . VII.

36. Gr. officinalis . L. Schreber. n. 22. In pratis humidis. Jul. Aug.

Pinguicula . VIII. a.

P. vulgaris

P. alpina.

Utricularia . VIII. 6.

37. Utricularia vulgaris . L.

Verbena. IX.

38. V. offic. Linn. Rth. Aug. et Huber Monac. Linn. IV. p. 255. Scholler. n. 23. Auf dem Angern am 9. Oct. Jul. Aug.

Lycopus. X.

L. europæus? L. In ripis et fossis. Jul. et Aug. Linn. III p. 255. Scholler n. 24. an fossas. Bibl.

Rosmarinus XI.

R. offic. ?

Salvia. XII.

S. sp officinalis?

S. Horminum sylvestris quinta altera species Clus. (Willich)

p. 10.

Diandria Monogynia.

Salvia. Sylvestris L. Schöller n. 25. In silv. mtn. aestate.

S. pratensis L. In pratis fertilibus Maj. et Jun. Jenae Sect. III p. 256. Schöller n. 26. Ad margines agrorum. Junio.

S. Verbenaca L.

S. verticillata L.

S. glutinosa.

Diandria Digynia.

S. Solarea. L.

Sol. Aethiopis. L.

Circaea. XIII.

C. lutetiana. L. in nemoribus, praesertim juxta rivulos. Jul. et Aug. Prim. III. app. p. 256. Scholler. n. 27. Im Wald über d. Eck. Hoverbach. Neudenroth.

C. alpina L. in solo humido, raro in sylvis et nemoribus. rarr. Glenau. ½ Jul. et Aug. Prim. III. app. p. 256. et V. app. p. 139.

B. Digynia

Anthoxanthum. XIV

A. odoratum. L. In pratis, cerioribus, montanis, passim. Maj. Glenau. Prim. III. p. 256. Scholler n. 28. Auf den Angern im April. Maio.

p. 12.

Triandria Monogynia

Cl. III. Triandria.

O. Monogynia.

Valeriana. XV.

V. dioica L. In virgultis. Ya Maj – Jun. Hexam. Enum. III. p. 257. Schaller. n. 29. In humidis. Mart. Comm. Lichenum.

V. officinalis. L. In nemoribus et dumetis. Yo Jun. et Jul. Enum. Hexam. III. p. 257. Schaller n. 30. Ad tyrfos. Jun.

V. tripteris. L.

V. montana L.

V. celtica L.

Triandria Monogynia.

Valeriana saxatilis. L.

V. elongata.

V. Locusta ol. storia. In cultis et arvis. ½ April et ½ Maj. Hfenwi. Fasc. III. p. 257.
Locusta olitoria fructu simplici. In campis Nobilior. Schreber. n. 235. Rau-Hünzhorn, Ackerfallat.

V. dentata. Mich. In agris ad Hfenwi Jul. Aug. Fasc. III p. 257.

Crocus. ~~Iris. XVI~~ XVI.

~~4.~~ Crocus vernus.

Triandria Monogynia.

Iris. XVII.

I. germanica ♃. In ruderib. 2/3 maj. prost. Linn. III. p. 58.

I. variegata. ♃.

β I. pumila.

* * Imberber.

I. pratens. angustifol. humilior C. B. (Wilck)

I. Pseudacorus. ♃. Scholler. n. 32. In fossis circa maj.

Iris sibirica. L. In pratis. Mus. Scholler. n. 33.

I. spuria. L.

I. graminea. L.

Gladiolus. XVIII.

Gled. communis. L.

Polycnemum. XIX.

Polycnemum arvense. L. Scholler n. 34. In campis. Jul. Aug.

Triandria Monogynia.

~~Cyperus~~ Schoenus. XX

Cyp.

+ Culmo teretiusculo

Sch. Marisc.

Sch. nigricans.

++ Culmo triquetro.

Sch. compressus.

S. albicans. Scholler n. 35 in paludibus Turingiae. Jun. Jul.

Sch. spicis geminis obtusis. Hall. (An ad hanc spectat?)

Cyperus. XXI

C. flavescens. L. In virginia et Carolina. Jul. et Aug. Linn. III. p. 258
Scholler n. 36. In paludibus. Jun. Jul. gallum Engenuus

C. fuscus. Scholler n. 37. in paludib. Jun. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Triandria Monogynia.

Scirpus. XXII.

* Spica unica.

Sc. ~~calyculatus~~ palustris. L. In inundatis et praesertim humidiusculis. ½ Maj. ad ½ Jun. Sterm. III. p. 258. Scholler. n. 38. in ~~palustri~~ humidiusculis. Maj.

Sc. caespitosus. L. Scholler. n. 39. in depressis turfosis. Maio.

Sc. capitulis equisch ~~terminibus~~ caschinis et habitionibus ett Rayp Hall. p. 319.

Sc. acicularis L. Scholler. n. 40. In inundatis. ☉ Iulio.

Sc. fluitans. L.

p. 18)

Triandria Monogynia.

\+ ** Culmo teretiusculo, polystachio.

Sc. lacustris. ♃. In stagnis est forsit ⅓ Jun. et ⅓ Jul. Henan. 5 vir. III. p. 258. Scholler n. 41. In palud. Lyc. Mus.

Sc. Holoschoenus. ♃. Scholler n. 42. In arenos. aestate. raro.

S. australis ♃?

S. setaceus. ♃. Scholler. n. 100 c. In addendis. In humidis arenosis. Jul. Lyc.

Juncus parvus montanus cum parvis capitulis luteis. Mors. (Willich) An huc? ☿. An Sc. caespitosus ♃?

Triandria Monogynia.

*** Caule triquetro, paniculis foliaceis.

S. maritimus.
Var. γ et δ Linn. Jenaei γ. in ripis et δ. in inundatis. vbrug 4 Jun. et 1/4 Jul. Trim. III. app. p. 258.
Scholler n. 43. in fossis aquae. Varietas minor spicis omnibus distichis offendit quoq. Scholler.

S. sylvaticus. ♂. In ripis et fossis. 1/2 Jun. 1/4 Jul. Trim. Jenens. III. p. 259. Scholler n. 44. in alneis Junio.

Scirpus (planifolius) spica disticha. Hall. Cat. Goett. p. 86. Carex montanus, spica compressa, disticha. Jacq. flor. Jen. p. 524. Jenaei in inundatis. 1/2 Maj. post. Trim. III. app. p. 259.

Eriophorum. XXIII.

E. vaginatum.

E. polystachion. ♂. Jenaei in uliginosis. 2/3 Maj. prior. Trim. III. p. 259. Scholler. n. 45. In aquidis Maj.

Nardus. XXIV.

N. stricta. ♂. Scholler n. 46. In aggeribus Jun.

Triandria Digynia.

B. Digynia.

Panicum. XXV.

* Spicata

P. verticillatum. ♃. In hortis et agris. Aug. et 1/2 Sept. Prim. V. app. p. 139. Scholler. n. 47. In hortis inter olera. Aestate.

P. glaucum. ♃. Scholler n. 49. In campis post messem. Jul. Aug. Pedunculo valde sulcatus. Spicula, ubi spica matura est, semper lutea sunt s. fulva, et semina majora, quam P. viridi.

P. viride. ♃. In collis, agris, colliby. Jul. Prim. Hoffmann. III. p. 259. Scholler n. 48. In campis. Aestate. Simillimum verticillato, sed molle est, nec aspernum digitis sursum ductis. Spicula saepe purpurea.

P. Crus corvi. ♃.

P. Crus galli ♃. in agris, collib 1/6 Jul. Aug. Hoffmann. Prim. III. p. 260. Scholler n. 50. Ab Augusto. Julio. Inflorescentiae magis multiflorae, i in humidis longius aristatae

Triandria Digynia.

P. dactylon. L.

* Paniculata.

P. miliaceum. L.

Digitaria. XXVI.

D. sanguinalis Mihi. Flenaci in cultis et collium arenis. Ruppert. Brun. III. p. 260. Scheller n. 51. In arenosis sterilibus, inter olera. Vaginae glabrae, vel pilosae. Spicae.

Alopecurus. XXVII.

A. pratensis. L. in pratis. ½ Maj. et ½ Jun. Flenaci. Brun. III. 260. Scheller. n. 52. In pratis et versus Maj. Jun.

A. agrestis. L.

A. geniculatus. L. Flenaci in pratis humidis et fossatis Jun. et ½ Jul. Brun. III. p. 260. Scheller n. 53. Ad fossa et [illegible] Jun. Jul.

A. paniceus. L.

Alop. ? Gram. myurum, spica molli candicante villosa. Lichtenb. habet Willich.

p. 22.

Triandria Digynia

Phleum. XXVIII.

Ph. pratense. L. In pratis, arvis & collibus. ½ Jun. & ½ Jul. Sturm. III. p. 260 Schreber n. 54. In pratis ubique.

Phl. alpinum. L.

Ph. nodosum L. In collibus lapidoso solo. ½ Jun. & ½ Jul. Jenani Sturm. V. p. 139.

Ph. f. Bromen typhoides spicatum alterum. C. B. (Willich) est Phl. nodosum Lin.

Phalaris. XXIX.

Ph. canariensis. L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Triandria Digynia.

Ph. phleoides. L. In vineis et pascuis. 2/3 Jun. post. Jenaui. Trin. Jenaui. III. p. 261.

Ph. arundinacea. L. In ripis. 2/3 Jun. post. Jenaui. Trin. ib. ead. Schuller n. 55. ad horsar. Jun.

Ph. oryzoides. L.

Milium XXX.

Mil. effusum. L. Jenaui in nemoribus. 2/3 Jun. prior. Trin. ib. ead.

Agrostis XXXI.

* Arista

Agr. spica venti. L. In agris cum pestibus cognitus. Jul. Jenaui Trin. III. p. 261. Schuller n. 56. In agris et vestitis. Jul.

Agr. arundinacea L. In sylvis ad rivulor. Jul. Sriñ. III. p. 261.

Agrostis subuniflora d. cr: sist Henari in versuris editum et pascuis suburba: vir. ½ Jun. et ½ Jul. Sriñ Fl. Henar. suppl. in Nov. Act. A. N. C. Tom. V. app. p. 139.

Agr. nebra L.

A. canina L.

** Mutica

Agr. caespitosa. Henari In sylvis pascuis versuris. Jul. Sriñ. III. p. 262. Scoller. n. 57. In versuris, pumariis, pratis. Julio.

Agr. alba L. Scholler. n. 58. ad fossas. Augusti.

A. minima L.

Agr. spicata (Willdenow)

Dactylis. XXXII.

D. glomerata. In pratis vestris vallis undertor. Jenn. Hencker Syn. III. p. 262. Schreber n. 39. In graminetis Jenn. Jul.

Stipa. XXXIII

S. pennata. Schreber. n. 60. In viridar. aureis.

S. juncea. ♂. Schreber n. 61. Ad viar. Civ. Jenn. Jul.

Aira. XXXIV.

~~* Mutica~~

A. aquatica. In aquatis Jul. Hencker Syn. III. p. 262.

A. subspicata. ♂. ~~** Bifloda~~

p. 26.

Triandria Digynia.

Aira caespitosa. In pratis fertilis. amoenior. ♃ Jun. post. Jenae. Linn. III. p. 263. Scholler. n. 62. In pratis Jul.

A. flexuosa. L. In sylvis et pascuis. ♃ Jun et Jul. Jenae Linn. III. p. 263. Scholler. n. 63. in sylvarum. Jun. Jul.

A. montana.

A. alpina. L.

A. canescens. Scholler n. 64. In sterilibus, arenosis. Jun.

A. praecox. L

A. caryophyllea. L. Henari in collibg arenos. ☉ Jul. prior. Srim. V. opp. p. 139.

A. varia. Jacq.

Melica. XXXV.

M. ciliata. L. in comitg. ☌ Jun. prior. Henari Srim. III. opp. p. 263

M. nutans. L. in nemoribg Henari ☌ maj. post Srim III. p. 263. Schreber n. 65. In dthn. Mau.

M. coerulea. L. In rhizinosis et pratis humidiusculis Aug. Henari Srim. III. p. 262. Schreber n. 66. In feuchten Holz und Bergwies. Aug.

p. 28.

Triandria Digynia.

Briza. XXXVI.

B. minor.

B. media. In prat. pasc. versus. Ilfenau Jun. Trim. III. p. 264. Scholler n. 67. Einige Zweige kürzer, Jun.

B. Eragrostis. L.

Poa. XXXVII.

P. aquatica. L. Ilfenau in ripis Schotterr 1/3 Jul. 1/3 Aug. Trim. III. 263 Scholler n. 69. In fossis Jun.

P. trivialis. L. ~~In pratis vestitis paludosis Jun. Trim. III. p. 262~~ Scholler n. 69. in pratis, ad vias. tota aestate. Flosculi apice colorati, magis flavi quam in reliquis. Spicula sepius bifiora.

Triandria Digynia.

P. angustifolia. L. In pratis ad versum Jun. Jenaei Schrb. l. c. ead Schöller n. 70. In hortis, pratis. mai. Jun. Anthera flava. Panicula oblonga, conferta, vel fere imbricata appropriatur.

P. pratensis. in sylvis pratis versuris. Jun et ½ Jul. Schrb. l. c. Schöller n. 71. In pratis aliis. Jun. Anthera coerulescentes. Numerus staminum varius.

P. annua. L. In aultis pratis inundatis. aestate. Jenaei Schrb. l. c. Schöller n. 72. In hortis et ad viar. ~~aestate~~. per totum annum. Ramuli bini ex eodem loco. Spicula ~~hexandria~~ binis, 4 and 5.

P. Eragrostis. L.

P. rigida. L.

P. compressa. L. in collibus et arvis. Jenaei ½ Jun. et Jul. Schrb. III. p. 264. Schöller n. 43. In variis. Jul. Spicula septenis sexfloris.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Triandria Digynia.

~~P. compressa. L.~~

P. nemoralis. L. Jenaï in sylvis et nemoribus suburbanis. Jul. Schm. III. p. 264. Scholler n. 74. Im Bingmer Lützsch. Jul. Damit Schm vel plures eredi. Spiculae bi- vel biflorae, gracilitate, quam congenerum. Stamen terenum, proreum.

P. barbosa. Scholler n. 75. in umbr. opaca.

P. distans. L.

P. cristata. L. In versuris, pascuis, collibus Jun. prop. Jenam Schm. III. p. 262. Scholler n. 76. Auf dem Jungen Grund monstrosissim. Jun. Anthera purpurea. Varias spiculis illustrat. glabris.

Poa n. 1465 et 1468. et nunc Aperia Jenaï. ind. Schm. flor. Jenens.

Sr. pratense paniculatum etc. Schkuhr. p. 289. est Trichium Hudsoni in Cumeras. (Willich)

Gr. loliaceum, paniculis multiplicibus et spiculis. Mant. 2. Rot.
et Poa Hallen. in Enum. (Willich)

Gr. Schreb. p. 184. n. 2. (Willich)

Gr. Schreb. p. 156. n. 1. (Willich)

Gr. Schreb. p. 207. (Willich)

Festuca. XXXVIII.

* Panicula secunda.

Fest. ovina. L. In collibus, rupibus, passim. 1/6 Maj. ad 1/2 Jun. Enum
Henan. III. p. 265 Schall Cr. n. 77. In vestris arid. Jun. Jul. ad Aug.
Spiculae 4- ad 5-florae.

Fest. vivipara. Willkrio.

F. rubra. ♃. Schuller n. 78. wächst zum Gebirgen bey der Hirzyn. Jun. Jul. Fest. caule simplici, sed maior, fol. latioribus. Culmg intra panicularum scaber. Color maturitate ruber.

F. brunäder. (von der Willich) Hzenari in sicris argillosis. ½ Jul. vid. Schm. V. p. 140

F. duriuscula. ♃. in pratis et pasc. exsiccis ½ Jun et ½ Jul. Hzenari Schm. III. p. 265. Schuller n. 79. In muris. Jun. Aehrchen 4–7 flora. Rami setiformi remoti breues.

** Panicula aequali.

Fest. decumbens. ♃. in pascuis ½ Jun et ½ Jul. Hzenari Schm. V. p. 140.

F. elatior. ♃. in pratis et versus Hzenari ½ Jun. et ½ Jul. Schm. III p. 265. Schuller n. 90. In graminein mai. Jun. Aehrchen breuissima. Corollae sub-seriis 6–9.

F. fluitans. ♃. Hzenari in inundatis et fossis. ½ Maj et ½ Jun. Schm. l. rudo c. Schuller n. 81. In fossis vbiq. Aestate. Semina, grana nuda.

Bromus. XXXIX

Br. secalinus. in pratis, messis ½ Jun. post. Henari Schm. III. p. 265 Scholler n. 82. Inter segetes. Jun.

Brong Hall. n. 1506. Henari excl.

B. mollis. (Nicht völlig) Scholler. n. 83. In graminosis. Maj.

Br. inermis. L. et Triticum Hall. n. 1432. Juxta vias vario Henari. ½ Jul. prior. Schm. V. p. 141. Scholler n. 85. Inter Hordeum Cynosur. Jun. Jul.

B. sterilis. L. Henari in agris siccioribus, arvis, collibus Jun. Schm III. p. 265. Scholler n. 84. Ad sepes. Jun.

B. arvensis. L. In siccioribus et dumetis. Jun. Jul. Henari. Schm. III. p. 266. Scholler n. 86. Ad margines agrorum. Jun. Folia supra pubescentia pilis albis. Spicula supra grisea, subtus viridia, 10-flora.

B. tectorum. L. In muris et ad vias publicas. ¼ Jun. et ½ Jul Schm. V. p. 121. Scholler n. 87. Ad muros Universitatis. Maj. Panicula secunda patens, matura fructu ad terram deflexa. Spicula glaberr. 5. Iota planta sapius purpurea color.

Br. giganteus. L. in locis umbrosis 2/3 Jul. Jenaei Sinn. V. p. 141.
Schuller n. 88. In Sylvis. Aug.

Br. pinnatus. in collibus 1/2 Jun. post. Jenaei Sinn. III. p. 266.
Schuller, n. 89. Jul. Spicula teretes, villosa, aristis ex apice glumarum ortis.

var. β. Br. Schreberi. p. 36.

Br. asper. Murray. Jenaei in agris, aris, crasperi. 1/2 Jul. ant. Sinn V. p. 121.

Bromus (Triticum) Hall. n. 1432. Jenaei in nemoribus et sepibus. Jul. Sinn. V. p. 121.

~~Br. f. Br. Micranum ch. Schr.~~

Avena. x L.

A. elatior. In pratis. Jenaei. 1/2 Jun. 1/6 Jul. Sinn. III. p. 266.
Schuller n. 90. In graminetis. agrisque. In Sollia sub nomine Rygrass cohit.

A. fatua. L. in agris segetis aestivis crebrius. Jenaei. Jul. Sinn. V. p. 142. Schuller n. 91. Inter segetes crebrius. Aestate.

Triandria Digynia. Arundo.

A. pubescens. Jenaui. In pascuis. 2/3 Jun. et 1/4 Jul. Prim. V. p. 142. Schuller n. 92. In aggeribus siccis. Jun. Jul.

A. sterilis. L.

A. flavescens. Jenaui vix pratis, versus alnum. 1/6 Jun. et 1/4 Jul. Prim. III. p. 266. Schuller n. 93. Jun. Jul.

A. pratensis. L. Jenaui in pascuis et coll. 1/4 Aug. et 1/5 Jun. Prim. III. p. 266. Schuller n. 94. In siccis. Jun. Aliae longe, nigrae.

Arundo. XLI.

A. phragmites. L. Jenaui in fossis et riuulis. Aug. Prim. III. p. 267. Schuller n. 95. In fossis et stagnis. Aug.

p. 36

Triandria Digynia. — Triticum.

A. epigejos. L. Schreber n. 96. Jul. Corolle aristata.

A. Calamagrostis. L. Henari in vdis sylvarum. rarr. 1/6 Jul. et 1/2 Aug. Prim FV. app. p. 128. Schreber n. 97. Jul. Aug.

A. laxum i-flora, et imo dorso aristata. Granen sessilia, paniculata contracta pyramidati. in A. Auerberg aristatum Schlegeri. Hall. emend. et auctar. in Act. Helv. V. p. 42. n. 121.

A. arenaria. (Host Willich) In arenosis. Gm. Scholler n. 98.

~~Latium. XLII.~~

~~L. perenne.~~ Triticum. XLII.

1) Triticum repens. Henari in agris et versuris. Fl. 2/3 Jul. Prim. III. p. 268. Schreber. n. 99. In agris, hortis, versuris. Jul.

~~L. tenulentum.~~

2) T. f. Sr. latifol. &c. Schreb. p. 4. (Willich)

β. Sr. latifol. - spica spicata diversa. C. B. (Willich)
~~L. spicis medio laxioribus. Linn.~~

3) T. junceum. L.

Triandria Digynia.

Hordeum. XXIII.

Hord. murinum. L. in ruderatis et versus. æstate. Jenaci Sturm. III. p. 267. Scholler n. 100. ad viar. et sepes. Jun. Jul.

H. cylindricum. Mattuschka. est Elymus europæus. Lin. Jenaci in memoriby. 2/3 Jun. Sturm. III. p. 267.

H. secalinum. Schrebero. Jenaci in pratis fertilioribus. 2/3 Jun. Sturm. V. p. 121. Scholler n. 100 β. In versuris. Jun. Jul.

Elymus.

E. caninus. L. in ~~versuris~~ sumetis Jenaci. varie. Jul. Sturm V. p. 142. Scholler n. 101. ad sepes. Jul. Nullum simile Tritico repens; sed radix fibrosa, non reptans vaginosa, vt in illo. denique arista saepius spicula sua multo longioribus.

Fl. Br. Schmidt. p. 9. no. 7. (Walkäh)

E. europæus. L. est Hordeum cylindricum Mill. Sturm. Hordeum

Lolium. XLV.

L. perene. In pratis, vestis, viridariis, Jun. Jul. Hennari Prim. III. p. 267 Scholler. n. 102. Ad vias, versuras. estate.

L. temulentum. L. In agris, presertim hordeaceis. Hennari Jun. Prim. III p. 267. Scholler n. 103. inter segetes. Jun.

L. specie mediis. latioribus. Linn.

Lolium Hall. n. 1418. Hennari in pratis. Jul. Prim. V. p. 142.

Cynosurus. XLVI.

C. cristatus. in pratis, pascuis, vestis. Jul. Prim. Hennari III. p. 268. Scholler. n. 104. Ad vias. Junio.

C. durus. L.

Triandria Trigynia.

C. coeruleus. ♃. In collibus et montibus Hennai. raro. Aprili. Prim. III. p. 268.

C. Trigynia

Holosteum. XLVII.

H. umbellatum. in agris, areis, ad hr. ½ Apr. et ½ Maj. Hennai. Prim. III. p. 268. Scholler n. 105. ad vias. Aprili. May.

Montia. XLVIII.

Montia fontana. In fontibus. raro. Jul. Hennai Prim. III. 268 Scholler. n. 106. In rivulis. Maio.

Tetrandria Monogynia.

Cl. IV. Tetrandria.

A. Monogynia.

Globularia. XLIX

Glob. vulgaris. L.

Gl. cordifolia.

Gl. nudicaulis.

Dipsacus. L.

D. fullonum. In versuris, curtis, suderatis. ♃ Jul et Aug. Jenaer Sem. III. p. 269. Scholler. n. 107. ad viar. Jul. Aug.

D. laciniatus.

Tetrandria Monogynia.

D. pilosus. L. In nemor. et dumet. Jenae. Aug. 5tim. III p. 269. Scholler n. 108. Jul. Aug.

Scabiosa. L I.

* Corollulis 4-fidis.

Scab. succisa. In marginib. sylvar. et nemor. ¼ Aug. et ½ Sept. Jenae. 5tim. III. p. 269. Scholler. n. 109. In subhumid. Jul.

Sc. arvensis. L. In prat. herbid. et versus. ¼ Jun — Aug. Jenae. 5tim. l. c. Scholler n. 110. Ad margines agrorum. Jun.

Sc. sylvatica. L.

** Corollulis 5-fidis.

Sc. columbaria. L. In collib. et pascuis. fl. ½ Jul. et Aug. Jenae. III. 5tim. III. p. 269. Scholler n. 111. In aridis editis. Jun. et Sept.

Sc. graminifolia. L.

Sc. ochroleuca. Schöller. n. 112. In versus sicor. Jul. et Aug.

Sc. pannonica (Willich)

Centunculus. L II.

Cent. minimus.

Plantago. L IV.

* Scapo nudo.

P. major. In pratis, cultis, viarum. Jun – Aug. Flemm. Strm. III. p. 270 Schöller n. 113. In hortis, ad viar. Jun. et Sept.

P. medèa. Ysenari in collis, pratis, versurisq. Sriñ. l. c. flor. estate.
Scholler n. 114. In ambulacris hortorum, ad vias. Mai. Jun.

Pl. lanceolata. c. priori fere estate. Ysenari Sriñ. l. c.
Scholler n. 115. Ad vias, agror. Maj.

Pl. alpina.

Pl. maritima. Scholler n. 116. In sabulosis. estate. Adhuc intacta.
Folia in nostris basi parùm lunata.

Pl. subulata.

Pl. cornopifolia. Scholler. n. 117. In arenosis humidis. Estate. Spica ante florescentiam nutans.

xx Caule ramoso. Aug.

Pl. Psyllium L. Schkuhr n. 118. In arenosis finium Marchiae orient. Jul. Caules diffusi, ramosi, fol. ovata.

Pl. cynops. L.

Sanguisorba. L IV.

S. officin. In pratis udis. Jul. Hierac. Trim III. 270. Schkuhr n. 119. In prat. Jul. Aug.

Rubia. L V.

R. tinctorum. L.

Tetrandria Monogynia. Galium

Galium. L VI.

* Fructu glabro.

G. palustre. In uliginosis et turfosis pass. ½ Jul. ad 1½ Jul. Jenaei Prim. III. p. 270. Schreber n. 126. Ad fossas Jun.

G. montanum. L. circa Jenam Prim. V. p. 122. vid. inf. pag. seq. ad marginem.

G. uliginosum. L. Schreber. n. 121. In turfosis. Jun. Perianthia glabra.

G. spurium. L. Schreber n. 122. In campis. glabr. Fructy hispidi, vel glabri.

G. saxatile. L. cum hoc conjungit Galium Hall. n. 717. crescit Jenaei in sylvis locis sublimioribus, ~~et saxa in monte Hasselberg~~ ad saxa ~~in~~ per rivulum inter Cabertz et M. Hasselberg dispersa ⅓ Jun et ¼ Jul. Prim. V. p. 122.

G. verum. L. in vepribus et pascuis. Jenaei Jul. Prim. III. p. 271. Schreber n. 123. Ad vias et vepres. Jun. Jul.

S. Mollugo. L. Hfenarii in sepibus, pratis. Jul. Schin. V. p. 122. Scholler n. 124. ed versurar. Jun.

S. Hybridum. L. Hfenarii in sylvis et nemorib. Jul. Schin. th. V. p. 122.

S. glaucum. L.

S. ~~album vulgare~~. rubrum. L.

S. album vulgare. F. R. H. (wildich)

~~xx~~ Fructu hispido.

S. boreale. L. Hfenarii in collib. dumosis. ½ Jun. Jul. Schin. III. p. 271. Scholler n. 125. In pratis. Mai. Jun.

circa Hfenarii crescunt

1) Galium Hall. n. 713. Schin. in virgultis et fossis. mar. ½ Jun. et ½ Jul. th. Schin. V. p. 122.

2) Galium Hall. n. 715. in collib. et pascuis. ½ Jun. et ¼ Jul. Schin. V. p. 122.

3) Galium Hall. n. 714. in collib. et umbrosis. mar. ¼ Maj. et ½ Jun. quod est juxta Hallerum Sal. montanum. L. Schin V. p. 122.

S. rotundifolium. L. et Asperula hirsuta. L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

5. Asparine. ♃. in cultis et ad sepes ubique Aprili Maj et Jun. Prim. III. p. 272. Scholler n. 126. In Kyburg, cultis Irchnerv. Maj. Jul.

Asperula. ♃ VII.

A. odorata. in nemoribus Aprili ¼ Maj et ⅛ Jun. Prim. III. p. 272 Scholler n. 127. rarig. Mai Jun.

A. arvensis. in agris ¼ Jan. Aprili Prim. l. c. Scholler n. 129. In campis circa Kyburg. Jun. Jul.

A. tinctoria. ♃. Scholler n. 129. ejusdem.

A. cynanchica. ♃. in coll. et pasc. raro. ¾ Aug. et ⅛ Sept. Prim. loc. III. p. 272.

A. laevigata. ♃. Scholler n. 130. Ufer terminor Fur. Barb. in sylvis Brüg Nöthig. Jun.

p. 48.

Sherardia. LVIII.

Sherardia arvensis. ☌. in agris et agris Jenae. Jul. et Aug. Sturm. III. 272. Schkuhr. n. 131. in versuris. Jun. et Sept.

Trapa. LIX.

Tr. natans. ☌.

Cornus. LX.

C. mas. Cornus sativa s. domestica. J. B. hist. I. p. 210. Jenae sponte. ½ Febr. ad ½ Mart. Sturm. III. p. 273. Schkuhr n. 132. In sepibus. Febr. Mart.

C. sanguinea. ☌. Cornus foemina. J. B. hist. I. p. 214. In comprimis collibus sepes constituit. ½ Jun. Sturm. l. c. Schkuhr. n. 133. Maio.

Camphorosma. LXI.

C. monspeliaca. ☌.

Tetrandria Digynia.

Alchemilla. LXII.

A. vulgaris. L. In pratis, præsertim sylvaticis. ½ Maj – ½ Jun. Hsenari Prim. III. p. 273. Scholler n. 134. In hortis botan. pertinea, in stratis nondum inventa. Jun.

A. alpina.

Elæagnus. LXIII.

E. angustifolia.

B. Digynia.

Cuscuta. LXIV.

C. europæa.

β. major. in cultorum sepibus rarius. ½ Jul. et Aug. Hsenari. Prim. III. p. 273. Scholler n. 135. vhap. Art.

Aphanes. LXV.

A. arvensis. L. In agris et arvis collium. ½ Maj. – Aug. Prim. III. p. 273. Scholler. n. 136. in campis Eschae.

Tetrandria Tetragynia.

C. Di Tetragynia.

Ilex. LXVI.

I. Aquifolium. L.
Joh. Bank. Hys. T. I. P. 2. p. 114.

Sagina. LXVII.

S. procumbens. In arvis et ruderatis. ½ Maj — Aug. Schm. III. p. 274.
Scholler n. 137. misit Sam. Angyr. Hab. Jun. Jul. Flor. ajectatis et evulsatis varia.

S. erecta. Jenae in pascuis. rarius. ½ Apr. post. Schm. l. c.

Potamogeton. LXVIII.

P. natans. L. in stagnis ½ Jun. et ½ Jul. Jenae. Schm. III. p. 274.
Scholler. n. 139. In stagnis Jun.

P. perfoliatum. L. Scholler. n. 139. In stagnis Jun.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

P. densum. L.

P. lucens. L. Scholler. n. 140. Subaqua. Jun.

P. crispum. L. Hetmi in fluviis ⅔ Fuck. fasc. Crim. III. p. 274
Scholler. n. 141. in stagnis. Jun. Maj.

P. serratum.

P. compressum.

P. pectinatum. Scholler. n. 142. In fossis et paludi. Jun.

P. setaceum.

P. gramineum.

P. marinum. L.

P. pusillum. ♃. In sylva die schwarze Pfütze. circa Henau. rarr. ½ Jul. et ½ Aug. Prim. III. p. 274. Scholler. n. 143. in paludibz. Dun. Caudic. et sph. capillacea, planta tamen totalibz longitudine.

P. ramosum angustifolium C.B. (Wilich. Sed nonne P. setaceum Linn.? Reich)

Class. V. Pentandria.

I. Monogynia.

Cerinthe. LXIX.

C. maior

β. maculata.

C. minor ♃.

Echium. LXX

Ech. vulgare. Henau in cribis, rumpis, arvis. Jul. Prim. III. p. 274. Scholler n. 144. in cribis, rumpis, arvis. Jun. Jul.

Pentandria Monogynia.

Heliotropium. LXXI.

H. europaeum.

Pulmonaria. LXXII.

P. angustifolia.

P. officinalis. fol. maculato essen maculata. a. bey der Johanniskirche variis. β in nemoribus. Spicil. Prim. III. p. 275. Fl. mac. et non maculato circa Marburg. circa Oberschaefen in Sumsis. Spicil. Nebel diss. sol. I. p. 15.

Lithospermum. LXXIII.

L. officin. L. Schuller. n. 145. ad Dumeta. Jun.

L. arvense. L. in arvis et agris collium. ½ Maj – Jun. Spic. III p. 275. Schuller. n. 146. in collib. ubiq. Majo et Sept.

L. purpureo-coeruleum. L. In collium Dumetis. ½ Maj – ½ Junii Henae Prim. III. p. 275.

Onosma

Flora

Germaniæ

Liber II

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Monogynia.

Onosma. LXXIV.

O. echioides. L.

Symphytum. LXXV.

S. officinale. L. In pratis humidiusc. ½ Maj – Aug. Flemm. Prim. III p. 275. Schuller. n. 147. capsulis S. K. purpureo. Aestate.

S. tuberosum. L.

Borago. LXXVI.

B. offic. in finetis, cultis. rar. Jul. Prim. III. 275.

Lycopsis. LXXVII.

L. vesicaria. L.

L. pulla. L. Schuller n. 148. ad margines agrorum. Maj et Aug

L. arvensis. In agris. Jul. Aug. Hevaei. Prim. III. p. 276.
Schkuhr. n. 149. in agris, ostatt.

Asperugo. LXXVIII.

A. procumbens. Schkuhr. n. 150. In ruinis. Majo.

Cynoglossum. LXXIX.

C. offic. L. in ruderatis, arvis, circa pagos. Maj. et Jun. Prim III. p. 276. Schkuhr. n. 151. In arvensis Maj. Jun.

C. apenninum. L.

C. Omphalodes. L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Monogynia.

Anchusa. LXXX.

A. off. L. Scholler. n. 152 in ruderatis copiose. Jun.

A. angustifolia. L.

Myosotis. LXXXI.

M. arvensis. in arvis, agris, nemoribz. Maj - 7bris Jenaui Sturm. III. p. 276. Scholler. n. 153. a. in agris. copiose.

M. palustris. in fossis et rivulis. Maj - Jun. Jenaui Sturm. l. c. Scholler. n. 153. b. ad fossas. copiose.

M. lappula. L. Scholler. n. 154. A mauer rarius. Jun. Jul.

Cortusa. LXXXII.

C. Matthioli.

p. 4.

Anagallis. L. XXXIII.

A. arvensis fl. ſtrenue. et coerul. in agris, agris, arvis. Jul. Henrici Strim. III. p. 276. Knaf, Schkuhr. n. 155. in hortis, campis, agris, ceſtate. Exsiccat hor. v. obdormit post meridiem.

A.

Lyſimachia. L. XXXIV.

L.

+ Pedunculis multiflorus.

L. vulgaris. L. in ripis. ½ Jul. et ½ Aug. Henrici Strim. III p. 277. Schkuhr. n. 156. am Elbdamm ahlis caprisc. Jul. Aug.

L. thyrſiflora. † ad foſſas. Jul. Corolla ad baſin parvita, interjectis dentibus brevioribus, apicibus petali flavo punctatis. Flores ſecus caulem ſecundam diviſi. Schkuhr. n. 157.

++ Pedunculis uniflorus.

L. punctata.

L. nemorum Henrici in nemoribus et ſylvis crescunt. Jul. Aug. Henrici Strim III. p. 277.

L. Nummularia. In nemor. et prat. humidulis, ad ſepes. Jul. Strim. l. c. Schkuhr. n. 158. ad foſſas caprisc. Jun. Jul.

Pentandria Monogynia.

Cyclamen. LXXXV.

C. europaeum.

Soldanella. LXXXVI.

S. alpina. L.

Primula. 87.

P. veris In pratis siccis. editis. ½ tpr. ad ½ Maj. Jenae. Sturm. III. p. 277. circa Marburg. Hebel. Disp. Obs. p. 14 Scholler. n. 159. Aprill.

P. elatior in nemoribus. ¾ Aprill ad ½ Maj. Jenae Sturm. l. c.

P. acaulis L.

P. farinosa.

P. auricula.

P. minima

P. integrifolia.

Androsace. 88

A. maxima.

A. elongata. Non Willich. Schull. n. 150. in arenosis. primo vere. c. d. Schreb.

A. villosa.

A. lactea.

Pentandria Monogynia.

Hottonia. 89

H. palustris. Scholler n. 154. in fossis. maj. Jun.

Menyanthes. 90.

M. trifoliata. in paludibus et riginos. ½ Maj – Jun. Hexaur Srim. III. p. 277. In pratis paludosis. maj. Nebel. Dissert. I. p. 27. Scholler n. 162. in pratis riginosis copiose. Maj.

Convolvulus. 91.

C. arvensis. in agris. ¼ Jul. et Aug. Hexaur. Srim. III. p. 278. Scholler n. 163. In altis et agris rig. Jun. et Sept.

C. Sepium. in ruris sepibus, salicetis. Hexaur. Aug. et ¼ 7br Srim. l.c. Scholler n. 164. in dumetis et sepib. Jun. Jul. Foliorum margo fuscus.

Datura. 92

D. Stramonium. ☌ In sinetis et ruderatis. ruriss. ½ Aug. priore. Srim. Hexaur. III. p. 278. Scholler. n. 165. In ruderatis Jul. copiose. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 8.

Hyoscianus. 93.

H. niger. In hortis, viaticis, praesertim pagorum. Tun. Aug. Zeneri Prim. III. p. 278. Scholler. n. 166. in viaticis ubiq. Prim. Jul.

Verbascum. 94.

V. Thapsus. an gemein Lungen wort. Tolmütsch Wurtzel 3te Beschreibung. 1766. p. 2. et Zeneri in sylvis cedruis et viaticis. ½ Jul. et Aug. Prim. III. p. 278. Scholler. n. 167. am Feldbaum et alibi vigore. Jul. Aug.

8. 9. Geschlecht d. Pflanzen

V. phlomoides. α. Tolmütsch Wurtzel am Rhein u. Lauterbrunn. Tolmütsch Wurtzel 2te Beschreibung. p. 9. Scholler. 168. in asperis Prim. Jul.

V. Lychnitis. β. Tolmütsch Wurtzel am Rhein. Tolmütsch Wurtzel. Zweyte Beschreibung. p. 9.
β. fl. albo. Tolmütsch Wurtzel am Rhein. Tolmütsch Wurtzel. Zweyte Beschreibung. p. 9.
Zeneri. in collibus et campis. rariss. ½ Jul. et ¼ Aug. Prim. III. p. 279.
Item Scholler. n. 169. Kunz Allem zugsin. Prim. Jul.

V. nigrum. Tolmütsch Wurtzel am Rhein. Tolmütsch Wurtzel 2te Beschreibung. p. 10.
In sylvis cedruis et viaticis. Zeneri Jul. et ¼ Aug. Prim. III. p. 279.
Scholler n. 170. ad viam Jul. Aug.

P. phoeniceum. Scholler. n. 171. Gyhalt.

V. Blattaria. In Feldern um Nidda. Polemonium Wiesen 2 Stunden
p. 10. Schkuhr. n. 172. am Polemonium Aug. Jul.

Polemonium. 95.

Polemonium coeruleum

Azalea. 96.

A. procumbens.

Vinca. 97.

V. minor. In nemoribus. flor. ½ Sept. ad ½ Maj. Hedwigi Sem. III. p. 279.
In sepibus prope Hanau, Maj. Marburgi Weigel Hist. veg. p. 24.

Solanum. 98.

S. Dulcamara. L. in ripis. Hedwigi rare. ½ Jun. ad Jul. Sem. III. p. 279.
Schkuhr. n. 173. in sepibus Jun.

S. nigrum L. In fimetis, viridaribus, cultis. ½ Jul. ad finem Sept. Hedwigi. Sem. III. p. 279.
Schkuhr n. 174. a acinis nigris S. luteis a. in cultis, viridaribus. S. huius Monographiae apud Linnaeum copiose. Schkuhr Hdb.

p. 10.

Physalis. 99.

Ph. Alkekengi. in collibg et vestur. raro. ½ Maj. et Jun. Jenae. Sturm III. 280. Schkuhr. n. 175. ad muros coquitur. Jun.

Atropa. 100

At. Belladonna. in sylvis [illegible] et nemor. ½ Jun. — Octbr. Sturm. Jenae. III. p. 280.

Samolus. 101.

Sam. Valerandi. Schkuhr. n. 171. in fossis. Jul. Aug.

Phyteuma. 102.

Ph. paucifl[ora].

Ph. comosa. ♃.

Ph. orbicularis. in pratis humidis ½ Jun. et ½ Jul. Jenae. Sturm. III. p. 280.

Pentandria Monogynia.

Ph. spicata. in nemor. et pratt. sylvaticis. ½ Maj. et ½ Jun. Henaei Prim. l.c.

Campanula. 103.

* Foliis lanceolatis angustioribus.

C. pulla. L.

C. rotundifolia. L. In pratt. et pasc. praesertim editior. ½ Jul. ad finem Augusti v.s.g. Henaei. Prim. p. III. p. 280. et Camp. Hall. n. 701. vid. Prim. V. p. 123. Schreber. n. 177. Prim. Gmel. et alibi copiose. Jun. seq.

C. patula. L. Schreber n. 178. ex Jacq. Flores parvi. Calyx ad basin laciniarum striis denticulo viridi. Caules diffusi.

C. Rapunculus. L. In vepretis et pascuis. Jul. et ½ Aug. Henaei. Prim. III. p. 281.
β. Camp. nemorosa angustifol. parva fere. Rupp. Henaei in pratis, pomariis. ½ Maj et ½ Jun. Prim. III. p. 281. et V. p. 123. separat Prim.
Schreber. n. 179. In graminetis Maj. Jun.

C. persicifolia. L. In sylv. et nemor. ½ Jun. ad Aug. Henaei Prim. III. p. 281. Schreber. n. 180. in sylvaticis Jul. Aug.

p. 12.

Pentandria Monogynia.

~~C. alpina Jacq.~~

C. ? Rapunculus Sylv. umbellatus Thal. (Willich)

++ Foliis foetidis cauliniis

C. rapunculoides. In agris et cultis. Jul. et ½ Aug. Jenaci. Schm. III. 281.
Schuller n. 181. In declivib. agris. Julio.

C. Trachelium. In nemor. et sylvis. ½ Jun. et Jul. Schm. l.c.
Schuller n. 182. in Dumetis. Jun. Sept.

C. glomerata. in pasc. et coll. rarus. Jul. Schm. l.c.
Schuller. n. 183. in siccis graminosis. Aestate.

C. Cervicaria. in nemoribus rarius. ½ Jul. Aug! Jenaci Schm. III. p. 282.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Monogynia. Lonicera.

C. thyrsoidea.

*** Capsulis obtectis calycibus fructu reflexis.

C. Medium.

C. alpina.

C. Speculum

C. hybrida.

Lonicera. 104.

* Periclymena caule volubili.

L. Caprifolium.

Pentandria Monogynia.

L. Peridymenum. In sepib. in sp[illegible]rea? Jul. et ½ Aug. Jenae Schm. III. p. 282.

** Chamaecerasa pedunculis bifloris.

L. nigra.

L. Xylosteum. In dumetis, sepib. nemor. ½ Maj. prop. Jenam. Schm. III p. 282.

L. pyrenaica.

L. alpigena.

L. coerulea.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Monogynia.

Rhamnus. 105. (L. sp. 279)

R. catharticus. J. B. hist. T. I. Part. 2. p. 55. In rumpis, collibq. ½ Maj et ⅙ Jun. Helvet. Polygamia dioeca. Brün. III. p. 282. Schreb. 164. in sepibus et dumetis. Maio.

R. saxatilis.

R. alpinus.

R. Frangula. Helvet. in nemoribq. Maj. et ⅙ Jun. Brün. III. p. 282. Alnus nigra baccifera. J. B. hist. I. p. 560. Schreb. n. 185. in dumetis. Maj.

R. Paliurus. L.
J. B. hist. T. I. pg. 2. p. 35.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 16.

Evonymus. 106.

E. tenuifolius L. Venat. in Scriby. raw. Mss. ol. 1/2 Jun. Hum. III. p. 283. Tetrandria. Monogynia.
Evonymus minor &c. J. B. hist. T. I. P. 2. p. 201/19
Schulter n. 186. ad Lyc. Mss. (Ac. catalogus v. 2 Lich.)

E. latifolius L. J. B. hist. T. I. P. 2. p. 202.

E. vernaculus. Scopoli.
Evonymus sive pulvereus? J. B. T. I. P. 2. p. 203.

Vitis. 107.

V. vinifera.

V. lacinosa. L.

Pentandria Monogynia. Ribes.

Ribes. 108.

* Ribesia inermia.

R. rubrum. In cultorum sepibus. Spontaneum? ⅓ Apr. et ½ Maj. Jsenari Schm. III. p. 283. Schkuhr n. 187. in dumetis Aprili.

R. alpinum. In sepib. et dumet. ¼ Apr. et ½ Maj. Jsenari. Schm. l.c. Fruct. dioicus.

R. nigrum. In ripis. rarius. ¼ Aprili. et ½ Maj. Schm. l.c. Schkuhr. n. 188. Aprili. Maj.

** Grossularia aculeata.

R. reclinatum.

R. Grossularia. in ripis collibus raro. ¼ Aprili et ¼ Maj. Schm. III. p. 287. Schkuhr. n. 189. in sepibus et dum. Bav. Mart. Aprili.

R. Uva crispa. In ripis, muris, collibus. Aprili. Jsenari. Schm. l.c. Schkuhr n. 190. in sepibus. Mart. Aprili.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(p. 18)

Hedera. 109.

H. Helix L. in sylvis nemorosis Helvetiae. Oeder. Flor. Dan. III. p. 284. Schuller. n. 191. ad muros. Tigur.

Var. β. hederaceo; foliis C. B. in sylvis vulgaris Helvetiae. Flor. Dan. V. p. 123.

Illecebrum. 110.

verticillatum. Schuller n. 192. in agris arenosis. Jul. Aug. Calyx aliquando.

Glaux. 111.

Gl. maritima. In salinis Curiae Rhaetorum. Jun. Flor. Helvet. III. p. 284. Schuller n. 193. ad fossas Cuy Döbeln. Jun.

Thesium. 112.

Th. Linophyllum.

Th. alpinum. Helvetiae in M. Frisolberg passim. rarius. Jul. Flor. Dan. V. p. 285. t. Thesium Hall. n. 1574. β. Thesium alpinum. Schuller. n. 194. in editis ante. Maio.

113 In Thesiis duobus, paniculato et helvetico, vidi in multis exemplis confirmari A. Jacquini annotationem, sessile nempe helveticum habere flores 4-fidos, cui italicum illud erectum et linifolium flores habeat 5-fidos. Quae in planitie Helvetiae, ea passim sunt 5-fida flore. Credas adeo 3 species esse; alpinam, flor. 5-fidis, ramis laxis, spectantibus, 4-fidis; helveticam, quae et in M. Weisner Hassiae, et in Altenfelsberg Turingiae provenit, etiam 5-fido flore, fol. flaccidis, petiolis elongatis; et italicam foliis linei, acutis, duriusculis, neque flaccidis, petiolis ramosis multifloris, in paniculam dispositis. Neq. dubitarem de hac disquirenda a prima, nisi media intercederet, quae facie priorem, flore posteriorem, imitatur. Hall. emend. comm. in Act. Helv. T. V. p. 309. n. 16.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Digynia.

B. Digynia.

Asclepias. 113

A. Vincetoxicum. In rothby. i/s maj. et s/s Jun. Zenari Sum. III. p. 284. Schuller n. 195. in dumeto. Jun. Jul.

Swertia. 114.

S. perennis.

Gentiana. 115

* corollis quinquefidis subcampanulatis.

G. lutea.

G. purpurea.

G. asclepiadea.

G. Pneumonanthe. Schuller. n. 196. in editis humidis. mai. Octob.

G. acaulis.

** Corollis 5-fidis infundibuliformibus

G. verna.

G. pumila.

G. bavarica.

G. rhiniloſa.

G. Centaurium.
a) minor. in pratis exſiccatis, paſcuis. raro. Jul.) Henari. Prim. III. p. 284.
b) ramoſiſſ. in pratis humidis. Jul. ad 1/3 Aug.
Schuller n. 197. Major et minor ramoſiſſimum. in humidis Jul. ad Sept.

G. amarella.

Gentiana Hall. n. 651. Henari in paſcuis raro. Prim. V. p. 123. 1/3 Aug. ad Sept. Oct.

*** Corollis non quinquefidis.

G. ciliata. Im Hügelichten. ad. J. F. Hayne. p. 2. Henari in collibus ramoſiſſ. raro. 1/3 Aug. ad 1/2 Sept. Prim. III. p. 285.

S. Cruciata. In Cyn[illegible] v. [illegible]zw. Zwen Zoll[illegible]. p. 2. In collib circa Henam rariss. 1/2 Jul. pr. Spic. III. p. 285.

S. filiformis.

Salsola. 116.

S. Tragus.

S. kali cum Ks Wilrich Scholler n. 198. in arenos. an Dur Elbe finden Magdeburg Gegend.

Chenopodium. 117.

~~Ch.~~

~~Chenopr~~ Fol. angulosis.

Ch. Bonus Henricus. In finetis, cultis, ruderatis. 1/2 Maj. ad finem Sept. Spic. III. p. 285. Scholler. n. 199. in ruderatis. asperate.

Ch. urbicum. Scholler n. 201. [illegible]

Ch. suborum. Henari in cultis, ruderatis, hinc inde rare. Aug. Spicilegii III. p. 285. Scholler. n. 201. in stagnis exsiccatis. Aug.

Ch. muratle. Inter olera frequens. Jul. Scholler n. 202. Caules patuli; fol. ovata glabra argute dentata.

Ch. album. In cultis, agris, sinetis. Tota aestate. Hennari, Sinn. III. p. 286. Scholler n. 203. inter segetes et olera copiosiss. Aug. Planta matura albicans. Racemi recti, cylindrati; floris alterni, sessiles, confertis.

Ch. viride. In viridariis, sinetis, cultis. ½ Jul. et Aug. Hennari. Sinn. III. p. 286 Scholler. n. 204. Inter olera vbiq. affine nimium C. albo. Caulis viridis, angulis purpurascentibus. Folia ramea lanceolata, integerrima, vix vno alterove dente. Racemi subformes, densi, longi, nudi. Calyces fructy angule pentagoni. Folia tenera vere inter olus venduntur.

Ch. hybridum. Mense pr. Mar. ½ Jul. et Aug. Hennari. Sinn. l. c. Scholler. n. 205. Inter olera. Jul. Aug.

Ch. Botrys.

Ch. glaucum. in sinetis et viridar. Hennari. raro. ⅕ Jul. et ½ Aug. Sinn. III. p. 286. Scholler. n. 206. ad sinesa. Jul. Aug.

** Folijs integris.

Ch. Vulvaria. In sinetis et viridar. rarissime. ⅕ Jul. et ⅓ Aug. Sinn. l. c. Scholler n. 207. in campis. Jul. Aug.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch. polyspermum. In cultis, versus. raro. ½ Jun. et Jul. Jenae Brin. III. p. 286.
Schreber. n. 208. inter dem copiose. Estate.

Ch. maritimum. Schreber. n. 209. ad salinas in Dulzn. copiose aestate.

Herniaria. 118.

H. glabra. In pasc. ad campos. raro. ½ Jun. et Jul. Jenae Brin. III. 286.
Schreber. n. 210. in arenosis frequens. Jun. Jul.

Ulmus. 119.

Ul. campestris. J. B. hist. T. I. P. 2. p. 139. duo ulmorum genera in Germania. Tul. p. 140. In sylvis Jenae ½ Mart. et ½ Apr. Brin. III. p. 287.
Schreber n. 211. in tumulis et sylvis. Apr. Varietas longioribus foliorum et seminum petiolis. Hupp. Den. p. 330. caput non frequens est, et a rustis Rüsterbaum appellat. Cortex crassis, hic, imo maiora, lignum non tam durum, ac in ulmo.

Eryngium. 120.

E. planum.

E. campestre. In campis. rarius. Aug. Brin. III. p. 287.
Schreber. n. 212. inter Jenam Apoldam. Jul.

E. amethystinum.

Hydrostyle. 121.

H. vulgaris. Schaller. n. 213. In humidis. Jun. Jul.

Sanicula. 122.

S. europaea. In nemoribus. ½ maj. pyst. Hesari Prim. III. p. 287.
In Zinzendr Hofg. Schaller. n. 214. Maj. Jun.

Astrantia. 123.

A. major.

Astr. minor.

Heracleum. 124.

H. sphondylium. In pratis et pomariis. Hesari Jul. Aug. Prim. III. p. 287.
Schaller. n. 215. im Hofgarten am Jordan. Julio.

H. angustifolium.

H. Panaces.

H. austriacum.

Oenanthe. 125.

O. fistulosa. In fossis pratorum. ¼ Jun. et Jul. Hsenari. Prim. III. p. 288 Schuller. n. 216. in fossis et fagar. Jun. Partium universale nullum.

O. pimpinelloides.

Caucalis. 126.

C. grandiflora. Hsenari in agris et arvis. ⅕ Jun. et ¼ Jul. Prim. III. p. 288.

287. C. latifolia. In agris collium. ⅓ Jun. et ⅙ Jul. Hsenari. Prim. l. c.

C. leptophylla. In agris collium. ½ Jun. et ½ Jul. Prim. Hsenari. l. c. In agris Galliae. Schuller. n. 217.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 26

Pentandria Digynia.

Daucus. 127.

D. Carota. In agris. Jul. et Aug. Sturm Flenar. III. p. 269. Scholler. n. 218. an hibernum et alibi capiose. Sem. Jul.

Tordylium. 128.

T. maximum. Scholler. n. 219. rarius. ejusd.

T. Anthriscus. In nemor. sep. dum. Jul. et 1/2 Aug. Flenavi Sturm. III. p. 288. Scholler. n. 220. non hibernum et alibi capiose. ejusd. Sem. asperum et flores nutantes. at alius embellatis. Nam similitudinem fructus Dispingunt.

Laserpitium. 129.

L. latifolium. In agris collibus. dumetis. Jul. prius et raro Flenavi Sturm. III. p. 290.

L. trilobum.

L. gallicum.

L. angustifolium. L.

Pentandria Digynia.

L. pruteniam. In Sylvarum humidis. rarius. ♃ Fol. pr. Henan. Linn. III. p. 290. c. descript.

L. Siler.

Peucedanum. 130.

P. officinale. Schreber. n. 221. in portis Fol.

P. Silaus. In prat. humidis. rare. Aug. Linn Henan. III. p. 289. Schreber. n. 222. frequens. Fol.

P. alsaticum.

P. fol. duplicato-pinnatis, pinnis longis linearibus. dissitis. Linn.

Ammi. 131.

A. maius.

Conium . 132.

C. maculatum . in cultis, viarum, ad sepes. Jul. et Aug. Jenae. Krim. III. p. 289. Schuller n. 223. in viarum et cultis frequens. Jul.

Bunium . 133.

B. Bulbocastanum.

Athamanta . 134.

A. Libanotis . In collibus sumosis. ½ Jul. et ½ Aug. Jenae. Krim. p. III. p. 289.

Ath. Cervaria . Ibid. in all. sumos. ½ Aug. et ½ Sept. Krim. l. c.

Ath. Oreoselinum . Schuller. n. 224. in pratis, glareosis. Jul.

A. cretensis.

Pentandria Digynia.

Ath. Neum.

Bupleurum. 135.

B. rotundifolium In agris editioribus. ½ Jun. et ½ Jul. Jenaei. Schm. III p. 289. Scholler. n. 225. in hortis inter olera, copiose.

B. longifolium. In collib. duriusc. A. nemor. raro. ½ Jun. et ½ Jul. Schm. Jenaei. III. p. 290.

B. falcatum. In collib. suburbanis. Jenaei ½ Jul. et Aug. Schm. l. c.

B. odontites.

B. rigidum.

B. tenuissimum. Scholler. n. 226. In sicc. Jul. Aug. Involucr. 5-phyllum, breve. Involucella setacea, brevia. Umbellulae axillares, parvae. Flores lutei.

p. 30.

Pentandria Digynia.

Sium. 136.

S. latifolium. Schreber. n. 227. in fossis aquosis. Jul.

S. angustifolium ? nonnum Hb Willich.

S. nodiflorum. In rivulis et fossulis. ½ Jul. et ½ Aug. Henari. Prim. Fl. p. 291. Schreber. n. 228. ad paludos. Jun. Sept. Quorsum universale sese dest.

S. Falcaria. in agris editioribus. ½ Jul. et Aug. Henari Prim. l. c. Schreber. n. 229. ad margines agrorum, et inter segetes vbiq. Jul.

Selinum. 137.

S. Sylvestre.

S. palustre. Schreber. n. 230. Jul. Fol. sat lac. fundunt. Foliola terminalia elongata!

S. Chabraei. Grantz.

S. Carnifolia. L. In nemoribus editis graminea. ℞ Jul. et Aug. Flora. Germ. III. p. 197. Scholler in. 231. in Dumetis. Helv.

S. Seguieri ? non Wilbrich. R.

S. austriarum Jacq. (Wilbrich)

S. argenteum. Grantz.

S. rad. fusiformi multiplici, involuero universali amplissimo Hall. (Wilbrich) Nonne S. sylvestre? R.

L. austriacum. Ligusticum. 138

Angelica. 139.

A. sylvestris. In pratis humidiusc. Aug. et Tk Sept. Trim. Flenar. p. 291. Scholler. n. 232. in Dumetis Jul. Aug.

Sison. 140.

S. inundatum.

Aethusa. 141

Æ. Cynapium In cultis agris, frimetis. Jul. et Tk Aug. Trim. III. p. 292. Scholler. n. 235. Inter olera. efbafe.

Coriandrum. 142.

C. sativum.

C. testiculatum.

Pentandria Digynia.

Scandix. 143.

Sc. odorata ♃ Willich.
Myrrhis sem. profunde sulcatis maximis. Hall. Suett. Odorata Riv. Rupp.) Myrrhis hirsuta fol. maculatis Cicutaria dicta Tungern. Myrrhis perennis, sem. striato, alba major odorata. Mons. Volpam. Norimb. Herb. Mill. Ulmens. Myrrhis magna semine longo sulcato. Raj. Hist. I. p. 431. Hist. B. 3. Part. 2. p. 77.

Sc. Pecten. ☉ in agris. ¼ maj. ad ½ Jun. Prim. III. p. 291. Schkuhr. n. 234. in agris cognita. Maio.

S. Cerefolium. In cultis et sepibus aliquando quasi sponte. maj. ad ½ Jun. Hsenac. Prim. III. p. 291. Schkuhr. n. 235. ad vias passim. Maio.

Sc. Anthriscus. Schkuhr. n. 236. Maio.

Chaerophyllum. 144.

Ch. sylvestre. In pratis, pomariis. ½ maj. ad ½ Jun. Hsenac. Prim. III. p. 292. Florem flosculi sterilem, ut sequentes. Prim. Schkuhr. n. 237. cognita. maj. Jun.

Ch. bulbosum. In nemoribus et cultis domestic. raro. ½ Jun. ad Jul. Hsenac. Prim. l. c. Schkuhr. n. 238. in duabus ad vias. frequens. Jun.

Ch. temulum. In sudetis, nemor. sepib. ½ Jun. ad Jul. Hsenac. Prim. l. c. Schkuhr n. 239. Ad vias frequens. aestate.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch. hirsutum. In ripis et pratis humid., sylvaticis. ½ maj. et ¼ fum. Jenae.
Prim. III. p. 292.

Ch. arvense.

Ch. aureum. Venne Mayenfeld. minder. Bad. Weilach.
Jenae in pratis, ad septa passim. ⅔ fum. et fol. Prim. III. p. 292. et V. p. 123.

Phellandrium. 145.

Ph. aquaticum. In stagnis et fossis. Jul. et ½ Aug. Jenae Prim. III. p. 293.
Scholler. n. 240. in fossis et stagnis. Jun.

Ph. Mutellina.

Imperatoria. 146.

I. Ostruthium.

Seseli. 147.

S. glaucum.

S. annuum. Scholler. n. 241. In jumbi Sylvatior. Jul. Segg.

S. tortuosum.

S. Hippomarathrum

S. pyrenæum.

S. saxifragum. Scholler pag. 307. Addit Pimpinellam tenuifolium Rivini in Sylvatior, Jul. Aug.

S. selaninder. Jacq. (Wilhich)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 36.

Pentandria Digynia.

Cicuta. 148

C. virosa. In aquosis ratisb. Jul. Scholler. n. 242.

Carum Carvi. 149

~~C. maculatum~~

C. Carvi. In pratis et pomariis. Maj. Schm. III. p. 294. Scholler. n. 243. in pratis vicin. Maj. Jun.

Pastinaca. 150

P. sativa. In pratis, ruderatis, arvis. Jul – ½ Sept. Januari. Schm. III. p. 297. Scholler. n. 244. in pratis estate.

Anethum. 151.

A. graveolens. In sepibus, cultis, ruderatis, quasi sponte. Jul. et ½ Aug. Schm. III. p. 297. Scholler. n. 245. in olerac. estate.

A. Foeniculum.

Aegopodium. 152.

Ae. Podagraria. In cultis, sepibus. ½ Jun. et ¼ Jul. Januari Schm. III. p. 297. Scholler. n. 246. ad sepes, in humosis agrisque. Junio. Ex herba verno tempore olus paratur.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Apium 153.

A. graveolens Schreber. n. 247. in Forsk. Julio.

Pimpinella 154.

P. Saxifraga. Jenaei in pascuis, versimo, rotibus. ½ Jul – ½ Sept.
Jenaei. Prim. V. p. 124. Schreber. n. 248. in Sept. Jun. Jul.

P. magna. Jenaei in pratis exsiccatis et pascuis. Jun – 7½ Aug.
Prim. V. p. 124. Schreber. n. 249. am Engpaß an d. Leina Wiesen
allen. Jul.

P. dioica. erst Pimp. pumila Vahl. et Seseli pumilum. Lin. spec.

Pentandria. Trigynia.

~~Viburnum. 155.~~

C. Trigynia

Viburnum. 155. (Lin. sp. p. 393)

V. Lantana. F. B. I. P. I. p. 557. In colliby dumosis. raro. ½ Maj. pro. Hayne III. p. 294. Pedunculi apice hispidi. Schm.

V. Opulus. Sambucus Rhia. F. B. hyl. I. p. 557. Hayne in sepibus humidis. ½ Maj. 8½ Jun. Schm. III. p. 294. Schkuhr. n. ~~252~~ 251. in dumetis. Majo.

β. fl. pleno. Sambucus rosea. F. B. hyl. T. I. P. I. p. 553.

Sambucus. 156.

S. Ebulus. F. B. hyl. I. P. I. p. 549. Schkuhr. n. 251. In sepibus. Jul.

S. nigra. F. B. hyl. T. I. P. I. p. 544. In sepibus et cultis. Jun. et ½ Jul. Hayne. Schm. III. p. 295. Schkuhr. n. 252. ad agros frequens. Jun.

S. racemosa. F. B. hyl. T. I. P. I. p. 551. In nemoribus raro. ½ Maj. pro. Hayne Schm. III. p. 295.

Pentandria Trigynia.

Rhus. 157.

Rhus Cotinus.

Staphylea. 158

S. pinnata. Staphylodendron. H. B. I. p. 274. In dumetis rariss. sponte quoq. Prim. III. p. 295.

Tamarix. 159.

T. germanica.

Alsine.

A. media. In cultis, arvis, agris. April — October. Flemm. Prim. III. p. 295. Scholler. n. 253. In hortis et cultis ubiq. toto anno.

~~Pentagynia.~~

Corrigiola. 160

C. littoralis. Scholler. n. 254. In arenosis. Insula Asseln.

Pharnaceum. 161.

Ph. Cerviana.

p. 40.

D. Tetragynia.

Parnassia. 162.

P. palustris. In uliginosis, et prat. humidiss. Aug. et Sept. Gsenac. Grim. III. p. 295. Scholler. n. 255. in humid. Aug.

E. Pentagynia.

Hue pertinet Crassula. 163. a

Cr. rubens, dum sedum refert.

Linum. 163. b.

L. usitatissimum. * Fol. alterna. Scholler. n. 256. inter segetes parcius. effusa.

*

L. hirsutum.

L. tenuifolium.

L. maritimum.

L. alpinum.

Pentandria Pentagynia.

L. anglicum

L. flavum.

ger.

** Folia oppositis.

L. catharticum. In pasc. et prat. mont. Jul. et Aug. Flor. Suec. III p. 296. Scholler. n. 257. in graminos. stabe.

L. Radiola. Scholler n. 258. in agris arenosis humidis. stabe.

Sequitur Drosera.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Horae
Germanicae
Liber III

1775

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentandria Polygynia.

Drosera. 164.

Dr. rotundifolia. in uliginosis et obscuris rarius. Flenei Fl. Srim III. p. 296. Scholler. n. 259. in turfos. aestate. var. maj. et minor.

Dr. longifolia.

Statice. 165.

St. Armeria. Scholler. n. 260. in aridis exiguis. sola aestate.

I. Polygynia.

Myosurus. 166.

minimus. In agris. 1/6 April et 12/5 maj. Flenei Srim. III. p. 296. Scholler. n. 261. in agris. Maio.

Hexandria Monogynia.

Class. VI. Hexandria.

I. Monogynia.

Loranthus. 167.

L. europaeus.

Berberis. 168.

B. vulgaris. In sylvis, sepibus, saltib. raro. ½ maj. post Junii III. p. 297. Jacquin. B. Lyc. Fl. Pl. 2. p. 52. Schkuhr. n. 202. in sepibus. maj. Jun.

Leucoium. 169.

L. vernum. In nemoribus. Martio. Jacquin. Junii. III. p. 297.

L. autumnale.

Galanthus. 170.

G. nivalis.

Hexandria Monogynia.

Narcissus. 171.

N. odorus.

N. pseudo-narcissus. (Nr. bl Willich.) Hennaci in pomariis passim. ½ mart. et ¼ April. 5tus. III. p. 297.

Allium. 172.

* Fol. caul. plana. Umbella capsulifera.

A. Ampeloprasum.

A. Victorialis.

** Fol. caul. plana. Umbella bulbifera.

A. sphaerocephalon. Scorodoprasum. Schöller. n. 2063. Hegnesir. Jun.

A. ~~descendens~~ carinatum

Allium stam. alterne bifidis, capitle bulbifero; fol. ova-minoris ciliatis. Hall. Baum. (Willich) (Nonne All. arenarium. L)

p. 4

*** Fol. caulina teretia. Umbella capsuliferа.

All. Sphaerocephalon.

All. descendens L.

A. flavum.

A. vineale. Scholler. n. 264. in versum. Jul.

A. oleraceum. Henari in nemoribus, collibus, agris sterilioribus. ½ Jul. et ½ Aug. Brem. V. p. 124. est Hall. n. 1223. Scholler. n. 265. in versum. Julio. Culmus bi- et tripedalis, non striatus. Spatha diphylla, longa, tubulata: valvula altera in folium sessile longissimum excurrente. Fol. pistillum. Scholl.

**** Fol. radicalia. Scapus nudus.

A. senescens.

A. angulosum. Henari in nemoribus partim nudis, collibus. Augusto. Brem. V. p. 124. est Hall. n. 1227 β. Scholler. n. 266. in Ansmunder Gipfel. Jul. Scapus

A. vernum In nemoribus editis. raw. ½ Maj et ⅙ Jun. Jenaer Schm. III. p. 298.

A. Schreadgrasum. Schoder. n. 268. no. 268. in Zusammen expirse. Jen.

A. aquaticum C. B. Willich.

H. flava.

Convallaria. 174.

C. maialis. ♃ in nemoribus. ½ Maj. prof. Jenaer. Schm. III. p. 298.
Inser. domest. major. Nurburg. Nebel. Dissert. I. p. 24.
Scholler. n. 268. in nemoribus. Maj.

C. verticillata. In nemor. et sylvis edit v. ⅕ Maj Seg.

C. Polygonatum. In collibj, nemoribj. maj. Jenaci. Prim. III. p. 298.
In silvis Mtg. Marburg. Hessel. Disc. Vol. I. p. 25.
Scholler n. 269. in nemoribj. maiis Maj.

C. multiflora. in nemoribj. raro. ½ maj. et ¼ Jun. Jenac. Prim. III. p. 298.
Scholler n. 270. in nemoribj. Maj.

C. bifolia. in nemoribj edibj. raro. ¼ maj. et ⅙ Jun. Jenaci Prim. III p. 299. Scholler. n. 271. Maj. Jun.

Hyacinthus. 175.

H. comosus.

H. botryoides.

H. racemosus.

Hexandria Monogynia.

Anthericum. 176.

A. ramosum. In collibb. Fid. Henaei Prim. III. p. 299. Scholler n. 272. Jun.

A. liliago. in mpibb raro Vid. ½ Jun. Prim. l. c. Scholler. n. 273. in editis arenosis Heidelb. maj. Jun. Scapo sepe ramoso, sed flores primi majores et stylo recurvato.

A. asphodeloides. pseudo-asphodelus. Willich. (Vide Anth. ossifragum. L. R.)

A. calyculatus. L. (An Anth. pseudo-asphodelus Willich? Reich.)

Ornithogalum. 177.

* Staminibus basi subulatis.

O. luteum. in pratis humidulis, ad sepes. raro. ½ Apr. et ¼ Maj. Henaei. Prim. III. p. 299. Scholler. n. 274. in sepibb. Mart. Aprili.

O. minimum. In agris. April. Henaei Prim. III. p. 299. Scholler. n. 275. in agris. Mart. Aprili. Differt quod minor, et petala habeat acuminatissima; praeipue quod pubescat, cum O. luteum glabrum sit.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 8.

O. pyrenaicum.

O. narbonense. non habet Willd.

** Stam. alterne emarginatis

O. umbellatum. Schreb. n. 276. in gramineis. Mais.

O. nutans. Schreb. in sepibus et gramineis. Mais.

Scilla. 178

Sc. amoena.

Sc. bifolia.

p. 9.

Hexandria Monogynia.

Asparagus. 179.

A. officin. In pratis fertilibus. rarius. Jun. Benar. Enum. III. p. 300. Scholar. n. 278. ad margines agrorum frequens.

Erythronium. 180

E. dens canis.

Vvularia. 181

Vvular. amplexifolia.

Fritillaria. 182.

Fr. Meleagris.

Lilium. 183.

L. bulbiferum.

L. chalcedonicum.

L. Martagon. in nemor. montosis. raro. Jun. prosp. Hesen. Enum. III. p. 300.

Tulipa. 184.

T. Sylvestris.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 10.

Hexandria Monogynia.

Acorus. 185.

A. Calamus. In stagnis. Jun. Jul. Henic. Prim. III. p. 300.
Scholler. n. 279. in stagnis. Jun. Jul.

Juncus. 186.

* Culmis nudis.

J. conglomeratus. In inundatis, ripis. ½ Jul. Henac. Prim. III. p. 300.
Scholler n. 280. in fossis. Jun. Jul. medulla linius et segetum ad lucernas inserunt.

J. effusus. Scholler. n. 281. ad fossas. Jun. Jul.

J. inflexus. Scholler. n. 282. in humidiusculis. apricis. Jul. ab effuso distinguitur paniculæ lateralis longior pedicellata, culmo crescente rigidiore et apice post florescentiam inflexo.

~~J. trifidus~~

J. squarrosus.

** Culmis foliosis.

J. aquaticus. L. Henac in pratis humidis. ½ Jun. et ⅓ Jul. Prim. III. p. 301.
Scholler n. 283. juncus articulatus. ad fossas estate (An sylvaticus? Reich)

J. sylvaticus.

J. bulbosus. Scholler. n. 284. in paschis siegenens. Fun. Rad. obliquum bulbosum. Corymbus coarctatus et partialer inaequales. Capsulae ovatae, fuscae, nitidae.

J. bufonius. Henari in inundatis, nivis, paludibus ½ Jun. et ¼ Jul. Krün. III. p. 301. Scholler. n. 285. in humidis. aestate.

J. Jacquini. Nur bei Wilhich.

J. biglumis.

J. triglumis.

J. pilosus. Henari Jun. sylvis. Jun. et Junio Hall. n. 1327. Henari Krün. III V. p. 124.
Scholler. n. 286. in arenosis aridis. Jun. Flores nutescentes.
~~Henrici pilosus Var.~~

p. 12

J. latifolius. Mihi.

J. niveus.

J. campestris. In pascuis et pratis siccioribus. Henaci 2/3 April et 1/4 Maj. Spic. III. p. 301. Schuller. n. 287. in sterilibus. April. Maio.

J. monanthos. huius Willich. Quid?

Circa Henacum sequi Juncī crescunt.

1/ Junc. Hall. n. 1318. in pratis humid. et inundatis. Jun. Spic. V. p. 124.

Gramen Zizaniae maximum. Willich. est J. maximus Mihi.

2/ Junc. n. 1325 Hall. In nemoribus. 1/2 Mart. et 1/2 April. Spic. l. c.

3/ Junc. n. 1323. in pratis palustribus. 1/4 Jun. et 1/3 Jul. Spic. V. p. 143.

4/ Junc. Hall. n. 1324. In sylvar. montos. humidis 2/3 Maj. post. Spic. V. p. 143.

Peplis. 187.

P. Portula. In inundatis raris. Jul. et 1/2 Aug. Henaci Spic. III. p. 302. Schuller. n. 288. ad fossas. Jul. Aug. Petalis ternis instructa; vidimus tamen petala, sed admodum fugacia et non omnia, sed saepius tantum 1, 2, 3.

Hexandria Trigynia.

B€. Trigynia.

Colchicum. 188.

C. autumnale. Scholler n. 289. in pratis maior. autumno.

Triglochin. 189.

Tr. palustre. Scholler n. 290. in pratis. et Jun.

Tr. maritimum. In pascuis humidis Cujj Vöhm. Jun. Scholler. n. 291.

Rumex. 190.

R. ♀ ♂ Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.

R. sanguineus.

R. crispus. In inundatis, ripis, agris humidiusc. ⅓ Jun. et ¼ Jul. Hessiae Enum. III. p. 303. Scholler n. 292. In olerariis. Jun.

R. maritimus. In inundatis ripis. Jun. — Aug. Hessiae Enum: l. c. In humidis copiose. Jun. Radix nubra. Scholler. n. 293.

Hexandria Trigynia.

R. acutus. In inundatis, rudentibus, cultis. ½ Jun. et ½ Jul. Hoffm. Germ. III. p. 303. Scholler. n. 294. in humidis frequens. Jun.

R. obtusifolius. in cultis, sepibus, inundatis. raro. ½ Jun. et Jul. Hoffm. Germ. III. p. 303. Scholler. n. 295. ad Albim copiose. Jul.

R. conglomeratus. Murray. Hoffm. in ripis et inundatis ¼ Jun. et ½ Jul. Germ. ~~Lin.~~ V. p. 125.

R. anthoxanthus. Murray. (an huc?)

** Hermaphroditi: valvulis grano dentatis, ♂. nudis.

R. bucephalophorus ♀.

R. aquaticus. In ripis raro. Hoffm. ½ Jul. Germ. III. p. 303. Scholler n. 296. in paludibus. Jun. Jul.

R. scutatus. Scholler n. 297. in ad Spinacetum (cum Syngyogyarum) esse.

Hexandria Polygynia.

R. *** Floribus dioicis.

R. alpinus.

R. Acetosa. In pratis, pomariis, versario. ½ Maj. et ½ Jun. Jenaeri Enum. III. p. 303. Scholler. n. 298. Mus.

R. Acetosella. In arvis, pascuis, praesertim collium. Maj. et ¼ Jun. Enum. III. p. 304. Scholler n. 299. in arvis. Maj. et Jul.

Scheuchzeria. 191.

Sch. palustris. Flore fusco-viridi. Jun. in agro Brunsvicensi legit C. A. du Roi, mecum communicavit.

C. Polygynia.

Alisma. 192.

A. Plantago. In inundatis, fossatis, riuulis. Jul. Aug. Jenaeri Enum. III p. 304. Scholler. n. 300. in fossis et stagnis. Jul.

A. natans.

A. ranunculoides. Scholler. n. 301. in stagnis. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Class. VII. Heptandria

Mono[illegible]gynia

Trientalis. 193.

T. europaea. In montium altiorum humidis rar. ½ Jun. ⊙ 1/6 Jul. Jenaci Prim. III. p. 304.

Æsculus. 194.

Æsc. Hippocastanum. Scholler. n. 302. ad plateas urbis. Nov. Dec.

Class. VIII. Octandria.

1. Monogynia.

Epilobium. 195.

* Stam. declinatis

E. angustifolium. In nemoribus editis. Jul. ⊙ 1/5 Aug. Jenaci Prim. III. p. 305. Scholler. n. 303. in silvis Dum. Jul.

** Stam. erectis regularibus, petal. bifidis.

E. hirsutum. In ripis. 1/6 Jul. ⊙ Aug. Jenaci. Prim. III. p. 305 Scholler. n. 304. α. in humidis. Jul.

E. ~~montanum~~ parviflorum. Schreb. Jenaci, ut prior. Scholler. n. 304. β. in humidis. Jul.

E. obscurum. Schreb. Lips.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Octandria Monogynia.

E. roseum. Schreb. 423.

E. mortauum. In uliginosis, sepibus. ½ Jun. et Jul. Hemari Sturm. III. p. 305. Scholler. n. 305. Jul. in editis et juxta fossas.

E. tetragonum. In uliginosis et pratis humidulis. Julio. Sturm. l. c. Scholler. n. 306. ad fossas. Jul.

E. palustre. In pratis uliginosis. Hemari. Julio. Sturm. V. p. 143. Scholler. n. 307. in humidis. Aug. Fol. oblonge dentata. Stip. pedunculata.

Oenothera. 196

Oen. biennis. In ripis rariss. ⅙ Jun. et Jul. Sturm. III. p. 305. In arenosis frequens. Schilde. Scholler. n. 308.

p. 18)

Vaccinium. 197. (Lin. Sp. pag. 498)

* Fol. caducis. s. deciduis.

V. Myrtillus. Vitis idea [redacted] angulosa. H. B. I. p. 520. In sylvis omnibus. ½ April et ½ Maj. Henavi Enum. III. p. 306. Scholler. n. 309. Maj.

V. uliginosum. Vitis idea magna etc. H. B. hist. I. p. 518. An et Vitis idea fr. nigro. Ej. hist. I. p. 519 2.

** Fol. sempervirentibus.

V. Vitis idea. Vitis idea semp. virens fructu rubro. H. B. hist. I. p. 522. In sylvis. Maj et Jun. Henavi Enum. III. p. 306.

V. Oxycoccus. H. B. hist. I. p. 227.

Erica. 198.

E. vulgaris. in collibus, montibus, sylvis. Aug. Henavi. Enum. III. p. 306. Scholler. n. 310. Augusto.

E. Tetralix. Scholler. p. 308. n. 1010. in V. videndis. In graminosis humidis. Hybernicis. Floret hic in ano. Vidi Julio.

E. herbacea s. carnea.

Daphne. 199. (Lin. spec. p. 509)

2. Mezereum. J. B. hist. T. I. P. I. p. 568. In sylvis nemorib⁹ & marit. Alp. Pyren. Hetruriæ Hort. Cliff. p. 386. In sylvis montanis circa Marburg. Dan. Rhod. dis. vol. I. p. 7. Febr. Mart.

D. alpina. non Lt Willich.

D. Laureola. Non Lt Willich.
Laureola sempervirens, flore luteolo J. B. T. I. P. I. p. 564? hæc crescit in sylvis Pyrenæis montosis Germaniæ montanis circa Marburg. Febr. et Mart. Dan. Rhod. Dis. vol. I. p. 7.

D. Cneorum. Non Lt Willich. J. B. hist. T. I. P. I. p. 570.
Flor. allii ex Thesi Lepii Clusius.

Thymelæa minor Cordo J. B. hist. I. p. 570. quid?

Stellera. 200.

St. Passerina.

p. 20

B. Digynia

Moeringia. 201.

M. muscosa.

C. Trigynia.

Polygonum. 202.

* Caespitosa. Spica unica.

P. Bistorta. In pratis editis humidulis. Jun. Henaei Prim. III. p. 306.

P. viviparum.

** Persicaria pistillo bifido, aut staminibus 8.

P. amphibium. In versuris, pratis humidulis. ~~rara~~ ½ Jul. et ⅓ Aug. Henaei Prim. III. p. 307. Scheller. n. 311. var. Ostiis et Vica. Jun. Jul.

P. hydropiper. In riualis, fossulis. Julio. Prim. Henac. III. p. 307. Scheller. n. 312. in aquosis. Jul.

P. Persicaria. in riualis, fort. inundatis. Jul. et ¼ Aug. Henaei Prim. III p. 307. Scheller. n. 313. in oleraceis, agris. Jul. Folia subtus tomentosa. Varietas fol. non maculosis, maculosis et fermè ejusmodi reperiebam; ejusd. flor. albis et rubris.

Octandria Trigynia.

Pd. angustifolium. (-D. (Weihe) ert Hall. Helv. n. 1555. ers. P. persicaria var. d. Habitat circa Henarem. in inundatis arenosis. Jul. et 1/4 Aug. Prim. V. p. 125.

*** Polygona fol. indivisis, spicis octandris.

P. aviculare. in viaticis, cultis, agris. Jul. Aug. Henari Prim. III. p. 307. Scholler. n. 314. in viis, cultis. Jun. Jul.

**** Helxine fol. subrotundis.

P. Fagopyrum. Scholler. n. 315. in agris arenosis. Jun. Jul.

P. Convolvulus. in agris, collibus. Jul. Henari Prim. III. p. 307. Scholler. n. 316. in agris. Jul. Aug.

P. dumetorum. (Non Kit Willich) In sylvis. Aug. 7bris Henari Prim. V. p. 125. Scholler. n. 317. ejusdem.

Polygonum Hall. n. 1556. In humid. Aug. Henar. Prim. V. p. 144.

P. scandens. Willich habet, an intelligit P. dumetorum ? Q.

D. Tetragynia

Adoxa. 203.

A. Moschatellina. Scholler. n. 318. vide dumetor. Marsh. Appl. Capitulum albicans. Flores laterales 5-fidi, centrum numero quinario. Moschi odor.

Elatine. 204.

E. Hydropiper.

E. Alsinastrum.

Paris. 205

P. quadrifolia. In nemoribus. Maj. passim. Herat Linn. III. p. 308. Scholler. n. 319. in flor. April. Maj.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Decandria Monogynia.

Class. IX. Enneandria.

A. Hexagynia

Butomus. 206.

B. umbellatus. In fos. et inundatis. ½ Jul. Hoffm. Germ. Fl. III. p. 308. Scheller. n. 320. in fossis et paludibus circ. Jul.

Cl. X. Decandria

A. Monogynia

Dictamnus. 207.

D. albus.

Ruta. 208.

R. montana. (W. Kit.)

Monotropa. 209.

M. Hypopithys. In sylvis. ½ Jun. et ½ Jul. Hoffm. Germ. Fl. III. p. 308 Scheller. n. 321. in sylvis extra terminos Flor. Barb. in Brandts Gmünd Burg Winnenburg. et alibi. gemein.

p. 24

Decandria Monogynia.

Pyrola. 210.

P. rotundifolia. In sylvis. ½ Jun. pyst. Hexar. Enum. III. p. 309. Scholler n. 322. Alm terminus Fur. Barb. in sylvis ubique circa Lipsiam. Jun.

P. minor. In nemoribus editior. varius. ½ Jun. In M. Hyelberg seniur. Hexaci Enum. III. p. 309. Scholler. n. 323. c. praecedente habitat et floret.

P. secunda. In sylvis. ½ Jun. ad ¼ Jul. Enum. Hexaci III. p. 309. Scholler n. 324. cum praecedentibus habitat. Jun. Jul.

P. umbellata.

P. uniflora.

Ledum. 211.

L. palustre.

Andromeda. 212. (A. sp. p. 563.

A. polifolia.
Viti ideae affinis ex J. B. hist. I. p. 227. An Myrtus cerasifolia thalig? vid. J. B. l. c.

Decandria Digynia.

Rhododendron. 213.

Rh. ferrugineum.

R. hirsutum.

R. Chamaecistus.

Arbutus. 214.

A. Vnedo.

A. Vva vrsi.
Radix adea putata, et vva vrsi. f. B. hist. I. p. 523.

B. Digynia

Scleranthus. 215.

Sc. annuus. In agris arenos. Jun. Jenae. Prim. III. p. 309. Scholler. n. 325. In agris frequens. Jun. Fol. Folia varicosa, viridia; flosculi parvi; calyces acuti, virides.

Sc. perennis. In collibus arenos. Jun. Prim. l. c. Scholler. n. 326. in arenosis Mai. Jun. Fol. crebrisa, incana; flosculi majores; calyces obtusiores albescentes. Huius radici M. Jimio adhaeret Coccus polonicus.

p. 26.

Decandria Digynia

Chrysosplenium. 216.

C. alternifolium. In nemoribus udis. Kyr. Hesperi. Hrin. III. p. 310. Schuller. n. 327. in humidis. Kyrilli.

C. oppositifolium ibidem ½ Kyr. pygl. Hrin. l. c.

Saxifraga. 217.

* Foliis indivisis, caule subnudo.

Saxif. Cotyledon. 1

S. Aizoïa.

S. sedoides. 2

S. stellaris.

Sax: rivalis.

S. Heum.

** Fol. indivisis, caule foliisq.
S. aizoides.

S. autumnalis.

S. rotundifolia.

S. granulata. In collibus, pascuis, nemoribus. ♃ maj. post. Grim. III. p. 310 Scholler. n. 320. maio.

*** Fol. lobatis. Caul. erectis.
S. bulbifera.

S. tridactylites In nemoribus et arvis. Maj. Hesenac. Grim. III. p. 310. Scholler. n. 329. Aprili, maio.

S. petraea.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Decandria Digynia.

S. caespitosa.

~~xxxx~~ Fol. obtusis. Caul. procumbente.
S. hypnoides.

S. repens. — Sypsophila. 218.

S. fastigiata.

S. muralis. in arvis, et colliis humidulis. Jul. et 1/2 Aug. Jenae. Prim. III. p. 310. Scholler. n. 330. in campis Freyburg. Aug. Septembri.

S. saxifraga.

S. officin. In pinis. 1/2 Jul. et 1/2 Aug. Jenae. Prim. III. p. 311. Scholler. n. 331. ad sepes. Jun. Jul. — Saxonaria. 219

S. Vaccaria. in agris, praesert. hordeac. 1/2 Jul. post. Jenae. Prim. l. c. Scholler. n. 332. in agris. Junio.

Decandria Digynia.

Dianthus. 220.

* Flores aggregati.

D. barbatus ?

D. carthusianorum In collib. pascuis. Jun. et ½ Jul. Prim. Hfenac. III. 311. Scholler. n. 333. ad vias Jun. et Aug.

D. Armeria Um Carlsbad. vid. dölenitzer Wasser 3 Meilen gegen Mittag p. 86. In pascuis collibq. Hfenac. ½ Jun. et Jul. Prim. III. p. 311. Scholler. n. 334. In dumetis. Aestate.

D. prolifer. In collib. nudis pascuis. ½ Jun. et Jul. Hfenac. Prim. C. C. Scholler. n. 335. Jul. Aug.

** Flores solitarii, plures in eodem caule.

D. deminutus. (Non habet alium Wilich)

D. Caryophyllus.

D. deltoides. In s. Gegend um Eger. vid. Es dölenitzer Wasser 3 Meilen gegen Mittag p. 79. In pascuis collium Hfenac. Jul. et Aug. Prim. III p. 312. Scholler. n. 336. in Hercyn. Jun. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 30.)

Decandria Trigynia. Arenaria

D. plumarius. In nymph. ½ Jun. pro. Flenr. Prim. V. p. 125.

D. superbus. In sylv. Aug. Flenr. Prim. ~~III~~ III. p. 312.

** Caule unifloro herbaceo.

D. arenarius.

D. alpinus. (Non habet Wilich)

C. Trigynia

Arenaria. 221.

A. trinervia. In nemor. spib. ½ Maj ♃ ½ Jun. Flenr. Prim. III. p. 312.
Schreber. n. 337. Jun.

A. muticaulis.

Decandria Trigynia.

A. serpilifolia. In arvis, editby. ½ Maj. estiv. Jenae. Sturm. III. p. 312. Schaller. n. 336. ad vias et muros. Maj. Juny oder Julius Augustus.

A. rubra. In arvis aliquot. ½ Maj et Jun. Jenae. Sturm. III. p. 313. Schaller. n. 339. ad vias. Julius.

β. maritima. in Salinis Artern ubique, ubi humidiora sunt. Sturm. l. c. In via humida Artern. Schaller. n. 339. β erigitur mane inter horam 9 et 10 ; obdormit inter 2 et 3.

A. bavarica.

A. saxatilis.

A. tenuifolia. In solo argilloso aprico circa Arnstadt prope villam Gefilde. rarius. Aug. Decr. Stam. semp. observavi. Sturm. Flor. Jenae. in V. p. 144.

A. laricifolia.

A. stricta.

A. nodosa ist Willkür quid? Q.

Decandria Trigynia.

Hollaria. 222.

H. nemorum. In nemoribus ad ripulas. ½ Maj. et ½ Jun. Hsenac. Enum. III. p. 313. Scholler n. 340. Jun.

H. Holosea. In nemor. lenib. ½ Maj. post. Hsenac. Enum. III. p. 313. Scholler. n. 341. in dumetis. Maio.

H. graminea. In agris arvisq; collium. ½ Jun. et Jul. Hsenac. Enum. l. c. Scholler. n. 342. Maj. Jun.

H. uliginosa Nunny. Hsenac. in nemoribus udis. ½ Jun. et Jul. Enum. l. c. Scholler. n. 343. in uliginosis. Maj. Jun.

Cucubalus. 223.

C. baccifer. v. Scholler. n. 344. in dumetis. Jul.

C. Behen. In collib. et arvis. Jul. Hsenac. Enum. III. p. 314. Scholler. n. 345. in sitis. Maj. Jun.

C. viscosus.

Decandria Trigynia.

C. Otites. Schreber. n. 346. in sicc. sepem. Maj. et segg. Flores hermaphrodit. saepiy sepem.

C. alpina acaulis. Wilhelm. est Silene acaulis.

~~Cucubalus alpinus, fol. oppositis.~~ Silene

S. nutans. Hennin. in collib. arenos. ½ Maj. ad ½ Jun. Hall. Helv. III. p. 314. Schreber. n. 347. In sylvat. montos. Mai. Jun.

S. conoidea.

S. conica.

S. rupestris. Hennin. in agris. rarius. ½ Jul. Hall. Helv. III. p. 314. Schreber. n. 348. in agris. Jun. vsq. in autumnum.

S. polyphylla.

S. Armeria. Schreber. n. 349. in hortis varius. Maio.

p. 34.

Pentandria Pentagynia

S. rupestris.

S. acaule.

Cherleria. 225.
Cherleria sedoides.

S. Pentagynia.

Sedum. 226.

* Plani folia.

S. Telephium. In rupibus montis. Hercyn. Aug. et 1/2 Sept. Smith. III. p. 314. Scholler. n. 350. in agris humidiusculis. Aug.

S. Anacampseros.

S. Anacampseros maximum. F. B. Willd.

S. Cepaea.

1 –

** Teretifolia.

S. reflexum. Hercyn. in rupibus, collibus. V. p. 176.
Scholler. n. 351. In montosis siccis. Jun. Colitur in hortis nostris et sub nomine Tripmadame ad usculta et acetaria adhibetur.

Pentandria Pentagynia.

S. rupestre. Scholler no. 352. in arid. Jun.

S. album. Scholler. n. 353. ad muror. Jun. Jul.

S. acre in muris, rupibus, collibus. ½ Jun. ad ½ Jul. Hexac. Schr. III. p. 315. varietas in agris collium provenions admodum perennis, insignis et major Schr. l. c. Scholler n. 354. in muris et sterilibus. Jun.

S. sexangulare. Hexandri. In muris, rupibus ½ Jun. ad ½ Jul. Schr. III. p. 315 Hexap. II. Obs. p. 126. Scholler. n. 355. in sepib. Jun. Jul. Sapor non acris. Caules simplices, nec ramosi; fol. ternata vel sexfaria oblique in bicrita; flores in ramo ultimo raro ultra tres.

S. villosum.

Spergula. 227.

Sp. arvensis. in agris, arvis collium. ½ Jun. ad Jul. Schr. Hex. III. p. 315. Scholler. n. 356. in agris vitis Ashe.

S. pentandra. Scholler. n. 357. in arenosis. Aprili Maio. Semillis a arvensi, sed magis glabra, flor. pentandri. Haec vernalis et fugax, illa asstiva et autumnalis, diutius durans. Aegrot. Hallens. Semina S. pentandra sunt orbiculata, comprecta, nigra, margine foliaceo candido cincta. Scholler.

p. 126. Sub

Sp. nodosa. Scholler. n. 358. in arenosis humidis. Jul. Aug.

Decandria Decagynia.

Cerastium. 228.

* Capsula oblonga

C. vulgatum. In agris, collib, arvis. maj. Smith. III. p. 315. Schöller. n. 359. Maj.

C. viscosum. ~~in a~~ Schöller. n. 360. in graminosis. Maio. Simile C. vulgato; sed folia magis lanceolata minora, ovata. Caules pauciores, erecti. Calyces exteriora foliola margine membranacea.

C. semidecandrum. In agris & collib pass. nonnihil Smith. V. p. 126. Schöller. n. 361. In arvis siccis, rupest. April Majo. Filamenta 5 fertilia, 5 antherifera.

C. arvense. In arvis, versus, collibg. 2/3 Maj. et 1/5 Jun. Smith. Hseac. III. p. 315. Schöller. n. 362. April. Maj.

C. dichotomum.

C. alpinum.

* Capsulis subrotundis

C. pilosum.

C. aquaticum. In ripis. 1/2 Jul. et 1/4 Aug. Hseac. Smith. III. p. 316. Schöller. n. 363. ad fossas. Jul. Aug.

Decandria Pentagynia.

~~C. virginicum Killich~~ Lychnis. 229.

L. Githago. In agr. Jul. Sturm. Flenau. III. p. 316. Scholler. n. 364. inter segetes. Jun.

Lychnis. 230.

L. Flos cuculi, in pratis humidis. Flenau ½ Maj et Jun. var. fl. albo et var. fl. pleno. Sturm III. p. 316. Scholler. n. 365. in pratis humid. Maj.

L. quadridentata.

L. Viscaria. in montib ½ Maj et ¼ Jun. Sturm. III. p. 316. Scholler. n. 366. In montosis Sylvaticis. Maio.

L. dioica. In nemoribus, sylv. caeduis et ripis. ½ Maj. ½ Jun – Jul. Flenau. Sturm. III. p. 316. est fl. purpureo var. Scholler. n. 367. in ganz gefüllt. Maj.

Oxalis. 231.

O. Acetosella. In nemor. Apr. et ½ Maj. Flenau. Sturm. III. p. 316. In locis opacis et nemorosis Apr. et Maj. Marburg. Rebel disp. cat. p. 18. Scholler. n. 368. In Sylv. Gmel.

O.

O. corniculata. Scholler. n. 369. inter olera. Jun.

D Decandria Monogynia.

cl. xi. Dodecandria.

1. Monogynia.

Asarum. 232.

A. europaeum. In nemor. Appr. Henr. Prim. III. p. 317. In nemor. montosis, sterilioribus ac autumno. Nebel Dis. inf. I. p. 19.

Portulaca. 233.

P. oleracea. In cultis. raro. Jul. et Aug. Henac. Prim. III. p. 317. Schoeller. n. 370. in deserto. Jul.

Lythrum. 234.

L. Salicaria. In ripis, uliginosis, praesertim humidis, obvium. Jul. et Aug. Henac. Prim. III. p. 317. Schoeller. n. 371. ad fossas et stagna. Jul.

L. virgatum.

L. Hyssopifolia. Schoeller. n. 372. ad stagna frequens. Jul. Aug. et Anthe. rae ad. Petala rugaria.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dodecandria Di- et Trigynia.

B. Digynia

Agrimonia. 235.

A. Eupatoria. in pascuis, collibus versus ½ Jun. et Jul. Hsen. Enum. III. p. 317. Schaller. n. 373. ad versuras agrorum. Jun. Jul.

A. agrimonioides.

C. Trigynia

Reseda. 236.

R. luteola. In campis, ripis, viderabis ½ Jun. et Jul. Hsen. Enum. III. p. 318. Schaller. n. 374. in graminosis. Jul. Aug.

R. lutea. in collibus. Jul. Aug. Enum. l. c. Schaller. n. 375. in sicuis. Jun. et Aug.

Euphorbia. 237.

* Umbella trifida.

E. Peplus. In cultis, agris, arvis. Aug. et 7ber. Hsenac. Enum. III. p. 318. Schaller. n. 376. in oleraceis. Aug. Sept. Petala lunata.

E. falcata.

E. exigua. in campis collibus agris. Jul. et Aug. Hsenac. Enum. III. p. 318. Schaller. n. 377. in campis frequens. Jul. Aug. Petala lunata. Fruct. lævis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 40.

Dodecandria Trigynia

** Umbella 4-fida.

E. Lathyris
Hsenari in cultis, non variis. quasi tamen sponte. Jul. Grim. III. p. 314.

*** Umbella 5-fida.

E. dulcis. Scholler. n. 378. Majo. ex Italia nigra evadit. Purpurea albissima serata. Fructu uber numerosus. Petala integra.

E. Paralias.

E. helioscopia. Fragris, arvis, cultis. Jul. reflorescit autumno. Hsenar. Grim. III. 31
Scholler. n. 379. In hortis et agris. exstat. Umbella solem sequit.

E

E. verrucosa.

E. pilosa.

E. platyphyllos. in agris. 2/3 Jul. prius. Hsenar. Grim. III. p. 319. Scholler. n. 380.
Gm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

**** Umbella multifida.

E. Esula. Scholler. n. 381. Majo. Rami saepe sterriles emittuntur.

E. Cyparissias. In campis, versuris, collibus. Maj. et ½ Jun. Gerac. Brim. III. p. 319. Scholler. n. 382. in arenosis aprilis. Majo et Sept. Petala lanata. Fructus laevis.

2 E. hyberna.

1 E. palustris. Scholler. n. 383. ad fossas. Maj. Junio. Pet. integra. Fructus verrucosus.

E. amygdaloides.

E. sylvatica.

E. Characias.

p. 42.

E. characias rubens germanica. C. B. (Willich)

E. sticta (Willich habet.

S. Dodecagynia

Sempervivum. 238

S. tectorum. In muris, tectis rusticorum. raro. Fuld. Venae. Prim. III. p. 319. Scholler. n. 384. in muris. Fuld.

S. globiferum.

S. hirtum.

Class. XII. Icosandria

1. Monogynia.

Philadelphus. 239

Ph. coronarius. In sepibus sponte nascitur. variis. Fuld. Venae. Prim. III. p. 319. Syringa flore albo. J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 203.

Amygdalus. 239. B.

A. communis. J. B. 1. p. 174 seqq.

Prunus. 240

Pr. Padus. In Silesia. Schwenkf. rud. J. B. hist. 1. p. 228. In compis, & sepes aliquando crescit. Apr. & Maj. Venari Prim. III. p. 320. Scholler. n. 365. in nemoribus. Maio.

P. Mahaleb. Non est Willich. Cerasus sylv. amara Mahaleb putata. J. B. hist. 1. p. 227.

P. Cerasus. ♃ B. hfl. I. 221.
P. humila. ♃ B. hfl. I. p. 222.
Scholler. n. 386. in domest. April. Maj.
} April. Hayne. ♃ B. l. c. p. 224.

P. avium. In sepib, campis et sylvis. ½ Maj. med. Hayne. Dtsch. III. V. p. 126.
Scholler. n. 387. April. Maj.

P. domestica. ♃ B. I. p. 191. Scholler. n. 388. in domest et remotis. April. Maio.

P. insitiva. Scholler. n. 389. Ad sepes. April.

P. spinosa. In sepib, sylvis, dumet., collib et glareis. Flor. Martio et Aprili. 7bris et 8bris pirely maturg erd. ♃ B. I. p. 196.
In campis, collib. ½ April et ½ Maj. Hayne. Dtsch. III. p. 320.
Scholler. n. 390. in sepib et dumet. April.

B. Digynia

Crataegus. 241.

Cr. Aria. Passim tricubi montib, ideog sylvatic gaudet. ♃ B. I. p. 65.
In sylvis montos. ½ Maj. fine. Hayne. Dtsch. III. p. 320.

Cr. Torminalis. In locis montosis, solo pingui et humido, ad Salzbach, inter fagos loco Schaafsberg. ♃ B. I. p. 4. 6is sqq.
In sylvis montos. ½ Maj. fine. Hayne. Dtsch. III. p. 320. Scholler. n. 391. in sylvis Maio. Jun.

p. 44.

Icosandria Trigynia. Sorbus.

Cr. Oxyacantha. J.B. hist. T. 1. p. 2. pag. 44. In cacumb, collibg. ½ Maj. post. pedicellis glandulosis, styli tres. Brim. Asenac. III. p. 320. Scholler. n. 392. In sepibg et domibus. Maio.

C. Trigynia

Sorbus. 242.

S. aucuparia. Vid. J.B. hist. 1. p. 62 seqq. Virginosis et opacis sylvis alisq vallibg et locis ripar torrentium etc. J.B. l.c. In sylvis et sepibg. raro. ½ Maj. fine. Brim Aser. III. p. 321. Scholler. n. 393. Maio.

S. hybrida. Non ut willich. In sylvis montosis. ½ maj. post. Asenac. Brim. V. p. 144.

S. domestica. Sorbus. J.B. hist. 1. p. 59.

D. Pentagynia.

Mespilus. 243.

M. germanica. Mespilus vulgaris. J.B. 1. p. 69 seqq In collibg. spuntanea ℞. ½ Maj. fine. Brim. Asenac. p. 321. Scholler. n. 394. In nemor. Maj.

M. Amelanchier. An Diospyros J.B. 1. p. 75 2.

Icosandria Pentagynia.

M. chamæ-mespilus.

M. Cotoneaster. in collibo, rupibus, montibus. ♄ April. passim. Prim. III. p. 321. Styli 3–5. Bacca ylobosa, valde cuta, 1-locularis, Nucles 3, oblonga hinc convexa, inde plana eminente notata. Prim. l. c.

Pyrus. 244.

P. communis. Parsim in Germania. In silvis, sepibus, ad arborum margines. F. B. tom I. p. 87. In campis, collibus. Jemar. ♃ Maj. pass. Prim. III. p. 322. Scholler. n. 395. April.

P. malus. In omni fere Germania tam planis quam montosis et tam montosis etc. F. B. d. Vol. I. p. 26. In collibus dumosis et sylvis. ♃ Maj. passim. Prim. l. c. Scholler. n. 396. in silvis et dumetis. April.

P. Cydonia. In Danubii pelagis ripis etc. sponte Rastisbonæ etc. arbor Cydo. F. B. d. Pl. p. 35.

Spiræa. 245.

Sp. Aruncus.

Sp. Filipendula. Scholler. n. 397. In arvosis. Jun.

Sp. Ulmaria. In uliginosis et pratis humidulis. ♃ Jun. et Jul. Jemar. Prim. III. 322. Scholler. n. 398. Jul.

Sp. palmifolia non Bl. Willich. In Silesia tamen nostris vid. F. B. T. I. P. I. p. 559. In Cirea Jenarum in Dumetis rarius. Sponte. ♃ ½ Jun. prior. Prim. III. p. 322

p. 46

Icosandria Polygynia. Rosa.

E. Polygynia.

Rosa. 246.

* Sermin. subglobosi.

R. eglanteria. Scholler. n. 399. in sepib. ramis. Jun. Flor. suec. Fol. ovatis.

R. rubiginosa. (Non bt willich.) In collib., campis. Jun. Henac. Srim. III. 322.

R. arvensis. (Non bt willich.) Scholler. n. 400. Jun.

R. cinnamomea.

R. villosa. In collib. et campis. Jun. post. varisk Srim. Hen. III. p. 322. Scholler n. 402. in sumebr. Jun. Fruby maior, quam in reliquis.

R. sempervirens.

** Serm. ovatis

R. gallica.

Rosa Hall. n. 1102. in collib. Sterilitby Henac. 1/2 Jul. prior. Srim. V. p. 194.

R. canina. Scholler. n. 403. in sepib. et sumeb. campestr. Jun. Petala bibba, incarnata. Bracteae 2 oppositae, ciliatae.

R. tomentosa. In campis et collibus. Jun. post. Sponte? Srim. Henac. III. p. 323 et V. p. 126. Scholler. n. 401. ad agrorum limites. Jun. Fruby maturus nigr.

Icosandria Polygynia. Rubus

R. alba. Scholler. n. 404. in sepib. Jun.

R. villosellatus.

R. repens. Von der alt
Eine sehr niedrige, kleine rasende Rose, mit zahlreichen Blättern, 7 bis 9 länglichen Blättchen, sägenzähnigen Blättern, dornigen Ruthen u. Blattstielen: glatten Früchten u. ungefähr Kelchblättern. In Deutschland. H. v. Münchhausen Hausv. Th. 5 Th. f. 281.

Rubus. 247.

* Fruticosi.

R. idaeus. In nemor. edibr. ½ maj. pyst. Hexan. Prim. III. p. 323. Scholler. n. 405. In dumetis. Maio.

R. caesius in collib. umbros. Jun–Aug. Hexan. Prim. l.c. Scholler. n. 406. ad agros et in agris.

R. fruticosus. in collib. dumosis, sylvis. ½ Jun–Oct. Prim. l.c. Scholler n. 407. in dumetis frequens. Maio.

* * Herbacei

R. saxatilis. In sylvis montosis. rarius. ½ maj. fine. Prim. l.c.

p. 48

Icosandria Polygynia.

Tormentilla. 248.

T. erecta. In pascuis, sepibus, sylvis. Jul. Aug. Jenae. Prim. III. p. 324. Scholler. n. 409. in omnib. statis.

Fragaria. 249.

Fr. vesca. In nemor. sylv. copiose. ½ Apr. et ½ Maj. Jenae. Prim. III. p. 324. In loc. apricis et inultis, fälsch. vere vere Marburg. Hebel. disp. bot. I. p. 20. Scholler n. 409. Maio.

Fr. Acrilis.

Potentilla. 250.

* Fol. pinatis.

P. Anserina. In ruderatis, campis, arvis. Jun – ½ Aug. Jenae. Prim. III. p. 324. Scholler. n. 410. Maj. et Sept.

P. supestris.

P. supina. Scholler. n. 411. inter Jena. gestalt.

** Fol. digitatis.

P. reptans.

Icosandria Polygynia.

P. argentea. Scholler. n. 412. Jun.

P. rupestris

P. verna. In collib. pascuis. April. et Maj. Schm. Fl. Boruss. III. p. 324. Scholler. n. 413. in arenosis, sterilib. April. Variat macula ad basin petalorum alba et non fulva.

P. aurea.

P. alba. Scholler. n. 414. in aridis, arenosis. Maio.

P. caulescens.

P. reptans. in pratis exsiccis, uliginosis, vernosis. 1/2 Jan. et Jul. Fl. Boruss. Schm. III. p. 325. Scholler. n. 415. Jul.

p. 50.

Icosandria Polygynia.

Senn. 251.

S. verbenum. Sanderatt, Semib. nemor. Sun. et Sut. 5 nim. Hexar. III. p. 325. Scholler. n. 416. Sun.

S. ♀ rivale. in virginia et prope Semindet. ½ Sun. pyst. Hexac. 5 nim. C. C.

S. montanum.

Dgyn. 252.

Dr. octopetala.

Comarum. 253

C. palustre. Scholler. n. 417. in palud. Sun.

Polyandria · Monogynia.

Class. XIII. Polyandria.

A. Pap. Monogynia

Papaver 254.

* capsulis hispidis

P. hybridum. Scholler. n. 419. in agris. Jun.

P. Argemone. In agris editis. Jun. Sriem. III. p. 325. Scholler. n. 419 inter Segetes. Jun. Jul.

P. alpinum.

** Caps. glabris

P. Rhoeas. in agris. 1/2 Jun. et 2/3 Jul. Sriem. III. p. 325. Scholler. n. 420. inter Segetes ubiq. Jun.

P. Dubium. in agris ruris. 2/3 Jun. pass. Henae Sriem. III. p. 326. Scholler n. 421. in agris. Jun.

P. somniferum (num Scholleri?) in cultis, rud eratis, fimetis. rarissime sponte? 1/2 Jun. et 1/4 Jul. Henae. Sriem. l.c.

Chelidonium. 255

Ch. majus. In rem orib. sepis. ruderatis, cultis. 1/3 maj. Oct. Henae. Sriem. l.c. Scholler. n. 422. in ruderatis ubique.

Ch. glaucium.

p. 52.

Polyandr. Monogynia.

Ch. arenicolorum.

Actaea. 256

A. spicata. In nemor. et collibus humos. Maio et Jun. Kern. Stirp. III. p. 326.

Cistus. 257.

* Stipulati superbiani.

C. Fumana.

C. canus.

** stipulati subsessiles

C. serpillifolius.

C. Helianthemum. In collibus, passim. Jun. et Jul. Jul. Hyen. Stirp. III. p. 326. Scholler. n. 423. in antiq. Jun. Jul.

C. alyssoides. Jacq. (villosus)

Scilla. 258

Scilla. J. B. hist. T. I. P. 2. p. 133.
— Autumnal. min. ad. J. B. ibid. p. 137.
Scilla europaea cy J. serotina fol. majore. C. B. β Jol. maxt. maxime foliis. C. B.
Ornithogalum in sylvis et umbrosis. ♃ Jul. prat. Zeneri Prim. III. p. 327.
Scholler. n. 424. in sylvis culta. Jul. Vhay, variabilis fol. majori et minori.

Nymphaea. 259

N. lutea. Scholler. n. 425. In stagnis. Jun. Jul.

N. alba. In stagnis rarius. Jul. Zeneri Prim. III. p. 327. Scholler. n. 426. c. priced.

Cl. I. B. Trigynia

Delphinium. 260

D. Consolida. In agris edicht. ☉ Jun et Aug. Zen. Prim. III. p. 327. Scholler. n. 427. Inter segetes frequens. Jun. Jul.

D. elatum.

D. Thora Italica. Clus. (Wulfen.)

Aconitum. 261.

A. Lycoctonum. In nem. or. mont. ½ Maj. et ½ Jun. Henar. Prim. III. p. 327.

A. Napellus.

A. variegatum.

C. Pentagynia.

Aquilegia. 262.

A. vulgaris. In collib. dumos. et pascuis. ½ Jul. et ½ Maj. et ⅓ Jun. Hen. Prim. III. p. 327.

Nigella. 263

N. damascena.

N. sativa.

N. arvensis. in agris collium. raro. ½ Jul. et ½ Aug. Henar. Prim. III. p. 328. Scholler. n. 928. in campis editis. Jul. et Sept.

Polyandria Hexa- et Polygynia.

I. Hexagynia

Thalictrum. 264.

Th. alpinum. Schkuhr. n. 429. in Sylvis frequens. Sylvestre. Pertinet ad Decandriam Dodecandriam.

II. Polygynia

Clematis. 265

* frutescentes

Cl. Vitalba. In collium dumetis. ½ Jul. et Aug. Flor. Suec. Vol. III. p. 328. Schkuhr. n. 430. ad Sylvas Jul.

Cl. Flammula.

** Erectae

Cl. erecta. Schkuhr. n. 431. ad margines Sylvarum. Jun.

Cl. integrifolia.

Arten gehören Clematis zum Anagene.

p. 56

Polyandria Polygynia.

Thalictrum. 266.

Th. minus. in collibb. variis. ½ Jun. et ¼ Jul. Jenani Sturm. III. p. 328. Scholler. n. 432. in graminos. Jun. Jul. Apices fothum purpurascentes, et cauli rubra purpurascentia.

T. angustifolium. Scholler. n. 433. in pas. Jul. Aug.

T. flavum. in pratis humidis. rare. Jul. Jenae. Sturm. III. p. 328. Scholler n. 434. in adumeta. Jul. Aug.

T. aquilegifolium.

Nur 2 ganze Cattha Sturm Isopyrum, p. 62. Helleborus. p. 61.

Caltha. 267.

C. palustris. In uliginosis et pratis humidis copiose. ¼ April. et ½ Maj. Jen. Sturm. III. p. 329. Scholler. n. 435. in humid. Aug. Maj.

Anemone. 268

* Hepaticae flore tricalycularis

A. Hepatica. In nemor. editis. ½ Mart. et ¼ April. Jenani Sturm. III. p. 329 In Sylva umbrosa Marchi et Apiali. Marburg. Dan. Nebel. Dis. lab. I. p. 12.

** Pulsatillae pedunculo involucrato, sem. caudatis.

A. patens.

Polyandria Polygynia.

A. Pulsatilla. In Lig colliby. ½ Apr. pyrl. Sim. 329. Scholler. n. 436. in sylvaticis montis fr. April.

A. pratensis. Fer Sinth Bruisbarg im Lüneburgisch. Hynr. p. 2. Scholler n. 437. In collib. aridis. Aprill. Flor minor quam precedentis, et magis obscure.

A. alpina.

+++ Anemonidea fl. nudo, sem. caudatis.

A. sylvestris In colliby ½ April et ½ maj. Henae. Sim. III p. 329.

A. nemorosa. In nemor. et sylvis. Aprill. Henae. Sim. III. p. 329. Scholler. n. 439. Aprill.

A. ranunculoides. In nemoriby. ½ Apr. et ½ maj. Hen. Sim. l. c. p. 330. Scholler. n. 439. ad Segen, in Hirs. Marti. Aprill.

A. narcissiflora.

Polyandria Polygynia

Trollius. 269.

T. europaeus In pratis ubiq. 5/6 Maj. et Jun. Jenae. Sturm. III. p. 330.

Ranunculus. 270.

* Fol. simplicibus.

R. flammula. In prat. humidis. Jun. et Jul. Jenae. Sturm. III. p. 330. Schkuhr. n. 440. in pratis depressis. Jun. Jul.

R. reptans. (nach Wilich) In solo sabuloso ud. Jenae. Sturm. V. p. 145.

R. lingua. Schkuhr. n. 441. In stagnis. Jul. Aug. Planta bicubitalis.

R. ficaria. In nemoribus, sepibus, pomariis. April. Jenae. Sturm. III. p. 330. In pratis secus vias, alveos loris irriguis stantibus. primo vere. Nebel dis. inaug. p. 12. Schkuhr. n. 442. April.

R. thora.

** Fol. dissecta et divisa.

R. aconitifolius. In nemoribus, sepibus. 1/5 April. 1/2 Maj. Jen. Sturm. III. 330. Schkuhr. n. 443. Jun. Jul. et alibi frequens. April. Maj. Petala primo vere in flore unum aut duo, sepe nulla, demum quina perfecta.

R. scelerat. In inundat. loca Asiae. Henac. Enum. III. p. 330. Schollen n. 444. In fossis exiguis. Maj. Jun.

R. aconiti folius. in sylvis altissimis in der Nähe des Fuchsbrunnens. Junio. cet Hall. n. 1164. Henac. Enum. III. p. 331 et V. p. 126.

R. platani folius (non hic Willich)

R. rutaefolius.

R. alpestris

R. bulbosus. In collib, arvis, versuris. Jun. Jul. Henac. Enum. III. p. 331. Schollet. n. 445. maj. et sept.

R. repens. in pascuis, versuris, arvis. Jun. Jul. Henac. Enum. l. c. Schollet. n. 446. inter olera. Maj. et Sept.

p. 60.

R. polyanthemos. In sylvis montos. rare ½ Jun. ⊙ 1½ Jul. Jenac. 5rim. III p. 331. Scholler. n. 447. Maj. differt a R. acri habitu duplo majori, fol. profundius et acutius dissectis et magis glabris, petiolis parum sulcatis, saepe non acri.

R. ℔ acris In prat. et pomariis. tota aestate. 5rim. l.c. Scholler. n. 448. in pratis. Maj. Jun.

R. lanuginosus. In sylvis et nemor. Jun. et Jul. Jenari 5rim. V. p. 145. Scholler. n. 449. In editis. Aestate.

R. arvensis in agris. ½ Maj. et Jun. Jenari 5rim. III. p. 331. Scholler. n. 450. inter segetes. Maj. Jun.

R. sceleraceus (Non ist Wilisch.

R. aquatilis. fol. emersis petiolatis. Jenari in stagnis. Jun. Jul. 5rim. III p. 331. Scholler. n. 451. in fossis et stagnis vbi Maj. Jun. Petala non squamulam gerunt; sed tantum parum melliferum.

Ranunc. Holl. n. 1162. In stagnis Jenari. aestate tota. 5rim. l.c. p. 332. et V. p. 127.

Adonis. 271.

A. æstivalis. Scholler. n. 452. inter segetes. Maj. Petala 5. ad 6, ochroleuca, basi intus nigra vel violacea. Rami ubi floriferi, flor. ipsis breviores albicant.

A. autumnalis. Henaci strag in agris (Hl. phaeniev et pallido) ½ Maj et ½ Jun. Grim. III. p. 332. Scholler. n. 453. In hortis inter olera. Jun. Sept. Flores atro-purpurei. Rami etiam supra floriferi.

A. vernalis.

Helleborus. 272.

H. hyemalis.

H. niger.

H. viridis. in umbrosis nemorum. variis. Marsh. Grim. Henec. p. 329. In montibus circa Marburgum Cattorum. Febr. et April. in dem Nebel disp. I. de plantis vernal. et qualibus. p. 5. (Marburg. 1756.)

H. fœtidus.

p. 62.

Didynamia Gymnospermia.

Hyssopus 273

t. thalictroides.

Atragene. 274.

t. austriaca. Jacq.

Class. XIV. Didynamia

1. Gymnospermia.

Leonurus. 275.

L. Cardiaca. In viridariis rar. Jul. et Aug. Flores Sum. III p. 332. Scholler. n. 454. ad sepes. Jul.

L. Marrubiastrum. Scholler. in n. 455. in dumetis et ad sepes. exeunte Jul. Aug.

Salvia. 276

Sl. hederacea. In pratis, versaris, junio. in April. 2/3 maj. Sum. Flores III. p. 332. Duae et septem staminum, prima vesc et tota aestate flores dat. Nebel. disp. vol. I. p. 16. Scholler. n. 456. ad sepes, in dumetis. April. Maio.

~~Sl. aurea. L.~~

Hyssopus. 277.

H. offic.

Didynamia Gymnospermia.

Mentha. 278.

M. sylvestris. In ripis et riguis sylv. Jenae. Aug. et 7bre Sturm. III. p. 333. Scholler. n.° 457. ad rivulos. Jul.

M. rotundifolia.

M. crispa. (num Li Willich)

M. aquatica. In fossis et riuulis. Aug. et 7bre Jenae. Sturm. III. p. 333. Scholler. n. 458. Jul. Planta non hirta, odore grauiore, quam M. arvensis.

M. gentilis. Scholler. n. 459. ad Salam. Aug. Similima M. arvensi, at minus hirta; corollae infimae laciniae acutae.

M. arvensis. In agris et arvis. Aug. et 7bre Jenae Sturm. III. p. 333. Scholler. n. 460. in agris cognitos. Aug. Planta tota hirta, corollae laciniae infimae obtusae. Stam. corollâ maiora, vel minora.

M. verticillata (num hit Willich) Jenae. In fossis. Aug. 7bre Sturm. V. p. 127. cum descript.

M. Pulegium. Scholler. n. 461. ad fossas. Jul.

M. crispa (num Li Willich) Scholler. p. 309. n. 1011. in graminosis humidis. Jul. Ano. differt M. sylvestri, cui folia latiora, supra viridia glabra, infra candicantia hirsuta vix conspicuis.

M. Hall. n. 224. Jenae in fossis. Aug. et 1/3 sept. Sturm. V. p. 127. c. descr.

Jul. Aug.

lena descr.

p. 64.

Didynamia Gymnospermia.

Sideritis. 279

S. montana.

Teucrium. 280

T. Botrys. In collibj, montibj. 1/2 Jun. et Jul. Jenaei Sinn. III. p. 334.

T. Chamaepitys. In collibj et amir. 1/2 Jul. et Aug. Jenaei. Sinn. l.c.

T. Scordonia. In sylvis raro. 1/2 Jul. et Aug. Sinn. l.c.

T. Scordium. In inundatis et stagnis. Jul. et Aug. Jenae. Sinn. l.c.
Scordium ~~v.~~ Scholler. n 4 Bd. 48 Sr. ad fossas. Jul.

T. Chamaedrys. In collibj. 1/2 Jun – Aug. Jenae. Sinn. l.c. p. 335.

T. montanum.

T. Supinum.

Didynamia Gymnospermia.

Ajuga. 281.

A. pyramidalis In collib. $\frac{2}{3}$ Maj. poss. ♃ Var. etj. reperi fl. albv. Hexaed. Prim. III. p. 335 Scholler. n. 463. in pratis siccis. Maj.

A. genevensis Scholler. n. 464. in siccis. Maj.

A. reptans In. prat. humidis, pomariis, nemorib. Maj. Hexaed. Prim. III. p. 335. Scholler. n. 465. Maj.

Betonica. 282.

B. officin. In pascuis. $\frac{2}{3}$ Jul. poss. Prim. Hexaed. III. p. 335. Scholler n. 466. Jun. Jul.

B. abrotanifolia.

B. hirta.

p. 66.

Didynamia Gymnospermia

Lamium. 283.

L. maculatum In dumosis humidiusculis. Maj– Aug. Henac. Prim. V. p. 145.

L. album In uliginosis, cultis, sepibus. Maj– Oct. Henr. Prim. III. p. 336 et V. p. 128 Scholler. n. 469. in sepibus et dumetis. Maj. et Sept.

L. purpureum In cultis agris, arvis. Tota aestate. Henr. Prim. III. p. 336. Scholler. n. 468. in sterilibus, ad sepes. April. Sept.

L. amplexicaule cum priori, fere eod. tes. pere. Prim. l. c. Scholler. n. 469. in hortis, agris. Toto fere anno.

Galeopsis. 284.

G. Ladanum.
Fl. Hall. n. 266. Henaci in collib. agr. arvis. 1/5 Jul. et Aug. Prim III. p. 336. Scholler. n. 470. in campis. Jul. Aug. Corolla rubra labium inferius macula lutea fringis purpureis notatum.

Gal. segetum. Neszler. Henaci in agris. 1/2 Jul. post. Prim. III. p. 336.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Didynamia Gymnospermia.

5. Tetrahit

α/ flor. alb. nutro p. In agris civit. Jenaei ½ Jul. et Aug. Schm. III. p. 337.
β. Sal. fl. magno variolore. Hall. Cat. Goett. p. 330. Jenaei in nemoribus civitat. ½ Jul. et Aug. Schm. l.c.
Schöller. n. 471. a. in agris passim. Jul. Aug. β. Galeopsis corolla flava, tubo calicis in fenore maculato, in dumetis. Jul. Aug. (An S. segetum? Reich.)

5

5. Galeobdolon. In nemoribus. maj. Jenaei Schm. III. p. 337. Schöller. n. 472. majo.

Haehys. 285.

St. sylvatica. In nemor. scrib. ½ Jun. et Jul. Jenaei Schm. III. p. 337. Schöller. n. 473. in dumetis. Jun. Jul.

St. palustris. In agris humidis ubique. Jul. Aug. Schm. l.c. Schöller. n. 474. Jugo Jul. ad Albim.

St. alpina.

p. 58

St. germanica. In collib. et agris montosis. Jul. Jsenaci Prim. III. p. 337. Scholler. n. 475. Aestate.

St. recta (nunc St. Willich) Jsenaci in collibus 2/3 Jul. et 1/5 Aug. Prim. V. p. 126. Scholler. n. 476. (in arenosis. Aestate et autumno.

St. annua. in agris Prim. Jsenaci III. p. 335. 2/3 Jul. pygl. Scholler. p. 246 308. n. 1012. in agris montosis. Jul. Aug.

St. arvensis (nunc St. Willich) In agris, arvis. 1/3 Jun. et Jul. Jsenaci Prim. III. p. 333. sub Clerona. Scholler. n. 477. in agris. Aestate. Labii lacinia intermedia non emarginata.

Nepeta. 286

Nepeta Cataria. In ruderatis. 1/5 Jun. et Jul. Jsenaci Prim. III. p. 338. Scholler. n. 478. ad muros. Jul.

N. pannonica.

Satureja. 287

Sat. montana.

Ballota . 289

B. nigra. In ruderatis et sepibus. Jul. ad Oct. Hayek Prim. III. p. 338.
Scholler. n. 479. ad sepes. aestate. et flore albo.

Marrubium. 289.

* Calyc. 5-dentati

M. peregrinum. ~

** Calyc. 10-dentati

M. vulgare. In campis et arvis. ½ Jun. et Jul. Hayek Prim. Hayek. III. 338.
Scholler. n. 481. ad vias, ad pagos. aestate.

Scutellaria. 289.

S. galericulata. In vicinitate, ripis, pratis humidulis. ½ Jul. et ¼ Aug.
Hayek Prim. 338. Scholler. n. 482. In humidis. Jul. Aug.

Sc. hastifolia. Scholler. n. 483. in Gumpendorf et alibi frequens. aestate.

Thymus. 290.

Th. Serpillum. Hayek in collibus, pascuis, sylvis. ½ maj. et Junio aestate
Prim. Hayek. III. p. 338.
Scholler. n. 484. in arenosis. aestate.

T. Acinos. In collib. apricis. ¼ Jun. et Jul. Hayek Prim. l. c.
Scholler. n. 485. in editis. Jul. Aug.

T. alpinus.

Didynamia Gymnospermia.

Brunella. 291.

Br. vulgaris. In prat. nemorib., passim. Jul. et 1/4 Aug. Henari. Linn. III. 339. Scholler. n. 488. aestate.

Br. grandiflora. Henari in pascuis editis. Jul. et 1/4 Aug. Linn. l. c. Scholler. n. 487. in siccis. aestate.

Br. laciniata. Scholler. n. 488. in graminosis. Jun.

Dracocephalum. 292.

Dr. austriacum

Dr. Ruyschiana.

Origanum. 293.

O. vulgare. in collibus humosis. Jul. et var. fl. alb. Henar. Linn. III. p. 339. Scholler. n. 489. In sylvaticis editis varig. Jul.

Clinopodium. 294.

Cl. vulgare. In collibus humosis. Jul. et 1/4 Aug. Henar. Linn. III. p. 340. Scholler. n. 490. ad sepes. Jul. Aug.

Didynamia Gymnospermia.

Melittis. 295.

M. Melissophyllum.

Melissa. 296.

M. officii.

Hormium. 297.

H. pyrenaicum.

B. Angiospermia.

Orobanche. 298.

O. levis

O. major. In pascuis. 2/3 Jun. prope Isenaui Grim. III. p. 390. Scholler. n. 491. in agris, ad dumeta. varius. Jun. Jul.

O. ramosa

O. purpurea. Jacq. (habet Wallich)

p. 72.

Lathraea. 299

L. squamaria. In nemorib. raro. Aprili. Hsenari Sriñ. III. p. 340.

Bartsia. 300.

B. alpina.

Euphrasia. 301.

E. offic. In ubq pratis. ½ Jul. et Aug. β. Cynthr. minor. Vill. Cat. Hisf. appx. p. 57. in sylvis et pascuis Sabaudiæ. Julio. Aug. Hsenari. Sriñ. III. p. 340. Scholler n. 492. Cujus Varietas Lissi. alibi. obvia.

E. Odontites In agris humidulis et inundatis. Jul. et Aug. Hsenar. Sriñ. l. c. Scholler. n. 493. ~~in~~ ad margines agrorum copiose. Estate.

E. lutea. in collium pascuis. ½ Aug. post. Hsenari Sriñ. III. p. 341.

Rhinanthus. 302.

R. crista Galli. α et β. Lin. Hsenari. a ~~in agris Jun. A~~ in pratis humidulis. ½ Maj. et ½ Jun. β. in pascuis Jul. Vrag. Alectorolych. Hall. n. 313. Sriñ. III. p. 341. Scholler. n. 494. in pratis copiose. Estate.

Alectorolophus Hall. n. 314. Hsenari in agris. Jun. Sriñ. l. c.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Melampyrum. 303.

M. cristatum. Schreber. n. 495. in Sylv. Jul.

M. arvense. In agris. 1/5 Jun. — 1/5 Aug. Henaei Enim. III. p. 341. Schreber. n. 496. in Agris. 8 Jun.

M. nemorosum. In nemoribus. 1/2 Jun. et Sept. Henaei Enim. l. c. Schreber. n. 497. in Hainen Thüring. Jun. Jul.

M. pratense. In Ober Sylv. 1/5 Jun. et Jul. Henaei Enim. III. p. 342. Schreber. n. 498. in Sylv. Schatz

M. Sylvaticum. In pratis mont. Jul. Henaei Enim. l. c. Schreber n. 499. in Sylv. Ins terminor. Fran. Barb. Brü Nördlig. Jun.

Pedicularis. 304.

alpina.

Linosella 305

L. ffica. In inundatis. Aug. Grim. Henari V. p. 145. Scholler. n. 500. in inundatis, copiose. Jul. Aug.

Scrophularia. 306.

S. nodosa. In nemor. et sep. umbros. Jun. et ½ Jul. Hen. Grim. III. p. 342. Scholler. n. 501. in dumetis et ad fossas. estate.

S. aquatica in ripis ½ Jul. et Aug. Henari Grim. p III. p. 342. Scholler n. 502 in humidis. estate.

S. vernalis

S. canina.

Digitalis. 307.

D. purpurea In silvis montos. caduci. Jul. et ¼ Aug. Henari Grim. III. 342

D. lutea. Scholler. n. 503. in silvaticis editis rarior. Jun.

D. ambigua. Henari in nemor. raro. ⅔ Jun. prior. Henac. Grim. III. p. 342.

Antirrhinum. 308.

* Folia angulatis.

A. Cymbalaria.

A. Elatine. Scholler. n. 504. in agris post messem. Aestate et autumno.

A. Spurium. in agris rariur. Aestate. Scholler. n. 505.

** Fol. oppositis.

A. arvense. In agris arenosis, annis. Jul. Henac. Prim. III. p. 343.

A. alpinum. Circa Meinungen Ehrhard. Pflanzensyst. Vers. II. p. 159.
ex Haller Hallero. n. 338.

A. minus. in collibus, agris. raro. 1/2 Jun. et Jul. Prim. Henaci. III. 343.
Scholler. n. 506. in agris arenosis. Aestate

*** Fol. alternis.

A. genistifolium.

A. Linaria. In agris, collibus, sylvis caeduis. Jul. Aug. Prim. p. 343. III
Scholler. n. 507. um Ebbrann ubi copiose. Aestate. Peloria ad muros zwischen
Im Bergpark z. Hummelsh. Scholler. n. c. Vidi in eadem plura linaria et pe-
loriae. Peloria sensim in linariam reducit et linaria frequenti mutatione
talibus fit Peloria, referente et vidente Schrebero. Scholler. l. c.

**** Corollis staminibus aequalibus.

A. maius.

A. Orientium. In agris, aestiv. ½ Jun. et Jul. Hoffmanni. Prim. III. p. 349. In agris frequens. Cassub. ad Scholler. n. 508.

Pedicularis. 309

P. palustris. In uliginosis et pratis humidis. ½ Maj. et ½ Jun. Hoffmanni. Prim. III. p. 343. Scholler. n. 509. in pratis uliginosis. Maj. Jun.

P. sylvatica. In sylvarum pascuis humidalis. ½ Maj. et ½ Jun. Hoffmanni. Prim. III. p. 344.

P. rostrata

P. verticillata.

P. comosa.

Tetradynamia Siliculosa.

P. tuberosa.

Vitex.

V. agnus castus ? wa bei Willich. ökon. Lex. B. Lief. T. I. Pr. p. 205.

Clas. XV. Tetradynamia

1. Siliculosa.

Draba. 310

D. alpina.

D. verna In pascuis, arvis, collib. ½ Apr. et ½ Maj. Flora. Stirm. III. p. 344. Schreber. n. 310. auf dem Anger zwischen März. April.

D. pyrenaica

D. muralis

Draba aizoides. (gelb?) Auf Burgen in Stürmers Heft. 2. Fl. d. Stürmer. Verzeichn. p. 2.

D. stellata.

p. 78.

Lunaria. 311.

L. rediviva

L. annua.

Myagrum. 312.

M. perenne

M. sativum. Var. β et γ. chin. Hfenarii. β in agris editis ½ maj. et ½ Jun. γ in agris inter Isnicum. Flor. cū chin. Smith. III. p. 344. Schkuhr. n. 511. inter segetes, inter lucum Isnic. sept. Jun. Jul.

M. paniculatum. In agris editis. ⅔ Jun. et ½ Jul. Hfen. Smith. l. c. Schkuhr. n. 512. in agris. maj. sept.

M. saxatile.

Tetradynamia Siliculosa.

Iberis. 313.

I. amara

I. nudicaulis In myrtis, editis. raw. ½ Apr. al ½ Maj. Henau. Prim. III. p. 344. Scholler. n. 513. In agris arenosis. ~~Jun. Jul.~~ Maj! Jun.

Alyssum. 314.

A. montanum Scholler. n. 516. in editis. April. Maj. Petala lutea. Stamina 4 apice bifida; duo basi denticulo.

A. incanum. Scholler. n. 514. um Schönbrunn Hügel Monplaisir. Halle.

A. calycinum. In cruce collium al campòr. Maj. Prim. V. p. 128. Scholler. n. 515. in andis apricis. Maj. al sept. Stamina non denticulo notata. Petala lutea, dein alba.

A. campestre.

p. 80

Tetradynamia Siliculosa.

Petraria. 315.

P. alliacea

Cochlearia. 316.

Cochl. Coronopus. Schreber. n. 317. ad viar. agriose. Jun. Jul.

C. Armoracia. In agris et pratis humidulis. ♃ Jun. ½ Jul. Ephemeri Sem. III. p. 345. ad fossas passim. Jun. Jul.

C. glastifolia. (Non ita villosa)

C. Draba.

Lepidium . 317.

L. alpinum.

L. petraeum

L. latifolium.

L. graminifolium (Non bl. Willd.)

L. ruderale Scholler. n. 520. ad murar. Jun. Jul.

L. Iberis Schuller. n. 521. ad murar. Jun. Jul.

L. sativum (non bl. Willd.) ad murar in Schwäbisch, wilder oben in Kirchheim gesäet. Jun. Scholler. n. 519.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 82

Thlaspi. 318

T. arvense. In arvis, agris cultis. ½ Maj. et Jun. Reflora Sept. Prim. III. p. 345. Schkuhr. n. 522. in campis Maj. Jun.

T. alliaceum.

T. hirtum.

T. campestre. In campis, raro. ½ Maj. et Jun. Asenari. Prim. III. p. 345. Schkuhr. n. 523. ad aggeres agri Mosor. Maj.

T. montanum.

T. perfoliatum. In arvis collium. ½ April. ½ Maj. Asenari Prim. III. p. 345. Schkuhr. n. 524. in glareis. Maj. ♃

T. alpestre.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

T. Bursa pastoris. In arvis, saltic, moerabg. Aprili et Maj. Reflorescit. Autumno. Henoch. Prim. III. p. 345. Marburgi. Tyrol. Maj in incultis. Rebel. Obs. vol. I. p. 17. Schkuhr in Horti et agris circa Maj. n. 526. Ayrer in Autumnis

Bursa. 319.

B. apula. (alias didyma L.)

B. corymbosa Scop. Hall. Willich. Schkuhr. n. 527. in arenosis sterilibus. Maj. Jun. Fol. rad. lanceolata pinnatifida dentata, dentibus strictis 3-5; caulina pauca, amplexicaulia, ovato-lanceolata s. linearia, plerum dentata. Corollae luteae. Siliculae laeves, nisi forte margine denticulo minimo.

B. Siliquosa.

Raphanus. 320

R. sativus (non L.) cum Willich

R. Raphanistrum. In agris. Maj – 7ber Henoch. Prim. III. p. 346. Schkuhr. n. 525. In agris circa Maj. et Sept.

Tetradynamia Siliquosa.

Erysimum. 321.

E. officinale. In ruderatis vlig. Jun. ad Oct. Jenaei. Sturm. III. p. 346. Scholler. n. 529. in viarum et ad sepes. gehle.

E. Barbarea. In ripis. ½ Maj. et Jun. Sturm. l. c. Scholler. n. 530. Majo.

E. Alliaria. In nemor. Lipsiae. ½ maj. prost. Sturm. l. c. April et Maj. in sumeliis et ad sepes passim magnitudine Barbaraeae. Nebel. Disp. botan. p. 21. Scholler. n. 531. in Gruna et alibi copiosissime. Majo.

E. repandum (Nun hat weißlich)

E. cheiranthoides. In agris cultis. varios. ½ Jul. et ½ Aug. Jenaei. Sturm. III p. 346. Scholler. n. 532. in sumeliis copiose. gehle. Folia plerumque paulo pervellata.

E. hieraciifolium. Jenaei ~~in agris cultis, varios. ½ Jul. et ½ Aug. Sturm. V. p. 128.~~ in ripis et collibus. raro. ½ maj. prost. Sturm. V. p. 128. Scholler. n. 533. ad marginem glauci varius. April et Sept.

Cheiranthus



Horae

Germanicae

Liber IV

1775.

IV V

Tetradynamia Siliquosæ.

Cheiranthus. 322

Ch. cynsimoides.

Ch. Cheiri.

Hesperis. 323.

H. tristis

H. matronalis.

H. sibirica?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 2.

Tetradynamia Siliquosa.

Arabis. 324.

A. alpina.

A. Halleriana. In agris editis. ½ Apr. ¼ Maj. 3. Jenaci. Sturm. III. p. 347.

A. bellidifolia. (Nov. 21 Willich)

A. hispida (Nov. 22 Willich)

A. Halleri.

A. pendula. (Nov. 23 Willich)

Tetradynamia Siliquosa.

A. Turrita.

Brassica. 325.

* Style obtusiusculo.

B. campestris in agris. ½ Maj. ½ Jun. Henari Enum. III. p. 347. Scholler. n. 534. inter segetes infrequens. Jun. Radix annua. Corolla lutea. Fol. radic. lyrata, subhispida, caulina laevia.

B. arvensis (Noch wildt)

B. alpina. (Noch wildt) In jugo praealti montis Kiel-horst raro, in sylvula collis ante pagum Siedtfeld copiosus. Henar. Enum. III. p. 348 et V. p. 128.

B. Napus. In agris. Maj. Henari Enum. III. p. 347. Scholler. n. 535. inter segetes frequens. April. Maj.

* Eruca siliquis stylo exsertis.

B. Eruca sativa Scholler. n. 536. in frequent. hort. Cul.

B. Eruca. (wan bekt wildt)

p. 4.

Turritis. 326.

T. glabra. In nemoribus editis. raro. ½ Maj. et ⅔ Jun. Jenaci. Sturm. III. p. 347. Schkuhr. n. 537. ad dumeta. Majo.

T. hirsuta. in collibus raro. ½ Maj. prope Sturm. l. c. Schkuhr. n. 538. in sylvaticis. Maio.

T. alpina. (Non est Willich.)

Dentaria. 327.

D. enneaphyllos.

D. bulbifera. In nemoribus. raro. 20–30 Maj. Jenaci. Sturm. III. p. 348.

D. pentaphylla.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fsat. 328.

F. Fsat. tinctoria.

Cardamine. 329.

* Fol. simplicibus

C. bellidifolia.

C. pratensis.

** Fol. ternatis

C. trifolia.

*** Fol. pinnatis

C. impatiens. In nemoribus ad rivulos. rarius. vere. in maj. et ½ Jun. Prim. III. p. 348. Scholler. n. 539. in nemoribus frequens. maj. Jun. Petalis interdum albis vel violaceis. sed simul flagrans.

C. hirsuta. In nemoribus ad rivulos. rarius. 2/3 maj. post. vs. Cardamine Hall. n. 472. a. Fsenar. Stam. constanter 6. Prim. III. p. 348 et V. p. 129.

p. 6

C. pratica Vill. In pratis humidulis. Maj. Jenens. Prim. III. p. 349. Schkuhr. n. 540. in pratis humidis vulg. Sphil. Maj.

C. amara, in viridar. 2/3 maj. post. Jen. Prim. l. c. Schkuhr. n. 541. in sylvis Majo.

Sinapis. 330.

S. arvensis. In agris vulg. 1/2 Maj – Sept. Prim. III. p. 349. Schkuhr. n. 542. inter segetes vulg. Sphil. et Segn.

S. alba, in cultis et agris. [illegible]. Jul. Aug. Jenac. Prim. l. c. Schkuhr. n. 543. in agris Majo.

S. nigra, Schkuhr. n. 544. Prim. Jul. Planta apud nos Segnij ultra hominis altitudinem excrescit.

Tetradynamia Siliquosa

Sisymbrium 331.

* Silig. declinatis erectiusc.

S. Nasturtium. In rivulis et stagn. ♃ Jun. ♃ Jul. Prim. III. p. 349. Scholler. n. 545. in rivulis Jun.

S. Sylvestre. in pratis humidis, ripis et in undatis. Jul. et Aug. Prim. l. c. et Scholler n. 546. ad margines agrorum. Jun.

S. amphibium. Scholler. n. 547. cum sine varietatibus ad fossas. Maj. et Sept.

Sisymbr. S. Radicula Hall. n. 487. in fossis et in undatis. Hexar. Prim. V. p. 129.

S. tenuifolium (non Gater. Willich) Injecto ad Mosam. + etc. infra Oppenheim ad Rhen. exsiccat. et ad vias et supra muror. Scholler. Mieg. in Comm. litterar. Haller. Tom. IV. p. 109 (Flores et totam aestatem. Latifol. N 108)

S. polyceratium * * Silig. sessil. axillaribg. (non Gl. Willich)

p. 8.

*** Caule nudo.

S. arenosum. Schleb. n. 548. in agris arenosis. April. Maj. Fol. radicalia lanceolata lyrata; caulina lanceolata dentata; pilis ſi- vel biſidis.

**** Fol. pinatis.

S. Sophia. In cultis et ruderatis Henar. 1/2 Jun. et Jul. Brem. III. p. 350 Schleb. n. 549. in ruderatis frequens. Maj. Jun.

S. Iris (non Kit Willich)

S. Loeſelii.

***** Fol. lanceol. integris.

S. Sisymbrium.

Monadelphia Decandria.

Class. XVII. Monadelphia.

A. Decandria.

Geranium. 332.

* Myrrhina. Stam. 5 antheriferis. Cal. 5-phyllus. Fructus declinati.

G. cicutarium. In agris, arvis, aliis, celtis. Majo et Aug. Prim. III. p. 350. Scholler. n. 550. in campis. Maj. et April.

G. moschatum. Riv.

** Batrachia. Stam. 10 antheriferis. Pedunculis bifloris. 4.

G. ~~marochanum~~ pheum.

G. sylvaticum. In mont. editioribus rarius. Henri 1/3 Aug. et 1/3 Tiber Prim. V. p. 146. Scholler. n. 551. Jun.

G. palustre. In vigetis sylvarum et ripis rivulorum. 1/3 Jun. et Jul. Henri Prim. III. p. 350. Scholler n. 552. Junio.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 19

Monadelphia Decandria.

G. pratense. In pratis. Jun. Jul. Jenae. Prim. III. p. 351. Scholler. n. 553. in pratis. Jun. Jul.

+++ Stam. 10 antherifery. Pedunculi 2-flori. ☉

G. bohemicum. ?

G. robertianum. In nemoribus, umbrosis, sepibus, ruderatis. Jenae. maj—Oct. Prim. l. c. Scholler. n. 554. ad muror. maj. Jun.

G. luridum. In umbrosis humidis. raro. 2/3 maj. prof. Jenae. Prim. l. c.

G. molle. in ruder. sep. cultis. 1/2 maj. et 2/3 Jun. Jenae. Prim. l. c. Scholler. n. 555. In hortis et agris obvia. caespitosa. Pet. semibifida, calycer submutici, corolla breviter. bipartita bifida.

G. columbinum In agris cultis et umbrosis. Jun—Oct. Prim. l. c. Scholler. n. 556. extra terminos Flor. Byrb. ad sepes Gmünd. Glinn. Jun.

Monadelphia Decandria

5. columbinum major. fl. minore coeruleo. Vaillant (Wulfen)

5. dissectum. in agris et cultis collium. Jun–Sept. Prim. Veron. III. l.c.

5. rotundifolium. In viridariis, cultis, ad sepes. Maj. et Jun. Veron. Prim. III. p. 352. Scholler n. 557. in agris. etate. Petala integra obtusa incarnata. Cal. mucronati. Planta subhirsuta.

*-**** Stam. 10 antheriferis. Pedunculis bifloris.

5. sanguineum. In mtibz. Gallaj. et ½ Jun. Prim. Veron. III. p. 352. Scholler. n. 558. in glar. Jun. Jul.

l. c.

Monadelphia Polyandria.

B. Polyandria.

Lavatera. 333.

L. thuringiaca. Scholler. n. 559. ad domata - Jul. Aug.

Malva. 334.

M. rotundifolia. In ruderat. et campis. Jun ad sept. Sem. Hem. III p. 352. Scholler. n. 560. ad vias aestiv.

M. sylvestris. in ruderat. versur. campis, cultiby. Jul. et Aug. Sem. l.c. Scholler. n. 561. in ruderatis aestate.

M. Alcea In cultiby dumosis. ½ Jul. et Aug. Hemic. Sem. l.c. Scholler. n. 562. aestate.

M. moschata.

Monadelphia Polyandria.

Althaea. 335

A. offic. Schreber. n 563. ad fossas. copiose. Jul. Aug.

A. cannabina.

A. hirsuta. In collibg. c. A. Alth. Holl. n. 1073. Hsenac. Sm. III. p. 353. c. descr. et V. p. 129.

p. 14.

Class. XVII. Diadelphia.

A. Hexandria

Fumaria. 336.

F. bulbosa
Var. cava et solida Jenaei in nemor. et sepib. Dcava floret 1/2 April
post. et solida 1/2 April prior. Spic. III. p. 353.
Var. cava mire et alte fere circa Marburgum ad Cattorum saepes Mens. et April Vahl
Obs. Bot. p. 13. est Fum. rad. solida latide Marburgi.
Schuller. n. 564. April. Flor. albis, rubris, coeruleis variis.

F. officin. In arvis, agris pinguibus. 2/3 maj – Aug. Jenae. Spic.
III. p. 354. Schuller. n. 565. in hortis et agris copiose. Gesale.

Boccone Tab.
Fuchsii Icon.
Lobelio

B. Octandria

Polygala. 337. (Lin. sp. p. 986.)

* Cistati.

P. amara

Diadelphia Decandria.

P. vulgaris. L. a et β. Jenaer. In pasc. collib. sylvis. 2/3 Maj. et 1/5 Jun. Sturm. III. p. 354 et V. p. 129. Schuller n. 566. in pascuis. Maj. Jun. Corolla violacea, carnea, alba.

P. chamaebuxus. ✱✱ Imberber J. B. hist. 1. p. 524. Solenhofii b. Dr. Mauvezülz reperit. Ferd. Jac. Baier. vid. ej. epistola itineraria in Nov. Act. A. N. C. Tom. IV. appp. p. 173. Flor. Maj.

C. Decandria.

Spartium. 338.

S. scoparium. In campis, sylvis. 1/5 Maj. et 1/2 Jun. Sturm. Jenaer III. p. 354. Schuller. n. 569. in sylvaticis arenosis. Maj

Genista. 339

✱ Inermes

G. sagittalis.

G. tinctoria. In pascuis, collibus, sylvis. 2/3 Jun. et 1/4 Jul. Jenaer Sturm. III. p. 354. Schuller n. 563. Jun. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

5. pilosa. Schreber. n. 569. in addit. Jun.

** Spinosa.

5. anglica.

5. germanica. In pascuis, sylvis. ½ maj. et ½ Jun. Jenaci 5 trim. III. p. 354. Schreber. n. 570. asiatica.

it. Hall. p. 340.

A. Vulneraria. In collib. Jul. Jenaci 5 trim. III. p. 355. Schreber. n. 571. ad margines agrorum. Jun.

A. montana.

Diadelphia Decandria.

Vicia. 341.

V. cuspidata.

Onobr. 342.

O. arvensis. In campis, collibg. Jul. et Aug. Jtenerar. Trim. III. p. 355.
β. var. spinosa. in campis, agris, collibg. ½ Jul. ad 7ber Jtenerar. Trim. l. c.
Schreber. n. 572. et ad viar ad versuras. caulis hirsuta et non spinosa, quae iunior.

O. minutissima.

Orobus. 343.

Colutea. 343.

C. arborescens.

p. 18

Orobus. 344.

O. pannonicus Jacq. f. austriaca Crantz.

O. vernus. In nemor. ½ Apr. et ½ Maj. Henoch. Linn. III. p. 353. Scholler. n. 573. In sylv. April. Maj.

O. tuberosus. In Hoy sylv. Maj. et ½ Jun. Linn. l. c. Scholler. n. 574. Maj. Jun.

O. niger. In M. Hoorselberg rariss. ½ Jul. prim. Linn. Henoc. V. p. 146. Scholler. n. 575. in sylvatic. Jun.

Pisum

Pisum sativum f. Vin. Cl. arvense Scholler. n. 576. in agris passim cultum.

Lathyrus. 345.

** Pedunculis multiflor.

L. Aphaca.

L. Nissolia. (Wenht Wilhelm) in agris rariss. ½ Jun. et ½ Jul. Henoch. Linn. III. p. 356. Scholler. p. 360. n. 1613. in graminos. Aug.

Diadelphia Decandria

++ Pedunculis multiflor.

A. hispidum.

A. tubeosum. In agris argillosis. Jacq. Enum. Henarc. III. p. 356. Scholler. n. 577. inter segetes copiose. maj. Jun.

A. pratense. In pratis. ½ Jun. et Jacq. Henarc. Enum. l. c. Scholler. n. 578. in pratis et dumetis copiose. maj. Jun.

A. sylvaticum. In collibus dumosis. Jacq. Enum. l. c. Scholler. n. 579. in editis Jul. Schola liliacea, nec caule labiosa. Siliculae subulatae angustissimae.

A. calycinum. Scholler. n. 580. in nemoribus frequens. Jul. Folia cilyptica, caule multoties labiosa. Siliculae etc. caule labiosae et fere hastatae.

L. heterophyllum

L. palustris. Scholler. n. 581. in forsit varietate. Ostsee.

Vicia 346.

+ Pedunculis elongatis.

V. pisiformis. In dumetis collium. variet. ½ Jun. et Jul. Jenaci Trim. III. p. 356.

V. dumetorum. In nemoribus variet. Jul. Trim. l. c.

V. sylvatica. In nemor. editis. ½ Jul. prim. Jenaci raro. Trim. III. p. 357. Scholler. n. 582. in Thür. Jun. Jul.

V. ~~Cracca~~ cassubica

V. Cracca. In collibus dumosis. ½ Jul. et ½ Aug. Hayek Prim. III. p. 357. Scholler. n. 582. in sepibus, dumetis, agris. Jun. Jul.

++ Flor. axillaribus, subsessilibus.

V. sativa. Hayek. in collibus, agris. Jul. Aug. Prim. III. p. 357. Scholler. n. 584. unter Hecken. Ecstatt.

V. angustifolia. Mich. In agris editis Lenne Stemwede. Julio. Hayek. Prim. V. p. 146. Scholler. n. 584. unter Hecken Ecstatt.

V. ~~lutea~~ calcynoides. In agris arvis sicciusculis. ¼ Jun. et Jul. Hayek. Prim. III. p. 357. Diarena ic. Clus. Scholler. n. 585.

V. lutea.

V. Cirium. In sepibus. maj. et Jun. Hayek. Prim. III. p. 357. Scholler. n. 586. in pratis cultis. maj. Jun.

p. 22.

Astragalus. 347.

* Caul. scapos erectis.

A. pilosus.

A. austriacus.

A. Onobrychis.

** Caul. scapis, diffusis.

A. Cicer. In versuris. raro. Jul. ad 1/5 Aug. Jenaei. Prim. III. p. 357. Scholler. n. 587. in pratis extra terminos Fl. Haro. Buj Hanau. Basle.

A. glycyphyllos. In vineis. 1/4 Jun. ad Jul. Jenae. Prim. III. p. 358. Scholler. n. 588. Jun.

A. arenarius. Scholler. n. 589. in arenosis. Jun.

** Scapo nudo; absq caule foliato.

A. montanum.

A. campestre.

P. alpina. Phacm. 348

57.

fragaut

p. 24.

Trifolium. 349.

* Petiolis, legum. nudis polyspermis.

T. M. cyanea.

T. M. ochr. a flor. alto in agris, collib. campis Jun – Sept. pfl. allv. in collibus & montib. Helv. temp. Hexaed. Prim. III. p. 358. Scholler. n. 590. Scalae et Index. cum Syng. cyanosi. Jun. Jul.

** Lotoidea legum. lectis, polyspermis.

T. hybridum. In agris et pratis. Jul. Aug. Prim. Fl. V. p. 146. Scholler. n. 591. in graminos. Jun. Jul.

T. repens. In pratis, pascuis, versuris. Jun – Oct. Hexaed. Prim. III. p. 358 Scholler. n. 592. in pascuis, pratis, agris regnalis. Maj. Sept.

*** Lagopoda, calycibus villosis.

T. rubens. Scholler. n. 593. in Sylvis. Scabra. Calyx nudus dentibus pilosis. Foliola in nostris non serrulata. Calycis dens infimus longitudine corollae, reliqui brevibus.

Trifol. spicis villosis, foliis inferioribus, vaginarum caudis latioribus. Hall. Gott. p. 283 Trifol. montan. purpur. majus C. B. Hoc Trifol. seposita mihi species, aliis temporibus fusius describenda. In Sylvis montan. Jun – Sept. Hexaed. Prim. III. p. 358. et V. p. 130.

T. pratense. In pratis, versuris. Jun. Maj – Aug. Hexaed. Prim. III. p. 358 Scholler. n. 594. in pratis ubiq. obvia.

T. alpestre. (~~Hoppe et Hornsch. (Hausm.)~~) In pascuis. ½ maj. et Jun. Henoch. Schm. V. p. 129. cum hac conjungit Hall. Helv. n. 376. Schm. l.c. Scholler. n. 595. in Dauphiné et alibi. Jun. Jul. Simile T. pratensi quoad flores et T. montano quoad folia. Alpestre scapulae virides, pratensi similiora venis nitore; hoc scapulis ultimis strictis, illud subnudis. Folia linearia, glabra, striata, intra basin ciliata; cetera serrulata.

T. arvense. In agris, arvis. Jul. et Aug. Schm. III. p. 359. Scholler. n. 596. in agris copiose. Aestate. Alae intus elegantissime maculae sanguineae.

T. ~~fistulosum~~. fistulosum In pascuis Henoch. variis. ½ Maj. prius. Schm. l.c. c. descript. Scholler. n. 597. in agris. Maj. Jun. Calycis laciniae exteriores longiores, validiores. Corollae albae, angustae, longitudine calycis.

T. striatum. ~~++++~~

++++ Vesicaria, calyce inflato ventricoso.

T. fragiferum. In pratis humidis. rare. Henoch Schm. III. p. 359. fl. ½ Jul. Scholler. n. 598. Aug. Flores apud nos plerumque purpurei.

~~+++++~~ Linnaeana vexillo corolla inferiore.

T. montanum. In pascuis et pratis montanis. Schm. ½ Jun. et ½ Jul. Henoch. Schm. l.c. Scholler. n. 599. in pascuis. Jun. Jul. Flores saepe petali albi. Capitulum ovi fere racemo coarctati, bracteis subulatis nunquam inferioribus.

T. agrarium. In pascuis. Jul et ½ Aug. Hsen. Schm. III. p. 359. Schöller. n. 600. in agris frequens. caespite. Cor. flava, nec spadicea.

T. spadiceum. In pratis montan. humidulis. ½ Jun. et Jul. Schm. l. c.

T. procumbens. In pascuis, arvis, agris. ½ Jun et Jul. Schm. l. c. p. 360 Schöller. n. 601. in graminetis Jun. Jul. A T. agrario differt capitulis minoribus, paucioribus, setillis angustioribus, parum hiatis; nec plicatis. Praeterea caules longi decumbunt; modo one alterove erecto.

T. filiforme. In prat. mont. humidulis. Jun. et Jul. Schm. l. c.

Hedysarum. 350.

H. alpinum.

H. humile.

H. Onobrychis. In collibus et ruderatis ½ Jun. et ½ Jul. Schm. III. p. 360. Schöller. n. 602. in editis. Jun. Jul.

Diadelphia Decandria.

C. Emens. Cornilla. 351.

C. ~~Scandens~~ coronata. Iserari in veneis am Hoerselberg. abbr. rarius. 1/3 Jun. prior. 5 nim. III. p. 360. et V. p. 130.

C. Secundata.

C. varia. Schaller. n. 603. in agris arenos. aestate.

Ornithopus. 352.

O. perpusillus. Schaller. n. 604. in agris arenos. et hosp. Planta gracilis procumbens. Folia petiolata. Pedunculi longissimi foliis. Flores luteo vexillo rubro reticulato.

(p. 28)

Hippocrepis. 353.

H. comosa L. In collib et pascuis. ½ Maj. ½ Jun. Jenae. Schm. III. p. 360.

Medicago. 354.

M. sativa.

M. falcata. In collib. campis, versus. ½ Jul. et Aug. Schm. III. p. 361. Schreber. n. 605. ad vias et sepes. Jun.

M. lupulina. In pratis, agris uberalis. Jul et Aug Schm. l.c. Schreber. n. 606. in cultis, agris pratis. estate.

M. polymorpha.

Var. minima. Jenae in versuris, rarius. ½ Maj. ad ¼ Jun. Schm l.c. Schreber. n. 607. in sterilibus glareosis. Maj. ad Sept.

Ervum. 355.

E. tetraspermum. In agris humidulis passim gallic. raro. ♀ Jun. ♂ ½ Jul. Jenaer Syst. III. p. 361. Schreber n. Beyt. in horto et agris. Regensb. Flora. E. Lens Scop. Wild. inter legumin. agri var. Regensb. Flora Schreber. n. Beyt.

E. hirsutum. In pascuis collib., agris. ½ maj ♂ ½ Jun. Jen. Syst. l. c. Schreber n. Beyt. inter legumin. Regensb. Flora.

E. solonense.

E. caule, et foliolis obverse ovatis hirsutis, Ait. Linn. p. 358. n. 6.

Cytisus. 356.

C. laburnum.

C. nigricans.

p. 30.

C. hirsutus.

C. supinus.

C. anfractuosus (non ht Wibich)

Lotus. 357.

* Legum. variabilis, nec capitulum anfractuosi.

L. maritimus

L. siliquosus. Schultes n. 611. ad fossas. Jun. Jul.

** Pedunculis multiflorus in capitulum

L. corniculatus.

a) L. pentaphyllos, fl. maj. luteo, splendente. C.B. ♃ Jenae in pratis humidis vicinis. Jun. β. Lob. pentaphyllos minor, glabra. C.B. ibid. in pasc. versus. pratis. Jun — 7ber. Sum. III. p. 362. Fl. subtilissa, siliquae glabrae. Sum. l.c.

Schultes. n. 612. in pratis, versus viam et vias. β. fl. maj, luteo, splendente C.B. frequens ad fossas. vinas, aestate.

Polyadelphia Polyandria.

4. Tonycnium.

Class. XVIII. Polyadelphia.

Polyandria.

Hypericum. 358.

~~+ Perforatum.~~

H. ~~Kalmianum (Linn. fil. Trifolium)~~

H. quadrangulare. In nipir, ferruginir. ½ Jul. et Aug. Sriñ. Hsenac. III. p. 362. Scholler. n. 613. in humidis pascuis. Lasch.

H. perforatum. In collib, nupitq, amir. ½ Jun. et Jul. Sriñ. III. p. 363. Scholler. n. 614. ad sepes et dumeta copiosiss. Jun.

H. humifusum In agrir, aruir, pascuir. Jun. — ½ Aug. Sriñ l.c. Scholler. n. 615. in siccis gsale.

Hyp. (fallax) f. trigyni, fol. ovato-oblongis, nigosis, calycibq lacinior ovatis, obtusis, caule subquadrangulari. Sriñ. Hsenac. III. p. 362. in prat. montan. humidis. Jul. et ½ Aug. Est mera varietas Hyp. perforati, ut diu jam C. B. notavit in pinace p. 279. a solo humiditate producta. Sriñ. Hsenac. V. p. 130.

p. 32

H. montanum. In sylu. et nemor. raro. Jul. Brim. Jenic. III. p. 363. Scholler. n. 615. in Sylvatic. Jul.

H. hirsutum. In nemoribus. 2/3 Jul. post. Med. Brim. l. c. Scholler. n. 617. in dumetis frequens. Jul.

H. pilosellum. in sylvis. raro. 1–16 Jul. Brim. l. c.

H. maculatum Crantzii Wim. et Wilich.

Syngenesia
~~Polygamia~~. Polygamia aequalis.

c

Class. XIX. Syngenesia.

2. Polygamia aequalis.

Cichorium. 359.

C. Erythraeum. Schreber. n. 618. ad vias et in agris ubique obvium.

Hieracium in sylvis, pascuis agrisque. Aug. 7bris. Linn. IV. app. p. 80.

Hypochoeris. 360

H. maculata.

Hieracium in pascuis et collibus. Mens. 7–15bris Jun. Linn. IV. App. p. 80.
H. glabra. Schreber n. 619. in agris arenosis obvia.

Hieracium in agris, arvis. Jun. Jul. Linn. IV. app. p. 80.
H. radicata. Schreber. n. 620. in pascuis obvia.

In nemoribus et pratis sylvaticis Hieracia. Jun – Aug. Linn. IV. App. 80

Tragopogon. 361.

T. pratense. Schreber. n. 621. in pratis. Jun.

Hieracia. in pratis. Maj. et Jun. Linn. IV. App. p. 81.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 34.

Tr. pomifolium.

Ex graminetis ad Ilsenaci. Grim. IV. Appp. p. 81. Junio.

Tr. hybridum. Willich

Picris. 362.

P. Hieracioides. Schuller. n. 622 ad sepes, Jul. Aug.

Ilsenaci in collibus arenosis Grim. IV. appp. p. 81. Jul. Aug.

Leontodon. 363.

L. Taraxacum. Schuller. n. 623. in pratis vbiq. ab Aprili ad Aug.

Ilsenaci in pratis, pascuis, pomariis, versuris. Grim. appp. p. 81. Maj – Octobr.

L. aureum.

4

L. autumnale. Scholler. n. 624. in versuris, pascuis, pratis. à Jul. in autumnum.

Sium. Henaui in pratis et versuris in pr. humidiusculis. Jul-Octbr.

L. hispidum. Scholler. n. 625. estate. Praetea Henaui in pratis-rem. Pappo fusil. plumos. Var. calyce admodum hirsuto est frequentissima. Alia varietas non tam frequens foliis fol. lanceol. parum remotis, obtusa, digito vix longiora. Stirpe è glaber. Calyx glaber, in quo tamen rarum alterumve pilum striatum invenire licet. Corollae labium virescentes. IV. p. 81.

In pratis, versuris, pomariis Henaui Maj-Jul. Sium. IV. app. p. 82

L. hirtum.

L. dentatum Jacq.

Circa Henaum in pratis et montanis pascuis. Jul. Aug. Sium. V. app. p. 130.

Scorzonera. 364.

Sc. humilis Scholler. n. 626. Jun. Jul.

S. graminifolia.

Sc. purpurea.

Sc. angustifolia. Scholler. n. 629. in sylvatica graminea. Mart.

S. laciniata. Scholler. n. 630. Jun. Jul.

Prim IV. app. p. 83. Hferari in collibg et versus. Jun. Jul.

S. latifolia II. C. B. S angustifol. II. C. B. (Willich.) Hferari in collibg humidis. Jun. Jul. Prim. IV. app. p. 83 et V. app. p. 131. non e Barr. graminifolia. a.

Crepis. 365.

Cr. foetida.

Hferari in collibg apricis, campis, arvis et versus. Jun. Jul. Prim IV. app. p. 83.

Cr. tectorum. Scholleri n. 631. in arenosis, Jun. Jul.

Cr. hirsuta. Hsenacii in oro prahir, pomariis Maj. Jun. Brün IV. p. 34. Scholler. n. 632. in graminosis arenosis. Caulis angulatus, scaber, fragilis.

Cr. setosa (non ad Wilich)

Cr. scythiaca. Wulf.

Cr. hirta (Wilich)

Crepis Hall. Helv. n. 31. Crepidi Hsenacii circa Schmerbach. et Burbach. rariss. Julio. Brün. V. p. 147.

Crepis caule ramoso. f. glabesc. foliis integris s. dentatis. Hall. n. 33. Hsenacii in arvis, collibus, agris. Jul. Aug. Brün V. app. p. 131. non E. Cr. tectorum L., quae nec crepidi Hsenacii.

p. 38

Syngenesia. Polygamia æqualis

Chondrilla. 366.

Ch. juncea. Hexaci in agris lapidosis argillaceis. Jul. Aug. Enum. IV. app. p. 84. Scholler. n. 633. in marginibus agrorum arenosorum. Jul.

Prenanthes. 367.

P. purpurea.

P. muralis. Hexaci in nemoribus Jul. Enum. IV. app. p. 84. Scholler. n. 634. ad murros. Jul. Aug. Pappus dispicatur.

Lactuca. 368.

L. quercina. Scholler. in nemorosis. Jul. n. 635

L. Scariola. Iron hit villich? Scholler. n. 636. ad aggeres ad Esper. Jul. Aug.

L. virosa. Habitat in collibus et montibus. Jul. Aug. Stirp. IV. app. p. 84.

L. saligna. Scholler. n. 637. in Saxis. Oelske. Icon Hall. Enum. Gen. p. 207. tab. 4.

L. perennis.

Hieracium. 369.

+ Scapo nudo unifloro.

H. incanum.

H. alpinum.

H. pilosella. Habitat in collibus, pascuis Maji ad Aug. Stirp. IV. app. p. 85. Scholler n. 638. in aridis, siccis. Maji. Sept.

H. hedypnoides. in declivibus.

✱✱ Scapo nudo multiflow.

H. dubium. Hsenaci. collet, pascua, vie graminea sylvarum. Jun. Jul. Brim. IV app. p. 85. Scholler. n. 639. in editis sicciv. Jul. Aug. Fol. Obtusa pilis rarioribus aspersa. Caulis parum hirsutior, uno alterove foliolo donatur; flores 2 aut 3 in cacumine ferent.

H. Auriacula. Hsenaci in collibus Jun. Jul. Brim. IV. app. p. 85. Scholler n. 640. in cespitosis in Hohenstein. Jun. Jul. Fol. acuta. Caulis et calyces nigris setis aspersi. Fol. pilis longis hispida.

H. cymosum (Non sat Wallich) Hsenaci in collibus septentrionalibus? Jul. Brim. App. in IV. p. 85.

H. præmorsum. Hsenaci in pascuis et sylvis. Maj. Jun. Brim. IV. app. p. 85.

H. aurantiacum.

H. pratense (caliscol. non sinuatum major. C. B. (Willich). sed non nisi H. præmorsum, qd obs. (sc.) Willich? quæ? Q.

✱✱✱ Caule foliato.

H. chondrilloides.

H. pomifolium.

Syngenesia Polygamia aequalis.

H. murorum. Jenaci ad pilos. β) sylvaticum γ. myophorum. α in rupib. β in sylvis et γ in sylvis. Jun. Jul. 5 rim. IV. appp. p. 85. Schreber. n. 641. var. β sylvaticum. Jun. Jul.

H. paludosum. Jenaci in prat. humidiusculis. Jun. Jul. 5 rim. IV. appp. p. 86.

H. villosum.

H. sabaudum Jenaci in sylvis. Aug. Sept. 5 rim. IV. appp. p. 86. Schreber. n. 642. in Brigau Helv. Jul. Aug.

H. umbellatum. Jenaci in sylvis et pascuis Jul. Aug. 5 rim. ibid. Schreber. n. 643 ibid. Jul. Aug. Calyces squarrosi.

Sonchus. 370.

S. palustris.

S. arvensis. Scholler. n. 626. inter segetes copiosiss. cæsiate.

In agris præsertim humidiusculis. Hsenaci Jul. Aug. Sptm. IV. app. p. 82.
S. lævis. Mihi

S. oleraceus. in cultis obj. cæsiate. Var. fol. modo lævibus, modo spinosissimis, nunc valde profunde ming laciniatis, habitum plantæ satis diversum reddunt. Excubiæ flores agit ab hor. 6. s. 7. in H. s. 12 antemeridianam. Scholler. n. 627.

Hsenaci in cultis, agris et viderabis Jul. Aug. Sptm. IV. p. 82.
S. asper. Mihi

Hsenaci et alterubi.
S. alpinus?

Lapsana. 371.

L. communis. Hsenaci. in agris et arvis. Jun. Jul. Sptm. l. c. p. 86. Scholler. n. 641. inter olera in hortis. Jun. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hyoseris. 372.

H. foetida.

H. minima. Smith. cum Icone in arenosis agris. Act. Aug. Nov. Act. A. N. C. IV. app. p. 87. Schkuhr. n. 645. in arenosis agris. Inf. Aug.

Carlina. 373

C. acaulis a)

β. caulescens. a. 1785 Icone in collibus montibus g. Aug. Smith. IV. app. p. 87.

C. vulgaris Icone in collibus, montibus. Aug. Segu. Var. caulescens. Scato. Smith. IV. app. p. 87. Schkuhr. n. 646. ad vias juxta Inf. Aug.

Cnicus. 374.

C. oleraceus Icone in prat. humidis. Aug. Smith. IV. app. p. 87. Schkuhr. n. 647. in humanibus. Inf. Aug.

C. Erisithales.

C. spinosissimus.

C. pygmaeus.

p. 44.

Arctium. 375.

A. Lappa. Scholler n. 648. in dumet. Jul. Aug.
a) v. major y v. major capitulis homotonis y. Lappa vera. a in uberatis versant, agris y in nemoribus y. nam in gradibus hausser auf dem Creuzberg bey Salzburg. Gmel. Aug. Frib. Hoffmanns. fl. IV. p. 88.

A. personata.

Carduus. 376.

† Fol. decurrentibus

C. lanceolatus. Hyemali in campis, collibus, uberatis. Jul. Aug. Frib. IV. app. p. 88. Scholler n. 649. Jul. Aug.

C. nutans. Hyemali cum priori. flora alba var. Jul. — Oct. Frib. l. c. p. 88. Scholler n. 650. Jul. Aug.

C. acanthoides. Scholler. n. 651. in marginibus agrorum. Jul. Aug. Flore minore, quam in C. nutante, maiore quam in C. crispo. Pedunculi alis crispis. Gmelin.

C. crispus. Hyemali s in uberatis et campis. Jul. — Octobr. Frib. IV. app. 88. Scholler. n. 652. in dumet. obvia.

C. defloratus.

C. ~~tuberosus~~ paludosus Jenaei in pratis humidiusculis sylvarum praesertim fl. albo. Jul. 7bris Schm. IV. appp. p. 89. Scholler. n. 655. in humidis. asiae.

C. cyanoides L. (Wahlb. Willich) in aridis frequens. est var. a monorlonos. Linn. Sunstarch. sp. cresol, ubi Schreberg non certiores fecit. Scholler. n. 654. asiae flaret.

C. deflorates. Schm IV. appp. p. 89. Jenaei in collibus depressis. Jul. Aug.

C. tuberosus.

Cirsium Hall. n. 176. Jenaei in pratis et pascuis montanis. Jul. Aug. Schm. ~~IV.~~ V. appp. p. 131. Neg. Jenaei nec Goettingae unquam C. tuberosum. vidit Schm.

++ Fol. ensiformibus.

C. acaulis. Schm IV. appp. p. 89. Jenaei in aridis et incultis sepes. Scholler. n. 655. ad muros in aridis passim. Jul. Aug.

C. eriophorus.

C. serratuloides.

C. helenophyllus? Reich viv. mscripsit meum in 4to Litt. C. haud Cardui, quem de la Chenal in Act. Helv. Vol. 4. describit. In paludosis Goett. hic carduus cum nostro, in paludosis Göttingae non raro inscientibus, sed comparatus, eidem esse Cirsium asphodeli radice, alias quidem tamen diversus, cetera simillimum. Hall. emend. Et auct. in Fl. Stol. Helv. p. 90.

p. 46.

C. mollis.

C. acaulis. Jenaci in pascuis editis et collibus. Aug. 7bris Varietas
caule subbrachiato multiflora in Nisbach. flor. cruciat. Sem. IV. app.
p. 89. Scholler n. 656. in pascuis. Jul. Aug. Caulem patrum saepius habet.

Onopordum. 377.

O. Acanthium. Sem. IV. app. p. 90. In campis inderatis. Jul. Aug.
Scholler. n. 657. in inderatis et ad vias. Jul. Aug.

O. Illyricum.

Serratula. 378

S. tinctoria. Jenaci in pratis et collibus dumosis. Jul. Aug. Sem. IV. app. 9
Scholler. n. 658. in pratis sicciusculis. Jul. Aug. Var. alba fol. flg. serratis et
datur.

S. alpina

Syngenesia Polygamia æqualis.

S. awen sis. Hsenaci in prat. humidiss. Jul. Aug. Sturm. IV. appp. p. 90. Scholler. n. 659. in agris et pascuis vig. Jul. Aug.

Cacalia. 379.

C. alpina.

Chrysocoma. 380

Ch. linosyris.

Eupatorium. 381.

E. cannabinum. Hsenaci in uliginosis et udis nemorum Aug. Sturm. IV. app. p. 90. Scholler. n. 660. ad Alsim. Jul.

Bidens. 382.

B. bipartita. Hsenaci in inundatis, ripisque et fossatis. Aug. 7ber Sturm. app. IV. p. 90. Scholler. n. 661. ad fossas et stagna. Jul. Aug.

B. cernua. Hsenaci c. seq. priori crebrius et floret. Sturm. l.c. p. 91. Scholler. n. 663. in humidis. Aug. Corollis Bidens hinc seminibus, sed radiata. Scholler. l.c.

B. minima. Hsenaci (ob Vielleicht) in agris arenosis humidis. et stale. Variet. et B. bipartita serund. strab. Scholler. n. 662. et stale floret.

B. Hall. n. 120. y. Verbesina minima Lill. In inundatis Hsenaci. Sept. Sturm V. p. 147.

p. 48

Syngenesia Polygamia superflua.

B. Polygamia superflua.

Artemisia. 383

A. campestris. Scholler. n. 664. in versuris siccioribus. Aug. 7bris.

A. maritima.

A. pontica. Jenaei in collibus. Aug. 7bris Brun. IV. appp. p. 91.

A. Absinthium Jenaei in ruderibus et collibus. ½ Aug et 1 Sept. Brun. l. c. Scholler. n. 665. ad viar. et pagos. Jul. Aug.

a) A. vulgaris. Jenaei a) vulg. β vulg. maj. caule ex viridi albicante. a) ~~vulgaris~~ in ripis, ruderatis, versuris β in coemeterio Aug. Brun. l. c. Scholler. n. 666. ~~et~~ cum sequentibus et aliis copiosissime. Jul. Aug.

Synyenesia Polygam. Syngenesia.

Tanacetum. 384.

T. vulgare. Hfenaci in ripis et versus. ½ Aug. et ¼ Sept. Schm. IV. app. p. 92. Scholler. n. 684. am Elbedamm et alibi. copiose. Jul. Aug.

Conyza. 385.

C. squarrosa. Hfenaci in collibus. ½ Aug. post. Schm. IV. app. p. 92.

Gnaphalium. 386.

* Cinereum.

G. dioicum. Hfenaci in pascuis editis et collibus. Maj. Jun. Schm. IV. app. p. 92. Scholler. n. 669. in aridis sabulosis copiose. Maj. Jun.

G. arenarium Hfenaci in area regia zwischen Unterellen u. Herda jenseits dem Diebichsberge. Aug. Schm. IV. app. p. 92. Scholler. n. 668. in arenosis Hfenaci. Frutic. et Jul.

** Argyreum.

p. 3v.

††† Filaginoidea.

S. sylvaticum. Hemer in Sylvanum humidiusculis. Aug. Sept. Sturm. IV. appp. 92 Schkuhr. n. 670. in pascuis. Jul.

S. silvaticum. Hemer in nemoribus et agris humidiusc. Jul. et 1/2 Aug. Sturm. IV. appp. p. 92. Schkuhr. n. 671. in humidis. Jul. Capitula marginalia.

S. saxatile. (Wilich)

Xeranthemum. 387.

X. annuum.

Bellis. 388

B. perenne. Hemer in pratis et pascuis. toto anno. Sturm. IV. appp. p. 93. Vaill. circa Parisios. Nederl. Kruidk. I. p. 25. Schkuhr. n. 672. in graminosis. vbiq. toto anno.

Matricaria. 389

M. Parthenium. in ruderatis Jenae Jul. Sem. app. IV. 93 Scholler. n. 673. ad septentrionalem Jul.

~~M. inodora Nunc non hic vid?~~ Chrysanthemum inodorum L.

M. suaveolens. Scholler. n. 674. in ruderatis et inter segetes. Stark. Receptaculum albicans. Folia bimastra incisa.

M. chamomilla. Jenae in agris. maj. Jun. Sem. IV. app. 93. Scholler. n. 675. inter segetes ubique. Jun. Jul.

Matr. recutita. Willd.

Chrysanthemum. 390.

Chr. atratum.

Ch. Leucanthemum. Sm. IV. app. p. 913 Hern. a scapo folioso major. Scapo foliato nudo major. Adnotatio in pratis et arvis p. m. orti. Aug. Jun. β. ½ Jul. Aug.
Scholler. n. 676. in prat. Maj. Jun.

Ch. inodorum. alias Matricaria inodora. Hern. in campis et agris. Jul. Aug. Sm. IV. app. p. 913. Scholler. n. 677. ad agros. Gelek

Ch. corymbosum. α minore β majore flore. Otay. Hern. in collib. sumosis et sylvis. Jun. Jul. Varietatem reperi radio pallido. Sm. C. supra cit. p. 94. Scholler. n. 678. in nemorib. Galiae.

Ch. segetum. in agris arenosis um Oberellen copiosiss. ubi olim Ruppius quoq. observavit. Sm. Flor. Hern. IV. app. p. 94. Jul. Aug. Scholler. n. 679. variissime. Jul. Aug.

Formicum. 391.

F. Pardalianches. Hern. in nemoribus. Jun. Sm. app. IV. p. 94.

F. Bellidiastrum.

Arnica. 392.

A. montana. In pratis montanis Helvetiae. ½ Jun. 8½. Jul. Spic. fl. Germ. IV. app. p. 94. Scholler in n. 680. in graminetis sylvaticis variissime. Jun. Jul.

A. scorpioides.

Distaxia Dicta d Tabernæmontano

Inula. 393.

I. Helenium.

I. Oculus Christi.

I. britannica.

I. dysenterica. Scholler. n. 681. ad boscos Regnitz. Jul. Aug.

Inula (Asper) Hall.) fol. rad. lingulatis hirsutis, subtus amplexicaulibus, dentatis. Hall. Gotting. p. 396. 397. circa Jenam in prato et ripis ad fluvium Wera. Aug. Brim. IV. opp. p. 95.

I. Pulicaria. Jenae in inundatis. ½ Aug. et ½ 7bris Brim IV. opp. p. 95. Scholler. n. 682. in inundatis exsiccatis. Jul. Aug. Cauli sepis erectus.

I. salicina. Brim. IV. opp. p. 95. in collibus dumosis siccis, nunquam ex uliginosis. Fl. ½ Jun. post. Scholler. n. 683. Jun. Jul.

I. hirta. Scholler. n. 684. ad sepes et fossas copiose. Brun. et S. Salicina differt fol. radicalibus, obtusioribus, vix manifeste serratis, caule uliginoso. ~~Calyx uliginoso~~ Calyx quasi foliosus.

I. germanica.

I. ensifolia.

Erigeron 394.

E. ~~acre~~ canadense. Jenae in humidis circa nemora sic. Aug. Brim. IV. p. 95. Scholler. n. 685. in collibus et ruderatis copiose. Julio.

E. ~~alpinum~~ acre. In collibus circa Jenam Jul. Aug. Brim. IV. opp. p. 95. Scholler. n. 686. in siccis. Aug. 7bris. Herba Ruga Wedelii.

C. alpinum.

Solidago. 395

S. Virgaurea. Jsenari in collib. umbros. et sylvis. Aug. Sept. Brün. IV. app. p. 96. Scholler. n. 687. var. altior fol. integerrimis. Aug.

Jacobaea absinthii folio. Chrysanthemum alpinum II. Clus. I. p. 333. Solidago est fol. vaginosis, pinnatis, pinnis paucioribus, acutis, simplicibus, et bifidis. Kalt. enum. VI. in Act. Pal. T. VI. p. 21. a in Hercynia Tab.

Cineraria. 396

2) C. alpina aspleata et sinuata Wilich.

V. integrifol. Jsenari in nemor. editior. Maj. Jun. Brün. IV. app. p. 100.

V

Cineraria palustris. Leyss. Hall. p. 165. Scholler. n. 688. in paludibus frequens. Jun.

S. helenites.

Senecio. 397.

* Florib. flosculosis.

S. vulgaris. Jsenari in arvis cultis. toto anno. Brün IV. app. p. 96. Scholler. n. 689. in cultis agriosis. per totum fere annum.

** Fl. radiat.: radio revoluto.

S. viscosus Jsenari in ruderat. nemor. mur. Jul. Aug. Brün. l. mods c. Scholler. n. 690. in arenosis. Jul. Aug.

S. sylvaticus. in nemorib. et sylvis caedui. Jsenari Jul. ½ Aug. Brün. l. c. Leyss. ed. Hall. tab. 3. Scholler. n. 691. in sylvis. Jun. Jul.

S. ††† Flor. radiatæ: radiis patentibus, fol. pinnatifidis.

S. ericifolius. Ifenaer in coll. dumosis et pascuis ½ Aug. ½. Reyss. Brem. l. c. Scholler. n. 692. ad dumeta. Jul. Aug.

S. incanus.

S. abrotanifolius.

S. Jacobæa. in sylvis collib. versus Ifenaer ½ Jul. et ¼ Aug. Brem IV. opp. p. 96. Scholler. n. 693. ad dumeta. Jun. Jul.

†††† Flor. radiatæ: radiis patentibus, fol. indivisis.

S. paludosus. Scholler. n. 694. ad segna. Jun. Jul.

S. nemorensis. Ifenaer in sylvis altissimis e.g. ans d. Ensselberg. ⅔ Jun. ½ Jul. Brem IV. opp. p. 97. Scholler. n. 695. Jul.

S. saracenicus. Jsenaci in sylvis montosis ½ Aug. et ½ Sept. Brem. l. modo c. Schoeller. n. 696. in dumetis Jul. Aug. Folia ovato-lanceolata, glabra, acute serrata. Corollae radii plerique gamopetali.

S. Doria.

S. Doronicum.

p. 96. T. alpina. Tussilago. 398

T. Farfara. Jsenaci in agris arvis ripis ½ Mart. et ½ April. Brem. IV. app. p. 97. in locis humid. et palustribus, ad fossarum margines Marburgi. Mart. April. Sam. Mobel dist. bot. l. de plant. vernal. p. 8. Schoeller. n. 697. in humidis. Mart. April.

T. alba. Schoeller. n. 698. ad Albim April.

T. hybrida. Jsenaci in ripis et fossis ⅔ April post. Brem. IV. app. p. 97.

T. Petasites. Circa Marburg Mart. in mat. fum. et ad fluvior. ripas. D. Nebel dec. tab. 1. p. 9.

Aster. 399.

A. acris (non est Willd) adfertur et in fossis ad Salinas Orn. Vulgo. Aug. Scholler. p. 309. n. 1014.

A. alpinus.

A. Tripolium. Circa Heracleum in Salinis Cliburgensibus. Aug. Sem. IV. epp. p. 98. Scholler. n. 699. Ad Albim arenosa. Jul. Aug.

A. Amellus. in collibus Germaniae 1/2 Jul. — Sept. Heracl. Sem. 5 mm. l. modo c. Scholler. n. 700. in Thuringia varius. Aug. Septembri.

Aster hirs. mart. Ludeg Lobel. p. 350. est A. Italicus. vitiger. tomentos. caule ramoso Hort. Hall. emend. VI. in Act. Pal. T. VI. p. 21. n. 75. An in Germania?

Anthemis. 400

* Radio disciore f. alb.

A. alpina.

A. arvensis. Heracl. in agris et arvis Maji. Jun. Sem. IV. epp. p. 98. Scholler. n. 701. ad vias et in agris. Astate.

A. Cotula. Heracl. in agris et viduatis. Jul. Aug. Sem. l. modo c. Scholler. n. 702. Jun. Jul.

A. Pyrethrum.

A + Radix carnosa s. bulbo.

A. Victoria. Hsenari in collibus Jun. Jul. Sriñ. IV. app. p. 98. Scholler. n. 703. Jul. Aug.

Achillea. 401.

A. Clavenae.

A. Ptarmica. Hsenari in pratis humidiusculis et virginosis ⅓ Jul. Aug. Sriñ. IV. app. p. 98. Scholler. n. 704. Jun. Jul.

A. abrata.

A. Millefolium. Hsenari a/albū et/purpureū. obvia in pratis, ver- sim. pascuis Jul. Aug. Sriñ. IV. app. p. 99. Scholler. n. 705. ad viam. et stabi agrestes. Estate.

p. 60

Syngenesia Polygamia frustranea

A. nobilis. Scholler. n. 706. in aridis apricis. maj. Jun.

Bupthtalmum. 402.

B. salicifolium.

C. Polygamia frustranea.

Centaurea. 403.

* Flores radii: calycinis squamis ~~intermixti~~ spinoso-ciliatis.

C. phrygia. Henaci in sylva vor Oberellen neben der Heerstrasse ½ Jul. M. Aug. Prim. IV. opp. p. 99. Scholler. n. 707. in Jul. Aug.

C. nigra.

C. montana. Henaci in pratis mont. et ripis mar umbrosis. maj – Aug. Prim. IV. opp. p. 99.

C. Cyanus. Henaci in agris Jun – ybr Prim. l.c. Scholler. n. 708. under Sept. Junio.

C. paniculata. Scholler. n. 709. in collibus et versus Regulum. Jun. Jul.

C. Scabiosa. Jenaei in collib. et pascuis Jul. Aug. Grim. IV. app. p. 99. Scholler. n. 710. in versur. variis. Jun. Jul.

C. Stoebe.

Acetosa
Africana
Cluk. Hagen
in Jun.

** Rhapontica: calycinis squamis ovatis scariosis.

C. Jacea. Jenaei in pratis pascuis versur. ½ Jul. Aug. Grimm IV. app. p. 99. Scholler. n. 711. in pratis et graminetis vulg. obvia.

C. splendens?

Corcopsis.
C. Bidens. Scholler. n. 714. in vineis Aug.

Calcitrapa:
*** Cuchus: calycinis squamis compositis.

C. Calcitrapa. Scholler. n. 712. in aggeribus et versur. Jul. Aug.

C. solstitialis. (Von La Wallach) Scholler. n. 713. In campis. Aug. Sept.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 62.

Syngenesia Polygam. necessaria

D. Polygamia necessaria.

Filago. 404.

F. germanica. Sturm. in Hefteri. vid. IV. app. p. 103. in arvis agris collibus ½ Jul. et ½ Aug. Schreber. n. 715. in agris et aliis in siccis. Jul. Aug.

F. pyramidata.

F. montana Hefteri in arvis collib. passim. Jul. et ½ Aug. Sturm. l.c. Schreber n. 716. in sterilibus. Jul. Aug. Fol. lanuginosa, floribus paucis albis disjunctis.

F. arvensis. Hesse bei Willich. Hefteri in campis et arvis Jul. Aug. Sturm. l. Schreber. n. 718. in agris. Jul. Aug.

F. Leontopodium.

~~Chrysa. 405.~~

Calendula. 405

C. arvensis.

C. officinalis. Scholler. n. 718. in cultis. Flor. Jul.

E. Polygamia Segregata

Ech.

Echinops. 406

E. Sphaerocephalus. Scholler. n. 719. ad dumeta. Jul. Aug.

F. Monogamia

Jasione. 407.

J. montana. Flemi in collib. pasc. rupest. ½ Jun et 2/3 Jul. Prim. IV. app. 101. Scholler. n. 720. in siccis arenos. Jun. Jul.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 64.

Syngenesia Monogamia.

Viola. 408

* Acaules.

V. hirta. Hexaci in collib. dumosis, campestr. Apr. Maj. Schm. IV. app. p. 101. Scholler. n. 721. Aprili. Maj.

V. palustris. Hexaci in udis, turfosis. ½ Maj. Schm. III. p. 147. Scholler. n. 722. in humosis palustribus. Aprili Maj.

V. odorata. Hexaci in pratis pomariis et prope sepes. 23 Aprili. Schm. l. c. supra
Circa Marburg juxta sepes Mart. Aprili. Jac. Weigel dis. inf. l. 22 p. 10. "
Scholler. n. 723. ad sepes Mart. Aprili

** Caulescentes.

V. canina. Hexaci in prat. montan. et sylvis ¼ Aprili et ½ Maj. Schm. l. supra c.
Scholler. n. 724. in Junio et alibi Aprili.

V. montana. Scholler. n. 725. in sylvis. Maj.

V. mirabilis. Hexaci in nemoribus. Aprili Schm. IV. app. 102.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

V. bifolia. Henari in silv rupestri, frigido vario. 2/3 Maj. med. Prim. V. p. 147.

*** hirsutis pinnatifidis; stigmate irregulato.

V. arvensis. Murray. Henari in arvis agri Gorlic. Maj–Sept. Prim IV. app. p. 101. Var. segnetalis
Scholler. n. 726. Apud et tota aestate. in agris arvensis. (vide sequens?) Rauch)

V. hirta in pratis über Ruhl ad viar circa Henaream Maj–Sept. Prim l. c. p. 101.

V. aspera. Habel Wallich. Zund?

V. pubescens, angustis Persica Allion et Rupp. p. 289. An ad hanc spectiosem?

Impatiens. 409

I. noli tangere. Henari in nemoribus umbrosis, praesertim ad rivulos. Aug Sept. Prim. l. c. p. 102
Scholler. n. 727. in sylvis umbrosis. Jun. Jul.

p. 66

Cl. XX. Synandria.

A. Diandria

Orchis. 410.

Orch. Hall. n. 1275. cum Icone in pascuis ½ Maj. et ⅓ Jun. Prim. ~~Herb~~ V. app. p. 132.

* Bulbis indivisis.

O. bifolia. Icone pulcra, exacta, sylvis ½ Jun. et ⅓ Jul. Prim IV. app. p. 102 Scholler. n. 728. Maj. Jun.

Or. viridiana. Mihi ~~exacta~~ Hall. n. 1277. Icone in ~~lapidosis~~, colitur Dumosa rarius. Fl. ½ Maj. et ⅔ Jun. Prim. V. p. 147.

O. globosa. Scholler. n. 729. in editis. Maj. Jun. Bulbi subsphaerici. Spica densissima brevis. Flores resupinati, purpurascentes.

O. pyramidalis

O. coriophora. Scholler. n. 730. Jun. Labium bifidum, serratum.

O. Morio. Icone in pascuis editum exacta ⅔ Maj. prior. Prim IV. app. p. 103 Scholler. n. 731. Maj. Jun. Labium laciniis crenulatum, bifidum, media emarginata. Petala obtusa, lineata.

O. mascula Hfenau in prat. montan. et pomariis Aprili Maj. Brun. l. modo cit.

O. ustulata. Schaller. n. 737. major. labium triplum media bilobo prodeuntiore punctis scabris. Petala glabriuscula.

O. militaris.
O. militaris L. quae mihi est Hall. n. 1276. crescit circa Hfenau in collibus um das Gefilde. ½ Maj. et ⅕ Jun. Brun. Trappa IV. app. p. 103 et V. app. p. 132.

O. militaris minor. Hall.

O. Cynosorchis militaris major. C. B.

O. pallens. L.

p. 68

** Bulbis palmatis.

O. latifolia Sturm IV app. p. 103 cum Hexaea in pratis udis. ½ Maj. et ¼ Jun. Schaller. n. 733. Maj.

O. sambucina. Hexaea in pascuis montanis Aprili Maj. Sturm IV. p. 103 app. Schaller. n. 734. ♣ Aprili. Maj. Var. flor. albis et rubris. Labium serratum trilobum, media emarginata punctis purpureis.

O. maculata. Hexaea in nemoribus et fossis humidiusculis Jun. Jul. Sturm l.c. p. 104 Schaller. n. 735. Jun. Labium crenatum, trilobum, media angustissima integerrima. Cauda solidus. Calcar brevis. Pet. later. parvula. Bracteae non flore longiores.

O. conopsea. Hexaea in pasc. mont. et coll. gramin. Jun. Jul. IV. app. p. 104. Schaller. n. 736. in pratis Sylvaticis. Maj. Labium aequale trifidum crenulatum, intermedia integerrima.

*** Bulbis fasciculatis.

O. abortiva.

Satyrium. 411.

S. hircinum

S. viride. Hexandr. in passerin. Linn. Syst. p. 404 Linn. IV in app.

S. nigrum.

S. albidum.

S. Epipogium.

E. repens.

p. 70)

Ophrys. 412.

* Bulbis ranosis.

O. Nidus avis, in nemor. editior. et sylv. umbros. ½ Maj. flor. in M. insulano ½ Jun. circa Jenam. Schin IV. app. p. 104. Scholler. n. 737. Maj. Jun.

O. Corallorhiza. Crescit in M. Sadelicis; inter Tridium et Bavariam supra Mittenwald; circa Vimaria, in Austria super Enzisd. Hall. Hall. in Act. Helv. 4. p. 94.

O. spiralis.

O. ovata. Jenae in prat. mons. ½ Jun. prior. Schin. IV. app. p. 104. Scholler. n. 738. Maj. Jun. Labium lineare.

O. cordata. In sepulcr. alp. Mittenwaldensi, medio via inter Inspruck et Munchen. Raj. hist. 2. lib. 21. p. 1233. no. 3. Circa Vimar. Leopold. Fl. Altens. circa Norimbergam Volckamer. fl. Norimb.

** Bulbis rotundis

O. Monorchis.

O. alpina.

O. monophylla. Hall. Hencui in collib. Dunensi maj. Jun. Prim. IV. app. p. 105.

O. fuciflora. Hall.

Serapias. 413.

S. latifolia. a) chlorifol. montana C.B. β. altera, atromberelle flore C.B. a) in collibus Dunensibus non longe a Mosbach β in collibus in der gepilde circa Hencuii Jun. Hall. Prim. IV. app. p. 105.
Scholler. n. 739. In sylvaticis. Hall.

S. longifolia. Hencui in pratis editior. humidis Hall. Prim l. c.

S. grandiflora. Hencui in sylvis et nemor. umbros. Jun. 2/3 Jun. post. Prim l. modo c.

pp. 72.

S. rubra. in collib. dum. Hy. Muschach Hesseri 12/13 Jun. post Brün. IV. app. p. 105

Helleborine bifolia rad. bulbosâ, cucullo parvo. Hall. (Wilck)

Cypripedium. 414.

C. Calceolus. Hesseri in nemoribus. 1/2 Maj et 1/4 Jun. Brün. IV. app. p. 106

B. Hexandria

tri-Hexandria. 415.

A. Clematitis. Scholler. n. 740. in dumetis. passim.

C. Polyandria

Calla. 416.

C. palustris. Schreber. n. 741. ~~in Böhmerwäldern. Hrn. Prediger Zurke.~~ in paludosis

Arum. 417.

A. maculatum Venari in nemorib. mai. Fun. Brun. IV. opp. p. 106 Marburgi copiose in sumetis et sepibus mai. Rebel. Pis. Bot. 1. p. 22.

Zostera. 418

Z. marina.

Monoecia Mo- et Diandria.

Class. XXI. Monoecia

A. Monandria

Chara. 419.

Ch. vulgaris Henari in fossis. Fl. Jun. Jul. Srim. IV. p. 139. Scholler n. 742. in fossis Jun.

Ch. hispida. In riuulis Henari. Srim. V. p. 158. Fl. aestate.

Zanichellia. 420.

Z. palustris. Henari in fossis. Jun. Srim. IV. app. p. 106.

B. Diandria

Lemna. 421.

1 L. bicarica. Henari in fossis. Non habet quando floret. Srim Wapp. p. 106 Scholler. n. 743. in fossis Jun. Jul.

2 L. minor. Vulgo aquis quietis Jun. Jul. Srim. l. modo c. p. 107. Scholler n. 744. Jun.

3 L. gibba. Non est Will. Crescit in Palagnawitz Henari. Fl. aestate. Srim. V. p. 148. Scholler n. 745. in Magaz. Jul.

4 L. polyrhiza n. in fossa in Hymnza Ilirica. Jun. Jul. Srim. IV. app. p. 107. Scholler. n. 746. in fossis et Magaz. Jun. Jul.

Lenticula palustris major vtrinque magis convexa. Mich. p. 14. t. 11. f. 2. est L. aquatica fol. minor, interna parte in vesicula ducta Hoffmann Flor. Altorf. Ita Hall. emendat. et auctor. in Act. Helv. V. p. 29. n. 83.

p. 75
135

C. Triandria.

Carex. 422.

* Spica unica simplici.

C. dioica.

** Spicis androgynis.

C. arenaria ~~Henari in sepes ubi nemorib ed. 2/3 Maj. post Schm Vappr. p. 122~~. Henari in solo lapidoso, argilloso. 1/2 Maj. post. Schm. V. app. p. 118. Reddi Schm. Hall. n. 1362. Scholler. n. 747. in arenosis. Jun.

C. disticha Schreberi.

C. leporina. Henari in prat. hum. 2/3 Maj. post. Schm. Wapp. p. 107. Scholler. n. 746. in graminosis frequens. Maj.

p. 76

C. vulpina. Hoffm. in Forst. et Hagenw. 2/3 maj. post. Schrad. IV. appp. p. 107. Scholler. n. 749. ad Forst. Maj. Jun.

C. bigeloi.

C. praecox Schreberi. Non ad Willdt.

C. muricata. Hoffm. in marginibus sylvarum et pone sepes 2/3 maj. post. Schrad IV appp. p. 107. Scholler. n. 750. Jun. Spica brevis, fol. carinata.

C. loliacea.

C. remota. Hoffm. in umbrosis Kunzendorfi. 2/3 Jun. prior. Schrad IV appp. p. 108. Scholler. n. 751. in Kunzendorf. Maj. Jun. Spiculae plerumque duae haerent in alis foliorum culmum superantium; tum unica cum folio floreli medioni; tandem spiculae circa 4 Kunzendorf.

C. elongata. Scholler. n. 752. in Kunzendorf. Maj. Jun. Spica universalis constat circiter sex spicatis, inferioribus duas lineas, superioribus unam lineam a se invicem distantibus.

Ad C. canescens L. ? Hall. n. 1360. in paludosis M. Bruckenthaler. legit vid. appendix II. ad Agrostogr. Silesiae p. 40. n. 7.

C. paniculata.

+++ Spicis sexu distinctis: femineis
subsolitariis.

C. flava. Jenaci in pratis spongiosis ver. Mosbach. 2/3 Jun. prior. Srim. IV. app. p. 109.

C. pedata

C. digitata. Jenaci in nemor. editis Aprili. Srim IV. app. p. 109

C. montana. Schreber. n. 1753. ad viar Aprili Muj. Fol. mollia flaccescentia. Culmi filiformes, nudi, pilosuli. Spica femina cruciis [illegible] nigra.

C. montana exactè a Flora Jenacensi et substituat vulgaris Linnæ Germanice Cervex cyperoid. minor spicis declinatis. Haller. Helv. n. 1381. in pascuis montanis Srim IV. app. p. 132.

p. 78.

C. tomentosa (von Kit Willich)

C. globularis. Scholler. n. 754. ad vias et aggeres sylvarum. April.

C. filiformis. Prim IV. app. p. 108 Jenaci in collibus et passim ½ April et ½ Maj.
Scholler. n. 755. April. Maj.

Gr. cyperoides, fol. caryophillei, spicis erectis, sessilibus, e
semin. conferti compositis. Rai. (Willich) An ad
hanc referenda?

C. Hall. n. 1398. Jenaci in sylvis. ½ Maj. post. Prim. V. p. 149.

Carex. Prim. circa Jenam. In collibus. ½ Maj. med. V. p. 148.
vix dignus qui unum vid. descripsit plantæ quæ non distinguuntur.

* *.* * Spicis sexu distinctis: seminibus
pedum calatis

C. atrata

C. capillaris. An generis R.

C. sylvatica Schreb. Hoppii in nemoribus editior. Fl. Fun. post. Brimm V. opp. pp. 132.

C. pallescens Hoppii in nemor. Lapidosis et collib. dumosis. Fun. Brimm. op. IV. opp. p. 108.

C. panicea. Hoppii in prat. humidiusc. Fl. Maj. post. Brimm. IV. opp. 109.

C. Pseudo-Cyperus. Scholler. n. 756. in paludib. Maj.

C. echinata. Scholler. n. 757. ad fossas. Septent. Maj.

p. 80.

C. humilis. Jenaer in voll. auctiss. n. 2 a syn. prior. Hall. n. 1370 β. Schum V. appp. p. 183.

C. distans. Schoter. n. 7. 58. ad fors. huj. fm. Accedit ea differt spicis longe distantibus, brevitter pedunculatis, nec nutantibus; capsulis acuminatis; squama calycina acuta.

Cyperoides etc Micheli. p. 56. n. 8. (Willich.)

Gr. sylvatic. angustifol. spica alba. C. B. Schmidt. p. 410. t. 10. f. 3. 4. 5. (Willich)

Cyperoides minus an ad hanc pertinet? spicis densioribus. J. R. H. (Willich)

Cyperoides etc Schenoch. p. 416. (Willich)

Cyperoides etc Schenoch. p. 416. (Willich)

Cyperoides etc Schenoch. p. 445. (Willich)

***** Spicis sexu dioicis: masculis pluribus.

C. acuta. Habitat in ripis ½ Maj. prior. Prim. IV. app. p. 109. Scheller n. 759. in fossis April. Maj. In pratis siccis vulgatis, in aquosis saepe triplo altior. annuis polymorpha planta.

C. nigra. Habitat in pratis humidiusculis ½ Maj. prior. Prim. l. modo c.

p. 82.)

C. vesicaria. Henari in ripis fossarum et stagnorum maj. est secundum Grim Hall. n. 1409. Grim. IV. app. p. 109. et V. app. p. 133. Scholler. n. 760. ad Forsar. n. Mant. Obs. var. β. occurrit ad fossas. Scholler.

Car. vesicariæ var. γ. singulare Willichii species est.

C. hirta. Henari in pratis arenosis, humidiusculis maj. Fun. Grim. IV. p. 1
In graminosis. Fun. Scholler. n. 761.

C. flacca Schreberi. (Var. ß Willich.

Sparganium. 423.

Sp. erectum. in fossis prioris. Jul. Aug. Henac. Grim. IV. p. 110. Schaller. n. 762. in fossis stagni alti Jul.

Sp. natans.

Typha. 424.

T. latifolia. Henari in fossis Jagr. Aug. Grimm. IV. p. 110. Schaller. n. 763. in fossis Jul. Aug.

T. angustifolia. In stagnis Henac. Aug. Grim. l. modo c. Schaller n. 764. in stagnis frequentior quam praecedens. Jul. Aug.

Axyris. 425

A. ceratoides.

Monoecia Tetrandria.

D. Tetrandria.

Urtica. 426.

V. pilulifera. Scholler. n. 765. inter ceteras rarius. aestate.

V. urens. in aris, viarum. cultis. Jenae. April et Sept. Sturm. IV. app. 110 Scholler. n. 766. in cultis vbiq. aestate.

V. dioica. In viarum. prarum. Jun. — Sept. Sturm. Jenae. IV. app. p. 110. Scholler. n. 767. in viarum. vulgaris. aestate.

Buxus. 427.

B. sempervirens.

Betula. 428. (Linn. sp. p. 1393)

1) B. alba. Hoffm. Fl. P. 2. p. 148 Segg. In collibus et campis Jenae. ½ April. post. Sturm. IV. app. p. 111. Scholler. n. 768. April. May.

2) B. nana.
B. fruticosa. Leopold. Fl. Anens. p. 20.

3) B. Alnus. Hoffm. Fl. P. 2. p. 151. In nivib. et viginos. Jenae. ½ Febr. ad ½ April. Sturm. IV. app. p. 111. Scholler. n. 769. April.
B. fol. incano &c. in Sermon. vid. Hoffm. Fl. P. 2. p. 154. est Hall. Helv. n. 1631.

E. Pentandria.

Xanthium. 429.

X. Strumaria. Schoeller. n. 770. in uliginosis humidiusculis Jul.

Amaranthus. 430.

A. Blitum. Schoeller. n. 771. in hortis et cultis frequens. Jul. Aug.

F. Polyandria.

Sagittaria. 431.

S. sagittifolia. Schoeller. n. 772. in fossis. Jun. Jul.

Myriophyllum. 432.

M. spicatum. In stagnis et fossis. ½ Jul. ¼ Aug. Schm. IV. opp. p. III. Schoeller. n. 773. in fossis Jul. Spica aquatica. Spica aquatica.

M. verticillatum. c. praecedente Schoeller. n. 774. Jul. Fol. quaterna.

p. 86

Ceratophyllum. 433.

C. demersum. in fossis. Jun. Jenae. Prim. IV. p. 111. Schuller. n. 775. in fossis et stagnis. Jun. Jul.

C. submersum. (non ut vult.) in fossis Jul. Schuller. n. 776. Fructu glabri. Planta minor et tenerior, quam praecedens; fol. sesqui minora.

Poterium. 434.

P. Sanguisorba. a) minor hirsuta C. B. est minor harum, in collibus. non in pratis ut semper florendi. Prim. IV. 111. Schuller. n. 777. in hortis nostris inter olera. Jun.

Fagus. 435.

F. Castanea. J. B. T. 1. P. 2. p. 121.

F. sylvatica. J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 117. Sylvam incolit. Apr. Maj. Prim. IV. p. 111. Schuller. n. 778. Apud nos culta. April. May.

Quercus. 436 (Q. ped. p. 1412)

Q. Robur. J. J. hist. T. 1. P. 2. p. 70.
Quercus breui pedunculo Jenaci in sylvis. 2/3 Maj. post. Prim. IV. p. 112. Schuller. n. 779. in sylvis. Maj.

Q. Cerris.
Quercus burgundica. J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 78?

Q. Ilex. Non ut vulgo. Circa Viennam? vid. Smilax Dalechi in J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 101. An Vienna austriaca?

Juglans. 437.

J. regia. (Nux hat wälsch) J.B. 1. p. 245.

Corylus. 438

C. Avellana. J.B. hist. 1. p. ~~245~~ 266. sqq Fusylvis ½ April. prol. Henac. Prim. IV. p. 112. Scholler. n. 780. mart.

Carpinus. 439. (Lin. sp. p. 1416)

C. Betulus. J.B. hist. T. 1. P. 2. p. 146. Henaci in sylvis April. Prim. IV. p. 112. Scholler. n. 781. culta. April. Maj.

C. ostrya.

5. Monadelphia

Pinus. 440.

* Fol. pluribus ex eadem basi vaginati.

P. sylvestris. in sylvis ½ Maj. mad. Prim. IV. p. 112. Scholler. n. 782. in sylvis Maj.

p. 88

P. montana. Mill. (nach Willich)

P. Cembra.

P. Larix. in sylva Mosberg, quasi spontanea. Syn. IV. app. p. 112.

Pinaster IV. austriacus. Clusii. (Willich)

** Fol. solitariis et basi distinctis.

P. Picea. circa pagos, in sylvis. ½ Maj. post. Syn. IV. app. p. 112. Scholler n. 783. in sylvis. Maj.

P. Abies. Hexari Abies nigra C. B. in sylvis. ½ Maj. post. Syn. IV. p. 113. Scholler. n. 784. plantatur. Maio.

Ht. Syngenesia.

Bryonia. 441.

B. alba. Habitat in Helvetiae ½ Jun – Sept. Prim. IV. app. 113 Scholler. n. 785. in Hedwig. Fun. (An sequens? Reich.)

B. dioica Mich.

Class. XXII. Dioecia

A. Diandria

Salix. 442.

* Fol. glabris serratis.

S. triandra. Habitat in pratis. ½ April et ¼ Maj. Prim. IV. 113. Scholler ad n. 786. ad Salam et Albim. April. Maj.

S. pentandra. L. Berolini. Hall. emend. et aucl. in T. V. Act. Helv. p. 90. n. 88.

S. vulgaris mbens. C. B. (Weiden)

S. vitellina. Henau in Schlesien an der Neisse. April. maj. Brim. IV. 113. Scholler. n. 787. ad Isigna. April.

S. amygdalina. cum primi Brim. 1/3 Maj. prior. IV. 113. Scholler. n. 788. Ad Albim. April.

S. hastata.

S. fragilis. In ripis et pratis. 1/2 Maj. prior. Henac. Brim. IV. p. 114. Scholler. n. 789. Ad Albim. April.

S. purpurea. Scholler. n. 790. Ad Albim. April. Rami saepe flaveo-coralliini. Stipula nulla. Fol. inferiora, subtus opposita.

S. Helix. Henaci in ripis. ½ April post. Samen mais um-
cum. Schim. IV. appp. p. 114.

S. herbacea.

** Fol. glabris integerrimis.

S. reticulata.

*** Fol. integerr. villosis.

S. auricula (non ab Willich) Henaci in pratis siegenss. Maj.
Schim. V. p. 133.

S. arenaria. Schoeller. n. 791. in paludosis Aprili.

S. cuneata. (non ab Willich) in siegenss. Aprili. Schoeller. n. 792.

Dioecia Diandria.

S. fusca. Scholler. n. 793. in arenosis humidis. April. Semina univalvis biparlita. Folia minima supra et amenta communiter nigrescunt.

S. rosmarinifolia.

* * * * Fol. subserratis, villosis.

S. caprea. Ifenari in silvis humidiusculis ½ April. Prim. V. p. 114. Varie in M. Inselberg. Frutex vix ramosa, erectiuscula, fol. ovato-lanceolatis margine undulatim inflexo, supra glabris, subtus valde tomentosis. Prim. V. p. 133. Scholler. n. 794. Ad fossas. Mart. April.

S. viminalis. Ifenari in ripis. ½ April. post. Prim. IV. p. 114. Scholler. n. 7
Ad Altrim. Mart. April.

S. alba in ripis et pratis juxta Nossam. ½ April. ad 1½ Maj. Prim. IV.
Scholler. n. 796. in floret. April.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Salix fol. ex ellipsi lanceolatis, vix legeminis, subtus sericeis, amentis brevibus. Smell. Sib. p. 162. n. 18. In Germania reperiam hic addo, Sottinga, nec longe a pago Herserhausen; et omnia affinia ei S. foliis oblongo ovatis C. B. Hn. Hall. in Enum. et Autar. in F. V. Acta. Helv. p. 32.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Flora
Germaniae
Liber V.
1775.

Anfang d. 14 Jul. Ein Theil d. 1/2 Monats V angefangen.

Dioecia Tetrandria.

B. Triandria

Empetrum. 943.

E nigrum.
An Erica baccifera Linnæi S.B. Fl. I. p. 526.?

C. Tetrandria

Viscum. 944.

V. album. in malo et pyro Gleditsch circa pagos Ilsenaei et Arnsb. post. Sirn.
V. app. p. 115. Scholler. n. 497. in arbore hyp. Marsh.

Myrica

M. Gale. L. S.B. Fl. Fr. 2. p. 224.

D. Pentandria.

Cannabis. 446

C. sativa.

Humulus. 447.

H. Lupulus. Scholler. n. 798. in septis et domibus. Jul. Aug.

E. Hexandria.

Tamus. 448

T. communis.

F. Octandria

Populus. 449. (Lin. spec. p. 1463.)

P. alba. J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 160 seqq. Scholler. n. 799. Mart. April.

P. foliis minore. non dissimilis. J. B. T. 1. P. 2. p. 160 seq.

P. hermula. in nemoribus Henaii ½ mart. med. Sem. IV. opp. p. 115.
P. hybri Libyca. J. B. Hist. T. 1. P. 2. p. 163.
P. nigra Tragi. vid. J. B. l. c. p. 164.
Scholler. n. 800.

P. nigra. J. B. hist. T. 1. P. 2. p. 155. Henaii ripis in ripis et
pratis humidiusculis. Tourn. Sem IV. opp. p. 115. Scholler. n. 801. Mart. April

Rhodiola. 450

Q. rosea.

5. Enneandria

Nerteriales. 451.

N. ~~annua~~ perenn. in nemoribus Zenari Aprili et Maj. Brün. IV. 117. 115

N. ~~pa~~ ~~renari~~ ~~Zenari~~ annua. in cultis circa Zenari Jul. et Aug. Brün. l.c. p. 116

Hydrocharis. 452.

H. Morsus ranae. In stagnis circa Schaller n. 602.

H. Monadelphia

Juniperus. 453.

J. communis Hennei in collib. et campis. Ab. Sept. post. Stim. IV. app. p. 116 Schreber. n. 803. ad murum. rara arbor. Aprili.

J. Sabina ?

Taxus. 454.

T. baccata.

J. M. Syngenesia

Ruscus. 455.

R. Hypoglossum

Class. XXIII

Polygamia

A. Monoecia

Hclaus. 456.

H. lanatus. in pratis et pumariis humidiusculis. 1/3 Jun. ad 1/3 Jul. Grim.
Jenae. IV. appo. p. 116. Schreber. n. 804. Grim. Jul.

H. odoratus.

Andropogon. 457.

A. ischaemum

A. gryllus Hall. habet Willd.

Vaillantia. 458.

V. cruciata. in Sicily et versus Henac. Vix maj. post. Enum. IV. p. 117. Scholler n. 805. in Dumetis agrise. maj. et Segg.

V. aparine. in agris dictis argillosis Henac. Jun et Jul. Enum. IV. appo. p. 116

V. cruciata glabra C. B. (An Vaillantia? Galium est apud dem. Reich.)

Verbenum. 459.

V. album

V. nigrum.

Acer. n. 460. (Lin. Sp. p. 1495)

t. pseudoplatanus. In Silvis umbros. et nemorib. ½ maj. prior. Hexac. Trim. IV. p. 117. Acer major ♀ J. B. III. P. 2. p. ~~156~~ 168.

t. platanoides Hexac. in sep. et nemor. ½ April. post. Trim. l. supra c.

t. campestre. J. B. hist. I. P. 2. p. 165. 499 In sepib. et nemor. ½ maj. prior. Hexac. Trim. IV. p. 117. Scholler. n. 606. In sepibus. Maio.

Parietaria. 461.

P. officin. Scholer. n. 607. ad muros. Trim. Jul.

P. lusitanica.

A. rosea. Wil. Scholler. n. 808. ad muros cymose. Aest.

A. hortensis.

A. laciniata.

A. patula. in cimetis suburbanis et in solitis Cruciburgensibus circa Ysenachum. Aug. Sium IV. spec. p. 117. Scholler. n. 809. in cimetis. Aest.

A. patula in agris, cultis, ruderatis. ½ Jul. et Aug. Ysenac. Sium. IV. 117. Scholler n. 810. in cultis et ruderatis. Aestate.

B Dioecia

Fraxinus. 463

Fr. excelsior. L. Hexandr. in monadelph. ad fericb. 1/3 Maj. prior. Linn. IV. p. 118.
F. vulgatior. J. B. Hist. T. I. P. 2. p. 174. 175.
Schreber. n. 811. Aphyll. Arbores alia hermaphroditae; alia femineae sunt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Class. XXIV. Cryptogamia

A. Filices.

Equisetum. 464

E. fluviatile ad margines sylvarum subalpinas et in agris subalpinis Jenae. Maj. Sturm. IV. p. 118. Scholler. n. 812. in nemoribus April. Maj.

E. arvense Jenae in agris et pratis subalpinis ½ April. post. Sturm. IV. p. 118. Scholler. n. 813. in agris. Mart. April.

E. palustre. Jenae. paludibus humidis, rivulis. Jun. segg. Sturm. IV. app. p. 118 et V. app. p. 113. c. fluviatili conjungit. Scholler. n. 814. in aquosis. Maj. Jun.

E. fluviatile Scholler. n. 815. ad stagna. Maj.

E. limosum. Scholler. n. 816. ad stagna. aestate.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 pa. 11.

E. hyemale . Schreb. n. 817. adsigna. capsulæ.

E. junceum Raj. Wilich.

Ophioglossum. 455.

O. vulgatum. Henck. in prahi exsicc. et passim. ½ Maj. et 1/6 Jun. Prim. IV. appp. p. 119.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1) O. lunaria in pascuis et pratis. ½ Maj et ½ Jun. Henac. Prim. IV. 119. Scheller. n. 818. in locis. Jun.
β. simplex bifida. Trew. Nou. act. A. N.C. Tom. I. p. 2. f. 10. 11. circa Norimbergam.

2) O. foliis unico pinnatifido, pinnis oblongis frequenter profunde 3 incisis. Trew. N. act. A. N.C. Tom I. p. 46. t. 2. f. 12. 13. circa Norimbergam. Haller pro varietate vulgari habet. Lunaria Dianthi folio Breyne. Cent. I. ic. 93. secundo Haller. et Lunaria Matricariæ folio O. regalis Breyn. Cent. I. ic. 94.

O. Matricariæ

O. viridis L. In sylvis humidiusc. montos. Gal. Prim. Henac. IV. p. 119. Scheller. n. 819. in sylvaticis. varior. Mai. Jun.

Asplenium. 467.

A. Scolopendrium Henac. in rupibus vallium e.g. im Georgen-Thale. Henac. Apud 15 Maj. Prim. IV. 119.

A. Thelypteris Henac. in solo pinguiori humido. rarissime. Fl. æstate. Prim. V. p. 149.
Polypodium Thelypteris Scheller. n. 822. in umbrosis humidis. æstate.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

A. pulchrum. Willich. Ht.

Polygonetum. 456.

P. vulgare. In nyrib. Sept. et Occ. Hsenac. Srim. IV. 119.

P. phegopteris. Hsenac. in nyrib. madidis. Jun. et Aug. Srim. IV. 119

P. aculeatum. W.

P. fontanum. Wil.

Polyp. Filix mas. In sylvis. Jul. et Aug. Jenari Grim. IV. 120. Scholler. n. 820. in sylvis.

P. Filix fœmina. In sylvis editis. Jul. et Aug. Jenae. Grim. ibid. Scholler. n. 821. in sylvis.

P. fragile in rupibus umbrosis Jenae. Jun. et Jul. Grim. IV. p. 120.

P. rhæticum.

P. Filix mas ramosa primis dentatis. Blumenf. Will. et Hall. Helv. n. 1705.

P. dentatis.

P. Hypoxylon. a. in sylvis lapidosis et editioribus. ½ Fun. prior. Hexenei IV. 120.

Polyp. Hall. n. 1701. In ramis cum Hexenio. Fl. austriacum versus. Trim. V. p. 149.

Polyporus Hall. n. 1705. Hexenei in sylvis Augusti. Trim. V. p. 149. (Weis. crypt. p. 317.)

Asplenium. 459

A. Scolopendrium. W.

A. Ceterach.

A. Trichomanes. Hexenei in ramis sylvarum et nemorum. Fun. sept. Trim. IV. 120. Roller. n. 823. ad arbores rarius. Mart. Agric.

Cryptogamia Filices.

A. Adiantum nigrum.

A. ruta. muraria in rupibus campestribus, muris & moenibus. April Jenac. Prim. IV. p. 120. Scholler. n. 824. ad murum. Mart. April.

Pteris. 470.

P. aquilina. in sylvis editioribus. Jul. sed rarius. Jenaci Prim. IV. 121. Scholler. n. 825. in sylvis. Aug.

M. natans. Marsilea
Crantz. Willich. Scholler. n. 826. in paucis Aug.

Cryptogamia Musci.

B. Musci.

Lycopodium. 471.

L. clavatum. in sylvis vastioribus. Sept. Prim. Jenaci IV. app. p. 121. Scholler. n. 827. in sylvis. Jul.

L. complanatum Scholler. n. 828. Byé Zurbrh passim deyser. Hall. p. 194. à nobis nondum visum. Jul. Aug.

L. annotinum. Jenaci. in sylvis altissimis: unico loco circa cacumen M. Inselberg. Aug. Sept. Prim. IV. 121.

L. Selago. L. Jenaci in umbrosis. solo pingui, humido, umbroso, expostulato. raro. Fl. ½ Maj. antecedens. ann. Prim. V. p. 148.

Sphagnum. 472.

IV. 121.

Ph. palustre. in uliginosis et semper madidis umbrosis. vere et ½ decembr. Jenaci. Prim. IV. 121.
β. var. Hall. n. 1724. a. Zollen. musc. t. 32. f. 1. in udis. Jenaci rarius. Fl. Nov. Prim. V. p. 150.
Scholler. n. 829. in humidis. passim.

Phascum. 473.

Ph. crenul on d. a/ major β minor a/ in cultis et hortorū areis. β in viis cavis montium. Fl. a et β ½ Mart. et ½ April. Ilmenau. Cohyphis minima cum operculo decidua. Brim. IV. p. 121. Scholler. n. 830. in areis hortorum. hieme et vere.

Ph. subulatum. d. in solo sabuloso, humo mixto. Ilmenau. April. V. p. 150. Scholler. n. 831. ad aggeres. primo vere.

Polytrichum. 474.

P. commune. a/ cirreum majus β juniperi folio serratis. d/ in sylvis et in humidiusculis montium. circa Ilmenau. d et β Febr. — Maj. Brim. IV. 122. (Polytrichum quadrangul. subglauc. foliis serratis. β juniperi fol. brevior. et rigidioribus. Scholler. n. 832. hieme et vere in alpestr. et arctis.)

P. piliferum. d. tereb. circa Ilmenau in collib. ½ April et Maj. Brim. V. app. p. 134. est secundum Brim. Hall. n. 1836. Scholler. n. 832. fl. hieme et vere.

P. alpinum. d. in humidis Mt. Inselberg. rar. Ilmenau Fl. vere adulto. Brim. V. p. 150.

P. urnigerum. d. in solo pinguiusculo argilloso montium. Ilmenau. Fl. vere. Brim V. p. 150.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 19.

Mnium. 475.

M. trichomanis- facie, fol. ovalegro. Hall. t. 31. f. 6. Jungermanniae species Schmideliae dict. f. 17. Rodae in Thuringia. Hall. Enumer. et amst. ad Enumer. Helvet. in Act. Helv. T. V. p. 22.

M. androgynum L. circa Hsenacum in nemoribus editis ad rupes. ½ April et ½ Maj. Hrim. IV. p. 122. Schreber. n. 833. Martio.

M. hygrometricum. in areis carbonariorum in sylvis. ad April. Hsenac. Hrim. IV. appx. p. 122. Pulverulenta crystallina nunquam reperi. Schreber. n. 834. var. maior et minor in locis humidis, ubi ad muros Mart. April

M. purpureum. in muris limo tectis, rudioribus. ½ April et Mart. Hsenac. Hrim. IV. 122. Schreber. n. 835. ad muros et in terra. Febr. Mart.

M. viridulum. in fissuris rupium Hsenac. Primo vere. Hsenac. Hrim. IV. p. 123. Schreber. n. 836. ad muros et in seminibus putridis. Februar.

M. annotinum. in sylvis ad arborum radices putridas. Febr. Mart. Hsenac. Hrim. IV. 123.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

M. hornum. - circa Ifenacum in nigris nigris sylvarum. Mart. Aprili Prim. IV. p. 123. Scholler. n. 837. in sylvaticis udis. Mart - Aprili

M. capillare. Scholler. n. 838. ad muros. Febr.

M. polytrichoides. in viis cavis. Ifenaci. Nov. et Aprili. Prim. IV. 123. Scholleri. n. 839. ad aggeres arenosos. hiems.

M. serpillifolium. α punctatum. ad rupes umbrosas et riguas. Jan. — Aprili. β pubescens. in sylvis umbrosis et arenosis riguis. Mart. et Aprili. γ undulatum. in nemoribus umbrosis. Mart. et Aprili. Ifenaci. Prim. IV. p. 123.
M. serpillifol. α punctatum β assurgens γ pubescens δ undulatum. Scholler. n. 841 a in humidis sylvaticis. hiems et primo vere.

M. Trichomanis. L. in cavernis et viis cavis sylvarum. Aprili. Ifenaci. Prim. IV. 123.

M. fissum L. in rupibus riguis. Jenae mart. et April. Schimm. V. 124.

M. pellucidum. L. Hall. 1853. In humo putrescentium frondium rarius. Jenae. April. Schim. V. p. 150. Var. dilute tinctum.

M. fontanum. L. Dill. muse. p. 340. n. 2. In rivis Jenae. April. Schim. V. p. 151.

M. palustre. L. Dill. n. 3. p. 253. In pratis humidis Jenae. Fl. vere. Schim. p. 151. in Tom. V.

M. proliferum erectum. L. Hall. n. 1841. In pratis oligino. Jenae. April. Schim. V. p. 151. Operculum hemisphaericum rostro acuto. Hallerianum certum erit, reliqua de limeano dubito.

M. Hall. n. 1847. Jenae In [illegible] pratis humidis Jenae. ½ Maj. pr. Schim V. p. 151.

Bryum. 476.

B. f. oval. acut. serrat. capsula ventricosa operculo acutato. Hall. enum. I. n. 32. t. 4. f. 5. In M. Auerberg Germaniae; Gottinger. Hall. Emend. et auctar. in Act. Helv. V. p. 19.

B. apocarpum. α elong. Hoffm. Hedw. Schreb. Hoffm. germ. Febr. Martio. fr. mat. Jan. et Febr. Brim. IV. p. 124. Schreb. n. 841. in lapidosis, ejus ad arbores. Hoffm.

B. striatum. L. Var. α-β Hoffm. germ. — Hedw. in rupibus et saxis. Febr. Mart. fr. atris. erectis. Decembr. — Mart. Hoffm. germ. in rupibus. arboribus putridis junioris. Hoffm. — Mart. Brimm. IV. p. 124. Schreb. n. 842. ad arbores. Hoffm.

B. pomiforme. Hoffm. in rupibus umbrosis et viis cavis sylvarum. Brim. IV. 124. Schreb. n. 843. ad truncos. prima vere.

B. pyriforme. in vernalis et agris vegetior. April. Brim. Hoffm. IV. p. 124. Schreb. n. 844. ad agros. Febr. et Sept.

B. extrichorium. ♂. a ♂♃ Jenaci. apr. myrtis, scrobibus et aggeribus subarcuosis sylvarum. ♃♃ in nemoribus, pratis et madidis a ♂♃ Mart. et Aprill. Prim. IV. 125.
Schreber. n. 845. ad muros. hieme.

B. subulatum. fruticetis, saxis, muris. Aprill. Jenaci. Prim. IV. 125.

B. murale. In rectis cæsarum et ad arborum putridas radices. subulo humoso rectas. ♃ Febr. ♂. Mart. Prim. Jenaci. IV. 125.
Schreber. n. 846. in rectis, terra. hieme et ver.

B. sarpanium. In sylvis udis. Jenaci. Decembr. Aprill. Prim. IV. 125.
Schreber. n. 847. ad radices arborum. Febr.

B. murale. in rupibus, muris, muris, rectis. mart. ♂ ♃ Aprill. Jenaci. Prim. IV. p. 125. Schreber. n. 847. in muris, ubi. hieme.

B. undulatum. In sylvarum vicis cavis et scrobibus umbrosis arenosis. Hedwig. Oct — April. Prim. IV. p. 125.
Scholler. n. 849. in umbrosis humidis sylvaticis. primo vere.

B. unguiculatum. in muris, ad vias. Febr. Mart. Scholler n. 850.

B. glaucum. in sylvarum arenosis, e capillitiis: fragilis planta. Fl. rarissime Oct. et Nov. Hedwig. Prim. IV. p. 126.

B. pellucidum. ~~Hedwig varet. in nigris rigis~~

B. helvenmallum. in siccis et viis cavis sylvarum. Hedwig. Jan. — Mart. Prim. IV. p. 126.

B. hirtum. Rara planta in nigris. Hedwig. Febr. et Mart. Prim. IV. app. p. 126.

B. viridulum. In nigris rigis. Febr. Mart. Hedwig. Prim. IV. p. 126.
Scholler. n. ~~Oct. in campis humidis~~ 852. Oct. in 115. Febr.

B. truncatulum. In uir cam sylvam. Jenae. Mart. et April. Srm. IV. 126. Schleich. n. 651. in campis humidis. hieme et primo vere.

B.

B. argenteum. In muris et aggeribus limo tectis. Nov. et Dec. Jenae. Srm. IV. p. 127. Schleich. n. 653. in muris. hieme.

B. pulvinatum. Jenae obliquae in saxis, muris, tectis. Mart. et April. Srm. IV. 127. Schleich. n. 654. in muris et tegulis. primo vere.

B. caespiticium. In muris et sylvarum promptis locis. Jenae. Srm. IV. p. 127. Schleich. n. 655. in muris. Jan. Febr.

B. circinatum, capsulis et setis brevioribus. Hall. Musc. p. 378. n. 41. Jenae in rupibus riguis. Martio. Srm. V. p. 152.

Bryum. Hall. Helv. n. 1781. cui hypnum. In rupibus riguis Jenae. hieme Srm. V. p. 152.

Bryum hypnoides hirsutie caulescens vulgare Dill. muse. p. 368. t. 47. f. 27. Jenae in arenosis collium, in rupibus et saxis riguis. Febr. Mart. Non sufficit B. hypnoides. Srm. V. p. 134.

Hypnum. 477

Hypn. Schleicheri, capsulis oblongis in setis brevibus. Schl. p. 231. n. 65. ex Germania & Pensylvania huius. Hall. emend. Mant. Isar. in vol. V. Act. Helv. p. 14.

H. taxifolium. in sylvarum viis cauis argillosis. Aprili. Marf. Aprili. IV. p. 127.

H. adiantoides. Aprili in rupib. riguis. vbiq. — Marf. Prim. IV. p. 127.

H. hygroides. L. Aprili. In viis cauis sylvarum, argilla nubra tectis. Marf. Prim IV. p. 127. Schreb. n. 956. in umbrosis. Decembri.

H. complanatum. in fruticeta arborumve stipitibus sylvar. Jan. Febr. Aprili Prim. IV. p. 127. Schreb. n. 957 ad truncos arborum. Jan. Febr.

H. crispum. in rupibus riguis Aprili. vbiq. 21/2 Dec. Prim. IV. p. 128. Schreb. n. 958. ad truncos arborum. Marf. Aprili.

H. hispidum. Jenaci in sylvis, quarum solum tegit. Nov. et Deo. Sturm IV. app. p. 128. Schkuhr n. 983. b. mai–Jun. flores. vidimus.

H. rotundifolium. Jenaci ad arborum radices putridas. Febr. Mart. Sturm. l. modo c. Schkuhr n. 980. ad muros et sepes. hiems.

H. lucens. Rara planta juxta rivulum pratensem speluncam Dudelandgrafenloch Jenaci. Nov. Sturm. IV. p. 128.

H. protiferum. Jenaci in sylvis ad madidas nives. Frequentissime ½ Febr. et April. Sturm. IV. p. 120. Schkuhr. n. 981. in graminosis. hiems et vere.

H. parietinum, in sylvis, praesertim locis humentibus. Febr. Mart. Sturm. l. c. Schkuhr. n. 982. in humidis sylvaticis. Martio.

H. crista castrensis. In editis humidiusculis et saxis, circa M. Hirselberg copiosissime. Jenaci. Flor. vere April. Sturm. IV. 128.

H. protelongum. Schkuhr. n. 963. in truncis arborum, in hiems. hieme.

H. plumosum. Schkuhr. n. 964. ad rad. arborum. Jan. Febr.

H. cupressiforme. Ad arbum quinidas radices in sylvis Hsenani hieme. Hsenani Srim. IV. p. 128. Scholler. n. 865. ad arbores hieme.

H. adunc[u]m. Hsenani in prat. vicinis. Mart. et 1/2 April. Mart. et 1/2 April. Srim. IV. p. 129. Scholler. n. 866. ad fossas circa Eschalem.

H. vitic[u]losum. Scholler. n. 867. ad arbum humeros hieme.

H. squarrosum. in pratis editis et siccis. Fl. rarissime. Hsenani Srim. IV. p. 129. Scholler. n. 868. in graminos humidis. hieme, sed Horer rendum vidi.

H. dendroides. Hsenani in prat. vicinis. Martio. Srim. IV. p. 129. Scholler. n. 869. in humidis. Mart.

H. alpe cuniculos. Hsenani ad madidos rupes. Fl. primo vere. Srim IV. p. 129.

H. cuspidatum. Hsenani ad arbores et rupes. Fl. hyeme et vere Srim. IV. p. 129. Scholler. n. 870. ad arbum humor. vere.

p. 30

H. parum. ubiq in prat. et sylvis. Fl. Nov. — Febr. Jsenaci Schm IV. p. 129. in Pannoniæ sylvatic. et vineis Schreber. n. 871.

H. Hirtellum. Schreber. n. 872. ad terram.

H. cuspidatum. in prat. sylvaticis. Mart. April. Jsenaci. Schm. IV. 130. Schreber. n. 873. in humidis. Aprili.

H. sericeum. Jsenaci in arboru truncis, muris, saxis. Febr. Mart. Schm. IV. 130. Schreber. n. 874. ad arbores, muros. vere.

H. velutinum. ad arbor. putridor. truncos et saxa Jsenaci. Jan. Febr. Schm. IV. p. 130. Schreber. n. 875. ad terram, rarius.

H. serpens. Jsenaci in saxis, humo sylvarum et ad ligna putrescentia. Febr. et Martio. Schm. IV. 130. Schreber. n. 876. in saxis, ad terram et arbores. April.

H. sarmentosum. Jsenaci ad truncos arborum praesertim querceos. Fl. Febr. et Martio, sed paulo varius. Schm. IV. p. 130. Schreber. n. 877. ad arbores, vineas.

H. myosuroides. Schreber. n. 878. ad arbores. vere.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hypnum Hall. Helv. n. 1742. Jfenaii in sylvis. Nov. Oec. Sim. V. p. 134.

H. Hall. Helv. n. 1745. Dill. hist. Muse. p. 316. n. 50. Jfenaii Ad rupes et art. pedes sentium radices in sylvis. Sim. V. p. 134.

Hypnum nigrum L. Hall. n. 1735. Jfenaii in solo arenos., humo mixto sylvarū. H. autumno. Sim. V. p. 152.

H. filiformis, capsulis subrotundis. Dill. Muse. p. 298. n. 31. Hall. Helv. n. 1731. H. Jfenaii in vivalorum alveo inferiori. H. Nov. Mart. Rosinū Hypno 29 Dill. cū operculo mamillato. Sim. V. p. 152.

H. Hall. n. 1731. Dill. n. 30. p. 297. Jfenaii ad arborū radices. H. Helv. et Mart. Sim. V. p. 153. (Not. Hoc Halleri nomen ad Hypnū accedens Sim. citat. Dill.)

H. Filicinū. a. in locis udis Jfenari. Fl. vere. Sim. V. p. 153.

H. abietinum. a. In rupibus et locis Jfenari. Flore magnā reperi. Sim. V. p. 153.

H. loreum L. in sylvis et ad terram. Fl. vere. Jfenaii Sim. V. p. 153

p. 32)

H. Hall. n. 1794. In pratis vdr. Zerbi. Aprili Hrim. V. p. 154.
Obs. Filiorū lamen nullum: Seta longissima. Caps. cylindrica, curva, margine aperturæ humido. Operculo conico. Fol. minor patulis. Ramis cinis et caule repente, tomentosis. Fructificationis partes pene Hypni cuspidati Swtz. Hrim. l.

H. Hall. n. 1767. In rupibus Herbæ. Fl. Veron. ad ver oss. Hrim. V. p. 154. Hypnū repens, sericeum, molle et pallidū, marmoribus adnexū. Dill. musc. p. 286. n. 22. Hrim addit.

H. Hall. n. 1753. In vallium saxis frequens Hrim. Serv anthum. Hrim V. p. 154.

Hypnum. Dillen. p. 331. t. 42. f. 64. 65. ad radices arborū et in saxis. hiems. Scheller. n. 879. Caulinli repentes implicati. Setæ capsuligeræ semiuales, inferne purpureæ, superiur lutea. Calyptræ conicæ, longæ, albidæ. Folia minutissima, subulata, acuta; ejs. in saxis parenthyscula. Color e rufescente pallide viridis.

Hypn. Dill. p. 331. t. 42. f. 66. ad truncos vel radices arborum, inprimis vimeorū rarius. frvere. Scholler. n. 880. Caulinli ramosissimi, subrecti, inferius nudiusculi, superiur pallide virides, uniales aut biuniales. Folia subulata, minuta acuta, in siccis cauli adpressa. Setas capsuligeras nondum vidi.

H. attenuatum. Schreb. Scholler n. 881. ad truncos arborum, rare.

Tonsina Lit. 478

T. anthyllica. In vineis circa Ysenacum. H. o. Prim. IV. p. 130. Scholler n. 882. in sepib. circa autumnum.

Buxbaumia. 479

B. sessilis. vide Hr Wallroth. Haec forsan primum in Germania 1759 reperta in viis cavis et ad latera fossarum Ysenaci. Nom. — Marl. Prim. IV. p. 131.

B. aphylla. Ysenaci in nemoribus editioribus ad fossarum, cavernarum et viarum cavarum parietes in pingui solo. Ysenaci. Sept. ad Maj. Calyptra, quae revera est, reperit medio Oct. vade caduca. Prim. IV. p. 130.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptogamia Algae.

C. Algae.

Marchantia. 480.

M. polymorpha. Henaci var. α. ad madidos rupes et juxta rivulos in silvis umbrosis. Syn. Fil. Germ. IV. 131. In umbrosis, circa civitatem Schaffh. Scholler. n. 883.

M. conica. Henaci in declivibus Marchio. Germ. IV. p. 131.

M. hemisphaerica. In solo pinguiusculo umbroso. raro. Henaci. Marchio. et Asphalt. Germ. V. p. 154.

Jungermannia. 481.

J. f. bifida, serratim compactis, globuligeris. Bauda in Germania reperta. Hall. emend. Mant. in Act. Helv. T. V. p. 28. n. 71. Videt ab Hr. Schmidelio dici f. 16. quae pulvinatera capsulata pro Asphaltis maribus his sed foliis amplius est.

J. asplenioides. Henaci ad pedes rupium et montium umbrosos. Asphalt. Germ. IV. p. 131. Scholler. n. 884. in umbrosis ticinis, sed rarius.

F. polyanthos. In vir et ad rivulos Jenae. Spitz. Schm. IV. 132.

F. bidentata. in vis cavis in rivis pabrarum. Fl. o. Jenae. Schm. IV. 132.
Schaller. n. 685. in montosis in Thr. saxatilis.

F. Bicuspidata. Schaller. n. 686. in aggeribus arenosis inter muscos. vere.

F. nemorea. Ol. ad madidos rupes. Jenae. Spitz. Schm. IV. 132.

F. albicans. in rupibus madidis et umbrosis Jenae. Spitz. Schm. IV. p. 132

F. reptans. In sylvis Turis cavis. Mart. Spitz. Schm. IV. p. 132.

F. complanata. in arborum corticibus. Mart. Spitz. Schm. Jenae. IV. 132.
Schaller. n. 687. in arboribus circa Erlebach. vere.

F. tamariscifolia. In arborum corticibus et stipitibus vivis. Febr. Mart. Hseraci. Srim. IV. p. 132. Schreber. n. 889. ad arborem fragilem. Fabr.

L. ciliaris. In rigui rupibus inter alios muscos e.g. in clausgrafenbach. et Hseraci. Flor. rarissime, unica vice sine stipibus florentem vidi Srim IV. p. 133. Addit Srim dicherastrum et sorpioides pulchrum villosum Dill. muscol. p. 481. f. 9. et dicitur a dicherastro f. 35 Dillen. diversissimum est. Nov. Act. A.N.C. T. V. Supp. p. 134. c. descripsit.

F. platyphylla. Schreber. n. 890. in corticibus arborum. hiems.

F. pinguis. in parietibus rigarum rupium et in viis speluncarum. Hseraci 2/3 April. prior. Srim. IV. p. 133. Schreber. n. 891. April

F. furcata. Hseraci ad arborum radices, in sylvis suburbanis. Flor rarissime locis humidis Mart. Aprili. Srim. IV. p. 133. Schreber. n. 892. in corticibus pinorum. primo vere.

F. Hall. n. 1866. In rupibus. Hseraci. F. nondum vidi. Obs. ad fidem nitidorum exemplarium. et Srim. V. p. 156.

H. trilobata. L. Hseraci in rupibus rigarum. April. Srim. V. p. 156. Obs. Nisi polius F. quinquedentata est. Srim.

F. dilatata. L. In humo putrescentium arborum Jenaci. Fl. vere. Srim V. p. 156.

F. platyphylla. L. α Dill. t. 72. f. 32 et β f. 33. In solo pinguiumido nigrum. In putrescentii arborum Jenaci. Utriq; vere. Srim. V. p. 156.

F. Hall. H. n. 1881. Dill. p. 503. n. 35. In humo arena mixto, semper. Jenaci. Fl. ½ Aprili. post. Diversissima a vera F. ciliari, ad potius a Lichen ostr. 3. Dill. p. 481. Srim. V. p. 157.

F. trichophylla L. In solo argillose, humido nigrum. Jenaci. April. Srim. V. p. 157.

F. epiphylla. In solo argillosi umbroso. Jenaci. Flor. nunquā vidi. Srim V. p. 157.

Anthoceros

A. laevis. L. In loris seu inundatis. Jenaci. Autumno. Srim. V. p. 155.

A. punctatus. cum antecedente. Jenaci. Fl. autumno. Srim. V. p. 155.

Blasia

B. pusilla. L. in vivis cavis infra silvam Klosterholz. Jenaci. Oct. et ¼ Nov. Srim. V. p. 155.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riccia. 482.

(p. 155

R. glauca L. In solo subuloso vernacorum Jenaci. Fl. primo vere. Schm. V.

R. natans. Schreber. n. 693. in stagnis aquis inclusis. Viget vere.

R. crystallina. Schreber. p. 269. n. 1015. in inundatis exsiccatis ad stagna aquis ipsis legimus.

Lichen. 483

L. scriptus. Jenaci in corticibus praesertim Fagi sylvaticae. Viget hyeme. Schm. IV. 133. in ad arbores. persistens. Schreber. n. 694.

L. nigosus. In fagi sylvaticae cortice. Fl. hyeme. Jenaci Schm IV. appp. p. 133. Schreber. n. 697. in carpinis, et alibi copiose. Persistens.

L. geographicus. in rupibus. Vere et hyeme. Jenaci Schm. IV. p. 133. Schreber. n. 695. in saxis ad muros varie. Persistens.

L. fusco-ater. Schreber. n. 699. ad muros. persistens.

L. sanguinarius L. in cortice querceo, fagi, et plurimarum salicum. Autumno et hyeme. Jenaci. Schm IV. p. 133. Schreber. n. 698. in arboribus. Persistens.

L. lacteus. in saxis, et. in tectis vetustis, persistens. Schreber. n. 696.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

L. calvarcus. In nudis. Hesseni. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 134. Scholler. n. 900. ad muros. persistens.

L. cinereus L. Scholler. n. 901. in saxis persistens. Similis L. fusco-albo, sed tuberculis minoribus. Margo ibidem niger est.

L. cricetorum. in Terra argillosa cricetorum denudata Hesseni. Srim. V. 135 Scholler. n. 904. in cricetis. vere et autumno.

L. subfuscus. Hesseni in arbor. corticibus. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 134. Scholler. n. 908. subfuscus alter, ruber et luteo Weiss. ad arbores et muros persistens.

L. fugineus Scholler. n. 902 est L. orbiculato Schreb. secundum Scholler. in agris frequens. Persistens.

L. centrifugus. In nudis montium editioribus. Fl. hyeme. Hesseni. Srim IV. p. 134. Scholler. n. 909. in saxis. persistens.

L. carpineus L. est L. angulosus Schreber. ex fide Scholleri. no. 905. in carpinis, muris, frunis. Persistens.

L. saxatilis. Hesseni in nudis editis. Hyeme. Srim. IV. p. 134. Scholler. n. 910. in saxis, muris antiquis. Persistens.

L. physodes in arboribus, praesertim Quercus corticibus. Fl. hyeme. Srim. Hesseni. IV. p. 134. Scholler. n. 913. ad saxa et arbores. Persistens.

L. tartareus. ad muros. persistens. Scholler. n. 906.

L. olivaceus. Hesseni in nudis et arb. corr. Fl. hyeme et primo vere. Srim. IV. 134. Scholler. n. 911. in arboribus et saxis. Persistens.

L. stellaris. in arbor. cort. mascul. alicum amus am est primus spinosa. Hsenaei. Fl. hyeme et vere. Prim. IV. p. 134. Schuller. n. 914. in arboribus persistens.

L. pallens est L. muralis sem. Schreber. secundum Schuller. n. 907. in asseribus vetustis, in corticibus arbor. Persistens

L. ciliaris. In arbor. cort. mort. altiorum. Hsenaei. Fl. hyeme. Prim. IV. p. 134. Schuller. n. 915. in arboribus. persistens.

L. hispidus. Schreb. in arboribus persistens. Schuller. n. 916.

L. parietinus. Schuller. n. 912. ad arbores, sepimenta, muros. persistens.

L. pulmonarius. In arb. cortice. Fl. hyeme. Prim. Hsenaei. IV. 135 Schuller. n. 917. extra term. Fl. Sard. in fagis. hieme.

L. purpuraceus. In arbor. cort. mascul. Piri sylvestris. Hsenaei Prim IV. p. 135. Fl. hyeme et vere. Schuller. n. 918. in sepimentis vetustis varius. Persistens.

L. fasciaceus. Ad arbor. truncos. Fl. hyeme. Hsenaei. Prim. IV. p. 135. Schuller. n. 919. ad salices et alibi. persistens.

L. fraxineus. In arborum corticibus vetustis exsiccatum Hsenaei Fl. hyeme. Prim. IV. p. 135. Schuller. n. 920. in tiliis, salicibus et alibi persistens.

L. carneolarius. Hsenaei in humidis arborum et lecti abundè. Fl. toto anno. Prim. V. p. 158. Schuller. n. 907. ad muros copiose. Persistens.

L. prunastri. In arbor. hunc. Ysenaci. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 135.
Schaller. n. 921. in pruno et alibi cruciger. Persicaria.

L. calicaris. In arboribus. Fl. hyeme. Ysenaci. Srim. IV. p. 135.

L. caperatus. In ruptis Ysenaci. Fl. o? Srim. IV. p. 135. Schaller. n. 922.
in arboribus et saxis. Persicaria. raro sortellas. profert.

L. venosus. Schaller.
n. 923. ad sepes et
alibi. hieme.

L. cyathoides. In sylvis et ad terram aliis muscis obtegit. Ysenaci. Flo.
hyema et vere. Srim. p. 136. IV. Schaller. n. 924. in sepibus rarius. primo vere.

L. cruciatus. In sylvis et exercitis supra alios muscos. Ysenaci. Srim. IV. p. 136.
Schaller. n. 925. adnascitur ad terram et s. muscosas. in sylvis ad sepes. Vere et autumno.

L. sacratus. al. in montibus Baruthinis. ad Hyem non Hercinam. p. 2.

L. pustulatus. In ruptis apricis. Ysenaci. Fl. hyeme et vere. Srim. IV. p. 136.

L. corriferus. Ad putrid. arb. radices. hieme. Srim. Ysenaci. IV. p. 136.
Schaller n. 926. in sepibus putridis et alibi. hieme

p. 44.

L. pyxidatus. Jsenari in sylv. ad pastr. arbor. radices. Fl. hyeme et vere. Sim. IV. p. 136. Schreber. n. 927. ad muscor. hieme.

L. fimbriatus. In cortic. et sylvis. Jsenari. Fl. autumno et hyeme. Sim. IV. p. 136. Schreber. n. 928. ad fragmenta vetusta et in glareosis. hieme

L. gracilis. Inter alios muscos in sylv. Jsenari. Fl. hyeme et vere. Sim. IV. p. 136. Schreber. n. 929. in cortic. alibi. hieme.

L. cornutus. Schreber. n. 930. in sterilib. hieme.

L. rangiferinus. Jsenari a) Dill. t. 15. f. 29. β Dill. T. 15. f. 30. In cortic. et sylvis. Fl. hyeme et vere. Sim. IV. p. 136.
Var. β sylvaticus. Schreber. n. 931. in sylvatic. hieme.

L. uncialis. Jsenari. In cortic. et sylvis. Fl. hyeme et vere. Sim. IV. p. 137. Schreber. n. 932. in sterilib. sylvatic. hieme.

L. sabulatus. In cortic. Mart. Apud. Jsenari. Sim. IV. p. 137. Schreber. n. 933. c. praecedente. hieme.

L. paschalis. Jsenari in Pargillosa sterili. Fl. vere. Sim. IV. p. 137.

L. plicatus. Hsenari in sylvis altissimis. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 137.

L. barbatus. ex ba derm. Fur. Barb. in arundinetis. Scholler n. 934.

L. subalbus. in altis. sylvis Hsenari. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 137. Scholler. n. 935. cum barbato. Besslers.

L. chalybeiformis. Fl. Hsenari in myrtis. et arbor. humor, praesertim Betul. albae. Fl. hyeme et vere. Srim. IV. p. 137. Scholler. n. 936. in segmentis vernis. rubescens. Besslers.



Lichen hirtus. In arboribus sylvar. Hsenari. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 137. Scholler. n. 937. in segmentis vernis, arboribus exiuse. persistens.

L. floridus. Hsenari in arbor. humor. Fl. hyeme. Srim. IV. p. 137.

L. crispus. L. In myrtis circa villam Hesride. Hsenari. F. autumno et vere Srim. V. p. 158.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Byssus. 484.

B. velutina. Hsenaei obs. in putrescenti ligno et aseribus antiquis. Fl. autumno et vere. Prim. IV. p. 138. Scholler. n. 939. an forsan excitatus. autumno et hieme.

B. flos aquae. Scholler. in stagnis. aestate. Fl. Barb. n. 936.

B. saxatilis. In rupibus sylvarum Hsenaei. Fl. hyeme et vere. Prim. IV. p. 138 Scholler. n. 941. ad saxa. persistens.

B. candelaris. In arborum annosarum corticibus e. g. in querna. Hsenaei. autumno et vere. Prim. IV. p. 138. Scholler. n. 942. in segmentis vehentis, in aseribus. Persistens.

B. botryoides. Hsenaei ad tabes asseres q. putridos. Fl. hyeme et vere. Prim. IV. p. 138. Scholler. n. 943. in fabricis cavis et aliis hortulanorum. Vigel aestate et autumno.

B. incana. In semitis arcuriis sylvarum, ad arborum stipites et radices putrescentes. Hsenaei Prim. IV. p. 138. Scholler. n. 944. ad forsan. vel autumno et hieme.

B. lactea. in plantis moribundis et praesertim delapsis foliis sylvarum. Hsenaei autumno. IV. p. 138. Scholler. n. 945. in corticibus prunorum. hieme.

B.

B. miniata. Sled. Fung. p. 23. a. Henaci in fol. putrescentibus autumno circa Domicilia venatoria Rheſiae. Sim. IV. p. 138. et V. p. 135.

B. antiquatus. in pomoeriis frequens. Perſiſlens. Schäffer. n. 940.

Tremella. 485.

T. verrucosa. Henau in rivulis et rupibus madidis. Fl. vere. Prim. IV. n. 130.

T. nostoc. Henau. In graminetis locis editis. Fl. vere. Prim. IV. p. 138. Schaller. n. 947. ad terram. Vere. Hessiae inf.

T. purpurea. Henau in sepibus, in ramulis arborum emortuis. Fl. hyeme et primo vere. Prim. IV. p. 139. Schaller. n. 948. in ramis emortuis et moribundis. Vigil hieme.

Tremella lichenoides L. Hall. n. 2032. In rupibus rigui Henau. Fl. vere. Prim. V. p. 156.

Tr. juniperina. in editis siccis. April. Schaller. n. 946.

Vrd. 486

V. intestinalis. Gerardi in nivalib. Fl. vere et æstate. Sinn. IV. app. p. 139. Scholleriin fossis et stagnis. æstate. 4. n. 949.

V. granulata. Scholler. n. 950. hieme et veris initio.

Conferva. 487.

C. riularis. Hedwig in varia forma fructifera et sterili. Fl. autumno et vere Linn. W. p. 139. Schrad. n. 951. in fossis et stagnis. Viget a vere in autumnum.

C. bullosa. Schrader. n. 952. c. prim. Viget aestate.

C. amphibia. Schrader. n. 953. in aquis fossis et rivis, in aquae vicissitudinem servant. Vig. et aestate.

C. reticulata. Schrader. n. 954. in stagnis. aestate.

D. Fungi

Agaricus. 488.

A. Chantarellus. Scholler. n. 955. in sylvis. 7bri. Esculentus, sed siccus tamen suspectus.

A. 6-partitus. Scholler. n. 956. aestate.

A. nauseosus. Scholler. n. 957. in sylvis. 7bri.

A. dentatus. Scholler. 958. autumno. Pileus flavescens, subtus radii a stipite discedentes, ubi denticulo acuminato insurgunt, corrodens nauseosus.

A. deliciosus. in sylvis autumno. Scholler. n. 959. Esculentus inter optimos.

A. campestris. Scholler. n. 960. aestate et autumno.

A. Georgii. Scholler. n. 961. Maj. Esculentus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 56

A. cinamomeus Schiller. n. 962. ad vias aythmo. Efculentus.

A. mamosus. Scholler. n. 963. in pomariis. Ochsv. rara.

A. hypeatus. Schiller. n. 964. in graminet. rarius.

A. exbinchius. Schiller. n. 965. Cstale.

A. finclarius. Schiller. n. 966. in finetariis. Astate e Vere-imme. Semiglobos.

A. campanulatus. Schiller. n. 967. inter olera. Astate et autumn. Lamellæ cinereæ f. albæ. Stipes nudus longissimus.

A. separatg. Scholler. n. 966. aestate et autumno.
ad a. Spitze dürftig. Schaer. wyg. ungleich.

A. fragilis. Schaller. n. 969. ad viar. ad arborer. autumno.

A. umbelliferar. Schaller. n. 970. inter muscos. Oelsoni.

A. androsaceus Schaller. n. 971. Octobr. Nov. Hypes capillar. Lamellae semiseminatae. minutus.

A. Clavus, inter folia dejecta. Nov. Dec. Schaller. n. 972. Pileus in nostr. clavus. Statura in minoribus clavum repraesentat.

A. sordidus Leyss. Hall. p. 217. Schaller. n. 973. autum

A. infundibulum. Leyss. Hall. p. 217. Schaller. n. 974. ad vias Nauenbei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Agarici acaules, dimidiati

A. quercinus. In ligno putrescentibus. Persoons. Schollen. n. 975

A. betulinus. Schollen. n. 976. in truncis betularum aliarumq; arborum. Persoons. Vix carnosus et fere coriaceus, zonis variis magis villosis, aliis interjectis magis glabris, dum ætate firmæ, varius inter se cōnexæ.

A. alneus. in alnis. & Vere. Schollen. n. 977. Simus, plures imbricatim crescentes.

Boletus. 489.

B. subreticul. ad truncos arborum. Schaff. n. 978. Persoon.

B. fomentarius. Schaffer. n. 979. ad salices et alibi. Persoon.

B. igniarius. Schaff. n. 980. in arboribus. Persoon.

B. versicolor. Schaffer. n. 981. ad arbores Persoon. Pori nisi ut mihi apparent.

B. suaveolens. Schaffer. n. 982. ad salices. Persoon.

B. ulcerosus. Schaffer n. 983. In truncis autumno.

B. luteus. Schaffer. n. 984. in sylvis. Augusto. Schaeffer. sed mihi corticosus.

B. boletus Var: a. Russula. in sylvis magnitudine notabilis. S. Fungus non vesca. In fungo siccato color flavus ex tempore in viridem mutatur. v. Grünspitz, Rhingilz; in delicia est. Omnes in sylvis rug. Schollen n. 985.

B. granulatus. Schollen n. 986. in area subhumida in sylvis. Autumno. Hujus pileus brevior. Pileus margine acuto cinctus.

B. subglutinosus. in sylvis in terra ad arbores. Autumno. Schöller n. 987. magnus carnosus albido-flavescens, nec glaber nec viscidus, si subglutinosus. Pileus, si ad truncos arborum crescit, dimidiatus. Hujus brevis.

177
p. 63

Hydnum. 490.

H. tomentosum. Schäffer. n. 488. Fl. fyl. Auctum. Pileo cinereo fu-
sco aut cinereo, tomentoso, centro pervio. Stipiti albi. Tipes fuscog.

Phallus. 491.

Dr. Schlotheim. Petrefakten n. 9059. ad Jumela, varietas. typic. mus.

Elvela. 492

Pezizza. 493.

P. lenticera. Schaller n. 990. in sepimentis putridis, in agris ob. oblita circa Lauban. Vere et autumno.

P. punctata. Schaller n. 991. in fimo equino in Mistbeeth. Vere

P. cyathoidea. Schaller. n. 992. inter muscos. Autumno.

P. scutellata. Schaller. n. 993. in paries ligni putridis. hiems.

P. Auricula. Schaller. n. 994. ad truncos arborum. Octobr. Nov.

Cl. pistillaris. Scholler. n. 995. in sylvis Senftenbi. Color luteus, longitudo aream digiti. Figura clavam perfecte repraesentat.

Cl. digitata. Scholler. n. 996. ad ligna putrida. autumno.

Cl. muscoides. ad truncos putridos. Nov. Scholler. n. 997. minuta, unciae longitudine, gregatim nascens e trunci ligni putrescentis.

Lycopodium. 495.

L. Brissa. Scholler. n. 996. estate et autumno.

L. stellatum et L. glabrum et fastile, foliis rariora patente ore acuminato dentato. Sleb. fun. p. 151. olim in sylvis circa Voig Landiae, quae nur nondum legi, d. Lyc. stellati calyce inverso Buxbaumii, ad semel lecta. Autumno. Scholler. n. 999.

L. ~~evidendrum~~ epiphyllum. Scholler. n. ~~1000~~ 1001. in dorso foliorum Taxifol. Forsteri, sub Falcaria aliisque plantarum. Vere et aestate

Lycop. epidendrum. Scholler. n. 1000. in parietibus ligneis arborum, in ramis emortuis, ribesiorum, rubrorum. Vere.

L. varicosum. Scholler. n. 1002. in ramis emortuis in epibg. Autumno.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 69.

Mucor. 496.

n. Embolus. in ligno putrescentibus. Dessiens. Scholler. n. 1003.

M. Mucedo. in variis putridis, panis, plantis, fructibus, etiam calceis sepositis. Omni tempore Scholler. n. 1004.

M. glaucus. Scholler. n. 1005. In fungis, pomis, aliisq. corruptis. Omni tempore

M. Erysiphe. Scholler. n. 1006. In foliis tamii, lilii sylvestris, syringae aliisq. Estate.

M. Septicus. Scholler. n. 1007. In hortorum terra pregnante, nec non ad parietes et parimenta lignea, & quae dastruid. Estate.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 71.

Plantae Dubiae.

4 Lotus arbor fructu cerasi quid? J. B. hist. 1. p. 229 [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vp. 75.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

28v

876

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

184
1074

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Plantae
dubiae

Chamaecistus 7. Clus. s. Anonymus fol. hyssopi ejusd. s. Anonymus subhirsuta. J. B. hist. I. part. 1. p. 527.

Phillyrea media L.? ad. J. B. hist. I. p. 539.

Ziziphus Cappadocica quibusdam Olea bohemica. J. B. hist. I. part. 2. p. 27.

Rhamnus v. oleaster germanicus. J. B. hist. P. I. P. 2. p. 33. quid?

Rhamnus Sarracenicus Salisb. J. B. hist. I. 1. P. 2. p. 57. quid?



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main