

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Observationes meas botanicas, Nederlandsche, Marburgensis, Altenburgensis, Giessensis
Heidelbergensis vid. sc. obs. de meteorol. Mensis Augusti. de Stri 1702.

Restituit DD Rudbeq. D. Dr. Huth Cassellan multas observationes in Hist.
plantar. et notasse, at easdem a posteris parum promotas. Mensis Julii
Mensis Augusti curiose gemessen v. wie in Italien ist Dillenius in Hist. sua
Observatis suis usitate v. sc. s. arbit. Mensis. 1736.

Quantitates vocat ex Bruschio & Nicolo DDcand. s, omnesque
Clar. Patricum Edit. Bas. de 1702.

De Characteribus plantar. omnes s. vid. Methodici. v. Rohr Tr. v. Q.
Malti methodi recentiores nondum 1736. 8. Cobity.
usque 5 plures denominationes amassit, quas fixit ex s. Nosce te ipsum
de hoc argumento. Cassa hac arbitria est. Utopia. Forte ab exter.
fixit "fallibili figuraque sua non fidente" denominatio optime
fixit pugnatia magis qua ut haberi nominabi sol; quin
in denominatione ex radice et foliis ex seminib. ex corpulis in-
centibus et exceptis sumit signata subvertat. Hac exce-
ptiones, dubia, difficultates si consideremus, methodos conferemus
et tantum non omnibus quanta quanta est. Est hoc in
natura mirabilis humana, à deficiente artificio naturam semper
percurrere. Judicandae essent monstra, nisi haec et diversitates
plantar. incognitae et solo diverso et temperatae in fl. simia. fol.
ipsa; eharum male agent qui peculiarem tr. de monstris plantarum
edent à tempest. vel insector. morsu, vel alii vicant. et de Ma-
ritimis plantis et accidentibus ext. quae characterem. Naturalis plantae flores ca-
rentes, semine, foliis, caule, radice, sub titul. suis peculiaribus ge-
neribus.
De fundamentis methodi, experimentis novis et exceptionibus cautis
correcti, quin deus plenus naturae artifex.

12 c 92

Fol.

I 692

1 – 184

ad IV 3°

4.

Ja von Lieben Tournefort. Alsatico vid. notitiæ de plantis quarundam quas Tauro oriundi sit picta et cori vicis. Magn. Flor. hyg. hyos. Julio. Ostosi dentis magni virosissimo dicto Hyoscyamo Jo Mayr Zu Ehl da ein Feldsalat wächst wird (vid. Hedwigia Ostosi a Hyoscyamo D. Gunther und Wurzel minutiæ ad veri cum calcis compressi, vid. collectio Folii = cas. plantæ differt. Titol. plant. Hesperi Lucanarum. Lentophyar.

Colon = cas. plantæ differt Rosfiniensi. Vaglisi. Vitic. De colon & cultu & metato vid. Sub Conferlæ media, rigali. Cretores de colon vari. Vaglisi vitic. vid. Vaglisi vid. Mennabil. Halesi. Lithe de colon vari. Vaglisi vitic. vid. Vaglisi vid. Mennabil. Halesi. Lithe Hominum Holler mittal. Solan alb. tuberosum Patatas. Solanum tuberosum Vetulor numeri differunt = cas. plantæ ficaria, Dictamnus alba, Tormentilla. Filipendula.

Transmutatio vegetabil = alii vid. Tiliæ de Chamæbalanus. A. avena vid. = tritici. mutat. Lini = Myagri. Lini Caput vesperi = Lini interimat, plasio Hyp Lapsanæ.

De seris plantarum vid. Jussieu.

Libbiferus plantæ vid. Pinelli albæ Jussieu. Scaligi.

De cepsidio seminal numeris varietat Hellebori nigri Hl nosse vid. Volcamer Hl Norimberg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Legatum.

Legatum.

4 vi
3

Legato postulando non necesse verba edicti d. 2. ff de edendo.

#37.
Legatarij pacisci pt re sibi debitor rec petere re
ceptor pt l. 47. ff. de pact.

Thuringiæ p. 106.

Abrotanum

campestre s. caulibus albicantibus & rubentibus: C. B. P. 136. Abr. campestre III Tab. p. 51.
Abr. sylv. odoratum, caulibus purpurascentibus Schwenck S.
Wilde Stabwurz. Hel. d. Augusto.
rejit dorsto et rivo ont caule rubro &
die Tafelsorten nennt Blind den Guil.
torsen in ob caule gelb rosmarinblatt eyer
rote crauds, in rhein ist Tafelsorten

Abrotanum hortense, si esse rami deorsum & antrorsum flexi caule striato, folio = decomposito tenui, vulgatius flore luteo. Cast. hort. Ich habe selbe nie für rare.

Abies

cones sursum spectantibus s. mas. CB P. 505.
Ab. baccifera. fructu sursum spectante Tourn. inst. 585.
Die Tannbaum Arten.

Absinthium

Ponticum s. Romanum Officinarum, sive Santonicum C. B. P. 128.
Abs. vulgare magis V. B. 3. 188.
Gemeiner Wermuth Sales
in den Salzburg Alpen. ist. 1737. Jussieu war oben auf den Tafelsorten auf Schlossberg & Felsbachstein.

Acacia

Americana Robini
Spinosa Acacia C. B. Tournef. inst. 614
Robini

Acanthium vulgare I. fl. alb. & II fl. purpur. Tab. 1063.
Spina alba tomentosa, betonicae sylvestris C. B. P. 382
Carduus tomentosus Acanthi folio vulgaris A. fl. alb. Tournef. inst. 441.
Die Distelen Flos Jasionis N. 123. Scabiosa folio pinnato

Acer
campestre et minus C.B.L.451.
Ac. vulgare minus folio J.R.1.166.
Massholder, Kleiner Ahorn.

montanum candidum C.B.L.450.
Weisser Berg oder grosser Ahorn.
Acer latifolium Hal. p.6.
Platanoides Clusii. Hist. 57.

Der Feldberg
A. in Niedergüns wälde, am Schwarzwasser d. Deutschen Crone Preuß in dem Schwarzwasser ob dem Dorffe in Wälde auf d. Berge Sept. 1747 gefunden.

Acetosa
Hispanica maxima Camer.
An Acet. montana maxima. C.B.L.114.

Hortensis rotundifolia C.B.L.114.
Oxalis folio rotundiore repens J.R.2.991.
Oxalis rotundifolia Dod. Pempt. 649.
Gartten Sauer Ampffer. Rompffer Sauer Ampffer

Folio oblongo crispo.
Acetosa folio crispo C.B.L.114.
Oxalis crispa Clus. 211.
Ist Sauerampffer an Mayn auf d. Sandhügeln.

Patientia C.B.L.114.
Oxalis vulgaris J.R.2.989.
Garten Sauer-Ampffer Juncia.

Ex Acetosa pecus ut lactuca vivit Stapel. Hoffmann vol. de Exquisitis Diaetajeus Rohr. Tr. 3 Gnäd. p. 95.

Rhabarb. gut 5 Lot vini hortis folia Mundel wie Rosa. Ob wie sie mit dem Metallspiegel zu pflegen Gemüse Gift wie Pota? Buchholz observirt.

vid. Willen. Fl. Gall. III. p. 1.

Acetosa wächst in nassen Lot. Lapathia wie Buchstaben Blätter wie Gamander Pota Gemüse Gift. Hundert ohne Gift bitter Salz.

Acetosa hyeme humida et obscura collecta vix pepsin, plane non est acida, at verno tempore et parva est, et crescere incipit, valde est acida.

Herbis item des e. gr. Nasturt. Uti. Chirurgi etc. et vere pro salsulis medicatis colligantur, sale fixo essentiali, quia acetosa acida et plena sunt, vita, ut in suis sal culinare apparetur videatur.

daylus est Florig et Semicoly elbis et mbay ati ego observavi in patria ego ad 5 Lig. bene Missa Januarii 1732 percipio.

anensis, lanceolata C.B. P. 114.
Aet. parva auriculata repet. J.B.
Adon. Dauc. Amyctor. Mayo. Junio.

anensis minima non lanceolata C.B. P. 114.
Ocalis minima II. Tab.
Alsine Dauc. Amyctor.

Autopsella vid. Turritis aestiv.
Steinera Rivini vid. Clinopodium.
Aconitum
Lycoctonum luteum C.B. P. 183.
Napellus fl. luteo Riv.
Vide b3 galeatum vulgo.
racemosa bacciferum an Actaea Clusii CNP.
p. 183. vid. Christophoriana.

Acorus verus s. Calamus aromaticus Offic. C.B. P. 34
Calamus aromaticus vulgaris multis
Acorus J.B. 2. 734.
Calmus.

Adelfia vulgo C.B. P. 74. vid. Orig.
Iris palustris lutea Tab.
Acorus Adulterinus J.B. 2. 702.
Gelb Schwertel Mayo & Junio
fl. Mayo in nivali.

Adiantum vid. Capillus Veneris, Trichomanes, Ruta muraria.
Agrimonia vid. Eupatorium

Alcea

vulgaris major C. B. P. 316.

Malva sylv. altissima folio cannabino, fl. amplo - Pl. Jen. p. 16.

Virginiana minus, pallide fusc. & purpurea.

tenuifolia crispa Mal.

pallide mit kraus, blättern

an der Gebirgstraße bey Eisenach - Herr Prof. Buttner Communic. 1727. Jul.

videtur sp. distinctum a vulgari nam folia angustiora, laciniis crispatis, minus divisis caeterum flos idem est.

Alchimilla vulgaris. C. B. P. 319.

Pes Leonis vel Alchimilla J. B. 3. p. 513.

Alchimilla. Dod. Pempt. 140.

Viscosa, Blätter kraus, Mantel duff, wenig tief gelappt, crispa, Mayo & Jun.

Alga vulgatissima et longissima

Alga vinosa capillaceis foliis C. B. P. 364.

Caterva Plinii. Lugd. Exerc. p. 197.

in Mayo.

Alliaria

vulgaris C. B. P. 110

Hesperis alliariae odore. Mor. Hist. Oxon. 2. 252.

Knoblauchskraut

Folia magna habens provenit in rivo bey der Linde, wo man die Felgen wascht, am Felsbruch. Pfütze. Pr. d. v. Flotting.

Die unterste Blätter in grün Pflanzen [illegible] der
Malven ruly - nicaris [illegible] gleich, die durch
sie aber werde, die trockene [illegible] [illegible].

Alnus
Sylvestre, latifolius C. B. P. 74.
Alnus nigra Tab. 810
Moly Syriacus latifolius Fl. Gen. p. 139
Wild Elder blank
Saravam C. B. P. 70.
Alnus vulg. et [illegible] J. R. H. p. 554.
Elder blank.

flos albus, Major
flowt

Sylvestre tenuifolius Ad. Lob.
Alnus sylvestre pannosifolius capitatum
purpureis segmentis major C. B. P. 74.
Wild or Elder tree.
[illegible] Tree [illegible] tree [illegible] an arvis
[illegible] am Dachstoff wird [illegible] aber [illegible]
tricorne quoque et unicorne
Sylvestre tricorne flore albo C. B. P. 74.
Jul: & Augusto.
Anst [illegible] Leopold Burg. [illegible] Jul.
Wird [illegible] am [illegible] Dachstoff [illegible]
[illegible] capite [illegible] Obstein [illegible]
[illegible] Fl. [illegible]

Alni
effigie laciniato folio major C. B. 429.
Ani Fleyerbirke Tab.
Ochagas alpina alni folio = cana Fl. Gen.

Alnus
rotundifolia glutinosa viridi C. B. P. 428.
vulgaris J. B. I. 151.
Alnus, et Betula, plerumque alnetis fiunt, ubi et
umor unde in Water quicquid se hujusmodi aquas nutrian-
copiose [illegible] obumbrat putat [illegible] glutinosa.
nigra vaccinea C. B. P. 429.
Frangula Dodon. Pemptad. 787.
Faulbaum

Alnus [illegible] secundum vaccinea C. B. P. 430.
Cacabelus Plinii Lugd. 1419.
Tourn. Inst. 599.
Cacabelus cynosbatus, vel Alnus baccifera
non J. B. Tom. p. 175.
Ist an Graben Ufer und an Wassern
[illegible] fert nigrum, quae maturae sunt [illegible]
Stein
an Hecken = Stauden.

de Alno Alni vide v. Rohr
T. 1. p. gen. C. P. 110.
Alnus [illegible] et Betula [illegible]
et humidi [illegible] de Alnis
et nigrum [illegible] malet
v. Rohr. Hist. p. 127.
Alni folia [illegible] glutinosa.

in Forsten v. Jänner A. Jul
A. 1733 hat florent in
vers. Forsten 3 Pf. 3 Hund
3 Jänner 1 Pf. 3 Ort
wie 3 Kapitel [illegible] Forst
ist [illegible] 3 Pf. 3 Hund
Hund 3 Pf. 3 Ort Forst
[illegible] 3 Pf. 3 Hund

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Spergula facie media CB. P. 251.
Spergula media nostras HB. Ty. p 770.
am Graben - Feldt Zäun Hecken.

nodosa Germanica CB. P. 251.
Arenaria J. B.
Arenaria Holosteo forte gemina Clabr. 350.
Alsine Wasserlein mit Knöpfgen.

vid Spergula. Spergula facie minor S. Spergula minor
Horsfeldi flore cæruleo CB. P. 251.
Arenaria campestris fl. purpureo cæruleo
H. Jen. p. 107.

Spergula dicta major CB. P. 251.
Are... arvensis vulgatior H. Jen. p. 100.
Bläserin spina v. Bast Gl. Cur. Alsine foliis.

aquatica serrettior Clab.
Arenaria aquatica serrettior
An Alsine aquatica media CB. P. 251.

Plantaginis folio Clabr. 350.
Arenaria plantaginis folio H. Jen. p. 107.

minor multicaulis CB. P. 250.
Arenaria multicaulis serpyllifolia
H. Jen. p. 107.

hirsuta magno flore CB. P. 251.
Holosteus caryophyllus Tabernæmon. an Sand-
Spurg.

hirsuta minor CB. P. 251.
Alsine hispida minuta Hal.

Hederulæ folio CB. P. 250.
Veronica Cymbalariæ folio verna Tournef. 175.
Veronica foliis Hederulæ Rivini
fl. ni amœn. Aph.

Aster lanceolatus Chabraei p. 450. ad S. Mauro [illegible]
[illegible] Hoffm. [illegible] Kupp. H. Jenens.

Aster montanus Linnaeus fl. lapponico CAR.
[illegible] (Syst. S. planifolia [illegible])

Br. Jena bei Nordseite wächst sehr [illegible] elegante
plena unter den andern.

Veronica foliis floscul. caulinis adnatis
C B. L. 250.
Veronica floscul. caulinis adhærentibus
Morif. H. O. S. 11. p. 322

trophyllos circulea C B L 250.
Veronica Rutæ folio Rivini
Veronica acerna trifido vel quinquefido folio Tourn. p. 145.

Chamædryfolia floscul. pedicul. oblongis
racematis C B L 250.
Veronica fol. Chamædryos Rivini.

pusilla graminea fl. tetrapetalo F. J. 66.
Saxifraga graminea pusilla fl. purpur. tetrapetalo Raji hist. 1026. persicaria
bey S. Pulegii copiose. it. an den Jg. Land-Brunn bey Kork.
Mejo.

alter sonst alten gibt hier a. Fleck Brunn sonst Bluht in Mejo in Land Straßen Graben sehr häufig.
gemein bey Bork. und Katz. gar in Felsen diesen gut.

altissima nemor. C B L. 250.
Alsine nemorum latifolia Mer. Pin. 72.

Major C B. L. 250.

Media C B L. 250.
Majonis, Mäulgrabern.

palustris minor serpillifolia C B L. 251.
Portulaca spuria aquatica Fl. Jen. p. 107.
Anagallis serpillifolia Vatic. J B. 2. 970

Althea

Dioscoridi & Plin. CBL. 315.

Malva palustris, mollis & incana I. Herman.

Althea f. Bismalva f. B. 2. 954

Hibiscus.

Hypoc. vide Hibiscus. Ascanii.

Ambrosia

campestris repens CBL. 138.

Cornopus Ruellii, f. Hastatus vermiculatus

f. B. 2. 919.

Hastatus sylvestris capsulis cristatis. Tournef.

Instit. 2. 14.

Anagallis

phoeniceo flore CBL 251.

gemis-fol mit rother Blum.

Blüht = Junius, Oct. & October. Linn.

fl. carneo

Im ein acker am Hübel, gleich am Fuß d.

Lutten-Hütte wächst.

Sept.

aquatica, major, folio oblongo CB. L. 251.

Veronica aquatica major folio oblongo.

Morif. 2. 325.

Tournef. 145.

aquatica major folio subrotundo CBL 251.

Veronica Dat. major fol. subrotundo

minor aquatica folio oblongo CBL 251.

Veronica Dalica minor fol. oblongo

Tourn. 145.

aquatica minor folio subrotundo CBL 251.

Veronica Dat minor fol. subrotundo

aquatica angustifolia stellata CB. 252
Veronica angustifolia stellata Fl. Jen. 239
veronica palustris angustifolia Rivini
Veronica Vat. angustifolia flore Tourn. 145.
fl. a dem Dunst auf dem Berg auf
d. fl. 1724 Julii a dem Dunst auf d. Spitzberg
wächst.

Anemone
sylvestris alba major CB. 176.
Anemone sylv. 1. Clusii Hist. 244.
Anemone alba magna plurima anni
parte floreat J. B. 3. 411.
Anemony. Ray Pluvii
seinen anfang Aprili, auf dem Lorgenl Berg
1732 ph. apertum ad initium
Maij in nemoribus flore albo simplici
Maio anemone flore albo simplici
1733. Maij
in nemoribus circa Malbach
Wormbs et Landau inferiorem
Basel et Nordlingen.
d. 1736. octobr.
für d. 3. 4. 5. 6. Wochen auf die Berge
fürnehmlich.
anemone major CB. L. 176.
Renealm anemone alba VIII Feb. 109.
Anemone sylv. major Fl. Gall. p. 99.
Nieß-wald-Jeulaire.

anemone (: fl. ex purpureo rubente :) CB. L. 177.

anemone sterilis foliis punctatis CB. L. 177.

Arethusa
Lusitanica CB. L. 147.
Arethus J. B. T. 3. L. 2. p. 6.
fl. Jun.

Angelica
sylvestris major CB. L. 155.
Angelica sylvestris major vulgatior
J. B. T. 3. L. 2. p. 144.
fl. Jul. crispa et striosa wächst
in Gebirgen Mutzenbach f.

sylvestris minor s. Enulica CB. L. 155.
Agrippium Tab. 745.
Eupatorium Rivini.
Hanfkraut flores nunc ex albo purpurei seu
carnei, nunc nivei, fol. f. 5. 7 wächst
in Holz wald by Mutzig.

Anthos ist an 3 O v. eine Distel, der wird ausgest.

Aconit

Sinnesse fl. purpurea CBP. 289 Kopfeis
m. flesch. caudiis.
Aconit s. resta bovis vulg. purpurea & alba
Sinnesse J B.
Aconit Rivini. a. 395.

Sinnis caules purpurea. CBP. 289
Aconit = Sinnesse purpur. flore J. B. v. 393.
Julio & Augusto.
Handsfol.
Hoff & Comp. Berg.

Asplenium vel. Ceterach.
Asphyllis Ris. vel. Lobi affinis
Antirrhinum
anceps major CBP. 212.
Antirrh. caryophyllos flylv. J.P. v. 464.
Antirrh. anceps Rivini.
Sonnet. fl purpureo gemacht.

anceps major
Fl. albo in rein Acker; stroist 3 Distel-
Mayn und 3 Pfund-Heft.

anceps minor CBP. 212.
Linaria pumila, vulgatius, anceps
Tourn. Inst. p. 169
Linaria anceps minima Rivini.
Auch 3 Äcker Frisch 3 Lobs und Gor-
bor Heft.
Julio

Aperine
vulgaris CB.P. 334.
Aperine asca Thalii Philanthropus.
Lab-Kraut.

Anemidis flores nitri seu carnem rubidant latentes antheras lutea, pericly seq. punctos, quos malta dein lutea, ita antheræ lil. albam contrahunt.

Ex his duabus papyr. aquosis Copiosissima fere 1700 stipul. 4 & plus Rosas bullis Cost ob a 3 Condensa + in alio puto vide zu mit seu + neq. ob Gummi Pulv. 3 ß. vix ad unam Pulmentum, folia Herbæ, fl. Lac ℞ plenitudo modo magis lucida virentia, alia purpurea omnia deinde gratia quam ob Rubis gliscit, quam albus Rubent flores, ratione ejusd. plenitudinis, flavis tinctis, cyr. Origanus albus, Chamæpity albus, Thymus hortensis. Hyssopus albus, Cichorea albus &c. Hirtellaria

papyr. duas ad fl. gramin. ℥i — fl. ℥ x fl. ex albo rubellos ℥i ad ℥ vi ℥ dilut. ℥ albo quia — lia oxy — gratia ℥ :/

De agrimonia ass. autores a aliis volatilis mentio fit vid. Pluk. phytographia p. 108. v. Rob. tr. 4. Jamesii p. 72.

Dat. fl. agrimonia minor, in vicinis pratis, fl. albo flav., st. a. 3 unc. a gibbis fl. Anemidis Pulv. Rhei Chamæpity ℥i 1732 Jul. 17 ℥ i. aqua ad extr. Solutio Sal. ammon. fixi. Absinthii vid. fl. Jacobi Sal. ammon. fixi p. 4.

Apium
hortense s. Petroselinum vulgò C.B. P. 153.
Apium hort. multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum plenum J.B.
T. 3. P. 2. p. 97.
Petersilg.

hortense latifolium C.B. P. 153.

hortense l. petroselinum crispum C.B.P. 153.

montanum foliis amplioribus C.B.P. 153.
Oreoselinum I. Tab. 279.
Berg Petersilien
Berg obrigk. v. um. d. klein. Par. - Kräut. it. ist. am Galgen alhier.

palustre & apium officinarum C.B.P. 154. Apium dulce s. Selleri Italorum Hort. Reg. Paris.
Apium vulgare in gratij J.B. T. 3. P. 2. p. 100
Bey Dulz Graf &. Dorfe dem wo Frl. Capp. ofe (3 rivulis proxime intercurrentibus) (x)
hoc Italis Celeri vocat, Selleri Rajo
diligenti culture mitescit. Vid. Cabeg. plant.
Norimberg. Volckam. p. 57.
it. in d. Mauren wo d. Brunn in Dorfe, Pfaffen
Loch, rivulus Camff.
it. Bey Neuhaus a. d. Pelz fürt Hort Reg. Paris.
it. Bey Schloß Hohenheim. Ht.
an d. Schloß Graben
mit Wasser und andern
Kräutern

Aquilegia sylv. C.B.P. 144.
fl. simpl. J.B. T. 3. p. 484
Akeley
an d. gebüschen sonn. vor d. Pfaff. Thor fl. Major
fl. carules simpl. x pleno, fl. purp. simpl. x
pleno, caruleus simpl., albus simpl. et quidem
= alba foliis virid. in seu herba et cotonis ma-
gis haud virid. = cetera sit magis
obscura, ut = caruleus alba,
rigens albus & spuria alba.
(x) ist an vorigen Orten
selbst auch sehr
gemein selbsten hier
an dem Fahrweeg
bey Hohenheim
die meiste.

Argemone

capitulo longiore spinosa C. B. T. 2. 296.
Argem. capitulo longiore C. B. P. 172.
Papaver cornutum capitulo longiore, hispidum
Tournef. Instit. 238.

capitulo longiore glabro Monsp. H. R. Blef.
Papaver cornutum capite longissimo
glabro Tournef. 238.

Anchusa

Clematitis recta C. B. P. 207.
Anch. Clematitis vulg. J. B. T. 3. p. 560.
Ochsenzung.
Lang lange wie d. Natter Gestalt, und an
seinen Enden. stark wollig langsam
der 3 Ecken. Thor. in gute an schlecht
in Erg an der Erd Rad wolig.

Anch. ca Wid. Dornick

Ht: 3 Jahr d. Art gutes
wenig schlecht, wd 3 Ecken.
Thor, so wie Stein + in Erd
wüst Art, Erd Art in
gelb Erd Art Jahr.

Artemisia vulgaris major C. B. P. 137.
minor I. de alba Tab. II. 27.
vulgaris J. B. 3. 184.
Beifuß

Anem

vulg. non maculatus C. B. P. 195.
Anem Tab.
Anem s. Aaron officin. And. J. B. 2. 780.
Braun, Pfeffer-Kraut, Teufels Augberg.
Dann Augusto matura, in pedunculo ovali-
nigricans. Sat angenehm liegen, wie Feld-
Kraut et alle zusammen. In d. Mitte Blätter ab-
Kreis-Linien, Kraut. I Pfeife Gold gelb
ut 6 bracteis Lil. convallium.

Anem

Art Marks ef-
fundit, Mejo Leiba
peritO, rel x manifest
x carlem barbarum
protect, plura rabix
solo Marks ef pi mu
Leiba effert.

maculatus, maculis candidis vel nigris C. B. P. 195.
gefleckt Pfeffer Kraut.
fl. ut vig. Mejo.

Asarabo
valgaris, s. Caejophyllus Frosc. C.B.L. 17.
Asarabo vulg. pulmonaria J.B. 2. 485.
Genuina Rosea

Asarum
C.B.L. 194.
Fusconis et officinarum, i. tot J.B. To. p. 548.
Haselwurz.

Asclepias vid. Hirundinaria.
albo flore C.B.L. 300.
Vincetoxicum Dod. Pempt. 407.
Schwalbenwurz
Hirundinaria

Asclepiadis
hirsuta C.B.L. 280
Hirtsend.
vid. Hyssopi.

Asparagus
palustris I Tab.
Asparagus sativus C.B.L. 487.
wilder Spargen.
Asperula s. Rubeola montana odora C.B.L. 334.
Hepatica stellata Tab.
Asperula sylvat. Pl. Genev. p. 5.
Waldmeister, Storn-Leber-Kraut.
alii Asperula vid. sub Asperula.

Aster
Atticus caerulei vulgaris C.B.P. 267.
Amelli Clusii
blau Storn-Kraut
An der Bonsauer Wild.

vid. Bellidis Aster.

montanus luteg. foliis glabris foliis
C B L. 266.
Atom. Linn. fl. Jean. [illegible] portig. [illegible]
[illegible]

Vill. Conyza. luteg. major foliis speciosa C B L. 266.
Aster. I. vel Pannonicg major. Clus. Pann.
Aster. III. sive Austriacus Ed. Cri. Hist.
Plant. Var.

Astragalus
luteus, pennis, procumbens S. Syst. Monsp.
Glycyrrhiza floribg luteis - pallescentibg.
Sylvestris C B. L 352.
Astragalus Riv.
fl. Jean. [illegible]

Atractylis
lutea C B L. 379. Centaurea officin. luteg C.B.L.
an Osseis-Major bg 3 blumis.

Atriplex
hortensis alba S. pallide virens C B L 119.
Gentis Malta

hortensis rubra C B L 119.
Variet. gentis Malta.

angustis oblongis foliis C B L 119.

foliis hastato S. Deltoide Monsp. H. R. Blas.

Syst. angustifolia, laciniata minor Cluss. p 305
An Atriplex Syst. altera C B L 119
Chenopodio angustifolio laciniatum
minus Tournef.
Alter. pontica

Sylvestris foliis sinuato-auriculatis C.B. 119
Chenopodium fol. sinuatis auriculatis Tournef. Inst. p. 506.
mit einer purpurfarbigen Aehre, wo es nicht hoch wächst, kleinen Blättern, Folia Clusiana.
mantime laciniata C.B. 120.

– Pl. Bot. Lonicer. Matthiol. it. Mattiol.
ist in der Mitte [illegible]

Sylvestris latifolia C.B. 119.
Chenopodium 1. Tab.
Gemein-Gänse-, wilder Malta.

Sylv. latifolia acutiore folio C.B. 119
Chenopodium II Tab.

Sylv. angustifolia acuta ramosa
bey Oberwesel an den Felsbrüchen Segt.

Foetida C.B. 119.
vulvaria Tab.
Chenopodium foetidum Tournef. Instit. p. 506.

Sylv. foliis sinuatis, spicis terminalibus virentibus, spicis rubris Morif. H.O. L. 2. p. 604.
Chenopodium foliis laciniatis, comis purpurascentibus Tournef. Instit. p. 506.
a Mayz nicht gemein.

Avena

vulgaris f. alba CBH. 23.
Avena alba F. B. 2. p 432.
Haber.

nigra CBH 23.
Schwarzer Haber.

tenuis arista

Dünn Spreuter Haber

panicula ad latus spectante

auch f. communis feld distet à nostrâ
Pflug Haber. kurtz weit dann
als f. anderer, wie alles bey selbe
Lands gebräg.

distet à Sativa. Haber,
quod ab ea valde varia
Natura patet ipsa.

Theophrast. l. IV. de caus. plantar. c. 6. sagt, es wachsen
v. Gerste manigmal in drey Jahren Mißkalten. Haec calida
vis a deum, est, quae sine venis: venam sine sanguine
habet. Es ist die Calidität der Natur, die Mängel der Feuchtig-
keit mit seiner mannigfaltigen würkung ersetzen
scheint, v. mehr in gantz Thessalien v. Athen.

Balsamina
lutea S. Noli me tangere C B P 306.
Impatiens Rivini.
Frauen-Haar. Kraut. [illegible]

Barba caprina flosculis compactis C B. P. 164.
Ulmaria Tab.
Geiß-Bart. [illegible]
Rerica cæsia nigra nitida rubra rodosa [illegible]
Tragopogon ex bo alba Dioscoridis [illegible]
[illegible]

Bellis
lutea flor. pistillo incisio major C B P 262.
Chrysanthemum arvense Tab.
Chrysanthemum arvense flor. glauco dentato
Fl. Jen. p. 157.
Gold blum.
bis 3 gute Lent Kraut in 3 Finger-Aden coquit.
[illegible]
Julius.

wie Chrysanthemum.

flor. caule foliis major C B P 261.
Leucanthemum vulg. Tournef. inst. 491.
Groß Gänß blum. wie alle diese lutey.

Sylvestris minor C B P 261.
Bellis minor sylvestris spontanea J. B. 3. 111.
Gänß-Blum gen, Klein wilde Mensch.

Sylvestris minima
Mayo de Junio
bey Baden in pratis.

Berberis
Fructus C B P. 454.
Oxyacantha II. Galeni. I. Tab. 1448.
Sauerach.
[illegible] Berres matura

Beta
Beta Vulgaris rubra
CB.
rubra radicâ Rapa CB. L. 118.

Rothe rübe. Römische Rose.
alba: Spelleseear Cicla officin. CB. L 118.
Beta Cicla 2 B. 2. 962. in Horto.
Ist auf der Pfaueninsel.

de Betis vid. Jonr botan
Cyclad.
nigra.

Rothe rübe

Betonica
purpurea CBL. 205.
Betonica I. Tabern. 931.
Betonie braun.
auch 2 weiß bei Halle Grabschaft Edd. H.
coprose-Inlus. coprose H. feldmarsch
in pratis.

Betula (Betulla
CB. L. 427.
Betula Tab. 1398.
Dod. Pempt. 839.
J B. I. 148.
birken.

Bidens vid. Cannabina.
Bistorta major radice nigri intorta CB. 192.
Nest. major. I. Tab.
Groß Natterwurz
auch J. ostindien wächst, bei J. Elbstrom bei Magd.
J. B. auch bei, wächst auch in Deutschland weit
J. und entweder Ital. Ist auf der H. Felder.
sonst an d. Alpen.

Bistorta
rubra major. CB L 118.
Blit. I. Tab. 817.
. Major
In J. Bundesstaaten Mag. wächst häufig bei J. Gerten
en Wasser.

album minus CB. p. 118.

polyspermos à Semina copia CB L 118.
Polyspermos Tab. 1219.
Cleistogamische Beta folio Fumet. Insp. 506
Fischmelde.

Bonus Henricus vid. Mercurialis

Lobat at corpis lateri = Lorti:
pr Neta sic ex eisen Rhabarb. wh Stfl
verum esse sumtr? Cam Lorenz. ut Lth
sämling, mensis Lobig.

Betonica ältes Gebräuch is Stfl. Kl.

Betonica weiss Leut sander, 17 maii Jun. aust der
weiss nahe der Lang wurz Engen Kunstst, deruft auch
Salig exper sich abraut Lerb betonica purpura Stfl
wurde diss nüngst durch mr. Dillen - ygens d
flora Giess. p. 12. Betonica alba tp. flor. à inbre
dolfem Heit, sed ego cor. plane tp. cr purpurea rep.
Lobet E. hic antiq parte necessitalem multiplicata Kass.

Helmont sander: diss. p. 46. Stt dass ein ausexcorne
Leb, dass wo grosse wunden Fleisch v. braun abgebrannt sein
ung ungefähr binnen sechs Tagen zuwachs.

Betula mensis Martii medii Junii sendet sich wie
ein blat pluviat. Cyrosbatz |: Jagubuttz, ist ehe stabe
eyne copie wie sie sendet. Ihr wirtz. Wm. Boyle enumeratis plant. circa Hallam lapsis.
Betula wird wie Mirtz an Oten. | stet mittelmässig
alte wands zwischen | mit eine bogel gesetzt, dann
die under bis mit Mond da Cambt Zeit auf
den Mond aber die Rinder sind in Kraft tag
ka viel wachsen, so augusti sind v. wenn sie tag
an alt Leib sieht wy dass sie die Leb vorne Zu
Leib wirg, wenn an Jung wirt gesetzt.
Stattrich Lutea, foliis oblongis, cadunt ante Cal. 240. Bs
Londin. Rupp. Stt. prang. nicht prop wittenb. sondern in
(+) wächst 1734. Stattrich Lutea, foliis oblongis, cadunt ante Cal. 240. Bs
Londin. Rupp. Stt. prang. nicht prop wittenb. sondern in
Stn wie d

Botrys
Chenopodium ambrosioides CBL 108.
Sive moschata folio maltha de Rivini.
Chenopodium laciniatis foliis Tournef. nos.
aus d. Engelbrecht. Chenopodium.
Brassica capitata viridis hybridus.
Brassica
alba l. viridis CBL 111.

capitata alba & rubra CBL. 111
Lyser-Kraut.

gongyloides CBL 111
Löffel-Kraut.

cauliflora CBL. 111.
blum-Kohl.

alba capite oblongo & penitus clauso
CBL. 111.

acephala CBL. 112

fimbriata CBL. 112.

feder-Kohl.

latifolia capitis foliis CBL. 111.

blatt-Kraut

alba crispa CBL. 111.

Krausköpfig.

carpestris pfoliata fl albo CBE 112
Brass. napitolii II Tab. 1140.
feld-Löff.
Zuckerwurzl mit stark-rübes blatt vnn.

Sylvestr. folijs circa radicem cichoreis CBE 112
Tuntis folijs inferioribus altioribus, ceteris
pfoliata Tourn. inst. p. 224.

Sylvestris folijs integris et hispidis CBE 112.
Tuntis hispita montana fl. albo Alpen.
p. 72.

Brunelle
major fol & dissecto CBE. rbo. Flos cum caule ag.
caruleo, vario alby.
Prunella fl. minore vulgaris J. B. 3. 428.
Brunella Rivini.

albus = 3 Strahlig gros Köpfl, in dem Köpfl ist viell die Hoffnung selber Stein und die Köpfl selber Stundig Fünfeck? und Köpfl ungleich.

brunell
caruleo magno flore CBE rbi.
Prunelle fl. magno folijs Eleginiato J. B. 3 429.
Brunelle fl. majore Rivini.

brunell mit gross blumen.

Bryonia
alba f. alba bacci nebri CBE. 297.
Bryonia Tab.
vitis alba f. Bryonia J. B. a. 140.
Zaun-rüben Giftrübe.

alba bacci nigri CB. P 297.

Vid [illegible] Zorit. 1740. d 26. Aug. [illegible]

[illegible]

1: nicolaus [illegible] albus [illegible] [illegible] Ar. 1 ct. vend
ma item nig. [illegible] :1 [illegible] albo tic
pinus rigth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Baglossum
Cabfolius, Borrago CB. L 256
Borrago offic. Fuchs. f. 12.
Borrago fl. cœrul. et albo Ms. v. 574.
Borrago

auch d' Borrell-Klatz bey d' Rabenstein: ex lectis
ex repositionibus ex Flotow ist genau:

ag-stifolius major CBL 256
Bugloss officinar nostrum Ff. p 11.
Ochsenzunge. Blatt und Stengel mit kurzen Borsten
steifen. Stengel oben ästig Blatt und Blüth
röthlich.
sylvestris minor CBL 256.
Echioides fl. cœrul. Rivini Echios Fuchsii f.
wilde Ochsenzunge. Borrago fl. Ms.

Bapthalmus
Prosconides CBL. 134.
Bapthl. Tancreti minoris foliis Tourn. inst.
clemonelos Chrysanthemum germanicum
4 95.
J B. 3, 122.
Rind-Auge in einig Orten spitz Juli August
A. Ast Stock Feldkamille auf d Felder.

Bupleuronem
foliis subrotundis s. vulgatissimus CBL. 278.
Asterula leporis umbella lutea J B. 3.
L. 2. p 200.
Bupleurum Rivini.

Hasen-Öhrlein
auf d. Felder. wächst auch. A. also an d. Felder-Rain Feldhasen-Ohrlein
oben aber ästet sich Stengel mehr wächst August. Kraut und Stengel
ist glatt. it. bey Waldheim. von Ferne ähnlich
ein Gallapfel wird
Gal. off. 1 ...

Burse pastoris
major foliis sinuato CBL. 108.
Täschel-Kraut.

major foliis sinuato CB. L. 108.

eleganti folio vester Convolvi repentis Camer.
Hort. Medic. 32 am Metzger bruck.

media CB P 108.
Bursa Past. minor Tab.

minor brevis oblonga CB P 108.
Alsine V minima Tab. 1087.
Alyssi vulgaris Polygoni folio caule
nudo. Tournef. 217.
Draba vulgaris caule nudo Polygoni
folio hirsuto H. Giss. 40.

Acker Vogel-Kreut.
fl. in axi Apri
plus flor. Rupp. ngpit Fl. Jenens. p 68.

Bursa pastoris similis
siliquosa major S. minoribus foliis CB. P 108.
Turritis vulgaris ramosa Tournef. 224.
Mayo a Jun flent.

siliquosa minor S. minoribus foliis CB. P. 109.
in pratis flide a jun vis. April. flent.

C.

Calamintha pulegii odore J. Hepatica CBP 218.
Calamintha arvensis N. fab. Gaz. Mus.

arvensis [illegible] Dan. Flora Rhedi.
A. Calamintha [illegible] Imber. epist. p. 92.
1727 Feb. wie [illegible] Stengel, [illegible] Blumen [illegible]
offenbarung [illegible] der Frühlingsfarbe a weiß [illegible]
welch Gift [illegible] Kopf [illegible] Leibes [illegible]
Thiers [illegible]. [illegible] C. [illegible] St. alibi.

Calthae palustris fl. purpur. CBP 276.
Pulegium majus I. fol. 1118.
alter blum.
An [illegible] Landmann Name, gleich wie [illegible]

vulgaris CBP 275.
Calthae polyanthos major CBP 275.
An [illegible] Tuch [illegible] Mitgab [illegible]

(: bei [illegible] Calendula :)
Syphilis; gut Kopf
ubaus, syp. mit
einige einen Vor-
mittag viel : syp
& viel :/

Corporales Lactuca A.

Convenit Fed. Cortusae.

Campanula
vulgatior folio Urticae I. major Raspior. CBP 94.
Cervicaria major Fabri Pemp. 164.
Campanula [illegible]

[illegible] Kraut.
[illegible] mundt; [illegible] mit [illegible] mit Pulver; und eben
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

pratensis fl. conglomerata CBP. 94. auf [illegible] Wiesen
Kräuden.

minor rotundifolia flore in fundi caulium
CBP 92.
Rapunculus sylv. fl. ex purpureo caeruleo Tal.
Ist kleiner bleibt als minor rotundif.
repit. eine fl. albo 1726 Jul. Tabl. syp: der
Brustsaft Leiter 3. alt Flosst Kraft
Im wurd am ausfloss [illegible]
minor rotundifolia vulgaris CBP 92.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~Cupressus horizontalis [illegible] Stilingia [illegible] ...~~

Cupressus horizontalis CBH. Pinus fl. Jamaic. Br. [illegible] Jam. [illegible] 1734 Jul. Br. [illegible] Rudbeck. Elys. [illegible] Dill. Elth. [illegible] Cupressus horizontalis conglomerata. Pinus Bahamensis [illegible] Jam. [illegible] Pinus Jamaic. [illegible] Pinus [illegible]

Videtur Lect. Vebel Heidelberg. vir. edidit 1739. el Hortulus [illegible] vegetabilia Taliarum, Cephalonia [illegible] in effectu elegantis familiam.

Cannabis maculata lig. augusta viridis vegetatior = minor erecta Cannabis [illegible] Pluk. [illegible] p. 807.

vid. Volkamer fl. Norib. [illegible] Quae mas Dioica [illegible] nullis [illegible] semibus, Fructus e contrario [illegible] nullo prorsus [illegible] Mas [illegible] Juniperum [illegible] Juniperus [illegible] Alias plantas [illegible] Juniperi [illegible] Lapido [illegible] Cameraria de [illegible] Cupressus [illegible] vid. Rupp. Flora Jenensis p. 463.

Gerardus [illegible] Dioica. Dant [illegible] [illegible] [illegible]

spinosissima, angustifolia, vulgaris CBt 488.
Card. caule crispo JB. T. 3. p. 89.
Jamaic. rosa - Pist.
Flor est purpur., flore carneo Pis. 2 Pseud. Maj.
ex albo rubescens, nonpurpurea albus Hort.
[illegible] Hort. [illegible]
alby coquille aux Magn. 2 Pseud. [illegible] Hort. Angl.

pratensis latifolia CBt. 376.
Cruc. pratensis Acanthi folio fl. flavescente
Tourn. 450.
Moris. - Pist. -

pratensis Asphodeli radice latifolia CBt 377.
Crista pratensis - asph. rad. latif. Tourn. Inst. 448.
pratensis asphodeli radice angustifolia Jul. A
Augusta.

[illegible] Hort. [illegible]

in avena provenies CBt 377.
Crista avensis Jonchi folio radicis repente
fl. purpurascente Tourn. 448.
Cardamine viscosa repens fol. Jonchi CBt 377.

Ad Pist. fl. Jul. g. hic Jamicensis evulsis ex
Angliae, ne officiat ei in vasculo.

palustris CBt 377.
Crista pratensis polycephalos vulgaris
Tournef. Inst. 448.

Rumph. - Pist. fl. Jul.

nutans JB.
Crista major pinguis capitulo magno CBt 377.

Flos est ex albo purpureus, albus Rauw. 2 Pseud.
Jul. Dauphinensis fl. Augusti.

Stellata fol. papaveris ornatrici CBZ 387.
Spina Stella Tab.
Calcitropa Fl. Jen. 174.
Cardunculus stellatus f. Calcitropa J.B. 3. p. 89

vid. Rupr. fl. Jenens.
in Add. p. 149.

Benedicty

+

Lanceatus latifolius CBZ 385.
Lanceolata f. scyth. Scorlon. J.B. 3. 558.

acanthoides J.B. 3. 56.

1737. Hel. corniculata purpur. fl.
rep. in Cobenz Thal
Tagleben, wie Pflanzen auf
fl. albiflorus f. nivei.

Carex vid. Graminea.

cardui stellati vid. Ostrey.
Carlina
acaulis minore purpureo flore CBZ 380.
acaulos Cirsium fl. purpur. Tournef.
Inst. 448.
in pratis.

Carex vid. Cornicul. Carpinat vid. Ostrey.
Cerynthe Riv.
vulg. CBZ 324.
Cerynth. vulg. fl. parvo later J.B. 2. 598.

Radix esui cruda amara
corrosiva est & urinis ciendis
accommoda, amara lixivia fit
& magna vitrea efficacitate
sic est comparata, ut amaris
vasa intestinorum offensa sanat
& petrificata, sibi vicinis
dura externa scabrities &
interna ff; si insperata
flamma & vena attenuata &
crassa & defecta propellit
bonaque in centro putrefacta
& flatum in tela putrescat sulphureum fuligine fera.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

aquatica rubra flore CB. P. 214.
Caryoph. aquat. fl. rubro striato J.B. 2. 798.
in Lower Hampshire bey Stockbridge.

Caryophyllus.

Dianthus sylvestris CBP. 209.

An? Bey Hampton Wildyen Julius
bey Rödelheim wächst.

An = Ist Bey Hampton wächst
sey nicht gut. Fl. Jul-
Fl. Franc. wächst
nicht 1733. 8bi
Lobel. Dr. Pagen sagt
sie nicht.

minimus muralis CBP. 211.
Dianthus minimus muralis Morif. H. 2.
Jul. et Aug. bis = 2 October p

bey Bockenheim wächst auf d Com
bey Frankf. Bey Hattst. rubellus
Bey Frankf. Bey Hattst. rubellus
Bey Bockenheim.

Sylv. vulg. latif. CBP 209.
Dianthus sylv. vulgaris multiflorus F.J. 106.
Fast wächst aber 1734 sehr viel Bey Hattst.
Fl. alba selten wächst. Bey Bockenheim.

Sylv. prolifer CBP 209
Dianthus sylv. fasciculatis floribus F.J 106.

bey Oberrad.
Dianthus vulgaris, Mag Com
wächst sehr häufig, Fl. Bey Hattst. Bey Bockenheim.

Sylv. humilis fl. unico CBP 209.
Dianthus sylv. pusillus fl. unico F.J. 106.

In der wüsten bey Bockenheim Mag copiose
Junio & Julio.

flore tenuissime dissecto CBP 209.
Dianthus montanus altissimus fl. tenuissime laciniato F.J. 106.
Caryoph. plumarius purpureus coronatus
Tab. icon. p. 287.
In variis Montibus ad Oppenheim Mag Zwischen Bockenheim
Junio & Julio. und Hattst. ist Bey Hattst.
sonder Nahmen. wächst nicht.

pratensis fl. laciniato simplici S. Flor. Cuenc.
CBL. 210.
Cychnis pratens. fl. laciniato simplici Mönch
H. C. L. 2 p. 537.

gemeine Blümen

In 3 einzelne wurde bey d. Rinder-Pest
consultirende
Mejo et Jiva.

anemonifl. hirsutus fl. majore CBL 210.
Caryophyll. holosericeus Lobel.
Myosotis anemonifl., hirsuta fl. majore Tournef.
fast. p. 2 45.
fl. maj.

anemonifl. glaber fl majore CBL 210.
Alsine pratensis graminea foliis amplexicaulibus
Tournef. Gr. Leunthes.

23. pratensis glaber fl. Majore. Gr. Cuan M.
blattlos einfach v. d. p. Brit am Stiel

Majo

anemonifl. glaber fl. minore CBL 210
Alsine pratensis graminea foliis ~~amplexicaulibus~~
amplexicaulibus Tournef.
Gr. Leunth. minus Tab.

anemonifl. umbellatus fol. glabris CBL 210.
Alsine verna glabra flosculis umbellatis
Tournefort.
Holosteum caryophyllum anemonifl. Tab.
Arenaria verna fegetis, glabra, bifolia
fl. pl. 100 minori stipulis.

anemonifl. glaber minimus CBL 210.
auf Berg-Aeckern. Hält sich wenig über am

hunc Br. Jesus xy. h. semel a sua sumsit, ut hs. 3 fl. 6 x.
pro eis ante hominem asseruit. Opus 35 Nov. Test.
vetus, flore elegantis pleno.

Castanea
Fyhr. qua peculiariter Castanea CBL 419.
Castanis Baum -

bey Lemny-berg und Urschel Juncis
st. aber nahe bey Bischofsheim auf der Rhönstraß
wachsend, blühend.

folio multifido CBL 419.
Hippocastanum Tournef.

Roß-Castanie.
flores Majo
durch 5 Kelchblätter
Dann fruct non [illegible] aculeatum.

Caucalis
Lata Apii folio CBL 1-2
ex Anspach bis Ansbach durch ersehen.

Semine aspero glochidibus subcostatis CBL
Caucalis vulgaris H. f. p 265.

arcasis echinata magno flore CBL. 152
Cauc. 1. Tab. 190.
Echinophora fl. magno Rivini.

Klettern-Lorbeer

bey Grünsfeld mit 3 Adern capreise Julio.

arcasis echinata parvo fl. et fructu CBL 152
Echinophora Rivini

auf 3 Bergen Hasenberg - Rüsselsheimer Berg.

Caucalis muris vel Holosteo affinis

aculeis gemina sunt in fructibus mostri inter fructus visus v. spinosa v. glabra.

Fruct Hippocastani Hippocastanum potest Dich viel Stein aber nicht Nüsse, gibt Zwiebel. Es frucht Hippocastanum wird auf die Art Castanien praeparirt, gekocht, gebraten, wird sehr süß, wie Castanien

Kaulauféia
Kaulaufeion.

Centaurium Centaureum, centaurea.
minus CBL. 278.
cent. minus fl. purpureo J B. 4.

Centaurea gallo provincialis.

Jn offenbacher Feld- wald bey dem wasser trieb
wächst. it. in wald hinter dem
Julio blüht offt mit - weis - oder
purpurweiß offenbacher J. B.

Die Zeit Nr. multiplicat
fl. albo = purpur.

purpureum minimum Morif. H. R. Blef. et
Hist. Oxon. P. 2. p. 566.
Die Kraft, acht 3 Morgen lang.

Cepa
vulgaris CB. L. 71.
Die weiß, bulbi hier und wirsch
die roth, tunicis durch 3 roth pt roth mixt wird.

oblonga Dodonæi CB L. 71.
weiße Zwiebel, die winter - Land stets in der andern
ersten.

weiße Zwiebel.
weiße Zwibel
blum ist rothfarb ausschwarz.
Sterilis Trag. CB. L. 72.

Die scharlotte. Ascalonica Matthioli ex quo corrupte
Echalotte, germani Schalotte. und Kupp. Fr. Je-
nensis. Dies Blum weiße Zwiebeln, weiß mit
wenig blich, aber in bulbis gelb ist braun roth.

portant auch, fast vollend
Kerbel - Kraut hoch
bey 3 Schuh.

Cerefa
silvestris vulgaris CBL 450.

acida rubella J B. Tom. 1. p. 121.

Cerefa major sylvestris fr. subdulci, nigro colore
rutilante CBL. 450.
Sylv. fructu nigro et rubro J B. 1. 520.

Maldivisch.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

A. 1737. Jul. in vrai a[illegible] Jaego B. Falkenstein ch.
für v. Jo — s Jaeger.

Lustwil. ist die Blume etwas weißlich.

N. Helianthemi Species 24 est quae in monte Bo. & mihi est obvium s. Gebirg wo sonst nelle wächst. Flos est rugul. pentapetal. sem multa cassidi lecta.

prunus fructu dulci incarnato Fl Kur.
pyl. Fl. majo.

racemosa fysh. fr. non edulis CBP. 451.
cerasus racemosa quibusdā alijs Padus JB.
Padus Germanica foliis deciduis Fl. f. 1422.
Vogel-Kirsch
Kirsch-Kirsch
fructu albo dulci
cerasa alba Dulcia CBP. 450

Kirsch-Kirsch

cerasus (cerasa) sanguinea fructu CBP 450.

Kirsch-Kirsch Amarell.

Chamaebalanus vid. Castanea

Chamaecerasus
dumetorum fr. gemino rubro CBP 451.
Periclymenum IV rectus. Tab.
Xylosteum Riviā.

Chamaecytisus
vulg. fl. luteo CBP. 465.
Helicacabum II Germanicum Tab. 1474.
Regis fl. Ludwigs et augustinus

Sonnen-Gürtel

Chamaedrys

Jacquin major asperifol. CBL. 249.
Jacquin II Tab. 771.

Germ. Gemeiner Wanderlattich.

Jacquin minor rotundifolia CBL. 249
Jacquin III mixt. Tab.

Jacquin minor latifolia CBL 249.
Jacquin Pannonica V Tab. 771 vid. Veronica
Wächst auf bethaupt. auf S. Cosmus Berg in Ober-
selbst in Wald. Ungarn. Wald. fl. Aprili.
vid. Botrys Chamaepitys spuria asperifolia.

Chamaegenista

folio Genistae vulg. CBL 395.
Wächst auf Berg.

Sagittalis CBL 395.
Chamaespartium Tab.
Genistella herbacea f. Chamaespartium J B.
T. 394.
fl. Junio. f.

Chamaemelum

vulgare; leucanthemum Dioscor. CBL. 135.
Chamom. vulg. amara J B. 3. 116.
Camille.

Chamaemelum CBL 135.
Cotula I. Tab. 70.
Chamom. nobilis f. Cotula foetida J B.
3. p. 120.
Hund's-dill.

foetidum CBL 135.
Cotula Tab.
Chamomelum foetidum f. Cotula foetida J B. 3. 120
Stinkende Chamille.

Lunaria rosea in Galeatam sorte.

Rudbeckia staphylinorum conspicua cum flore pleno
picta Gabriel S. Crithmus Tournefortii,
ad auctoris fidem. sed vide Lemery
Dictionaire des Drogues Universel. ubi
et esse percipies staphylinorum auctarium dicit
eà calculi contritione dictum ait glaucium
ut Crithmum, sed eodem modo Lu
perce-pierre.

Anonymus magnus S. Hispaniae Trib. quae CPK.
Myrtus est optima vulgo stirio, gustu dulcis,
habet semina post umbellam candida magna oblonga,
et quasi cuneata, et striata. vidi 1717 Francofurti in
Hortorum Ill. Rüdigerianis gentis.

Magni flores solis ejus lutei sunt, et paulo post marcescunt.
vna folia o vigintis cuiusvis dant.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaepitys
lutea, vulg. f. foliis tripartitis CBP 249.
Cham. vulg. odorata fl. luteo J B.

frigora, Distel-Kraut.
Cichorium Cornutum. Raji Hist. 1707
Hedypnois ist arab. spica, wird 4 Zoll hoch, wächst
1735. stirbt optima florebat Julio. ist a
Botanisten sehr selten.

Chamaephyllos
nonnihil similis CBP 152.
Perfoliata Anglica Lob. Adv.
Scordio minor II Tab.
Alchymilla montana minima Colonnae
T. I. p. 146.
Cham. Nadel-Kerbel

Chamaephyllos
sativa CBP 152.
Cerefolium officinarum s. Chaerophyllum Tourn. 314.
Kerbel.

Sylvestris CBP 152.
Myrrhis arvensis semine striato lævi
Monsp. Ubal. 44.
wilder Kerbel. fl. Junio ad Septembr.
flores albi sunt.

Chelidonia
rotunda folio minor CBP 90.
Chelidonium minus Tab. p. 1134.
Ficaria vulg. F. J. p. 145.
Ranunculus verna rotundifol. major
Tournef. Inst. 296. et minor Epist.
Scharbock Kr., Feig warzen-Kr.
habet radicati petala, plurima simul sex, VII. VIII.

Chelidonium
majus vulg. CBP. 144.
majus I. Tab. 101.
Chelidonium s. Chelidonia J B. 3. 482.
Schell-Kraut.

Chondrilla
graeca roseosa, amaris quae l. Droserid.
CBL 190.
Chondrilla juncea VII. Feb. 487.

Condrilla Julii

Juncea vor d alte Graben - Seite g. d.
G. am Wege copiose Julio et an d
G. Lustenberg. Bey d. Ziegelhütte.
et. an d. Galgen Thor vor d Galgen Thor, wächst d Galgen Seite.

Chrysanthemum
major fl. profunde laciniata flo negro
CBL 194.
Chrysanth. cretica Clus. Hist. 205.
an d Esels-Thor dicht d Kreutz Stein
Septembri. ex Orto.
anveaf. Teb. vid. Bellis.

Cicer
sylvestre foliis oblongis hispidis majus
CBL 347.
Cicer sylv. II Tab. 885.
Glast Rivini.
Wild Erbs.

Cichorium
sylv. s. officinarum CBL 126.
rejit d. Erdz et albo qui utpl. cornely ejs.
Cichor. sylv. J B. 2. 1007.
Spinn - Distel.

Sativum CBL 125. J. B. 1007.
wegweiß - wurtz wächst d. Kirch-Thor Cornely,
et Cichor. sylvestris est.

pinnatae, lacteum, hispidae asperum
C. Hieracii hispidi foliis caulem amb.
dentibus CBL 126.

Cichorium folio rubro maculis albis 1736. Julii = wobei kurtz planta vidi, wo weit gegen wo d gemeine. a blattern, ist folio rubro maculis albis, d gemeine ohne flecken ist a rivino, ist an d Scharten d Juncus = allem. Vide Jatybur. ist d Cichorium, neue Jatybur folia sunt brevia ut. tend a = apice, et = laciniata. Hier Cichorien mandlete meinem punct = apice acuta, magna, et laciniata.

Cicuta
major CBP. 160
Cicut. l. Teb. 1702 Dod. Pempt 467. 713.
2. P. 2. 175. fl. Junio.
An 3 Gradus Hexandriae Gynandriae Dodecandriae Polyandriae Monogynae Polygynae Dioeciae Monoeciae Cryptogamiae Classis Linnaeanae?
Beschreibung.

Cicutaria minor Petroselini similis CBP. 160
Petroselinum canum Tab. 273.
Cynapium Rivini.

Cicutaria
palustris tenuifolia CBP. 167.
Thelaudrix Dodon. Pempt. 591.
Masters Beschreibung.

bulbosa CBP. 167.
Myrrhis dodonaea bulbosa JB. 3. P. 2. p. 183.
Myrrhis sylvestris Rivini
Myrrhis arvensis seminibus striatis, bulbosa, tuberosa, nodosa, Conyopsyllon Monspeliensium
Tournef. 315
Clematis
sylvestris latifolia CBP. 300.
Vitis nigra II Tab.
Clematis latifolia vulgaris JB. 2. 125.
Flandrische Beschreibung fl. Jul.

latifolia dentata JB. Clusius p. 118.
Flandrische Beschreibung fl. Jul.

Daphnoides minor CB. P. 301.
Clematis Daphnoides I. Tab. 1270.
Periploca vulg. angustif. fl. Lugd. Tournef. 120.
Vonca Rivini.

Die grün

Cicutaria Wasser Rivini viel. linearibus foliis.

Bulbocastanus Tab. Gesner Hist. und Lobel Rivini Dalechampii Cicutaria bulbosa Conopsyllon minus Tabernaemontani Lobel Dalechampii Cicutaria bulbosa Conopsyllon minus Tabernaemontani Bulbocastanum

Clinopodium

origano simile CBL 224.

Clinopodium 1. Tab. 707.

Clinopod. quorund. Origani facie JB. 3. P. a. 250.

Clinopod. 2. Rivini.

Thymbra-wort.

anverse cymi facie CBL 224

Acinor Rivini.

Thym-Kölnisch

Cnicus

sylvestris spinosior CBL 378.

Heracleia Tab. 1076. Rivini

Carlina sylv. quibusd. alijs Atractylis JB. 3. P. 87.

Carlina sylv. vulg. Tournef. 500.

sylvestris humilior s. Card. Benedict. CBL. 378.

Distel

Carlina Canarie

Stamm & Blatt [illegible] Stengel [illegible] Kraut [illegible] Stengel, [illegible] Blumen [illegible] Kraut [illegible] Wurzel [illegible] Blumen.

Colchicum

autumnale CBL. 67.

Colchicum JB. 2. 649.

Zeitlos.

Fl. [illegible] Augusti & 7bri a prin. ad vere.

Fl. 7bri et octobri [illegible] perfert ligusticum. Majus et Julio.

Centaurea nigra

pratensis cornelea CBL 280

Bugula Dod. Pempt. 135.

Centaur. nigra thyrsoid Bugula JB. 3. 430.

Gilbey Günsel.

pratensis purpurea CBL 280.

Bugula fl. purpur. Fl. Dan.

Bugula purpurea Fl. Gissens.

auf [illegible] Wiesen [illegible] Fl. Jun. [illegible] Aug. 1732 Maj.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Schreiben d. Rektor ecclesiae = Curtis, in Thuringen [illegible] eines Arguments nichts [illegible].

[illegible] Br. 1729 [illegible] [illegible] [illegible]

Capsula major ovata, media Regula, minor Tormentilla.

Rebrum illo regulum circuta, folio triphyllo rufo 1732 Majo optime & crispo flexuoso ramosum, ramis ramosis, floribus umbellatis, umbellis 3 radiatis, 3 A. pedunculis, fructu depresso 4 angulari, 4 sulcis, 4 valvulis, valvulis ob-longis, seminibus reniformibus, rufis, ore rostro dorso convexis.

Petalum videtur contra vulgarem observationem esse in flore hypopetalo, cum pentapetalo figuido eandem rationem servare, scilicet in utroque parte inferiori petalum unum, caetera quatuor regulariter par, et à recto notante discrepant, potest quoque à caeteris recte observari esse inferius & discretivum dicitur. sed et ut appendiculum rectius et ei caeteris assimilatum potest, quippe se petalo rudimentum exhibet.

Ex Herb. Kl. 1733 Majo florig = Mauy Jorte [illegible] = Farbraut = Wild = put Jenny = Sued = [illegible] = [illegible] = [illegible]

Convolvulus

major, alby CBI 194.
Convolv. major I Tab. 160.
Groß Winde.

minor arvensis /: fl. albo & rosei: CBI. 194.
Helxine cissampelos multis. Convolvulus minor
J B. 2. 157.
gemeine Acker Winde.

minor semine triangulo CBI 195.
Volubilis nigra Tab.
Tagpyym vulgare seu dasar Fuchs. 911.
Buch-Winde.

Conyza

major fl. globoso CBP. 266.

Conyz. paluſtris parvo flore globoſo Tournef.

inſt. Inſtit. 487.

Dürr-wurz. Kahlkopf

cornuta aeris CBP 265.

Conyz. cornut. III Tab. 1244.

Aſter arvenſis cornutus aeris Fl. p. 167.

klebt dürr wurz.

Vrd. Aſter. media Aſteris fl. luteo C. III Droſcordi CBP. 265.

Aſter paluſtris, autumnalis Conyzae folio Tourn.

inſtit. p. 487. Jul. Aug.

(00)

gelber Stern-blume.

media Aſteris fl. luteo folio negroſi albicantis

Conyza affinis Germanica CBP. 266.

gelber Stern-blume.

major vulg. CBP 265.

Conyza major. II Tab. 1242.

Conyza major Matthioli

Bacchus quelyda BB. p. 1051.

gemein dürr wurz.

paluſtris ſemitifolia CBP 266.

Conſolida paluſtris III Tab. 946.

Jacobea paluſtris altiſſima folio ſemiti Tourn.

Inſt. 485.

Mauſe ohren-kraut.

Jul. B. J. am Rhein gen Swiß bey Salt Gebirg.

Juli Junius.

bey Kahlkopf.

alba acris annua Mori.

Aſter Canadenſis annuus fl. purpureo Hort. Reg. Paris

virga aurea virginiana Tournef. Inſtit.

Conyza Canadenſis annua, acris, alba linariae folio

Breyn.

Conyz. folio vil. Jonn. Botanologia ſua Conyza.

Jacobus Lutetius Cursus gravedens. Verberes
Corpus filius pinnulo veri Regis Florens.
Hb. Villeneuve a Flavis Flavi. Hevigi
Tubercul-Pect Tevigi



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(oo) [illegible] Matthioli flores ma-
gni Cateo, hunc dicit loci pere-
nnes J. B. 2. p 1050.

Cardamine
major CBL 158.
in arvis ... Offenbach ... Juli ...
... Aschaffenburg ...
... Kleestein ...

Cornus
hortensis mas CBL 447.
Cornus sativa s. domestica ... T. 1. p. 10.
Cornel-Kirsch.

Corniola CB. L. 447.
Virga sanguinea Matthioli et J. B. 1. 214.
Cornus Lonicer & Rivini.
Cornouiller ... Cornus Pulli ... Aschaffenburg.
Cornus
sylvestris CB. L. 418.
Avellana nux sylvestris J. B. 1. 289.
Haesel-Staude. ... Mart. 8bris 1726 ...
... Haselnuß-Strauch.

Sylvestris cortice albicante

Corylus
Avellana CB. L. 417.
Nux Pontica Lonicer.
Cornus Galli-Lond. Lobelianis.
Corylus Vid. Cornus

Crocata
hirsuta CB. L. 335.
Gallis latifolia
Crocus quich de ... J. B.
Crocus aurea Frej.
... Majo.

Cucumis
Sativus vulgaris: maturus fructu ... albo: CBL 310.
Cucum. vulg. viridi & alby J. B. 2. 545.

Cucurbita
major. rotund. ... CBL 312.

Rob ex cucurbita pepon Sonnt Rof. Tr. Hyperici ... 91.

Cuminum
-pratense Carri officinarum CB. I. 158.
Cenum Tab. Dod. Lempt. 299. Rivini.
Wiesen Kümmel.

Cuscuta
major CBI. 219.
Cassytha s. Cuscuta JB. 3. 666.

Seide Kraut.

Cyclonia Fr. wheelshaw
oblong (s. apfel v. birn
förmig = fegi shortonen-
sis, wo es als Compo-
situm, statt s. Wort Ge-
ne s. Cydonien Ge-
schlecht weil es ein Kern-
Obst ist wird.

Cyanus s. vid. Volcamer: potat
volaamen verbi gratia s.
veaine d. Acker. vid.
Fl. Norimb. p. 133.

Cyanus
Segetum CBI. 273.
Cyan. cornut. anversi. Tab. 428.
blad. Korn-bl.
Flor. corymbiter & caruleo, interdum albus
et atro-rubens, in unis uteri segetis.

albus reperitur in Hortis Gr. Bran-
denburg. Nr. 732. Nigrum
Flore Cyani Cyanus.
wächst.

montanus latifolius vel Verbascalus Cyanoides
CBI. 273.
Cyan. Alpinus radice pyretica JB. 3. 29.
Auf d. Falkenberg Mayo. A. wächst d. gr.
an dem Gebüsch.

Cymbalaria . . . .
CBI 306.
Linaria fol. glabris, subrotundis, Hederae
foliis clematitis Morif. H. 2.
totius
Cymbalaria folius purpurascentibus JB. 3. 685.

Cynapium vid. Cicutaria Apii folio.

Cynoglossum
major vulg. CBI. 257.
Cynoglossus vulg. JB. 3. 598.
Hunds Zunge.

minus CBI. 257.
Lappula Rivini.
Cynoglossus angustif. Semine echinato Boerh.
Lugdbat. 134.

ist s. Feldgrab = mausi-
ol. a. s. Hamster Loch,
da sie s. separat-
ell sehr wüten es mus
sie sehr vertilgt
werden.

vid. Apis.

Jovis planeta apis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cyperus
longus, radice, latifolius, spica tunicis involuta
Mons.

Gramen cyperoides panicula sparsa major CBP. 6.
cyperoide ad ripas Moeni. est gratissimi
saporis, ast sine nodis et multo, ast
et 3 pedes alta gaudet sapore

Cyperus ad ripas Moeni
ad Lucas
ad Julium

D.

Damasonium
stellatum
montanum multifido bracteis foliis
CBP 150.

Sagittifolium Lanceolatum Clusii var. hist.
Hippocrathes Riviani.
— bracteis oblongis ovatis Rivini.

potentilla palustris folio quinquefolio CBP. 150.
Cat. elect. c. Basil. 95. p.
ad 3 Mutzig Crucis.

potentilla tenuifolia s. Sesseli potentilla tenuifolia in Sepi
a in Prodr. descripta.

Ad Lucas-Berg ad Hainam frigidam
Mutz. Aug. et Sept.

potentilla Millefolium palustris foliis CBP 150.
Cannifolia tenuissimis Asphodeli radice Tourn. Radix alba praemorsa.
Job.
Millefolium Valerii foliis Mons. Oenanthe in sicca botanic. Tournef
Auf 3 Mutz Crucis Cruce Berg v. Feldkirch hier in Sc. It. ad
in amoen. d. 8. 8. 8

Dens Leonis

lutosi foliis CBL. 126.

Taraxicum officin.

Hedypnois f. Dens Leonis Fuchsii. J. B. 2. 1035.

angustis foliis CBL 126.

Löwen Zahn.

Dentaria

heptaphyllos bacciferа CBL 322.

Dentaria 10 Tab. 322.

Conllodon minor bulbifera J B. 2 902.

Zahn-Kraut.

Dictamnus

albus corticibus tenuibus

Fraxinella officinarum CBL 322.

Fraxinella Tab. 1159.

Fraxinella officinarum Dictamnus J B. T. 3. 494.

Esp-wurtz, wonach Dictamnus

Digitalis

lutea magno flore CBL 194.

Digit. lutea Tab. 960.

Gelbe grosse Fuchs

Dipsacus

sativus CB. P. 385. J. B. T. 3. 772.

Cardui fullonum f. Dipsacus sativus Lob. icon. 17.

1739. Decembr. H. D. Müller, p. Lancegrave Hamburgensis pflag, Ihro Excell. Herrn Gesandten Ihr Post-Pferd auf Ihro Excell. hiesige Reise Amicam Herrn Zeichen-Stuben zu verlangen, so Ihro wegen der Rüge-Abtheilung worauf man Ihro, so lange Sie hier seyn, Ihro Post nicht verlangen.

Ego in veri affectionis pignus praesentis in der Reise-Buch aber Ihro Excell. Herrn Gesandten Ihr Post-Pferd Ihro Excell. Herrn Gesandten Ihr Post-Pferd v. Adelebsen.

/: Nr. Herr D. Müller ist Ihro Excellenz Ihr Post-Pferd :/

Sylvestris aut Virga Pastoris major. C.B.L. 185. 49
Dipsacus sylv. s. labor Veneris J. B. T. 3. p. 74.
wilder Carden.

Sylvestris capitatis maxore l. virga pastoris minor
C.B.L 185.
Dipsacus minor Plini
virga pastoris J. B. 3. 75.
Alauda wilda Karden;
Wächst in wälden bey dem Berg-walde: fl. im Julio et Augusto.

Doronicum
Plantaginis folio altero C.B.L 185.
Arnica offici. Schwederi.
Gros Jacobs-blume. Donny-blume.
Blühet Jährlich bey Ende Aprilis Mayo.
Junio et Julio.
an 2 Fuß hohen Stengel.
in mehr selbig

Draba
umbellata l. Draba major capitulis donata
C.B. 103.
Arabis verrucosa p. 190. Warzichte Rauke.

an 3 Zoll hoch. mit adest viscos. biscos. brevis post flores
Mayo et Junio. stipulat. regul. c. est Draba s.
Arabis s.
adest ex hortis huc lata.

lutea siliquis strictissimis C.B. 110.
Hesperis lutea siliquis strictissimis Tournef. Inst. p. 210.
Arabis quibusdam verrucosa. Ray.
Arabis quibyda J. B. 2. p. 870.
Arabis a quibyda dicta planta Camer. Epitom.
Matth. p. 742.

Sec. Dillenium in Pl. Giss. tract. Moenon. p. 2
Arnica caule simplici, foliis ovato-lanceolatis
integerrimis, radicalibus petiolatis, caulinis
sessilibus. Hoffm. Germ. 2. p. 178.
Arnica caule simplici, foliis ovato-lanceolatis
integerrimis, radicalibus petiolatis, caulinis
sessilibus. Hoffm. Germ. 2. p. 178.

Dorcanthy
pratensis Semto foliis CBL 98.
Tanacetum album vulgare Tab. 1164.
Ptarmica vulg. foliis longo serrato fl. albo
J.B.T. 3. 147.
Ptarm. simil. Borrent. misse Dorent.

auff 3 offenbar sehr weiß eigentl. Just. de Stagn.
et alii, N. 24) 3 sehr weiß auff 3 Fuß

Achillea
vulgaris CBL n54. J.B.T. 3. p 586.
Achillea Dod. Lemst. p 631.

caule labet puncto rubicunda, alio
quo tb. inus. aliqs. obscure
flosculos plane rubri. in
ff ca cornl. rubri ut
Donaje ic.

flos corymbus est cornuly alijs dr. et albo rubescit.
fl. juncis circa viar. alijs dr. et rubeus est.
caul 2 ft 2 ft 6 zoll rubet est.
wächst wenig sehr niedrig bey Schmiedeb. Dr. C. ubi sig.

Serpicifolia anceps CBL n54.
Myosotis minor anens. Fl. Jen. p. 10.
Ech. serpicifol. Serpicifolia fl minore J.B. 3. 589.

dergleichen nennt Hirtenblum v. Leerjahr N. Fr.
blum fast blau aber die ist blau v. i. D.
wächst sehr selten, wird blau. Vid. Crystes.
med. Dr.

Serpicif. palustris CBL. n54
Myosotis palustris major Fl. J. p. 9.
Myosotis glabra palustris & Major Fl. 83.
fl albo zoll 2 Finger hoch v. 2 Finger weit
fl Majo.

Serp. nemorosa:
Myosotis hispida montana & Scabiosa F. G. 46.
Myosotis Serpicifolia latifolia hispida Ehrh.
Myosotis Scabiosa, procerior, latifolia,
hispida Fl. Jen. 97.
flos corymbus est cornuly, m. albus et purp.

Serpicifolia palustris CBL n54 a.
Serpicifol. latifolia. CBL 1071.
Linaria segetum & nemorum fol. villosis
Tournef. 169

Scabiosa

foliis accumbrato in basi auriculato CBR 450.
Clutiae stamina foliis angulosis FB. 2. 372.
Clutiae Rivini.
fluitans.

Dichysperma J. Stoechas cutinea tetrifolia CBR 464.
Stoechas cutinea Germanica lutea foliis
FB. Tg. p 159.

flore albo.

Flos modo est spicatus modo racemosus. fl. Junio Jul.
flos albus antequam aperitur, deinde purpureus est.

Equisetum
foliis nudum non remotis S. junceum Imago
Tabernaem. CBR. 16.
Descriptio fehlt. ist wie folio, stirpis stand
beyrecht in quinque partes divisi, steriles fertilibus
steriles obtusi, fertiles acuti. 35.

anceps longioribus setis CBR 16.
Caret descriptione, nisi quod dicatur folia
patentia. Rajo. Hirsuta pulverulenta pilosa fundit
ut conferv. clinor.

palustre longioribus setis CBR 15.

pratense longissimis setis CBR 16.

sylvaticum tenuissimis setis CBR 16.

palustre brevioribus setis CBR 15.

folius sub aestate virens CBR. auch dem Mayer
clinat in virides, fertiles virides, vix fert. fuscati. ubi et
sterili virides, in denis, ubi corpus cortici cutitis cui fa-
tibulariis radicis, fructibus et folius.

Erica
vulg. glabra CBR 485

Erica vulg. humilis [illegible] flore albo. Kalb.
FB. 1. 354.

Erica.

alba Tal
in alba folia St. Lucia viridia, in rubra obscura.

weiß Kraut zu Kindbett ähr in weiß. St. auf
Felsen ob Zabi zu Ende 1732 Julii mense d. 17.
St. L. S. [illegible] weiß.

Crocea maj or & stlior
fl lutea = rica varii
a viridar Label capsa.

Crysimum
polyceration l. corniculatum CBL 101.
Crys. filiquis parvis, quibyda Dentaria J.B.T. 2
p. 864.

Sein ältere Art Herr Dillenius
ist sich mit Grund
selbst
alterius filiquis Cruciatum CBL 101. Crys. II Tab. 2 mit
an stutter Rinde und am Mayz
Cyclus
— aber am Agtstaler selt. ist 1739 Dürfen über
Crocea Mori mit 8 gelb rein.

Hl. Jul. Hagl. habet filiq
Cruciatum 2 fistulosas ab
ab Ro Celsio in 2 fl.
secund. an Jungerm fl.
vocat Serapias in Jordins
ist offenbar und Cruciata
wie 3 simpl. obwin 2 cyl.
mit. & allein ist
3 Blätter sind
an Blüm Pod
unsers Jahrs, sowie.

vulgare CBL 104.
Crysimum 1. Tab. 840. Diese.
~~3 Blätter dünn rothe Mayz, andere Blume~~
~~Cyclus~~
~~Stengel~~
fl. Mayo Jun. et 4 Tota usque.

Mayz-Kraut.

Theophrasti folia Cardamo CBL 27.
Cyprus veneta Tab. Jöchelm.
Tagetes vulg. exotica Tournef. 511.

Senf in agris bey Rinderfeld.

Cryagrium
vulg. CBL 286. J.B.T.3. p. 85.

Mauer Senf.

arvense folio sinu similiter CBL 286.
Anthony IV Tab. 700.
Taleana Rivini
Feigel. Kraut.

Eruca

Sylv. major luteo, caule aspo CBP 98
Eruca pelustris major 1. Tab.

grosse wasser-Rauke.

Sylv. minor, lutea parvoque flore CBP 98.
Sisymbrio pelustri repens, Lepidii foliis Tourn. Inst. 226.
fl. Jul.

lutea latifolia S. Barbarea CBP. 98.
Sisymbrio Eruca folio glabro fl. luteo Tourn. 226.
Winter Rocket. Dyers rocket Lyons.

Eupatorium

veterum S. Agrimonia CBP 321.
Agrimonia S. Eupatorii off. Tr. p 321.
Agrimonia offic. Fuer. 301.

Odermenig.

Cannabinum CBP. 321.
Hemp Agrimony. 1. Tab.
Eupatorium Avicennae offic. F. X. p 157.

Wasser-Hanf, hat flores purpurei, fere et
viol. Cannabina. Bidens.

Euphrasia

officinalis CBP 239.
Euphrasia Tab. 1096.
Euphrasia ramosa pratensis fl. albo Cyllen.
Augentrost.

minor. Fl. Gall. App. 57.

pretensis rubra CBL 234.
Celsissitus 1 Tab. 554.
Euphras. penna purpur. DB.
Celsissitus Riviai.
Cadaver Augustost.

Ad St 3 Kadelfenwurz. Griff d Cadaver
vor Mark und Kädelfen expressissimi
Julii et Augusto.

Evonymus
vulg. granis rubentib CBL 428.
Evonymus 1 Tab. 1460.
Evonymus multis, albis Tetragynia DB 1. 207.
1: fruct aliquā fuerant int corticē viridi pars 4
albi, tribus fuerant picti, qui quadratā quasi figurā
schlecht. 1 fruct 4 f. Pyrenoti. 2 4 fruct alienti
Stund d Baum. lutei. - fruct 4 carnei
colori.

F.

Faba
CBL 338.

Fagopyrum
vulg. saudear Framet. Ved. Convolv. maius se-
mine triangulo CBL 295.
Fagopyrum scandens altissimum dumetorum se-
minibus tribus alis pellucidis cinctis Fl. Jen.
Fagopyrum pentagynum dumetorum seminibus
alatis - seminibus alatis duplici modo dissepti
Fl. Gott. app. p 60.

Weizen. Buch-weitzy. Heidel.
Ved. Buchweitzen
Falcaria Ved. Ungrisch.
Falcata
Fl. cordes Riviai.
auch der gelbgrüne auch in der Ordnung
der Nelken steht. in den Ordnungen
in der welche auch den Kelch für Frucht
nicht rein Cadaver, und nicht Kelch gehalten?
nicht den Kelch, als der Kelch Frucht?
Fl. Julio.

Fl. lutea vulg.

[illegible]

Fagus
CBK. 419. Tab. 1388.
bey Cand.

Festuca arundinacea Schreb. gramen CBK 349.
— ovinoides Rivini

an? Festuca d. bromoides Mejo. it. oben auf
dem Berge Hey ubi rigi trab Spili a flore.
it. Zwey Nester v. Gerste a. am Ufer d. Neg.
auf B. 1 weiß v. gemein dem Pferdefuß ähnlich.
it. Gras Gras wächst in d. Erde hier häufig.

Festuca
graminea glumis hirsutis CBK 9.
Lolium Lonic.

von Gramen.

avenacea Sterbij elatior J. Bromus CBK 10.

utriculis lanugine flavescentibus CBK 10.
Aegilops quibus do arista recurva J. Avena pi-
losa JB. n. 432.
Gramen avenaceum utriculis lanugine flaves-
cibus Tournef. Inst. 505.

pratensis lanuginosa CB. Prodr.

Filix
fulcris rapidis nigricantibus strigosa Fl.
Jen. Jul.

Filix pendula
vulgaris an Molvon Plinii. ? CBK. 357.
Filix. 1. Tab.
Rotta Nau – brosch filix mihi – wächst Maj.
in portis arc. St.

Filix femina s. 10 fusca
pilosa ex axillis foliorum
ubi nervi se jungunt, sori
dorsi singuli punctiformes
nunc spicati.

Filix [illegible]. obtusa. [illegible]. Hoffm.
non ramosa dentata CBK 358.
Filix mas 1. Tab. 1181.

non ramosa pinnulis tenuissimis et tenuissime
dentatis CBK 358.

vid. fil. Thelypteris fl. Je-
nens. Kupp. p 276.

ramosa major pinnulis obtusis non dentatis
CBK 357.
Filix femina II Tab.
Farn kraut – Mädlein
in sylvis ubique fere obvia.

querna CBK 358.

Saxatilis foliis bi serratis CB 358.

Saxatilis ramosa nigris maculis punctata
CBK. 358.

N. pilosissima pinnulis bi dentatis Dod. Kempf. 466.
auf d Mutzenbüsch, an Felsenhöh – prati
d. all filix mas o ramosa.

radix quasi scilo pendet, nō ramosa angusta.
Nullo stipite nuda est.
Hujus flos interius VII. petalis quadrat. exterius
sub decapetalo regulari, semine quadrifluviano. vid.
D. clamosa alba.
Hemler in suis flore pro hexapetalo habet; ita
tamen etiam, ut viii folia flora duos pares
sibi sit in fecisse arbitretur.

Clusius epistolis suis ad Lobelium scribens flos seminum capsulas
vix & vix ullas ejusque ergo ad notandum esse, quibus sua
natura ad augmentum vix ullo pacto posse
filia fit / & quidem dubium, utrum ipsi semina
nudentur & tamen ipsa capsula ab ipsis
ita ab vix quidem. Bruno est in horto medico
Hamburgensi observatum ipsi ab ovis gemmis Lingua
cervina ad vix bluminatum prodeunte, nisi
ante ad ortum vix dum dum ipsi Pauly vix jungi
Plantas in suis quidem duplicatas.
Tabernæmontanus radicem petas b. m. vidit Orientalem elegantiæ crassa,
et forte ea est illa radix quæ vocatur Pauly - unde
Lobelius ad nostrum asparagi, sed absurdum vidit
insignis, quæ ipsa nil simile est. Ipse quidem ex Italia
ipsi nigrum unde - radicem mentus, ubi ulige est, sed
vidimus quæ ob - causam mentis altissimum 1732 Jul.
die 17. ♃. Folia ipsi in quibus magis quæ ob
ipsi dem altissimum in ipsis Plantis.
Folium vanis ipsi ipsi ipsi, ob vix ipsi.

Folium circa & pilosa
ubi vidit, sed
alibi.

ist im Waldhorn über
Mainz.

non remot. ♃ Cabel / bei Frankf. / hie.

Frankfurt ♃ [illegible] ipsi [illegible] ipsi, vagament quæ depasta
Frankfurt. Vide 1726 Oct. hic [illegible]

Filicula
fontana major. s. Adiantō album foliis
folio CBK 358.

Flos Adonis
Adonis flav. fl. pleniceps spicis foliis longi-
oribus CBK 178.

1. Crista Gall. Anz. vocat Jean qui fois trafi est,
et a quasi Chibat pagella nigra.

Flos Cuculi, cathedra fl. albo. cum fonti fl. Maji, in hortis fl. plenis
cum Hallo = fonti by Hallo 1737 Junii.

Foeniculum
vulg. Germanicum CBK 147.
fenchel.

Foenum Graecum
latinum CBK 148.

Jun. Jul. an d Rabenstein a S. Schutt Platz.

Fontinalis hucusque minor, in rivulo de wasser
a flusse Erft. it. in den Brünnen by den
gebirgen. Wasser. Vid pte magnetes.

Frazeni
vulg uni: CBK 326.
Frazer Tab. 326.
Eschen.

Frutex album CBK 326.
Frazer album Tab.

Teutophylli der fol frazeri
veel weniger; Hl. Fra
Frazerstamm.

Tab. optima est Dodonaei, wie Hyo-
scyamus, d. Kraut wie,
etwas die foetida.

Fraxinus Quelbeer Ast Zu Hecke so um sie abliess 1735. Fl Januarij 86
blatt S. Calyx by a Gartenzaun. it Langlich
Linnaei Handb. stam in sol. y Ast Mr Kleiner
by Mahnerest Rhs in weit 1737. Majo florentes
offen dem Forstbaum by Nürnberg in wald am wege. Dt. Strand in weit
offens. Hyae mihi. Rhs Zt.
Fraxinus
excelsior CBK. 416.
Fraxinus Tab. 1419
Fraxinus vulgatior J.B. Tr. p. 174.

Eschbaum.
spicis by 3 alte gebrochen by oberwind, a 3 1737. Jul. by Feldbrunnen
Strauss. fl. ~~purpurei~~ spicis, tunc et
postea de spadiceis optime dignosci
possunt. ~~inclinant~~ quia onustae ingenerent quae depasci
Indutum. Vid 1726 Mai. Bon Cathedrale

Tropicella pl. Literary.

Fumaria

Officin. et Descondy. CBK 140.

Fumaria 1. Tab. 85.

Fr. Rente. Taubon. Kupf.
Blüht bis in 3 Jahrgänge Kinder.

Bulbosa radice cava major CB. P. 140.

Split rad. rotunda cava Rivini A. Rsen.
dto. Fumaria cyperi.

Gelwurz

Fl. alba & purpur.
bij uns im Garten sehr.

Bulbosa radice non cava major. CBK 144.

Split varia rad. rotunda & cava Fl. J. 158.
in 3 Gattungen ist auch 2 Gipfen. ist Rhizom der
ung. Lupine.
radice quam hic anno proxime sequenti patefacit, cauta et pro
ipsa et in generem protrudenta.

Bulbosa radice non cava minor CBK 144.

Split rad. rot. & cava minor. 2
auch dem Rhizom der Lupine wo-
nig Gegensatz capreolo / Rhizom Fumaria wo-
mit in Rhizomen diesen Tab. Vid. Raum
ung.

Fumaria

Canellata et capitata valg. stissing Champignon
valgo dicty Fl. Jen. 155.

Sept. mit Fumaria valg. stori auch Fumaria
wird sie an Rind Fett capreolo. mit weiß
r. wie Lemellis Polybrüsen, da 1 wird
Fl. Fl. Stand Fleisch.

Porosus CBK 970.

Fungi regnis J. cavernosi J. mercurius J. B.
J. 806.

Dolety esculenty negrosus, fulvus aut albicans
quasi fuliginis saturity. Thurnet. 56.

Morchela.

Apuli et Major in Gratia a Clisi Loris
Rumidij J. Bisl. optimus & magnus Corpus
roseum dicit, ubi Carbone usti sunt, v. Di
Fl. Insel Cedor wird stark à Sole albi. acalent
flavia in Fr. valde fungiferus /

digitatus major CBL 372
Fraxinus ramosa flava et albida Fraxini
digitatis nonnullis Chabr. 585.

porrecta mespilus Fl. Jen. 553.
Fraxinus Augustifolia mespili Bauh.
Je 3 wälsches Holz Hoffmann.

lutea J. patula Chabr. p 584.

lanuginosa, alba lactescens

pinnatus albus lactescens fructu turgens QB.
Fraxinus alba aesir CBL 371. Hoffmann

membranacea auricula reflexa J. Sambucina
CBL. 372.

in caudicibus rafcas vagas equina figura
CBL 372.
Fraxi Ornus Tragi.

Salicis adnascens.

simetaria in plano orbiculari candida CBL

muscos interficiens CB. 372.
Fraxinus muscaria dicta fruticosa Chabr. 588.
nostra hic exprimit in Hybris.

rotundus orbiculatis CB 374.
Lycoperdon vulg. Fungus
Fungus pulverulentus crepitu lupi dictus
minimi esculentus Chabr. 591.

rotundus orbiculatis cortice scabro.
mit Pfeife

rotundus pulverulentus magnus lucti Germanis
Bofist B.B.S. L. 40. c 75.
Lycoperdon maximum et esculentissimum
Fungus lupinus, Crepitu Lupi Clusio
dictus. Bofist q.s. Hexenbofist F.J. p. 358.

Lycoperdon pyriforme gregatim nascens, ver-
mucosum et asperum Hebstasen. F.J. p 359.

Lycoperdon minimum sine pediculo.

calyce donatum Lycoperdon.

Lycoperdon non nascens.

qui lumentum ex uno pede generatur CB 374.

qui cespitem
CB.

vid. Vogelius fl. Halens. prosp. ubi. figura. Urb
a Tokmefort. in patch Cabinet Lubecensis.

Chalcus aspCXX. Vide Hadriani Junii Medici scripta
in 4. de prisca Chalcide vel Sphaleti Halensium
nuper ex Epist. Junii Epistolas 1652. 12. Amplex.
editas, ubi de hac fusius actum est a me.

vid. Philippus Pr. C. Decad. II. hea. 10.
obs. 207. de fungulis minimis seminiferis.
c. fig. aen.

panvar albar ꝓuincias Chabr. 587. s: pedcul
gi cerpor colors varii ꝓuinciæ Chabr. 588.

gur Cynortodi vulgatissimy.

— ——— lignear.
vid Hyperbr Cymbalariæ

pilealer auny vifidy Mayo Cy Gorbirfoft
bÿ d Lätfrisch bom Mussr cupiosi,
auch Cäst wuchs bÿ Kind-Hoft.

Seminifer Mezerei calycinomi Lugdl. ras. H.
Tunyordy vulgatissimus F. 9 p. 354.

an Hanauer May Junii. H. Cass.
wie sie mit in Cabinet kommen Blüh in 3 Jahr
sind abgewachsen, wessen aber wieder

pulverulenty minimy pedicular Lugi vifidæ
Cy Regi Cynoss. p. 16.
bÿ Aberrod in einer wenig nahe 3 Ostern.
bunter May. Julio

gi verni Monspeliæ dicti adorati et esculati
Chabr. p 581.
Wanzenwärzgen.

gur ruber lemellaty minimy

bÿ d Lätfrisch bom Mussr Augusto.

bÿ Frankfurt wilden cupiosi
Chabr. p. 587. s:
hundert Blüh
wie p: ut supra: 64.

camellus bulbosus.

an d Dard-steig.

camellus niger

bij d walch trefft auff unir Meisa.

Aegypte.

omnia cervi reticulat minimus =

in d wald zu Zeit bonsum v. Rehensis,
zog d bonsumus über.

Leptenbof.

hyperoxylon Lignitabs d gen Vill. Schlesien
pulicum Bruckmann:
1734 August = in d Hand ist flüssig wie Wolly
an d Flamm = d fett-gestank verbrent gut
wie d Oesterr. Thee Sag = d Glanz = d gut
Zeug wurde Zeit verfault. da d ärste Wolle
Leten dem d Flam d Fr. [illegible] d
Fr ist d wie fürst, fest ist ob als ob premia =
fruling mus d Fr tritt, stand, ist schwarlent
braun v. = d mitte fest bis wie Zeit = centro
Fürst. da Wolly wie Fr schwelzt.

calyx formis coloris minii ostiumbranacey.
rapit in terra ist. arbor nemorensis de.
[illegible] cidaris procerior elibi, ut a alle fest
Martii = durant an Gerbersfest wie d
Fürst. thor, wo Leroigne bulbos. Rex.
pyllon fest. Fürst d. St Lastfa Gi
Villemi.

G.

Gallicum
luteum CBL 295.
Gallet 1. Tab.
Gallet vers HB 2. 720
Under Hunds Kabl Kruf.

palustre album CBL 295.
Absinthium gentianoides palustre H. J. p 6.
Crucista palustris alba Tour. 115.

album minus IV Tab.
Gallet album minus CBL 295.
Lubia Cynanchica HB.
Rabeola Tournef.
Klein weiß Mayor-Kraut.

album supinum multicaule H. Jen. p 4.

weißt Läuffig auff und und 3 Felburg.
Junio & Julio Stengel sind ast-
ästig stigt rostig; true gelblich, Rispen alb.

Genista
anglosa & scoparia CBL 295.
Genista 1. Tab. 1509.
Cytisus genista scoparia vulg. fl. luteo Tourn.
649.
Hünds.

tinctoria Germanica CBL 295.
Genistella Tinctoria VI Tab. 1510.
Tinctorij flos HB. II. p 991.
Genistella Rivini
Klein färber Hünds.

wirthen & Ruth alb Kraut
alb wirthig
dinatica
oder Kraut.

vocat färber-Gelbkraut
färbet gelb flos a
kraut mensis Jun
Hünds ver.

Spinosa, minor, Germanica CBL 195.
Genipella Tab. V aculeata 1540.
Genipella Spinosa Rivini.
Genista - spectabilis minor Germanica Tourn. 695.
Lilio Narcissus Asphodelus, caput Hl. Johannis. Fl. coeli oder die Gelbe Lilie in wälder an dürren Plätzen. Fl. Mejo Fac. 63
Gentiana
v. cruciata CBL 188.
Gentiana minor I. Tab 1104.
Gent. minor s. vulgo cruciata JB. 3. 502.
Kreuz - Gentiana.

Gentianella centaurea caerulea fol. centaurii minoris. Kayl Hl. Jen. p. 16. Gent. cut. aegyptiaca minor flore ex Cattus Polopi CBL. Pneumonanthe Cord. Il Tower agroff. Gentiana Tab. in vento ut Enzian auf dem weg nach Offenbach über die Mayn brücke auf einem feuchten Platz. Blüht im Julio Augusto. Wächst 1 Jahr in Garten.

paluestris aegyptia CBL 188.
Pneumonanthe Tab. 1176.
Lungen - blum.

Gennium
Batrachoides fol. aconiti CB. L. 317.
Gramalis portensis foliis Ranunculi Aconitive F. J. 116.
vom lust colorirt vid. Kayl Hl. Jen. J. p. 103. Hl. Mejo.
- - fl. ex cretu purpureo, saepius pallide caeruleo vel gelbgrünlich - ut. bey Crons Berg.

foliis Malvae rotundo. CBL 318.
Gramalis fol. Malvae rotundo F. J. 117.
Ger. Columbina. major. fl. minore caeruleo Kayl. Hist. 1059.
Ger. Columbina fl. rubro Fl. Giss. p. 70.
an 3 Thurnhof-weg v. Jul Berks
Jenis
Ger. fol. subrotundo multis serratis s. Columbinum J. B. 3. 472.

violacea aquilegiae Lobelii p. 86.
Gramalis parvaepi foliis tenuiss. dissecto luteo fl. caeruleo F. J. 118.

(x) Salix reticulata magnus mihi laciniatus foliis
acuminatis F.B. T. 3. 477.
Grisebachii pentandra magna foliis acuminatis
oviq̃ profunde laciniatis F. 7. 116.
Genus radice grandiflora W.

d. A. nov. p. 103.
Lapp. rad. cata rad. in
reflexa Decand.
add. = Mayo p. 160.

Salix reticulata magnus flore CB 318.
Gemmis hirsutadus Pudon.
Grisebachii montana hirsutadus F. 7. 117.
in sylva prope pagum Mirowo sub v. wurden.
Hollerung sub pag. p. A. cum Salix Mattiol.
mihi.

Cicutus flor. majoribus ovatum CBL.
annulus elatius fl. rad. ex Hist. opus.
angulatus fl. ad nymphas aucdeale mihi pro.

1. fl. alba H. Cicuta Virg.
Virg. mas. H. Volum.

Cicutus foliis inuel ~~maculis inodorum~~ et pepinus
CB K 219 inpetum. A. stri ch. lac.

Laricum sapatile CB L. 318.
Gener. rotundifolius sapatile montanus.
Colum. Cast. 1. p. 107.
Sal salicastrum am Ohey a. in fl. (3)
nach 3 flüsse 3. A. flor. 3 selbst an
Sumpfe Lorbeer-flüsse A. mit Wasser
auf dem Cy, oder ist nahe dem Gute Dorfe, A. ch. 1732. Mayo
A. 032 Julii L. 180

Roberti anus primus CB K 219.

Columbinus annuum, mihi folia tenuis
laciniato fl. pedicelo longissimo cas-
sagte Mons. H. O. L. 2 p. 51 a.
ad viam nelpium. fl. of purpury.

Glycyrrhiza fl. flo. ovib. Apiaceae

Graphelia
vulgaris rayky CBL 263.
Graphelia vulg. Tab. 780.
Foleys S. Josquin Dod. Pempt. 86.
Elisa. Lamb.

vulgaris tenuifolia
JB. T3. 159.
Foleys baly. tenuissime folii excata
Tournef. Instit. p. 454.

media CBL 263.
Graph. IV. med ia Tab. 781.

major angusti. oblongo folio alterum CB.
263.
Elellyssum spicatum Tournef. Instit.
450.

major angusto oblongo folio CBL 263.
Foleys altera Dod. Pempt. G.

montanum flore rotundiore CBL 263.
Elellyssos montanus flore rotundiore
Tournef. Inst. 451.

montanum fl. et folio longiore CBL 263.
Elellyssos montanus longiore et folio
et flore Tourn.

ad Stoechadem citrinam accedens JB.
An Elellyssos Pyth. angustifol. capitulis
conglobatis CBL 264.
Elellyssos annuum flore croceo obtuse
saxatile Fl. G. p. 185.
Kunft Ist offenbarlich wirds am Rivulo
crescentem
Augusto.

minus repens CBL 263.
Graphelus V minus Tab. 781.
Felgo minor Gerard. Emacul. 64.
Clav. Käse Laub.

Gramen
caninum, arvense s. Gramen Dioscoridis CBL 1.
Quecken CBL 1. [illegible]
loliaceum angustifolium s. spica CBL 1.
Phoenix s. Lolium marinum Dod. Pempt. 540.
fl. Junio cepisse zeigt viel.

loliaceum spica longiore CBL 1.

Graminum gen. cicutae CBL 5.
Gr. folio gracili paniculâ ad unum pes.
sesu spectante. Tourn. inst. 547.

hordeaceum minus & vulgare CBL 1.
hordeum murinum J. B. Tr. 491.
Mäus-Gerste.

pratense cristatum s. Gramen spica cristata
love CBL 5.

typhoides maximum spica longissima CBL 4.
Lond. t. 10.

typhoides aspro primum CBL 4
Gr. c. cauda muris minus J. B. Tr. 471.
it. duo gramina typhoides Gr. alopecuroides spica
a cauda vulpina.

typhoides molle CBL. 4
Gr. spicatum spica cylindracea molli et
lanosa Tournef. Instit. p. 508.

dactylon fol. Latine CBL 8.

Spica spicata, vel ad spicam gerit, est vitis Dactylon, caule unico. Dicit dactylon.

——— angustifol. Spicis villosis CBL 8.

Schreber 11 Feb.
Ad ripam Moeni auff Seite des Hrn.
des Gasten Acker gegen Mayn auf d. Hügel
[illegible]

paniceum Spica simplici de asper Tournef. Inst.
Gr. paniceum Sp. simplici CBL 8.

paniceum Spica divisa CBL 8.

paniceum Spica ensifis longis ornata CBL 8.

Spicatum foliis asperis CB. Prodr. g. 2 3.
Gr. paniculatum Spicis crassiusculis & brevibus
oribus Tournef. inst. 521.

panicula paniculata nigricante foliis; Hôa
Theophrasti CBL 2.

panicula paniculata medium CBL 2.

——— ——— minus CBL 2.

——— ——— molle CBL 2. Prod. 5.
Gramen canicum Dalechampii.

est periculum, ne spectetur in finibus ast quod
in periculo / abstulit denique est — sicar.

Linigr. praecipua amplexus Sonnef. 66a


69

quae in Journal 1749.
16 Stück. ufercheint
Julii 7. Stück.
de Glis et tibialis
parandis glirographiae
longae. vidit B.
v. Haller Bern 30
Sept. Niedersächs.

Septimum mense sexto ortus. Ob I. 3.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

pratense tomentosum panicula sparsa CB. 4.
Linagrostis Tab.
Linagr. panicula amplior Tournef. 66.



Segetum duo in Journal 1749.
de Alis et tribulis
Linagrostide, vidit B.
Hessi-Hirschfeld.

Segetum

Segetum

Segetum

pra CBL 4.

66 a

Segetum panicula effusa CBL 3.

an Dachstr. bey m. weg und am Oberl.
wo neben weg d. Schwingel - braunes Gr
gehört. Mesp.
k. copiose in Gonzer wald reji [illegible] et B. k. in wald a. d. Gr.
k. parcius in Gelber Gr. Hard auf dem berg, Pfz. + Mayfeld
wenig gantz gefunden. Z.?

Segetum altissimum panicula sparsa CBL 3.

panicula pleadula aurea CBL 3.

Segetum panicula arundinacea CBL 3.

arundinaceum spica multiplici Kal egyptiacum
Kal Dorst. CBL. 6.

arundinaceum paniculo molli spadicea maj
CBL. 7
Gr. plumosum Lobel. spica candida et
spica modo lucens 1B. 2. 2. 476.

tremulum majus CBL 2.
Zitter-Gras.

avenaceum dumetorum spicato Raji Fl. Giss. vid. Festuca.
App. 169
Gr. latif. spica triticea compacta CB. Prod. 17.

und Carassia.

Carassi albo fructu flore CBL 3og bud.

Carassia vulg. et palustris Tournef.
246.

Zu d. H. ofnuvit I Landschaft dafft
einzeschätzt viach. it. auff 3 flach
wisch bey dem wasserbrunn. Fischer v. Ma-
thildt Hoff in s Bodens. Ecc.

nemorosa spicis parvis asperis CBL 7.

Cyperoides

cyperoides latifolium spica rufa: s. caule triangulo
CBL 6.
Cyperus Gras.

cyperoides spica pendula longiore CBL 6.
auff den weg nach Hörstein auch einer
seits wisch, allwo es sich stark [illegible]
[illegible] ut videt.

——— palustre nostras spica divisa CBL. 6.

——— ——— ——— ——— compactis CBL. 6.

——— miliaceum CBL 6.

——— palustre spicis 3bus subrotundis & vix
conjunctis spatio distantibus Morisi.

——— pendula spicis majoribus CBL 6.
an 3 Mayß und bey 3 gruben Hanß Hl Bader
im Graben.

_____ minus periculo spatha subflavescente
CBL6.

Cyprj minimus periculo spatha subflavescente Tourn. Inst. p 527.

_____ _____ _____ _____ nigricante
CBL6.

Cyprj minimus periculo sp. nigric. Tourn. Inst. p 527.
H. Jul. et Augusto Cäsaribus Trier offenbahrt
wurden sie Cäsar Trier hat. nyta et rub. thun
sie trocken unter Cäsar Augusto in Gallia gar
häufig trocken stehen.

palustre auctorum L. minus Germanicum CBL7.

Cyprj oder palustre auctorum capitulo brevior
Tourn. 527.

hirsutum, latifolium majus CBL7.

Juncus nemorosus, latifolius, major Tourn.
Inst. p 246.
auf d Felsberg und alt-König.
ob d Fr. alt Königst. Capelle. man hat
nahe Trier Quadersteine gefunden, auch einen Grundst. der Kirche 4 Fuß tief
hirsutum latifolium minus CBL7.
im Dürrbach. wald.

hirsutus angustifol. major C.B. Prodr. 16. L7.

_____ capitulis spicatis CBL7. Capelle Rupp. Rasen.
Bunt gras in feuchtig in pabi
ligig.

junceum minimum panicula foliacea
Moris.

bey d Juncellis inutilis. in d Pumpf
unsinns d Fürstl. Weiß Pforten in d
Mauer gefunden

minimum Chabr. 172.

Gr. spurium aquaticis fol. minimum
Fl. Gissl. Suppl. Apr. p. 172
[illegible]

hybridus cognat. sp. alba. C. B. cum Bas.
p. 6. im walde unter Neuen Hof.
im walde [illegible]
[illegible]

paniculata asper
Gr. zweyh. paniculata medius.

paniculata autumnalis paniculis angustis cavendis nigricante Tourn.
inst. 541.
ved. Fl. Gissl. p. 171.
den Januar May durch mein wasser.

arundinacea exoda major montanum.
C B 2.
durch s. Offenbach weis coquelicot
Juil & August.
s. Offenbach und Zwischen Mühlen
den und Trier

spica fluitans C B Prodr. 57.

juncea spicata S. Triglochin C B 2 p. 6.
ved. juncea Tournef.

montana arundinacea lanuginosa minor
C B. im Rinder wieder wald zu.

aquatica, paniculata, spicata C B 2
Gr. c. parva cauda minor rad. & rudosa
repens J B. 2. 472.
Gr. spicata Vaticus spica & rudosa brevi
Tourn. Instit. p. 540.

ubi hospita erexit.

Hoc Hünerbein auff dem Hofgericht wegen dem Schloß, allwo sich d. 17ten Julii, in Manual Fol. 90 [illegible]
[illegible] Hünerbein specialem.

Segetum altissimum panicula arcuata inaequa
spatio latiore Lob. icon.

Acker-Knäu-Gras.

Sylvaticum panicula tenui e brevistis
rami compositis Fl. Gissens. p. 130.
In Wäldern bey Darmstadt Julius.

_____ _____ miliaceum spatio CBH.

Gr. miliaceum vulg. Park.
ibid. copiose. St. in weld Feldern
Frankfurt sehr gemein Matthiol
wächst

foliaceum cornigulatum spicis glabris Tournef.
in Provinz, ist sehr copiös, wächst sehr hoch
hoch, besonders auf die Aecker zu Rosbach
Bischofsheim, Hattersheim, Kelsterbach.
avenaceum proteaeformi elatius panicula fla-
vescente brevistis paniculis Rey. Hist. 1284.

Rosbach, wo man
Kelsterbach, wo übrall
Bischofsheim
Hattersheim
Lorsbach.

in pratis Junio.
meistens viel. Stellen.

minus vulg. paniculis nigris Tournefort.
Gramen miliaceum album Tabern.
icon. rosbach
auf allen Aeckern Gelbhaar. Lichtenberg. Hessenbrück.

spicatum panicae miliaceae albae Tournefort.
Inst. 518. Phalaris major panicae albae
CBH. 28. Regen flores 1737. Julii
Frisch in Bodenheimer Weinberg v. Rothgrün
Melchior am Weg nach Gonsenheim Cassiengrund
und Rupp Fl. Jenens.

Grossularia
simplici acino vel spinosa sylv. CBL 455.
Uva crispa Tab.
Grossularia vulgatissima foliis hirsutis et late virentibus F. J. p. 265.
Stachel-beer. Kloster-beer.

H.

Hedera
terrestris vulg. CBL 306. major et minor
Chamaecissus Rivini.
Gundel-Reb. Gundel-Kraut.

arborea CBL 305.
communis major. J.B.T. 2, III.
Hedera corymbosa communis Lob. icon. 614
nullibi copiose ac Italiæ circa Neapolim & Gaetam nullo.

major flavis CBI 305.
Hed. Helix II Tab. 1178.

Helenium
vulgare CBL. 276. hujus Gundelrebe
communis est fusca & Helenium alba & Odorifera major &
Fuchs Hist. apud Nürnberg zu finden wie vil.
Kirsch fc Nürnberg.

Indicum majus CBL 275.
(Herba Sti Johannis)

Helianthemum vulgare folium Chamaecissi.

Helianthemum

Indicum fruticosum CBP. 477.

Helleborus

Serapias fol. maculosis CBP. 86

Helleborine

Leucanthemum VI. Clus. Hisp.

Jamesonia angustifol. fl. albo

Latifolia montana CBP. 186.

Helleborine Prod. Pempt. 384.

Angustifolia palustris J. pralensis CBP. 187.

Helleborine palustris nostras Raji H. P.

fl. albo vel Jamesonia montana latifolia

CBP. 187.

montana angustifol. purpurascens. CBP. 187.

Jamesonia fl. rubro Rivini.

fl. ruber Jacobaeae CBP. 187.

Calceoly Prod. Pempt. 130

Manica Diuglossa.

altera atro-rubente flore CBP. 136.

Hanc ego bonus et malus vidi Lugduni.

Hepatica alba vid. Terraffia.
Hepatica fontana vid. Lichen.

83 Hepatica pellata Tab. vid. Asperula

Herba

fluitans foliis cordiformi angulosque triquetro

Hepatica vid. Dalea.

Hieracium

Hieracium Sonchi folio Sonchi l. Hieracium Sonchi folio CBH 126.

folia subrotunde glabra

folia oblonga glabra CBH 127.

Hypochoeris II Tab.

Hic enim nonnulla collecta Tabernaemontani ad[illegible]
[illegible] nulla ab reg[illegible]. Vid. Hier[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

minus Dentis leonis folio subcrispo C B I 107.

Hyoseris I. Tab. Hyoseris pusilla Taberna = agrestis minor. H. G. 3 Cl. 2 Spec. = vulgaris? Gesn. H. Lob. Ic. Jacea.
habet caulem glabrum. ut dens leonis.

montana latifolia, glabra, minor C B I 107.

Hieracium montanum latifolium minus XIV. Lob. 1495.
Jacea alpina 3 minor hirsuta Cornuti.

alpinum, latifolium, hirsutie incanum fl magno
C B I 107.

Hieracium VIII. Tab.
Herba Costi officinis
Hieracium minus Lobelii major I. Herba Costa off. an graebneri. ist wol
1 X. Tab. Jacea montana Cornuti Canadensis = Costus dicta. endig et
umbrosa.

Cichorium montanum asphodeli hirsutie asper
C B I 106.

folius Cichorei Syst. vidore Castoni. Botan. Monspel.

Der. ist fol.
Dens Caprinus Raji. H. Jenens. Folio Lobelii
exflavo rubello, citissime in pappos abeuntes albi- ist offenbar
dosque Lactucae effigie. Tab. ohne Noth. nicht gut
hirtissimus, asphodeli minor C B I 107. genug
Jacea Tabernaemontani = Centaurea Jacea
A. = Knautia. Jacea asperior.

—— latifolium hirsutum C B I 107.

it. Jacea Tabernaemontani = Knautia pratensis A. Cyani
folio.

~~asphodeli~~ ~~hirsutissimum~~

maximus fol. pilosissimus C B I 107.

pulmonaria I: folia vena prima rubra et maculosa: /
Gallorum seu Hieracii Classis et Cubi.
Dens ~~leonis~~ globi maximus Inventus in = planta
et Delii Hieracii Vid. H. Jenens. p. 163. de
Manse variis Hieracii = Insecta globi in sunt
Jacea C. B. 1737. Jul. auf 3 Alpen. = In hac planta = capitulo alii
globi capitulo in seet
minutissimos caulis plantae
nascuntur. et sua salva
integrit = sui domicilii
et tota globosa proles =

13 rotundifolium

Vid. p. antea.

Auf d. wüste bey Rödelheim wo man nach Jenes
Gesetz

Acag.

— niveum foliis ovatis CBt. 238
Selera syst. fl. alb. V Seb. 765.
Mösen Herbar.

— foliis serratis fl. suaveruberis
Selera prototyp. foliis serratis fl. suave rubentis
Fl. pen. 9 n. 16.
M. pict. n. 8 sun.

Hyacinthus
stellatis, bifolius, Germanicus CBt. 45.
Cornutus alter.

Dalechamp. Hyacinthi. Sole auff Lateinisch gesetzt Gerstenmeyer
über die 3 Historien thut weiß Lorenz Scholtzius A.
pomarius in Tabern. folius angustis pendulis, alba in gantz Lorenz Scholtzius Tabern. V.
Hyacinthus autumnalis auff Teutsch ist nicht bekannt, denn
Hyacinthus ist der Cornutus alter vulg. Er ist Lateinisch gesetzt Lorenz Scholtzius 53
wie schon in Folio gedruckt. 1729. Mejo.

vulg. vel niger CBt 169.
Hyacinthus Seb. 969.
Hyac. vulg. Pin. 3. 87.
helfen. Arnd.

Notae similes ad vol. 1 vol. 2 Kochs Teutsch Flora pag. 47. ex Folio Gerstenmeyeri 1. 162. Corollo Obs. Cantab. IV. Obs. 44.

Hyacinthus
vulgaris CBt 29. officinalis
Hyacinthus Seb. 1 Tab. 1 variata
hyac. vulg. f. pyramidata caule circumdato foliis
globosis Pin. 3. 87.
Hyacinthus Dr. Arnica. Dennis Johann Blum ad Hyacinthum

minor, supinus, vel supinum globosus CBt 29.
Hyacinthus minimus supinus Pin. 3. 384.
In Gräben auff Hoffnungsthal wird Hyacinthus
et alibi copiose emittitur vulgo.

elegantissimus non ramosus foliis late [illegible] p. 13.
3. 383.

Asyne s. Hyppe. bifolia glabra effusa
CBL 280.

An und. Cruc. it. rel. Grundstock Forum
A. Rundwurzel fl. Jul.
3. foliata.

Asyne erecta caule triangulo pl. 53. 382.

Arachnoides altera foliis Hyperi grad
aliquibus hypericoidis. CBL. 280.

villosa erecta caule rotundo Forum
Arachnoides hirsuta CBL 280

Eu s Lonic. wasse bey s. folia soft. den
nacken Cruc.

J

Jacea
nigra pratensis latifolia CBL 271.
Jacea I. Tab. 435.
flockig- blume.

—— angustifolia vel latifolia minor
foliis caule brevi CBL 271. Prod. 117

flor gd ogue est alby alcis purpureg
flockig blume mit schmalen blettern in grab
fl. pl. k. Augspr.

vulgaris laciniata fl. purp. Tournef. Inst. 448.
Scabiosa major Spanetis capitulis CBL alby.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cabal. [illegible] flores ex religiosis pallidiores, pro officinalibus, Deus ex officinalibus exputent.

1.

folia interdum sunt obscure rubra vel fusca. in probis, alia viridia.

foliis cauliculis, laciniatis, cauliculis non
splendentibus Tournef. inst. 454.
Strobe vulg. calyculis 5 splendentibus CBL 273.
Lilly auf d Lustenberg. fl Julio.
vicia dissectifolia semore.
Jacea vigna laciniata CBL 271.
Jac. Austriaca H. Cluss. Hist. 271.
Flores carnei, in alby. Bl d. vary
auff d Lonsenberg.

Jacobea
vulgaris laciniata CBL 131.
Herba Jacobea vom Lab. 465.
am raub Berg vor Offenbach viel
H. Jacobs-blum.
vulgaris foliis ruber Crucis laciniatis CBL 131.

Jasmin
vulgatis fl albo CBL 397.

Ilex
Aquifolia fol. CBL 97.
Ilex I Tab.
Ilex gramineis foliis s. Ilicis Tour. inst. 216.
auff d Mauer an dem alt Hof gen Sal.
Impatiens Rivini vid. Balsamina.
Impatiens
major CBL 156
In d Linden Hecken vor Jol Aberwd.
virga vid. Helleborus.

Intybus
Cichorium latifolia s. Endivia vulg. CBL 128.
Cichorium latifol. s. Endivia vulg. Tournef. Inst. p 478.

vid Cichorium Intybus, s. Endivia vulgaris latifolia minus laciniata non a laciniata, et brevior.

vid Offenbach Art. f. 24.

[illegible]

cuspis CDE 1-15.

Cuthord cuspis Tourn. Inst. I 367 t. 429

[illegible]

Jovis mostrata Linnaeus 1747 Aug. [illegible]

Jovis mostrata Ehrh. [illegible]

Jovis mostrata v. Cameriter. CDB Bot. in Gott. 6 Forstkal. [illegible]

Jovis mostrata fl. Julio. Jovis mostrata Lud. [illegible]

Jovicaeso [illegible]

Tournef.

Trichlochin Linnaei.

Gr. junceum spicatum J. Bauhini CBL 6.

Juncellus

cornutus minimus Ad. Lob.

inundatus 3 in Prodr. CBet L. 12.

Juncus

maximus J. Surculi major CBP 12

Cusson.

J. Scirpus medius CPL 12.

capitulis equisetiformis major CBL 12.

Scirpetum minimum Cluf. 197.

Juncellus nutans CBL 12 (vid.)

Gladiolus major CBP 12.

Rutonum fl. rotundo & albo Tourn. Inst. p. 271.

Rutonum Caspis. 553.

Juncus c. fl. capitulis rotundis fl. S. R. Germ.

Clus. p. 197.

Gr. juncum floribus rotundis vulgare Park.

acutus panicula sparsa. CBP. 11.

Juncus foliis aq. fl. S. R. Germ.

fl. Jul. Cäsaris Monsp. nostratibus

Iris vid. Acorus.

Iris valg. Lutea, Flore luteo, Radice tuberosa, Caule tereti, foliis ensiformibus. Linn. Spec. Plant. 57. Flora Suecica. 1. Edit. 31. Fl. Dan. t. 1. Hall. Helv. n. 1. Schmidt Oesterr. Baum. 1. t. 1. Schkuhr Handb. 1. t. 1. Sturm Deutschl. Fl. 1. H. 1. Reichard Taschenb. 1. Jahrg. 1. Abth. 1. Reichenb. Fl. Germ. excurs. 1. Host Gram. austr. 1. t. 1. Pollich Pal. n. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Wahlenb. Fl. Suec. 1. Edit. 1. Fl. Carniol. Edit. 2. 1. Wulfen in Jacq. Coll. 1. Schrank Baier. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Willd. Spec. Plant. 1. Bd. 1. Abth. 1. Pers. Syn. 1. Bd. 1. Abth. 1. Poir. in Lam. Encycl. 3. Bd. 1. Abth. 1. Ehrh. Beitr. 1. Bd. 1. Abth. 1. Hoffm. Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. Edit. 1. Bd. 1. Abth. 1. Roth Tent. Fl. Germ. 1. Bd. 1. Abth. 1. Sprengel Syst. Veget. 1. Bd. 1. Abth. 1. Link Handb. 1. Bd. 1. Abth. 1. Schultes Oesterr. Fl. Edit. 2. 1. Bd. 1. Abth. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. Suppl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Reichenb. Fl. Germ. excurs. 1. Host Gram. austr. 1. t. 1. Pollich Pal. n. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Wahlenb. Fl. Suec. 1. Edit. 1. Fl. Carniol. Edit. 2. 1. Wulfen in Jacq. Coll. 1. Schrank Baier. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Willd. Spec. Plant. 1. Bd. 1. Abth. 1. Pers. Syn. 1. Bd. 1. Abth. 1. Poir. in Lam. Encycl. 3. Bd. 1. Abth. 1. Ehrh. Beitr. 1. Bd. 1. Abth. 1. Hoffm. Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. Edit. 1. Bd. 1. Abth. 1. Roth Tent. Fl. Germ. 1. Bd. 1. Abth. 1. Sprengel Syst. Veget. 1. Bd. 1. Abth. 1. Link Handb. 1. Bd. 1. Abth. 1. Schultes Oesterr. Fl. Edit. 2. 1. Bd. 1. Abth. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. Suppl. 1. Bd. 1. Abth. 1.

Iris vulgaris. Linn. Spec. Plant. 57. Flora Suecica. 1. Edit. 31. Fl. Dan. t. 1. Hall. Helv. n. 1. Schmidt Oesterr. Baum. 1. t. 1. Schkuhr Handb. 1. t. 1. Sturm Deutschl. Fl. 1. H. 1. Reichard Taschenb. 1. Jahrg. 1. Abth. 1. Reichenb. Fl. Germ. excurs. 1. Host Gram. austr. 1. t. 1. Pollich Pal. n. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Wahlenb. Fl. Suec. 1. Edit. 1. Fl. Carniol. Edit. 2. 1. Wulfen in Jacq. Coll. 1. Schrank Baier. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Willd. Spec. Plant. 1. Bd. 1. Abth. 1. Pers. Syn. 1. Bd. 1. Abth. 1. Poir. in Lam. Encycl. 3. Bd. 1. Abth. 1. Ehrh. Beitr. 1. Bd. 1. Abth. 1. Hoffm. Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. Edit. 1. Bd. 1. Abth. 1. Roth Tent. Fl. Germ. 1. Bd. 1. Abth. 1. Sprengel Syst. Veget. 1. Bd. 1. Abth. 1. Link Handb. 1. Bd. 1. Abth. 1. Schultes Oesterr. Fl. Edit. 2. 1. Bd. 1. Abth. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. Suppl. 1. Bd. 1. Abth. 1.

Iris vulgaris. Linn. Spec. Plant. 57. Flora Suecica. 1. Edit. 31. Fl. Dan. t. 1. Hall. Helv. n. 1. Schmidt Oesterr. Baum. 1. t. 1. Schkuhr Handb. 1. t. 1. Sturm Deutschl. Fl. 1. H. 1. Reichard Taschenb. 1. Jahrg. 1. Abth. 1. Reichenb. Fl. Germ. excurs. 1. Host Gram. austr. 1. t. 1. Pollich Pal. n. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Wahlenb. Fl. Suec. 1. Edit. 1. Fl. Carniol. Edit. 2. 1. Wulfen in Jacq. Coll. 1. Schrank Baier. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Willd. Spec. Plant. 1. Bd. 1. Abth. 1. Pers. Syn. 1. Bd. 1. Abth. 1. Poir. in Lam. Encycl. 3. Bd. 1. Abth. 1. Ehrh. Beitr. 1. Bd. 1. Abth. 1. Hoffm. Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. Edit. 1. Bd. 1. Abth. 1. Roth Tent. Fl. Germ. 1. Bd. 1. Abth. 1. Sprengel Syst. Veget. 1. Bd. 1. Abth. 1. Link Handb. 1. Bd. 1. Abth. 1. Schultes Oesterr. Fl. Edit. 2. 1. Bd. 1. Abth. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. Suppl. 1. Bd. 1. Abth. 1.

Iris vulgaris. Linn. Spec. Plant. 57. Flora Suecica. 1. Edit. 31. Fl. Dan. t. 1. Hall. Helv. n. 1. Schmidt Oesterr. Baum. 1. t. 1. Schkuhr Handb. 1. t. 1. Sturm Deutschl. Fl. 1. H. 1. Reichard Taschenb. 1. Jahrg. 1. Abth. 1. Reichenb. Fl. Germ. excurs. 1. Host Gram. austr. 1. t. 1. Pollich Pal. n. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Wahlenb. Fl. Suec. 1. Edit. 1. Fl. Carniol. Edit. 2. 1. Wulfen in Jacq. Coll. 1. Schrank Baier. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Willd. Spec. Plant. 1. Bd. 1. Abth. 1. Pers. Syn. 1. Bd. 1. Abth. 1. Poir. in Lam. Encycl. 3. Bd. 1. Abth. 1. Ehrh. Beitr. 1. Bd. 1. Abth. 1. Hoffm. Deutschl. Fl. 1. Bd. 1. Abth. 1. Bluff et Fingerh. Comp. Fl. Germ. 1. Edit. 1. Bd. 1. Abth. 1. Roth Tent. Fl. Germ. 1. Bd. 1. Abth. 1. Sprengel Syst. Veget. 1. Bd. 1. Abth. 1. Link Handb. 1. Bd. 1. Abth. 1. Schultes Oesterr. Fl. Edit. 2. 1. Bd. 1. Abth. 1. Mert. et Koch Deutschl. Fl. Suppl. 1. Bd. 1. Abth. 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lworis geniculi Spatha major CBE 12.

— — — ô Spatha CBE 12.

palustris humilis erecta & repens Tourn.

Gramen nemorosum calyculis geniculis repens et erectum CBE 7.

folio articulato floribus umbellatis ex articulis Tournef. Inst. p. 497.

Gramen juncei folio articulato Vaill.

C. Articulis CB Prod. 12

— — — — — Tournef. Inst 247.

Gramen juncei folio articulato Vaillant CBE 5.

~~Gramen nodosum Vaill. Botryo Cham. synon.~~

Gramineus

valg. fruticosa CBE. 488.

Vid. Caryophyllata.

Mach-Felder! sind baccas ebig flüssig & magst. ob die Einfalbig?

vid. Gyl. obitz & mas. vid. et Spec. Tournefi Lugdi Volat. p. 265 & Rejo Commun. Spec. d. Vellantini de Plantarum.

formae Vaillantii fl. Krain. et gramin. folio sect. fl. amento ovato ebig baccas simulgatig. Heucher fl. mens. petalis ignotis esse vult sed Lugdi & Vaillantii Vid. Boerhaav. fl. Hallens. p. 172 sq.

K

Kein flügelter, ad marg. capsula linsicht, quae vid. bipartita est, subinde bipartita non prossa.

Knaeel Rejo vid. Polygon.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

L

Lactuca
Sativa CBL 120.

— Lactuca rubra ÄB.
— Lactuca maculosa ÄB. P. 120.

Lact. capitata CBL 120.
Lact. capitata crispa brassicae folio Lob.

Lact. fol. obscure viridia femine nigro CBL.
Lact. Romana longa Lugdun. ÄB.

Lact. crispa CBL 120 Kopfsalat
Lact. crispa s capitata Lob.

Sylvestris
costa spinosa CBL 120.
Lact. Sylv. s. Cardua multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso ÄB. 2. 1003.

Lasarum Segetum Rivini viol. Silentij.
Lactuca
parpurea foetida fol. subrotunde s. Galeopsis Ruso. CBL 130.
Galeopsis viscosa fol. et fl. minore ÄB. 3. 320.
Taubnessel
[illegible]

non foetens foliis oblongis. CBL 201.
[illegible]
Album non foetens fol oblong. CBL 201. Galeopsis Rivini.

foliis caulem ambientibus CBP 231.
Galeopsis fol. caulem ambientibus Rivini.

foliis caulem ambientibus minus CBP 231.

Melissa alba tinctoria CBP 231.
Melissa Anonymi Lusitani Gul. Wedel Amoenit. Nat. Med. p. 172 n. 2. Ex quo Gesnerus Epist. 2. ad Dn. Camerarium 5. Febr. 1734. Aprilis 13. in hortum pervenit, et postea in Germaniam.
foliis oblongis luteum CBP 231.
Galeopsis Urticæ minor fl. luteo J. B. t. 3. p. 825.
Lamium fl. luteo Rivini.
foliis ejus rugosis, luteis, albo maculatis notatum.
maculatum CBP 231.
Galeopsis Tab. 904.
Caule ad Lunæ Nostr.

nigrum sylvaticum fœtidum CBP 231.
Urtica lucida Lugdun. et Tabernæm. Icon. 536.
Stachys sylv. Rivini
Galeopsis procerior, fœtida, spicata
Tourn. inst. 185.
Wald-Nessel-Trey.
Lamium
dumosum Sambuci affine CBP 224.
Sambuci XII sylvatici J. Tab. 500
Lamium Dod. Pempt. 675
flos purpureus ex nigricante flavescens.

sylvaticum Sambuci affine CBP 225.
Sambuci IXE. Sylvatici II Tab. 501.
Lamium sylvaticum.

Lepithum

folio acuto crispo CBL 115.

Lep. acuto crispum. III Tab. 824.

grand. unif. fl Majo.

folio acuto plano, flore aureo. CBL 115.

Lepathr. anthoxanthon J B. Tr. 987.
auff. dem Mayenberg. fl. gelbe.

hortense s. spinacia semine spinoso CB 114.

folio subrotundo CBL 115.

Lep. folio minus acuto CBL 115.

Lep. vulg. fl. obtuso J B. Tr. 984.

minimum CBL 115

Lep. acutum minimum J B. Tr. p 985.

sylvestre nigrum vulgare J B

Hippolapathum sylvestre I. Tab. icon 426.

aquaticum folio cubitali CBL 116.

Lepathr. palustre V. Tab

fehlen a. Jul.

Hastatum folio triangulo CB 116.

Chenopodium fol. triangulo Tournef

Bonus Henricus officinarum. quibus mala Henrici
ist Spinatia. Vel a alia planta nomen
Helvetia, cujus gefallen manicht. Vid. Jacobi
Botanologia fol bonus Henricus. Vid. Hayne
Lexic. Med. fol hit Bonus Henricus.

S. Hedera Christi
antiquum Plinii
Lepathum magnum
palustre magnum

de gemeldte Alleal mede van Copie Fabri
St. Rapp Tl Jaersi p. 46.

1. Cop. Ther Lubeck Collect. fol obligo verwt
Obligatie à Wilh. Kalpen Knyght Koke Tr vs
Gerrits p. 254. Hamker Kort wolth C:/
Rapp Tl Jaersi.

Cop. of Schuldbrief à Statt v. Lubeck
St. Valeriy munita et brun Heavy state optima fl. pecta

hanc speciem Heidelbergi 1732 steyl-fine ex-fl. albo. in den Glasgrube b. dem Eigenthümer Hergarten. wo gute Stücke sind.

Mynheer Sonata Riviari.

[illegible] circa 6 5 Zoll auf 5 Zoll breit. prima facie an Gestalt wie 3 Stück Seife von 2 gros Büs an a Grube, it. wie 3 Lichtschnuppen, Lichtscheere was fest, steht fest oben wie die andere Büs [illegible] ist an 2 Grube für. [illegible] Mit einem Stück von Königsberg Büs a den Grube für [illegible] 1833 Frankfurter Fastnacht Freitag. Vive Mynheer.

M. Hr. v. Hagen.

Leppa Bardana.
major Antrum Driopor. CNL 198.
Lepp. maj. 1. Feb. 1157.
Hyoncta S. Leppa major aut Bardana PB
T. 3. p. 570.
Gen. Klotz. Julii. ebenso wie Lepp.

major montana capitata tomentosa sectoria
Driopod. CNL 198.

bei Kindorf Juli

minor Xanthii Driopod. CNL 198.
Leppa minor 11. Feb. 1157.
Xanthium S. Leppa minor PB.

Clamor Klotz Cattlord-Lauf

bei Kindorf et auf? Leppi-feld, wo
man auch die bunte Distel gesetzt, eigent.
in wie Del, wie wie wie v. Hellen Hof.

Lathyrus
Hylaeus major CNL 344.
Lathyrus Hyl. Fed. Lempt. 1810.

Hyl. luteus Hylii Vicia CNL 344. Vicia Lab.
Lathyrus pratensis Linn.

anverspi repens tubenos CBL 344.
Chamaedaphne Tab. 691.
Lithymalus anverspi Rivini.
vid. fl. Jacens. Dodd. Rosa [illegible]
flem wspe dicit.

N purpurea
Lithymalus angustifol. folij. hirsuta CBL 344.

[illegible] aus dicken bis 3 Stollen - Wurzel
it. [illegible] Julio. Junio. [illegible]

Laureola
foliis deciduis fl purpureo CBL 462.
Daphnoides fl-purpureo Tab. 1492.
Thymelaea laurifolio deciduo f. Laureolae femina
Tournef. 595.
[illegible]

Laureola flore albo fl. rubr. maj. et min. ut et fl. odor gratissimus C. Bauh. Sapor.

Calceus - Ducatii waterbergicus St. Jacobi - Schuh capitell - Juvenil. St. - 3 Fuß 8 Zoll Rhf.

Laureola
folio deciduo fl purpureo CBL 462.
Daphnoides fl-purpureo Tab. 1492.
Thymelaea laurifolio deciduo f. Laureolae femina
Tournef. 595.
[illegible]

Lavendula
angustif. CBL 246.

Lavendel
Jun. & Julio
[illegible]

Lens
vulgaris femine fabuste. CBL 346.
Lens minor Dodon. Pempt. 526.
Lens J.B. 2, 217.
Linsen.

major CBL 346.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



1770. [illegible]

Centuriae palustris latifolia foliis punctatis CBP.
vel Selinum Micheli cognosci in veris hor.
Gorlitzensibus ann. Rhenan. ad. 1739 mens. Maio Haller Hist.
Gotting.

vocat Ri in Curtis legitur Monnotiges. Tiel la
velgo quia Lapsum habet raphum rupicam
Lonicero simile sed flore CBP.

Ct Joh. et Casp. Bauhin nuncupabi Selernit vel antea ausgeholt v. Wasserwol-
bendiane = Jungfer Cabbagetree, Rot = Silber ausgeholt wird gemacht v. in die
Pflegeln Essen. v. vor. Lonicer Selb. Lieut Bauhin by. flore carent vernixt
w Haar Antan L = hirta. Cyparissias montanus, Remarq. pli remarkti
note = Selb, dentaria, Casp. Matthioli & alii. Selbosa
1750. 8 Januarij v. Febr. plantis Cel. Linn. ist Ihnen pi Linnaeus by. floreali,
Jahr da eine Febr. Wo die Pflanz am Schmerz ist, in Rosacardi
v. Petro Martyr, tellici, Jos fibrosa et tuberosa squamosa ferunt
so Lorem Zorgfältig subide magis.
Cl Cochlear Ft.
an Lichtem Finder
v. nulst, by 2
Blumen auf einem
Stiele wachsen.

(oo) Gegenteil Carl dort Linn
ab Linn, per se sena
rie, umbosa pentalat
Chamaerion negrifl.
thom parvo, et alter
herbar umbosa bona
amantes. semina
vicinalem aer, tacile
= loco disposito to
germinabit, vacuata,
mont disposita, terra va.
Wasserfalle
copiose loc = loco &c.
cubebat foli plan
= exposito Lobi an
cradulationi.
Jo vere et Ebr. papen à
domicilio gemeinschaft, pro
v. Hattorf v. Jen ist
wild. (oo)

Grabow Planta bringt D Länder, Linster aber à wächst a S
A, die Küste Ufer v. metrix wird in ruhi A et alter
terra hor. fert plantas, aliter disposita, herbae ipsae
A mutuata. A seria in ruhissima alia, = terra
H mutata. A seria in ruhissima alia, = terra
disposita facile &c. consociates germinant.

Mantissa Micheli pag 2. No. 2.
Lichen pedunculi Bellad CBP. 362. wächst in mir am Berg
1749 Julio in Schl. Thorn in Cornbett gen Bäuerl Hasmatt,
Ober Jenbach Ober Jenbach v. wasserfall, an dem abfluss der
wasserfalle Bäuerl, loco umbroso et pluvio, Hortus, auf Son
Marschal de Bellefile 1741. Jen Juni Vogel Lichen pedunculi. Vorse
des Marschall v. Bellefile v. Ort offen v. Un Bäume
Glück steht gerade, Ch Jenbach Schl. Selb Jenbach Jenbach,
Strohhut gegen Abend v. Bäumen fest an Schl. Jenbach,
Jenbach Bäume.

Lenticula
palustris vulg. CBE 362.
Lenticula palustris Tab.
Lens palustris J.B.
Water-linse. Meer-linse.

Equatica trifolia. CBE. 362.
Hedenla palustris Tab. 2181.
Kenwards Hedeney Petiv. Lank.
Water Clover.

Lepidium
latifolium CBE 94.
Id Dodt hic Gandavi sponte nascens cum angustif.
vid Rupp. Flor. Jen.
angustifolium vid. id Rupp. l.c.

Leucoium
bulbosum vulgare CBE 15.
Leucoium bulbosum 1. Tab. 1005.
Narcisso-Leucoium vulg. Tournef.
Leuconarcissolyrion Lob.
Gemmig Blüma 1. mit 6 Blettern. Lexophyll.
an gelben Haar wie Haar, et. an 3 Haar Haar
Lilien Haar an der Wurz, wie Wurz gegen den Erdgrund
petreum latifolium f. Hepatica fontana CBE 362.
Hepatica 1. Tab. 1200.
Braun-Leberkraut.
Leberblümen in einer niedrigen Höhe, einige volle
Leberblümen = Knolle oft mehr als 30 Knollen.
Häuser Knolle zum Grund, die Knolle wie
petreum umbellatum CBE 362.
den offenbaren Weg in Rivulo
Augusto

Lexophyllon. Gemmig Blüma mit 6 Blettern, die Haar haben, wie Haar an gelben Haar wie Haar, et. an 3 Haar Haar die Wurz, wie Wurz gegen den Erdgrund

Hyeme lei pè mi h. Martii et Maii ejus floret, an Rosenfarb wird Chrisanthemum. Wo 3 Nordwesten Blest d. Knolle Knolle Knolle Knolle. 1726 et 37 leucoium pè Martium. o Knolle flenbet et ocyor

museosus. Tab.
Mus ganze Jahr, sind meyst weiter weiß
v. Knollig so wenig Knolle v. offenbar.
Apit in Moos.
petreus stellatus CBE 362. Michel. Nov.
Plant. Gen. Marchantia capitulo stellato
vid Tercibus. Tab. 1. n. 2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lilium pomponium - cuneus maj. Cpt. 11 Junio 1735. Gal. Trajecti
Lilium pomponium - cauda hasta longa, vix 1736 altior, prope Roll
mit 1 Blüher = caule hasta longa, vix 1736 altior, prope Roll
gefüllt, nulla arte, nisi pene Kirchheim. vid.
Maii die 30 et sequ. in hortis Leidensibus et deorsum
hoc anno [illegible] tres segmenta [illegible]
[illegible] Hort. Leidensis
[illegible] Leidensis
[illegible] Leidensis
[illegible]

Linum
sativum CBL 274
Linum Tab.
flachs-Lein. fl. Jun.

pretense flosculis cæruleis CBL n 274.
Lin. catharticum Fl. fer. p. 367
Alsine verna glabra flosculis albis L. potius
Linu minimum JB. 2. 455
A. Maj. Jun. [illegible] 1733 wächst in Mayland und Italien
Lithospermum
minus, repens, latifolium CBL 258.
Lithosp. repens magno Cluf. Pannon.
[illegible]
Matth. [illegible]
ist ein Gebürg-Kraut und wächst in vielen Orten in Tyrol

Michael Soler Tabis
in monte Arabis Soler
alii Arabis foliis Col.
ligen vid. Stirp. ann.
Clement. fl. p 426

majus erectum CBL 258.

Major Germ.
[illegible] Fl. Franco.
[illegible]
[illegible]
anguse. rubra CBL 258.

Echioides fl. albo Rivini
Buglossus anguse. annuum Lithosp. minus
Tournef. 134.

Gesnerus Major Germ. à semine rubro nigro quo
pulcherrime fl. quotannis, quem penes
Lonicerus
Lonicerus Valerianæ.
minor CBL 359.
Lonicerus altera Germina II Tab. 1190.
Spicant Trago
Lonicerus altera Icon. Lobelii 413.

Officinarum varietas ad Prod. Mutz-Lonic.
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1733 fol. 117. 24 in Mayland
Lotus
Lotus officinalis vulneraria pratensis CBL 330.
Lotus Germ. fl. latea III Tab. 909.
Valeriana rustica Tournef. 791 et
Q B. n 362.
Anthyllis Rivini.
Gelber Hasen-Klee fl. Major.

Loti

Lotus corniculatus odora C B L 331.

Melilotus fl carul. Rivini

auct S Landsorff

S. Melilotus pentaphyllos minor glabra C B L 992

pentaphyllos fl major luteo splendente

C B L 332 cum adulta glabra minor fl B. 2. 356.

Descriptum Linn.

Harlotus magna fit Lotus
umbrosis in Lud. ut
ago ait. 1709. stagl. mich
Lunta Oberst Lotte Lotte
— de vers. — der Lud.
wasser wo. — Lotus St. St.
Lotus gad. in Lotus Libania
Lotus Oberst ad
Lotus Lotus mon Lugg fl.
Lotus p. 216.

Lunaria

Lunaria agri nos vocat
Mon. tuit mey Lunty.
Mij: fre der nemi-
mother punt, & luter
fufij coed ut ea
ej scolet pelvis
luteg ubi semen ges-
rodi. Lopes plante
examfuit & f it,
sh ut Mij: & Jonis
sunt cursus ralgreab.

Clypeat

Cum ea naturitatem
venit planta sunt
f nudis Lpeus: calathis
grandium, et clabris
pelvis ea albo luteoly
ut stigmata ftos con-
stat semimus.

Nec proprietates plantis:
sed alles est in Deum.
Unus in tuus continet
plenus y globatus, qui ves
mota ufiate et luter ca-
ffule, simplit, & en
ata effundit, pofe
degit tota planta.

Lunaria

nemorosa minor l-valgaris C B L 354.

Lunaria botryites f B. 2. 709.

ofmunda foliis lunatis, Tournef. 547.
in valle fut Nordorf
ad Lindberg ad Lus Lberg de Nemi Lein.
Vale ung Lg Liegberg wrisst. allen ubi f Mus
plenty.

Lupulus

Salictaris Lactis. Lupulus mas C B L 298.

Lupulus Squama epis, quia in Lonchion ufcula
mutuant Tour.

Hinc Squama stabit flonis
flourdentis.

farmica C B L 298

Lupulus fit hyemus ut pinus mas Lub Lores, qui
Lan Lutenus mutus fructus cor experientia vi
f Lycopodii. videt maxime formandi. Vid. de exa
plant. vocem Cannabis.

Luteola herba Salicis folio C B L 100

Catananche I. Tab.

Lutea Clusii gfrutex. f B. 2. 465.

Ptarmica Lonit 219.

Lychnis

Sylvestris alba simplex. C B 204.

Oemantis f. Oenanthe 4 I Tab.

Lychnis Sylv. alba simplex l. Segetum Lutea
C Bauh cum Lupleu f 59.

Lotes letzgenandten, wirt sich Doch ergeben, wie weit sie denen
gleich in Eisharty auf Linien, fünfe gehen, und die
Pausen dessen gebraucht, sonst vulgo Guitarre Pfeyl, v. sig
sie delicat schön. [illegible] colons: /

vel a Pfeyffelstab.

Canonica recensio ist viel zu weitl. Etwas zu
gross - schmahl.

Lunaria et Sphera Caballi [illegible] Germanica
Cyth. allegorice in usu est, quibus [illegible] entiby
habentur. |: etsy lunae signatura crassiora ab in
petit, deren Cambos dicunt Lunaria habere :|
Lunae [illegible] H. Kirchberg in Franch: gebürtig, seine [illegible]
der Sphera selbsten auf dem Instrument [illegible]
steht, da sie [illegible] in declarat unda bemerkt: [illegible]
der Pfeyffe: [illegible]
1732 Mai. [illegible] [illegible] [illegible]
regum insueta lunaria [illegible]
Bon. müsse von der [illegible]
Pfeyffe seine auf Blasen finden; [illegible]
offenbar gnug zu ihre, [illegible]
ist [illegible] [illegible]
zeitige mangel; [illegible]
will wissen, [illegible]
[illegible] Rest [illegible]
[illegible]

wer aber Adrian,
wie [illegible] [illegible]
[illegible] gelehrt - wer aus
[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
Pfeyffenberg [illegible]
berg.

Lubolen [illegible] Cassia [illegible] allen von [illegible]
gelb, [illegible] blau [illegible] grün - vid. Zeuschner Lexicon.
p. 450. v Kolo Fr. Hyacinth p. 118.

Cydonij Hist. Lutes Spies Ridinarte [illegible] maximo Nat. Mus.
Flos pantipetal. regularis, corpulentiplex [illegible] multa.
Hymnus alter Sect. [illegible] tertii Pl. plenus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sylvestris S. Fabiis, purpurea, simplex CBL nov.
Seimsheim rubra II Tab. 679.
Rothsee wieder stets.

Segetum major CBL nov.
Lychnis arvens. v. Tab. 674.
Baden. rigidissimum Bodamer.

Segetum rubra foliis ± foliatis CB nov.
Vaccaria Bodens.
Lychnis segetum vaccaria. docta Mors. H. r

Sylvestris quae Been alba vulgo CBL nov.
Muscipula pratensis, vesicaria Fl. Jen. p 112.
pepo vesicaria.

montana, viscosa, alba, latifolia CBL nov.
Muscipula montana hirsuta Fl Jen. p 112.

flos regul. pentapet. caps. 1 locul. 10 valv. S. Muscipula est.

Sylvestris, viscosa rubra, angustif. CBL nov.
vesicaria Lobel. Pal. Ger.
Jul. 8. Heu! Land-Rose CBL Kleine Sorte.
it. in Wald. Calcar. Cleve. Cologne. Mosel. Rhine.
Caulis est viscidus, dipsadeus, folia plana sparsa. Arima
schon, calyces ovati flores.

vesicaria Lobel. quae est flos regul. pentap. caps. 5 locul. 10 valv.

muscosa seu muscipula CBL nov.
Lobel ic spetul. fendit bicornis flos semper multi. flor.
Ohrter Tab.
Muscipula muscosa flore S. Oegmonder bellidiformi J B.

Ch. seu muscipula (q plenis. v. semiplenis minore flore)
bleibt 3 ganze Tage nach dem Verblühen.

Sylvestris (Ohrter) angustifolia calycibus ovatis Asiatis
CBL nov.
Muscipula flamea.

auch auf alten Ohrter, an Ebereschen
Stock bey Wald.
Jamin.

nostiflora CBS L 1092
[illegible] alpina & hirsuta fl. rubello, gemb. alet. vespa.

auct. J. Bauhin. flore luteo Pseudo-Narcissi. auct.
ad vesperum diem 3 altum. A. 1734. Jul.
[illegible] Julii = 3 [illegible] 5 Rabenh. &c.
Julii & Augusto.

Lychnis muscosa minima Morison. vid. Bauhin. minor muscosa
alpina CBP.

lutea major: gramineo Pseudo-narcissi CBL 245.
Cumulens erata Lobelii

Cyclus binis, ternis et quaternis ex adverso
respondentibus?

passim ad rivulos.

Galbeo Rhei Lobelii.
auct. Matthiolo [illegible] Gesnero &c.

Spicata, purpurea forte Clusii CBL 246.
Salicaria vulgaris, purpurea foliis oblongis
Tournef. inst. 253.
brunus Rhei Lobelii.

Siliquosa hirsuta magno flore CBP. 245.
Chamaenerion pelustre hirsutum magno flore
Pl. J. p 97

——— ——— parvo flore CBP 245.
Chamaenerion pelustre hirsutum parvo flore
Pl. Jen. 97.

——— glabra major CBP 245.
Chamaenerion glabrum latifol. majus.
Pl. Jen. p 97

Lychnis pericarpium tetrapetali reflexi regulare aperitur per 5 foramina oblonga ad basin 5 petalorum sita. Calyx tubulosus 5 dentatus et 5 costatus. Capsula 5 locularis 5 valvis membranaceis seminibus multis. (An forte Cassia?)
Lychnis.

Ad Julii an Lonicerus Lustig d. 21 Julii accepit.

flos communis purpureus, sed nonnulli albi, nonnulli varii color in pomo in ad 1732 Jul d. 17 ex via von Rüsselsheim Lustfeld flavi. planta 4 pedes alta vel in silva. Ad. 4 carnea Lonicera Lust v. Mayenfels pumila. minor.

Stigeosa glabra minor CBL. 245.
Chenopodium glabrum latifolium minus Fl. fen. 37.

Chenopodium dictum latifolium CBL 245.

Chenopodium altissimum Lobatum Rj. 36.
Epilobus latifolius glabrum [illegible] Hist. 1. 631.
bey d nandy Crisp. grosse Dand-Steig
Jul. et Aug
et in Nidwalden viel bey Buochs
Ex Cortice balsamo spirosa cum Ol. planta Lac.
cornuta galericulata f. gracilis cornuta
CBL 246.
Cassida palustris vulgatior fl. carnea
Tournef. 158.
Scutellaria Rivini.
Portulaca. fl. Jul auf d Mauergräben d SS

Lutea comiculata CBL 245.

Onagra Tourn. et Rivini. fl. Jun. et Jul. die Nebenäste auf = Stiel. v.
hey d. Zigelhütte, ist an vielen Orten häufig. Lobet
flore ob pulmonis spasticos exhibitum mirum petalo-
in glaucio divisis. fumosis pichoque quadrifolio
quatuor his explicat. distinctus sunt interstitiis longis
in ejusdem semina compressa, in Gra. maturo
ejusdem stria. [illegible] d A d Cruciferen
Familie stellt A. [illegible] d Valeriana Linné auf
die dritte Zeitig, nennt = Stir vi Flor Linnæ.

Majorana
vulgaris CBL 244.

Mala
sylvestria, quæ et alba et rubra, mayricet
minora CBL. 439. mit dünnen v. langen
Stielen.

Die d gemeinen Wildgen über d Felder Gesträuch.

Malva
crispa Label. fl albo purpur.
Blumt d dunkel fl. bey d Wohnungen.

rosea
Blumt d dunkel fl. bey d Wohnungen
Stock rosa, Mauer-rosen ex pur-
purea pulcherr. bey Buochs ex pur-
pureo deluto est. Quelle die Farben

Marrubium
album vulgare CBL 230.
Marrubium album JB. I. 2. 316.
Ger. Prodr. et Dillen. H. Gis.
Matth. Pand.
nigrum foetidum Ballote Dioscor. CBB. 230.
Marrubiastrum V. Tab. gal.
Ballote Matth.
Rivini
Tournefort. 185.
Schwartz Pand.

Hb. Marburg. vegi. fl. albo. A. rubellor. 1732 Aug.

Flor. ultr. - est mihi, nonnunquam albi. Blüht 8 Tage v. Gabel. Dürfte 5. Tage spätter kommen 1729. Gibt durch Frost [illegible]

palustre glabrum CBL. 230.
Lycopus palustris glaber Tourn. inst. 191.

palustre hirsutum CBL 230.
Lycopus palustris villosus Tourn. Inst. 191.

Cardiaca dictum, forte primum Theophrasti
CBL 230.
Cardiaca Tab.
Herba Justiana.

Marrubium vid. Linné sp.
Matricaria
vulgaris CBL 133.
Matricaria vulgo, mihi Parthenium JB. 2. 129.
Mutterkraut. Wächst [illegible]
Rosmio. [illegible]

Meyer

auf d. Feldheimer Feld.

Medica
echinata minima ♃B T. II p 386.
Intolius echinata anverse CBL 129.
conllata, echinata minima Rivin.
Oschsbz Lbra.
bey grünschein auff mein Acker. Hand.

hispida reper folio cordato latiori
auff 3 Meilen gr. bey an 3 grossen Gerb
gegen 3 wanen Gerten Hensel über.

Melampyrum
purpurea crista coma CBL 234.
Melampyrum multis spicis coronatum ♃B. T3. p 493.
Kuh-weitzen. Kuhkal-weitzen. in gyr.

latifolium CBL 234.
Melampyrum sylvat. I et II Tab.
Melampyrum montanum Rivini.
Wald-Hirsch. Kuh-weitzen. in Hess.

cornuta coma CBL 234.
Melampyrum sylvat. Rivini.

latifolium angustifolium CBL 234.
Melampyrum latifolium lineis foliis. CB. Prod.
Melampyrum cristatum Rivini et ♃B.
3. 440.

Melilotus

officinalis Germanica CBL 331.

Melilotus sylvestris fl. albo.

Lotus sylv. fl. albo I Tab.

Lotus sylv. II Tab.

Raii - Alsa.

bey 2 gut - Land - Heft in — Acker

Julio Junio.

etw cultiv. decrepity, ubi pauly sp., olet ut flavis.

x3 provenit majoribus & oblongis foliis fl. luteis

in agris Julio & Augusto.

bey Hundsh. im Feldgen.

Mentha

Mentha est triplex! 1) major 2) vertibillata 3) crispa.

Sylv. longior folio CBL 227.

Mentha hirsuta spicata foliis longiore

cuneiformi JB.

Raii - Münz

Sylv. rotundiore folio CBL 227.

Mentha hirsuta spicata foliis longiore cuneiformi JB. rotundior

Raii - Münz Spontaneus, fl. spicato

storea brevi JB. 3. 2 a. p. 219.

Raii - Münz.

rotundifolia palustris sequutica major CBL.

citrata vulgaris et major CBL 227.

Mentha felina I. Tel. 7yr.

Catarii major vulg. Tournef. 201.

Repeta Riv.

Citron - Kraut. Citron - Balsam.

Vid. & Calaminth.

Mercurialis
testiculata f. mar. Dioscor. & Clusii CBL 122.
Mercurialis mas Tab. 941.
bingal. Kraut Mannlein.

spicata f. femina Dioscor. CB L 122
Mercurialis fœmina Tab. 941.
bingelkr. Weibl

montana, testiculata CBL 122.
Mercurialis sylv. mas Tab. 942.
wild bingel. Kraut Männlein

montana spicata CBL 122.
Mercur. sylv. femina Tab. 942.

Mespilus
Germanica. folio Laurino non spinosa f.
Mespilus sylv. CBL 450.
Mespilus sylv. Dn. 1. 69.
Mespel.

Apii folio sylvestris non spinosa f. Sorbus
terminalis CBL 454.
Crataegus fol. laciniato Tourn. inst. 633.
Aronia.
Sorbus terminalis & Crataegi Theophrasti Dn.

Apii folio sylvestri spinosa f. Oxyacantha
CBL 454
Oxyacantha vulg. Pl. Jen. p. 103.
Oxyacantha vulg. J. Bauhini alby Dn. 1. 49.
Mespilus. Mespilus rotij Mespilus
fij-baum und Rosa tr. Ulysses p. 474.

Eichi wreck seine Eigenschaft, aber Stockfisch vires pernicia, von Hi ita audit, et Sp Strigen, et vesicularia planta, & hos emolliat. In obstipis stomachis effectus novi.

Milleum
Semine luteo & albo CBZ 26.
Millef. BB. T. 2. p. 446.

Millefolium

Millefolium hort. fe. groß. Millefolium
ca rigaly in nudo
vrig. in antiis.

vulgare album CBZ 140.
Millefolium Stratiotes pennatis temoribus
BB. T. 3. p. 196.

Distelß-Grobe.
nobile odoratum Vir. fol. Tanaceti semper
C. Bauhini.
vulgare purpureum mag. CBZ 140.

aquaticum f. Viola aquatica caule nudo
CBZ 141.
Nymphaea Rivini.
fl. Alg.

cf Ranunculi ca clava-
ctem Hd. Kapp
fl Jenens.

aquaticum foliis Absinthii, Ranunculi flore
et capitulo CBZ 141.
Ranunculi Vatrij capillacei CBZ 180.

vid. Dicho-
tophyllon ——— cornutum CBZ, Equiseti palustris paniculati cf.
in ostio f. Millefol. Thal. aquatilis f. aqua-
tilis Cat. Cant. Dichotophyllon. Dillen.
fl Gill. p. 147. = Morr. Hist. 3. a.
——— pennatis spicatis CBZ 141.
Potamogeton foliis pennatis Tourn.
instit. 253.
in blühen gilt, als wenn die Blätter
pfeilförmig wären.
——— fl. luteo ~~albo~~ galericulato Lob.
Millefolium Vatrium laciniatum CBZ 141.
Lentibularia, Gesneri & Rivini.
cf. fl. Mosquaborum.
——— foliis foeniculi Ranunculi flore
et capitulo CBZ 141.
Ranunculi Vatrij alby fluitans Tenerodani
foliis fl. L. Batav.
Ranunculus fluitans = Myg.

1738 Jul. agri ten. ad
vias in Hirtenwiese versus
Eschborn & Vilbel, Vorderstein, der
Hirschborn & alias = Equisetum palustre ad Vgm.
Chausseehaus = an beiden Seiten Graben.
Millefol. wie die Folgen.

cf Ranunculi ca rep.
clavatum.

1. Ranunc. Vatrij fol.
rotund. & capillaceis
vid. sub Ranunculo.

foliis hispidis et glabris.

Hepatica folliis s. stipulis obtusis Dodon. Park. valde similis est, Hepatica flore simplici magis diluto coerulea, Raiana hyeme virens magis obscure G.

fol. hispidis & glabris.

Mihi sit in capitulo de Hepatica

Nobis dicitur Ranunculus.
Nostri pelo vid. Cyclamen.

Gelen in seinem hyeme
stentill mit figuren fa-
git nuscorum, et
lichenum, hier o spu-
ria, figuren figuren
essentialis à Ju gela
cognalante ut pol
est a nostrum, ka a
ille corp dat. Nusq
gelu quoque emsit
et adeo et
calent fidei
emsit hyemi.

Sc Nussij vide Dillen. A. Vaillant in Hist flora Parisiis quo 5 multis fig. variis praedit in Botanico in fol.

Jo Petri Andreæ Micheli 1729 edita novis plantarum generib. fol. simul cum Klein. sp. flora muscorum et fungorum genera bastarda v. ge. bat. fol, v. vid. v. an 2 floris glumacei ipsis Hen. Linn. - Linn. Gl. Jort. 1736. p. i.

—— flosculis ad foliorum nodos CBL 141.
Cotamogeton flosculis ad folior. nodos Tour.
299.
hic Cochinchinæ in aquis tranquil. copiose,
Augustis.
copiose ad Magin, in der N: Isla. ~~Isla~~
~~Isla~~.
nobis vix. tenuis.

Molluga
montana latifolia ramosa CBL 294.
Gallium album latifol. ~~perfoliatum~~ FJ 3.
~~Gallium album~~ ~~Rubia~~.
Asperula odorata tinctor.
Rubia sylvatica tenuis 93.

montana angustifolia C. Gallium album la-
tifolium CBL 294.
Gallium album latifolium perfoliat. FJ 3.
Gallium album valgare Tour. 115.

Moly vid. Allium sylvestre tenuifolium ~~Cepa~~ Cepa
Moly.
umbelliferus pratensis GB. 2. 564. Ray. Fl. Jenæ
vocat Moly montanum folio rotundo, Allium mon-
tanum fol. teretibus rotundis. p. 138. floret Jul. in
pratorum ~~Cepa~~ Cepa Jenæ cum duabus sequentibus a me
Julio. J: Br. 1726 repert. Ray. sp: 3 Mill. ~~Cepa~~ 2 Bl. Cepa
~~Cepa~~ Cepa
Allium
vulgatissimum CBL 76a.
~~Cepa~~ Cepa
genuinum Moris.

A. Vr. copiose
repert. 8 Julii Cepa
ad Cepa an der
Jenischen Berg.
1734 Julii
A. 1736. Julii
in Cepa
wild an den
Berg der Stange.
~~Cepa~~ Cepa
Berg
Cepa
Berg.

vulgatius pennatum major CBL 76a.

folium major CBL 76a.

polytrichoides CBL 76b.
Juli b. H. in d. Land-wasser bey d. Jagdschloß.

pyxidatum Dillen. CBL 76b.
Lichen pyxidatus major foetidus.
J: Musci pyxidati species CBL 76b. J

as. pyxidata Fresenii proles

multiformiter pyxidata, apicibus coccineis
D. Hof. Hist. Stafford. 199. Tab 14. fig. 1.
Lichenoides tubulosum, pyxidatum, tubercu-
culis amoene coccineis Fig. 3 nos.

hic explicite nigit. Fresenii, conoideo, erecto, incano. CBL 364.

hic monte tect. Conoideo f. cornuto, montano, CBL 367.
Muscus conoideus f. corallina montana Tab.
duplex I altera duplex II Plumier.

+ adiecti aurei capitati

An D. Lichtwitz bonum nostrum Hyperi-
cum vulgatum
Hagens.

Conoideo.
Muscus Spanish palestris vendi caput modo-
pinky Tournef.
Muscus pulmonis Dodon vi. Lempt. 492
huic vel sibi invicem.

(erecto ramoso setante viridi CBL 366.)

arboreo: Usnea officinarum CBL 367.

arboreo cum Orbiculis, CBL 367.

—— repitalij cevit CBL 367.

—— conbridet CBL 367.

pulmonarig CBL 367.
Licken arborg s. pulmonarij arboreo
JB. 3. 759.
Lichen arboreus, pelltat arborescens, maximum, platyphyllon. H. Gff. p 108.

crustw modo arboribg adnascens (colore flavescente) CBL 367.
Licheri crustacey arborei passim stipes
sepium, tigulamine H. ff p 347
Licken crustw modo arboribg adnascens, flavo
Rzk. Hft. 116 in alsatiæ montibus. colore cinereo
CBL 367.
Licken crustacey, cinereg arborei sepium
et tegulare H. sax. p. 347.

terrestris clavatus CBL 360.
Lycopodium Lob.
Muscus Frostir repens, pedicalis foliaceis, binis clavis in alter je cõgenitis Kluk. T. 4 Tab. 8.
Br. repit in einer Klamm und wird bey der Frantzen Kap. in die wüste die wurtz der Selago ist dünn und sehr ästig mit vielen feinen haaren und sehr schlechten Blätgen besetzt
aquatig. foliis expansis CB. Pin. 154.
Fontalis minor lucens JB. 3. 3. 778.
Clus. 560.
Selago aquatica foliis pellucidis triangularibg acutis, et complicatis circa
F. Gff. p. 690.

vocat — saxonia
Lichen fungo et cortici adnatus Linn.

N. repit CBr. auf der Frantzen Kap. in einer Klamm und wird bey der Frantzen Kap. in die wüste. Die wurtz der Selago ist dünn und sehr ästig mit vielen feinen haaren und sehr schlechten Blätgen besetzt
N. repit CBr. auf der Frantzen Kap. in einer Klamm und wird bey der Frantzen Kap. in die wüste. Die wurtz der Selago ist dünn und sehr ästig mit vielen feinen haaren und sehr schlechten Blätgen besetzt
Dieses Exemplar ist etwas grösser als die Exemplare die ich in Europa gesehen habe

pelustre, foliis fabrorum ij Tournef.
Muscus polytrichoides humilior alterius
foliis pellucidis Mori.
in umbrosis siccis vallis Bois de
Bois-Rouge, Bois de Landroyes
Bois de Bellefontaine

cornicularia terrestris

capillaceus

Muscus de Loges Bois de Bois de Bois

terrestris è viridi pellucens, denso nascens,
foliis reflexis Pl. Gen. p. 342.
Lucis Sabaudiæ in Bois Bois. Bois. in
ostenbacher Wald.

f. foliis Lichen Alpinus foliis Evernii.
pulmonaria Pastoris Hercynia Jacob. Breyn. in
Ephemer. Germ. Dec. 1. An. III. Obs. 209.
c. figura p. 429.

Bois Bois Lichen Bois est, ut etiam mihi
mirum videtur pluribus displicuit, ita est
notissimus, quod exemplo clarum fieri potest
in Bois-Bois.

f. foliis cæspitosi Lichen Bois. Evernii foliis
Pulmonariæ Plant. minus vegetis. Cauter.
l. in pallore, Petiveri Dict. /

vid. Dillen in Hist. Muscor.
p. 209. Lichenoides viride
Evernii foliis rotundis
Raji Syn. Pl. Brit. III. p. 77. n.
90.

Hallenser Zeitungen 1777. Stück nächst. se = Abgiß hier
ist in vers. Helvetien.

[illegible]

[Myrtus] obovata Rivin. vid. Lycopetii Icon in Litera L.

Myrtus obovata vulgaris ejusdem Rivin. = 3 vidi in Hortulano Hispanico Lycopetii Mastigia. Vide Icon. Rivin. Tab. 174. Fig. 2. Est exemplar. Cal. forte dual. circumscissile. Petala 5 obovata. Stamina numerosa. Germen inferum. Stylus 1. Stigma simplex. Pericarpium Bacca ovata, 1 locularis, polysperma. Semina reniformia. Testa punctata. Embryo curvus. Cotyledones planae. Radicula supera. Habitat in Lusitania. Floret Junio. Fructus maturescit Octobri

Myagrum
Sativum CBL 109.
Myagrum I. Fab. 125 a.
Myagrum Segetum foliis auriculatis acutis
fl. et semine majore. F. f. p. 79.

Lin. dictor. nescio inter lineas.

Myagrum
Sinuata foliis rotunda CBL 109.
Myagrum Sylvestre CBL 109.
Lavanchia II Fab.
Spatula & culbura provenit.
Lin. dictor. fl. Majo in anni. mens. 3
Myagrum Kl. 9.

Myagrum siliqua longa CBL 109.
Myagrum II Tabern.
Tetradynamia Siliculosa foliis Tournef. Inst.
p. 224.
an Myagrum vulgo Leindotter?

Julius
Post zu verkauft ist.

Myosotis wird Ech. 5 serius 154.

Myosotis
Sylvestris seminibus asperis CBL 160
Cerealis Chrysophylli fol. Rivini
ist wilder Bein. [illegible]

Syst. seminibus levibus CBL 160
Chrysophyllum Sylvestre Tenuifolium Asperum foliis
Tournef. 214.
Cerefolium Sylvestre Rivini.
Lilium conv. in silv. prati.

Myosotis wird Vitis idaea.

X

Xapur

Latria CBL 95.

Xapus Clusii Hist. rar. & Exotic. p. 172.

Kleb-Dorf
[illegible]

Xeja Jo Adrond in Jo Gärtn.

Xeftertium
pratense majus flore CBL 104
Cardamine pratensis major flore purpurascente & albo Tournef. inst. rei.

Gemeine Blumen. Kirsch Leipz.
Flore albo & purpurascente varieg.

equestre sylvaticum CBL 104.
Lysimachia Matth. p. 487.
Brunn. Lexic.

——— majus & amenum CBL 104.
Cardamine sive majore altera Tournef. Inst. rei 4.
Gelbe Brun. Lexic.

——— arcuatum folio longiore CBL 104
[illegible]

Cochleare vulgatius CBL 103
Xeftertium vulgare J. B. in. 912.
Garten Lexic.

Syls. Asyndis foliis CBL 105.
Illaspi minus Germanicum XVI Tab. 853.
Cruciata
Cras. Syls. Asyndis fol. capsuli minimi Monsp.
Kestert-syls. JB.
Asperula arvensis foliis CBL p 97
Lepidium graminei foliis J. Rhenis Jonesc 216.
Alsine herbam Chaut.

Petroum foliis Bursae pastoris CBL 106
Bursa pastoris minor foliis incisis CBL 106.
Alliaria vulgaris, minimum, foliis
glabris, fissis T.t. 209.

Sylvestris tenuissima Diversis CB. 105.
Aconitum Lycoctonum
Sophia Chirurg.
Sophia Chirurgorum foliis Cruca.
Nasturtium vulgare siliquis aboriis fructu CB. P.
Lycoctonum
majus, latifolium CBL 169.
Lycoctonum majus J. Rhenanum majus JB. v. Bauh
graminum Tabaci.

minor CBL 170.
Erysimum glabrum. Lycoctonum minus JB. T.
p 690.
Wilder Tabak, nicotiana vielle
ist der Spanische.
Lys Rind a Rind auch in andern Aug. & Sept.

Ad Regio a Lotharingia
Capitale in venit
Asperula Cruciata
Hor. & Jungermannia
in Silvestris sit
Lycoctonum
Matthiolus
v. Jungermannia

Nigella
arvensis . cornuta CB 145
Melanthus Lyte 47. Tab. 182
Melanthus Lyte. f. arvense J B 3. 807.
Schwartz Kümmel.
Mild. Rend. Kümmel. fl. Jul.
Nigellam tenuifolium vid. Valerianam.

Cumulania
major lutea CBZ 304.
Cumulania spicata f. Cumulipis offic. Fj pag.
Lysimachia cumifera fol. verticillatis
fl luteo Tournef 141.
Pfennig-Kraut. fl Junio.

Nux
Juglans f. regia vulgaris CBZ 417.
Nuß Baum.

Nymphaea
alba major CBZ 193.
Nymphaea alba l. Tab. J B. 3. 770.
Weiß Seerosen. auf s Wasser Blüh.
fl Junio.

alba minima CBZ 193.
Ranunculus aquatilis Dod. & Tab.
Nymphaea minor f. morio ranunculus J B. 3. 799.
Wasser-Bisp.
fl Junio.

lutea major CBZ 193.
Nymph. lut. Tab. l. B. 3-771.
Gelbe Seerosen.
= 3 Rud. an Gestalt ganz ist an Geruch
Storax-fl. Jul. Aug. mittis etc.

Morsus Ranae fol. ovali
fl Jun. Aug. Flos
tripetal. caerule. tripetita.
petal. quinquefurc.
fructus & semen ut
flos priori Ranae fl.
Tab. ic. 1. 1. 1. 1.
tota planta alba viscosa
succulenta. Vid. Ruppius.
Descript. vide inter
et Knauth fl Julio.

Ist gleich an Gestalt
in den Blumen Blatt
& ganz wie die Tabak
und die Nicotiana. Blumen
Pflanzen sind. Wegen
Pflanzen 1772 Nov. Pflanze
Pflanzen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cerinthe
Vetrix CBL 162.
Filipendula palustris I. Tab. 421.
cerinthe f. filipendula Vetrix JB. Ts. Lz. 91.
Masses filipendel-wurz. fl. Jun. 0. vid. Kapp. fl. Jan. p. 225.

Onobrychis
folis viciæ spicata echinata major CBL 350.
Onobr. major folio ulij echinati cristati in
spica digesta Morif.
Graneby Clus.

averfi C. lanceolata averfi erecta CBL. 215.
Campanula averfi minima Morif.
Speculum veneris Gesk. fl. Maio 0 Julio 0
Da aber coti[illegible] clen fl. fer i[illegible]
it. zu sagen. aber vid. fl. Jenens. p. 45.
Heuls fl. wohlen averfe

Ophioglossum
vulgatum CBL. 354.
Ophioglossum Tab. 1252.
Natter-Zunge
[illegible]
it. [illegible]
it. offenbar [illegible]

Orpin
bifolia CBL 87.
Orpin I. Tab. 1107.
bifolia major f. orpin major quibsdam JB.
T. 2. 509.
Zweyblatt. Natter-Wurz.

Orchis
morio purpurea CBL.
folijs lanceolatis non maculatis CBL 82.
Orchis minor purpurea et aliorum colorum cui
oli virentibus J. B. T. 2. p. 767.
Mejo [illegible]
dist 5 offen [illegible]
it. [illegible]
it. [illegible]
morio folijs maculatis CB. et J. folijs [illegible]
[illegible]

major tota purpurea non maculata DB.
Anebenkr. Standelwurz.
Mayo = Hünstorf weld v. St. Felix ostwärts

Orchis militaris major, barba latiore minor, purpurea c. fructu. Hayne

Orchis militaris minor

Orchis militaris major barba angustiore purpurea
dissecta Fl. Jen. v. Tab.
bey d. Gerbersteg auf d. Lehen gegen
Ostermundigen zu. 11. Mayo 1796 rupi.

myodes S. muscam gerens de aliis herbidis Clab.
DB. p. 769.
Ophr. muscifera corpy reflexas minor (gelen
d. alij Lobidij. BL 83.
in S. Ulrichs wald St. Ryff 1788 Mayo initio gefunden
[illegible]

Spiralis alba, adorata Clabr.

Triorchis alba adorata minor CB. P. 84.
auf d. Weg bey d. Lulegüt nach d. Felsa
x Forst steigender.
st auf d. Weg am wäldig Zaun
forderst v. bornen
st. auf d. Compost-Hügel
x st. auf d. Weg = d. Felsrod zu coro-
lle ne Nr. 2 ganz unter.

Orchis militaris major, barba latiore minor purpurea c. fructu. Hayne
Orchis militaris minor

Gnoforchis
bifolia lanceolata cucullo major CBL 81.
ordis nigricans Rivini.

militaris minor CBL 81.
Orch. pervis floribus multis parvis nigricantibus Tournef.
Orch. militaris minor et minima Rivini.
Ja – Stadtmus d. Österreich – Linnaeus.
[illegible]

ordis
bifolia latissima CBL aa.

alba bifolia minor calcare oblongo CBL 84.
fl. Junii fine in 3 wald Juni 5 [illegible]
[illegible]
pelmeta fl viridi CBL 86 et in Lvdr. 990a

[illegible]

——— pelastris alteri CBL 86
Palmata serapias pelastris leptophylla violacea, maculata, et o maculata JB. n 776.

——— ——— maculata CBL 86
Palmata Riv.

——— odoratissima CBL 86. et Lvdr. 90.
A. ordis palmata minor calcaribus oblongis CBL 86.
ordis palm. rubella c. longis calcaribus rubellis JB. n 778.

—— montana, maculata CBL 86.
Palmata montana maculata.
Palmate angustifolia maculata Ri-
an 3 Hauptst. und Aehrchen. 7 Zoll

—— alpina flore pauw fabulatus.
an auf 3 Stellen Wr. Ich dient (an Trunkelt)

obtusiva fusca CBL 86.
Lindgavii Lugd. 1070.
Leotbia Dod.
wie [illegible] Stellen [illegible] mit [illegible]
Tab. [illegible]
wie wird [illegible]
[illegible] Stellen [illegible]
[illegible] Stellen [illegible]
[illegible] Stellen

rgith maculata & non maculata, in folijs, flore niveo,
St. cornes, & purpureo -
Rajo. St.
ubi Amica.

1732 Maij

vadijs. ex multis radicul. compositis.

1727 fl. niveo rgi, & fl. [illegible] mihi [illegible], & fl. purpurei

fl. Martis in purpl

1727 Junii inter reg. [illegible] & Herzogen pacta
Hollst. separata I.

Hanover 1727 Junii inter reg. sub sago gen.
Hut. v. Klein Munchhoff in wolf. Bit.
walley hr. adeint pinxer.

luteum minus CBL 71. ornithopodii lu-
teum S. palladium majus CBP. 71.

Ornithopodium
majus CBL 350.
ornithop. ~~majus~~ fl. flavescente JB. Fr. p 750.

Vogel-Klee.
Stiele 3 bis 4 Zoll ... wird 2 Fuß ... Blumen ...
... Blüthen Büschel, ... Blumen ... Blüthen
... Blüthe, ... Blumen ... Blüthen Büschel ...
minus CBL 350. pallidum ... minus.
Hyperillus ornithopodii Lob. ic. 82.

Orobanche
major caryophyllea olens CBL 87.
Orobanche II Tab.
Orobanche fl. majore JB. 2. 780.
Wunder-Wurz. Die gute ... A. und
... Mutterkraut ... Mutterkraut ...
Mutterkraut JB.
rubra dentata, major CBL 88.
Bentaria Matth. Tab.
Ambleta Tournef.
Squamaria Rivini.
Ambleta Cordi S. Aphyllon JB. 2. 780.
Schuppen-Wurz. Drosen-Wurz.

quae Hypocistys dici potest CBL 88.
Hypocistis Rivini. fl. sub Linaria Tino Plinii.
abortiva ... CBL Necotia
... fl. major. Nissi ... dicti.
Orobus
sylvestris purpureus vernus CBL 351.
Orobus Pannonicus I. Clus. Hist. p. CCXXX.

Sylvestris angustifolia Absynthii radice CBA 251.
ovata radice tuberosa Rivini.
bis 3 Runsoff an Rhein. Salzach nach Ufer. Von Rappoltsweiler.
a Hanau 3 Feldberg. St Jean a Jul.

Syl. foliis viridi CBP 252.
Cribus II. pennonicis Clusii.
bis Feldberg [illegible] an 3 Hofenbuck a dem
Orth 1732 Nisi gest M. Ich [illegible]
A. 1732 Jul. d. 17. = obenden wilder
St. Jun. Kals. + post quod = [illegible]
Ostrya Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis CBL 427.
Carpini Teb. Bod. Tempt. 841.
Mist bussen.
seite 3 niederwärts Bey-Felder, wo man nach dem
Ochsenkopf geht will, auf 3 Feld, an Obey.
arbore ha cauli nigricante repente est. Oxyacantha vid.
Papaver Mespilo.
vulgare cajg capitula globosa rubi lucat
semine thecas ajaboleyor Dioscoridi CBL 170.

erraticum mejg: foliis Dioscoridi, Theophrasti,
Clusio CBL 171
papaver erraticum rubeum, campestre,
Pb. 2. 395.
Klyger-Korb. Mej. Jun. Jul.

——— miag CBL 171.

an 3 weg Zwisch Rudolf. v Dultzbuschmis
st in 3 ostenbuschisch dem-feldberg.

Pastinaca
officinarum Dioscoridis CBL ~~171~~ 121.
Pastinaca Bod. Tempt. 102
Si Pastinaca glabra Cl. mas. Matth. Cl.
St Mejo in hortis. intend 3 many pas-
tasi-coloris rapat. 1733. 7bris in vers
3 Niederwind unter [illegible] dorff an 3 wichtlis Jn
Kalberg, mittlis an 3 Mauer, [illegible] an
Swisse = 5 [illegible] 3 Mejo [illegible]
st. 1736 Jun. [illegible]

Kein Scheide ist [illegible]
Fürsten. emolle [illegible]
Pilosum annot ist
Calend.

(a) [illegible] an 5 Mond
[illegible] ubi [illegible]
[illegible] ist [illegible]
an 3 [illegible]
Fürsten an 5 [illegible]
Pius, Mon, annotat
und 5 Mond [illegible]
an 3 gantz Mauer [illegible]
Pastinaca [illegible] (a)
[illegible] 37. Mej. st.
alch an Zwischt.
Mauer, [illegible]
ist [illegible]

Hepatica alba vulgaris dicta.

Paraxis
Tournef.
Gr. Paraxi alba praecoci flore CB. 209.
Hepatica flor. 11 Tab. vid. Gramen Paraxi.
Leber blümen
oder auff Schlesisch weiß Leberblümen
September A. in Rödern Lust.

Lestimea
trauttvetteria sativa rediviva lutea & alba
CB. 151.
Lestimea sativa f. Cerasta lutea J. B. 3. p. 64.
Dens leonis rediviva lutea aurantii colore et alba Tournef. Inst. p. 507.
Staphylina Rivini.

Gelbe wurtzen.
tenuif. sylv. Crispum 4, 6. Dracocephalum
CB. 151.
Staphylina sylv. Rivini.

wilder Nesser

Hyssopus latifolia CB. 155.
Asphodelus ramosus II. Tab. 198.
wilde Lestimea.

Sativa latifolia CB. 155.
Asphodelus Sativa Tab. Fab.
Lestimea Sativa latifolia fl. lutea
J. B. T. 3. p. 2. p. 150.
Lestimea-wurtz.

it. ißt begrüßt an Stelling auf Stein burg 33.
Rhetinet Cißt vocat pleraque.

Passerina Trag. et JB. 3.456.
Lithospermum Linnaei fol. Germanicum CBH. 254.
Lithospermum officinale L. Sp. pl. ed. 1. 286 Klein vivant = lagon
gerad bei Nürnberg.

Wächst wieder Mergen, ißt mündet Ehe 3 Jahren
Kostnet, da ißt ohne Stelling viele Stengel v. groß = Fisch, 3 radices
sind mündet, weil wenig Knollen Fol.
(o) Semen Lithospermi officinalis, Regenstein, Hist. Pet
crinitum = semen cerinthes obtusifolium.

(o) Rubic. Willis à nonnullis cornuta Selinia und cornua rubra
pro forte alia fruit, hinc "Stein ogabine augen Selinia
vid. Dunkleri Theatrum botanicum p. 163. Umbelliferi
multis id commune est, et forte Nürnbergensis ita
multos in petroselino explosa fama terruit vid.
Vind. Hortul. volaci. Hortulo plantis non ita
nocet, atque nunc in parva semina tempore.

In medio flori est
circus rubet, qui
officinae tingit.
videt rubellus
coadhaeret, et ne
Salamine opti
color inde exstat.

(o) vid. de radicis carnosae virtute Selinia und mente Hy-
pericum commune pl. circa Harlem Sept. p. 25.
ißt 3 wächst jung. — Fruchtig Hält Kräuter allen
anisum; Spiritus effluit et corrupta, virtus pleraq.
Umbelliferis multis id commune est; et petroselini
usus crudus Nonnullis noxius Dill et
Hospitalensis p. 1763.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pedicularis

pinnatifida purpurea CBA 163.

Pedicularis tuberosa, Crista Galli fl. rubro et albo Clusii 476.

Crista Galli lutea minor H. Jen. p. 255.

Läus-Kraut.

palustris, rubra, elatior Raji Hist. 770

Crista Galli major F. H. p. 295.

intensa vi. pinnatifida ultra medium [illegible] Linn. Spec.

pinnatifida latea, erectior, calyce floris hirsuto

Lousem-Gras. 172.

Crista Galli mas CB. T. 3. 496.

Haus-Laus.

——— ——— l. Crista Galli CBA 163 Lausekraut mit gelben Blumen

Crista Galli fœmina CB T. 3. 496.

Lactuca s. Cepula rotunda

CB K 292.

Teufels Feb. 992.

Runder Mäusöhr-Salat.

Lattich-Arten. Lactuca. Chondrilla s. Sonchus

Hyoscyamus

vulgatissima s. arvensis CBA 177.

Hyoscyamus I. Feb. 1140. Riv.

Bauernkraut Hyoscyamus rotundifolius arvensis Tournef. inst. 310.

Bilsenkraut.

Hyoscyamus s. Apollinaris.

Euphrasia

nom. spec. Gerardi Cl. 2. 702.

Capitulum Germani & Dodon. et Fourn.

Lin. v. wider. Lobel. Gerard. Matth. Bauh. Cam. Clus. Dod. Lugd. Trag. Fuchs. Tab. Ger. Ang. Dan. Ital. Belg. Fl. Dan. Fl. Suec. Fl. Fr. Fl. Lapp. Fl. Angl. Fl. Carn. Fl. Pruss. Fl. Helv. Fl. Austr. Fl. Ingr. Fl. Sibir. Fl. Graec. Fl. Ital. Fl. Belg. Fl. Germ

Vid. Volumen Flor. Veter. Berg. Regr. Inscr.

Lebestitz

minor CBL. 197.

minor alby augebos folio 913. 3. 566.

Lebenedanum

Germanicis CBL 149.

Lebenedano minor Germanicis 913. Vat. c. 36. vid. Adam. Appendic. p. 27.

Lebenstrang.

Lebezquino

parvo fl. non ramoso CBL rq.

Lebezquino parvo ramoso CBL rq.

Lebezquino gothdo parvo fl. ramoso 913 a. 635.

Lecca

major prima f. Abies rebra CBL 493

Abies tenuior foliis fr. deorsum inflexo Tourn. 585.

Lilosella

major, repens, hispida CBL 282.

Lilosella 1 Fab.

Mant. 65.

— — mönus hispida CBL 1bv.
Dear lenni q pilosella foliis magis villosis
Tourn. Inst. p. 467

aust 8 Hrabnüss capsule sunis.

montana hispida pumo flore CBL 1bv.
Pilosella major 11 Tab. 507.
Hieracium montanum umbellatum
angustifolium Tournef. Instit. p 471.

Hieracium murorum angustifolium non
lanatum CB Prod. p. 67.

Mauer Öhrl.
J. Dillenius — Herr Instit 8
Mauer. Myo.

Pimpinella

Kapselle alba ist groß
Einer. die major
Saxifr. Tourn. minor
Pilosella, v. die minor.
ma.

Kapselle wächst häufig
Pimpinella Pilosella
petit.

Sagifraga major alten CBL 157.
Saxifrage major 11 Tab. 557.
Saxifrage alten major Tour. 309.
Pimpinella minor Rivini.

Alsine bifolia.
Sanicula bifolia CB 1734 Hist. Ox. appt
A. saxifr. Tourn. alten = welcher sie ist
Pimpinella.

— — umbella candida CBL 157.
Saxifrage major umbella candida
Tournef. Instit 309.
major alba Lobus oben ast Kapsel hier etwa
Pimpinella altissima alhundische appet.
Corchorus major Ilex ex 1732 d. 18 Jul. F.
ast Pimpinella major. Tournef. Instit
Hieracium Pilosella minor. St. Gm. nach
Linn. = offic. nach.
— minor CBL 160
Saxifrage major Tournef 309

——— tenuifolia CBR ibo Prod. 84.
Pimpinella tenuifolia Rivini.
Ist bleibt / ist schon ausgestrichen.

Sanguisorba major CBR ibo
Sanguisorba major I Seb. 316
Sanguisorba major fl. spadiceo &c.
J3. I 2. p 120.
grob Pferdbeu Kraut.

——— minor hispida CBR ibo
Sanguisorba minor II Seb. 316.
&c. 3. I 2 p. 113.
Klein Pferdbeu Kr.
an 3 Fuß hohen Stängeln auf.
mit vielen Knöpfen.
Maj.

Linar
Syst. CBR 491
Lin. Syst. vulg. Genevensi et Scoda
&c. I. p 393.
Linaria bastard.

Cistus Hyssopi
CBR 407.
Staphylodendron Matth. p 274.
an Stängeln [illegible]
fl. Maj. a Jun. Stock so 3 Fuß hoch wird. wie
Gallia, Syriaca, Kleber salv. Dulce [illegible]. Z Gestalt (x) [illegible]
Italia, [illegible] 3 andere viel zerstreut wird.

(x) d. i. in solchen Dolden
einfach beisammen
stehen [illegible]
[illegible] 3 Fuß
[illegible] 3 Fuß
[illegible] 3 Fuß
Staphylodendron Matth.

Lignosa alt 1/4 Fuß grün
v. braun v. weiß. Flecken, die mehr
oder weniger gelb.

* so im Abgang an einer Landstraße
gegen Frankfurt in der Gegend von
1734 Mart. Apr. Maj.

Lysimachia
Lysimachia flavescens CBP 240
Lysimachia v. Tab. 883.
Cruciata fl. albo luteo.
Mildo Ebers.
aurea CBP 240.
Lysa vulgaris parva alba sive aurea
BB. T. 2. p 297.
Ebers.
Flos candidus est albo, quandoq; purpureis vexillis mixti cernitur.

regnum Tab.
Rock-Ebers.

hortensis regia CBP 242.
Lysimachia. Lysimachia Ebers.

Plantago
latifolia glabra CBP 189.
Plantago major I. Tab. 1107.
Plant. latifolia sinuata CBP.
Grosser wegerich.

—— minor CBP 189.
Folia in hac est aliquando serrata.

— spica multiplici sparsa CBP 189
Pl. major paniculâ sparsâ BB T3. 503.

— racema CBP 184.
Pl. major hirsuta media à nonnullis exgeminata BB T. 3. p 504.

ut vocabuli genus / peta vocavit

Br. Plantago foliis gramineis fl. luteis capitatis minus flo-
ribus viridi Zeylanica Cornuti p. [illegible] an
Pilz wurz p. auf 3 Reis-wurzel &c. Saporis Salsi. Ho-
rebat 1728 d. 2 Augusti in ipsis Cimbris. Z Wurz
sein Rad 2 wie auch &c. Kali & Salsus saporem. &
Augusto 1728 &c. 14 tyr Grund Z Mittel sein 4 Blätter
Plantain cum Kali quicalets auf 3 Reis-wurzel. dick
& Corrosiv repens & salt. vid. Seiten. Ibr.
p. 27.

angustifolia major CBL 189
Pl. lanceolata Teb 1111. JB. 2. 505.
Groß spitzig Wegerich

——— minor CBL 189.
Pl. lanceolata spanis minima JB 2. 505.
Klein wegerich, bleibt die ganze Zeit über
v. Jahrs als die Blumen.

aquatica latifolia CBL 190.
Pl. aquatica I. Teb 1111
Reperuntly palustris Plantaginis foliis
amplioris Tourn. fast nigr
Alisma Cordi et Rivini.

flores regularis bifidi
et fem. nudi
fructus.

——— latifolia Pl. cti minus
angustifolia minor CBL 190.
Pl. Vaticc minor Teb. 1112.
Alisma angustif. Pl. Jen. 54.
Reperuntly palustr. fol. strictis minore.
Wasser Wegerich.

Plantaginella palustris
CBL 190
Alsine palustris exigua floscula albi
foliis lanceolatis, Plantaginella
Vaticc exstar Ment
amat steile Oerter, wo nur gemeiß Rey, wachsen
sogmit er sehr gleicht. B

Polygala
major CBL 115
Polygala vulg. major. JB. T. 2 p. 387.
Polygala major cærulea alba et purpu-
rea Teb.
Groß Kreuzwurz Kraft Ewigkeit - blau Lein.

Polygala floret
Majo.
& cinerea.
ex parte alba ex
parte cærulea.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

vulgaris. CBL 115.

Polygonum multiflorum GB.

et hinc flores colore ut in antecedente variat,
hic 3 fig. apud Tabernaemontanum
occurrunt.

bleich Knauf Blümelig.

nigrae. niveae CBL 115.

weiß Knaf Blümlein.

Polygonatum

latifolium vulgare CBL 203.

Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis
GB. 3. 514

Weißwurz. Mai
groß = franz G falsche Sem.
foliolate
fl. majore odoro CBL 203.

Weißwurz
Knaf Knauf in den Hecken an der
Landstraße in den Wäldern viele
stehe stehe

angustifolium Graminifolium CBL 203.

vid. Tillen. Act. 1. 27.

Polygonatum V. angustifol. 1 Tab.

folia ut terno quaterna quinaque
cadi-circumpositi = caulem
planitiem faciunt.

Weißwurz mit schmalen steifen Blättern

Knaf Knauf steifkraut. Im Kleefeld an 3 Kleefeld bey
fl. Maj. semio. G falsche Sem.

Polygonum

latifolium CBL 287.

Polygonum l. major Tab.

Polygonum s. Centinodia GB. 3. 374.

Knöterich - gras - Vogelgras.

maritimum angustifolium CBL 287. semio

oblonga angustis foliis CB. 287.
Mentzelii.

erectum humile foliis ovatum. Fl. Giss.
p. 165. Hds. Strigellus fl. cameo Sept.

brevi angustogue foliis CBP. 287.
Polygonum angustifolium simplex J.B. 3. 376.

angustissimo et acuto (. graminea foliis,
minus repens CB. P. 287.
Polygonum minus polycarpon Tab.
Alchymilla sapina graminea foliis
minore flore Tabern. 508.
Polyg. angustissimo gramineo foliis CB.
Cat. Bert et Basilio p. 82.
Kruwel hoji (o parum)

gramineo foliis magis erectum CBP. 290
Polyg. minus alterum Tab.
Alchymilla erecta graminea foliis
minore flore. Tabern. 508

~~coarctatum CBP. 290.~~
— Polyg. Germanicum incanum fl. majore
pleraque ~~CBP.~~ Regi Syrbs. 62. in
Wad. à A. ruinosa Hela. H. Hanov.
et Polygon. comitum Polonis CBP.
Old. Rapp Flora Jenens.
minus s. millegrana major glabra CB. 291.
Germania Tabern.
Heu od. bruy-Kraut.

Polygonifolia
F. Giss. 150. et in add. p. 239.
Polygoni vel linifolia et tenuifolia fl. Scorpioidis
J.B. 3. 379.
Polygonum affine plantae linifolia millegra-
minine quorundam Cluss. p. 458.
du 3 weg bey d. flos-bruy v. in aug.
Julio.

in hoyni rudice Corcu
multo majus diu
ruinosa Graminis
vivat. Folia Polygoni
p. de Polygoni Polygoni
in Cruce — ad spicam
— 4 major in Tr. Wag. in
Gyzenaeo Mus. Sloan
Polyg. ad viam Asphalti
ubi de spicam Alchi:
Observ. 5
spicam de Cl. Observ
in Gyzenaeo Polyg.
spicam Sp. —
Sp.

Mr. Ortolle observait
Gr. Kenker ad exemplaria Flori amicorum com
plurium seu ad Hassel
Seti ad dej
flos rubigine de la spinchi
hygrometrique de Saussure de
Montpellier 1776. et
d'Heaume dans le Journal
de Physique de Villa-

Polypodium
vulg. CBL 259.
Polypodium 1. Tab. 1188.
Schkuhr meyer Bot.
Hayne Fasc.

Ingenuales & cætera sexus affabre sterlen und Lehen Hütte d. Mond
Die Zimbry hinirde, ultra Sedin nyt.
Est Fisch = 5 Tem

At. Est Lustmäuer an d Jüdenwall
praecipit polygodin=
überall Est Lustmäuer Est d Nord Seite,
wo Stätte v. Stadt unter Est, in d moor
ubi semen ejus exigua valde optime pluit
redimy agen, ut auricula ursi
et = ipso muscos qui Diätig humus d Servat
multy germinen = brev editionibus dento ex.
postulo siccanti -

At: Est Lust-
mäuer am
wüsten Ziest
Est d grosse
Gichtrube.
Und in sum
überall an Est
Lustmäuer
an Est Nord-
Seite
= Est mäuer an
d Waldpfad
egyptiacus
Gichtrube
Est

At. an der Mau
der Est Lust
Hill an der
Nord Seite, wo
Kirsch
gross Kirsch
= d Felder
Est über
dem edicto
albo, Tuchma
ne.

ovali pyrali debent Martio ineuntio Aprili,
Aprili in Junio Julio, Sunt in Aprili
Flor tres v. Eiz mit, und nun celiso,
Sept vivipes. Pallens tres abit in
= folia, et nun rostr expandunt folia
pene antis totacea. Vid Lon = ffl.

Bupalus albus = vid
Hall. Hallen cat = Est
Enum. Hort Kilon
Stud 1759. Stuttg.

Bupalus bene nunc
dictus Est. Bupalus
albam multis
dictus = sutor ei
ex dicta sum Est
Dulter scarabaeus
non = item.

Bupalus albus folia = Est = Est = Est

Potalieu

angustifolia s. sylvestris C.B. 198.

Lost. anversis II Teb.

Pau burtol. = lotis aqu. trut. Jul. Bel. = lotis anv. ii. uti a blats trig spem Carlo Lemnio.

latifolia s. sativa CBL 198.

Port. lotersis latifolia J.B. 3. p. 678.

burtol. = lotis. Ges. 665. 1 plat.

anversis CBL 198.

Lotalieu vegua s. Andrachnoin anverse Lauer. Hor. 171

Potalieu vegua s. anversis Lamerario J.B. 3. 678.

Alsinæformis peludrosa tricarpos flosculis albis vaqtis Lluk. 7. 5.

Lamerario Rio ... 3 weiß. an 3 Lander ... 3 Zeitlose ... ist der alten Dasis ...

Potamogeton

rotundifolius CBL 190.

Potamogeton 1 Teb. 1117.

Potam. rotundifolio J.B. 3. 776.

Dam kreut.

Salicis folio CBP 190.

Potamog. angustifol. ii Teb.

Lsicaria salicis folio Potamogeton angustifolius dicta Raji H.P. p. 184.

alteru Dod. Clus. p. 562

est quasi 4 foliatus. Hebet major et minor species.

Pot. foliis latis splendentibus CBL. 190.

Fontinalis lucar major J.B. 3. 776.

~~alterum~~ foliis angusti splendentibus CBL 190

Pot. foliis oblongis alternis lentis undatis Fig. 112

Folia sunt diversa figura

5 Rudo Cl. Rudolphi ... it. bey Hannover

angustifolium caule compresso foliis gra-
minis cæsii Fl. Fen. p 60.

Latum. ramosus caule compresso fol.
graminis cæsii Merret. 97.

foliis crispis J. Lectura varium CBL 193.
Fontinely crispa 715. 3. 778. Cleb. 563.

Fontinelis.

gramineum ramosus CBL 193. copiose
in Mezz.

pusillus graminea foliis caule rotundo
Rey. Hist. 190.
alpinus Plantaginis foliis Tournef. Fontinelis
minus major 613 3. 777. in Mezz. aestivis.
Cubet folia latissima undulata.

Potentille

CBL 321.
Anserina Lob. 342.
Argentina Dod. Pempt. 600
Pentaphyllodes argenteum, alatum,
J. Potentilla Tournef. Inst. 298.

Genistoides
Cruella vid. Cruella.

Cruenta
hyssopifolia CBL 444
Cruenta hyss. Jobst 13. i. 193.

Dissecta od. Absinthi. vom.
Major est et minor, major vocatur Sabrofolia
Stagnina altissima vid. Cruenta
Calycina
Calycina
ubifolia CBL 111.
Calycina Hort. Ups. 12. p 256.
Alsatica Vatica J. Calycina vulgaris Tourn.
189.

Cardiaca
Cardiaca
Cardiaca

Hortulanus Acad. Giessens. 1731 [illegible] und [illegible] Professor Botanices ordinarius [illegible] Professor Botanices extraordinarius [illegible]

Professor Botanices extraordinarius [illegible]

Professor Botanices ordinarius [illegible]

Pulmonaria
Gallica maxima rosea
Vid. Hieracium maximum folio plantaginis.
I. Symphyti vide Symphytum.

Calceolus
Fol. crispis et major flore CBX 177.
Calceolus I Tab. 480.

Auf Osolitz:
Pl. Danzk. 3 Lonicer. Agrimonia ... Auf Consulberg.
Alsine crispa. Arenaria ... Stellaria ...
Byrcenth vid. Oxyacantha Dioscoridis
Cyrola
rotundifolia major CBX 191.
Cyrola Tab. 1199.

Auf d. Altdorf ... Auf Consulberg ...
Hunter Gruß - Hunter - Hesperis.

Cyrus
sylvestris CBX 499.
wilder Birnbaum.

Q

Quercus

Petiolis mer gnis brevi pedicula est CNL 419.

fics-baum.

Quinquefolia officinalis

Jugiten CNL 326.

Pentaphyllodes sapinus HB. n. 398.

Pentaphyllo sapinus quorundā Volentillus fruc

clus. Hist. cviii.

1794 Augst vel Julio [illegible] wächst

[illegible] flore, [illegible]

Quinquefolia

major repens CNL 325.

Quinquefol. vulgaris IV Fab. 351.

Gemein fünffinger Kraut.

minor repens luteus CNL 325.

Quinquefolia minor XIII. Fab. 354.

Klein fünffinger Kraut.

NB (Pentaph.) Bavaricum Gesn. H. N. 120.

hexaphyllos luteus CNL. 325.

Pentaphyllo magis mollis hexaphyllos pulce

sear. fl. luteo HB. n. 398.

[illegible]

folio argenteo CNL 325.

Quinquef. sylvest, major X Fab. 350.

Pentaphyll. reptans foliis perpendē serti,

tibus argenteis, fl. luteo HB. n. 398.

Gras stein fünffi fingrin Kraut.

palustre, rubrum CBL 326.
Anemone palustris XII. Tab. 354.
Clematis Hookeri palustris rubr. Tournef. 298.
auch [illegible]

albus, major, altera CBL 325.
Anemone palustris flore alb. V Tab. 352.
Wald-sumpf. fingir. Kraut.
in d. wald bey den Dörfern gelb blühend
[illegible] Kirchhoven eglend [illegible]
[illegible]

Q

Ranunculus
palustris folio Ranunc. dulcis J. duplex.
folius auch 8 Mörgen breit
[illegible]

* vide sub Anemone
[illegible]

Ranunculus palustris folio Ranunc. dulcis J. duplex.
folius auch 8 Mörgen breit
[illegible]

remorsus lutea CBL 178.
Ranunculus remorsus lutea VIII. Tab 104.
Remorse fl. lutea
[illegible]
gelbe wald Grun spek.

[illegible] Cyclotia, fol. rotundo CBL 178.
[illegible]

Muscatellina dicta CBL 178.
Ranunculus bulbosus minimus Tab. XI. Tab 94.
Moschatellina Tournef.
[illegible]

Anno 1750. Montags, den 6. Julii. No. 107.

134

Mit Röm. Kayserl. Maj. Allergnädigstem Privilegio.

JOURNAL.

In Franckfurt am Mayn.

Wien, den 27. Junii.

Diese Tage hindurch sind alle noch anwesende unter denen Croatischen Trouppen, theils alte, und theils neue resolvirte Herren Officiers, von hier nach Grätz zum Campement abgegangen. So ist auch bereits die Reis-Route, welche Ihro Kayserl. Königl. Majest. dahin resolviret haben, schon zum Vorschein gekommen. Ihro Kayserl. Königl. Ungarische Majestät haben ohnlängst allergnädigst anbefehlen lassen, daß künfftig nicht nur in Dero Residentz-Stadt Wien, sondern auch in allen Oesterreichischen Erb-Landen das Fleisch dem Publico um einen geringern Preis soue gegeben und ausgehauen werden; da man nun diesen Allerhöchsten Kayserl. Königl. Befehl vor wenig Tagen an seiner Behörde publiciret, dagegen aber weitläufftige Gegen-Vorstellungen gemachet worden, so sind, um dieses so löbliches Vorhaben in der That werckstellig zu machen, einige Commissarien nach Pohlen, welche Monatlich 400. und mehr Stück grobes Horn-Vieh heraustreiben lassen sollen, abgeschicket worden. Der Hochfürstl. Brandenburg-Onolzbachische Gesandte, Freyherr von Mentzingen, stehet vollkommen in Bereitschafft, die Belehnung coram Throno zu nehmen, und da diese Sache auch bereits bey dem höchsten Reichs-Gerichte vorgekommen, so will gantz sicher verlauten, daß dieser solenne Actus Investituræ künfftige Woche seinen Fortgang haben werde.

Petersburg, den 9. Junii.

Nachdem der Herr von Warendorff von Ihrer Majestät, dem König in Prenssen, den Character als Dessen Bevollmächtigter Minister, erhalten, so hat derselbe vorgestern seine erste Audientz bey Ihrer Majest. der Kayserin, erhalten. Die zu Cronstadt liegenden Kayserl. Flotte soll nur 14. Tage längst den Küsten von Ehst-Lieff- und Curland bis Dantzig in der See krentzen, und alsdann nach gedachten Cronstadt geraden Wegs wieder zurücke segten, wofern nicht einige Umstände erfordern, daß sie länger in der See verbleiben müsse.

Livorno, den 10. Junii.

Von Corsica vernimmt man, daß der Marquis von Cursay mit den Häuptern der Mißvergnügten über alle diejenige Articul, wodurch der Ruhestand in dieser Insul auf einen dauerhafften Fuß gesetzet werden könne, endlich übereins gekommen, und daß man allein die Zurückkunfft eines an den Französischen Hof abgefertigten Couriers erwarte, um die dieserwegen geschlossene Verordnung offentlich kund zu machen.

Cadix, den 12. Junii.

Endlich ist den 8. dieses Don Benedict Anton Spinola, General-Lieutenant der Königl. See-Macht, mit den Schiffen seiner Flotte, der Phenix, der Drache und die Königl. Familie, so den 16. April aus dem Haven von Fort Royal, auf Martinique, wo sie im November verwichenen Jahrs angekommen, abgesegelt, in hiesigem Haven angelangt. Die Fregatte, die Sacra Familie, warffe auch den 6. dieses in hiesiger Baye die Ancker, welche den 24. Februarii von Vera-Cruz abgegangen. Desgleichen sind den 10ten die Kriegs-Schiffe, Castillien und Europa, aus der Süder-See kommend, und einen Theil der Escadre des Don Francisci Orozco, ausmachend, eingetroffen. Die obgedachte 3. erstere Schiffe haben für Rechnung des Königs und der Particuliers an Bord 348 tausend 972. Thaler in Pistolen und Gold-Stangen:

9498 tausend 444. in gemünztem Silber und in Stangen; 44 tausend 110. Smaragden; 181. Untzen Perlen; 192 tausend 200. Vanilles; 20 tausend 202. Arrobas Taback; 6825. Arrobas Cochenille; 2130. dito Anil; 6550. dito Cacao; 12 tausend 882. Pfund Coquilles; und verschiedene andere kostbahre Waaren. Die Ladung der Schiffen aus der Süder-See bestehet in 1173 tausend 442. in Pistolen und in 1242 tausend 635. Thaler in Gold-Stangen; 1014. Marck kostbahrer Steinen; 409 tausend 481. Pfund Cacao ꝛc. Die Ladung der Fregatte, la Sacra Familie, bestehet für Rechnung der Particuliers in 77 tausend 132. Thaler in Silber; in Anil, Vanilles und Häuten und andern kostbahren Waaren und Effecten.

Madrit, den 12. Junii.

Die Staats-Geschäfften, welche eine Zeit her wegen der vorhabenden Vermählung der Spanischen Prinzeßin zum Theil unterbrochen worden, werden nunmehro mit desto grösserem Eiffer abgehandelt, und gehet die Haupt-Beschäfftigung dahin, den Vertrag zu End zu bringen, welcher die Strittigkeiten zwischen Spanien und Engelland heben sollen; dahero man ein neues Vergleichs-Project aufgesetzet hat, welches zum Vergnügen beyder Nationen gereichen dörffte, dahero der Herr Keene ohnverzüglich seinem Hof Nachricht ertheilen solle.

London, den 25. Junii.

Gegen die Mitte des August-Monats wird zu Neumarcket ein merckwürdiger Wettlauff mit 6. dem Grafen von Marck gehörigen und an eine Kutsche, worinn ein Mensch sitzen wird, angespannten Pferden gehalten werden, welche in einer Stunde 19. Englische Meilen weit lauffen sollen, wider welches der Herr Theobald Taafe tausend Pfund Sterling zur Wettung aufgesetzet, und man versichert, daß auf diesen Wettlauff mehr als 20000. Pf. Sterling von andern Personen gewettet worden. Aus Edimburg in Schottland wird angemercket, daß man von Aberdeen vernommen, daß die Arbeiter, so beschäfftiget gewesen das Erdreich auf dem Kirchhof von Lamphanon aufzuwerffen, ein Gefäß voll sehr alter Specien gefunden, deren ein Theil sehr abgenutzet und unkentbar, diejenige aber, so noch im Stand, beweisen, daß sie unter den Regierungen von Robert und David, gewesener Königen in Schottland, gemünzet worden. Man vermuthet daß der Französische Gouverneur von Martinique, Marquis von Caylus die Absicht gehabt habe, einige Nenthen von der Insul St. Lucia zu ziehen, und selbige nebst den übrigen alsdann erst wiederum einzuraumen.

Paris, den 26. Junii.

Verwichenen Mittwoch und Donnerstag wurden zu Compiegne über verschiedene Angelegenheiten von grosser Wichtigkeit, ausserordentliche Raths-Versammlungen gehalten. Mit verschiedenen Schreiben aus Bretagne vernimmt man, daß der Königliche Minister des See-Wesens, Herr Rouillet, den 19. dieses zu Brest angelangt, und den Haven, die Magazins und Schiffe in Augenschein genommen, er wird ebenfalls die Flotte auf der Rhede besichtigen, und es soll in seiner Gegenwart ein See-Treffen nach allen Umständen gehalten werden. Die Flotte wird, dem Vernehmen nach, nicht so bald unter Segel gehen, und es ist ebenfalls noch ungewiß, welchen Weg dieselbe nehmen werde, und wohin sie bestimmet ist. Ihro Majest. der König, haben wegen der Anzahl, und der Verrichtungen der Artillerie-Officier des See-Wesens, der Kleidungen und Bewaffnungen der Dragoner- und Reuterey-Regimenter 3. verschiedene Verordnungen ergehen lassen.

Ein anders aus London, den 27. Junii.

Den 25. dieses wurde das Parlament bis auf den 10. Sept. verschoben. Zu Sadlers Wells und zu Neu Wells, 2. Orten, wo sich das gemeine Volck, welches dahin zu trincken kommet, zu divertiren pfleget, haben sich bishero zu dessen desto mehrerer Belustigung allerhand Schauspieler, Seil-Tänzer und Pantominenspieler aufgehalten. Wie nun die Friedens-Richter oder Policey-Beamte in Erfahrung gebracht, daß die letztere auf ihrem Schau-Platze zum öfftern allerhand Vorstellungen machten, die wohl pöbelhafften, aber keinen züchtigen Augen gefallen konten, so haben selbige rathsam erachtet, diesem Greuel, auf einmal abzuhelffen, denen Acteurs ernstlich bedeuten zu lassen, ihre Vorstellungen von nun an einzustellen. Die Acteurs zu Neu Wells liessen sich aber durch dieses Verbot so wenig irre machen, daß sie vielmehr die 2. folgenden Tage gantz ungescheut ihren Schau-Platz eröffneten. Wie aber am dritten Tage ein noch schärfferes Verbot von Seiten der Friedens-Richter erfolgte, so hielten sie vor nöthig, denen sich abermals eingefundenen Zusehern von diesem Verbot Nachricht zu geben und selbige um Verzeihung zu bitten, im Fall sie sich genöthiget sähen, in ihren Schauspielen eine Aenderung zu machen. Allein der Pöbel, welcher blos, um sich zu divertiren dahin gekommen und sich also in seiner Erwartung betrogen sahe, nahm keine Raison an, sondern suchte sich nun auf Kosten der Acteurs selbsten ein Divertissement zu machen, schmisse selbigen Bouteil-

len, Gläser und andere dergleichen an den Kopf, zerbrach zuletzt die Bäncke und Fenster, und begab sich endlich mit grossem Lermen und Geschrey aus dem Schau-Platze heraus. Und vielleicht wäre es nicht dabey geblieben, wann nicht die Quartiers-Commissarien, welche man allhier Connetables nennet, auf die erste davon erhaltene Nachricht eine bewehrte Mannschafft dahin abgeschicket hätten, um die Unruhe zu stillen, und die Haupt-Anstiffter bey dem Kopffe zu nehmen.

Berlin, den 27. Junii.

Am 24. dieses als am Johannis-Tage sahe man zu Mittags zwischen 11. und 12. Uhr auf den hiesigen Feldern viele Leute das sogenannte Johannis-Blut suchen, von welchem der Aberglaube viele ungegründete und fabelhaffte Erzehlungen ausgehecket, und von den abergläubigen Leuten als Wahrheiten angenommen worden; daher diese abergläubische Aufführung solcher Leute eine öffentliche Beschämung verdienet, dann es ist dieses sogenannte Johanns-Blut nichts anders als ein rothes Bläßgen oder Wärtzgen an den Wurtzeln des Scleranthus, welches insgemein Knawel, Knaul oder Kneel genennet wird, und häuffig als Unkraut in dem Heydekorn oder Buchweitzen zu wachsen pflegt, hier aber auch im Thier-Garten und fast überall in Menge angetroffen wird. Diese Bläßgen, aus welchen ein rother Safft geht, wenn man sie drückt, werden durch eine kleine Fliege, von dem Ihnen mangeschlecht, verursachet, indem sie ein Ey in die Wurtzel legt, wovon diese rothe Excrescentz entstehet. Diese rothe Farbe ist die schönste Cochenillen-Farbe, und es ist kein Zweiffel, daß man sich derselben, anstatt der so theuren Cochenille, bedienen, und dadurch eine grosse Geld-Ausfuhre verhindern könte; zumal da man Spuren hat, daß man vor Alters diese Teutsche Cochenille schon zu diesem Nutzen angewendet.

Hamburg, den 27. Junii.

Die letzterwehnten Händel der Tischler-Gesellen haben auch die übrigen Handwercks-Pursche angesteckt. Sie bringen ein und andere alte Gebräuche zu Marckte, die sie von ihren Meistern wieder hergestellet wissen, auch nicht eher wieder zu der Arbeit gehen wollen, bis solches geschehen, und noch über das die gefangen-sitzenden Tischler-Gesellen losgelassen und befriediget worden. Inzwischen machen sie sich auf ihrer Herberge, wiewohl ohne alle Ausschweiffungen, alle Tage lustig. Ein Edler Magistrat, welcher die aus einem solchen Anfang unverhofft entspringen könnende Folgen, äusserstem Fleisses zu verhüten trachtet, hat gestern durch die Bürger-Capitains Haus bey Haus ansagen lassen, daß ein jeder Bürger auf den ersten Trommelschlag und Läutung der Sturm-Glocken, sich fertig halten solle, auf den bestimmten Sammel-Plätzen zu erscheinen; wie dann auch am gestrigen Abend statt sonst gewöhnlicher 2. Compagnien von der Bürger-Wache, 4. Compagnien aufziehen müssen, welche zur Erleichterung der Soldaten, 24. Stunden auf ihren Posten verbleiben, wo sie sodann von 4. andern abgelöset werden.

Braunschweig, den 27. Junii.

Wir schmeichlen uns hier, daß die zukünftige Laurentii-Messe eine der Ansehnlichsten seyn wird, und daß sich auf derselben eine grosse Anzahl Fremde einfinden werden. Ihro Durchlaucht unser gnädigster Landes-Herr unterlassen nichts, was nur auf irgend eine Weise zu Beförderung sowohl des Vortheils der hieselbst commercirenden, als auch zum Differtissement derer Fremden beförderlich seyn könne.

Haag, den 30. Junii.

Die Herren Staaten der Provinz Holland sind am Sonnabend bis auf fernere Beschreibung auseinander und nach Haus gegangen, die hier anwesende Herrn Deputirte der resp. Admiralitäts-Collegien aber sind noch hier und täglich in Berathschlagungen über das See-Wesen versammlet. Der neu ernennte Königl. Portugiesische Botschaffter, Herr Pereira Fidalgo, hat laut Nachrichten aus Lissabon den 26. oder 27. des Monats May von dannen hierher abreisen sollen, er hat aber unterwegs eine Commißion bey dem Königl. Französischen Hof zu verrichten, und wird also noch so gar bald hier nicht eintreffen können.

Nieder-Rheinstrohm, den 30. Junii.

Derjenige Amsterdammer Bürger, welcher bey dem Auflauf daselbst ehemal an der Spitze gestanden, und gleichwohl nicht eingezogen worden, hat sich neuerdings durch anzügliche Reden gröblich vergangen, daß endlich derselbe gefänglich nach dem Haag gebracht worden; Ein anderer, den man auch dahin überführen sollen, ist aus Furcht plötzlich gestorben. Ein gewisser Medicus, welcher auch gefangen sitzet; und mit dessen Befragung der Ober-Bogt täglich beschäfftiget ist, giebet zu vielen Reden Anlaß, worinn aber dessen Verbrechen bestehe, kan man nicht erfahren, doch muß es eben nicht gering seyn, da, wie man sagt, derselbe sich in Weibs-Kleidern aus der Stadt begeben wollen. Die zu Leyden befindliche Fabricanten haben die Accis-Befreyung für das Bier, welches sie für die Arbeiter gebrauchen, erhalten; Es ist zu hoffen; daß die

Auflage auf die Seiffen ihnen gleichergestalt werde nachgelassen werden. Als dieser Tagen ein mit Eß-Waaren beladenes Schiff, für Rechnung eines Predigers, allda eingegangen, hat der Einnehmer solches ausladen lassen, derselbe wurde aber von dem Pöbel dergestalten empfangen, daß man ihn halb tod nach Hause tragen müssen: durch die gute Anstalten eines Detachements Dragoner ist dieser Auflauf gestillet worden.

Aus den Niederlanden, den 30. Junii.

Den 27. dieses haben die 3. Gemeinden der Stadt Brüssel die Hebung von 100000. Gulden zur Halbscheid erblich auf 4. prCent, und die andere Helffte auf Leib-Renthen von 8. prCent bewilliget, um einen Weg von Boom, einem Dorff über klein Willebrock gelegen, nach Antwerpen zu machen, wie auch eine fliegende Brücke zu bauen, um die Passagiers, welche mit sogenannten Treck-Schuyten aus Willebrock gekommen, über den Rupel-Fluß zu bringen, wie imgleichen Fahrzeuge zu verfertigen, um selbige durch den Weg nach Antwerpen zu fahren. Man rechnet, daß durch sothanen Weg die Schifffahrt der Stadt Brüssel vieler Unkosten wird entledigt seyn, und den Personen, so vorhin beängstiget waren sich auf das Wasser zu begeben, dieser Weg so viel angenehmer seyn werde, weil man sich die Rechnung machet in Zeit von 6. Stunden aus Brüssel nach Antwerpen zu kommen. An dem Canal von Löwen fähret man mit allem Eifer zu arbeiten fort, und es sind täglich mehr als 6. tausend Arbeiter darzu bestellet.

Cöllen, den 2. Julii.

Die annoch in und um Mülheim beysammen liegende Chur-Pfältzische Reuterey, hat zwar mit denen Exercitien schon seit etlichen Tagen ein Ende gemacht, und ware beordert auf verwichenen Sonntag von dannen aufzubrechen, allein weil ihrer künfftigen Quartiere halben noch etwas zu reguliren vorgefallen und darüber einen nach Mannheim abgeschickten Expressen eine Resolution eingeholet werden müssen, so ist diese Mannschafft zur Rückkunfft gedachten Expressen annoch auf einige Tage mit Fourage versehen und in denen bisherigen Interims-Quartieren zu verbleiben commandirt worden.

Ein anders aus Cöllen, den 3. Julii.

Nachdem Ihro Churfürstliche Durchlaucht den Schluß gefaßt einen Gesandten an den Königlichen Preußischen Hofe abzuschicken, so haben Höchst-Dieselbe den Herrn von Sierstorf ꝛc. zu dieser Gesandtschafft erkieset, daher derselbe den 1. Julii sich nach Augustusburg begeben, um daselbst von Ihro Churfürstlichen Durchlaucht die Verhaltungs-Befehle zu empfangen. Es werden demnach Jh. Excellenz künftige Woche über Hannover die Reise nach Berlin antretten. Ihro Churfürstl. Durchlaucht sollen beschlossen haben eine Reise nach vollbrachter Erndte in Dero Nieder-Ertz-Stifft zu thun. Zu gedachtem Augustusburg befindet sich dermahlen der Königl. Dänische General, Herr Graf von Schulenburg, welcher mit vieler Distinction tractiret wird, und auf dem Churfürstlichen Schloß einlogirt worden.

AVERTISSEMENTS.

Franckfurt am Mayn. In Johann Friederich Fleischers Buchhandlung ist anjetzo wieder neu gedruckt zu haben: Herrn J. M. von Loens einzige wahre Religion, allgemein in ihren Grundsätzen, verwirrt durch die Zänckereyen der Schrifftgelehrten, zertheilet in allerhand Secten, vereiniget in Christo. 2. Theile 8. kostet 45. kr.

In dem Brönnerischen Buchladen auf dem Pfarreisen ist zu haben: Bibliotheque historique & critique des livres rares, Tome I. 4. 1750. 3. fl. 45. kr. Der Spanische Roman oder Diana, eine erdichtete Geschichte. 8. 1750. 15. kr. Die Kunst alles Federvieh in jeder Jahrszeit häufig zu ziehen und zum Nutzen und Vergnügen zu halten. 8. 1750. 15. kr. Jo. Ad. Kopii Historia juris. 8. 1750. 36. kr. Jo. Jod. Becks Praxis aurea de Jurisdictione superiori criminali & centena, vulgo von der Obergerichtbarkeit, Zent-Gericht, hohen Malestz oder fraißlichen Obrigkeit und Blutbann. 4. 1750. 2. fl. Ej. vollständiges und nach dem heutigen Curial-Stylo eingerichtetes Formular. 4. 1750. 3. fl. 30. kr. Alexander Gottl. Baumgarten Aesthetica. 8. 1750. 30. kr. Ej. Ethica. 8. 1750. 28. kr. Ej. Metaphysica. 8. 1750. 30. kr. Biblia sacra ex Seb. Castellionis interpretatione. 8. 1750. 2 fl. 15. kr.

NB. In dem Avertissement vom 22. Junii beliebe man anstatt: zukommen zu lassen, **zukommen lassen mögte**; anstatt aber im widrigen Fall und bey dessen ꝛc. **im widrigen Fall und bey dessen Entstehung dessen dahier in sequestro befindlich so mütterlich als geschwisterlich** ꝛc. zu lesen.

Dieses JOURNAL ist wochentlich viermal bey denen Serlinischen Erben und auf allen Post-Aemtern Montags, Dienstags, Freytags und Samstags zu haben; wird aber bey Hrn. Serlin ausgegeben.

pretaxis ericæ, veris CNL. 178.
Lonicer. sylv. II Fab. 107.
Bauhini Pinax fund.

——— ——— dulcis CNL 179.
Lonicer. dulcis I. Fab. 117.
Pisser Pinax fund.
[illegible] Bauh. [illegible]

——— pretaxis repens Cluserus CNL 179.
Lonicer dulcis II. Fab. 179.
Pisser Pinax.
Ran. [illegible] Bod. lempt. 4mr.
(citreus, maculis albis. Plukn. Alm. t. 179. f. 1. c.)

——— Fedia ventricosa minor rotundo CNL 179.
Lonicer. nidor IV. Fab.
Antonius Rubeus. Unitet asperatus est.

anagallis echinata CNL 179.
Lonicer. anagallis latifol. XIII. angustifolia XIV. Fab.
Cordus Pinax fund.

palustris Apii folio lucis CNL 180
Lonicer. palustr. fl minimo 99. T. 3. 477. 858.
Pisser Pinax. duplex est, folio latiori et angustiori.

aquatica folio rotundo & capillaceo CNL 180.
Lonicer fluviatilis Fab. 119.
fl. Magn. [illegible]

——— Cotyledonis folio CNL 180.
Lonicer. spuria Cotyledonis folio Volck. T. X.

longifolia palustris major CNL 180.
Lonicer. Lunaria major XIV. Fab. III.
alia Plantula [illegible]
fl. Magn. [illegible]

——— ——— minor CBL 180.
Ran. lanuginosus minor XVIII. Tab III

aquatilis capillaceus CBL. 180. vid. Millefolium Vaticum

——— ——— cornutus = Millefolium Vaticum
cornutus CBL 141.
Ranunc. Vaticus alb. caulinatis tenuissime
divisis foliis, floribus caeruleis longis
pedunculo insidentibus Bauh. Th. T. 55. Fig.

aquatilis, albus, fluitans, Lenticulae foliis H. L.
Bat. vid. Millefol. Vaticum

montanus folio Aconiti, magno flore CBL 182
Ranunc. magnus radice hirsuta fl. luteo
J. B. T. 3. 417. [illegible]
——— ——— alb. fl. majore CBL 182
Ranunc. fl. albo Alpino major Clus. p. 46

arvensis tenuifolius Tabernaem.
Ranunc. arvensis foliis Tabernaemontani fl. luteo
Fl. Giess. App. p. 28. fl. Maj. Jun.

montanus foliis Ranunculi pratensis crecti
acris fl. simplici & pleno. = Wild
Hahnenfuß mit Gras-blättern gelb Bl. simple
= double Gras de = feuille Renoncule jaune.
(folia ibi manifeste albo obsita)

Raphanus
major orbicularis l. rotundus CBP. 96.
Rottbüs.

niger CBP. 96.
Raph. major oblongus cortice Kalbo Knigge
F. t. p. 66.

minor oblongus CBP. 96.
Radicula sativa minor Jod. Rempt. 67. 6.
Rettigen Lettut à gueden etty

— tortundus.

mystic. CBP. 96.
Cochlearia folio cubitali Tourn. inst. p. 215.
Armoracia Rivin.
Maior. Rottbüs.

aquatica folio ex gründ leviter divisa CBP. 97.
Sisymbrium Vatric., folio in gründer levi-
ter divisi, siliqua brevior Tournef.

aquatica altera. CBP. 97.
Nasturtium Vatric. R. Fab. 794.
Sisymbrium Vatric. Raphani folio siliqua
breviore Tournef.

Monster Jadwisch. an Rietkresse à 3 Gulden
Lettuce à Spring folie A. Lettuce à ongeen
in Dunghill. A. à Rome ripa.

Rapistrum
fl. luteo CNL 95.
Lemispecies fl. melino III Feb. 793.
Sinapi erucae proxc. seminae nigro Morif.
H. O. E. 2. p. 216.
Rapistrum segetum fl. luteo vel pallido
Fuer. 230.
Rapist. fl. luteo siliqua glabra articulata
Kit. H. 805.
ii. anni subinde. fl. Jul. Junio.

— albo siliqua articulata CNL 95.

— luteo, siliqua glabra, articulata Rapi Hist 805.

Rapum
sativum oblongum Fl. T. 2. n. 838.
Rapa sativa, oblonga s. fusiformis CNL 90.
Long. Ruben

Rapa
sativa rotunda CNL 89.
Rapa sativa rotunda Fl.
Rondel. Ruben.

Vid. Campanula. Rapunculus
esculenta CNL 92.
Rapunc. 1. Fel. 792.
—— vulg. campanulata Fl. T. 2. 795.
Campanula radice esculenta fl. coeruleo H. L. Det
Rapunzel. fl. Junio Jul.

Vid. Fl. Jenens. de Replanz. Hin. 3bri, octobri ... exp. ...
parum et florentia in annis ... rapes albas ...
Hanc autem fl. albos a lutes. ... ...
v. Hanc, flos ... v. planta tota habitus ...
gen.

... Lift Sedig, poly Hyde-Kelleg und Rosa Tr.
... 75.

Tiger ... in ... Ruby ... mit ...
... Leg, ...

... thyse multi flesh ... ...

Spicatus [fl. virolacus] CBL 92.
Repens nach spicatus [albus] CBL 92
an weg nach Feldberg Kronfeldstein
- dürft.

Scabiosa capitulo cæruleo CBL 92
Scabiosa XIII. minor 5 Tab. 444.

Scabiosa foliis negro flore CBL 99.
- Campanula angustifolia cærulea J.B. 5.
flos 5° B. cærulei subtil palescat.

nemorosa, angustifolia parvo flore CBL 99.
Campanula nemorosa angustifolia parvo
flore Tournef.

Scabiosa
vulg. CBL 100
Scabiosa II Tab. 920.

Staphedon. vid Silla = Aug. Prag. 28.
flos lacte violaceo = 5 C.

Rhamnus catharticus
CBL 478.
Spina cathartica Tab. 1489.
Rhamnus Tournef.
Cerasi spina Rivini = Aufeld = 3 Fuß.

Rosa
Sylv. vulg. fl. ad unam racemula CBL 480.
Rosa sylv. X Tab. 1497.
Rosa sylv. Granatorum X Granatus albi - flos Granatus albi rubi
valgens, ist ein gleicher Folter = Rhicipis vid Tem
flos Cynosbati. Rosa Cynosbati - Rosa Cynosbati
Eglanteria to conspit.
— foliis odoratis CBL 480.
Rosa Eglanteria
Staphedon. Tour.

arvensis candida CBL 484.

sylvestris fl. majore & rubente CBL 483.

latus simplex. CBL. 482.

Rubeola

Ruby ideoq antiquus est
et vitio iclutus, nolili
nisi = Ideo antiqui pu-
tabat, et = Ruby nasci
mentis.

mb. D. fil. [illegible] jubly vicennt.
à sponte rubi ibi in terram conjecta vigit et auf = gieb
und Jenes, spe antiquus, die Letten wenig, und
Cuntzy

Rubus elginus humilis JB. Clamarubus Separatis CBH. Ruby
separatis elginy Clusii. [illegible] Br. myrty ch. 173
d. 1704. 24 Lof 3 Lff [illegible] Stock Stöcke, wenig
Ruten lang 3f, an allen = 3 Lofs Mauer, wie an der wilds
in dem Feldern; Lebblich [illegible] ampliy flores, [illegible]
Lof fructus rubri = clyeachs, sich = fünfblätt an Lof Letto,
Rubis = Ol. Lofis = Lofis, v. wolst vogt man auf
Magadeburg, sind = Lofs, ist nun dreyeckt a pusty.
Lofis auf = folia Lofi wie [illegible] folia latina x
ähnlich [illegible], et non ilbefunt ut = averso latere.

Lototi
mit Sebum, Die Pflanze aufgenommen, ist mit Ay ve-
getabl = Motty. Terebinthina [illegible] gemischt
Lay ebel ung Zinsbol, Motty, Wärme, neu alle
at mit Brise = Cuig, hüt et pelley, volatili-
nimul detritus et infantus Mitus tenbüth-
les, aneyes coinjicat verny.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ruta

Rhus

Salix

— rubeat CBL 473.
Rothe Weid.

A. angustifolia Mönch. Serrata lutea foliis ovatis CBL 473.
– Wald-Hopfen. Gelbe Sand-Weide.

foliis oxygonalibus utrinque viridi acuto
CBL 473.
An S. Myrs. ulva S. Gelb-Sand-Weide

oblonga, viridis, acuto foliis CB. L 474
Salix angusta & longissima foliis cuspi-
datis glaucis albicantibus J.B. 1. 212.
an S. ulva S. Myrs.

latifolia rotunda CBL 474.

Salix caprea rotundifolia Tab.
rotundis glaucescentibus, rapite et stipite S. Lonicerae
rapite et stipite luteis, i.e. S. multis ut de foliis an.
Non Nisi Cortice, Ramis foliisque pilosis.

foliis ex rotundato acuminatis CBL 474.

latifolia repens CBL 474.

humilis latifolia erecta CBL 474.

——— angustifolia CBL 474.

Salix viol. Hudis.
Lambertiana

fr. in umbella nigro CBL 456.
Lambert viol. J.B. 1. 244.

Hollen – Hollunder – Baum? i.e. Holz
Ital. Sambuco und Rob. Fr. Hollerbeer.

——— viridi CBL 456.

Zell 30 Nebel weiß 3.

racemosa montana rubra CBL 456.

Semb. racemosa acini rubri J.B. 1. 551.

Acacia - Hülsenbr. auf 3 Fuß hohe Stämme.

equestris fl. simplici CBL 456.

Opuli Rheetia p. 284.

Foam fast. 607.

Pfaffenhütchen - baum. Fl.

——— globoso pleno CBL. 456.

opuli fl. globosi Tournef. p 607.

Schneeballen. Im Garten.

humilis s. Ebuli CBL 456.

Ebuli Tab. 1160.

Ebuli s. Sambucus herbacea J.B. 1. 546.

Attich, baum mutua Acc die Flöte. am Fuß [illegible] Ast [illegible] Ast [illegible] Ast

Satureja

hortensis s. Cunila sativa Clusii CBP 248.

Satureja sativa ND. Tr. p. 272.

Saxifraga

rotundifol. alba CBP 309.

Saxifrag. alb. 1. Tab.

Saxifr. — rotundifolia granulosa ND. 3. 708.

vomitor Dioscorid. |: 3 wirtl. 4 foliosa ala :|

aurea CBP 309.

chrysosplenium 1. Saxifraga aurea Lob. 1224.

chrysosplenium folio ampliori auriculato

Cornut. 146.

Gelbes Milzkraut.

Scabiosa

pratensis, hirsuta, flore coeruleo CBP 269.

Scabiosa major, communis, hirsuta, foliis laciniatis

ND. 3. 2.

Cynoglossum Dod. — Scabiosa.

multifido fol. & flore caerulea CBP 270.

Scab. columbaria fl. c. J. XII Alsat. Hist. III.

gelbe Scabiose.

cujus folia alba altera CBP 270.

Capitulis globosis major minor CBP 270.

Scab. minor vulg. ND. 3. 3.

——— foliis in tenuissimas laciniis dissectis CBP 271.

major fl. ex purpureo coeruleo II Tabern. Icon.

Cornut. Hasit. 464.

major flore albo capitulis CBP Icon. Matth.

s. Rotor Tr. 4 graeßl wil 4 alle 3 Rotor Lobelius vl. unter gemisch mit st. Gras red. CB u. Cluy 1. 174. wobey nicht Satureja alba Tr. = 3 gerth Cluy. Cluy. v. Bauh. für Cunila alba Tr. 3 gerth setzt.

Scabiosa ch. cyanea et rubra. ch. ruby. in Lobelio et rigidula in media. Scabiosa major caerulea offic. Rosa Bo. 2 mit fl. purpureo 1732. mit d. 15 4 auf Schulwiese bey Wimmis Heidelberg wo uns mehr fehlen hat.

|: Rapunculus Scabiosa capit. globosa minor rupi. 1727 Julio medio flore nivis auf dem Sundboden wenig bis gut. an Sundbach Stock. s. d. Wald Berg Legy. s. d. Hütte obwod im Wald nach Offenberg 3 Std. Rapunculus :|

Scandix

semine rostrato vulgaris CBP. 150

Scandix I. Tab. 288.

Kelten veneris ♀ B. J. R. Part. a. p. 71

Nadel-Kerbel.

Scolymus

hortensis foliis spinosis Gis. Hort.

Cirsium hort. acaulon CBP. 380

Artischok.

Scordium

CBP. 247.

Scordium I. Tab. 1144.

Chamaedrys palustris canescens Scordium officin.

Feuerlet. Hasenkraut.

Lysimachia Knoblauch Fr. d. H. auch d. wasser

Au Salb Feldbeerkraut Gil. et Aug. Tab.

[illegible]

altenens ♀. Salvia sylvestris CBP. 247.

Salvia Sylv. V. Tab.

Scordotis Rivin.

Wald-Salbey.

Scordium Rivin. Wasserknoblauch

Scorzonera

latifolia altera CBP. 125.

Scorzonera Germ. I Tab.

Gebor-wurtz. [illegible]

Scrophularia

nodosa foetida CBP. 325.

Scrophularia major Tab.

Scrophularia Rivin.

Scroph. nodosa fabrorum ♀ B.

braunwurtz. Knotenwurtz.

pelusini b festid a f. equestris minor CBL 235.

equestris major CBL 235.
Betonica Patris Tab. 934.
Scroph. nasuta radice fibrosa JB.
2. 421.
Master betonies.

Secale
hyemis l. major CBL 25.
Korn. Roggen.

vernum l. minus CBL 25.
Sommer-Roggen.

hyemis CBL 25.
Clavis Lilienfeld. Lonic.
Secalis mater Tiel.
Roggen-Mutter Korngesprenge. Mutterkorn.

Secundata
dumetorum major se vario spiegio articulatis
CBL. 348.
Hedysarum purpureum Tab. 901
Cornutta se varia Riv.
——— herbacea se varia Tourn. 650.
Kuhjuh-Kraut Kalkspan. Hc. Jul. = anni in Rom.

13. ——— ——— se albo ut mihi notata.

vid. Breslauische Berichte A. 1717. 7br. p. 76. gesch.
stehet alles, was wegen D. ist in Act. med. Physic.
Dec. II. vol. VII. 1726. Excipio ex serie fecalium ea
quae ubi p. Lorenzum [illegible] eruit, merely fortuita
diuersitate observata. [illegible] Breslae Cruciis d. 1. Mai
1717. Vid. Christianum de Crato Inquisitorem
Gesch. in Breslau Thun der wie mit Clapperk. Hellwig
unter ist, anfangt sich an Ottonis Helvigii Physici Wun
ist nicht anders als ein mensch von Leder gemacht
v. lang seine nase, gibt sie nicht [illegible] wunder
dann es ist v. alter weg, an blau mael, v. sieht
Leuth, gespeiset, ut legitur vergnügt ob. Nr. 1. Sept. 6.
deth. Wasser ist tüchtig bey nassen Jahrz. ubi vid. Jan. 1732
Julio, das Brunnen gross. Et wird ihm Lorn blau
v. 3 wochen wie d. finger. Wasser mit Rein Wasser
v. wird v. Eyer fest. Sehr schön.

Vid. Longolii Joh. Daniel Judicium medicum de compto ore lymphae per fruticetum compto Vrbi Breslae Anno 1715. bis pestilente 1717. d. 8. 1717. in quo valide declarat scriptores allegatos rationes vitiosas nullius esse momenti.

Ist wohl nie deutsch gebraucht, ob [illegible] wenn allein
gut dass einige stoss gut dein ist. ehe ist es
gar nahe entlehnt. A et B color.

Sedem
vulg. CNL rgs. fol. 687.
Sedem majus Lib. 1504.
Sedes S. Seng vocat majus office. Volck. fl. 80.
Hainrich
auff d Ludwigl Land auff ein Mader-
Julio.

minus luteus folio antis CNL rgs. weiß
Sedes minus fl luteo fol. 3. Cgl.

— — remedia reflexa CNL rgs. ein Apfel
Kinde auf d Mein. Pl fleischfarbe Trigue
Spadone ist ein gelbe u. weiß ein
ad instar selbst. Es selbe mehr vid.
l'Emery dictionn. des Drogues simples.
— textilis albus CNL rgs.
Sedes minus folio longiusculo textili candido fol. 3.
ein Pflanze von 3 oder 4 Schuh hoch
Kinder sonst auch ein gelbe Mein
ist auch dem wilden aber, dem offenbar auch ein
wilder Mann, ist auch in jungen Mader
und in den Felsen bei Lorch
ist viel [illegible]
tridactylites tectorum CNL rgs.
Tridactylites tectorum fl albo fol. 3. 76.
Saxifraga verna annua humilior Tourn. Inst. floret Maio. auf 3
rgs.

pulpis sobrie pallens purpureus CN. rgs. auf 3
weiß Es fallen sie.

Sempervivum
minus vermiculatum acre CNL rgs.
Sedum parvum acre fl luteo fol. 3. Cgl.
Mader-Pfeffer.
am Galgen.

Stelle freey [illegible]
sortente Vertis op
ntibi vocem et
pney confluenc.

— — inspic. CBL 284.
Sedulius minimus latine Saec. IX. B. T. 695.
Ch. 3 Wiederholt aus einer Grab-Rund.
Ch. 2 Amelia Rhenii copiose.

Senecio
minor vulg. CBL 131.
Senecii I. Sch. 462.
Senecii vulg. s. Erigena. GB.

Kreutzwicht. Jun.

viscum pinguis CBL 131.
Saxifraga pomonica I. Cusp. Hist. XXI.
Saxifraga visciosa et hirsuta FF. 165.

Sempervivum
vulg. major CBL 220.
Sempervivum majus Lenk.
Sempervivum tectorum Rivin.
Quendel
est foliis hirsutis et glabris
s. fl. albo s. CBL 220.

— minus CBL 220
Sedum vulg. JB. T. I. 2. p. 269.
Sempervivum Rivini fl. albo
Auch 2 Conferven Berg. etwas [illegible] wie einige
ist etwas [illegible] Spitze [illegible], zum verdrücken.
foliis citri odore CBL 220
Sempervivum citratum Rivini
Sedum citri odore JB. T. I. 2. p. 270.
Auf der [illegible] Spitze [illegible]
[illegible] Spitze [illegible]

capitulis lapazinosis CBL 220.
Haec non est peculiaris species, visaque mihi [illegible]
longiori internodiis saliens diversitate, in quae-
vis Sempervivi specie.
augustifoliis glabris CBL 220 fl. albo an Sempervivum
Ch. 3 Dec. Jahr.
ist. fl. albicante [illegible]
ist am [illegible] Spitze ist [illegible]
[illegible] ist [illegible]
[illegible] Dec. 1736 Jul.

[illegible] Sedum [illegible]
[illegible] Sedum [illegible]
[illegible] Sedum [illegible]

—— foliis peloso

Serratula

CNL 255. Gl. B. T. 2. p. 23.

Jacq. Lempt. 42.

Serratula sylvatica Tf. p. 178.

Jacea nemorensis C. Serratula vulgo Jacea

Jusl. 444.

Desert.

Sesseli pratense Silaus foetu Clusii CNL 163.

Sesseli pratense Clusii.

Angelica pratensis Apii folio Tourn. Inst. p 313.

Serratula foliis cordatis CNL 162. pro 2 vix Linn. descripta.

Sideritis

vulg. hirsuta, erecta CNL 299.

Sideritis fol. hirsutis pfunde crenatis

Sideritis Clusii

Sider. hirsuta procumbens CNL 299.

Ruell Lonic. fl. Jul.

anonis latifol. glabra CNL 299.

Alyssum majus Tab.

Betonica anonis annua flore albo flosculis

Tourn. Inst. 203.

hirsuta pallido fl. CNL 299.

arvensis aggregifolia rubra CBP 290.
Galeopsis petala fagetis se proponentia Tourn.
Cadmus fagetis Rivin.

N. ——— latifolia repens Ladon fagetis
ist die Knoblichs Wurtz = arvis.
S. Galeopsis petali fagetis fol. latioribus
Kapp Felgen - p 183.

Scrapi Scrapis folio / seti. Scrapi
rotundo CBP 99. Zu dem
Druff. 1728 Zu den ersten
rare plantam zu Tabernae
montanus / Zu Lindy
Hütt an den Straßen
wenig auf den Cornel-
feldern. A. 1732 May
flores ins Sommer
am Ende
Scrapi semine variat,
rum Semine ex nitro
vis. phasit albo & luteo
vis. fl. Jacensi &c. semp
Scrapi Scrapis semine albo
& nitro &c.

Scrapi Erucae folio CBP 99.
Scrapi Erysimo Scrapi cognatum f. simile
PB. T. 2. p 857.
Mitt. Druff.
Jährlich blüht bis = 3 Jahr wie
Jahr Stengel mit Samen bis
wächst fast = Schuh hoch.

Sisymbrium
Germanicum CBP 155.
Sisymbrium nasturtii PB. 3. Th. - 193.
Gemeiner Barbarea.

Nasturtium
latifol. CBP 154.
In Gärten bey Rudolst. an Bäch &c. wächst häufig

S. apium palustre folio & long. CBP 154.
Sium umbelliferum PB. 3. 172.

Cecutaria Rivini - Cicutae
in Oberlaubach Vid.
H. Jenens p. 224.

Erucae folio CBP. p. 154.
1726 Jul. Liebe Rth. Bey dem äussern Graben
bey alten Schloß Bey Feinsthal, Zwischen
den Mühlen & Cospeda - allee.

Smilax
hortensis f. Rhododendros CBP 309.
Rhododendron fl. coccineo s. puniceo Knorr.
H. G. Th. Bg.

Solanifolia
Acorus doctorum CBP 189.
Canna Lutetiana Lob. icon. 166.
A. Gefallen stan. In Bächen, Gräben &c. Bey Jena Gehren sehr gemein. Blüht
Lysimachia &c. Juny. Bey Kirchhasla Lieb =
rauh Frauenpf. Bey Jena Juli. Juny 1736. Blüht
Juli an einigen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Solanum
officinale CBL 166.
Solanum-Extract 1 Tab. 973.
Sol. vulg. ad usum exhibit 973.
Kunst-Apoth.

vesicarium CBL 166.
Alkekengi Lonic.
Halicacabum Riv.
Alkekengi offic. Tourn. 151.
Judenkirsch-Judenkirschkraut.
an Gichtschäfte ...

Solanum hortense CBL 166.
Sol. bacis nigris Cerasi similibus Tab. 977.
Belladonna major folio et flore subrotundo
Solanum maniacum multis Belladonna J.B. Tab. 397. Ves. Kräuterbuch p. 119.
... Tournef. ...
quadrifolium baccifera CBL 167.
Aconitum salutiferum Tab. 1095.
Lupi affi.
Hoba peni J.B. 613.
Lupi Lugd.
fuchsii. Gichtschäfte. A. auf Salbung.

Solanum s. Dulcamara CBL 167.
Amara dulcis Tab. 1290
Glycipicros s. Amara dulcis J.B. ... 109.
Strigens. Kartoffelkraut.
... valens passum.

Solanum s. pomo spinoso oblongo CBL 169.
(o) Stramonia s. Datura major, fructu spinoso oblongo C. B. Pit.
Sol. spinosum ... Tab.
... Datura ... Lugd. p. 87.
Solanum luteum CBL 167. Lugd. p. 87.
Piper americanum J.B. T. 3. p. 621.
Teufelsapfel

Radix colorem rotundum variat, alia n. est ... albicans, alia albicans, haec major et longa ... illa major longa et grandis ... Tournefortii ...
A. Mal. ... Lugd. Bat. vid. et Arm.

pomifera fr. rotundo strieto molli CBL. 167.
Mela aurea odore foetido glabra Lycopsicon
JB 2: 620

Sonchus
asper, laeviusculus, et b laeviusculus CBL 124.

laevis, minor, paucioribus laciniis CBL 124.
Sonchus laeviusculus b spinosus JB. 2. p. 1016.

— laevis et latifolius CBL 124.
Sonchus minor laevigatus, mitior, s. minus
spinosus JB. 2. p. 1014.

— — — fl. subpurpureo CBL 124.
Sonchus laevis III Tab. icon. 191.

— — — muralis pennis floribus CBL 124.
Cacalia foliis runcinatis fl. luteis JB. 2. 1004.

Laevior Austriaca V. altissima Clus. Hist.
CXLVII.
Sonchus asper arborescens CBL 124 Edit. 2.
Hieracium arborescens palustre CBL 6 2
2 Rudbeckia asper 3 foliis fl. purpureis
asper ~~latifolius~~ laeviusculus foliis dentatis laevior.
CBL.
Sonchus laeviusculus spinosus JB. 2. 1016.

vid. Asperulam. Sophia Clusiana Cabel. Jen. 738. Asperulae Kniveae & Laevigatae
Sisymbrium annuum absinthii minoris foliis Tournef. Asperul.
Hyss. laevigatum CBP. Fischeri Asperula, Cruciata, Mollug.
Spergula vid. Alsine Scopoli Ruppii.

Ur. Fürbenhandschuh Gut im Großh. Hess. Hall. Amt Lauterbach.
Interest ut omnia Reuelii Sonthofen.

Sorbus
Sybr. folijs domesticis similis. CBP. 415.
Aucupeni Rivini.
In sylvis montanis frequens.
Fructus.

Sparganium
ramosum CBP. 15.
Sparganium I. Tab. 559.
Sparg. ramosum Lugd. Bat. 541.
Ramosum.

non ramosum CBP. 15.
Sparganium alterum II. Tab. 560. Lugd. Bat. 541.
Ramosum.
Locis subaquaticis, ubi aqua stagnat, frequens.

~~non ramosum Mey. F. G. p. 130.~~
Sparganium erectum vel. rotundum.

Sparganium Vid. Alsine
caulibus pusillis foliosis latis ovato acutis.
F. F. p. 67.
Locis humidis Hercyniae.
Junio.

tenuifolia ramosa flore albo seminibus limbo foliaceo cinctis F. F.
Alsine, sagina facie minus Jasmini non
Dioscoridis. Icon. Fasc. 194.
Alsine Mastis et Anguillis frequens. Locis humidis Hercyniae.
graminea minima flore obscure virente fl. tetrapet.
Tremesi. Junio.
In pratis humidis.

1737. xbr. Vol
ist 3 Fol
an Cop. Dies
Folia
sind zu klein
zu gebrauchen
gut.

Stachys Betonica Crantz
vulg. hirsuta C.B. 157.
Betonica officinalis C.B. 157.
Betonica officinalis Germanica
off. 3. Kr. 160.

hirsutum foliis angustioribus C.B. 157. Knaut. 83.
hirsutum foliis subrotundis.

Stachys Tragi vid. Betonica
Stachys
segetum Germanica C.B. 226.
Stachys Sylvatica Ricini
Stachys Tragi. Stachys Fuchsii. H.R. T. 3. 219
Stachys montana Ricini

palustris fœtida C.B. 226.
Stachys Palustris Matthioli Tab.
Galeopsis palustris Betonicæ foliis & variegata
Tourn. Inst. R. 185.
Stachys Palustris Germanica. Matthioli. Dodon.

Hortulanæ vocant. Scabiosæ flo. in germania.
Statice Lugd.
Gal. Lugd. Ubi ann. Magn. it. ann. Matth. Magni. Matth. Magni. Matth. Magni

Symphytum S. Consolida major fl. albo aut fabulaceo
CBP. 259.
Symphytum tuberosum
Consolida minor.
Symph. major ejusd. HB. 3. 593.
Osmastronium.
fl. purpureo
auch mit gelben, weißen und blauen Blumen. Mexikan.
manchester S. tuberosum Lobel. obs. CBP. 259.
Palmonaria Italorum ad Buglossum accedens
HB. 3. 595.
Lungenkraut. vid. fl. Jesaias f. 7.
it. non maculosum. vid. Palmonaria.

Symphytum
cornutum CBP 398.
Lobel Matth. et Tournef.

alba s. Philadelphi Atheniei CBP 398.
Symph. fl. albo Cluf. Hift.
Da jetzig hinter [illegible] eyer 3 gebraucht u. 3 fort. thun.

Serratula
vulg. luteum CBP. 132.
Serratula officin. F. H. p. 186.
Serrat. vulg. fl. lut. HB. 3. 432.
Scharfkraut. Säum-Kraut.
fl. Julio.

minor alba odore camphoræ s. Achillea Dioscor.
CBP. 132.
Millefolium nobile Ger.
Achillea millefolium odorata JH. 3. 140.
auch 3 fach finden 3 Kinder Heft. fol. Aug.
auch 3 gemacht alten Jacob Rudolphi u Pulz.
Cant Quais
1682 [illegible] 1737 [illegible]
vid. fl. Nordby Volkamer de Rejo.
cet. ist item vid. in 3 Stadt of Hay cet. ist 30 Ogenfum auf Jemberg, Lowen [illegible] mag Lauf Roma- nord 3 fl.

montanum incanum major fl. CBP 132.
Serratula bacciferum Lob. 379.
auch Scharfkraut.
minor alb. CBP Julio da Johan fl. v. den [illegible] Mark in dem wald a vago fl Julio. 1726 vgl. nicht [illegible]
Lehpolus Germanicus CB.

Thalictrum

majus filiqua angulosa aut striata CBP. 306.

Ruta pratensis major I. Tab. 120.

groß weiß Bauten

fl. [illegible]

minus CBP 337.

Ruta pratensis minor VI. Tab. 104.

klein weiß Bauten.

Telephium

vulg. CBP 287.

Telephium I. Tab. icon.

Fabaria Offic. J. J. p. 115.

Latte Henne, Mund-Kraut. Donnerbohne.

Thlaspi

annuae filiquis latis CBP 105.

Thlaspi majus I. Tab.

Thlaspi cum filiquis latis J B. 2. 920.

Bursa Pastoris Mus. Bon. Drucke

Myagrum semine et capsula St. Ted rostrata major erecta

Vaccaria vaccaria filiis major CBP 106.

Thlaspi vulgatius J B. 2. 921.

fl. Mayo

| de vaccaria dictum vid. [illegible] |

---

minus CBP 106.

annuae ? foliatae majus CBP 106.

Bursa Pastoris Mus. ? foliata J B.

Thlaspi alyssoides Tab.

? foliatae minus CBP 106.

Thlaspi III. pannonicum Clus. Hist. CXXXI.

vid. fl. Jenens.

157

Alyssum dactyl. cinereum majus CBH 107.
Alyssum incanum luteum spicatum folio minus Tournef.

Lunaria incana CBH 108.
Alyssum Lunaria incana Tournef. Inst.
Alyssum Lunaria Matthioli Icon. p. 217.
flores albi an Alyssum alterum Mayeri Hist. v. den
Spat
-Kraut. Mondvel-weg. [illegible]

Thymelaea
alpina folio caeterum CBH 463.
Casia Tab.
Cneorum Matth.
Daphnoides Tabernaem. 913. T. I. p. 870.
Thymelaea alpina, buxifolia, Rumelica,
fl. purpureo odoratissimo Tourn. Inst. 594.
fl. albo
Semper virens, [illegible]

Thymelaea
vulg. folio latiore CBH 214.
Thymelaea V. T. Apium
folio
Farnina folio rejore CBH 426 Bock.
Thymelaea alpina buxifolia dicta Park. Theatr. Cneorum Lin.
Daphnoides Gesn. Cneorum Matth. Daphne alpina
minore CBH 426.
[illegible]

Thymelaea
Linifolia Gesn. T. M. et C. p. 170.

Linum Gallicum Tabernaem. Icon. Gesneri
Gesn. Hort.

myrsinites Lobelii Obs. B. 190.
Folio [illegible] Matth. Malt.

myrsinites CBH 190.
Reperit Gesnerus primus Cremeris montibus.

helioscopia CBH 291. (foliis crenatis)
Gemein Landstrauch über Oberwesel u. auf trockenen Feldern
foliis crenatis auf Lahnberg. Ist gelb. Blüht
[illegible]

: Hierauf Lunaria gesandt
1734 April ist sie wieder
[illegible]
Viola - Lunaria
[illegible]
[illegible]
[illegible]

linifolij caule & ramosso tuberculij crebris obsito Fl. in Levant. extra Giff. Hj Herm. Ley.
cyparissij C B.
cyparissias foliis punctis crocei rotatis C B Lugd.

folijs primi fortè Dioscor. Pityusa C B Lugd.
Esula minor Dodon. p 270.
in sylva Affrensi S. D. Augustæ.
capitulis foliis crocei rotatis. item.
& foliis Octavis.
folijs primi C B Lugd. Dioscoridis.

S. Esula cyparissias C B. Lugd.
in vineis c. gr. circa Constantiam.

folijs obtusis C B. p Lugd.
a. loco ubi Lugd. describit
Tabernæmontani.

latifolij crocei Germanicij C B Lugd.

myrsinitis spuria vernicis similis C B Lugd. Germ.
& Jul. circa Constantiam Hungariæ
& Montpelium Dig.

sylvatica lucida off. C B Lugd.

sylvestris tota cana foliis retinerus J B. T. 3. p. 671.
in sylva Affrensi fl. Majo et Junio
Reliqui se multis Abbatiam in sylva Affrensi
recollige est testatus, sed Lucis fuit
familiare et in multiplicem spuria
necessitate

volat Rivius Rappin de Chalcographia agendi.

Tom tells ord: mio ch tubogetal. femin in nid: 4. ab subit
ch pertopetale ut gu-gu-pliv- a tuom ch Ducit femin
5: und: ut ~~pertopetale~~ gu-gu-pliv- vid ch Hausf.

vid ch. Hausf. hortense fest sabinde: Heil: Heil: Heil:
gild, wo sy vollbrüder: / gust Lerche wa Hausf.
Heil. vbesch brand.

Tribaloides oder Tribol. Otico inwend Haber 1739 stygl
P Hausthein am Rhein Cop: ose.

Tribolonax fol: = = =
Lang Hälse = Stengel
gest Hälse v. wie
Tribol. ab Hälse
Main.

an 3 Heil: Hälse Mäslo: = 3 alt Mei: wend Cop: Ab.
Hälse ab wie vor oberhalb mit Hälse
Cop: ose 1752 May. Heil: Hälse Cop: ose.

die beiden Gebrüder v Buch, Neuer Hagen 3 v der ostsee wegen
Colonel Lotte Krieg, welche ab Nov: 1749 Juni ein
wenig ganz trauerlich sind.
vid. Lotte. Hausf. p. 17. de planta varietate.

Tribolo-pedalis pungens. Cant. Hausf. in hac ve
nus Hausf. Hausf. optimus Hausf. ab ovum, qui nunquam valde
nus acutis.

Tribol. wird offt mit Blatbor: mit 4 Aug: Aeuglen
Hausf: gebildet / und gl wird gefunden.

Tribol. audit Tribol. albus Hausf. Hausf. Hausf. Hausf. Hausf.
quam Hausf. Hausf. Tribol. pedalis albus Hausf. Hausf. Hausf.
Hausf. Hausf. Hausf. Hausf. Hausf. Hausf. Hausf. Hausf.

Tormentill
Hfr. CBL. 326.
Tormentilla Tab. 360.
Tormentill.
[illegible] fl. Junio Jul.

Tragopogon.
pratense luteum, majus CBL 274.
Tragopogon luteum Tab. 994.
Gold-Bart.

purpureo-roseum Corn. filio quod Artefii vulgo
CBL. 274.
Barba Hirci fl. purpureo Cam. Rayo auct.
Landrayg.

Trichomanes s. Polytrichon
officin. CBL 356.
Trichomanes nostr. Tab. 1187.
Grün-rothe Mauerlein.

Trifolium
palustre CBL. 327.
Trif. fibrinum Tab.
Menyanthes Tourn. 117.
Biber Abs. Dunckelkraut. Sumpf-Klee.
Hasen Klee
et album

pratense purpur. CBL 327.
Tr. pratense fl. purpur. Tourn. pro.
Rother Kranck Trifolium auch Roth Hasen Klee
ing. flore purpureo albo
fl. Maio Triphyllo vulgo.

——— album CBL 327.
Trif. pratense album à Fuchsio depictum
Icon.
Trifol. Rivini.
Weiß Kraut Trifolium album
differens.

——— fl. albo minor et frumina glabra Pluk.
t. 380.
Weiß Hasen Klee

——— luteum capitulo Lupuli l. agrarium
CBL 328.
Trifol. aureum Tab.

—— —— se minore semine mult. Fl. S.
2a. 380
Melilotus minima Rivin.

montanum lapulum CBL 329
Fr. lapulum montanum capitulis spadiceis fl.
Jen. p 248.

angustifolius fl albo Rivin.
Frit vepris albo fl. vicenis Clus. Fl. S. 2. p 382

luteum, lapulinum, minimum Morif. H. O. S. 2. 142

montanum purpureo vepris CBL. 328.
Frit. vepris Clus. II. non albus sed rubus Fl.
2. 375.

—— Spica longissima rubens CBL 329.
Frit. purpur. vepris spica et foliis longi.
ore Fl. 2. 375.

—— fl pallentes majore
by Fl. Lutrisch brown mostly v. ins bunch by
Frit. Jenis.
Frit. vagrandy Cinereum Lupulum, pallide
luteum f. bolidum Morif.
aureae humile spicatum f. Lagopus CBL 329.
Lagopus asplij spicata Fl. 2. 377.
utrique flent flosculi flavi nidunt albi Fl. A.

—— —— —— —— —— —— flabo
Fabae
by Fl. Fl. Jenis ins Fl. Fl. Actum.)

1726. hoc optimi veneris, brevi in planta publicemus, qua
vacui Mißtrie auf der Hauptwache, Zeichen der
Wahrheit, bey dem wahren Christ.

Schwefel luteus sitz gen. communis. b. Medici fun-
ftiferus. Mr 330.
- Selecta Rivini.

— — — —

Typha
sylvestris - erecta CBL 21.

angustifolia spica alba CBL 21.

Tunica Ord. Dianthus
Cattha
Caryophyllus

Caryophyllus
vulg. CBL. 197.
Caryophyllus Lob. Ic. 1. p. 563.
Dodonaeus - Caryophyllus Dod. Pempt. p. 596.
Gartenblumen. Hochgebürgte Gartenblumen. A. bey
J. Zeiher, Handelsmann und Gärtner. Mayn. Zeit.
A. neue in Frankreich [illegible] — Gaudy. Gartenb.

Gipfelgewächse wie
1736 u. 1737. Herbst.
zum mehr Martii.

Typha
palustris major CB3 L. 20.
Typha I. Lob 558. Ic. 2. 539.
Typha Lob. Icon. 87.
Schoenus Dodon. Lusi. Dalb. Lisch vielerley.

——— clava minor gracili CB Pin 20.
Gemeiner brauner Kolben.
Folia longa sunt augusta magis, et glauca, longitudinem ei
Kolben, Lusi. Dalb. gi und
varietas vid. vitis idaea.
Valeriana
Sylvestris major montana CBL 164.
Phu vulgaris II Lob. 455.
Grosser Baldrian.

palustris major CBL. 164.
Valer. palustr. major Pfunde Lexicon
CBProd. 80.
Grosser wilder Baldrian.

——— minor CBL 164.
Phu minus II Lob. 455.
Valerianae minimae Dod. Pempt.

Agrestis minor fl minore Raji Hist. 389.
Kleiner Baldrian.

Tritic. = clemonbilan. vitis ferr. cupreus deg. excern
drit. F. M. Helmont. Lexicon. p. 211.
ex tritic. aceti vid. stolen
pende = tritic. metall. vid. pende

ab inde folia etiam dist. inf. weil auch hypte blätter hat
[illegible] gedruckt, wie die Hahnenfuß
blatt, dennoch ebenso gelatin, auch Eyer gleich,
einige auch der wie pita rosea, auch 3 deren
aber glatt.

de veleni officinali ex cit Albert M.

Diese Wurzel setzt M. immer Pflanzen adult, v. auf Pflanz
selbst, so dass sie = Pflanzen unter sich sind, 2 Pflanzen
gleich wie eben die Eltern, selbst sie sogar auch M.

pedunc. Labet folia grossa modo serrata, non reliqua Labet
serrata.

1706 vom Aug. d. 2 Pflanzen sich in Kasten, welche später in Lebe
die Früher offt mit 3 mehr Pflanzen voller in wenig
Tagen standen.

kurz Labet flores modo compacti, modo spargun ramulis in-
sidentes, risp. in alten Pflanz Kinder
reliquit.

cinquefolia radicosa major CBL 165.
Valerianella auricula, pinnatifida, hirsuta, semine compresso Morif.
——— semine altero Morif. Umbell.
Locusta terr. 283.
Pfeudodictamnus.

V

Verbascularia
pratensis odorata CBL 241.
Primula veris I fab. 699.
——— major flore luteo odorato Tod.
& pfeudo Clus.
fl. Aprili
recta Hiftoria Italiae pagina dicit.
——— vel fylvestris radicosa CBL 241.
Primula IV Sylv. III Lob. 700.
Primula veris pallida fl. dulcis Cast. Hist.

wild o Oxlip Cal — Blattaria
fl. stand finger up Virginia wild. v. wild
white. Ch. Cowsl. Cal up & yellow — & wild
trial in Ita.

Verbascum
ner latifolium, luteum CBL 239.
Verbascum I. Lob. 957.
wild Cowsl. & Oxl. et Cowsl.

vagas fol. ramosis fl. albo fol. crispis
I. virgin.
283.
Verbasc. folio viridi crispo Morif. H. O.
488.
flor cum umbra lutea, elegans alb.

virgin fl. ca luteo pregrandi CBL 240. |: Aries
verbascum IV. virgin Lob. 956. Oxl. flowers Cal
verb. virgin fl. parvo spicis propinquis Jacob. in fact
283. Apr. 873. Aries of
fl. Junio Chia viscosa. folia & fact nonnihil Stamina fert eadem ut Verbascum latifolium, odorata, calathus flavus, petala fl. tuti lutea, pistillum viride et pilosum, multa grana et rugosa. Lob. nella virginal Locusta

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

verbena

conspicua coerulea fl CNL nby

Verbena recta 1 Feb. 380.

verbena Riv.

Verb. vulg. JB. 3. 443.

Hiern Cr. Monac. [illegible]

Veronica

mas spicata et vulgatissima CNL 246.

Ver. vulgatior fol. rotundioribus JB. 3. 291.

Veronica Riv.

[illegible]

[illegible] (repias nemorum spicata JB. 3. p. 176) H. Dillen.

[illegible]

spicata minor. CNL 247.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

M. Veronica flore pleno, virginalem esse Haller Helvet. palavit. Vid. obs. Bot. Gottorp. M. I. 6.

Hr. Fridericus Ehrhart Veronica [illegible] in folio Edvardi Dameti.

Hanc veronicam officinarum habet olim Wolfsberg flore valgari ex albo variato, & obscure coerulea, in quo & foliis aliquid virides fit. Ft. rubra ad fl. lineis saturatioribus picta in multis fl. Wolfsberg, nihil a priori differt flore duplici (*) flore elegantissime pleno, fol. in caule, caulibus ramisque ramulis, quia simplici fl. instructa, & ex Hr. Monnard. Ille, qui illi vendidit, ipse ortum, vetus est mihi non satis memoria de quo ambiguum, postquam Coppa in vas ab hinc annis transtulit. Hortiduli 1732. Julii die 17. Ft. Coppa in suo statu

Ft. flebunt ut in flore pleno varians officinarum

Affinant & hic plantulae. In Wolfsberg flore pleno postea luxuriante & in plantulas 3 exempl. fl. pleno & simpl. simul, ut ibum fl. simplici & altera vero, unus & flosculi ut oborti, & ex eodem in calyce unus flosculus

1734. Julii fine Hr. [illegible] at Kilcher fruticosa & mont Wolfsberg sponte et provenit vix. Ex origine flore pleno exsiccata plantulae elegantissimae ut adsit in planta quae semen tulit effectu in ostii denique mense haec planta non esse luxu naturae sed generis quasi jure venit. Caeteri autem mutant & assumunt.

1734. Stamina vix ad dimidium vidi colorem esse eundem in una radice et flore ab initio esse violaceum, et postea ad Ae & Oe declinare in pallidum abire. Flore pleno Veronica Scala ait & ego ita est. Et flosculi sine ullo ordine sunt, nec numero est. Et flosculi sine ullo ordine sunt, nec numero est. Et flosculi sine ullo ordine sunt, nec numero

Vicia
Sativa vulg. Semine nigro CBL 344.
Wicke.

it. fl. albo rg.
it. vexillo [illegible]
andere weiß. bis a
Chirol.

maxima dumetorum CBL 345.
Graeca major 11 Feb. 892.
groß wild. Wicke.

vulgaris caulibus foliis semine pisi nigro
an ? CBL 345.
Vicia foliis angustioribus fl. rubro FG. p 91.
fl. [illegible] in axis à 3 fl. st.

(Sepium foliis rotundioribus acutis CBL 345.
Zahn fera)

multiflora CBL 345.
Anders fl. Maji fere.

Segetum cum stipulis planis hispidis CBL 345.
Graeca minor 11 Feb. 892.
kleine wilde Wicke.

——— Jugulenis stipulis glabris CBL 345.
Graeca minor stipulis generalis Rivini.

Lutea fol. convoluti minoris CBL 345.
Aphaca Lob.
Elatine 11 Feb.
wilde gelbe Wicke.

Sylv. pallida stipulis luteis hispidis
Ved. Sylv. luteis stipulis hispidis rotundis
denigatis CBL. 345.
Vicia lutea fl. sylvestris JB. Tom. p 313
a 3 [illegible] Blatt [illegible] 3. Schoten [illegible]
[illegible] it. [illegible]
[illegible]
ramosa, minimis, foliis labentibus fl. purpureo
Im Wald [illegible] Oberrath. fl. Majo. it.
[illegible]

Vincae [illegible] Ved. (Cornutae.

Vinca vinc. Clematis

viola Martia, ut &
caltha palustris &c. Vi-
ola tricolor. Ich di
arff ich so eigtlich
sonderlich, wo die mate-
rie steht aufführen, v. dem
I pauca sunt, sed bene
& materia &c.

Viola

Martia purpurea fl. simplici odora CBR 199.
viola Martia purpurea J.B. 3. 542.
Matz Viola.

—— inodora sylv. [: foliis rigoris et rotun-
dioribus :] CBR 199.
Juncea - Viola.

—— —— —— [: foliis macronatis oblongis
et strictioribus :] CBR 199.
wild Viola.

—— alba CBR 199.
viola Martia fl. albo odorata et non
odorata J.B. 3. 543.
weisse Viola.

tricolor hortensis repens: an Cloÿer
Cloÿer Thuringiæ CBR 199.
Jacea tricolor S. Trinitatis flor. J.B. 3. 548.
Dandet-blumen
J. S. simplex - Acker am Hand zu finden wenig
v. Grabung. Okyo. Junius.

bicolor, arvensis CBR 200
viola bicolor frigor & hortorum vetter
Trejo J.B. 3. 548.
viola sylv: Lob. icon. 611.
nutrorsis vid. Onba.

viola in hortis Martio & 7bri floreat vulgaris.
alba flore alba & purpurea sp. variabilis plinii & Cortusi.

flore odorato in nivea sed rariori rubente vicini
1737. Martio in 3 stirp. ex agro 3 stirp. in hortum
Vestae, mense in 3 stirp.

Viola palustris rotundifol. glabra, rubis Hist. Oxon.
Moris. Parte II 3a. in sumpfig weiß allhier
an Gelaßen Rt. alibi.

Viola palustris rotundifolia glabra Morison. Hist. Oxon. Pl. Maj.
Sect. 5. Tab. 17. Fig. 7
Bey Kiel an der
Wallwiese an alt-
ney am Meerbusen
Rt. Rupp
noted also.

548.

ngrich & in hortis subsilv. Rt. an vallen Cöln & alibi.
h. sic in flore est varia, varietas flore luteo violaceo
obscure cuneato s. violacea, & pallide cuneata. Und also ist
auch trivialer varietas. Ob sie aber Linnaeus so
gute wisse wie ich sie anspreche.

ist [illegible] allein unsere gelb.

Virga aurea
major vel Doria CBL. 269
Aliena Monspeliens. f. Doria JR. 1084.
Jacobea pratensis altissima foliis serratis
Tournef. 485.

asyphitolia serrata CBL 269.

latifolia serrata CBL 269. Virga Aurea vulgaris latifolia J. B.

asyphitolia integra serrata CBL 269.
Symphytum Petraeum. Lob.
Bauh. Pin. 269.

Virga aurea vel Asteriscus
Inula alba CBL 429.
Viscum Lob. 1376.
Mistel.
viscum fibi creat tanquam proverb. vid. Horn botanolog. ex eo viscum optat quo avem capiunt.

Virga aurea
viminea CBL 271. Lob 1281.

Virga Aurea
folio oblongo crenato serrato nigricante CBL 270.
Beyfußblatter
1737. fol. 271 planta ingata Hr Gmelin, quae ibi ipsi vocatur alsbeere vom Jacobäa kraut, Senecio vulgaris ipsi vocatur wilder wermuth oder Beyfußblatter.

folio subrotundo ÿ non crenato baccis rubris
CBL 470
Tabernaem. 1727. fol. 425.
Fuchsel - kraut
Kittelkraut
pulustris CBL 471.
Oxycoccos J. Vaccinia palustris Ols.
Oxycoccus. Tournef
Moos beere

Virga aurea latifolia glabra vulgaris
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio oblongo
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato nigricante
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato subrotundo
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato subrotundo nigricante
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato subrotundo nigricante
Virga aurea latifolia glabra serrata, folio ovato subrotundo nigricante

Ulmus
Campestris et Theophrasti CBL 426.
Ulmus vulgatissima foliis latis scabris Gener.
Tournef. 1480.
Ulmus J B. I. 129.
Ulmus montana CBL 427.
Ulmus latif. Ray.
Ulmus latifolia
Ulmus urticae
Urtica
Urtica urens minima CBL 232.
Urtica rubra Tab.
Urtica urens Nostras.
Urtica urens pilulis geminis I. Dioscoridis similis
Urtica urens CBL 232.
Urtica urens minor CBL 232.
Urtica urens minor annua J B. 2. 446.
Urtica urens minor CBL 232.
Urtica urens pilulis geminis Lobelii CBL 231.
Urtica urens pilulis geminis Tournef.
Urtica urens minor calyculis aculeatis fl. purpure

Ophiogr
Entici.

Lonicer

avena.

Secale

Z

Z.

Jea Auct. z. Ulmo bey Volkart

1727 Obri als auf Nidberg Kastanien Baum
Lunaria fl. coerulea. mit den agni, respicit
Iris pr. gross. Kleine Monat Rose, das ist
bey Kassel, als Jena 1727 von der Lobst
schön sommers wetter.
bey Hessen flor Stein, in ufem anzi mey
Hessen Zs, item in anzi bey Eschborn Fuder
Lilia Rubeola diversa repeta cornelia
Obst. cw floribus.
bey Hessen Zwischen Stein v. flor Stein in collibus
arenosis & inculti vinearum fundo: v. Strauch.
Chamaedrys officinarum Scrophularia nodosa v.
Daucum mont. multifido bey Hessen Stein.
Linn Sylvestris foliis cognitionibus & deasionibus
fl. minore Obst. Lese Zwischen mit Baum.
Supplementum
Cervanam. cw flore
Calceolariam cw Jenense.
Oxyacantham mit ihren roth beern und fein
gefüllten Blumen wieder dahin verlegt von dem
Ihrem Mutter so wie Kraut Lese gelebt
Gegenstand Stein, weil es wegen
andere als nach P. Hermann Leuchtberg Zs Hl
gewesen. it. als 1729 Obri wieder dessen Land, da es also
regnerig Wetter gewesen, sind es da mit Ein-
ten ohne Beutel Lese. it. 1732. Obri als
Orobyche dem quidam in Lorg ähnlich florentem.
Stirps equitis Germanici cum flore stolo
observatis, fragit per terram.
Rupicolla Sapite. major umbellis caudis Obst.
Jenische alba Lenis oleyi

1729. d 8 Obris h gros wieder von Hessen. Montag p
drunk gebracht nun, und d. 12 Obris Zu besehe wieder den
Ort Zwischen Weinberg und Hessen Stein v. flor
Stein 1/2 Stunde von Hessen Stein welche 1727 auf Besich
tigt hatte, v. abdata, observando Kräuter gesehen. Es
sind allerley viele daher Bemerkung Lese. Steinigel,
v. und gelb Lilien Stein Tauber gelbweiß auch Lese
der Blumkraute, und auf diesen platz ist Rose gelesen
ein gantze Hessen Wanderung, auch von mir in dem
Ober Zwischen Berg Leuchtberg Zu nun Zu in abends nach
a. ist dem unter der Wegister ag. Schuler Lese Mantel

175

Cod. tr. Syte um ſt Walth = Thun ... ſ v. Zurich Lützern v. Underſeen, Lucy
z dritter ſind durch Oppenheim v. Mayntz gelegt, da Engraue mentioned ...
Caſſel an Jamaicam ad plures Rhenum tragi 1/5 Cy 1724 ſo Mutſchi
Schüler an der Rhein ... collichy in cultu vinearum ... der ... Rhein,
ſignum ... wilder Palbey, ... den May ... den ... Lucy ...
... wie er ... ſolch ... Gerichtſtatt ... ſeye ... mit ... ſ ... Thun
Seybow. ... Lucy ... ſo ganz ... Oppenheim ... Underſeen,
... ſolch ... Mayntz ...

Vid. de Hochheimenſibus plantis 1736 obſ. botanicis

virum ... ſeye ... Lucy ... ſol ... Ich ... ſeye ... ſich ... in ... alle
... wie ... Lucy ... iſt. Hr. ... alſo ... ſich ... ſich ... Lucy ...
... ſeye ... Lucy ... ſeye ... Lucy ... ſeye


Vid. de Hoedt in casib. plant. 1736. obs. botan.

Lethyris sylvestris Dod. p. 519.
Rhodia seu Lobi vera mastich Dod. Kempf. p. 531.
Colpodes magna Dodon.
Clus. vulgare Rauch.
Pelis palustris Dodon. Kempf. p. 960.
Pilis vulgo
Orchis palustris J. Bauhini
p. Post. Dod. Kempf.
Asphodelus p. 678 Dod. Kempf.
Caryophyllus minor Dodon. Kempf. 174. (Clusianus)

Lectisunt Capitula generalia Ordinis fratrum Predicatorum. Et sicut dudum fratres provincie ultra Garonam in montibus Reliquus omnes ejusdem fuerunt valde acres. Unde versus Ispaniam lectisunt et in novi ramuli arboris cum pestis et in novissimi secundo die mensis S. Hieronymi. Sonechi. Apud Ispaniam lectus fuerunt Capitula Apostolica.

177

N. J. G. Müller Orts-Reis Hortus Eyst. 7. Nürnb. 1734. 12



ubi ☉ w ☽ in ☌ ☉. nulla ☽ fulgor
sed Zonas ☉ ☽ ☉ ubi nullus
☉ gab stuff. Zu Tab, sed ubi ☿ ☉
nam ☉ non sunt tabl quid minerae
vigeneri, sic ☿ sobet.
Terra ubi minera generat est vel
arenosa vel ☿ legen compressionis unita
vel ☉ argillosa; ubi sparnis ☿ lege
cohesionis et complexionis repulsa ☉
illa expulsa est actio cohesio.
Echo fit ubi ☽ cutis sonus non ver
reluspit ☉ ☽ Stich in tag schund
stellt ☉ ☽. in Linsen viel Feldtin stoße
abgeht, dessen Stich ist, wissen die
Calvisten, Lirch?
Terra arenos. Quartz.
Islandus ist absprandy.
als ☽ wo ☿ Wachsel auf ☿ Stoß
wegen Hoff in braunen grab weich
& die Leute ☽ wasser trunks, ☿ ☽
so vitriolisch salzigt stinkend Zeug bey sich
stellt, dass die Leute alle ☽ taub
bekandy, wenn sie aber anderes
gut wasser durch gedrunkt wurde
eins bekommt wurde.
Mellebeln gibt ☉ blinde Ose
Hyllig ☽ ☉ rotter.

Ranores quodam plantæ

1.) Geranium (creatis fl. mar. f. supino CWZ.
repit Jenæ. Brand fl. albo.

2) Anemone sylv. major alba CWZ. antifolio
repit eam flore plenissimo seu rosa. Brand.
Jenæ an. der Leibs Kuppe aber nicht sonst in
+ Gut Holtz in Jahr d. Land Graf. vagnata, hat aber d.
Holtz major. folia. Rore. Graf. Sonnen.
idd repit. et aut. Silberner Blume superp.
Clusii fabel. hat sie in d. Gerth Kirch. Wende der
Blume voll.

3) Cynoglossa fl. albo
repit ad Brand Jenæ. Sonnen.

4) Idd Jenæ repit:
Caryophyll. arvens. umbellif. Horleo glabro CWZ.
fl. pleno f. albo ut vulgaris. sed

5) Idem Colchicus autumnalis vere florens tenuis in-
venit.

6) Flos Adonis hat genau fl. pleno semel repit Jenæ.

7) Ist. ornithogalum fl. albo.

8) Ist. Rubus vulgaris fl. pleno.

9) Ebrat die Theil gruppe d. omnium auf 2 der Nachricht
wurtz und oberen Zeit, auf und. mit Theil vulg
Blatter der ruby. vulgari.

10) Ist. Chamedrys non offic. fl. albo f. folio nervi f. ob sind
an diesen die Blatter weisser als an der ordinary,
wie auch in Origano fl. albo f. pleno gesch
wird. Jenæ repit. Br.

11) Alsine minor tomba obtuso CWZ. Kappes
fl. Jenæ. fl. pleno repta.

Lichen cinereus arboreus marginibus fimbriatis
Muscus arboreus frigius marginibus pelliti Raji
Hist. 116.
Lichen tabifolius ramosus minor hirsutus. Muscus
arboreus, capitulis carens CBauh. 367. 182
Lichen cinereus tabifol. ramosus. Muscus alta
Quercus, tabifolius, Corallioides, arboreus
Dr. Lest. 1. 335. Muscus arboreus Corallioi-
des CBR. 367.
Muscus capillaceus major capitulis crassioribus
cylindraceis, nutantibus. Tournef. Muscus
capillaris foliolis tabulatis congestis, capitulis
oblongis reflexis Raji Synops. 53.
Muscus capillaceus major stellatis Tournef.
Muscus capillaceus major & elatior, capitulis
cylindraceis, obtusis, nutantibus. Tourn.
Muscus capill. major & elatior, capitulis
longis, obtusis, diversis reflexis & veluti
pedunculis, pyxidibus pedicellatis rubris Raji
Hist. 34. Muscus capillaceus, major, pedicellis & capitulis
tenuioribus. Tourn. Muscus capill. major foliis tenuissimis capitulis a-
cutis Tourn. Muscus coronatus medius, foliis
tenuissimis pellucidis, longioribus, capitulis e-
rectis, acutis Mosc. Hist. Oxon. Part. 3. 630.
Sect. 15. Tab. 6. Sect. 15 fig. 10. minor
Muscus capillaceus palustris flagellis longioribus
bifurcatis Tourn. Muscus capillaris palustris
flagellis longioribus bifurcatis Mus. Petiv.
Cent. 1. num. 50.
Muscus capillaceus minimus, stellatus muralis,
stellatus Tourn. Muscus muralis minimus
rosis stellatis, capitulis longiusculis, acutis
erectis. Mosc. Hist. Oxon. P. 3. p. 629. Sect. 15 Tab
6 fig. 12
Muscus pyxidatus major, foliis capillaribus acutis-
simis Tourn. Muscus muralis Tabernæmon.

Muscus Squamosus folium junipinis reflexis
Tournef. Muscus clavatus junipinis
foliis reflexis, clavis strigulosis, sine
pediculis Moris. Hist. Oxon. Part. 3. Sect. 15 Tab. 5. fig. 3. Tournef. Inst. R. H.
Muscus squamosus candicans mollissimus
Tourn. Muscus pulcher dodon. Camp. 4.
Muscus pulcher tenuissimis Regii Hist.
Muscus squamosus densissimis strictis aureis
arboreis Tournef. Inst. R. H.
Lycopodium viscosum [illegible] fl
muscosa [illegible] majusculum Pyrenaicum
CB. Pin. 106.
[illegible] fl muscosa minor
Jamaicensis CBP. p. 206.
Jonquille. RB.
Trifolium Hispanicum caryophyllatum Spica dilutè
rubente CBP. 328. Trifol. caryophyll. hispanicum J. Lagopus caryophyll. Flore dilutè
rubente CB. a. 377 Lagopus caryophyllus hispanicus Clusii Hist. cclxvij.
Scabiosa major flore ex cæruleo purpureo
Tabern. II. 103. Tournef. Inst.
Scabiosa tenuifolia pruinosa, minor CB Pin.
270.
Scabiosa capitulo globoso major CB Pin. p.
270. Scabiosa minor vulgaris [illegible]
RB I. 3. p. 3. Tournef.
Scabiosa minor 4 Tab. Scabiosa capitulo
globoso minor CBP. p. 270. Tabern. I.
Potamogeton Alpinus plantaginis folio
Poetinali tenuior RB. 3. 777.
Viola palustris rotundifolia glabra Monspel. Hist. Oxon. 2 11.
[illegible]

183

Lichen Dioscoridis & Plinii Usnea colore flavescente
Col. Pl. 331. Muscus crispus modo arboris adnascens
colore flavescente C. B. Pin. 367.
Lichen crispus modo arboris adnascens tenuior dicitur
Tournef. Muscus crispus modo arboris adnascens
cinereus, mollior, & in angustiores laciniis divisus Raji
Hist. 116.
Lichen crispus modo saxi adnascens, vermiculosus
cinereus & velut deauratus Tournef.
Lichen pulmonarius saxatilis maximus rotundifolius
Tournefort. alterius
Lichen pyxidatus major Tournef. Muscus pyxidatus
terrestris C. B. Pin. 367. Muscus pyxidatus J. B. 3. 767
Muscus terrestris pyxidatus albus fistulosus imitatus Lobel.
Icon. 267.
Lichen pyxidatus minor Tourn. Muscus pyxidatus saxatilis
C. B. Pin. 367. Prodr. 152. J. B. 3. 767.
Lichen pyxidatus, acetabulis ovis coccineis & fumentibus
Tournef. Muscus multiformis pyxidatus, apicibus coccineis
D. Plot Hist. Staff. 199. Tab. 14. Fig. 1.
Lichen pyxidatus, prolifer Tournefort.

Lycopodion Lusitanicum, minimum, pediculo donatum Tab. 331. fig. E. F. Inst. R. H. Tournefort. Fungus pulverulentus minimus, pedicule longo insidens Raj. Synops. 16.

Lycopodion vesicarium stellatum Tournef. Inst. R. H. Tab. 331. H. H.

Alga Tournef. Inst. R. H. Tab. 337.

Corallioides corniculis candidissimis Tourn. Itin. p. 565. Muscus [illegible] coralloides s. cornutus montanus C. B. P. 361. Muscus Corallinus s. Corallina montana Tab. Icon. 810. [illegible]

Lichen Dioscoridis & Plinii Idaeus, color cinereus Col. Part. 1. 331. Muscus crustis modo arboribus adnascens, colore viridante C. Bauh. Pin. 361.

Lichen Dioscoridis & Plinii Idaeus colore viridante Col. Part. 1. 331. Muscus crustis modo arboribus adnascens colore viridante C. B. P. 361.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main